(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104667076 A
(43)申请公布日 2015.06.03

(21)申请号 201510129435.0

(22)申请日 2015.03.24

(71)申请人 陈志建
地址 250000 山东省济南市高新区崇华路1587号

(72)发明人 陈志建

(51)Int.Cl.
A61K 36/902(2006.01)
C12G 3/04(2006.01)
A61P 29/00(2006.01)
A61P 19/04(2006.01)
A61K 35/62(2006.01)

权利要求书1页 说明书7页

(54)发明名称

一种急性软组织损伤舒筋通络药酒

(57)摘要

本发明公开了一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，主要由下列原料药制备而成，均为质量份：刘寄奴6-12；苏木5-10；三棱8-12；延胡索6-9；葱白5-10；羊蹄4-9；瓦草3-9；地龙5-10；水栀9-12；草乌头8-15；米酒适量。本发明经多年临床实践总结而成，具有活血祛瘀、理气止痛的功效，疗效显著、标本兼治。

CN 104667076 A

1. 一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，其特征在于，主要由下列原料药制备而成，均为质量份：刘寄奴 6-12；苏木 5-10；三棱 8-12；延胡索 6-9；葱白 5-10；羊蹄 4-9；瓦草 3-9；地龙 5-10；水栀 9-12；草乌头 8-15；米酒适量。

2. 如权利要求 1 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，其特征在于，刘寄奴 8-10；苏木 6-9；三棱 9-11；延胡索 7-8；葱白 6-9；羊蹄 5-8；瓦草 4-8；地龙 6-9；水栀 10-11；草乌头 10-13；米酒适量。

3. 如权利要求 1 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，其特征在于，刘寄奴 9；苏木 7.5；三棱 10；延胡索 7.5；葱白 7.5；羊蹄 6.5；瓦草 6；地龙 7.5；水栀 10.5；草乌头 11.5；米酒适量。

4. 如权利要求 1-3 任一所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，其特征在于，步骤如下：

（1）取地龙除去杂质，洗净、切段，加入原料药质量 0.3-0.5 倍的黄酒（优选的：加入原料药质量 0.4 倍的黄酒）拌匀，闷润后，置于热油锅内，炸至表面呈棕黄色，取出、沥干油；

（2）将甘草及黑豆加水煎煮过滤得汤液，取草乌头洗净，置于汤液中浸泡 6-10 小时（浸泡 7-9 小时；更加优选的：浸泡 8 小时），取出放入蒸锅内，隔水蒸，切薄片、晒干；

（3）将刘寄奴、苏木、三棱、延胡索、葱白、羊蹄、瓦草和水栀洗净除杂，加入米醋和清水（米醋和清水的质量比为 1:3），文火加热共煮至透心，取出、切厚片，晒干，与步骤（1）和（2）所制原料药一起捣碎过筛；

（4）将步骤（3）所得药粉加入至米酒内，密封浸渍，每天搅拌一次，共浸渍 25-35 天（优选的：浸渍 28-32 天；更加优选的：浸渍 30 天），取上清液，压榨药渣，榨出液与上清液合并，搅拌均匀，密封静置，过滤、灌装即得舒筋通络药酒。

5. 如权利要求 4 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，其特征在于，步骤（1）闷润 20-30 小时（优选的：闷润 22-28 小时；更加优选的：闷润 25 小时）。

6. 如权利要求 4 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，其特征在于，步骤（2）隔水蒸 4-6 小时（优选的：隔水蒸 4.5-5.5 小时；更加优选的：隔水蒸 5 小时）。

7. 如权利要求 4 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，其特征在于，步骤（3）米醋和清水的总量为所煮原料药质量的 6-8 倍（优选的：米醋和清水的总量为所煮原料药质量的 7 倍）。

8. 如权利要求 4 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，其特征在于，步骤（3）捣碎过 60-120 目筛（优选的：捣碎过 80-100 目筛；更加优选的：捣碎过 90 目筛）。

9. 如权利要求 4 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，其特征在于，步骤（4）加入米酒的量为药粉质量的 12-24 倍（优选的：加入米酒的量为药粉质量的 16-20 倍；更加优选的：加入米酒的量为药粉质量的 18 倍）。

10. 如权利要求 4 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，其特征在于，步骤（4）密封静置 12-18 天（优选的：密封静置 14-16 天；更加优选的：密封静置 15 天）。

一种急性软组织损伤舒筋通络药酒

技术领域

[0001] 本发明涉及中医中药领域，特别是涉及一种急性软组织损伤舒筋通络药酒。

背景技术

[0002] 急性软组织损伤系指人体运动系统、皮肤以下骨骼之外的组织所发生的一系列急性挫伤或（和）裂伤，包括肌肉、韧带、筋膜、肌腱、滑膜、脂肪、关节囊等组织以及周围神经、血管的不同情况的急性损伤。这些组织受到外来或内在的不同致伤因素的作用，造成组织急性破坏和组织生理功能的暂时紊乱而产生损伤。急性软组织损伤一般是受外来的机构应力的作用，当应力作用达到一定的强度超过软组织承受负荷，即能诱发损伤，产生症状。临床症状表现为 1. 疼痛：与暴力的性质和程度，受伤部位神经的分布及炎症反应的强弱有关。2. 肿胀：因局部软组织内出血或（和）炎性反应渗出所致。3. 功能障碍：引起肢体功能或活动的障碍。4. 伤口或创面：据损伤的暴力性质和程度可以有不同深度的伤口或皮肤擦伤等。

[0003] 公布号 CN 103301411 A（申请号 201310281418.X）的中国专利文献公开了一种治疗软组织损伤的中药酒及其制备方法，由下列重量份的原料制成：芙蓉叶 28-42 克、白芷 28-42 克、当归 23-33 克、紫草 23-33 克、三七 13-17 克、乳香 13-17 克、丁香 13-17 克、山柰 13-17 克、延胡索 10-14 克、泽泻 10-14 克、黄连 10-14 克、黄芩 7-11 克、赤芍 7-11 克、红花 6-8 克、牡丹皮 6-8 克、姜黄 6-8 克、60 度白酒 4600-6600 克。公布号 CN 103169830 A（申请号 201310120987.6）的中国专利文献公开了一种治疗闭合性软组织损伤的外用药酒，由当归 10g、川芎 10g、生大黄 10g、红花 10g、生川乌 10g、生草乌 10g、西党参 10g、桃仁 10g、乳没 10g、骨碎补 10g、土鳖虫 10g、木鳖 10g、血竭 10g、田三七 10g、甘草 10g、52 度白酒 1kg 制成。公布号 CN 104337918 A（申请号 201310337815.4）的中国专利文献公开了一种用于治疗扭伤的外用药酒，其特征在于包含以下成份：川乌 10 克、羌活 15 克、三七 10 克、苏木 25 克、泽兰 15 克、大黄 5 克、苏木 6 克、白芷 10 克、远志 15 克、勒党根 9 克，酒精度为 40% 的白酒 400 毫升。

[0004] 目前应用于治疗急性软组织损伤的药物虽有不少，但治疗效果却相差甚大，部分药物存在耗时长、疗效差的缺点，因此应研究出临床效果更加显著、使用安全、见效快的药物。

发明内容

[0005] 针对现有技术的问题，本发明的目的是提供一种效果显著、服用安全适用性广的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒。

[0006] 本发明的技术方案是：

一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，主要由下列原料药制备而成，均为质量份：刘寄奴 6-12；苏木 5-10；三棱 8-12；延胡索 6-9；葱白 5-10；羊蹄 4-9；瓦草 3-9；地龙 5-10；水栀 9-12；草乌头 8-15；米酒适量。

[0007] 优选方案为，刘寄奴 8-10 ；苏木 6-9 ；三棱 9-11 ；延胡索 7-8 ；葱白 6-9 ；羊蹄 5-8 ；瓦草 4-8 ；地龙 6-9 ；水栀 10-11 ；草乌头 10-13 ；米酒适量。

[0008] 更加优选的方案，刘寄奴 9 ；苏木 7.5 ；三棱 10 ；延胡索 7.5 ；葱白 7.5 ；羊蹄 6.5 ；瓦草 6 ；地龙 7.5 ；水栀 10.5 ；草乌头 11.5 ；米酒适量。

[0009] 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，步骤如下 ：

（1）取地龙除去杂质，洗净、切段，加入原料药质量 0.3-0.5 倍的黄酒（优选的 ：加入原料药质量 0.4 倍的黄酒）拌匀，闷润后，置于热油锅内，炸至表面呈棕黄色，取出、沥干油 ；

（2）将甘草及黑豆加水煎煮过滤得汤液，取草乌头洗净，置于汤液中浸泡 6-10 小时（浸泡 7-9 小时 ；更加优选的 ：浸泡 8 小时），取出放入蒸锅内，隔水蒸，切薄片、晒干 ；

（3）将刘寄奴、苏木、三棱、延胡索、葱白、羊蹄、瓦草和水栀洗净除杂，加入米醋和清水（米醋和清水的质量比为 1:3），文火加热共煮至透心，取出、切厚片，晒干，与步骤（1）和（2）所制原料药一起捣碎过筛 ；

（4）将步骤（3）所得药粉加入至米酒内，密封浸渍，每天搅拌一次，共浸渍 25-35 天（优选的 ：浸渍 28-32 天 ；更加优选的 ：浸渍 30 天），取上清液，压榨药渣，榨出液与上清液合并，搅拌均匀，密封静置，过滤、灌装即得舒筋通络药酒。

[0010] 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，步骤（1）闷润 20-30 小时（优选的 ：闷润 22-28 小时 ；更加优选的 ：闷润 25 小时）。

[0011] 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，步骤（2）隔水蒸 4-6 小时（优选的 ：隔水蒸 4.5-5.5 小时 ；更加优选的 ：隔水蒸 5 小时）。

[0012] 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，步骤（3）米醋和清水的总量为所煮原料药质量的 6-8 倍（优选的 ：米醋和清水的总量为所煮原料药质量的 7 倍）。

[0013] 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，步骤（3）捣碎过 60-120 目筛（优选的 ：捣碎过 80-100 目筛 ；更加优选的 ：捣碎过 90 目筛）。

[0014] 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，步骤（4）加入米酒的量为药粉质量的 12-24 倍（优选的 ：加入米酒的量为药粉质量的 16-20 倍 ；更加优选的 ：加入米酒的量为药粉质量的 18 倍）。

[0015] 所述的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法，步骤（4）密封静置 12-18 天（优选的 ：密封静置 14-16 天 ；更加优选的 ：密封静置 15 天）。

[0016] 本发明所用主要中药原料的药理如下 ：

刘寄奴 ：又名刘寄奴草、九里光，为菊科蒿属植物奇蒿的带花全草。药性 ：茎圆柱形，表面棕黄色或棕绿色，质硬而脆，易折断，头状花序集成穗状圆锥花序，枯黄色，气芳香，味苦、辛，性温。成分 ：主要含有奇蒿黄酮、小麦黄素、芹菜素、棕榈酸等。根据现代药理研究发现，该药具有抗缺氧、活血化瘀、消积、止血消肿的功效，用于血滞经闭，食积腹痛，尿血，烫伤等症。

[0017] 苏木 ：基原 ：为豆科植物苏木的干燥心材。化学成份 ：木部含无色的原色素－巴西苏木素约 2%。巴西苏木素遇空气即氧化为巴西苏木红素。另含苏木酚，可做有机试剂，检查铝离子。又含挥发油，油的主要成分为水芹烯及罗勒烯。还含鞣质。性味 ：甘咸，平。归经 ：入心、肝经。功能主治 ：行血，破瘀，消肿，止痛。治妇人血气心腹痛，经闭，产后瘀血胀痛喘急，痢疾，破伤风，痈肿，扑损瘀滞作痛。

[0018] 三棱：基原：为黑三棱科植物黑三棱、细叶黑三棱、小黑三棱的块茎。性味：味辛；涩；凉。归经：肝；脾经。功能主治：破血行气；消积止痛。主症瘕痞块；瘀滞经闭；痛经；食积胀痛；跌年伤痛。

[0019] 延胡索：基原：为罂粟科植物延胡索的块茎。性味：辛苦，温。归经：入肝、胃经。功能主治：活血，散瘀，理气，止痛。治心腹腰膝诸痛，月经不调，症瘕，崩中，产后血晕，恶露不尽，跌打损伤。

[0020] 葱白：基原：为百合科植物葱的鳞茎。化学成份：鳞茎含挥发油，油中主要成分为蒜素；又含二烯丙基硫醚。叶鞘和鳞片细胞中有草酸钙结晶体。性味：辛，温。归经：入肺、胃经。功能主治：发表，通阳，解毒。治伤寒寒热头痛，阴寒腹痛，虫积内阻，二便不通，痢疾，痈肿。

[0021] 羊蹄：基原：为蓼科植物羊蹄或尼泊尔羊蹄的根。化学成份：羊蹄根含大黄根酸、大黄素、呢坡定基 -3- 甲基萘。性味：苦，寒，有小毒。归经：《本草撮要》：″入手少阴经。″功能主治：清热，通便，利水，止血，杀虫。治大便燥结，淋浊，黄疸，吐血，肠风，功能性子宫出血，秃疮，疥癣，痈肿，跌打损伤。

[0022] 瓦草：基原：为石竹科植物瓦草的根。性味：苦；辛；性凉。归经：肺；肾经。功能主治：镇痛；清热；利尿；化痰。主跌打损伤；风湿疼痛；胃脘痛；热淋；肺热咳嗽；外伤出血；疮疖肿毒。

[0023] 地龙：性味与归经：咸，寒。归肝、脾、膀胱经。有清热定惊，通络，平喘，利尿的功效。用于高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，水肿尿少。

[0024] 水栀：基原：为双子叶植物药茜草科植物大花栀子的果实。化学成份：种子含藏红花素、甘露醇，以及一种熔点为 167-168℃的成分，可能是植物激素。枝皮含山梨糖醇、甘露醇等多羟基醇。性味：苦；寒。归经：心；肝经。功能主治：散热解毒；消肿止痛。主热毒；黄疸；鼻衄；肾炎水肿；挫伤扭伤。

[0025] 草乌头：基原：为毛茛科植物乌头(野生种)、北乌头等的块根。性味：辛；苦；热；大毒。归经：心；肝；脾经。功能主治：祛风除湿；温经散寒；消肿止痛；。主风寒湿痹；关节疼痛；头风头痛；中风不遂；心腹冷痛；寒疝作痛；跌打损伤；瘀血肿痛；阴疽肿毒；麻醉止痛。

[0026] 米酒：基原：用蒸熟的江米(糯米)拌上酒酵发酵而成的一种甜米酒。性味：味甘辛，性温。功能主治：益气，生津，活血。

[0027] 本发明提供的一种急性软组织损伤舒筋通络药酒配方科学，制备方法简单。除此之外，它的优良之处还表现在：

1、本发明所得产品，治疗效果好，治愈率高，可有效缩短治疗时间；

2、本配方经多年临床实践总结而成，具有活血祛瘀、理气止痛的功效；

3、本发明所选中药材，安全无副作用，可长期服用，提高免疫力。

具体实施方式

[0028] 下面结合实施例和实验例详细说明本发明的技术方案，但保护范围不限于此。

[0029] 实施例 1一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，主要由下列原料药制备而成(每份 10g)：刘寄奴 6 份，苏木 5 份，三棱 8 份，延胡索 6 份，葱白 5 份，羊蹄 4 份，瓦草 3 份，地龙 5 份，水栀 9 份，草乌头 8 份，米酒适量。上述一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法

是：

（1）取地龙除去杂质，洗净、切段，加入原料药质量 0.3 倍的黄酒拌匀，闷润 20 小时后，置于热油锅内，炸至表面呈棕黄色，取出、沥干油；

（2）将甘草及黑豆加水煎煮过滤得汤液，取草乌头洗净，置于汤液中浸泡 6 小时，取出放入蒸锅内，隔水蒸 4 小时，切薄片、晒干；

（3）将刘寄奴、苏木、三棱、延胡索、葱白、羊蹄、瓦草和水栀洗净除杂，加入米醋和清水（米醋和清水的质量比为 1:3），米醋和清水的总量为所煮原料药质量的 6 倍，文火加热共煮至透心，取出、切厚片，晒干，与步骤（1）和（2）所制原料药一起捣碎过 60 目筛；

（4）将步骤（3）所得药粉加入至米酒内，米酒的量为药粉质量的 12 倍，密封浸渍，每天搅拌一次，共浸渍 25 天，取上清液，压榨药渣，榨出液与上清液合并，搅拌均匀，密封静置 12 天，过滤、灌装即得舒筋通络药酒。

[0030] 实施例 2一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，主要由下列原料药制备而成（每份 10g）：刘寄奴 12 份，苏木 10 份，三棱 12 份，延胡索 9 份，葱白 10 份，羊蹄 9 份，瓦草 9 份，地龙 10 份，水栀 12 份，草乌头 15 份，米酒适量。上述一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法是：

（1）取地龙除去杂质，洗净、切段，加入原料药质量 0.5 倍的黄酒拌匀，闷润 30 小时后，置于热油锅内，炸至表面呈棕黄色，取出、沥干油；

（2）将甘草及黑豆加水煎煮过滤得汤液，取草乌头洗净，置于汤液中浸泡 10 小时，取出放入蒸锅内，隔水蒸 6 小时，切薄片、晒干；

（3）将刘寄奴、苏木、三棱、延胡索、葱白、羊蹄、瓦草和水栀洗净除杂，加入米醋和清水（米醋和清水的质量比为 1:3），米醋和清水的总量为所煮原料药质量的 8 倍，文火加热共煮至透心，取出、切厚片，晒干，与步骤（1）和（2）所制原料药一起捣碎过 120 目筛；

（4）将步骤（3）所得药粉加入至米酒内，米酒的量为药粉质量的 24 倍，密封浸渍，每天搅拌一次，共浸渍 35 天，取上清液，压榨药渣，榨出液与上清液合并，搅拌均匀，密封静置 18 天，过滤、灌装即得舒筋通络药酒。

[0031] 典型病例：xxx，女性，22 岁。病史：患者滑轮滑时不慎摔伤，手臂有擦伤，且轻微出血，左腿肿胀，青紫有淤血，疼痛难忍，不能行走，经医生检查，患者无骨折现象，诊断为软组织损伤。

[0032] 服用本实例所得一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，每次一两，每天两次，五天为一个疗程，患者服用三天后，淤血、疼痛明显减轻，擦伤处好转，继续服用一个疗程后，左腿可正常行走，无其他不适症，停药半年内，一切正常。

[0033] 实施例 3一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，主要由下列原料药制备而成（每份 10g）：刘寄奴 8 份，苏木 6 份，三棱 9 份，延胡索 7 份，葱白 6 份，羊蹄 5 份，瓦草 4 份，地龙 6 份，水栀 10 份，草乌头 10 份，米酒适量。上述一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法是：

（1）取地龙除去杂质，洗净、切段，加入原料药质量 0.3 倍的黄酒拌匀，闷润 22 小时后，置于热油锅内，炸至表面呈棕黄色，取出、沥干油；

（2）将甘草及黑豆加水煎煮过滤得汤液，取草乌头洗净，置于汤液中浸泡 7 小时，取出放入蒸锅内，隔水蒸 4.5 小时，切薄片、晒干；

（3）将刘寄奴、苏木、三棱、延胡索、葱白、羊蹄、瓦草和水栀洗净除杂，加入米醋和清水（米醋和清水的质量比为 1:3），米醋和清水的总量为所煮原料药质量的 6 倍，文火加热共煮至透心，取出、切厚片，晒干，与步骤（1）和（2）所制原料药一起捣碎过 80 目筛；

（4）将步骤（3）所得药粉加入至米酒内，米酒的量为药粉质量的 16 倍，密封浸渍，每天搅拌一次，共浸渍 28 天，取上清液，压榨药渣，榨出液与上清液合并，搅拌均匀，密封静置 14 天，过滤、灌装即得舒筋通络药酒。

[0034] 实施例 4一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，主要由下列原料药制备而成（每份 10g）：刘寄奴 10 份，苏木 9 份，三棱 11 份，延胡索 8 份，葱白 9 份，羊蹄 8 份，瓦草 8 份，地龙 9 份，水栀 11 份，草乌头 13 份，米酒适量。上述一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法是：

（1）取地龙除去杂质，洗净、切段，加入原料药质量 0.5 倍的黄酒拌匀，闷润 28 小时后，置于热油锅内，炸至表面呈棕黄色，取出、沥干油；

（2）将甘草及黑豆加水煎煮过滤得汤液，取草乌头洗净，置于汤液中浸泡 9 小时，取出放入蒸锅内，隔水蒸 5.5 小时，切薄片、晒干；

（3）将刘寄奴、苏木、三棱、延胡索、葱白、羊蹄、瓦草和水栀洗净除杂，加入米醋和清水（米醋和清水的质量比为 1:3），米醋和清水的总量为所煮原料药质量的 8 倍，文火加热共煮至透心，取出、切厚片，晒干，与步骤（1）和（2）所制原料药一起捣碎过 100 目筛；

（4）将步骤（3）所得药粉加入至米酒内，米酒的量为药粉质量的 20 倍，密封浸渍，每天搅拌一次，共浸渍 32 天，取上清液，压榨药渣，榨出液与上清液合并，搅拌均匀，密封静置 16 天，过滤、灌装即得舒筋通络药酒。

[0035] 典型病例：xxx，男性，38 岁。主诉：腰部肿胀、疼痛难忍三天；病史：患者三天前干重体力活时，不慎扭伤腰部，刚开始感觉不严重，遂未重视，晚上睡觉时疼痛难忍，腰部两侧出现肿胀，局部出现瘀斑，肢体活动受限制，到医院经 X 线检查，未发现脱位或骨折，诊断为关节扭伤。

[0036] 输液治疗后，效果不显著，便回家寻求其他方法，经人介绍服用本实例所得一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，每次一两，每天两次，五天为一个疗程，患者服用一周后，感觉腰部疼痛减轻，瘀斑开始消退，继续坚持服用一个疗程，不适症消除，肢体可正常活动，为巩固疗效，又继续服用一个疗程，随访一年内，未出现后遗症。

[0037] 实施例 5一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，主要由下列原料药制备而成（每份 10g）：刘寄奴 9 份，苏木 7.5 份，三棱 10 份，延胡索 7.5 份，葱白 7.5 份，羊蹄 6.5 份，瓦草 6 份，地龙 7.5 份，水栀 10.5 份，草乌头 11.5 份，米酒适量。上述一种急性软组织损伤舒筋通络药酒的制备方法是：

（1）取地龙除去杂质，洗净、切段，加入原料药质量 0.4 倍的黄酒拌匀，闷润 25 小时后，置于热油锅内，炸至表面呈棕黄色，取出、沥干油；

（2）将甘草及黑豆加水煎煮过滤得汤液，取草乌头洗净，置于汤液中浸泡 8 小时，取出放入蒸锅内，隔水蒸 5 小时，切薄片、晒干；

（3）将刘寄奴、苏木、三棱、延胡索、葱白、羊蹄、瓦草和水栀洗净除杂，加入米醋和清水（米醋和清水的质量比为 1:3），米醋和清水的总量为所煮原料药质量的 7 倍，文火加热共煮至透心，取出、切厚片，晒干，与步骤（1）和（2）所制原料药一起捣碎过 90 目筛；

（4）将步骤（3）所得药粉加入至米酒内，米酒的量为药粉质量的 18 倍，密封浸渍，每天搅拌一次，共浸渍 30 天，取上清液，压榨药渣，榨出液与上清液合并，搅拌均匀，密封静置 15 天，过滤、灌装即得舒筋通络药酒。

[0038] 试验例 1 本发明所得一种急性软组织损伤舒筋通络药酒（实施例 5）的临床应用：

选取人群：2014 年 3 月 -2015 年 1 月，依据就诊病历，在四所医院筛选患有急性软组织损伤的患者 367 例，年龄 12-55 岁，平均年龄 34.9±1.8 岁，其中男性患者 196 例，女性患者 171 例。西医诊断标准：（1）软组织挫伤：1 有明显的外伤史，疼痛剧烈，局部迅速肿胀，肢体活动功能障碍；2 伤处压痛明显，可出现局部青紫淤血斑，严重时可出现皮下血肿，波动症阳性；3 损伤后两周左右，淤肿大部分消退或转为黄褐色，疼痛逐渐减轻，功能恢复或轻度障碍；4 少数损伤较为严重者，恢复期较长，局部仍有肿胀或硬结，隐隐作痛，肢体活动有不同程度的受限，X 线检查主要是排除骨折、脱位及骨病等。（2）关节扭伤：1 早期 有明显的扭伤史，伤后疼痛剧烈、局部出现不同程度的肿胀、淤斑、关节活动障碍；2 中期 受伤 3-4 天后，肿胀开始消退，瘀斑青紫逐渐变浅色，皮肤温度高，疼痛渐减，关节活动仍然受限；3 后期 关节损伤两周之后，淤肿大部分消退，瘀斑变成黄褐色，疼痛渐消，功能大部分恢复，少数损伤严重的患者恢复期较长，局部仍有硬结，隐隐作痛，关节受限，迁延不愈；4 X 线检查主要是排除骨折、脱位及骨病等，有时对肌腱、韧带及软骨的损伤有一定的参考价值。

[0039] 试验前，将患者随机分为两组，实验组 237 例和对照组 130 例，两组在性别、年龄、病程、病情等方面无显著差异。实验组服用本发明所得一种急性软组织损伤舒筋通络药酒，每次一两，每天两次，五天为一个疗程；对照组服用其他常规药物（扶他林软膏、云南白药胶囊、活血接骨散或舒筋活血片等）。服药期间对两组患者进行连续观察，记录症状及变化。

[0040] 疗效判定标准：参照文献疗效标准，（1）治愈：疼痛肿胀完全消失，无压痛点，瘀斑消失，局部功能恢复正常，活动达正常范围；（2）显效：疼痛肿胀基本消失，患处或有轻微压痛，功能活动恢复或接近正常，瘀斑面积明显减小；（3）有效：疼痛肿胀明显减轻，患处仍有压痛，功能较之前有所改善，瘀斑面积缩小；（4）无效：各症状及体征无明显改善。

[0041] 临床结果：经两个疗程的服药后，两组的治疗结果如表 1 所示：

	实验组			对照组		
例数	237			130		
	治愈	显效	有效	治愈	显效	有效
一个疗程	116	42	57	34	25	41
两个疗程	158	43	31	72	18	19
总有效率	97.9%			83.8%		

由表 1 可知，治疗一个疗程后，实验组的治愈患者为 116 例，治愈率为 48.9%，显效患者为 42 例，显效率为 17.7%，有效患者为 57 例，有效率为 24.1%，总有效率为 90.7%，而对照组被治愈的患者为 34 例，治愈率为 26.2%，显效的患者为 25 例，显效率为 19.2%，有效患者为 41 例，有效率为 31.5%，总有效率 76.9%，显著低于实验组的治疗效果；经过两个疗程的治疗，实验组的总有效率达到 97.9%，明显优于对照组的总有效率 83.8%，说明本发明所得产

品疗程短、见效快。

[0042] 本发明中所使用的中药，刘寄奴可活血化瘀，苏木可消肿止痛，三棱可破血行气，延胡索可活血散瘀，葱白可通阳解毒，羊蹄可清热止血，瓦草可镇痛清热，地龙可通络平喘，水栀可消肿止痛，草乌头可温经散寒，多种药材协同作用，再加上米酒的益气活血功效，可有效治疗急性软组织损伤，缓解不适症。

[0043] 应当指出的是，具体实施方式只是本发明比较有代表性的例子，显然本发明的技术方案不限于上述实施例，还可以有很多变形。本领域的普通技术人员，以本发明所明确公开的或根据文件的书面描述毫无异议的得到的，均应认为是本专利所要保护的范围。