



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102552865 A

(43) 申请公布日 2012.07.11

(21) 申请号 201210065119.8

(22) 申请日 2012.03.06

(71) 申请人 蒋月芳

地址 252300 山东省聊城市阳谷县南环路
318号4号楼5单元102室

(72) 发明人 蒋月芳

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006.01)

A61P 7/10(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种治疗妊娠水肿的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗妊娠水肿的中药组合物,它是由以下中药原料配制而成的,黄芪 24、白术 18、茯苓 18、生姜皮 12、泽泻 10、桂枝 12、肉桂 10、巴戟天 12、补骨脂 12、续断 12、生杜仲 12、桑白皮 12、黄芩 10、地稔 10、生山楂 15,木香 6、厚朴 6。本发明的优点是:服用方便,疗效显著,不影响胎儿的发育,治疗费用低,药源广,价廉,治疗妊娠水肿有效率 100%,治愈率 100%。

1. 一种治疗妊娠水肿的中药组合物,其特征在于:它是由以下重量份的中药原料配制而成的,黄芪 24、白术 18、茯苓 18、生姜皮 12、泽泻 10、桂枝 12、肉桂 10、巴戟天 12、补骨脂 12、续断 12、生杜仲 12、桑白皮 12、黄芩 10、地稔 10、生山楂 15,木香 6、厚朴 6,将以上 17 味中药原料共放到砂锅内然后倒自来水管的水过药高 3 厘米浸泡 20 分钟把水倒掉,而后再向砂锅内倒自来水管的水过药高 5 厘米并把砂锅盖好用武火熬开,然后改用文火熬 30 分钟把药液倒出,然后再向砂锅内倒自来水管的水过药高 3 厘米用武火熬开,然后改用文火熬 20 分钟把药液与第一次的药液倒在一块即得药液,将药液候温于晚饭后一次服下。

一种治疗妊娠水肿的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明的药物属于纯中药技术领域,具体的说是一种治疗妊娠水肿的中药组合物。

背景技术

[0002] 妊娠后,肢体面目等部位发生浮肿,称“妊娠水肿”,亦称“妊娠肿胀”,传统医学则称为“子肿”。妊娠晚期,本病多因脾肾阳虚,运化敷布失职,以致水湿泛滥,流于四肢,则出现,面目四肢浮肿或遍及全身,心悸气短、指压留痕,精神疲倦,小便不利,口淡、食欲不振、大便溏薄,舌质胖嫩,四肢欠温、腰膝无力,舌淡苔薄,边有齿痕,脉虚缓或沉迟。西医没有好的方法治疗妊娠水肿。中医治疗妊娠水肿多用‘全生白术散’《妇人良方》或‘五苓散’《伤寒论》以及‘五皮饮’《麻人活科全书》治疗,存在治疗单一,治愈慢,治愈率低的缺点。本发明的目的在于提供一种服用方便,无毒副作用,不影响胎儿的发育,治疗全面,疗效显著,药源广,价廉的一种治疗妊娠水肿的中药组合物。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种服用方便,无毒副作用,不影响胎儿的发育,治疗全面,疗效显著,药源广,价廉的一种治疗妊娠水肿的中药组合物。

[0004] 本发明的技术方案是这样实现的,一种治疗妊娠水肿的中药组合物,其特征在于:它是由以下重量份的中药原料配制而成的,黄芪 24、白术 18、茯苓 18、生姜皮 12、泽泻 10、桂枝 12、肉桂 10、巴戟天 12、补骨脂 12、续断 12、生杜仲 12、桑白皮 12、黄芩 10、地稔 10、生山楂 15,木香 6、厚朴 6,将以上 17 味中药原料共放到砂锅内然后倒自来水管的水过药高 3 厘米浸泡 20 分钟把水倒掉,而后再向砂锅内倒自来水管的水过药高 5 厘米并把砂锅盖好用武火熬开,然后改用文火熬 30 分钟把药液倒出,然后再向砂锅内倒自来水管的水过药高 3 厘米用武火熬开,然后改用文火熬 20 分钟把药液与第一次的药液倒在一块即得药液,将药液候温于晚饭后一次服下,一日一剂。

[0005] 治疗疗程:3 天为 1 个疗程,轻者 1-2 个疗程可治愈,重者 2-3 个疗程可治愈。

[0006] 治疗效果:有效率 100%,治愈率 100%。

[0007] 主治:由于妇女妊娠晚期引起的‘妊娠水肿’。症见:面目四肢全身浮肿,指压留痕,心悸气短、精神疲倦,小便不利,口淡、食欲不振、大便溏薄,舌质胖嫩,四肢欠温、腰膝无力,舌淡苔薄,边有齿痕,脉虚缓或沉迟。

[0008] 所述的地稔为用的地稔的果。

[0009] 本发明的药物具有益气温阳,化气行水的功效。

[0010] 本发明药物机理如下:

[0011] 黄芪:味甘,性微温。入脾、肺经。具有补脾益气,固表止汗,益气升阳,利水退肿,托疮排脓的功效。参考,(中医方药学,广东中医学院编,广东人民卫生出版社,1973 年 6 月第 1 版第 1 次印刷。见 597-598 页)

[0012] 茯苓:味甘、淡,性平。入脾、胃、心、肺、肾经。具有利水渗湿,健脾补中,宁心安神的功效。(同上,见 303-304 页)

[0013] 生姜皮:味辛,性微温。具有行水消肿的功效。(同上,见 74 页)

[0014] 泽泻:味甘、淡,性寒。入肾、膀胱经。具有利水渗湿,泻肾火的功效。(同上,见 305-306 页)

[0015] 桂枝:味辛、甘,性温。入肺、膀胱经。具有发汗解表,温经散寒,通阳化气的功效。(同上,见 67 页)

[0016] 肉桂:味辛、甘,性大热,入肝、肾、脾经。具有温肾壮阳,温中祛寒,温经止痛的功效。(同上,见 237 页)

[0017] 巴戟天:味甘、辛,性温。入肾经。具有补肾壮阳,强筋健骨的功效。(同上,见 625 页)

[0018] 补骨脂:味辛、苦,性温。入肾经。具有补肾壮阳的功效。(同上,见 623 页)

[0019] 续断:味苦、微辛,性温。入肝、肾经。具有补肝肾,强筋骨,止崩漏,安胎的功效。(同上,见 621 页)

[0020] 生杜仲:味甘、微辛,性温。入肝、肾经。具有补肝肾,强筋骨,安胎,降血压的功效。(同上,见 620-621 页)

[0021] 地稔:味甘、涩,性平。具有补血调经,舒筋活络,收敛止血的功效。(同上,见 619 页)果以补血为特长。

[0022] 桑白皮:味甘,性寒。入肺经。具有止咳平喘,利水消肿的功效。(同上,见 444 页)

[0023] 黄芩:味苦,性寒。入肺、脾、胃经。具有清热泻火,清热燥湿,清热安胎,清热止血的功效。(同上,见 126 页)

[0024] 木香:味辛、苦微,性温。气芳香。入脾、胃、大肠、胆经。具有行气止痛的功效。(同上,见 479-480 页)

[0025] 厚朴:味苦、辛,性温。气香。入脾、胃、肺经。具有行气化湿导滞,降逆平喘的功效。(同上,见 487-488 页)

[0026] 生山楂:味酸、甘,性微温。入脾、胃、肝经。具有消食导滞,化瘀散结的功效。(同上,见 461 页)

[0027] 白术:味苦、甘,性温。归脾、胃经。具有补气健脾,止汗,燥湿利水,安胎的功效。参考(中药学,高学敏主编,人民卫生出版社 2000 年 11 月第 1 版第 1 次印刷,见 1597-1598 页)

[0028] 按:方中用黄芪、白术、茯苓、肉桂、巴戟天、补骨脂为主,补气健脾,温肾壮阳,脾、肾阳气足,则运化敷布水湿功能正常,使水湿下输膀胱从小便去,故面目四肢全身浮肿,心悸气短、指压留痕,舌质胖嫩,腰膝无力,边有齿痕,脉虚缓或沉迟自好;辅以桂枝、生姜皮、泽泻、桑白皮通阳化气,渗湿利水以治小便不利,四肢欠温,面目四肢全身浮肿;为防胎动,故用地稔、白术、续断、生杜仲、黄芩养血清热以安其胎;用生山楂,木香、厚朴消食化积以治精神疲倦,口淡、食欲不振、大便溏薄,且运载药力直达病所使药力迅速发挥之,故面目四肢浮肿或遍及全身,心悸气短、指压留痕,精神疲倦,小便不利,口淡、食欲不振、大便溏薄,舌质胖嫩,白、四肢欠温、腰膝无力,舌淡苔薄,边有齿痕,脉虚缓或沉迟迅速消于无形,诸药相合,相得益彰,具有益气温阳,化气行水的功效。

[0029] 中医理论认为,妊娠水肿,在妊娠晚期,多因脾肾阳虚,运化敷布失职,以致水湿泛滥,流于四肢,则出现:面目四肢全身浮肿,心悸气短、指压留痕,精神疲倦,小便不利,口淡、食欲不振、大便溏薄,舌质胖嫩,四肢欠温、腰膝无力,舌淡苔薄,边有齿痕,脉虚缓或沉迟。治宜益气温阳,化气行水方能迅速治愈妊娠水肿也。

[0030] 实施方案

[0031] 下面结合实施例对本发明作进一步的说明。

[0032] 实施例:取黄芪 24、白术 18、茯苓 18、生姜皮 12、泽泻 10、桂枝 12、肉桂 10、巴戟天 12、补骨脂 12、续断 12、生杜仲 12、桑白皮 12、黄芩 10、地稔 10、生山楂 15,木香 6、厚朴 6,将以上 17 味中药原料共放到砂锅内然后倒自来水管的水过药高 3 厘米浸泡 20 分钟把水倒掉,而后再向砂锅内倒自来水管的水过药高 5 厘米并把砂锅盖好用武火熬开,然后改用文火熬 30 分钟把药液倒出,然后再向砂锅内倒自来水管的水过药高 3 厘米用武火熬开,然后改用文火熬 20 分钟把药液与第一次的药液倒在一块即得药液,将药液候温于晚饭后一次服下,一日一剂。

[0033] 治疗疗程:3 天为 1 个疗程,轻者 1-2 个疗程可治愈,重者 2-3 个疗程可治愈。

[0034] 治疗效果:有效率 100%,治愈率 100%。

[0035] 主治:由于妇女妊娠晚期引起的‘妊娠水肿’。症见:面目四肢全身浮肿,心悸气短、指压留痕,精神疲倦,小便不利,口淡、食欲不振、大便溏薄,舌质胖嫩,四肢欠温、腰膝无力,舌淡苔薄,边有齿痕,脉虚缓或沉迟。

[0036] 本发明的药物具有益气温阳,化气行水的功效。

[0037] 为表明本发明药物的疗效,将治疗的 100 例怀孕妇女患‘妊娠水肿’的患者平均分给试验组和对照组,试验组分给 50 例,对照组分给 50 例,立档留查和追踪调查加以统计对比,对照组用中药‘全生白术散’治疗,一日一剂;试验组用本发明药物治疗,一日一剂,皆以症状:面目四肢全身浮肿,心悸气短、指压留痕,精神疲倦,小便不利,口淡、食欲不振、大便溏薄,舌质胖嫩,四肢欠温、腰膝无力,舌淡苔薄,边有齿痕,脉虚缓或沉迟减轻为有效;皆以症状:面目四肢浮肿或遍及全身,心悸气短、指压留痕,精神疲倦,小便不利,口淡、食欲不振、大便溏薄,舌质胖嫩,四肢欠温、腰膝无力,舌淡苔薄,边有齿痕,脉虚缓或沉迟全部消失为痊愈。统计结果如下:

[0038] 表 1、对照组疗效情况

[0039]

标准 疗效率	有效		见效时间	痊愈		治愈时间
	人数	百分比		人数	百分比	
50	39	78%	4 天	30	60%	9-18 天

[0040] 表 2、试验组疗效情况

[0041]

标准 疗效率	有效		见效时间	痊愈		治愈时间
	人数	百分比		人数	百分比	
50	50	100%	2 天	50	100%	6-12 天

[0042] 经过对照组和试验组治疗对比,本发明药物治疗‘妊娠水肿’的效果优于‘全生白术散’治疗‘妊娠水肿’的效果。

[0043] 病例:东昌府区道口铺镇王楼村,患者马某某,女,30岁,于2000年8月15日上午来诊。主述:2000年1月上旬怀孕,到了7月开始脚肿,8月初全身开始肿,小便不利,无精神,不愿吃饭、大便稀,四肢发凉、腰痛,浑身无力,感到全身胀,到聊城市人民医院妇科大夫诊断为‘妊娠水肿’,经服用中西药无效,故来诊。临床症状:面目四肢浮肿,指压留痕,气短、舌质淡、胖嫩,舌苔薄,舌边有齿痕,脉虚、沉,参合本人叙述的症状,临床诊断为:妊娠水肿,咐停用一切药物,改用本发明药物先服3剂后,主述,服3剂药后,四肢不发凉了,小便增多了,大便已正常,也有精神了,全身已不胀,症见:面目四肢全身浮肿基本消失,指压还留有点痕迹,但轻多了,舌质淡、胖嫩,舌苔薄,舌边有齿痕,脉虚,咐其又服本发明药物6剂后,三诊,脉已平和,其它症状全部消失,为防复发,又服3剂本发明药物,至期,生下一健康女孩。