



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104306911 A

(43) 申请公布日 2015. 01. 28

(21) 申请号 201410479446. 7

(22) 申请日 2014. 09. 09

(71) 申请人 宋永花

地址 036800 山西省朔州市平鲁区榆岭乡上
梨园村

(72) 发明人 宋永花

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006. 01)

A61P 15/02 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种用于治疗阴吹的中药

(57) 摘要

一种用于治疗阴吹的中药,是由下列药物制备而成的:黄芪、党参、柴胡、升麻、白术、山药、当归、木香、半夏、陈皮、枳实、茯苓、苍术、生姜,将上述药物第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升,第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升,每日两次,早晚空服。

1. 一种用于治疗阴吹的中药,是由以下重量的药物制成的:

黄芪 15 份、党参 12 份、柴胡 9 份、升麻 6 份、白术 12 份、山药 12 份、当归 12 份、木香 9 份、半夏 12 份、陈皮 9 份、枳实 12 份、茯苓 12 份、苍术 9 份、生姜 9 份、每份为 1 克。

2. 根据权利要求 1 所述一种用于治疗阴吹的中药,其特征是将所述药物用水煎服成汤剂口服。

一种用于治疗阴吹的中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药（属于中药技术领域），特别是涉及一种用于治疗阴吹的中药。

背景技术：

[0002] 凡妇人阴道经常有气排出，状如放屁，自己无法控制，严重时簌簌有声，连续不断，这就是中医所说的“阴吹”。祖国医学所说的阴吹之疾，多指阴道壁和盆底组织松弛及一些神经官能症。常发生于身体虚弱，精神抑郁，气机不畅的经产妇。中医认为，引起阴吹的病机主要是脾胃功能失常，造成清气不升，浊阴不降，气机逆乱，胃气下泄，不循常道，逼走前阴而致阴吹。阴吹多见于40岁以上，经产体弱之妇，而室女体健者较为少见。最早见于《金匱要略·妇女杂病脉证并治》，这一疾病在临床上多见于有生育史的妇女。因患该病者“多隐忍羞于言”，所以，就诊者远较实际患者为少，其实际病人多矣。

[0003] 临床上治疗阴吹极为棘手，一般患者不愿就医，自己在药店购买口服补气补肾类药物，有时并不对症，使用起来没有明显效果。

发明内容：

[0004] 本发明是一种见效快、疗效好，无任何副作用的中药制剂。

[0005] 本发明的药物是由以下重量的中药为原料制备而成的：

[0006] 黄芪15份、党参12份、柴胡9份、升麻6份、白术12份、山药12份、当归12份、木香9份、半夏12份、陈皮9份、枳实12份、茯苓12份、苍术9份、生姜9份、每份为1克。

[0007] 可以将上述药物制成药剂学上的任何一种内服剂型，本发明优选的剂型是汤剂。

[0008] 本发明的药物的具体制备方法是：将上述药物第一剂加水700毫升煎至200毫升，第二剂加水500毫升煎至200毫升。

[0009] 使用方法是：将煎好的汤剂口服，每日两次，早晚空腹。

[0010] 中医认为治疗阴吹应以益气升清、调理脾胃、化痰燥湿为治疗原则。方中黄芪、党参、柴胡、升麻益气升清；白术、山药、当归、木香调理脾胃；半夏、陈皮、枳实、茯苓、苍术、生姜化痰燥湿。上述药物配伍使用，协同作用，从而达到治疗的目的。

[0011] 本发明的药物疗效好、见效快、服用方便、无副作用，对阴吹有很好的治疗效果。

[0012] 为进一步证明本发明药物的临床疗效和安全性。选择89例患者对本发明药物进行临床观察。

[0013] 89例病人中以10天为一个疗程，一个疗程痊愈者20例，二个疗程痊愈者21例，二个疗程以上痊愈者44例，无效4例。全部使用本发明进行治疗，每日一剂，每日两次，早晚空腹。

[0014] 疗效标准：显效：阴吹症状消失；有效：阴吹症状缓减或消失；无效：治疗前后无明显变化。

[0015] 表1 治疗后疗效统计结果

[0016]

患者	例数	显效 (%)	有效 (%)	无效 (%)	总有效率 (%)
一个疗程痊愈者	20	18(90)	2(10)	0(0)	20(100)
二个疗程痊愈者	21	15(71.4)	6(29.6)	0(0)	21(100)
二个疗程以上痊愈者	48	24(50)	20(41.7)	4(8.3)	44(91.7)
总计	89	57(64.0)	28(31.5)	4(4.5)	85(95.5)

具体实施方式：

[0017] 黄芪 15 份、党参 12 份、柴胡 9 份、升麻 6 份、白术 12 份、山药 12 份、当归 12 份、木香 9 份、半夏 12 份、陈皮 9 份、枳实 12 份、茯苓 12 份、苍术 9 份、生姜 9 份、每份为 1 克。

[0018] 将上述药物混合后煎成汤剂，第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升，每日两次，早晚空服。