

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 12 月 22 日(22.12.2016)



(10) 国際公開番号
WO 2016/204271 A1


- (51) 国際特許分類:
A61K 38/00 (2006.01) A61P 3/00 (2006.01)
A23C 3/00 (2006.01) A61P 5/00 (2006.01)
A23L 33/19 (2016.01) C07K 14/52 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/068098
- (22) 国際出願日: 2016 年 6 月 17 日(17.06.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-123682 2015 年 6 月 19 日(19.06.2015) JP
- (71) 出願人: 国立大学法人静岡大学(NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION SHIZUOKA UNIVERSITY) [JP/JP]; 〒4228529 静岡県静岡市駿河区大谷 8 3 6 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者: 茶山 和敏(SAYAMA Kazutoshi); 〒4228529 静岡県静岡市駿河区大谷 8 3 6 国立大学法人静岡大学農学部内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号丸の内 MY PLAZA (明治安田生命ビル) 9 階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロピア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: IMMUNE FUNCTION DEVELOPMENT PROMOTER AND GROWTH PROMOTER

(54) 発明の名称: 免疫機能発達促進剤及び成長促進剤

[図3]



(57) Abstract: The present invention discloses an immune function development promoter and growth promoter containing CCL25. Taking this immune function development promoter can promote the development of the immune function of a subject. Additionally, taking this growth promoter can promote the growth of a subject.

(57) 要約: 本発明は、CCL25を含有する免疫機能発達促進剤及び成長促進剤を開示する。本発明の免疫機能発達促進剤を摂取することで、対象の免疫機能の発達を促進することができる。また、本発明の成長促進剤を摂取することで、対象の成長を促進することができる。

WO 2016/204271 A1

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

— 明細書の別個の部分として表した配列リスト
(規則 5.2(a))

明 細 書

発明の名称：免疫機能発達促進剤及び成長促進剤

技術分野

[0001] 本発明は、免疫機能発達促進剤及び成長促進剤に関する。

背景技術

[0002] 新生児の初期免疫機能獲得には母乳摂取が重要な役割を果たしている。特に、出産直後に分泌される初乳には、IgA抗体や免疫機能に關与する物質が多く含まれており、新生児の感染防御に重要な役割を果たしている。その免疫機能關与物質の一つにケモカインと呼ばれるタンパク質があり、CXCL8 (IL-8)、CCL5 (RANTES) 及びCCL28が母乳に含まれるケモカインとして知られている。しかしながら、例えば、初乳の製造・分泌時期には乳腺組織内でCCL28の発現がほとんど見られないことが報告されている。このように、初乳の摂取による新生児の免疫獲得において、ケモカインがどのように關与しているかについては依然として不明である。

[0003] 上記のケモカインの他、マウス、ヒトの胸腺で発見され、腸管免疫に關与するケモカインの一種に、Chemokine (C-C motif) ligand 25 (CCL25) がある。これまでに、母体におけるCCL25の働きとして、乳腺組織内での初乳へのIgAの移行にCCL25が関わっている可能性が報告されている（非特許文献1）。しかしながら、CCL25についても初乳の摂取による新生児の免疫獲得における働きは明らかにされていない。

先行技術文献

非特許文献

[0004] 非特許文献1：竹中正樹、茶山和敏、“妊娠および必乳中のマウス乳腺内におけるCCL25ケモカインの発現”、2010年3月5日、第11回静岡ライフサイエンスシンポジウム要旨集、p. 19

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 本発明は、CC L 2 5 の新たな機能を同定することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明者らは、驚くべきことに、これまで母体で発現することによって乳汁への I g A の移行に関与していると考えられていた CC L 2 5 が、乳汁自体に含まれており、乳汁を摂取する対象へ直接働きかけることで免疫機能の発達を促進する機能及び成長を促進する機能を有することを見出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、以下の [1] ～ [6] を提供する。

[1] CC L 2 5 を含有する免疫機能発達促進剤。

[2] 乳児用である [1] の免疫機能発達促進剤。

[3] 経口摂取用である [1] 又は [2] の免疫機能発達促進剤。

[4] CC L 2 5 を含有する成長促進剤。

[5] 乳児用である [4] の成長促進剤。

[6] 経口摂取用である [4] 又は [5] の成長促進剤。

さらに、本発明は、以下の [7] ～ [2 4] も提供する。

[7] 免疫機能発達促進剤の製造のための CC L 2 5 の使用。

[8] 免疫機能発達促進剤が乳児用である [7] の使用。

[9] 免疫機能発達促進剤が経口摂取用である [7] 又は [8] の使用。

[1 0] 成長促進剤の製造のための CC L 2 5 の使用。

[1 1] 成長促進剤が乳児用である [1 0] の使用。

[1 2] 成長促進剤が経口摂取用である [1 0] 又は [1 1] の使用。

[1 3] 対象の免疫機能発達促進に使用するための CC L 2 5 。

[1 4] 対象が乳児である [1 3] の CC L 2 5 。

[1 5] 対象が CC L 2 5 を経口摂取する [1 3] 又は [1 4] の CC L 2 5 。

[1 6] 対象の成長促進に使用するための CC L 2 5 。

[1 7] 対象が乳児である [1 6] の CC L 2 5 。

[18] 対象がCC L 2 5を経口摂取する[16]又は[17]のCC L 2 5。

[19] 必要とする対象にCC L 2 5を投与する、対象の免疫機能発達を促進する方法。

[20] 対象が乳児である[19]の方法。

[21] CC L 2 5を経口投与する[19]又は[20]の方法。

[22] 必要とする対象にCC L 2 5を投与する、対象の成長を促進する方法。

[23] 対象が乳児である[22]の方法。

[24] CC L 2 5を経口投与する[22]又は[23]の方法。

発明の効果

[0007] 本発明の免疫機能発達促進剤を摂取することで、対象の免疫機能の発達を促進することができる。また、本発明の成長促進剤を摂取することで、対象の成長を促進することができる。

図面の簡単な説明

[0008] [図1]CC L 2 5を添加した人工乳を与えて人工哺育した新生仔マウス群（CC L 2 5添加群）と、CC L 2 5を添加していない人工乳を与えて人工哺育した新生仔マウス群（コントロール群）の体重増加を経時的に比較したグラフである。＊はコントロール群と比較して有意差があったことを示す（ $P > 0.05$ ）。

[図2]CC L 2 5添加群とコントロール群における体重当たりの臓器重量を比較したグラフである。＊及び＊＊はコントロール群と比較して有意差があったことを示す（＊： $P > 0.05$ 、＊＊： $P > 0.01$ ）。

[図3]CC L 2 5添加群とコントロール群の腸管におけるIg A産生細胞数を比較したグラフである。＊はコントロール群と比較して有意差があったことを示す（ $P > 0.01$ ）。

[図4]CC L 2 5添加群とコントロール群の胸腺中の総細胞数及び総細胞数あたりのリンパ球数を比較したグラフである。

発明を実施するための形態

- [0009] 本実施形態における免疫機能発達促進剤及び成長促進剤は、ヒト及び非ヒト動物を含む哺乳類を対象としており、ヒトを対象とすることが好ましい。
- [0010] 本実施形態において、免疫機能発達促進剤及び成長促進剤は、好ましくは乳児用であり、より好ましくは新生児用である。乳児とは、母乳又は人工乳で生育されている子供を意味する。出生からの経過期間に特に拘るものではないが、ヒトの場合、例えば乳児は出生後1年未満の子供を意味することができ、新生児は出生後28日未満の子供を意味することができる。非ヒト動物においては、それぞれヒトの乳児及び新生児に対応する期間の個体を意味する。
- [0011] 本実施形態におけるCC L 25を含有する免疫機能発達促進剤及び成長促進剤は、CC L 25が活性を有する状態で含まれている組成物であれば特に限定されないが、母体から得られた乳汁そのものは含まれない。
- [0012] CC L 25は、公知の方法により製造したものを用いてもよく、市販のものを用いてもよい。
- [0013] 本実施形態における免疫機能発達促進剤及び成長促進剤を対象に与える形式は、特に限定されず、経口摂取用、経腸摂取用、経静脈投与用等とすることができるが、経口摂取用とすることが好ましい。
- [0014] 本実施形態における免疫機能発達促進剤及び成長促進剤を対象の経口摂取用とする形態は、特に限定されず、対象が経口摂取するのに適当な媒体に添加して用いることができるが、人工乳に添加して用いることが好ましい。
- [0015] 人工乳は、母体から得られた乳汁をそのまま用いたものではなく、人工的に製造、加工された乳汁を意味し、例えば乳児用、未熟児用、医薬用の調製粉乳及び液体調製乳等が挙げられる。
- [0016] 免疫機能発達促進剤とは、その組成物を摂取した場合又は投与された場合に、対象の免疫機能の発達が、摂取していない対象又は投与されていない対象と比較して促進していると認められるものを意味する。促進しているか否かについて判断するための指標としては、例えば免疫系に關与する遺伝子及

び／又はタンパク質の発現量、腸管（大腸及び小腸）、脾臓、胸腺等の免疫系器官である臓器の体重あたりの重量、IgA産生細胞、リンパ球（キラーT細胞及びヘルパーT細胞等のT細胞、B細胞及びナチュラルキラー細胞）、ダブルネガティブ細胞及びダブルポジティブ細胞等の免疫系に關与する細胞の数、小腸内のパイエル板の個数及び大きさ等を用いることができる。すなわち、その組成物を摂取していない対象又は投与されていない対象と比較して、免疫機能が働いている際に発現量が増加する遺伝子及び／又はタンパク質の発現量、腸管、脾臓、胸腺の体重あたりの重量が有意に高い場合、IgA産生細胞数、リンパ球数、パイエル板の個数が有意に多い場合、及びパイエル板の大きさが有意に大きい場合等には、その組成物の摂取又は投与により、免疫機能の発達が促進されていると判断することができる。

[0017] 免疫機能が働いている際に発現量が増加する遺伝子及び／又はタンパク質としては、例えば各種免疫細胞の表面マーカー類、各種サイトカイン類及びIgAを含む免疫グロブリン等が挙げられる。免疫系器官としては、腸管、脾臓、胸腺の他にも、リンパ節、骨髓等が挙げられ、免疫系に關与する細胞としては、IgA産生細胞の他にも、リンパ球（キラーT細胞及びヘルパーT細胞等のT細胞、B細胞及びナチュラルキラー細胞）、ダブルネガティブ細胞、ダブルポジティブ細胞、マクロファージ及び白血球等が挙げられる。

[0018] 成長促進剤とは、その組成物を摂取した場合又は投与された場合に、対象の成長が、摂取していない対象又は投与されていない対象と比較して促進していると認められるものを意味する。促進しているか否かについて判断するための指標としては、成長に關与する遺伝子及び／又はタンパク質の発現量、対象の体重、筋量、臓器重量等を用いることができる。すなわち、その組成物を摂取していない対象又は投与されていない対象と比較して、成長が促進される際に発現量が増加する遺伝子及び／又はタンパク質の発現量、対象の体重、筋量、臓器重量等が有意に高い場合には、その組成物の摂取又は投与により、成長が促進されている判断することができる。

[0019] 成長が促進される際に発現量が増加する遺伝子及び／又はタンパク質とし

ては、例えば成長ホルモン、甲状腺ホルモン及び糖質コルチコイド等が挙げられる。

実施例

[0020] 本発明を以下の実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

[0021] (新生仔マウス実験群)

交尾が確認できた日を妊娠0日目とし、出産する前日（妊娠19日目）にメスを1匹に隔離した。そして、出産した日を0日目とし、生後0日目（親を帝王切開）、生後1日目、生後2日目、生後5日目、生後10日目、生後21日目（離乳後）の6群を作成し、各時期の新生仔から腸管（小腸及び大腸）を摘出した。

[0022] (腸管試料の作製)

マウス新生仔を、毒物の使用基準に従ってジエチルエーテル過剰吸入によって安楽死させ、腸管（小腸及び大腸）を摘出した。大腸はRNA later（TaKaRa社）に漬けて一晩4℃で浸透させた後、-80℃で保存した。小腸は3等分にし、それぞれを、（1）リアルタイムPCRに用いるサンプルとして、RNA later（TaKaRa社）に漬けて一晩4℃で浸透させた後、-80℃で保存し、（2）免疫染色に用いるサンプルとして、プラスチック製のクリオモルド（角型1号；Sakura Finetek社）に封入剤であるティッシュテックO.C.T. コンパウンド（Sakura Finetek社）と共に入れ、ドライアイス上で速やかに凍結させ、凍結切片用のブロックを作製し、-80℃で保存し、（3）ヘマトキシリン・エオジン（Hematoxylin and Eosin Stain；HE Stain）組織染色に用いるサンプルとして、4%パラホルムアルデヒド固定液に24～36時間浸漬させ、固定処理を行った。組織染色用サンプルは固定処理後に1×PBSで3～4回洗浄し、組織標本の作製のために70%エタノール溶液中で保存した。

[0023] (リアルタイムPCR法)

トータルRNAは、RNeasy Mini Kit (QIAGEN社)を用いて、プロトコルに従って調製した。cDNAの合成にはSuper Script (商標) First-Strand Synthesis System (Invitrogen社)を使用した。リアルタイムPCR用チューブにFast Start Essential DNA Green Master 2xconc. (Roche社) 10 μ l、Sense primer (10 μ M) 1 μ l、Anti-sense primer (10 μ M) 1 μ l、cDNA 1 μ l、Fast Start Essential DNA Green Master H₂O (Roche社) 7 μ lを加えて全反応量を20 μ lとした。そして、Light Cycler (商標) Nano (Roche社)を使用してリアルタイムPCRを行った。リアルタイムPCRに用いたプライマー (Sigma-Aldrich社) は、GAPDH (PCR産物のサイズ 136bp) : 5' -GGGTG TGAACCATGAGAAGT-3' (配列番号1 ; フォワード)、5' -GACTGTGGTCATGAGTCCT-3' (配列番号2 ; リバーズ)、CCL25 (PCR産物のサイズ 131bp) : 5' -CCATCA GCAGCAGTAAGAGG-3' (配列番号3 ; フォワード)、5' -CTGTAGGGCGACGGTTTTAT-3' (配列番号4 ; リバーズ)、CCR9 (PCR産物のサイズ 110bp) : 5' -GCCTGAG CAGGGAGATTAT-3' (配列番号5 ; フォワード)、5' -GAGCAGACAGAGTG-3' (配列番号6 ; リバーズ)である。解析する遺伝子としては、CCL25、CCR9及び内部標準としてGAPDHを用いた。それぞれ遺伝子の反応条件は、初期変性を95℃で3分間行った後、CCL25 : 熱変性 (95℃、60秒)、アニーリング (55℃、50秒)、伸長反応 (72℃、60秒) を全40サイクル、CCR9 : 熱変性 (95℃、60秒)、アニーリング (58℃、50秒)、伸長反応 (72℃、60秒) を全45サイクル、GAPDH : 熱変性 (95℃、60秒)、アニーリング (55℃、50秒)、伸長反応 (72℃、60秒) を全45サイクル

、の各条件で増幅を行った。

[0024] (免疫組織化学的染色)

−80℃で保存した腸管組織を、切片作製の前に、−20℃で約20分間平衡化(切片作製時の粗砕を防止)した後、腸管組織ブロックをクリオスタットで8μmの厚さに薄切し、シランコートした無蛍光スライドガラス(FRC-11; Matsunami社)に貼り付けた。切片がスライド上で乾いた後、冷アセトンで−20℃で10分間浸漬し、風乾した。洗浄バッファー(1X PBS)で切片を各5分間、3回洗浄した後、免疫染色を行った。免疫染色には、CCL25及びIgAそれぞれについて一次抗体及び二次抗体を用いた。1%BSA含有PBSブロッキング液で、各切片を室温で1時間ブロッキング処理した。ブロッキング液を除去し、ブロッキング液で希釈した一次抗体を各切片に添加し、4℃で一晩インキュベートした。一次抗体液を除去し、1X PBSで切片を各5分間、3回洗浄した。1%BSA含有PBSブロッキング液で希釈した二次抗体を各切片に添加し、室温で2時間インキュベートした後、二次抗体を除去し、1X PBSで切片を各5分間、3回洗浄した。その後、水溶性封入剤(Thermo Scientific社)にてスライドガラス上で封入し、実体蛍光顕微鏡(MZ10F; Leica社)にて観察を行った。免疫組織化学的染色に使用した抗体は、CCL25: Goat anti-mouse CCL25/TECK antibody (一次抗体; R&D Systems社)、Fluorescein (FITC)-conjugated AffiniPure Rabbit Anti-Goat⁺⁺ IgG (H+L) (二次抗体; Jackson Immuno Research社)、IgA: Goat anti-mouse IgA affinity Purified (一次抗体; Bethyl Laboratories社)、Rhodamine (TRITC)-conjugated AffiniPure Donkey Anti-Goat⁺⁺ IgG (H+L) (二次抗体; Jackson Immuno Research社)であり、それぞれ1:100の希釈

倍率で用いた。

[0025] (統計学的解析)

実験結果に関するすべての統計処理は、 t -検定を用いて行い、統計学的有意水準は特に明示のない場合については5% ($P > 0.05$) とした。

[0026] (人工乳汁の作製)

マウス用人工乳汁を用いた人工哺乳法に関する文献 (Biosci. Biotechnol. Biochem., 2007, 71(10), 2420-2427 及び Experimental animals, 2006, 55(4), 391-397) を参考に、脂肪の含有量を16%から18%に修正して、マウス用人工乳汁を作製した。以下に人工乳汁の作成方法を示す。初めに、Casein mixture を作製した。

(a) セリン (0.2875 g)、システイン (0.225 g) 及びトリプトファン (0.27 g) の3種類のアミノ酸を、NaOH (0.25 g) 及びKOH (1.5 g) を含む200 ml のアルカリ水溶液に加えた (常にスターラーで攪拌、60~70℃)。

(b) カゼイン (40.0 g) をアルカリ水溶液に加え、溶解した。このCasein mixture を、沸騰しているお湯の入ったバス中で30分間滅菌した。次に、カゼイン塩のミセルを作製した。

(c) Casein mixture にカルシウム及びマグネシウムを加えた。 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (1.7 g)、 GlyCaPO_4 (8 g) 及び $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (1.9 g) を50 ml の蒸留水 (121℃で10分間オートクレーブ) に溶かし、ポリトロン様ミキサーでホモジナイズした。これをCasein mixture にゆっくりと加えた (ホモジナイザーで混ぜ続ける)。

(d) $\text{CaCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (2.5 g) 及びCa-citrate (1.2 g) を25 ml の蒸留水に溶かし、オートクレーブした後、Casein mixture にゆっくりと加えた。

(e) Na_2HPO_4 (0.8 g) 及び KH_2PO_4 (0.08 g) を12.5 ml の蒸留水に溶かし、オートクレーブで滅菌した後Casein mix

t u r eに加えた。

(f) ラクトース水溶液 (ラクトース 18.91 g を 55 ml の蒸留水に溶かしたもの) をオートクレーブで滅菌した後、ゆっくりと C a s e i n m i x t u r eに加えた。

(g) $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (0.48 g) 及び $\text{C i t r a t e}-\text{H}_2\text{O}$ (0.01 g) を 5 ml の蒸留水に溶かした。そのうちの 2.5 ml、 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (0.3 g)、 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (0.075 g) 及び $\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (0.0125 g) を 6.25 ml の蒸留水に溶かした。そのうちの 1.25 ml、NaF (0.00775 g) 及び KI (0.0125 g) を 6.25 ml の蒸留水に溶かした。そのうちの 1.25 ml を C a s e i n m i x t u r eに加えた。この操作は、Millipore Filtration (0.45 μm) で滅菌した後に、常に攪拌しながら行った。

(h) その後、Whey Protein Isolate (40 g) 及び Whey Protein Hydrolysate (50 g) を 250 ml の滅菌蒸留水に溶かした。この溶液を、攪拌しながら 40℃以下に冷ました C a s e i n m i x t u r eに加えた。

(i) カルニチン (0.08 g)、ピコリン酸 (0.04 g)、エタノールアミン (0.068 g) 及びタウリン (0.3 g) を 5 ml の蒸留水に溶かした。そのうちの 2.5 ml を C a s e i n m i x t u r eに加えた。

(j) クエン酸二水素コリン (1.47 g) を 18.375 ml の蒸留水に溶かした中和溶液 (5 N NaOH で pH 7.0 に中和) に、水溶性ビタミン mixture (シアノコバラミン (0.0119 mg)、ビオチン (0.18 mg)、葉酸 (0.78 mg)、チアミン塩酸塩 (8.81 mg)、ピリドキシン塩酸塩 (1.25 mg)、リン酸リボフラビンナトリウム (12.15 mg)、パントテン酸カルシウム (26.43 mg)、p-アミノ安息香酸 (44.04 mg)、ニコチン酸 (49.88 mg)、アスコルビン酸ナトリウム (674 mg)、及び 4-イノシトール (487.25 mg)) を溶かした。そのうちの 17.5 ml を C a s e i n m i x t u r e

に加えた。

(k) 脂溶性ビタミン (ビタミンK₃ (19.825 mg)、ビタミンE : α -トコフェロール (23.45 mg) 及びビタミンAとDを含む混合物) 並びに6種類の食用油 (パーム油 (53.85 g)、ココナッツ油 (44.9 g)、コーン油 (17.955 g)、中鎖脂肪酸油 (26.9325 g)、大豆油 (35.91 g) 及びコレステロール (0.4 g)) を沸騰しているお湯の入ったバス中で30分間滅菌した。この油性溶液を40~50℃まで冷ました後、攪拌しながらCasein mixtureに加えた。

(l) この最終混合物を、高圧条件下 (180 kg/cm²) で3回ホモジナイズした。

(m) ホモジナイズの後、人工乳汁は無菌的に50 ml 滅菌ポリプロピレンボトルに分注し、-20℃で凍結させた。

(n) 凍結した人工乳汁はガンマ線照射処理 (30 kGy) による滅菌をし、哺乳実験まで-20℃で保存した。

[0027] (人工哺育実験に用いたマウス)

10~12週齢のddY系マウス (Japan SLC社) 及びddY系マウスの新生仔を用いた。

[0028] (人工哺育実験)

予備実験として、帝王切開して3時間以内に人工乳汁で人工哺育を開始した。32匹の帝王切開による新生仔に人工哺育を行ったところ、3日目には約43% (14匹) の新生仔マウスが死亡した。そして、9日目までに全数の新生仔マウスが死亡した。このことから、本実施例においては、生後2日齢まで母乳哺育させた新生仔に、生後3日齢から、3時間に1回、人工乳汁を与えることとした。

[0029] (ヘマトキシン染色)

人工哺育したマウスの小腸を摘出し、小腸 (十二指腸から空腸まで) をピンでとめて、10%ホルマリン液中で3時間以上浸漬固定処理を行った。固定処理後に蒸留水で数回洗浄し、Mayer's Hematoxylin

S o l u t i o n で 7 分間染色した。その後、蒸留水で一回洗浄した後、一時間流水洗した。

[0030] (実施例 1 新生仔腸管内の C C L 2 5 及び C C R 9 の発現と I g A 産生細胞の経時的変化の観察)

リアルタイム P C R により、腸管組織の C C L 2 5 m R N A の発現について解析した。その結果、離乳時期である生後 2 1 日目群の発現量を 1 とした時、小腸での C C L 2 5 m R N A 発現量は、生後 0 日目群で 0.12 ± 0.07 、生後 1 日目群で 0.09 ± 0.06 、生後 2 日目群で 0.39 ± 0.04 、生後 5 日目群で 0.62 ± 0.003 及び生後 10 日目群で 0.70 ± 0.05 であった。すなわち、C C L 2 5 m R N A の発現量は、生後 2 日目から増加し始めて、その量は経時的に増加し、生後 5 日目群から生後 2 1 日目群まで、その発現量は 0 日目群に比べて、有意に増加した。また、大腸での発現量は、生後 0 日目群で 0.41 ± 0.04 、生後 1 日目群で 0.33 ± 0.01 、生後 2 日目群で 0.27 ± 0.02 、生後 5 日目群で 0.08 ± 0.006 及び生後 10 日目群で 0.09 ± 0.006 であり、生後 2 1 日目群が最も高かった。

[0031] C C L 2 5 の唯一のレセプターである C C R 9 について、リアルタイム P C R により、腸管組織における m R N A の発現について解析した。その結果、小腸では、生後 2 1 日目群を 1 とした時、生後 0 日目群で 0.15 ± 0.04 、生後 1 日目群で 0.25 ± 0.006 、生後 2 日目群で 0.02 ± 0.01 、生後 5 日目群で 0.50 ± 0.01 及び生後 10 日目群で 0.7 ± 0.01 であった。すなわち、C C R 9 m R N A の発現量は、生後 0 日目に比較して、生後 5 日目から有意に増加し始め、その量は経時的に増加していた。そして、生後 2 1 日目群の C C R 9 m R N A 量が最も高い値を示した。大腸での発現量は、生後 0 日目群で 0.006 ± 0.0005 、生後 1 日目群で 0.036 ± 0.008 、生後 2 日目群で 0.005 ± 0.001 、生後 5 日目群で 0.005 ± 0.0003 及び生後 10 日目群で 0.004 ± 0.0004 であり、C C R 9 m R N A の発現量は、生後 1 日目群、生後 2

日目群、生後5日目群及び生後10日目群では低い値を示しており、生後21日目群がピークになることが分かった。

[0032] 次に、生後10日目の大腸及び小腸におけるCCCL25及びCCR9のmRNA発現量を比較した。その結果、小腸の発現量を1とした時、大腸のCCCL25 mRNA発現量は 0.07 ± 0.009 であった。また、CCR9 mRNA発現量は、小腸の発現量を1とした時、大腸のCCR9 mRNA発現量は 0.06 ± 0.003 であった。大腸のCCCL25 mRNA及びCCR9 mRNAの発現量は小腸に対して有意に低い値を示した。この結果から、新生仔腸管におけるCCCL25の発現も、腸管機能が確立されている離乳後と同様に、主に小腸で発現していることが確認された。

[0033] 次に、CCCL25抗体を用いた免疫組織化学的染色法により、小腸組織のCCCL25の経時的変化を確認した。CCCL25-FITC抗体を用いて小腸組織においてCCCL25の発現に免疫組織化学染色法を行った。蛍光実体顕微鏡で蛍光染色の陽性部位を観察した結果、生後0日目群、生後2日目群及び生後5日目群において小腸の絨毛上皮にCCCL25の発現はほとんど確認できなかったが、生後1日目群、生後10日目群及び生後21日目群では、絨毛上皮にCCCL25の発現が確認できた。

[0034] 次に、免疫組織化学的染色法によるIgA抗体を用いて、小腸組織のIgA産生細胞の経時的変化を確認した。IgA-RITC抗体を用いて小腸組織においてIgA産生細胞の発現に免疫組織化学染色法を行った。蛍光実体顕微鏡で蛍光染色後に観察を行った結果、生後0日目群、生後2日目群及び生後5日目群では小腸の絨毛上皮にIgA産生細胞の発現はほとんど確認できなかったが、生後10日目群では、ほとんどの、生後21日目群ではすべての絨毛上皮にIgA産生細胞の存在が確認できた。

[0035] (実施例2 CCCL25が体重増加に与える影響)

新生仔マウスを、Yajima et al.の文献 (Biosci. Biotechnol. Biochem., 2007, 71(10), 2420-2427及びExperimental animals, 2006, 55(4), 391-397) に記載の方法に準じて、生後2日齢まで母乳哺育させた後に、3日齢から各

人工乳汁を用いて人工哺育を開始した。新生仔マウスを（１）人工乳汁にＣＣＬ２５（Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｎｔ Ｍｏｕｓｅ ＣＣＬ２５（ＴＥＣＫ）、Ｂｉｏ－Ｌｅｇｅｎｄ社）を $0.5 \mu\text{g}/\text{ml}$ 添加した群（ＣＣＬ２５添加群）及び（２）人工乳汁ＣＣＬ２５抗原の無添加群（コントロール群）の２群に分けた。

[0036] 人工哺育した新生仔マウスの体重変化を調べた結果、ＣＣＬ２５添加群の新生仔マウスの体重は、生後４日齢まではコントロール群とほぼ同等の体重だったが、５日齢以降は、コントロール群に比べて有意に増加した（図１）。

[0037] （実施例３ ＣＣＬ２５が免疫器官の重量及びパイエル板に与える影響）

実施例２と同様に新生仔マウスをＣＣＬ２５添加群及びコントロール群に分け、１０日齢まで７日間人工保育した後に解剖し、腸管（小腸及び大腸）、脾臓及び胸腺を摘出し、各重量をＣＣＬ２５添加群及びコントロール群で比較した。免疫系器官である脾臓、胸腺、及び腸管の体重当たりの重量で比較した結果、コントロール群の脾臓（ＳＰ）が $3.95\% \pm 0.05$ 、胸腺（Ｔｈｙ）が $4.00\% \pm 0.06$ 、大腸（ＬＩ）が $7.02\% \pm 0.08$ 及び小腸（ＳＩ）が $5.46\% \pm 0.10$ であったのに対して、ＣＣＬ２５添加群の脾臓重量（ＳＰ）は $4.99\% \pm 0.058$ 、胸腺重量（Ｔｈｙ）は $4.95\% \pm 0.059$ 、大腸重量（ＬＩ）は $6.99\% \pm 0.04$ 及び小腸重量（ＳＩ）は $6.44\% \pm 0.06$ であった。ＣＣＬ２５添加群では、コントロール群に対して、小腸の重量が高い傾向が見られ、さらに、脾臓及び胸腺の重さが有意に高かった（図２）。これに対して、体重あたりの大腸の重量はコントロール群とＣＣＬ２５添加群でほぼ同じ値を示した。

[0038] また、ヘマトキシン染色した小腸を顕微鏡で観察して、小腸内のパイエル板の数を数え、一匹当たりのパイエル板の数を算出した。さらに、一つ一つのパイエル板の長径及び短径を測定して、その平均を一つのパイエル板の大きさとし、一匹当たりのパイエル板の大きさを算出した。コントロール群及びＣＣＬ２５添加群について、パイエル板の個数及び大きさを比較した結果

、個々のパイエル板の大きさには差がみられなかったが、パイエル板の個数はCCCL25添加群の方がコントロール群よりも多い傾向がみられた。

[0039] (実施例4 CCCL25が腸管組織のCCCL25 mRNA及びCCR9 mRNAの発現に与える影響)

腸管組織のCCCL25 mRNAの発現について調べた結果、コントロール群の小腸CCCL25 mRNA発現量を1とした時、CCCL25添加群での発現量は 0.79 ± 0.11 であった。有意差はなかったが、コントロール群で発現量がより高い傾向が見られた。また、腸管組織のCCR9 mRNAの発現量について調べた結果、コントロール群の小腸CCR9 mRNA発現量を1とした時、CCCL25添加群での発現量は 1.29 ± 0.16 であった。有意差はなかったが、CCCL25添加群で発現量がより高い傾向が見られた。

[0040] (実施例5 CCCL25が小腸の腸絨毛におけるIgA産生細胞数に与える影響)

IgA-RITC抗体を用いて小腸組織のIgA産生細胞の免疫組織化学染色を行った。一つの腸管（小腸）の絨毛を7本選び、その中で陽性を示したIgA産生細胞の数を数え、コントロール群及びCCCL25添加群で比較した。7本の絨毛内に確認できたIgA産生細胞数は、コントロール群では 1.33 ± 0.2 とほとんど見られなかったのに対し、CCCL25添加群では 43.75 ± 1.24 と有意に大きかった（図3）。この結果から、乳汁中のCCCL25が出産後10日目までのIgAの誘引に必須であることが明らかとなった。

[0041] (実施例6 CCCL25が胸腺中の細胞数に与える影響)

実験動物は、10～20週齢のddY系マウス（Japan SLC社）及びddY系マウスの新生仔を用いた。

新生仔マウスを、Yajima et al.の文献（Biosci. Biotechnol. Biochem., 2007, 71(10), 2420-2427及びExperimental animals, 2006, 55(4), 391-397）に記載の方法に準じて、生後2日齢まで母乳哺育させた後に、2日齢から10

日齢までの8日間、各人工乳汁を用いて人工哺育を行った。新生仔マウスを(1)人工乳汁にCCL25 (Recombinant Mouse CCL25 (TECK)、Bio-Legend社)を $0.5 \mu\text{g/mL}$ 添加した群(CCL25添加群)及び(2)CCL25抗原の無添加群(コントロール群)の2つの実験群に分けた。

[0042] マウス用人工乳汁を用いた人工哺乳法に関する文献(Biosci. Biotechnol. Biochem., 2007, 71(10), 2420-2427及びExperimental animals, 2006, 55(4), 391-397)を参考に、脂肪の含有量を16%から18%に修正してマウス用人工乳汁を作製した。以下に人工乳汁の作成方法を示す。

(a) NaOH (1 g)、KOH (6 g)を800mlの蒸留水に溶かした(アルカリ水溶液)。セリン (1.15 g)、システイン (0.9 g) 及びトリプトファン (1.08 g) の3種類のアミノ酸をアルカリ水溶液に加えた(常にスターラーで攪拌、60~70℃)。

(b) カゼイン (160.0 g) をアルカリ水溶液に加え、溶解した。このCasein mixtureを、沸騰しているお湯の入ったバス中で30分間滅菌した。

(c) $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (6.8 g)、 GlyCaPO_4 (32 g)、 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (7.6 g) を200mlの蒸留水に溶かし、ポリトロン様ミキサーでホモジナイズした。これを、Casein mixtureにゆっくりと加えた(ホモジナイザーで混ぜ続ける)。

(d) $\text{CaCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (10 g)、Ca-citrate (4.8 g) を100mlの蒸留水に溶かし、オートクレーブした後、Casein mixtureにゆっくりと加えた。

(e) Na_2HPO_4 (3.2 g)、 KH_2PO_4 (0.32 g) を50mlの蒸留水に溶かし、オートクレーブした後Casein mixtureに加えた。

(f) ラクトース水溶液(ラクトース75.64 gを220mlの蒸留水に溶かしたもの)をオートクレーブで滅菌した後、ゆっくりとCasein

m i x t u r eに加えた。

(g) $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (1.92 g)、 $\text{citrate-H}_2\text{O}$ (0.04 g) を20 mlの蒸留水に溶かした。そのうちの10 ml、 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (1.2 g)、 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (0.3 g)、 $\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (0.05 g) を25 mlの蒸留水に溶かした。そのうちの5 ml、 NaF (0.031 g)、 KI (0.05 g) を25 mlの蒸留水に溶かした。そのうちの5 mlをCasein mixtureに加えた。この操作は、Millipore filtration (0.45 μm) で滅菌した後に、常に攪拌しながら行った。

(h) ガンマ線照射による滅菌 (30 KGy) を行った、Whey protein isolate (160 g) 及びWhey protein hydrolysate (200 g) を1000 mlの滅菌蒸留水に溶かし、この溶液を攪拌しながら40℃以下に冷ましたCasein mixtureに加えた。

(i) カルニチン (0.32 g)、ピコリン酸 (0.16 g)、エタノールアミン (0.272 g) 及びタウリン (1.2 g) を20 mlの蒸留水に溶かした。そのうちの10 mlをCasein mixtureに加えた。

(j) クエン酸二水素コリン (5.88 g) を73.5 mlの蒸留水に溶かした (65℃のwater bath中で) 中和溶液 (1N NaOHでpH 7.0に中和) に、水溶性ビタミンmixture (シアノコバラミン (0.0476 mg)、ビオチン (0.72 mg)、葉酸 (3.16 mg)、チアミン塩酸塩 (35.24 mg)、ピリドキシン塩酸塩 (50.0 mg)、リン酸リボフラビンナトリウム (56.6 mg)、パントテン酸カルシウム (105.72 mg)、p-アミノ安息香酸 (176.16 mg)、ニコチン酸 (199.52 mg)、アスコルビン酸ナトリウム (2.696 g)、及び4-イノシトール (1.989 g)) を溶かした。そのうちの70 mlをCasein mixtureに加えた。

(k) 脂溶性ビタミン (ビタミンK₃ (79.3 mg)、ビタミンE: α -ト

コフェロール（93.8 mg）、ビタミンAとDを含む混合物）と6種類の食用油（パーム油（191.5 g）、ココナッツ油（159.6 g）、コーン油（63.84 g）、中鎖脂肪酸油（95.76 g）、大豆油（127.68 g）、コレステロール（1.6 g））を沸騰しているお湯の入ったバス中で30分間滅菌した。この油性溶液を40～50℃まで冷ました後、攪拌しながらCasein Mixtureに加えた。

（1）ホモジナイズの後、人工ミルクは無菌的に50 ml滅菌ポリプロピレンボトルに分注し、-80℃で保存した。冷凍した人工ミルクはガンマ線照射（30 KGy）による滅菌をし、-80℃で保存した。

[0043] 生まれた日を生後0日目として、生後0日目から2日目まで母乳哺育したマウス新生仔を親から離し、生後2日目から3時間に1回、哺乳器を用いて経口投与によって人工乳汁を授乳した。人工哺育期間中、哺乳量と体重を継続的に測定し、10日目まで8日間人工哺育した後に、ジエチルエーテル過剰吸入によって安楽死させ、解剖して胸腺を摘出した。

[0044] 摘出した胸腺の重量を測定し、0.1%ウシ血清アルブミン（BSA）入りphosphate-buffered balanced salt solution（PBBS）の入ったシャーレへ取り出した。摘出した胸腺は、シャーレ内にて、ハサミで組織をある程度細切した後、スライドグラスのフロスト部分ですりつぶし、ピペットを用いて浮遊液を42 Kのメッシュで濾して、コニカルチューブに移した。800 rpmで5分間の遠心分離を行い、上清をデカンテーションによって除去した。残った胸腺細胞に、赤血球除去用塩化アンモニウム溶液（Tris-buffered ammonium chloride：ACTB）を加えてピペティングし、室温で5分放置して溶血処理を行った。その後、冷PBBSを加え、800 rpmで5分間の遠心分離を行い、上清をデカンテーションにより除去した。洗浄のため、冷PBBSを加えて、800 rpmで5分間の遠心分離及び上清除去の操作を2回行った後、エッペンチューブへ移した。得られた溶液を適宜希釈し、総細胞数及びリンパ球数を数え、コントロール群及びCCL25

添加群で比較した。実験結果に関するすべての統計処理は、t ー検定を用いて行った。


[0045] 胸腺中の総細胞数は、コントロール群よりも C C L 2 5 添加群で多い傾向にあった。また、総細胞数あたりもリンパ球数も、コントロール群よりも C C L 2 5 添加群で多い傾向にあった（図 4）。

[0046] 以上の結果より、C C L 2 5 の添加による、免疫機能発達促進効果及び成長促進効果が確認された。


請求の範囲

- [請求項1] C C L 2 5 を含有する免疫機能発達促進剤。
- [請求項2] 乳児用である請求項 1 に記載の免疫機能発達促進剤。
- [請求項3] 経口摂取用である請求項 1 又は 2 に記載の免疫機能発達促進剤。
- [請求項4] C C L 2 5 を含有する成長促進剤。
- [請求項5] 乳児用である請求項 4 に記載の成長促進剤。
- [請求項6] 経口摂取用である請求項 4 又は 5 に記載の成長促進剤。


[図1]




[図2]



[図3]



[図4]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/068098

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61K38/00(2006.01)i, A23C3/00(2006.01)i, A23L33/19(2016.01)i, A61P3/00(2006.01)i, A61P5/00(2006.01)i, C07K14/52(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61K38/00, A23C3/00, A23L33/19, A61P3/00, A61P5/00, C07K14/52

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2016
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2016	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2016

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII), CApus/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	Kazutoshi SAYAMA, "Elucidation of physiological functionality of CCL25 in milk for the enhancement of gut immunity in neonate", [online], 25 July 2014 (25.07.2014), [retrieval date 05 September 2016 (05.09.2016)], Internet: <URL: https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-25560048/ >, entire text, particularly, column of 'Kenkyu Seika no Gaiyo'	1-6
X	LEVAST, B. et al.; "Ultra-early weaning in piglets results in low serum IgA concentration and IL17 mRNA expression", 2010, Veterinary Immunology and Immunopathology, vol.137, pp.261-268, entire text, particularly, ABSTRACT	1-6

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
06 September 2016 (06.09.16)

Date of mailing of the international search report
20 September 2016 (20.09.16)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/068098

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2005-508647 A (Mars, Inc.), 07 April 2005 (07.04.2005), entire text; particularly, paragraphs [0008] to [0010] & WO 2003/041512 A1 page 2, line 19 to page 3, line 11 & US 2005/0079244 A1 & US 2008/0260893 A1 & EP 1446023 A1	1-6
X	KATHURIA, N. et al.; "Generation of antigen-specific immunity following systemic immunization with DNA vaccine encoding CCL25 chemokine immunoadjuvant", 2012, Human Vaccines & Immunotherapeutics, vol.8, No.11, pp.1607-1619, entire text, particularly, summary, column of Discussion	1,2
P,X	Kazutoshi SAYAMA et al., "Mouse Bonyuchu CCL25 wa Shinseiji no Seicho Oyobi Men'eki Kino no Hattatsu o Sokushin suru", 25 April 2016 (25.04.2016), The Japanese Society of Nutrition and Food Science Dai 70 Kai Taikai Ippan Koen Topics-shu, pages 37 to 40	1-6
A	Kunio HIESHIMA, "CCL25, CCL28 wa IgA Kotai Sansei Saibo no Chokan eno Homing ni Kan'yo suru", 2005, Clinical Immunology, vol.43, no.5, pages 584 to 588	1-6
A	MEURENS, F. et al.; "Expression of mucosal chemokines TECK/CCL25 and MEC/CCL28 during fetal development of the ovine mucosal immune system", 2007, Immunology, vol.120, pp.544-555	1-6
A	Masaki TAKENAKA et al., "Ninshin Oyobi Hitsunyuchu no Mouse Nyusen Soshikinai ni Okeru CCL25 no Hatsugen", 2010, Proceedings of the Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry, page 227	1-6

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. A61K38/00(2006.01)i, A23C3/00(2006.01)i, A23L33/19(2016.01)i, A61P3/00(2006.01)i, A61P5/00(2006.01)i, C07K14/52(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. A61K38/00, A23C3/00, A23L33/19, A61P3/00, A61P5/00, C07K14/52

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2016年
日本国実用新案登録公報	1996-2016年
日本国登録実用新案公報	1994-2016年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamIII), Cplus/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	茶山 和敏 ; 「乳児の腸管免疫機能の向上を目的とした乳汁中 CCL25 の生理学的機能性の解明」, [online], 2014. 07. 25, [検索日 2016. 09. 05], インターネット:<URL: https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-25560048/ >, 全文、特に、「研究成果の概要」欄	1-6

☑ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

06.09.2016

国際調査報告の発送日

20.09.2016

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号 100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

長岡 真

4 U

5277

電話番号 03-3581-1101 内線 3439

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	LEVAST, B. et al. ; “Ultra-early weaning in piglets results in low serum IgA concentration and IL17 mRNA expression” , 2010, Veterinary Immunology and Immunopathology, vol.137, pp.261-268 全文、特に ABSTRACT	1-6
X	JP 2005-508647 A (マーズ インコーポレイテッド) 2005.04.07, 全文、特に、[0008]－[0010] & WO 2003/041512 A1 第2頁第19行－第3頁第11行 & US 2005/0079244 A1 & US 2008/0260893 A1 & EP 1446023 A1	1-6
X	KATHURIA, N. et al. ; “Generation of antigen-specific immunity following systemic immunization with DNA vaccine encoding CCL25 chemokine immunoadjuvant” , 2012, Human Vaccines & Immunotherapeutics, vol.8, No.11, pp.1607-1619 全文、特に、要旨、Discussion 欄	1,2
P, X	茶山 和敏ら ; 「マウス母乳中 CCL25 は新生仔の成長及び免疫機能の発達を促進する」, 2016.04.25, 日本栄養・食糧学会第70回大会一般講演トピックス集, p.37-40	1-6
A	稗島 州雄 ; 「CCL25, CCL28 は IgA 抗体産生細胞の腸管へのホーミングに関与する」, 2005, 臨床免疫, vol.43, No.5, pp.584-588	1-6
A	MEURENS, F. et al. ; “Expression of mucosal chemokines TECK/CCL25 and MEC/CCL28 during fetal development of the ovine mucosal immune system” , 2007, Immunology, vol.120, pp.544-555	1-6
A	竹中 正樹ら ; 「妊娠および泌乳中のマウス乳腺組織内における C C L 25 の発現」, 2010, 日本農芸化学会大会講演要旨集, p.227	1-6