



Office de la Propriété
Intellectuelle
du Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An agency of
Industry Canada

CA 2234500 C 2009/08/25

(11)(21) **2 234 500**

(12) **BREVET CANADIEN
CANADIAN PATENT**

(13) **C**

(22) Date de dépôt/Filing Date: 1998/03/18

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 1998/09/24

(45) Date de délivrance/Issue Date: 2009/08/25

(30) Priorité/Priority: 1997/03/24 (FR9703793)

(51) Cl.Int./Int.Cl. *A61K 31/695* (2006.01),
A61K 47/26 (2006.01), *C07F 9/40* (2006.01)

(72) Inventeurs/Inventors:
SEGUIN, MARIE-CHRISTINE, MC;
GUEYNE, JEAN, MC

(73) Propriétaires/Owners:
SEGUIN, MARIE-CHRISTINE, MC;
GUEYNE, JEAN, MC

(74) Agent: SMART & BIGGAR

(54) Titre : NOUVELLES COMPOSITIONS A BASE DE SILICIUM BIOLOGIQUEMENT ACTIF

(54) Title: NOVEL BIOLOGICALLY ACTIVE SILICON-BASED COMPOSITIONS

(57) Abrégé/Abstract:


Compositions pharmaceutiques agissant par inhibition des sérines protéases comprenant, en association avec tout excipient approprié, au moins un composé de formule générale (I) suivante : $R_6R_7P(O)-(CHR_5)_m-(CHR_4)_n-Si(OR_1)(OR_2)(R_3)$ (I) dans laquelle : R_1 et R_2 chacun indépendamment représentent un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle, R_3 représente un groupement hydroxyle ou un groupement alcoxy ou un groupement alkyle, R_4 et R_5 représentent chacun indépendamment un atome d'hydrogène, un groupement hydroxyle, un groupement alkyle ou une fonction acide carboxylique, R_6 et R_7 représentent chacun indépendamment un groupement alcoxy, n est un entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4 m est un entier strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 3.



85466-20

ABREGE

Compositions pharmaceutiques agissant par inhibition des sérines protéases comprenant, en association avec tout excipient approprié, au moins un composé de formule générale (I) suivante :



dans laquelle :

R_1 et R_2 chacun indépendamment représentent un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle,

R_3 représente un groupement hydroxyle ou un groupement alcoxy ou un groupement alkyle,

R_4 et R_5 représentent chacun indépendamment un atome d'hydrogène, un groupement hydroxyle, un groupement alkyle ou une fonction acide carboxylique,

R_6 et R_7 représentent chacun indépendamment un groupement alcoxy,

n est un entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4

m est un entier strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 3.

**Nouvelles compositions à base de silicium biologiquement
actif**

La présente invention a pour objet de nouvelles compositions pharmaceutiques agissant par inhibition des sérines protéases et comprenant au moins un composé à base de silicium biologiquement actif.

5

Les composés à base de silicium biologiquement actif sont des composés organo-siliciés et plus particulièrement des silanols présentant plusieurs groupements Si-OH. Les silanols sont décrits dans l'état de la technique comme constituant
10 une forme de silicium assimilable par l'organisme, à condition de posséder la propriété d'exister en solution aqueuse sous forme d'oligomères solubles de faible poids moléculaire(EP-0 289 366).

15 Plusieurs complexes de silanols ayant des propriétés thérapeutiques intéressantes ont déjà été décrits dans le passé. Le brevet spécial de médicament N° 6.871 M déposé le 23 décembre 1966 décrit un complexe organo-silicique utile comme médicament contre tous les phénomènes inflammatoires.
20 FR-A-2725207 décrit des précurseurs de silanols qui sont des composés à base de silicium possédant des liaisons biologiquement hydrolysables notamment au contact des tissus vivants et permettant la libération des oligomères possédant les fonctions Si-OH biologiquement actives.

25 Les silanols ainsi obtenus *in vivo* sont utiles en thérapeutique, notamment pour le traitement de l'arthrose, pour la restructuration des microvaisseaux, pour le traitement des tendinites des sportifs, pour le traitement de l'asthénie, pour le traitement de la cataracte, pour le
30 traitement des artériopathies tel que notamment l'artériosclérose et plus généralement pour leur activité anti-inflammatoire, anti-oedemateuse, anti-glycation, anti-radicalaire, analgésique, régénératrice et réparatrice.

35 Les silanols de l'art antérieur sont administrés par voie générale, orale ou parentérale, et agissent d'une manière non spécifique.

85466-20

2

Pour notamment remédier à cet inconvénient, le but principal de la présente invention est de proposer une composition pharmaceutique agissant par inhibition des sérines protéases, comprenant un composé à base de silicium biologiquement actif capable d'atteindre dans l'organisme un tissu ou un organe spécifique, telle que notamment les tissus osseux ou cartilagineux, ou les tissus cutanés et d'exprimer au sein de ces tissus une activité pharmacologique.

10 L'invention a pour objet l'utilisation d'une composition pharmaceutique agissant par inhibition des sérines protéases et comprenant, en association avec tout excipient approprié, au moins un composé de formule générale (I) suivante :



15 dans laquelle :

R_1 et R_2 chacun indépendamment représentent un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle,

R_3 représente un groupement hydroxyle ou un groupement alcoxy ou un groupement alkyle,

20 R_4 et R_5 représentent chacun indépendamment un atome d'hydrogène, un groupement hydroxyle, un groupement alkyle ou une fonction acide carboxylique,

R_6 et R_7 représentent chacun indépendamment un groupement alcoxy,

25 n est un entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4,


m est un entier strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 3,

85466-20

2a

pour la préparation d'un médicament destiné à traiter l'arthrose ou la polyarthrite évolutive.

La composition pharmaceutique selon l'invention comprend, en association avec tout excipient approprié, au moins un
5 composé de formule générale (I) suivante :



dans laquelle :

R_1 et R_2 chacun indépendamment représentent un
10 atome d'hydrogène ou un groupement alkyle,

R_3 représente un groupement hydroxyle ou un groupement alcoxy ou un groupement alkyle,

R_4 et R_5 représentent chacun indépendamment un atome d'hydrogène, un groupement hydroxyle, un groupement
15 alkyle ou une fonction acide carboxylique,

R_6 et R_7 représentent chacun indépendamment un groupement alcoxy,

n est un entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4,

20 m est un entier strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 3.

Avantageusement, la composition pharmaceutique selon l'invention comprend un composé répondant à la formule (I) dans laquelle :

25 R_1 et R_2 chacun indépendamment représentent un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle,

R_3 représente un groupement hydroxyle ou un groupement alcoxy ou un groupement alkyle,
 R_4 et R_5 représentent chacun indépendamment un atome d'hydrogène ou un groupement hydroxyle,
5 R_6 et R_7 représentent chacun indépendamment un groupement alcoxy,
 n est un entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4,
 m est un entier strictement supérieur à 0 et inférieur ou
10 égal à 3,
et la somme $(m + n)$ est strictement inférieure à 6.

Parmi ces composés, sont préférés les composés de formule (I) dans laquelle :

15 R_1 et R_2 chacun indépendamment représentent un atome d'hydrogène ou un groupement C₁₋₄ alkyle,
 R_3 représente un groupement hydroxyle ou un groupement alcoxy ou un groupement C₁₋₄ alkyle,
 R_4 et R_5 sont chacun indépendamment un atome d'hydrogène
20 ou un groupement hydroxyle,
 R_6 et R_7 représentent chacun indépendamment un groupement C₁₋₄ alcoxy,
 n est un entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4,
25 m est un entier strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 3,
et la somme $(m + n)$ est égale à 2.

Suivant un mode de réalisation préféré de l'invention, le
30 composé de formule (I) entrant dans la composition pharmaceutique selon l'invention est le diéthylphosphatotriéthoxysilane.

Avantageusement, la composition pharmaceutique selon
35 l'invention est administrée par voie orale, rectale ou topique.

Suivant un mode de réalisation particulier, la composition pharmaceutique selon l'invention est sous forme solide.

5 Suivant un autre mode de réalisation particulier, l'excipient comprend plusieurs fonctions hydroxyles. De préférence, l'excipient est le lactose.

10 Un autre but de l'invention est de proposer un médicament destiné au traitement de l'arthrose, de l'ostéoporose, de la polyarthrite chronique évolutive, de la maladie de Paget, ou des affections cutanées, notamment eczématiforme, agissant par inhibition des sérines protéases, qui comprenne la composition pharmaceutique ci-dessus décrite.

15 L'invention est illustrée non limitativement par la description détaillée et les exemples qui suivent :

20 La composition selon l'invention comprend donc un composé de formule (I) qui est une molécule comprenant deux groupements principaux : d'une part un groupement phosphonate et d'autre part un groupement silanol ou précurseur de silanol. Ce composé est tel que la liaison P-C n'est pas hydrolysable *in vivo* et la liaison Si-C n'est pas hydrolysable *in vivo*.

25 Une véritable synergie entre les deux groupements est constatée, et conduit à obtenir un ciblage très spécifique du composé selon l'invention et une efficacité accrue de la fonction silanol au niveau de la cible.

30 Le groupement phosphonate va contribuer à véhiculer le composé selon l'invention au niveau des tissus notamment riches en phosphates, notamment l'os et le cartilage, et le groupement silanol va alors agir sur les métalloprotéases présentes dans la matrice extracellulaire. A noter que
35 l'inhibition des métalloprotéases par l'utilisation des compositions selon l'invention n'est pas spécifique d'un tissu particulier, et pourra donc avoir des applications

extrêmement étendues et variées, sur toutes les pathologies accompagnées d'une suractivité des métalloprotéases.

Une autre fonction du groupement phosphonate est d'agir comme
5 agent tampon au niveau de la cible.

Par ailleurs, du fait que la liaison P-C n'est pas hydrolysable *in vivo*, le groupement phosphonate n'est pas libéré au niveau du tissu. Il ne peut donc pas être incorporé
10 par l'organisme dans la matrice osseuse et ne s'accumule pas dans l'os.


Les compositions pharmaceutiques selon l'invention sont donc particulièrement appréciées pour leur capacité à atteindre
15 une cible spécifique, lieu d'une pathologie, et pour s'y distribuer de manière non-ubiquitaire au niveau de la matrice extra-cellulaire.

Suivant une variante avantageuse de l'invention, les
20 compositions pharmaceutiques comprennent un composé de formule générale (I) dans laquelle R_4 et R_5 sont tous les deux indépendamment un atome d'hydrogène ou un groupement hydroxyle, et la somme ($m + n$) est strictement inférieure à 6. Il a en effet été constaté qu'une longue chaîne centrale
25 peut représenter un facteur stérique susceptible de diminuer l'accessibilité du composé selon l'invention au site d'action. Par ailleurs, si la chaîne centrale est une succession de groupements apolaires, tels que notamment des groupements méthylène, la solubilité du composé selon
30 l'invention peut diminuer fortement, ce qui le rend moins assimilable et de ce fait moins actif.

Suivant une autre variante avantageuse de l'invention, la composition pharmaceutique comprend un composé de formule
35 générale (I) dans laquelle R_4 et R_5 sont chacun indépendamment un atome d'hydrogène ou un groupement hydroxyle et la somme ($m + n$) est égale à 2.

Une composition pharmaceutique préférée est la composition comprenant le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane de formule :

5



La composition pharmaceutique peut être administrée par voie orale, rectale ou topique. La voie orale est préférée ; elle se présente de préférence sous forme solide.

10

En effet, un but recherché est l'obtention d'une composition pharmaceutique comprenant un composé de formule (I) qui soit solide, unidose et administrable par voie orale, de manière à être utilisable en médication ambulatoire ne nécessitant pas la réalisation d'un acte médical préalable.

15

L'excipient approprié associé, dans la composition pharmaceutique, au composé de formule (I) peut être tout excipient thérapeutiquement acceptable. De préférence, l'excipient utilisé comprend de nombreuses fonctions hydroxyles. L'excipient préféré est le lactose.

20

Les compositions pharmaceutiques selon l'invention sont avantageusement utilisées pour l'obtention de médicaments destinés à soigner les maladies ostéo-articulaires telles que notamment l'arthrose, de l'ostéoporose, de la polyarthrite chronique évolutive, de la maladie de Paget, ou des affections cutanées, notamment eczématiforme.

25

Les composés de formule générale (I) agissent, non pas de manière directe, mais de manière indirecte, au niveau de la matrice extracellulaire, comme agents inhibiteurs de métalloprotéases.

30

35

A titre d'exemple, l'utilisation des composés selon l'invention est étudiée sur l'activité des métalloprotéases telles que la collagénase, la stromélysine et la chymotrypsine, au niveau des chondrocytes, des ostéoblastes
5 ou de l'épiderme.

On rappelle que les chondrocytes sont des cellules cartilagineuses présentes dans la matrice extracellulaire. Elles produisent des enzymes protéolytiques et notamment des
10 métalloprotéases (stromélysine, collagénase,...) capables de digérer la matrice cartilagineuse. En situation normale, il y a un équilibre entre la chondrorésorption et de chondroformation. Une augmentation significative de l'activité des métalloprotéases crée un déséquilibre
15 induisant une chondrorésorption massive. Cette suractivité des métalloprotéases est à l'origine de l'arthrose. Elle est notamment induite et réglée de façon autocrine et paracrine par des médiateurs de l'information, les cytokines, et plus particulièrement par l'interleukine-1 (IL-1) qui est une des
20 cytokines les plus actives au cours de ce processus de dégradation du cartilage.

L'utilisation des composés de formule générale (I) selon l'invention, permet d'inhiber l'activité des métalloprotéases
25 et plus particulièrement des sérines protéases, au niveau basal comme en situation de suractivation interleukine-dépendante (exemples 6 et 7).

On rappelle par ailleurs que la matrice extracellulaire d'un
30 épiderme est décrite pour être un compartiment où se réalisent des réactions de protéolyse, dues, entre autres, à des enzymes de la famille des sérines protéases (trypsine, chymotrypsine, urokinase-like, desquamine). Ces réactions d'hydrolyse sont impliquées dans l'activité catabolique de
35 l'épiderme et dans plusieurs autres équilibres tels que l'hydratation, la desquamation ou l'inflammation.

85466-20

8

On a notamment remarqué l'augmentation de l'activité de ces enzymes sur la peau après un stress oxydatif, tel que notamment un coup de soleil.

La desquamine est une sérine-protéase très proche de l'urokinase. On sait que cette enzyme est capable d'hydrolyser les desmosomes des kératinocytes et donc de moduler la desquamation de la peau. Cette enzyme serait aussi impliquée dans le contrôle de la libération d'IL-1 à partir de Pro-IL-1 fortement localisée dans les hémidesmosomes (Tron VA; Rosenthal D; Saunder DN; "*Epidermal interleukin-1 is increased in cutaneous T-cell lymphoma*", J. Invest. Dermatol.; 1998, vol. 90(3), pp. 378-381). Or, l'utilisation des composés de formule générale (I) selon l'invention, permet d'inhiber l'activité de la desquamine dans un extrait épidermique (exemple 10), donc de diminuer la libération d'IL-1 (responsable de l'inflammation et de la dégradation du cartilage) à partir de Pro-IL-1. Ainsi, les composés selon l'invention peuvent être valablement utilisés pour le traitement de pathologies chroniques, ainsi qu'à titre préventif.

Les exemples suivants servent à illustrer l'invention, et ne sont bien entendu pas limitatifs.

Exemple 1 :

Effet d'un précurseur de diéthylphosphatoéthyltrisilanol, le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane, sur l'activité de type collagénase d'une culture de chondrocytes humains.

Des cultures de chondrocytes sont réalisées à partir de cartilages humains prélevés sur des cadavres dans les 12 heures qui suivent le décès. En milieu aqueux tamponné (pH 7,0 - 7,4), le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane libère le diéthylphosphatoéthyltrisilanol correspondant, qui

85466-20

8a

est le silanol actif. L'activité enzymatique de type collagénase de ces cultures de chondrocytes est quantifiée par la méthode de Cawston et Barrett. Sous l'effet du silanol une diminution dose-dépendante de l'activité

5 "collagénase-like" des

chondrocytes a été observée (30 % d'inhibition pour 500 µg/ml de diéthylphosphatoéthyltrisilanol).

Exemple 2 :

- 5 Effet d'un précurseur de diéthylphosphatoéthyltrisilanol, le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane, sur l'activité de type collagénase de cultures de chondrocytes humains après induction à l'IL-1.

Des cultures de chondrocytes sont réalisées à partir de
10 cartilages humains prélevés sur des cadavres dans les 12 heures qui suivent le décès. En milieu aqueux tamponné (pH 7,0 - 7,4), le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane libère le diéthylphosphatoéthyltrisilanol correspondant, qui est le silanol actif. L'activité enzymatique de type collagénase de
15 ces cultures de chondrocytes est quantifiée par la méthode de Cawston et Barrett après traitement préalable des cultures par l'IL-1. Sous l'effet du silanol une diminution dose-dépendante de l'activité "collagénase-like" des chondrocytes a été observée (21 % d'inhibition pour 500 µg/ml de
20 diéthylphosphatoéthyltrisilanol).

Exemple 3 :

- Effet d'un précurseur de diéthylphosphatoéthyltrisilanol, le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane, sur l'activité de type
25 stromélysine d'une culture de chondrocytes humains.

Des cultures de chondrocytes sont réalisées à partir de cartilages humains prélevés sur des cadavres dans les 12 heures qui suivent le décès. En milieu aqueux tamponné (pH 7,0 - 7,4), le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane libère le
30 diéthylphosphatoéthyltrisilanol correspondant, qui est le silanol actif. L'activité enzymatique de type stromélysine de ces cultures de chondrocytes est quantifiée par la méthode de digestion de la caséine couplée à la résorufine. Sous l'effet du silanol une diminution dose-dépendante de l'activité
35 "collagénase-like" des chondrocytes a été observée (37 % d'inhibition pour 500 µg/ml de diéthylphosphatoéthyltrisilanol).

85466-20

10

Exemple 4 :

Effet d'un précurseur de diéthylphosphatoéthyltrisilanol, le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane, sur l'activité de type stromélysine d'une culture de chondrocytes humains après
5 induction à l'IL-1.

Des cultures de chondrocytes sont réalisées à partir de cartilages humains prélevés sur des cadavres dans les 12 heures qui suivent le décès. En milieu aqueux tamponné (pH 7,0 - 7,4), le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane
10 libère le diéthylphosphatoéthyltrisilanol correspondant, qui est le silanol actif. L'activité enzymatique de type stromélysine de ces cultures de chondrocytes est quantifiée, après traitement préalable des cultures avec de l'IL-1, par
15 la méthode de digestion de la caséine couplée à la résorufine. Sous l'effet du silanol une diminution dose-dépendante de l'activité "collagénase-like" des chondrocytes a été observée (18% d'inhibition pour 500 µg/ml de diéthylphosphatoéthyltrisilanol).

Exemple 5 :

20 Effet d'un précurseur de diéthylphosphatoéthyltrisilanol, le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane, sur l'activité "desquamine-like" d'un extrait épidermique.

La desquamine est obtenue à partir d'extrait épidermique selon la méthode décrite par Bry MM; Bell T; Brysk H;
25 Selvanayagam P; Rajaraman S; "Enzymatic activity of desquamin" Exp. Cell. Res.; 1994, vol. 214(1), pp. 22-26. L'activité de la desquamine est évaluée par son aptitude à hydrolyser le substrat spécifique synthétique du tPA pour lequel elle a une très forte affinité. Après traitement d'un
30 extrait épidermique par le silanol, une inhibition dose-dépendante de l'activité "desquamine-like" de

85466-20

10a

l'extrait épidermique est observée (25% d'inhibition pour 300 µg/ml de diéthylphosphatoéthyltrisilanol).

Exemple 6 :

Effet d'un précurseur de diéthylphosphatoéthyltrisilanol, le
5 diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane, sur l'activité
synthétique d'ostéoblastes.

Des cultures d'ostéoblastes sont réalisées à partir d'os humains prélevés sur des cadavres dans les 12 heures qui suivent le décès. En milieu aqueux tamponné (pH 7,0 - 7,4), le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane libère du diéthylphosphatoéthyltrisilanol correspondant, qui est le silanol actif. L'activité synthétique des ostéoblastes est quantifiée par la mesure de l'activité de la phosphatase alcaline. Sous l'effet du diéthylphosphatoéthyltrisilanol, une augmentation dose-dépendante de l'activité des phosphatases alcalines des ostéoblastes a été observée (+ 24 % pour 100 µg/ml de diéthylphosphatoéthyltrisilanol).

Exemple 7 :

Effet d'un précurseur de diéthylphosphatoéthyltrisilanol, le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane, sur l'activité IL-6 d'ostéoblastes.

Des cultures d'ostéoblastes sont réalisées à partir d'os humains prélevés sur des cadavres dans les 12 heures qui suivent le décès. En milieu aqueux tamponné (pH 7,0 - 7,4), le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane libère du diéthylphosphatoéthyltrisilanol correspondant, qui est le silanol actif. L'IL-6 est quantifiée par la technique ELISA. Sous l'effet du diéthylphosphatoéthyltrisilanol une diminution dose-dépendante du taux d'IL-6 d'ostéoblastes a été observée (- 49 % pour 100 µg/ml de diéthylphosphatoéthyltrisilanol).

Exemple 8 :

Effet d'un précurseur de diéthylphosphatoéthyltrisilanol, le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane, sur l'activité de type chymotrypsine d'un extrait épidermique.

Après prélèvement sur tissu cutané, l'épiderme est découpé puis mis en solution dans une solution tampon appropriée. La solution est homogénéisée à l'Ultra Turax (4 °C) jusqu'à obtention d'un extrait épidermique satisfaisant. L'activité chymotrypsine-like de cet extrait est estimé par la mesure de la dégradation de la N alpha-Benzoyl-L-Tyrosine Ethyl Ester


(BTEE) (substrat synthétique spécifique). Sous l'effet du diéthylphosphatoéthyltrisilanol, une diminution dose-dépendante de l'activité "chymotrypsine-like" de l'extrait épidermique a été observée (27 % d'inhibition pour 400 µg/ml
5 de diéthylphosphatoéthyltrisilanol).

85466-20

13

REVENDEICATIONS :

1. Utilisation d'une composition pharmaceutique agissant par inhibition des sérines protéases et comprenant, en association avec tout excipient approprié, au moins un
 5 composé de formule générale (I) suivante :



dans laquelle :

R_1 et R_2 chacun indépendamment représentent un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle,

10 R_3 représente un groupement hydroxyle ou un groupement alcoxy ou un groupement alkyle,

R_4 et R_5 représentent chacun indépendamment un atome d'hydrogène, un groupement hydroxyle, un groupement alkyle ou une fonction acide carboxylique,

15 R_6 et R_7 représentent chacun indépendamment un groupement alcoxy,

n est un entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4,

m est un entier strictement supérieur à 0 et
 20 inférieur ou égal à 3,

pour la préparation d'un médicament destiné à traiter l'arthrose ou la polyarthrite évolutive.

2. Utilisation selon la revendication 1, dans laquelle la composition comprend, en association avec tout
 25 excipient approprié, au moins un composé de formule (I) dans laquelle:

85466-20

14

R_1 et R_2 chacun indépendamment représentent un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle,

R_3 représente un groupement hydroxyle ou un groupement alcoxy ou un groupement alkyle,

5 R_4 et R_5 représentent chacun un atome d'hydrogène,

R_6 et R_7 représentent chacun indépendamment un groupement alcoxy,

n est un entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4,

10 m est un entier strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 3,

et la somme ($m + n$) est strictement inférieure à 6.

3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle la composition comprend au moins un composé de
15 formule (I) dans laquelle :

R_1 et R_2 chacun indépendamment représentent un atome d'hydrogène ou un groupement C_{1-4} alkyle,

R_3 représente un groupement hydroxyle ou un groupement C_{1-4} alcoxy ou un groupement C_{1-4} alkyle,

20 R_4 et R_5 représentent chacun un atome d'hydrogène,

R_6 et R_7 représentent chacun indépendamment un groupement C_{1-4} alcoxy,

n est un entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4,

25 m est un entier strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 3,

85466-20

15

et la somme (m + n) est inférieure à 6.

4. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle le composé de formule générale (I) est diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane.

5 5. Utilisation selon la revendication 4, dans laquelle le diéthylphosphatoéthyltriéthoxysilane libère du diéthylphosphatoéthyltrisilanol en milieux aqueux.

6. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle la composition est
10 adaptée pour administration par voie orale, rectale ou topique.

7. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle la composition est sous forme solide.

15 8. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans laquelle l'excipient comprend plusieurs fonctions hydroxyles.

9. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans laquelle l'excipient est le
20 lactose.

10. Utilisation selon la revendication 1, dans laquelle le composé de formule générale (I) est le diéthylphosphatoéthyltrisilanol.

SMART & BIGGAR
MONTRÉAL, CANADA

AGENTS DE BREVETS