



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105535331 A

(43) 申请公布日 2016. 05. 04

(21) 申请号 201610033352. 6

(22) 申请日 2016. 01. 19

(71) 申请人 朱玉水

地址 475000 河南省平顶山市汝州市蟒川乡
核桃园村 6 组

(72) 发明人 朱玉水

(51) Int. Cl.

A61K 36/889(2006. 01)

A61K 36/896(2006. 01)

A61K 9/06(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

A61K 33/28(2006. 01)

A61K 35/644(2015. 01)

权利要求书2页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗宫颈糜烂的外用药膏及其制备方法,该外用药膏由以下重量份的原料药制备而成:当归 120~180 份、白芷 30~60 份、黄连 80~120 份、黄柏 80~120 份、乳香 40~60 份、没药 50~80 份、轻粉 40~60 份、甘草 100~150 份、紫草 20~40 份、血竭 30~45 份、黄蜡 160~250 份、白凡士林 80~150 份和芝麻油 900~1200 份。使用本发明制备的药膏能够有效地治疗宫颈糜烂,治愈率较高。

1. 一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,其特征在於:由以下重量份的原料药制备而成:当归120~180份、白芷30~60份、黄连80~120份、黄柏80~120份、乳香40~60份、没药50~80份、轻粉40~60份、甘草100~150份、紫草20~40份、血竭30~45份、黄蜡160~250份、白凡士林80~150份和芝麻油900~1200份。

2. 根据权利要求1所述治疗宫颈糜烂的外用药膏,其特征在於:由以下重量份的原料药制备而成:当归120~150份、白芷40~60份、黄连100~120份、黄柏80~100份、乳香40~50份、没药60~80份、轻粉40~50份、甘草100~120份、紫草30~40份、血竭30~35份、黄蜡200~250份、白凡士林80~100份和芝麻油1000~1200份。

3. 根据权利要求1所述治疗宫颈糜烂的外用药膏,其特征在於:由以下重量份的原料药制备而成:当归150~180份、白芷30~40份、黄连80~100份、黄柏100~120份、乳香50~60份、没药50~60份、轻粉50~60份、甘草120~150份、紫草20~30份、血竭35~45份、黄蜡160~200份、白凡士林100~150份和芝麻油900~1000份。

4. 根据权利要求1所述治疗宫颈糜烂的外用药膏,其特征在於:由以下重量份的原料药制备而成:当归150份、白芷45份、黄连100份、黄柏100份、乳香50份、没药50份、轻粉45份、甘草120份、紫草30份、血竭38份、黄蜡200份、白凡士林100份和芝麻油1000份。

5. 根据权利要求1~4任一项所述治疗宫颈糜烂的外用药膏的制备方法,其特征在於包括如下步骤:

(1)先将原料药当归、白芷、黄连、黄柏、乳香、没药、甘草和紫草研磨成粒度为60~120目粉末,接着称取上述配方量的原料药粉末当归、白芷、黄连、黄柏、乳香、没药、甘草和紫草加入至配方量芝麻油中浸泡6~8日得到混合物a;

(2)然后将步骤(1)得到的混合物a置于锅内慢火熬制3~4小时,锅内油呈褐色,将油锅暂离火源,用细纱布过滤得滤液b;

(3)将步骤(2)得到的滤液b置于新的锅内加热至沸腾,然后加入配方量的血竭、黄蜡和轻粉,搅匀,最后待温度降至100℃以下时加入配方量白凡士林调制成膏剂。

6. 一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,其特征在於:由以下重量份的原料药制备而成:当归120~180份、白芷30~60份、黄连80~120份、黄柏80~120份、乳香40~60份、没药50~80份、轻粉40~60份、甘草100~150份、紫草20~40份、血竭30~45份、黄蜡160~250份、白凡士林80~150份和芝麻油900~1200份。

7. 根据权利要求1所述治疗宫颈糜烂的外用药膏,其特征在於:由以下重量份的原料药制备而成:当归120~150份、白芷40~60份、黄连100~120份、黄柏80~100份、乳香40~50份、没药60~80份、轻粉40~50份、甘草100~120份、紫草30~40份、血竭30~35份、黄蜡200~250份、白凡士林80~100份和芝麻油1000~1200份。

8. 根据权利要求1所述治疗宫颈糜烂的外用药膏,其特征在於:由以下重量份的原料药制备而成:当归150~180份、白芷30~40份、黄连80~100份、黄柏100~120份、乳香50~60份、没药50~60份、轻粉50~60份、甘草120~150份、紫草20~30份、血竭35~45份、黄蜡160~200份、白凡士林100~150份和芝麻油900~1000份。

9. 根据权利要求1所述治疗宫颈糜烂的外用药膏,其特征在於:由以下重量份的原料药制备而成:当归150份、白芷45份、黄连100份、黄柏100份、乳香50份、没药50份、轻粉45份、甘草120份、紫草30份、血竭38份、黄蜡200份、白凡士林100份和芝麻油1000份。

10. 根据权利要求1~4任一项所述治疗宫颈糜烂的外用药膏的制备方法,其特征在于包括如下步骤:

(1)先将原料药当归、白芷、黄连、黄柏、乳香、没药、甘草和紫草研磨成粒度为60~120目粉末,接着称取上述配方量的原料药粉末当归、白芷、黄连、黄柏、乳香、没药、甘草和紫草加入至配方量芝麻油中浸泡6~8日得到混合物a;

(2)然后将步骤(1)得到的混合物a置于锅内慢火熬制3~4小时,锅内油呈褐色,将油锅暂离火源,用细纱布过滤得滤液b;

(3)将步骤(2)得到的滤液b置于新的锅内加热至沸腾,然后加入配方量的血竭、黄蜡和轻粉,搅匀,最后待温度降至100°C以下时加入配方量白凡士林调制成膏剂。

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药制剂技术领域,具体涉及一种治疗宫颈糜烂的外用药膏及其制备方法。

背景技术

[0002] 宫颈糜烂是慢性宫颈炎的一种常见表现。目前,治疗宫颈糜烂主要药物治疗和手术治疗两种方法,手术治疗成本高,痛苦大。药物治疗主要分为西药和中药两种,治疗的宫颈糜烂西药很多,但大多数药物治疗效果差,并且还有治疗成高、副作用大等缺点,严重时甚至影响患者健康。另外,还有很多治疗宫颈糜烂的中药,但大多数具有治疗效果差、治愈。

发明内容

本发明的目的是提供一种治疗宫颈糜烂的外用药膏及其制备方法,用该方法制备的中药膏剂可标本兼治,治愈后不反弹,同时也解决了传统药物量大难以下咽等各种不适症状的问题。

[0003] 为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:

本发明提供一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归120~180份、白芷30~60份、黄连80~120份、黄柏80~120份、乳香40~60份、没药50~80份、轻粉40~60份、甘草100~150份、紫草20~40份、血竭30~45份、黄蜡160~250份、白凡士林80~150份和芝麻油900~1200份。

[0004] 根据上述治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归120~150份、白芷40~60份、黄连100~120份、黄柏80~100份、乳香40~50份、没药60~80份、轻粉40~50份、甘草100~120份、紫草30~40份、血竭30~35份、黄蜡200~250份、白凡士林80~100份和芝麻油1000~1200份。

[0005] 根据上述治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归150~180份、白芷30~40份、黄连80~100份、黄柏100~120份、乳香50~60份、没药50~60份、轻粉50~60份、甘草120~150份、紫草20~30份、血竭35~45份、黄蜡160~200份、白凡士林100~150份和芝麻油900~1000份。

[0006] 根据上述治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归150份、白芷45份、黄连100份、黄柏100份、乳香50份、没药50份、轻粉45份、甘草120份、紫草30份、血竭38份、黄蜡200份、白凡士林100份和芝麻油1000份。

[0007] 所述治疗宫颈糜烂的外用药膏的制备方法,包括如下步骤:

(1)先将原料药当归、白芷、黄连、黄柏、乳香、没药、甘草和紫草研磨成粒度为60~120目粉末,接着称取上述配方量的原料药粉末当归、白芷、黄连、黄柏、乳香、没药、甘草和紫草加入至配方量芝麻油中浸泡6~8日得到混合物a;

(2)然后将步骤(1)得到的混合物a置于锅内慢火熬制3~4小时,锅内油呈褐色,将油锅暂离火源,用细纱布过滤得滤液b;

(3)将步骤(2)得到的滤液b置于新的锅内加热至沸腾,然后加入配方量的血竭、黄蜡和轻粉,搅匀,最后待温度降至100℃以下时加入配方量白凡士林调制成药膏。

[0008] 本发明的膏药具体使用方法:一天一次,晚用,7天一个疗程,一个疗程可见效,一个月可康复;疾患时间较长者适当多加1~2个疗程巩固患处。

[0009] 本发明中药膏剂中各味原料药的药理:

当归:味甘、辛、苦,性温;归肝、心、脾经。功能主治:补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。

[0010] 白芷:味辛,性温;入肺、脾、胃三经。功能主治:祛风湿,活血排脓,生肌止痛;用于头痛、牙痛、鼻渊、肠风痔漏、赤白带下、痈疽疮疡、皮肤瘙痒。

[0011] 黄连:味苦,性寒,无毒。归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。功效清热燥湿,泻火解毒。用于湿热痞满,呕吐吞酸,泻痢,黄疸,高热神昏,心火亢盛,心烦不寐,血热吐衄,目赤,牙痛,消渴,痈肿疔疮;外治湿疹,湿疮,耳道流脓。

[0012] 黄柏:味苦,性寒。归肾经;膀胱;大肠经。功效清热解毒药;清热燥湿药。主治:湿热痢疾、泄泻、黄疸;梦遗、淋浊、带下;骨蒸劳热,盗汗;以及口舌生疮;目赤肿痛;痈疽疮毒;皮肤湿疹。

[0013] 乳香:味苦辛,热。入心、肝、脾经。功效调气活血,定痛,追毒。治气血凝滞、心腹疼痛,痈疮肿毒,跌打损伤,痛经,产后瘀血刺痛。

[0014] 没药:苦,辛,平;入肝、脾、心、肾经。主治胸腹瘀痛、痛经、经闭、癥瘕、跌打损伤、痈肿疮疡、肠痈、目赤肿痛。有活血止痛、消肿生肌等功效。

[0015] 轻粉:本品为氯化亚汞;性味辛,寒;归大肠、小肠经;具有外用具有杀虫,攻毒,敛疮功效;内服祛痰消积,逐水通便的功效。

[0016] 甘草:味甘,性平;入心、脾、肺、胃四经;功效益气补中,缓急止痛,润肺止咳,泻火解毒,调和诸药;主治倦怠食少,肌瘦面黄,心悸气短,腹痛便溏,四肢挛急疼痛,脏躁,咳嗽气喘,咽喉肿痛,痈疮肿痛,适用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0017] 紫草:性寒,味甘、咸。归经:归心、肝经。功能主治凉血,活血,解毒透疹。用于血热毒盛、斑疹紫黑、麻疹不透、疮疡、湿疹、水火烫伤。清热凉血,用于麻疹,热病癍疹,湿疹,尿血,血淋,血痢,疮疡,丹毒,烧伤,热结便秘。

[0018] 血竭:味甘;咸;性平;小毒。归心经;肝经。功效散瘀定痛,止血,生肌敛疮。主治:跌打损伤;内伤瘀痛;痛经;产后瘀阻腹痛;外伤出血不止;瘰疬;瘰疬溃久不合及痔疮。

[0019] 黄蜡:用蜜蜂窝榨干蜂糖后,用水熬的。它具有收涩,敛疮,生肌,止痛作用。用于溃疡不敛,创伤,烧,烫伤等功效。

[0020] 白凡士林:具防水性,是一种非常好的保湿用品,用于配制医药的药膏及皮肤保护油膏用的原料。

[0021] 本发明的积极有益效果:

(1)本发明根据中医传统理论,在组传秘方的基础上结合发明人的长期临床实践,该原料药当归、白芷、黄连、黄柏、乳香、没药、轻粉、甘草、紫草、血竭和黄蜡为精选原料,各味药物之间配伍合理,功效互补,能产生较好的协同作用。临床应用表明,该药对治疗妇科疾病

宫颈糜烂可标本兼治,治愈后不反弹,疗效巩固,本发明制作工艺保存了药物的药性,大大的提高了疗效,同时也解决了传统膏药量大难以下咽等各种不适症状的问题。

[0022] (2)本发明为纯中药产品,安全,治疗费用低,见效快,一般1~2个疗程见效,患者痛苦小、不抗药,毒副作用小,易被患者接受,避免了大剂量使用西药产生毒副作用的缺陷。

[0023] (3)本膏药在保存传统药物疗效的同时减短了病痛的时间,节约了治疗费用,能够真正的为广大患者提供经济有效的帮助。

[0024] 病例统计:

发明人从2008~2015年共收治有记载的抑郁症的患者548例,共治愈490例,占89.4%;有效42例,占7.7%;治愈率为97.1%。

[0025] 典型病例:

病例1 张女士 29岁 广州人 公司职员 白带增多,下腹及腰骶部疼痛,尿频,妇科检查中度糜烂,使用本发明药物一周后见效,一个月后痊愈,为了巩固,持续再使用1~2个疗程。

[0026] 病例2 戴女士 34岁 北京人 护士 白带量多,外阴不适,时有骚痒,妇科检查轻度糜烂,使用本发明药物一周,症状均消失,而痊愈。

[0027] 病例3 王女士 40岁 西安人 银行职员 白带增多,外阴痒痛,不孕。妇科检查重度糜烂,使用本发明药物2周后见效,一个半月后痊愈,为了巩固,持续再使用2~3个疗程。

[0028] 具体实施方式:

以下结合实施例对本发明进一步的描述,但并不限制本发明的内容。

[0029] 实施例1:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归120~180份、白芷30~60份、黄连80~120份、黄柏80~120份、乳香40~60份、没药50~80份、轻粉40~60份、甘草100~150份、紫草20~40份、血竭30~45份、黄蜡160~250份、白凡士林80~150份和芝麻油900~1200份。

[0030] 上述治疗宫颈糜烂的外用药膏的制备方法,包括如下步骤:

(1)先将原料药当归、白芷、黄连、黄柏、乳香、没药、甘草和紫草研磨成粒度为60~120目粉末,接着称取上述配方量的原料药粉末当归、白芷、黄连、黄柏、乳香、没药、甘草和紫草加入至配方量芝麻油中浸泡6~8日得到混合物a;

(2)然后将步骤(1)得到的混合物a置于锅内慢火熬制3~4小时,锅内油呈褐色,将油锅暂离火源,用细纱布过滤得滤液b;

(3)将步骤(2)得到的滤液b置于新的锅内加热至沸腾,然后加入配方量的血竭、黄蜡和轻粉,搅匀,最后待温度降至100℃以下时加入配方量白凡士林调制成膏剂。

[0031] 本发明的膏药具体使用方法:一天一次,晚用,7天一个疗程,一个疗程可见效,一个月可康复;疾患时间较长者适当多加1~2个疗程巩固患处。

[0032] 实施例2:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归150份、白芷45份、黄连100份、黄柏100份、乳香50份、没药50份、轻粉45份、甘草120份、紫草30份、血竭38份、黄蜡200份、白凡士林100份和芝麻油1000份。

[0033] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0034] 实施例3:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归120份、白芷40份、黄连90份、黄柏100份、乳香40份、没药60份、轻粉55份、甘草145份、紫草35份、血竭30份、黄蜡170份、白凡士林140份和芝麻油950份。

[0035] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0036] 实施例4:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归180份、白芷55份、黄连105份、黄柏110份、乳香55份、没药70份、轻粉45份、甘草150份、紫草25份、血竭30份、黄蜡200份、白凡士林130份和芝麻油1000份。

[0037] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0038] 实施例5:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归130份、白芷40份、黄连90份、黄柏110份、乳香45份、没药70份、轻粉50份、甘草110份、紫草36份、血竭42份、黄蜡165份、白凡士林80份和芝麻油1200份。

[0039] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0040] 实施例6:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归155份、白芷45份、黄连100份、黄柏90份、乳香58份、没药55份、轻粉40份、甘草135份、紫草25份、血竭40份、黄蜡210份、白凡士林130份和芝麻油1100份。

[0041] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0042] 实施例7:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归135份、白芷50份、黄连85份、黄柏95份、乳香53份、没药76份、轻粉55份、甘草105份、紫草36份、血竭45份、黄蜡200份、白凡士林140份和芝麻油1000份。

[0043] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0044] 实施例8:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归136份、白芷36份、黄连120份、黄柏88份、乳香42份、没药60份、轻粉50份、甘草140份、紫草30份、血竭35份、黄蜡200份、白凡士林100份和芝麻油900份。

[0045] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0046] 实施例9:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归180份、白芷60份、黄连80份、黄柏90份、乳香45份、没药78份、轻粉40份、甘草105份、紫草25份、血竭40份、黄蜡230份、白凡士林95份和芝麻油1200份。

[0047] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0048] 实施例10:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归170份、白芷55份、黄连90份、黄柏85份、乳香50份、没药80份、轻粉60份、甘草130份、紫草38份、血竭35份、

黄蜡170份、白凡士林90份和芝麻油1000份。

[0049] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0050]

实施例11:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归165份、白芷35份、黄连85份、黄柏80份、乳香50份、没药60份、轻粉45份、甘草130份、紫草35份、血竭30份、黄蜡200份、白凡士林145份和芝麻油1050份。

[0051] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0052] 实施例12:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归135份、白芷45份、黄连100份、黄柏110份、乳香45份、没药70份、轻粉50份、甘草140份、紫草25份、血竭45份、黄蜡210份、白凡士林130份和芝麻油950份。

[0053] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0054] 实施例13:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归145份、白芷50份、黄连95份、黄柏105份、乳香40份、没药75份、轻粉45份、甘草145份、紫草30份、血竭40份、黄蜡200份、白凡士林90份和芝麻油1000份。

[0055] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0056] 实施例14:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归170份、白芷40份、黄连110份、黄柏95份、乳香50份、没药80份、轻粉40份、甘草105份、紫草30份、血竭40份、黄蜡210份、白凡士林130份和芝麻油1000份。

[0057] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。

[0058] 实施例15:

一种治疗宫颈糜烂的外用药膏,由以下重量份的原料药制备而成:当归160份、白芷60份、黄连115份、黄柏110份、乳香45份、没药75份、轻粉55份、甘草145份、紫草35份、血竭35份、黄蜡200份、白凡士林120份和芝麻油1200份。

[0059] 本实施例的制备方法与实施例1的制备方法相同。