

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
14 janvier 2010 (14.01.2010)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2010/004228 A2

(51) Classification internationale des brevets :
C07D 413/10 (2006.01) *C07D 233/64* (2006.01)
C07D 263/32 (2006.01) *G01T 1/02* (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2009/051382

(22) Date de dépôt international :
10 juillet 2009 (10.07.2009)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0854740 11 juillet 2008 (11.07.2008) FR

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US) :
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) [FR/FR]; 3, rue Michel Ange, F-75016 Paris (FR). **UNIVERSITE DE STRASBOURG** [FR/FR]; 4, Rue Blaise Pascal, F-67081 Strasbourg Cedex (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) :
BARILLON, Rémi [FR/FR]; 14 rue Armand Busé, F-67520 Marlenheim (FR). **BOUAJILA, Ezeddine** [TN/FR]; 7 rue Racine, F-69100 Villeurbanne (FR). **DOUCE, Laurent** [FR/FR]; 37 rue Saint-Urbain, F-67100 Strasbourg (FR). **JUNG, Jean-Marc** [FR/FR]; 7 rue de la Forêt, F-67270 Gougenheim (FR). **STUTTGE, Louise** [FR/FR]; 9 rue de la Division Leclerc, F-67000 Strasbourg (FR).

(74) Mandataire : **BLOT, Philippe**; Cabinet Lavoix, 2 Place d'Estienne d'Orves, F-75441 Paris Cedex 09 (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport (règle 48.2.g)

(54) Title : NOVEL DISCRIMINATING MOLECULE FAMILY FOR NEUTRON AND GAMMA RADIATION

(54) Titre : NOUVELLE FAMILLE DE MOLECULES DISCRIMINANTES POUR LES RAYONNEMENTS NEUTRON ET GAMMA

(57) Abstract : The invention relates to a novel discriminating molecule family for neutron and gamma radiation and to the preparation method thereof. Said molecules are also useful for detecting radiation (X, gamma, electrons, protons, ions), and thus for manufacturing radar and industrial or medical dosimetry instruments.

(57) Abrégé : L'invention concerne une nouvelle famille de molécules discriminantes pour les rayonnements neutron et gamma et leur procédé de préparation. Ces molécules sont également utiles pour détection des rayonnements (X, gamma, électrons, protons, ions), et donc pour la fabrication d'instruments de radiodétection, de dosimétrie industrielle ou médicale.



WO 2010/004228 A2

NOUVELLE FAMILLE DE MOLECULES DISCRIMINANTES POUR LES RAYONNEMENTS NEUTRON ET GAMMA

La présente invention concerne une nouvelle famille de molécules discriminantes pour les rayonnements neutron et gamma notamment et leur procédé de préparation. Ces molécules peuvent aussi être utilisées pour la détection des rayonnements nucléaires, en recherche fondamentale ou bien dans les domaines de la dosimétrie et de l'imagerie médicales.

La production de paires électron-trou par ionisation constitue la première étape, l'une des plus rapides, de la relaxation de l'énergie initialement déposée par un rayonnement dans un milieu. Dans la matière organique excitée, les paires formées sont généralement constituées d'un électron quasi-libre dans la bande de conduction, géminé (électriquement apparié) à un trou beaucoup moins mobile dans la bande de valence.

La discrimination repose sur le fait que la quantité d'énergie, dE , déposée dans un milieu par unité de distance parcourue, dx , par un rayonnement incident, est différente selon que ce rayonnement soit formé de photons ou bien de particules chargées. Dans le cas d'une excitation par des photons gammas issus, par exemple, d'une source radioactive, la quantité dE/dx est relativement faible, ce qui implique de faibles densités d'ionisation, et donc une production de paires électron-trou, relativement faible. Dans le cas d'une excitation par des neutrons, il se produit différentes réactions nucléaires, dont la plus importante est la réaction (n,p) au cours de laquelle un proton (p) est éjecté d'un noyau par collision élastique avec un neutron (n) incident. Ce proton va naturellement ralentir dans le milieu par excitation et ionisation de ce dernier, produisant des paires électron-trou géminées de même nature que celles produites avec un rayonnement gamma, mais avec une densité d'ionisation bien plus forte.

La recombinaison différée des paires produites étant à l'origine de l'émission de fluorescence, cette dernière sera plus intense lors d'une excitation par des neutrons (indirectement par des protons) que par des photon gammas. La comparaison des intensités de fluorescence émises lors des deux types d'excitation, photons et neutrons, permet donc la discrimination.

La discrimination des rayonnements neutron et gamma est généralement réalisée selon trois types de méthodes :

- par mesure de temps de vol des particules gamma et des neutrons ;
- par l'utilisation de détecteurs à base de semi-conducteurs ; ou
- 5 - par l'utilisation de molécules scintillantes diluées au sein de matériaux plastiques transparents.

La méthode qui consiste à faire des mesures de temps de vol est particulièrement complexe de mise en œuvre sur les plans technique et opératoire, notamment en raison de la difficulté d'accéder à une bonne référence
10 temporelle. Elle nécessite, en effet, une technicité importante, tant dans la fabrication matérielle de l'expérience que dans sa conduite. Cette technique, qui donne cependant des résultats très précis, reste essentiellement dédiée aux laboratoires de recherche et aux applications en milieu peu hostile.

La méthode qui consiste à utiliser comme partie active d'un détecteur un
15 matériau semi-conducteur reste limitée aux fortes fluences. Dans ce domaine d'application, la principale limitation à l'utilisation de matériaux conducteurs réside toujours dans le fait que la mesure se fait sur la quantité de charges produites ou bien le courant généré. Dans tous les cas, les mesures restent peu sensibles car la limite de détection d'un courant se situe aux environs du picoampère et
20 correspond donc qu'à la production d'environ 10 millions de porteurs de charges mobiles chaque seconde. On compense généralement la faible sensibilité de cette méthode par l'augmentation du volume sensible du détecteur, mais se posent alors de nouveaux problèmes, liés à la diminution globale de la conduction de l'ensemble ainsi qu'à la dégradation de la réponse temporelle du détecteur.

25 Les mesures basées sur la scintillation de molécules diluées sont de loin les plus utilisées.

Ainsi, lorsque le milieu irradié contient des molécules luminescentes, la recombinaison géminée des paires électron-trou résultant de l'ionisation primaire conduit, avec un rendement défini, à une émission de fluorescence différée dont
30 l'intensité sera proportionnelle à la densité des ionisations produites par le rayonnement sur son parcours. Cette intensité est plus élevée lors du passage d'un proton que lors du passage d'un photon en raison d'une perte d'énergie par unité de parcours, dE/dx , plus importante. Ainsi, par une mesure de fluorescence

différée, on peut discriminer entre la fluorescence résultant du passage d'un proton [produit par un neutron lors d'une réaction (n,p)] et celle résultant du passage d'un photon. La comparaison des intensités des deux signaux de fluorescence émis permet d'effectuer la discrimination. La difficulté de la mesure

5 résulte essentiellement dans le fait que la fluorescence n'est émise que durant un temps très court, de quelques centaines de nanosecondes, après le passage du rayonnement primaire, ce qui implique une instrumentation spécifique, fonctionnant avec une résolution temporelle nanoseconde. L'intensité de fluorescence étant globalement faible, on ne peut la détecter qu'à l'aide de

10 photomultiplicateurs. Le spectre d'émission de la fluorescence est indépendant de la nature de l'excitation et ne dépend que de la nature du chromophore choisi. La sensibilité de détection est bien supérieure à celle que l'on peut attendre d'une mesure de courant car il suffit que quelques milliers porteurs de charges libres soient produits dans les milieux pour que la détection devienne possible.

15 Les molécules scintillantes diluées sont généralement des oxazoles ou des oxadiazoles, voire du para-terphényle ou de l'anthracène. Toutes ces molécules ont des propriétés de luminescence nanoseconde dans un domaine spectral s'étendant de 300 à 400 nm.

Cette méthode, basée sur la mesure de fluorescence de recombinaison,

20 après interception des charges produites dans le milieu par les molécules scintillantes, est de loin la plus rapide (nanoseconde) et la plus sensible. En théorie, la production d'une seule charge libre dans le milieu suffit à produire une fluorescence détectable et donc une mesure. La méthode serait donc 10 millions fois plus sensible que celle basée sur la conduction. Mais, dans la pratique

25 actuelle, le fait que la limite de dilution d'une molécule scintillante dans un plastique se situe vers 0.01 mole/L, réduit d'un facteur 10 à 100 la sensibilité. L'autre facteur de réduction de la sensibilité est donné par l'angle solide de détection de la lumière. On peut l'estimer de 100 à 1000. L'utilisation d'un photomultiplicateur ayant un rendement de détection typique de 20 % réduit donc

30 la sensibilité d'un facteur 5 environ. Globalement, on peut estimer que les techniques de fluorescence sont environ 1000 fois plus sensibles que les techniques électriques et que la principale limitation provient de la dilution des molécules fluorescentes. L'utilisation de matériaux fluorescents aromatiques non

dilués est possible, soit à l'état liquide (benzène, xylène), soit à l'état solide (p-terphényle, anthracène). Ces matériaux sont cependant hautement inflammables et toxiques. Le benzène, par exemple, et le xylène utilisé commercialement sur l'appellation Ne213, sont des agents intercalants, donc
5 cancérogènes et mutagènes. Ils sont également irritants pour la peau et les yeux.

Il a maintenant été découvert une nouvelle famille de molécules fluorescentes permettant également la discrimination en temps réel des rayonnements neutron et gamma notamment. Ces molécules résultent de l'association d'une entité fluorescente avec une entité ionique comprenant un
10 hétéroatome choisi parmi N, S ou P porteur d'une charge positive, par exemple une entité ionique de type imidazolium. Contre toute attente, les composés ainsi obtenus présentent d'une part, des propriétés de fluorescence rapides (nanoseconde) et d'émission dans l'ultraviolet (400 nm), et d'autre part les propriétés des liquides ioniques. Le fait que ces matériaux possèdent au moins un
15 groupe fluorophore par molécule leur confère des rendements de fluorescence importants, semblables à celles des matériaux non dilués, mais avec de nombreuses propriétés supplémentaires :

- tension de vapeur non mesurable permettant une utilisation sous vide poussé ;

- bonne stabilité thermique (200°C) ;

- caractère ininflammable ;

- faible toxicité ;

- état liquide ou solide ;

- mise en forme et usinage plus facile ;

- propriétés cristal liquide.

Outre ces propriétés, la réalisation de molécules à façon permet d'ajuster l'efficacité d'interaction initiale avec le rayonnement afin d'augmenter la perte d'énergie (dE/dx) et donc la quantité de lumière émise. Ceci peut être obtenu, par
30 exemple, par l'adjonction d'un atome lourd (détection des photons), ou par l'augmentation du nombre d'atome d'hydrogènes (détection des neutrons). Une meilleure sensibilité de détection est obtenue, en milieux purs et dilués, dans la


mesure où l'on contrôle mieux la construction de la molécule et les paramètres d'interaction.

Ainsi, selon un premier objet, l'invention concerne l'utilisation pour la
 5 détection des rayonnements gamma, X, neutron, proton, d'un composé fluorophore F_1 porteur d'un groupe organique cationique associé à un contre-anion, ou bien porteur d'un groupe anionique associé à un contre-cation organique, ledit groupe cationique ou contre-cation organique comportant au moins un hétéroatome choisi parmi N, S ou P porteur d'une charge positive.

De préférence, le composé fluorophore F_1 est porteur d'un groupe cationique organique associé à un contre-anion.

De façon préférée, le groupe organique cationique est un groupe
 15 hétérocyclique éventuellement substitué par un à trois groupes choisis parmi R^{1a} , R^{1b} , R^{1c} ou R^{25} ,

ou bien le groupe organique cationique est un groupe (a), (b), (c) ou (d) :



où

20 R^{1a} , R^{1b} , R^{1c} sont, à chaque occurrence, chacun indépendamment choisis parmi H, les groupes alkyles en C_1 - C_{30} , cycloalkyles en C_3 - C_7 , aryle en C_6 - C_{10} , hétéroaryle, aralkyle, hétéroarylalkyle, un groupe fluorophore, dans laquelle lesdits groupes alkyles ou aryles sont éventuellement substitués par 1 à 3 groupes R^{20} ;

25 R^{25} est indépendamment choisi parmi OH, NH_2 , $=O$, $C(=O)OR^{21}$;


R^{20} est, à chaque occurrence, indépendamment choisi parmi F, Cl, Br, I, OR^{22} , $NR^{23}R^{24}$, $NHOH$, NO_2 , CN, CF_3 , alkyle en C_1 - C_6 , alcényle en C_2 - C_6 , alcynyle en C_2 - C_6 , aryle en C_6 - C_{10} , aralkyle, $=O$, $C(=O)R^{22}$, CO_2R^{22} , $OC(=O)R^{22}$,
 30 $C(=O)NR^{23}R^{24}$, $OC(=O)NR^{23}R^{24}$, $NR^{21}C(=S)R^{22}$ et $S(O)_yR^{22}$;

R^{21} est, à chaque occurrence, indépendamment choisi parmi H ou alkyle en C_1 - C_6 ;

R^{22} est, à chaque occurrence, indépendamment choisi parmi H, alkyle en C_1 - C_6 , aryle en C_6 - C_{10} et aralkyle ;

R^{23} et R^{24} sont, à chaque occurrence, indépendamment choisis parmi H, alkyle en C_1 - C_6 et aryle en C_6 - C_{10} , ou bien R^{23} et R^{24} forment avec l'atome d'hydrogène auquel ils sont attachés un groupe hétérocyclique de 3 à 7 chaînons ;

10 Selon un mode de réalisation préféré, l'invention concerne l'utilisation d'un composé de formule (A) :



dans laquelle :

15 Z^+ est un groupe organique cationique tel que défini ci-dessus,

X^- est un anion organique ou inorganique,

Y est un groupe alkylène en C_1 - C_6 ou

20 un groupe $(\text{alkylène en } C_1-C_4)_m-Q-(\text{alkylène en } C_1-C_4)_n$;

un groupe arylène en C_6 - C_{10} ;

dans laquelle les groupes alkylène, arylène sont éventuellement substitués par 1 à 3 groupes R^{20} ;

25 Q est un groupe $-C(=O)-$, $-NR^{21}C(=O)-$, $-C(=O)NR^{21}-$, $-C(=O)O-$, $-OC(=O)-$, $-O-$, $-NR^{21}-$, $-S(O)_y-$, $-CR^{21}=CR^{21}-$, $-C\equiv C-$, arylène en C_6 - C_{10} , hétéroarylène de 5 à 10 chaînons, cycloalkylène en C_3 - C_6 ou hétérocycloalkylène de 3 à 6 chaînons, dans laquelle lesdits groupes arylène, hétéroarylène, cycloalkylène sont éventuellement substitués par 1 à 3 groupes R^{20} ;

30

L^* est un groupe fluorophore F_1 ,

m est 0 ou 1 ;

n est 0 ou 1 ;

y est 0, 1 ou 2,


- 5 les groupes R^{20} , et R^{21} étant tels que définis ci-dessus.

De façon privilégiée, l'invention concerne l'utilisation des fluorophores définis ci-dessus pour la discrimination des rayonnements proton/gamma, proton/X, neutron/gamma, neutron/X, alpha/gamma, alpha/X.

10

De préférence, le groupe organique cationique est un groupe hétérocyclique comportant au moins un atome d'azote. A titre d'exemple de groupes particulièrement préférés, on peut citer notamment les groupes pyridile, imidazolyle, imidazolidinyle, oxazolyle, oxazolidinyle, thiazolyle, thiazolidinyle, 15 pyrazolyle, triazolyle, tétrazolyle, benzotriazolyle, un groupe guanine ou un groupe caprolactame.

Plus préférentiellement, le groupe organique cationique est choisi parmi :



20


Selon un mode de réalisation particulièrement préféré, le groupe organique cationique est un groupe pyridile ou imidazolyle, notamment :



De préférence, le composé fluorophore F_1 porteur d'un groupement cationique ou anionique est un radical oxazolyle, oxadiazolyle, anthracényle, ou 25 phénanthrényle.

Selon une variante préférée, les composés utiles selon l'invention répondent à la formule (I) :

8



(I)


dans laquelle :

U, V représentent indépendamment CR^{26} ou N, étant entendu que l'un au moins de U ou V représente N ;

R^{26} est H, $\text{C}_1\text{-C}_6$ alkyle, OR^{22} , $\text{NR}^{23}\text{R}^{24}$, NO_2 , C(=O)R^{22} , CO_2R^{22} , OC(=O)R^{22} , $\text{C(=O)NR}^{23}\text{R}^{24}$, $\text{OC(=O)NR}^{23}\text{R}^{24}$, SO_3H , PO_4H , CN.

- 10 R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{3a} , R^{3b} , R^{3c} sont, à chaque occurrence, chacun indépendamment choisis parmi H, les groupes alkyles en $\text{C}_1\text{-C}_{30}$, cycloalkyles en $\text{C}_3\text{-C}_7$, aryle en $\text{C}_6\text{-C}_{10}$, hétéroaryle, aralkyle, hétéroarylalkyle, dans laquelle lesdits groupes alkyles ou aryles sont éventuellement substitués par 1 à 3 groupes R^{20} ;
- 15 Y, Z^+ , X^- , R^{20} , R^{22} , R^{23} , R^{24} étant tels que définis ci-dessus.

Plus préférentiellement, le composé de formule (A) répond à la formule (Ia) :



(Ia)


- 20 Selon un autre aspect, l'invention concerne l'utilisation d'un composé fluorophore tel que défini ci dessus, pour la fabrication d'un instrument de radiodétection, de dosimétrie industrielle ou médicale.

- 25 Selon un deuxième objet, l'invention concerne un composé fluorophore porteur d'un groupe organique cationique associé à un contre-anion ou bien d'un

groupe anionique associé à un contre-cation organique, ledit groupe cationique ou contre-cation comportant au moins un hétéroatome choisi parmi N, S ou P porteur d'une charge positive, dans lequel le groupe fluorophore n'est pas un groupe anthracényle.

- 5 De préférence, le fluorophore est choisi parmi un radical oxazolyle, oxadiazolyle ou phénanthrényle et est plus préférentiellement un radical oxazolyle.

Selon une variante préférée, les composés selon l'invention répondent à la formule (I) :




10

(I)

dans laquelle Z^+ , X^- , Y , U , V , R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{3a} , R^{3b} , R^{3c} sont tous tels que définis ci-dessus.

- 15 Plus préférentiellement, les composés selon l'invention répondent à la formule (Ia) :



(Ia)

- 20 De préférence, R^{1a} est un groupe alkyle en C_1 - C_{16} .

De préférence, R^{1b} , R^{1c} sont H.

De façon préférée, U est CR^{26} , et notamment CH.

25

Selon une variante, Y est un groupe alkylène en C₁-C₆, notamment un groupe CH₂.

De préférence, X⁻ est un anion choisi parmi un halogénure, P(R⁴)₆⁻, B(R⁴)₄⁻,
 5 SCN⁻, (R⁵SO₂)₂N⁻, R⁵OSO₃⁻, R⁵SO₃⁻, carborane, carbonate (CO₃²⁻),
 hydrogénocarbonate (HCO₃⁻), alcoolate (R⁴O⁻), carboxylate (R⁴COO⁻), amidure
 (NH₂⁻), phosphate (PO₄⁻), SiF₆⁻, SbF₆⁻, I₃⁻, nitrate (NO₃⁻), oxyde d'halogénure,
 silicate, sulfate (SO₄⁻), sulfonate (R⁴SO₃⁻), cyanure (CN⁻), carbanions, ou
 métallate ;

10 où :

R⁴ est, à chaque occurrence, un groupe indépendamment choisi parmi un atome
 d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₆, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe
 aralkyle ;

R⁵ est, à chaque occurrence, un groupe indépendamment choisi parmi alkyle en
 15 C₁-C₂₀, halogénoalkyle en C₁-C₂₀, aryle en C₆-C₁₀, aralkyle.

Le terme "Métallate" désigne un complexe anionique contenant un métal,
 notamment un métal de transition complexé par plusieurs ligands, par exemple un
 chalcogène tel que l'oxygène ou un groupe cyanure. De préférence, l'anion
 métallate est un groupe cyanométallate ou oxométallate.

20 Le terme "carborane" désigne une molécule constituée d'atomes de bore, de
 carbone et d'hydrogène et portant une charge négative. A titre d'exemple, on peut
 citer CB₁₁H₁₂⁻.

Le terme "oxyde d'halogénure" désigne des oxydes de formule HalO_x⁻ où Hal
 représente Br, Cl ou I et x est un entier de 1 à 4. A titre d'exemple, on peut citer
 25 ClO₄⁻, IO₃⁻.

Le terme "carbanion" désigne un composé comprenant un atome de carbone
 porteur d'une charge négative. A titre d'exemple, on peut citer (CF₃SO₂)₃C⁻.

Plus préférentiellement, X⁻ est choisi parmi Br⁻, PF₆⁻, BF₄⁻, (CF₃SO₂)₂N⁻,
 30 C₁₂H₂₅OSO₃⁻, C₁₆H₃₃OSO₃⁻, CF₃SO₃⁻.

Parmi les composés préférés, on peut citer notamment :

- bromure de 1-méthyle-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- bromure de 1-hexyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium


- bromure de 1-octyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- bromure de 1-décyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- bromure de 1-dodécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- bromure de 3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-1-tétradécyl-3H-imidazol-1-ium
- 5 - bromure de 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- hexafluorophosphate de 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide
- 10 - 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium dodécyl sulfate
- 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium hexadécyl sulfate.

- 15 Selon un autre objet, l'invention concerne un matériau, notamment un matériau plastique transparent comprenant un composé tel que défini ci-dessus.

Les composés selon l'invention peuvent être préparés par application ou adaptation de toute méthode connue en soi de et/ou à la portée de l'homme du
20 métier, notamment celles décrites par Larock dans *Comprehensive Organic Transformations*, VCH Pub., 1989, ou par application ou adaptation des procédés décrits dans les exemples qui suivent.

Les composés selon l'invention peuvent être notamment préparés en faisant réagir un composé fluorophore porteur d'un groupe partant avec un groupe
25 comportant un hétéroatome nucléophile choisi parmi N, S ou P, de manière à former un groupe organique cationique tel que défini ci-dessus.

Ainsi, selon un mode de réalisation particulier, l'invention concerne un procédé de préparation d'un composé de formule (Ia) comprenant la réaction d'un composé de formule (II) avec un composé de formule (III) :



dans lesquelles R^{1a} , R^{1b} , R^{1c} , R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{3a} , R^{3b} , R^{3c} , U, et Y sont tels que définis ci-dessus et GP représente un groupe partant.




Par « groupe partant », on entend un groupe chimique labile, i.e pouvant être facilement substitué par un groupe nucléophile. Comme exemple de groupe partant, on peut citer notamment Cl, Br, I ou les sulfonates tels que mésylate ou tosylate.

Eventuellement, ledit procédé peut également comprendre l'étape consistant à isoler le produit obtenu.

Cette réaction consiste généralement en une substitution d'ordre 2 des précurseurs de formules (II) et (III). Cette réaction est généralement réalisée dans un solvant polaire aprotique, notamment dans un éther tel que le tétrahydrofurane. Les composés de formules générales (II) et (III) peuvent être préparés par application ou adaptation de toute méthode connue en soi et/ou à la portée de l'homme du métier, plus particulièrement selon la méthode décrite dans la littérature [1] ou dans [2 à 5] pour les composés de formule (III)).

Les composés selon l'invention peuvent être également préparés à partir d'un composé fluorophore porteur d'un groupe précurseur d'un groupe cationique tel que défini ci-dessus, plus précisément un groupe non chargé électroniquement comportant un hétéroatome choisi parmi N, S ou P. Plus particulièrement, les composés selon l'invention peuvent être préparés en faisant réagir un tel composé avec un composé électrophile, par exemple avec un acide ou un agent alkylant.


A titre illustratif et non limitatif de cette voie de synthèse, on peut citer le schéma réactionnel ci-après.



L^* , Y étant tels que définis dans la présente demande

Les composés selon l'invention peuvent être également préparés en introduisant sur le composé fluorophore, un groupe anionique, par exemple un anion carboxylate (CO_2^-) et en associant cet anion à un contre-cation organique comportant un hétéroatome choisi parmi N, S ou P, ledit hétéroatome étant porteur de la charge positive.

Le schéma réactionnel ci-dessous est donné à titre illustratif et non limitatif de cette voie de synthèse.



L^* , Y étant tels que définis dans la présente demande

DEFINITIONS

Tels qu'on les utilise ci-dessus et dans toute la description de l'invention, les termes suivants, sauf mention contraire, doivent être compris comme ayant les significations suivantes.

Selon la présente invention, le terme « fluorophore » désigne un groupe fluorescent, capable d'absorber de l'énergie à une longueur d'onde spécifique et de réémettre de l'énergie à une longueur d'onde différente mais également spécifique. La quantité et la longueur d'onde de l'énergie réémise dépendent à la fois du fluorophore et de l'environnement chimique du fluorophore.

Selon la présente invention, les radicaux alkyle représentent des radicaux hydrocarbonés saturés, en chaîne droite ou ramifiés, de 1 à 30 atomes de carbone, de préférence de 1 à 20 atomes de carbone. On peut notamment citer, lorsqu'ils sont linéaires, les radicaux méthyle, éthyle, propyle, butyle, pentyle, 5 hexyle, octyle, nonyle, décyle, dodécyle, hexadécyle et octadécyle.

On peut notamment citer, lorsqu'ils sont ramifiés ou substitués par un ou plusieurs radicaux alkyle, les radicaux isopropyle, tert-butyl, 2-éthylhexyle, 2-méthylbutyle, 2-méthylpentyle, 1-méthylpentyle et 3-méthylheptyle.

Le terme "halogénoalkyle" désigne un radical alkyle substitué par un ou 10 plusieurs atomes d'halogène. Les radicaux halogénoalkyle incluent les radicaux perhalogénoalkyle et notamment les radicaux perfluoroalkyle de formule C_nF_{2n+1} .

Le terme "halogène" désigne un atome de chlore, brome, iode ou fluor.

Le terme « cycloalkyle » signifie un système de cycle non aromatique mono- ou multicyclique de 3 à 10 atomes de carbone, de préférence de 5 à 7 atomes de 15 carbone. A titre d'exemple de cycloalkyle monocyclique, on peut citer notamment le cyclopentyle, le cyclohexyle, le cycloheptyle, et similaires. A titre d'exemple de groupe cycloalkyle multicyclique, on peut citer notamment la 1-décaline, le norbornyle, ou l'adamant-(1 ou 2-)yle.

Le terme « alcényle » désigne un groupe hydrocarboné aliphatique qui 20 contient une double liaison carbone-carbone et qui peut être linéaire ou ramifié ayant de 2 à 6 atomes de carbone dans la chaîne. Ramifié signifie qu'un ou plusieurs groupes alkyle inférieurs, tels que le méthyle, l'éthyle ou le propyle, sont liés à une chaîne alcényle linéaire. Comme exemple de groupe alcényle, on peut citer notamment l'éthényle, le propényle, le *n*-butényle, l'*i*-butényle, le 3-méthylbut- 25 2-ényle, ou le *n*-pentényle.

Le terme « alcynyle » désigne un groupe hydrocarboné aliphatique qui contient une triple liaison carbone-carbone et qui peut être linéaire ou ramifié ayant 2 à 6 atomes de carbone dans la chaîne, de préférence 2 à 4 atomes de 30 carbone. Ramifié signifie qu'un ou plusieurs groupes alkyle inférieurs, tels que le méthyle, l'éthyle ou le propyle, sont liés à une chaîne alcynyle linéaire. Comme exemple de groupes alcynyles, on peut citer notamment l'éthynyle, le propynyle, le *n*-butynyle, le 2-butynyle, le 3-méthylbutynyle, et le *n*-pentynyle.

Le terme « aryle » désigne un système cyclique monocyclique ou multicyclique aromatique de 6 à 10 atomes de carbone. Comme exemple de groupes aryle, on peut citer notamment le phényle ou le naphtyle.

5 Le terme « aralkyle » désigne un groupe aryl-alkyl-, dans lequel l'aryle et l'alkyle sont tels que décrits dans le présent document. Comme exemple de groupes aralkyle, on peut citer notamment le benzyle, le 2-phénéthyle et le naphtlèneméthyle.

10 Le terme « groupe hétérocyclique » désigne un groupe carbocyclique substitué ou non substitué, mono- ou multicyclique dans lequel la partie cyclique comprend au moins un hétéroatome tel que O, N, ou S. L'azote et le soufre peuvent être éventuellement oxydés, et l'azote peut être éventuellement substitué dans les cycles aromatiques. Les groupes hétérocycliques comprennent les groupes hétéroaryles et les groupes hétérocycloalkyles.

15 Le terme « hétérocycloalkyle » désigne un groupe cycloalkyle dans lequel un ou plusieurs atomes de carbone de cycle sont substitués par au moins un atome choisi parmi O, N, ou S. A titre d'exemple de groupe hétérocycloalkyle, on peut citer notamment les groupes pyrrolidinyle, pyrrolinyle, imidazolidinyle imidazolinyle, pirazolidinyle, pirazolinyle, pyrazalinyle, pipéridyle, pipérazinyle, morpholinyle, thiomorpholinyle, tétrahydrofuranylle, dithiolyle, oxathiolyle, 20 oxadiazolyle, oxathiazolyle, pyranyle, oxazinyle, oxathiazinyle, et oxadiazinyle..

Le terme « hétéroaryle » ou « hétéroaromatique » désigne un groupe contenant de 5 à 10 atomes de carbone dans lequel au moins un carbone de cycle est remplacé par au moins un atome choisi parmi -O-, -N-, or -S-. Comme exemple de groupe hétéroaryle, on peut citer notamment pyrrolyle, furanylle, 25 thiénylle, pirazolyle, imidazolyle, thiazolyle, isothiazolyle, isoxazolyle, oxazolyle, oxathiolyle, oxadiazolyle, triazolyle, oxatriazolyle, furazanylle, tétrazolyle, pyridyle, pyrazinyle, pyrimidinyle, pyridazinyle, triazinyle, indolyle, isoindolyle, indazolyle, benzofuranylle, isobenzofuranylle, purinyle, quinazolinyle, quinolyle, isoquinolyle, benzoimidazolyle, benzothiazolyle, benzothiophényle, thianaphthényle, 30 benzoxazolyle, benzisoxazolyle, cinnolinyle, phthalazinyle, naphthyridinyle, and quinoxalinyle. Sont également compris dans la définition des groupes "hétéroaryle" les systèmes de cycles fusionnés incluant notamment les systèmes cycliques dans lequel le cycle aromatique est fusionné avec un cycle

hétérocycloalkyle. Comme exemple de tels systèmes de cycles fusionnés, on peut citer notamment le phthalamide, l'anhydride phthalique, l'indoline, l'isoindoline, et la tetrahydroisoquinoline.

Le terme « hétéroarylalkyle » désigne un groupe aryl-hétéroaryl-, dans lequel l'hétéroaryle et l'alkyle sont tels que décrits dans le présent document.

Les termes « alkylène, cycloalkylène, hétérocycloalkylène, arylène, hétéroarylène » désignent respectivement des groupes bivalents alkyle, cycloalkyle, hétérocycloalkyle aryle et hétéroaryle, ces groupes étant tels que définis ci-dessus.

FIGURES

Figure 1 : Température de transition solide liquide de composés bromure de 1-alkyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium.

Figures 2 à 4 : Courbes de décroissance de la fluorescence obtenue avec les composés en C₁₆ des exemples 7 (figure 2), 8 (figure 3) et 9 (figure 4) par des photons CoC60 et des protons de 2MeV.

Figure 5 : Spectres d'émission et d'absorption du composé en C₁₆ de l'exemple 7.

Figure 6 : Dégradation de l'intensité de scintillation pour les composés des exemples 5 et 7, l'anthracène et le BC418 résultant des dégâts infligés aux matériaux par des protons de 2MeV.

Figures 7-8 : Pouvoir de discrimination neutron-gamma du composé de l'exemple 9 testé à partir d'une source radioactive de ²²Na+⁶⁰Co (rayonnement gamma) d'américium-béryllium (AmBe) (rayonnement de neutrons).


EXEMPLES

Les exemples suivants illustrent l'invention, sans toutefois la limiter. Les produits de départ utilisés sont des produits connus ou préparés selon des modes opératoires connus.

Les pourcentages sont exprimés en poids, sauf mention contraire.

Exemple 1

Bromure de 1-Méthyle-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium, 1a



Dans un ballon préalablement purgé à l'argon anhydre, sont placés du
 5 1-méthylimidazole (Aldrich) (0.257 mL, 0.265 g, 3.2 mmol), du 2-(4-bromométhyl-
 phényl)-5-phényl-oxazole [1] (1.013 g, 3.224 mmol) et du THF anhydre (15 mL).

Le mélange réactionnel est agité à 80°C pendant 12 heures. Durant la
 réaction, un précipité se forme.

Un solide blanc est isolé par filtration, lavé avec 2 fois 10 mL de THF et
 10 séché sous pression réduite à température ambiante. Le produit a été purifié par
 chromatographie flash (colonne de gel de silice, élution, DCM-MeOH, MeOH 1% à
 7%) et caractérisé comme étant un sel d'imidazolium.

$$\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{BrN}_3\text{O} + 1.6 \text{ H}_2\text{O} = 425,10 \text{ g.mol}^{-1}$$

Rendement en solide incolore cristallin : (1.205 g, 94 %)

15 $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{BrN}_3\text{O}; 1.6 \text{ H}_2\text{O}$ Calculé (%): C 56.57; H 4.49; N 10.03

Théorique (%): C 56,51; H 5.03; N 9.88

Pf = 190 ± 1 °C

Des expériences RMN ont été réalisées dans le CDCl_3 . (^1H RMN, :
 20 6 mg/0.3 mL CDCl_3)

^1H RMN (300 MHz, CDCl_3 , 20°C): δ 10.72 ppm (s, 1H, N-CH-N imidazolium), 8.11
 (d, 2H, =CH- aromatique, $^3J = 8.5$ Hz), 7.67 (m, 4H, =CH- aromatique), 7.45 (m,
 3H, =CH- aromatique), 7.32 (m, 3H, =CH- aromatique), 5.72 (s, 2H, Ph-CH₂-N),
 4.09 (s, 3H, N-CH₃).


25 ^{13}C { ^1H } RMN (75 MHz, CDCl_3 , 20 °C): δ 36.83 ppm (Ph-CH₂-N), 52.78 (N-CH₃),
 122.06 (C aromatique), 123.47 (C aromatique), 123.55 (C aromatique), 124.18 (C
 aromatique), 127.01 (C aromatique), 127.56 (C aromatique), 128.27 (C
 aromatique), 128.62 (C aromatique), 128,91 (C aromatique), 129,50 (C

aromatique), 135.02 (C aromatique), 137.51 (N-CH-N imidazolium), 151.63 (C aromatique), 159.97 (C aromatique).

IR : 3141, 3088, 3057, 2998, 2859, 1766, 1739, 1649 (s), 1561 (s), 1493 (s), 1451 (s), 1420 (s), 1334, 1283, 1169 (s), 1133, 1065, 1021, 947, 872, 831, 764, 723, 689, 613 cm⁻¹.

Exemple 2

Bromure de 1-Hexyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium, 1b



La procédure expérimentale est identique à celle du composé **1a** (1-hexylimidazole [2-5] 0.787 g, 5.2 mmol, 2-(4-bromométhyl-phényl)-5-phényl-oxazole 1.390 g, 4.4 mmol)

$C_{25}H_{28}BrN_3O + 0.5 H_2O = 475.42 \text{ g.mol}^{-1}$

Rendement en solide incolore cristallin : (1.908 g, 92%)

$C_{25}H_{28}BrN_3O; 0.5 H_2O$ Calculé (%): C 63.03; H 6.10; N 8.69

Théorique (%): C 63.16; H 6.15; N 8.84

Pf = 150 ± 1 °C

¹H RMN (300 MHz, CDCl₃, 20°C): δ 10.88 ppm (s, 1H, N-CH-N imidazolium), 8.11 (d, 2H, =CH- aromatique, ³J = 8.2 Hz), 7.67 (m, 4H, =CH- aromatique), 7.40 (m, 5H, =CH- aromatique), 7.24 (m, 1H, =CH- aromatique), 5.77 (s, 2H, Ph-CH₂-N), 4.30 (t, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₃-CH₃, ³J = 7.55 Hz), 1.92 (m, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₃-CH₃), 1.31 (m, 6H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₃-CH₃), 0.87 (t, 3H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₃-CH₃, ³J = 6.9 Hz).


¹³C {¹H} RMN (75 MHz, CDCl₃, 20 °C): δ 13.79 (N-(CH₂)₅-CH₃) ppm, 22.24 (N-(CH₂)₄-CH₂-CH₃), 25.77 (N-(CH₂)₃-CH₂-CH₂-CH₃), 30.02 (N-(CH₂)₂-CH₂-(CH₂)₂-CH₃), 30.90 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₃-CH₃), 50.15 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₃-CH₃), 52.50 (Ph-

CH₂-N), 122.25 (C aromatique), 122.41 (C aromatique), 123.44 (C aromatique), 124.09 (C aromatique), 126.91 (C aromatique), 127.52 (C aromatique), 128.16 (C aromatique), 128.54 (C aromatique), 128.86 (C aromatique), 129.50 (C aromatique), 135.26 (C aromatique), 136.70 (N-CH-N imidazolium), 151.53 (C aromatique), 159.96 (C aromatique).

IR : 3121, 3063, 2961, 2939, 2854, 1744, 1645, 1557 (s), 1491 (s), 1456 (s), 1418, 1358, 1324, 1154 (s), 1111, 1057, 1020, 949, 862, 838, 818, 764 (s), 716 (s), 687, 646, cm⁻¹.

Exemple 3

Bromure de 1-Octyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium, 1c



La procédure expérimentale est identique à celle du composé **1a** (1-octylimidazole [2-5] 0.865 g, 4.8 mmol, 2-(4-bromométhyl-phényl)-5-phényl-oxazole 1.495 g, 4.8 mmol)

$C_{27}H_{32}BrN_3O + 0.25 H_2O = 498,97 \text{ g.mol}^{-1}$

Rendement en solide incolore cristallin : (2.134 g, 90 %)

$C_{27}H_{32}BrN_3O; 0.25 H_2O$ Calculé (%): C 64.84; H 6.29; N 8.22

Théorique (%): C 64.99; H 6.57; N 8.42

Pf = 117 ± 1 °C


¹H RMN (300 MHz, CDCl₃, 20°C): δ 10.92 ppm (s, 1H, N-CH-N imidazolium), 8.11 (d, 2H, =CH- aromatique, ³J = 8.2 Hz), 7.68 (m, 4H, =CH- aromatique), 7.45 (m, 3H, =CH- aromatique), 7.35 (m, 2H, =CH- aromatique), 7.23 (m, 1H, =CH- aromatique), 5.77 (s, 2H, Ph-CH₂-N), 4.29 (t, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₅-CH₃, ³J = 7.6 Hz), 1.93 (m, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₅-CH₃), 1.24 (m, 10H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₅-CH₃), 0.86 (t, 3H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₅-CH₃, ³J = 6.6 Hz).

^{13}C { ^1H } RMN (75 MHz, CDCl_3 , 20 °C): δ 13.94 (N-(CH $_2$) $_7$ -CH $_3$) ppm, 22.45 (N-(CH $_2$) $_6$ -CH $_2$ -CH $_3$), 26.18 (N-(CH $_2$) $_5$ -CH $_2$ -CH $_2$ -CH $_3$), 28.80 (N-(CH $_2$) $_4$ -CH $_2$ -(CH $_2$) $_2$ -CH $_3$), 28.90 (N-(CH $_2$) $_3$ -CH $_2$ -(CH $_2$) $_3$ -CH $_3$), 30.11 (N-(CH $_2$) $_2$ -CH $_2$ -(CH $_2$) $_4$ -CH $_3$), 31.53 (N-CH $_2$ -CH $_2$ -(CH $_2$) $_5$ -CH $_3$), 50.22 (N-CH $_2$ -CH $_2$ -(CH $_2$) $_5$ -CH $_3$), 52.59 (Ph-CH $_2$ -N),
 122.11 (C aromatique), 122.33 (C aromatique), 123.47 (C aromatique), 124.13 (C aromatique), 126.96 (C aromatique), 127.57 (C aromatique), 128.23 (C aromatique), 128.56 (C aromatique), 128.88 (C aromatique), 129.52 (C aromatique), 135.21 (C aromatique), 136.85 (N-CH-N imidazolium), 151.58 (C aromatique), 159.98 (C aromatique).

IR : 3065, 2926, 2854, 1648, 1559 (s), 1489, 1454 (s), 1420, 1360, 1157 (s), 1117, 1020, 949, 860, 771, 719, 689 cm^{-1} .

Exemple 4

Bromure de 1-Décyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium, 1d



La procédure expérimentale est identique à celle du composé **1a** (1-décylimidazole [2-5] 0.973 g, 4.7 mmol, 2-(4 bromométhyl-phényl)-5-phényl-oxazole 1.383 g, 4.4 mmol)

$\text{C}_{29}\text{H}_{36}\text{BrN}_3\text{O} + 0.5 \text{H}_2\text{O} = 531.53 \text{ g.mol}^{-1}$

Rendement en solide incolore cristallin : (2.111 g, 92 %)

$\text{C}_{29}\text{H}_{36}\text{BrN}_3\text{O}; 0.5 \text{H}_2\text{O}$ Calculé (%): C 65.61; H 7.09; N 7.85

Théorique (%): C 65.53; H 7.02; N 7.91

Pf = 136 ± 1 °C

^1H RMN (300 MHz, CDCl_3 , 20°C): δ 10.93 ppm (s, 1H, N-CH-N imidazolium), 8.12 (d, 2H, =CH- aromatique, $^3\text{J} = 8.2$ Hz), 7.68 (m, 4H, =CH- aromatique), 7.34 (m, 6H, =CH- aromatique), 5.77 (s, 2H, Ph-CH $_2$ -N), 4.30 (t, 2H, N-CH $_2$ -CH $_2$ -(CH $_2$) $_7$ -


CH₃, ³J = 7.5 Hz), 1.93 (m, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₇-CH₃), 1.24 (m, 14H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₇-CH₃), 0.87(t, 3H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₇-CH₃, ³J = 6.6 Hz).

¹³C {¹H} RMN (75 MHz, CDCl₃, 20 °C): δ 13.98 (N-(CH₂)₉-CH₃) ppm, 22.52 (N-(CH₂)₈-CH₂-CH₃), 26.17 (N-(CH₂)₇-CH₂-CH₂-CH₃), 28.84 (N-(CH₂)₆-CH₂-(CH₂)₂-CH₃), 29.10 (N-(CH₂)₅-CH₂-(CH₂)₃-CH₃), 29.24 (N-(CH₂)₄-CH₂-(CH₂)₄-CH₃), 29.30 (N-(CH₂)₃-CH₂-(CH₂)₅-CH₃), 30.11 (N-(CH₂)₂-CH₂-(CH₂)₆-CH₃), 31.70 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₇-CH₃), 50.18 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₇-CH₃), 52.53 (Ph-CH₂-N), 122.19 (C aromatique), 122.42 (C aromatique), 123.44 (C aromatique), 124.09 (C aromatique), 126.91 (C aromatique), 127.54 (C aromatique), 128.19 (C aromatique), 128.54 (C aromatique), 128.85 (C aromatique), 129.51 (C aromatique), 135.25 (C aromatique), 136.73 (N-CH-N imidazolium), 151.53 (C aromatique), 159.96 (C aromatique).

IR : 3078, 2992, 2922, 2851, 1749, 1645, 1558 (s), 1488, 1445, 1365, 1331, 1160 (s), 1118, 1059, 949, 876, 821, 767, 720, 691, 655 cm⁻¹.

Exemple 5

Bromure de 1-Dodécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium, 1e



La procédure expérimentale est identique à celle du composé **1a** (1-dodécylimidazole [2-5] 1.262 g, 5.3 mmol, 2-(4-bromométhyl-phényl)-5-phényl-oxazole 1.342 g, 4.3 mmol)

$C_{31}H_{40}BrN_3O + 0.15 H_2O = 553.28 \text{ g.mol}^{-1}$

Rendement en solide incolore cristallin : (2.23 g, 95 %)

$C_{31}H_{40}BrN_3O; 0.15 H_2O$ Calculé (%) : C 67.25; H 7.28; N 7.40

Théorie (%) : C 67.30; H 7.34; N 7.59

Pf = 152 ± 1 °C

¹H RMN (300 MHz, CDCl₃, 20°C): δ 10.96 ppm (s, 1H, N-CH-N imidazolium), 8.12 (d, 2H, =CH- aromatique, ³J = 8.5 Hz), 7.68 (m, 4H, =CH- aromatique), 7.45 (m,

3H, =CH- aromatique), 7.36 (m, 1H, =CH- aromatique), 7.30 (m, 1H, =CH- aromatique), 7.22 (m, 1H, =CH- aromatique), 5.77 (s, 2H, Ph-CH₂-N), 4.29 (t, 2H, N-CH₂-(CH₂)₁₀-CH₃, ³J = 7.5 Hz), 1.93 (m, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₉-CH₃), 1.24 (m, 18H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₉-CH₃), 0.87 (t, 3H, N-CH₂-(CH₂)₁₀-CH₃, ³J = 6.72 Hz).

5

¹³C {¹H} RMN (75 MHz, CDCl₃, 20 °C): δ 14.03 (N-(CH₂)₁₁-CH₃) ppm, 22.58 (N-(CH₂)₁₀-CH₂-CH₃), 26.20 (N-(CH₂)₉-CH₂-CH₂-CH₃), 28.88 (N-(CH₂)₈-CH₂-(CH₂)₂-CH₃), 29.22 (N-(CH₂)₇-CH₂-(CH₂)₃-CH₃), 29.29 (N-(CH₂)₆-CH₂-(CH₂)₄-CH₃), 29.40 (N-(CH₂)₅-CH₂-(CH₂)₅-CH₃), 29.49 (N-(CH₂)₃-(CH₂)₂-(CH₂)₆-CH₃), 30.13 (N-(CH₂)₂-CH₂-(CH₂)₈-CH₃), 31.79 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₉-CH₃), 50.23 (N-CH₂-(CH₂)₁₀-CH₃), 52.61 (Ph-CH₂-N), 122.06 (C aromatique), 122.30 (C aromatique), 123.47 (C aromatique), 124.13 (C aromatique), 126.96 (C aromatique), 127.57 (C aromatique), 128.24 (C aromatique), 128.58 (C aromatique), 128.89 (C aromatique), 129.54 (C aromatique), 135.18 (C aromatique), 136.89 (N-CH-N imidazolium), 151.58 (C aromatique), 159.98 (C aromatique).


10

15

IR : 3082, 3015, 2919, 2848, 1735, 1560, 1489, 1443, 1364, 1159 (s), 1056, 949, 874, 812, 764, 719, 691, 654 cm⁻¹.

20 Exemple 6 :

Bromure de 3-[4-(5-Phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-1-tétradécyl-3H-imidazol-1-ium, 1f



25

Dans un ballon préalablement purgé à l'argon anhydre, sont placés du 1-tétradécylimidazole [2-5] (1.023 g, 3.9 mmol), 2-(4-bromométhyl-phényl)-5-phényl-oxazole (1.215 g, 3.9 mmol) et du THF anhydre (15 mL). Le mélange réactionnel est agité à 80°C pendant 12 heures. (Le solvant est enlevé sous vide et le produit est lavé avec 3 fois 10 mL de Et₂O et séché sous pression réduite à température ambiante. Le produit a été purifié par chromatographie flash (colonne

de gel de silice, élution, DCM-MeOH, MeOH 1% à 7%) et caractérisé comme étant un sel d'imidazolium.

$C_{33}H_{44}BrN_3O = 578.63 \text{ g.mol}^{-1}$

Rendement en solide incolore cristallin : (2.092 g, 93 %)

5 $C_{33}H_{44}BrN_3O$ Calculé (%): C 68.49; H 7.78; N 7.08

Théorique (%): C 68.50; H 7.66; N 7.20

Pf = 117 ± 1 °C

1H RMN (300 MHz, $CDCl_3$, 20°C): δ 11.00 ppm (s, 1H, N-CH-N imidazolium), 8.13 (d, 2H, =CH- aromatique, $^3J = 8.2$ Hz), 7.68 (m, 4H, =CH- aromatique), 7.46 (m, 3H, =CH- aromatique), 7.36 (m, 1H, =CH- aromatique), 7.26 (m, 1H, =CH- aromatique), 7.20 (m, 1H, =CH- aromatique), 5.77 (s, 2H, Ph-CH₂-N), 4.30 (t, 2H, N-CH₂-(CH₂)₁₂-CH₃, $^3J = 7.5$ Hz), 1.94 (m, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₁-CH₃), 1.24 (m, 22H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₁-CH₃), 0.87 (t, 3H, N-(CH₂)₁₃-CH₃, $^3J = 6.7$ Hz).

15

^{13}C { 1H } RMN (75 MHz, $CDCl_3$, 20 °C): δ 14.03 (N-(CH₂)₁₃-CH₃) ppm, 22.58 (N-(CH₂)₁₂-CH₂-CH₃), 26.20 (N-(CH₂)₁₁-CH₂-CH₂-CH₃), 28.89 (N-(CH₂)₁₀-CH₂-(CH₂)₂-CH₃), 29.25 (N-(CH₂)₉-CH₂-(CH₂)₃-CH₃), 29.30 (N-(CH₂)₈-CH₂-(CH₂)₄-CH₃), 29.40 (N-(CH₂)₇-CH₂-(CH₂)₅-CH₃), 29.50 (N-(CH₂)₅-(CH₂)₂-(CH₂)₆-CH₃), 29.54 (N-(CH₂)₄-(CH₂)₂-(CH₂)₈-CH₃), 29.58 (N-(CH₂)₃-CH₂-(CH₂)₉-CH₃), 30.13 (N-(CH₂)₂-CH₂-(CH₂)₁₀-CH₃), 31.81 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₁-CH₃), 50.23 (N-CH₂-(CH₂)₁₂-CH₃), 52.61 (Ph-CH₂-N), 122.07 (C aromatique), 122.32 (C aromatique), 123.47 (C aromatique), 124.12 (C aromatique), 126.96 (C aromatique), 127.57 (C aromatique), 128.24 (C aromatique), 128.56 (C aromatique), 128.88 (C aromatique), 129.54 (C aromatique), 135.20 (C aromatique), 136.86 (N-CH-N imidazolium), 151.58 (C aromatique), 159.98 (C aromatique).


25

IR : 3127, 3096, 2917 (s), 2849 (s), 1609, 1589, 1556, 1470, 1440, 1363, 1330, 1186, 1160 (s), 1117, 1054, 951, 847, 818, 772, 717, 694, 661 cm^{-1} .

30

Exemple 7 :

Bromure de 1-Hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium,
1g



- 5 La procédure expérimentale est identique à celle du composé **1f** (1-hexadécylimidazole [2-5] 1.385 g, 4.7 mmol, 2-(4-bromométhyl-phényl)-5-phényl-oxazole 1.489 g, 4.7 mmol)

$$C_{35}H_{48}BrN_3O = 606.68 \text{ g.mol}^{-1}$$

Rendement en solide incolore cristallin : (2.680 g, 93%)

- 10 $C_{35}H_{48}BrN_3O$ Calculé (%): C 68.86; H 8.39; N 7.17

Théorique (%): C 69.29; H 7.97; N 6.93

Pf = 97 ± 1 °C

- 1H RMN (300 MHz, $CDCl_3$, 20°C): δ 10.93 ppm (s, 1H, N-CH-N imidazolium), 8.12 (d, 2H, =CH- aromatique, $^3J = 8.5$ Hz), 7.68 (m, 4H, =CH- aromatique), 7.40 (m, 4H, =CH- aromatique), 7.25 (m, 2H, =CH- aromatique), 5.77 (s, 2H, Ph-CH₂-N), 4.30 (t, 3H, N-CH₂-(CH₂)₁₄-CH₃, $^3J = 7.5$ Hz), 1.93 (m, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 1.23 (m, 26H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 0.88 (t, 3H, N-(CH₂)₁₅-CH₃, $^3J = 6.7$ Hz).

20


- ^{13}C { 1H } RMN (75 MHz, $CDCl_3$, 20 °C): δ 14.06 (N-(CH₂)₁₅-CH₃) ppm, 22.63 (N-(CH₂)₁₄-CH₂-CH₃), 26.24 (N-(CH₂)₁₃-CH₂-CH₂-CH₃), 28.90 (N-(CH₂)₁₂-CH₂-(CH₂)₂-CH₃), 29.30 (N-(CH₂)₃-(CH₂)₉-(CH₂)₃-CH₃), 29.43 (N-(CH₂)₃-(CH₂)₉-(CH₂)₃-CH₃), 29.53 (N-(CH₂)₃-(CH₂)₉-(CH₂)₃-CH₃), 29.59 (N-(CH₂)₃-(CH₂)₉-(CH₂)₃-CH₃), 29.62 (N-(CH₂)₃-(CH₂)₉-(CH₂)₃-CH₃), 30.13 (N-(CH₂)₂-CH₂-(CH₂)₁₂-CH₃), 31.86 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 50.32 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 52.78 (Ph-CH₂-N), 121.75 (C aromatique), 121.95 (C aromatique), 123.52 (C aromatique), 124.19 (C aromatique), 127.06 (C aromatique), 127.62 (C aromatique), 128.39 (C aromatique), 128.62 (C aromatique), 128.93 (C aromatique), 129.57 (C

aromatique), 134.99 (C aromatique), 137.31 (N-CH-N imidazolium), 151.66 (C aromatique), 160.00 (C aromatique).

IR : 3128, 3097, 2917 (s), 2850 (s), 1611, 1557, 1470, 1444, 1363, 1331, 1159 (s),
 5 1122, 1058, 951, 846, 770, 720, 661 cm⁻¹.

Exemple 8 :

1-Hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
 hexafluorophosphate, 2a



Dans un ballon, est introduit du bromure de 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium (1.008 g, 1.7 mmol) qui est dissout dans de l'éthanol (50 mL). On ajoute une solution aqueuse de hexafluorophosphate de potassium (0.490 g, 2.7 mmol, 10 mL). Le mélange est agité à température
 15 ambiante pendant 3 jours. Le précipité est filtré, lavé avec 3 fois 30 mL d'eau distillée et séché à pression réduite à température ambiante pendant 12 heures. Le produit est caractérisé par spectroscopie RMN.

$C_{35}H_{48}F_6N_3OP = 671,74 \text{ g.mol}^{-1}$

Rendement en solide incolore cristallin : (0.994 g, 89%)

Pf = 114 ± 1 °C


¹H RMN (300 MHz, CDCl₃, 20°C): δ 8.80 ppm (s, 1H, N-CH-N imidazolium), 8.12 (d, 2H, =CH- aromatique, ³J = 8.5 Hz), 7.70 (d, 2H, =CH- aromatique, ³J = 7.1 Hz),
 25 7.47 (m, 5H, =CH- aromatique), 7.35 (m, 1H, =CH- aromatique), 7.21 (m, 2H, =CH- aromatique), 5.38 (s, 2H, Ph-CH₂-N), 4.18 (t, 3H, N-CH₂- (CH₂)₁₄-CH₃, ³J = 7.5 Hz), 1.89 (m, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 1.23 (m, 26H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 0.88 (t, 3H, N-(CH₂)₁₅-CH₃, ³J = 6.7 Hz).

^{13}C { ^1H } RMN (75 MHz, CDCl_3 , 20 °C): δ 14.05 (N-(CH_2)₁₅- $\underline{\text{C}}\text{H}_3$) ppm, 22.62 (N-(CH_2)₁₄- $\underline{\text{C}}\text{H}_2\text{-CH}_3$), 26.16 (N-(CH_2)₁₃- $\underline{\text{C}}\text{H}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$), 28.86 (N-(CH_2)₁₂- $\underline{\text{C}}\text{H}_2\text{-(CH}_2$)₂- CH_3), 29.30 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{C}}\text{H}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3), 29.46 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{C}}\text{H}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3), 29.56 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{C}}\text{H}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3), 29.64 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{C}}\text{H}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3), 29.75 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{C}}\text{H}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3), 31.86 (N- $\text{CH}_2\text{-}\underline{\text{C}}\text{H}_2\text{-(CH}_2$)₁₃- CH_3), 50.31 (N- $\underline{\text{C}}\text{H}_2\text{-CH}_2\text{-(CH}_2$)₁₄- CH_3), 52.99 (Ph- $\underline{\text{C}}\text{H}_2\text{-N}$), 122.16 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 122.32 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 123.47 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 124.16 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 127.08 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 127.58 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 128.39 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 128.60 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 128.90 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 129.31 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 134.44 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 135.50 (N- $\underline{\text{C}}\text{H-N}$ imidazolium), 151.65 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 159.90 ($\underline{\text{C}}$ aromatique).

IR : 3165, 2922, 2851, 1561, 1468, 1417, 1384, 1163, 1116, 1057, 1023, 949, 840, 818, 770, 741, 720, 693, 654 cm^{-1} .

Exemple 9 :

1-Hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
bis(trifluorométhylsulfonyle)imide, 2b



Dans un ballon, est introduit du bromure de 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium (1.007 g, 1.7 mmol) qui est ensuite dissout dans l'éthanol (55 mL). On ajoute du lithium bis(trifluorométhylsulfonyle)imide (0.731 g, 2.5 mmol). La solution est agitée à température ambiante pendant 3 jours. Le solvant est retiré sous pression réduite. Le solide est lavé avec 3 fois 30 mL d'eau distillée et séché sous pression réduite à température ambiante pendant 12 heures. Le produit est caractérisé par spectroscopie RMN.

$\text{C}_{37}\text{H}_{48}\text{F}_6\text{N}_4\text{O}_5\text{S}_2 = 806.92 \text{ g.mol}^{-1}$

Rendement en solide incolore cristallin : (1.261 g, 94%)

Pf = 78 ± 1 °C


^1H RMN (300 MHz, CDCl_3 , 20°C): δ 9.08 ppm (s, 1H, N-CH-N imidazolium), 8.16 (d, 2H, =CH- aromatique, 3J = 8.2 Hz), 7.72 (d, 2H, =CH- aromatique, 3J = 7.1 Hz), 7.48 (m, 5H, =CH- aromatique), 7.37 (m, 1H, =CH- aromatique), 7.23 (d, 2H, =CH- aromatique, 3J = 7.1 Hz), 5.44 (s, 2H, Ph-CH₂-N), 4.22 (t, 2H, N-CH₂-(CH₂)₁₄-CH₃, 3J = 7.5 Hz), 1.89 (m, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 1.24 (m, 26H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 0.88 (t, 3H, N-(CH₂)₁₅-CH₃, 3J = 6.7 Hz).

^{13}C { ^1H } RMN (75 MHz, CDCl_3 , 20 °C): δ 14.05 (N-(CH₂)₁₅-CH₃) ppm, 22.63 (N-(CH₂)₁₄-CH₂-CH₃), 26.07 (N-(CH₂)₁₃-CH₂-CH₂-CH₃), 28.79 (N-(CH₂)₁₂-CH₂-(CH₂)₂-CH₃), 29.25 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃), 29.30 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃), 29.41 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃), 29.53 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃), 29.59 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃), 29.63 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃), 29.97 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃), 31.86 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 50.34 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₄-CH₃), 53.06 (Ph-CH₂-N) 119.80 (q, CF₃⁻, J = 321.1 Hz), 122.37 (C aromatique), 122.54 (C aromatique), 123.49 (C aromatique), 124.19 (C aromatique), 127.15 (C aromatique), 127.58 (C aromatique), 128.55 (C aromatique), 128.67 (C aromatique), 128.93 (C aromatique), 129.26 (C aromatique), 134.36 (C aromatique), 135.46 (N-CH-N imidazolium), 151.74 (C aromatique), 159.94 (C aromatique).

IR : 3141, 3084, 2919, 2851, 1937, 1849, 1800, 1590, 1560, 1493, 1466, 1416, 1351, 1181, 1138, 1059, 952, 906, 848, 824, 790, 764, 718, 687, 655, 615 cm⁻¹.

Exemple 10 :

1-Hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium dodécyl sulfate, 2c



Dans un ballon, on introduit du bromure de 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényloxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium (1.005 g, 1.7 mmol) qui est ensuite dissout dans du méthanol (100 mL). On ajoute du sodium dodécyl sulfate (0.783 g, 2.7 mmol, 50 mL MeOH). Le mélange est agité à température ambiante pendant 12 heures.

Le solide blanc est isolé par filtration, lavé avec 3 fois 30 mL d'eau et séché sous pression réduite à température ambiante pendant 12 heures. Le produit est caractérisé par spectroscopie RMN.

10 $C_{47}H_{73}N_3O_5S = 792.16 \text{ g.mol}^{-1}$

Rendement en solide incolore cristallin : (1.053 g, 80%)

Pf = 127 ± 1 °C

^1H RMN (300 MHz, CDCl_3 , 20°C): δ 10.04 ppm (s, 1H, N-CH-N imidazolium), 8.13 (d, 2H, =CH- aromatique, $^3J = 8.2$ Hz), 7.71 (d, 2H, =CH- aromatique, $^3J = 7.1$ Hz), 7.59 (d, 2H, =CH- aromatique, $^3J = 8.2$ Hz), 7.45 (m, 3H, =CH- aromatique), 7.36 (m, 1H, =CH- aromatique), 7.19 (m, 2H, =CH- aromatique), 5.57 (s, 2H, Ph-CH₂-N), 4.25 (t, 2H, N-CH₂-(CH₂)₁₄-CH₃, $^3J = 7.5$ Hz), 4.10 (t, 2H, CH₃-(CH₂)₉-CH₂-CH₂-OSO₃⁻, $^3J = 6.8$ Hz), 1.90 (m, 2H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 1.68 (m, 2H, CH₃-(CH₂)₉-CH₂-CH₂-OSO₃⁻), 1.24 (m, 44H, N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃) et CH₃-(CH₂)₉-CH₂-CH₂-OSO₃⁻), 0.87 (m, 6H, N-(CH₂)₁₅-CH₃ et CH₃-(CH₂)₉-CH₂-CH₂-OSO₃⁻, $^3J = 6.7$ Hz).


^{13}C { ^1H } RMN (75 MHz, CDCl_3 , 20 °C): δ 14.03 (N-(CH₂)₁₅-CH₃) et CH₃-(CH₂)₁₁-OSO₃⁻ ppm, 22.60 (N-(CH₂)₁₄-CH₂-CH₃) et CH₃-CH₂-(CH₂)₁₀-OSO₃⁻), 25.92 (N-(CH₂)₁₃-CH₂-CH₂-CH₃) et CH₃-CH₂-CH₂-(CH₂)₉-OSO₃⁻), 26.24 (N-(CH₂)₁₂-CH₂-(CH₂)₂-CH₃) et CH₃-(CH₂)₂-CH₂-(CH₂)₈-OSO₃⁻), 28.94 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃) et CH₃-(CH₂)₃-(CH₂)₆-(CH₂)₂-OSO₃⁻), 29.29 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃) et CH₃-(CH₂)₃-(CH₂)₆-(CH₂)₂-OSO₃⁻), 29.36 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃) et CH₃-(CH₂)₃-(CH₂)₆-(CH₂)₂-OSO₃⁻), 29.42 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃) et CH₃-(CH₂)₃-(CH₂)₆-(CH₂)₂-OSO₃⁻), 29.48 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃) et CH₃-(CH₂)₃-(CH₂)₆-(CH₂)₂-OSO₃⁻), 29.59 (N-(CH₂)₂-(CH₂)₁₀-(CH₂)₃-CH₃) et CH₃-(CH₂)₃-(CH₂)₆-(CH₂)₂-OSO₃⁻), 30.06 (CH₃-(CH₂)₉-CH₂-CH₂-OSO₃⁻), 31.85 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₃-CH₃), 50.15 (CH₃-(CH₂)₉-CH₂-CH₂-OSO₃⁻), 52.74 (N-CH₂-CH₂-(CH₂)₁₄-CH₃), 67.73 (Ph-

$\underline{\text{CH}}_2\text{-N}$), 122.03 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 122.24 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 123.49 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 124.14 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 126.98 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 127.64 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 128.21 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 128.56 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 128.89 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 129.50 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 135.42 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 137.31 ($\text{N-}\underline{\text{CH}}\text{-N}$ imidazolium), 151.59 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 160.04 ($\underline{\text{C}}$ aromatique).

IR : 3123, 3071, 2919, 2850, 1634, 1552, 1468, 1381, 1248, 1154, 1097, 1061, 991, 869, 793, 768, 719, 693, 662, 620 cm^{-1} .

Exemple 11 :

- 10 1-Hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium hexadécyl sulfate, 2d



La procédure expérimentale est identique à celle du composé **2c** (bromure de 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium 1.010 g, 1.7 mmol, 60 mL EtOH), sodium hexadecyl sulfate (0.919 g, 2.7 mmol, 180 mL EtOH/60 mL H₂O).

$\text{C}_{51}\text{H}_{81}\text{N}_3\text{O}_5\text{S} = 848.27 \text{ g.mol}^{-1}$

Rendement en solide incolore cristallin : (1.253 g, 89%)

- 20 Mp = 130 ± 1 °C

^1H RMN (300 MHz, CDCl_3 , 20°C): δ 10.04 ppm (s, 1H, $\text{N-}\underline{\text{CH}}\text{-N}$ imidazolium), 8.13 (d, 2H, $=\underline{\text{CH}}\text{-}$ aromatique, $^3\text{J} = 8.2$ Hz), 7.71 (d, 2H, $=\underline{\text{CH}}\text{-}$ aromatique, $^3\text{J} = 7.4$ Hz), 7.58 (d, 2H, $=\underline{\text{CH}}\text{-}$ aromatique, $^3\text{J} = 7.9$ Hz), 7.46 (m, 3H, $=\underline{\text{CH}}\text{-}$ aromatique), 7.36 (m, 1H, $=\underline{\text{CH}}\text{-}$ aromatique), 7.19 (d, 2H, $=\underline{\text{CH}}\text{-}$ aromatique, $^3\text{J} = 11.0$ Hz), 5.57 (s, 2H, $\text{Ph-}\underline{\text{CH}}_2\text{-N}$), 4.25 (t, 2H, $\text{N-}\underline{\text{CH}}_2\text{-(CH}_2\text{)}_{14}\text{-CH}_3$, $^3\text{J} = 7.4$ Hz), 4.10 (t, 2H, $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_9\text{-CH}_2\text{-}\underline{\text{CH}}_2\text{-OSO}_3^-$, $^3\text{J} = 6.9$ Hz), 1.90 (m, 2H, $\text{N-CH}_2\text{-}\underline{\text{CH}}_2\text{-(CH}_2\text{)}_{13}\text{-CH}_3$), 1.68 (m, 2H, $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_9\text{-}\underline{\text{CH}}_2\text{-CH}_2\text{-OSO}_3^-$), 1.24 (m, 52H, $\text{N-CH}_2\text{-CH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_{13}\text{-CH}_3$) et

$\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_{13}\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OSO}_3^-$), 0.88 (m, 6H, N - $\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_{13}\text{-CH}_3$) et $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_{13}\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OSO}_3^-$, $^3J = 6.6 \text{ Hz}$)


$^{13}\text{C} \{^1\text{H}\}$ RMN (75 MHz, CDCl_3 , 20 °C): δ 14.04 (N-(CH_2)₁₅- $\underline{\text{CH}}_3$) et $\underline{\text{CH}}_3\text{-(CH}_2\text{)}_{15}\text{-OSO}_3^-$) ppm, 22.61 (N-(CH_2)₁₄- $\underline{\text{CH}}_2\text{-CH}_3$) et $\text{CH}_3\text{-}\underline{\text{CH}}_2\text{-(CH}_2\text{)}_{14}\text{-OSO}_3^-$), 25.93 (N-(CH_2)₁₃- $\underline{\text{CH}}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$) et , $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-}\underline{\text{CH}}_2\text{-(CH}_2\text{)}_{13}\text{-OSO}_3^-$), 26.24 (N-(CH_2)₁₂- $\underline{\text{CH}}_2\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH}_3$) et $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-}\underline{\text{CH}}_2\text{-(CH}_2\text{)}_{12}\text{-OSO}_3^-$), 28.94 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{CH}}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3) et $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_3\text{-(}\underline{\text{CH}}_2\text{)}_{10}\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-OSO}_3^-$), 29.29 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{CH}}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3) et $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_3\text{-(}\underline{\text{CH}}_2\text{)}_{10}\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-OSO}_3^-$), 29.37 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{CH}}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3) et $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_3\text{-(}\underline{\text{CH}}_2\text{)}_{10}\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-OSO}_3^-$), 29.43 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{CH}}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3) et $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_3\text{-(}\underline{\text{CH}}_2\text{)}_{10}\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-OSO}_3^-$), 29.48 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{CH}}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3) et $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_3\text{-(}\underline{\text{CH}}_2\text{)}_{10}\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-OSO}_3^-$), 29.64 (N-(CH_2)₂-($\underline{\text{CH}}_2$)₁₀-(CH_2)₃- CH_3) et $\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_3\text{-(}\underline{\text{CH}}_2\text{)}_{10}\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-OSO}_3^-$), 30.06 ($\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_9\text{-}\underline{\text{CH}}_2\text{-CH}_2\text{-OSO}_3^-$), 31.86 (N- $\underline{\text{CH}}_2\text{-CH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_{14}\text{-CH}_3$), 50.15 ($\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_9\text{-CH}_2\text{-}\underline{\text{CH}}_2\text{-OSO}_3^-$), 52.74 (N- $\underline{\text{CH}}_2\text{-CH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_{14}\text{-CH}_3$), 67.73 (Ph- $\underline{\text{CH}}_2\text{-N}$), 122.00 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 122.23 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 123.48 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 124.14 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 126.98 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 127.64 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 128.20 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 128.56 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 128.89 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 129.49 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 135.40 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 137.31 (N- $\underline{\text{CH}}\text{-N}$ imidazolium), 151.59 ($\underline{\text{C}}$ aromatique), 160.04 ($\underline{\text{C}}$ aromatique).

20

IR : 3123, 3071, 2918, 2850, 1630, 1552, 1470, 1409, 1381, 1248, 1153, 1113, 1063, 987, 872, 845, 793, 769, 719, 693, 662, 620 cm^{-1} .

Exemple 12

25 *Stabilité thermique du bromure de 1-alkyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium*



La stabilité thermique des composés bromure de 1-Alkyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium a été étudiée en effectuant une analyse

thermogravimétrique (ATG - DSC) au moyen d'un appareillage "SDT Q600" de la compagnie TA Instruments, muni d'un module DSC-TGA Standard. Les analyses ont été réalisées avec un balayage d'air de 50.0 ml/mn en capsule de platine et à la vitesse de 10°C/mn.

5

Bromure d'alkylimidazolium (n)	T _{dec} (°C)
n = 1	200-205
n = 6	190-200
n = 8	200-210
n = 10	190-200
n = 12	200-210
n = 14	190-200
n = 16	210-220

Tableau 1

Exemple 13

Température de transition

10 Les radioluminophores bromure de 1-alkyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium ont été caractérisés par une calorimétrie différentielle à balayage au moyen d'un appareillage "DSC Q1000" de la compagnie TA Instruments, muni d'une cellule DSC Standard et d'un cryostat RCS. Les analyses ont été réalisées avec un balayage d'azote de 50.0 ml/mn en capsule aluminium et
15 à différentes vitesses.

Les résultats obtenus sont représentés à la figure 1. Ils montrent le caractère modulable des propriétés physiques des composés de formule (I). En outre, de façon intéressante, une mésophase cristal liquide est observée pour la molécule
20 présentant une chaîne carbonée en C₁₆. Les propriétés mésomorphes ont été caractérisées par des observations au microscope à lumière polarisée. L'émergence de la phase cristal-liquide en refroidissant le composé à partir de l'état liquide (isotrope) est caractéristique d'un Smectique A (formation de bâtonnets avec des unités positives). La calorimétrie différentielle indique une

transition cristal-mésomorphe a 97°C (enthalpie 11,9 J/g) ainsi qu'une transition mésomorphe-liquide (point d'éclaircissement) a 115°C (2,0 J/g).

Exemple 14

5 *Pouvoir de détection*

La discrimination n- γ repose sur la comparaison, à composantes rapides égales, des composantes lentes résultant des processus d'ionisation induits respectivement par les rayonnements gamma et les protons de recul produits par les neutrons [6-11]. Le moyen le plus fin d'effectuer la mesure d'un déclin de
10 fluorescence est d'exciter impulsionnellement (impulsion nanoseconde) l'échantillon et de reconstituer statistiquement sa réponse par une technique de coïncidence, ceci en utilisant un photomultiplicateur fonctionnant en régime de photoélectron unique.

Les premières mesures de déclins excités par des protons pulsés
15 nanoseconde d'énergies comprises entre 1 et 4 MeV (accélérateur électrostatique 4MV) ont été réalisées dans les conditions de production d'un proton de recul pour induire une réponse du détecteur. A titre d'exemple, les figures 2 à 4 représentent des courbes de décroissance de la fluorescence obtenues avec les composés des exemples 7 (fig. 1), 8 (fig. 2) et 9 (fig. 3)(chaînes alkyles C₁₆) excité par des
20 photons du Co60 et des protons de 2 MeV. On observe bien la présence de deux composantes, rapide ($t < 20$ ns ; t : temps)) et lente ($t \geq 20$ ns). La composante rapide est de type exponentiel. La durée de vie de l'état excité fluorescent du composé est comprise entre une et deux nanosecondes. Comme prédit par la théorie, la loi de décroissance de la composante lente est de type $t^{3/2}$, ce qui
25 indique une diffusion isotrope des porteurs des charges avant leur recombinaison mutuelle. Le comportement, en matière de détection, de ces nouvelles molécules est donc tout à fait semblable à celui des anciens produits et peut donc les remplacer sans nécessiter de modification importante des systèmes de détection (photomultiplicateur) et d'acquisition de données (électronique et informatique de
30 traitement).

Exemple 15

Spectre d'absorption et d'émission

On a également observé que l'émission de fluorescence du composé en C₁₆ de l'exemple 7 se situait bien dans le domaine spectral de l'ultraviolet, vers 400 nm (voir spectres d'émission et d'absorption en figure 5), ce qui est tout à fait compatible avec un remplacement des scintillateurs actuels sans modification des chaînes de détection et d'analyse.

Exemple 16

Tenue aux rayonnements

La diminution de l'intensité de la fluorescence résultant des dégâts infligés aux matériaux par des protons de 2 MeV a également été étudiée. On observe un très bon comportement des molécules selon l'invention (voir la figure 6) si on compare leurs tenues à celles de matériaux concurrents, tel que le BC418 commercialisé par la société Bicron, filiale de Saint-Gobain. Ainsi, pour une intensité de fluorescence donnée à fluence nulle, on remarque que la perte d'intensité du composé en C₁₆ de l'exemple 7 avec la fluence n'est pas très différente de celle du BC418.


Exemple 17

Pouvoir de discrimination n-γ

Le pouvoir de discrimination neutron gamma du composé de l'exemple 9 a été testé en situation réelle à partir d'une source radioactive de sodium et de cobalt 60 (²²Na + ⁶⁰Co) d'américium-béryllium (AmBe). L'analyse des composantes rapides et lentes des déclins de fluorescence permet de tracer le graphe représentant, en abscisse, l'intégrale du signal (Q tot) et, en ordonnée, l'intégrale de la composante lente (Q lent). On observe ainsi une différence très marquée entre l'intensité de la composante lente obtenue avec le rayonnement gamma (fig. 7) et celle obtenue avec les neutrons (fig. 8). Ceci met en évidence, de manière indiscutable, la propriété de discrimination neutron gamma des composés de formule (I).

Exemple 18

Polymère méthacrylate de méthyle contenant 52% (en poids) de sel d'hexafluorophosphate.



Dans un récipient en verre, sont introduits de l'hexafluorophosphate de 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium (5,10 g, 8,4 mmol) et du méthacrylate de méthyle (MMA, Prolabo) (10,45 mL, 9,80 g, 98,0 mmol). Le mélange est chauffé entre 40° et 60° C jusqu'à dissolution complète du sel d'hexafluorophosphate. Du 2'-Azobis(2-méthylpropionitrile) (AIBN, Acros, 12 mg) est ajouté. Le mélange est chauffé à différentes températures (T_i: °C) pendant différents intervalles de temps (t_i: heures).

1/ (T₁, t₁) : (60, 3)

2/ (T₂, t₂) : (96, 1)

3/ (T₃, t₃) : (108, 2)

A la fin, pour terminer le processus de polymérisation, le mélange est chauffé à 115°C pendant 10-30 mn. Le mélange est ensuite refroidi dans un bain de glace (0°C) pendant 20 mn. Le polymère de méthacrylate de méthyle incorporant le sel d'hexafluorophosphate (52% en poids) est un solide transparent.

Expérience n°	Wt %, (salt: g/MMA: g)	AIBN (mg)	T ₁ , T ₂ , T ₃ (° C)	t ₁ , t ₂ , t ₃ (h)
EB083	0 (0/2.817)	8	60, 96, 108	2.5, 3, 0
EB095	11 (0.10/0.939)	4	60, 96, 115	3, 0, 3
EB096	21 (0.20/0.939)	4	60, 96, 108	3, 3.5, 0
EB097	43 (0.20/0.469)	2	60, 96, 108	3, 4, 0
EB099	43 (0.20/0.469)	2	60, 96, 115	3, 2.5, 1
EB100	43 (0.20/0.469)	2	60, 96, 108	3, 2, 2

EB101	53 (0.25/0.469)	2	60, 96, 108	3, 1.5, 2
EB102	64 (0.30/0.469)	3	60, 96, 108	3, 1, 2
EB103	75 (0.35/0.469)	3	60, 96, 108	3, 1, 2.5

A noter que le méthacrylate de méthyle a été préalablement séché sur CaH_2 , purifié par distillation sous vide et stocké à -25°C .

AIBN a été purifié par recristallisation à partir du méthanol à 0°C .

REFERENCES

- [1] H.-J. Meyer and T. Wolff, Chem. Euro. J., 2000, 15, 2809-2817: *Water-binding Solid Scintillators: Synthesis, Emission properties and test in 3H and 14C counting*,
5
- [2] S. Khabnadideh, Z. Rezaei, A. Khalafi-Nezhad, R. Bahrinajafi, R. Mohamadi, A. A. Farrokhrooz, *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters* 13 (2003) 2863–2865 - *Synthesis of N-alkylated Derivatives of Imidazole as Antibacterial Agents*
- 10 [3] Jen-Yen Cheng and Yen-Ho Chu*, *Tetrahedron Letters* 47 (2006) 1575–1579,
- [4] Martin Tosoni, Sabine Laschat*, and Angelika Baro., *Helvetica Chimica Acta* Vol. 87 (2004)
- [5] Wang, Xixin; Zhao, Jianling; Yang, Hao; Chen, Wentao; Zhu, Zhijia.
15 Department of Chemistry, Nanyang Teacher's College, Nanyang, Peop. Rep. China. Huaxue Shiji (2001), 23(5), 306-307. Publisher: Huagongbu Huaxue Shiji Xinsizhan, CODEN: HUSHDR ISSN: 0258-3283. Journal written in Chinese. CAN 136:279384 AN 2001:877665 CAPLUS
- [6] J.-M. Jung, Thèse de Doctorat de l'Université Louis Pasteur n°998,
20 Strasbourg, 1991
- [7] D. Paligoric, J. Klein, Int. J. Rad. Phys. Chem. 4 (1972) 359
- [8] J. Klein, R. Voltz, Phys. Rev. Letters 36 (1976) 1214
- [9] J. Klein, R. Voltz, Can. J. Chem. 55 (1977) 2102
- [10] J. Klein, J. Chim. Phys. 80 (1983) 627
- 25 [11] G. Klein, R. Voltz, M. Schott, *Chem. Phys. Lett.* 16 (1972) 340 ; id. 19 (1973) 391


REVENDEICATIONS

1. Utilisation pour la détection des rayonnements gamma, X, neutron, proton, d'un composé fluorophore F_1 porteur d'un groupe organique cationique associé à un contre-anion, ou bien porteur d'un groupe anionique associé à un contre-cation organique, ledit groupe cationique ou contre-cation organique comportant au moins un hétéroatome choisi parmi N, S ou P porteur d'une charge positive.

2. Utilisation selon la revendication 1, dans laquelle le composé fluorophore F_1 est porteur d'un groupe cationique organique associé à un contre-anion.

3. Utilisation selon la revendication 2, dans laquelle le groupe organique cationique est un groupe hétérocyclique éventuellement substitué par un à trois groupes choisis parmi R^{1a} , R^{1b} , R^{1c} ou R^{25} ,

ou bien le groupe organique cationique est un groupe (a), (b), (c) ou (d) :



R^{1a} , R^{1b} , R^{1c} sont, à chaque occurrence, chacun indépendamment choisis parmi H, les groupes alkyles en C_1 - C_{30} , cycloalkyles en C_3 - C_7 , aryle en C_6 - C_{10} , hétéroaryle, aralkyle, hétéroarylalkyle, un groupe fluorophore F_2 , dans laquelle lesdits groupes alkyles, aryles ou fluorophore F_2 sont éventuellement substitués par 1 à 3 groupes R^{20} ;

R^{25} est indépendamment choisi parmi OH, NH_2 , $=O$, $C(=O)OR^{21}$;


R^{20} est, à chaque occurrence, indépendamment choisi parmi F, Cl, Br, I, OR^{22} , $NR^{23}R^{24}$, $NHOH$, NO_2 , CN, CF_3 , alkyle en C_1 - C_6 , alcényle en C_2 - C_6 , alcynyle en C_2 - C_6 , aryle en C_6 - C_{10} , aralkyle, $=O$, $C(=O)R^{22}$, CO_2R^{22} , $OC(=O)R^{22}$, $C(=O)NR^{23}R^{24}$, $OC(=O)NR^{23}R^{24}$, $NR^{21}C(=S)R^{22}$ et $S(O)_yR^{22}$;

R^{21} est, à chaque occurrence, indépendamment choisi parmi H ou alkyle en C_1 - C_6 ;

R^{22} est, à chaque occurrence, indépendamment choisi parmi H, alkyle en C_1 - C_6 ,
5 aryle en C_6 - C_{10} et aralkyle ;

R^{23} et R^{24} sont, à chaque occurrence, indépendamment choisis parmi H, alkyle en C_1 - C_6 et aryle en C_6 - C_{10} , ou bien R^{23} et R^{24} forment avec l'atome d'hydrogène auquel ils sont attachés un groupe hétérocyclique de 3 à 7 chaînons ;
10

4. Utilisation selon la revendication 3, d'un composé de formule (A) :



dans laquelle :

15 Z^+ est un groupe organique cationique tel que défini à la revendication 3,

X^- est un anion organique ou inorganique,

Y est un groupe alkylène en C_1 - C_6 ou

20 un groupe $(\text{alkylène en } C_1\text{-}C_4)_m\text{-Q-(alkylène en } C_1\text{-}C_4)_n$;
un groupe arylène en C_6 - C_{10} ;

dans laquelle les groupes alkylène, arylène sont éventuellement substitués par 1 à 3 groupes R^{20} ;

Q est un groupe $-C(=O)-$, $-NR^{21}C(=O)-$, $-C(=O)NR^{21}-$, $-C(=O)O-$, $-OC(=O)-$, $-O-$,
25 $-NR^{21}-$, $-S(O)_y-$, $-CR^{21}=CR^{21}-$, $-C\equiv C-$, arylène en C_6 - C_{10} , hétéroarylène de 5 à 10 chaînons, cycloalkylène en C_3 - C_6 ou hétérocycloalkylène de 3 à 6 chaînons, dans laquelle lesdits groupes arylène, hétéroarylène, cycloalkylène sont éventuellement substitués par 1 à 3 groupes R^{20} ;

30 L^* est un groupe fluorophore,

m est 0 ou 1 ;

n est 0 ou 1 ;

y est 0, 1 ou 2,

Les groupes R^{20} , et R^{21} étant tels que définis à la revendication 3.


5. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 4, pour la discrimination des rayonnements proton/gamma, proton/X, neutron/gamma, neutron/X, alpha/gamma, alpha/X, ions gamma/ions X.

6. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle le groupe organique cationique est un groupe hétérocyclique comportant au moins un atome d'azote.

7. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 6, dans laquelle le groupe organique cationique est un groupe choisi parmi les groupes pyridile, imidazolyle, imidazolidinyle, oxazolyle, oxazolidinyle, thiazolyle, thiazolidinyle, pyrazolyle, triazolyle, tétrazolyle, benzotriazolyle, benzotriazolyle, un groupe guanine, un groupe caprolactame.

8. Utilisation d'un composé selon l'une des revendications 1 à 7, dans laquelle le composé fluorophore F_1 porteur d'un groupement cationique ou anionique est un radical oxazolyle, oxadiazolyle, anthracényle, phénanthrényle.

9. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il répond à la formule (I) :



(I)

dans laquelle :


U, V représentent indépendamment CR^{26} ou N, étant entendu que l'un au moins de U ou V représente N ;

R^{26} est H, C_1-C_6 alkyle, OR^{22} , $NR^{23}R^{24}$, NO_2 , $C(=O)R^{22}$, CO_2R^{22} , $OC(=O)R^{22}$, $C(=O)NR^{23}R^{24}$, $OC(=O)NR^{23}R^{24}$, SO_3H , PO_4H , CN.

R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{3a} , R^{3b} , R^{3c} sont, à chaque occurrence, chacun indépendamment choisis parmi H, les groupes alkyles en C_1-C_{30} , cycloalkyles en C_3-C_7 , aryle en C_6-C_{10} , hétéroaryle, aralkyle, hétéroarylalkyle, dans laquelle lesdits groupes alkyles ou aryles sont éventuellement substitués par 1 à 3 groupes R^{20} ;

Y , Z^+ , X^- , R^{20} , R^{22} , R^{23} , R^{24} étant tels que définis à la revendication 3.

10. Utilisation selon la revendication 9, dans laquelle le composé de formule (A) répond à la formule (Ia) :



(Ia)


11. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, pour la fabrication d'un instrument de radiodétection, de dosimétrie industrielle ou médicale.

12. Composé fluorophore F_1 porteur d'un groupe organique cationique associé à un contre-anion ou bien porteur d'un groupe anionique associé à un contre-cation organique, ledit groupe cationique ou contre-cation comportant au moins un hétéroatome choisi parmi N, S ou P porteur d'une charge positive, dans lequel le groupe fluorophore F_1 n'est pas un groupe anthracényle.

13. Composé selon la revendication 12, dans lequel le groupe fluorophore est choisi parmi un radical oxazolyle, oxadiazolyle ou phénanthrényle.

14. Composé selon la revendication 13, dans lequel le groupe fluorophore F_1 est un radical oxazolyle.


15. Composé de formule (I) selon la revendication 14 :



(I)

dans laquelle Z^+ , X^- , Y , U , V , R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{3a} , R^{3b} , R^{3c} sont tous tels que définis à la revendication 9.

16. Composé de formule (I) selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'il répond à la formule (Ia) :



(Ia)

dans laquelle X^- , Y , U , V , R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{3a} , R^{3b} , R^{3c} sont tels que définis à la revendication 15 et R^{1a} , R^{1b} , R^{1c} sont tels que définis à la revendication 1.

17. Composé de formule (I) selon la revendication 16, dans lequel R^{1a} est un groupe alkyle en C_1 - C_{16} .

18. Composé de formule (I) selon la revendication 17, dans lequel R^{1b} , R^{1c} sont H.

19. Composé selon l'une quelconque des revendications 12 à 18, dans lequel U est CR^{26} .

20. Composé selon la revendication 19, dans lequel U est CH.

21. Composé selon l'une quelconque des revendications 12 à 20, dans lequel Y est un groupe alkylène en C₁-C₆.

22. Composé selon la revendication 21, dans lequel Y est CH₂.

5

23. Composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 12 à 22, dans laquelle X⁻ est un anion choisi parmi un halogénure, P(R⁴)₆⁻, B(R⁴)₄⁻, SCN⁻, (R⁵SO₂)₂N⁻, R⁵OSO₃, R⁵SO₃⁻, carborane, carbonate, hydrogénocarbonate, alcoolate, carboxylate, amidure, phosphate, SiF₆⁻, SbF₆⁻, I₃⁻, nitrate, oxyde d'halogénure, silicate, sulfate, sulfonate, cyanure, carbanions, ou métallate, dans laquelle :

R⁴ est, à chaque occurrence, un groupe indépendamment choisi parmi un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₆, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe aralkyle ;

15 R⁵ est, à chaque occurrence, un groupe indépendamment choisi parmi alkyle en C₁-C₂₀, halogénoalkyle en C₁-C₂₀, aryle en C₆-C₁₀, aralkyle.

24. Composé selon l'une quelconque des revendications 12 à 23, dans laquelle X⁻ est choisi parmi Br⁻, PF₆⁻, BF₄⁻, (CF₃SO₂)₂N⁻, C₁₂H₂₅OSO₃⁻, C₁₆H₃₃OSO₃⁻, CF₃SO₃⁻.

20

25. Composé selon l'une quelconque des revendications 12 à 24, choisi parmi :

- bromure de 1-méthyle-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- bromure de 1-hexyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- bromure de 1-octyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- 25 - bromure de 1-décyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- bromure de 1-dodécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- bromure de 3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-1-tétradécyl-3H-imidazol-1-ium
- bromure de 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- hexafluorophosphate de 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-
- 30 imidazol-1-ium
- 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium
- bis(trifluorométhylsulfonyl)imide

- 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium dodécyl sulfate
- 1-hexadécyl-3-[4-(5-phényl-oxazol-2-yl)-benzyl]-3H-imidazol-1-ium hexadécyl sulfate.


5

26. Matériau comprenant un composé selon l'une quelconque des revendications 12 à 25.

10

27. Matériau selon la revendication 26, caractérisé en ce qu'il s'agit d'un matériau plastique transparent.

28. Procédé de préparation d'un composé de formule (Ia) comprenant la réaction d'un composé de formule (II) avec un composé de formule (III) :




15



dans lesquelles R^{1a} , R^{1b} , R^{1c} , R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{3a} , R^{3b} , R^{3c} , U, Y sont tels que définis dans la revendication 16 et GP représente un groupe partant.

20



1/5


**FIG.1**

2/5

FIG.2FIG.3

3/5

FIG.4FIG.5






FIG.7

FIG.8