

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. Dezember 2010 (29.12.2010)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2010/149309 A2

(51) Internationale Patentklassifikation:
C07D 263/56 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2010/003647

(22) Internationales Anmeldedatum:
17. Juni 2010 (17.06.2010)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
09163551.6 24. Juni 2009 (24.06.2009) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **BAYER CROPSCIENCE AG** [DE/DE]; Al-
fred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **RAHN, Nicola**
[DE/DE]; Stresemannstr. 17, 40210 Düsseldorf (DE).
DUNKEL, Ralf [DE/DE]; Am Kraehwinklerbach 9,
42799 Leichlingen (DE). **KUNZ, Klaus** [DE/DE]; Hoch-
dahler Str. 3, 40625 Düsseldorf (DE). **PERIS, Gorka**
[ES/DE]; Sechzigstr. 10, 50733 Köln (DE). **BENTING,**
Jürgen [DE/DE]; Amselstr. 7, 42799 Leichlingen (DE).
DAHMEN, Peter [DE/DE]; Altebrücker Str. 61, 41470
Neuss (DE). **WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike**
[DE/DE]; Oberer Markeweg 85, 56566 Neuwied (DE).
BECKER, Angela [DE/DE]; Stratenweg 45, 40629 Düs-
seldorf (DE). **VOERSTE, Arnd** [DE/DE]; Mozartstr.
3-5, 50674 Köln (DE). **GÖRGENS, Ulrich** [DE/DE];
Fester Str. 37, 40882 Ratingen (DE). **HADANO, Hiroyu-**
ki [JP/JP]; 3-2-18 Gion, Shimotsuke-shi, Tochigi
329-0434 (JP).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **BAYER CROPSCIENCE**
AG; Business Planning and Administration, Law and Pa-
tents, Patents and Licensing, Building 6100, Alfred-No-
bel-Str. 50, 40789 Monheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,
KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,
NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts (Regel 48 Absatz
2 Buchstabe g)

(54) Title: CYCLOALKYLAMIDOBENZOX(A)THIA)ZOLES

(54) Bezeichnung : CYCLOALKYLAMIDBENZOX(A)THIA)ZOLE

(57) Abstract: The present invention relates to new cycloalkylamidobenzoxa(thia)zoles, methods for preparing the compounds, agents containing these compounds, and the use thereof as biologically active compounds, in particular for fighting harmful mi-
croorganisms in plant and material protection.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft neue Cycloalkylamidbenzoxa(thia)zole, Verfahren zum Herstellen
dieser Verbindungen, Mittel enthaltend diese Verbindungen, sowie deren Verwendung als biologisch aktive Verbindungen, insbe-
sondere zur Bekämpfung von schädlichen Mikroorganismen im Pflanzenschutz und im Materialschutz.



WO 2010/149309 A2


Cycloalkylamidbenzoxa(thia)zole

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Cycloalkylamidbenzoxa(thia)zole, Verfahren zum Herstellen dieser Verbindungen, Mittel enthaltend diese Verbindungen, sowie deren Verwendung als biologisch aktive Verbindungen, insbesondere zur Bekämpfung von schädlichen Mikroorganismen im Pflanzenschutz und im Materialschutz.

Es ist bereits bekannt, dass bestimmte Benzoxazole oder Benzthiazole im Pflanzenschutz als Fungizide eingesetzt werden können (vgl. JP 2005-145840 und WO 1997/08170). Außerdem sind bestimmte Benzoxazole als 5-HT₃-Inhibitoren bekannt (vgl. WO 2008/019363).

Da sich die ökologischen und ökonomischen Anforderungen an moderne Wirkstoffe, z.B. Fungizide, laufend erhöhen, beispielsweise bezüglich Wirkspektrum, Toxizität, Selektivität, Aufwandmenge, Rückstandsbildung und günstige Herstellbarkeit, und außerdem z.B. Probleme mit Resistenzen auftreten können, besteht die ständige Notwendigkeit, neue fungizide Mittel zu entwickeln, die zumindest in Teilbereichen Vorteile gegenüber den bekannten aufweisen.

Es wurden nun neue Cycloalkylamidbenzoxa(thia)zole der Formel (I)



gefunden, in welcher

X¹ für Sauerstoff oder Schwefel steht,

X² für Sauerstoff oder Schwefel steht,

R¹ für Wasserstoff, Halogen, C₁-C₄-Alkyl, Hydroxy, Sulfanyl (SH), C₁-C₈-Alkoxy, (C₁-C₈-Alkoxy)carbonyl, Amino, C₁-C₈-Alkylamino, Di-(C₁-C₈-Alkyl)amino, C₁-C₈-Alkylthio, C₁-C₈-Alkylsulfinyl oder C₁-C₈-Alkylsulfonyl steht,

R² für Halogen, Hydroxy, Cyano, Nitro, C₁-C₈-Alkyl, C₁-C₈-Alkoxy, C₁-C₈-Alkylthio, C₁-C₈-Alkylsulfinyl, C₁-C₈-Alkylsulfonyl, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, (C₁-C₄-Alkyl)thio(C₁-C₄-alkyl), (C₁-C₄-Alkyl)sulfinyl(C₁-C₄-alkyl), (C₁-C₄-Alkyl)sulfonyl(C₁-C₄-alkyl), Formyl, C₁-C₈-Alkylcarbonyl, C₁-C₈-Alkylamino, Di-(C₁-C₈-alkyl)amino, C₁-C₈-Halogenalkyl, C₁-C₈-Halogenalkoxy, C₁-C₈-Halogenalkylthio, C₁-C₈-Halogenalkylsulfinyl, C₁-C₈-Halogenalkyl-

5 sulfonyl, Halogen-C₁-C₄-alkoxy-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylthio-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfinyl-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfonyl-C₁-C₄-alkyl, Phenyl (welches wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Alkylthio, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₁-C₆-Halogenalkylthio substituiert sein kann), Heteroaryl, Heterocyclyl steht,

m für 0, 1 oder 2 steht, wobei zwei benachbarte Reste R² für C₄-Alkenylen stehen, wenn m für 2 steht,

10 R³ für C₃-C₁₂-Cycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Amino, C₁-C₈-Alkyl-amino, Di-(C₁-C₈-alkyl)-amino, C₁-C₁₂-Alkyl, C₁-C₈-Alkoxy, C₁-C₈-Alkylthio, C₁-C₈-Alkylsulfinyl, C₁-C₈-Alkylsulfonyl, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, (C₁-C₄-Alkyl)thio(C₁-C₄-alkyl), (C₁-C₄-Alkyl)sulfinyl(C₁-C₄-alkyl), (C₁-C₄-Alkyl)sulfonyl(C₁-C₄-alkyl), C₁-C₁₂-Halogenalkyl, C₁-C₈-Halogenalkylthio, C₁-C₈-Halogenalkylsulfinyl, C₁-C₈-Halogenalkylsulfonyl, Halogen-C₁-C₄-alkoxy-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylthio-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfinyl-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfonyl-C₁-C₄-alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl oder C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl (welche jeweils im Cycloalkylteil wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Hydroxy, C₁-C₄-Alkyl substituiert sein können), Phenyl, Benzyl, Phenoxy oder Benzyloxy (welche im Phenylring jeweils wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Alkylthio, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₁-C₆-Halogenalkylthio substituiert sein können), substituiert sein kann, und wobei der Cycloalkylring gegebenenfalls durch O, S oder C=O unterbrochen sein kann,

25 oder für durch einen Phenylring oder Heteroarylring anelliertes C₃-C₁₂-Cycloalkyl steht, wobei das Cycloalkyl oben genannte Substituenten tragen kann und wobei der anellierte Phenylring gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, C₁-C₈-Alkyl-amino, Di-(C₁-C₈-alkyl)-amino, (C₁-C₄-Alkyl)carbonylamino, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Alkylthio, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₁-C₆-Halogenalkylthio substituiert sein kann,

30 oder für Bicycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Hydroxy, Halogen, C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Alkoxy substituiert sein kann, und wobei der Bicycloalkylring gegebenenfalls durch O oder S unterbrochen sein kann,

oder für Tricycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Hydroxy, Halogen, C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Alkoxy substituiert sein kann,

und wobei der Tricycloalkylring gegebenenfalls durch O, S oder NR^4 unterbrochen sein kann,

R^4 für Wasserstoff, C_1 - C_4 -Alkyl, (C_1 - C_4 -Alkoxy)carbonyl oder für (C_1 - C_4 -Alkyl)carbonyl steht, sowie deren agrochemisch wirksamen Salze.

- 5 Je nach Art der oben definierten Substituenten weisen die Verbindungen der Formel (I) saure oder basische Eigenschaften auf und können mit anorganischen oder organischen Säuren oder mit anorganischen oder organischen Basen oder mit Metallionen Salze, gegebenenfalls auch innere Salze oder Addukte bilden. Als Metallionen kommen insbesondere die Ionen der Elemente der zweiten Hauptgruppe, insbesondere Calcium und Magnesium, der dritten und vierten Hauptgruppe, insbesondere
- 10 Aluminium, Zinn und Blei, sowie der ersten bis achten Nebengruppe, insbesondere Chrom, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink und andere in Betracht. Besonders bevorzugt sind die Metallionen der Elemente der vierten Periode. Die Metalle können dabei in den verschiedenen ihnen zukommenden Wertigkeiten vorliegen.

- Tragen die Verbindungen der Formel (I) Hydroxy, Carboxy oder andere, saure Eigenschaften induzierende Gruppen, so können diese Verbindungen mit Basen zu Salzen umgesetzt werden. Geeignete Basen sind beispielsweise Hydroxide, Carbonate, Hydrogencarbonate der Alkali- und Erdalkalimetalle, insbesondere die von Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium, weiterhin Ammoniak, primäre, sekundäre und tertiäre Amine mit C_1 - C_4 -Alkylresten, Mono-, Di- und Trialkanolamine von C_1 - C_4 -Alkanolen, Cholin sowie Chlorcholin.
- 15

- 20 Tragen die Verbindungen der Formel (I) Amino, Alkylamino oder andere, basische Eigenschaften induzierende Gruppen, so können diese Verbindungen mit Säuren zu Salzen umgesetzt werden. Beispiele für anorganische Säuren sind Halogenwasserstoffsäuren wie Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Bromwasserstoff und Iodwasserstoff, Schwefelsäure, Phosphorsäure und Salpetersäure und saure Salze wie NaHSO_4 und KHSO_4 . Als organische Säuren kommen beispielsweise Ameisensäure, Kohlensäure und Alkansäuren wie Essigsäure, Trifluoressigsäure, Trichloressigsäure und Propionsäure sowie Glycolsäure, Thiocyansäure, Milchsäure, Bernsteinsäure, Zitronensäure, Benzoesäure, Zimtsäure, Oxalsäure, Alkylsulfonsäuren (Sulfonsäuren mit geradkettigen oder verzweigten Alkylresten mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen), Arylsulfonsäuren oder -disulfonsäuren (aromatische Reste wie Phenyl und Naphthyl welche ein oder zwei Sulfonsäuregruppen tragen), Alkylphosphonsäuren (Phosphonsäuren mit geradkettigen oder verzweigten Alkylresten mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen), Arylphosphonsäuren oder -diphosphonsäuren (aromatische Reste wie Phenyl und Naphthyl welche ein oder zwei Phosphonsäurereste tragen), wobei die Alkyl- bzw. Arylreste weitere Substituenten tra-
- 25
- 30

gen können, z.B. p-Toluolsulfonsäure, Salicylsäure, p-Aminosalicylsäure, 2-Phenoxybenzoesäure, 2-Acetoxybenzoesäure etc.

Die so erhältlichen Salze weisen ebenfalls fungizide Eigenschaften auf.

Die erfindungsgemäß verwendbaren Cycloalkylamidbenzoxa(thia)zole sind durch die Formel (I) allgemein definiert. Bevorzugte Restdefinitionen der vorstehenden und nachfolgend genannten Formeln sind im Folgenden angegeben. Diese Definitionen gelten für die Endprodukte der Formel (I) wie für alle Zwischenprodukte (siehe auch unten unter „Erläuterungen der Verfahren und Zwischenprodukte“) gleichermaßen.

- X¹ steht bevorzugt für Sauerstoff.
- 10 X¹ steht außerdem bevorzugt für Schwefel.
- X¹ steht besonders bevorzugt für Sauerstoff.
- X² steht bevorzugt für Sauerstoff.
- X² steht außerdem bevorzugt für Schwefel.
- X² steht besonders bevorzugt für Sauerstoff.
- 15 R¹ steht bevorzugt für Wasserstoff, Halogen, oder C₁-C₄-Alkyl, Sulfanyl, Amino oder C₁-C₄-Alkylthio.
- R¹ steht besonders bevorzugt für Wasserstoff, Chlor, Methyl, Hydroxy, Sulfanyl, Methylthio, Ethylthio oder Butylthio.
- R¹ steht ganz besonders bevorzugt für Wasserstoff oder Sulfanyl.
- 20 R¹ steht insbesondere bevorzugt für Wasserstoff.
- R² steht bevorzugt für Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-, i-, s- oder t- Butyl, Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, i-Propoxy, n-, i-, s- oder t-Butoxy, Methylthio, Ethylthio, n-Propylthio, i-Propylthio, n-, i-, s- oder t-Butylthio, Dimethylamino, Trifluormethyl, Trichlormethoxy, Trifluormethoxy oder Heteroaryl (welches bevorzugt ausgewählt ist aus 1-Imidazolyl, 3-Thiazolyl, 3-Oxazolyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl).
- 25 R² steht besonders bevorzugt für Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Nitro, Methyl, Trifluormethyl, Methoxy oder Trifluormethoxy.

- m steht bevorzugt für 0, 1 oder 2, wobei zwei benachbarte Reste R² für -CH=CH-CH=CH- stehen, wenn m für 2 steht.
- m steht besonders bevorzugt für 0.
- m steht außerdem besonders bevorzugt für 1.
- 5 R³ steht bevorzugt für Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl, Cyclooctyl, Cyclo-
dodecyl, welche jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden
durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Amino, Methylamino, Ethylamino, i-Propylamino, n-
Propylamino, Dimethylamino, Diethylamino, Di-(i-propyl)amino, Di-(n-propyl)amino, Me-
thyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-, i-, s- oder t- Butyl, Octyl, Methoxy, Ethoxy, Methylthio,
10 Methylsulfinyl, Methylsulfonyl, Methoxymethyl, Ethoxymethyl, Methoxyethyl, Ethoxyethyl,
Methylthiomethyl, Ethylthiomethyl, Methylthioethyl, Ethylthioethyl, Trifluormethyl, Trich-
lormethyl, Trifluorethyl, Phenyl, Benzyl, Phenoxy oder Benzyloxy (welche im Phenylring
jeweils wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Flu-
or, Chlor, Brom, Nitro, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-, i-, s- oder t- Butyl substituiert
15 sein können), substituiert sein kann, und wobei der Cycloalkylring gegebenenfalls durch O, S
oder C=O unterbrochen sein kann,
- oder für jeweils durch einen Phenylring oder Thiophenring anelliertes Cyclohexyl oder Cyc-
loheptyl, wobei das Cycloalkyl oben genannte Substituenten tragen kann und wobei der anel-
lierte Phenylring gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Fluor,
20 Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-, i-, s- oder t- Butyl oder Methylcarbonyl-
lamino substituiert sein kann,
- oder für Bicycloheptyl, Bicyclooctyl, oder Tricyclodecyl steht, welche jeweils gegebenenfalls
einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Hydroxy oder Methyl substituiert sein
können, und wobei der Tricycloalkylring gegebenenfalls durch N-Methyl unterbrochen sein
25 kann.
- R³ steht besonders bevorzugt für 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl, 4-*tert*-
Butylcyclohexyl, 4-n-Butylcyclohexyl, 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexyl, 4-n-Ethylcyclohexyl
- R⁴ steht bevorzugt für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, i-Propyl, n-Propyl, n-, i-, s- oder t- Butyl,
Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl oder Methylcarbonyl.
- 30 R⁴ steht besonders bevorzugt für Wasserstoff, Methyl, Methoxycarbonyl oder Methylcarbonyl.

Die oben aufgeführten allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restedefinitionen bzw. Erläuterungen können jedoch auch untereinander, also zwischen den jeweiligen Bereichen und Vorzugsbereichen beliebig kombiniert werden. Sie gelten für die Endprodukte sowie für die Vor- und Zwischenprodukte entsprechend. Außerdem können einzelne Definitionen entfallen.

- 5 Bevorzugt sind solche Verbindungen der Formel (I), in welcher alle Reste jeweils die oben genannten bevorzugten Bedeutungen haben.

Besonders bevorzugt sind solche Verbindungen der Formel (I), in welcher alle Reste jeweils die oben genannten besonders bevorzugten Bedeutungen haben.

Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher X^1 für Sauerstoff steht.

- 10 Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher X^2 für Sauerstoff steht.

Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher X^1 und X^2 jeweils für Sauerstoff stehen.

Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher R^1 für Wasserstoff steht.

- 15 Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher X^1 und X^2 jeweils für Sauerstoff und R^1 für Wasserstoff stehen.

Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher R^2 für Wasserstoff steht.

Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher X^1 und X^2 jeweils für Sauerstoff sowie R^1 und R^2 für Wasserstoff stehen.

Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher

- 20 R^3 für C_3 - C_{12} -Cycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Amino, C_1 - C_8 -Alkyl-amino, Di- $(C_1$ - C_8 -alkyl)-amino, C_1 - C_{12} -Alkyl, C_1 - C_8 -Alkoxy, C_1 - C_8 -Alkylthio, C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Alkylsulfonyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, $(C_1$ - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), $(C_1$ - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), $(C_1$ - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), C_1 - C_{12} -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl oder C_3 - C_6 -Cycloalkyl- C_1 - C_4 -alkyl (welche jeweils im Cycloalkylteil wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Hydroxy, C_1 - C_4 -Alkyl substituiert sein können), Phenyl, Benzyl,
- 25

Phenoxy oder Benzyloxy (welche im Phenylring jeweils wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Alkylthio, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₁-C₆-Halogenalkylthio substituiert sein können), substituiert sein kann, und wobei der Cycloalkylring gegebenenfalls durch O, S oder C=O unterbrochen sein kann,

oder für Bicycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Hydroxy, Halogen, C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Alkoxy substituiert sein kann, und wobei der Bicycloalkylring gegebenenfalls durch O oder S unterbrochen sein kann,

oder für Tricycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Hydroxy, Halogen, C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Alkoxy substituiert sein können, und wobei der Tricycloalkylring gegebenenfalls durch O, S oder NR⁴ unterbrochen sein kann.

Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher

R³ für C₅-C₇-Cycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, C₁-C₈-Alkyl-amino, Di-(C₁-C₈-alkyl)-amino, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy, C₁-C₄-Alkylthio, C₁-C₄-Halogenalkyl, Halogen-C₁-C₄-alkoxy-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylthio-C₁-C₄-alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl oder C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl (welche jeweils im Cycloalkylteil wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Hydroxy, C₁-C₄-Alkyl substituiert sein können), Phenyl, Benzyl, Phenoxy oder Benzyloxy (welche im Phenylring jeweils wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Alkylthio, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₁-C₆-Halogenalkylthio substituiert sein können), substituiert sein kann,

oder für Bicycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Hydroxy oder C₁-C₄-Alkyl substituiert sein kann, und wobei der Bicycloalkylring gegebenenfalls durch O oder S unterbrochen sein kann,

oder für Tricycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Hydroxy oder C₁-C₄-Alkyl substituiert sein kann, und wobei der Tricycloalkylring gegebenenfalls durch O, S oder NR⁴ unterbrochen sein kann.

Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher

- R^3 für C₆-Cycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, C₁-C₈-Alkyl-amino, Di-(C₁-C₈-alkyl)-amino, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy
- 5 oder für Bicycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Hydroxy oder C₁-C₄-Alkyl substituiert sein kann, und wobei der Bicycloalkyrling gegebenenfalls durch O oder S unterbrochen sein kann,
- oder für Tricycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Hydroxy oder C₁-C₄-Alkyl substituiert sein kann, und wobei der Tricycloalkyrling gegebenenfalls durch O, S oder NR⁴ unterbrochen sein kann.
- 10 Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher
- R^3 für C₆-Cycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Methyl, Ethyl, *i*-Propyl, *n*-Propyl, *t*-Butyl, *n*-Butyl
- oder für Bicycloalkyl steht, welche jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Methyl, Ethyl, *i*-Propyl, *n*-Propyl, *t*-Butyl, *n*-Butyl substituiert sein kann
- 15 oder für Tricycloalkyl steht, welche jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Methyl, Ethyl, *i*-Propyl, *n*-Propyl, *t*-Butyl, *n*-Butyl substituiert sein kann.
- Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher
- R^3 für 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl, 4-*tert*-Butylcyclohexyl, 4-*n*-Butylcyclohexyl, 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexyl, 4-*n*-Ethylcyclohexyl.
- 20

Bei den in den vorstehenden Formeln angegebenen Definitionen der Symbole wurden Sammelbegriffe verwendet, die allgemein repräsentativ für die folgenden Substituenten stehen:

Halogen: Fluor, Chlor, Brom und Iod;

Alkyl: gesättigte, geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, z.B. C₁-C₆-Alkyl wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl, 1,1-Dimethylethyl, Pentyl, 1-Methylbutyl, 2-Methylbutyl, 3-Methylbutyl, 2,2-Dimethylpropyl, 1-Ethylpropyl, Hexyl, 1,1-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethylpropyl, 1-Methylpentyl, 2-Methylpentyl, 3-Methylpentyl, 4-Methylpentyl, 1,1-Dimethylbutyl, 1,2-Dimethylbutyl, 1,3-Dimethylbutyl, 2,2-

25

Dimethylbutyl, 2,3-Dimethylbutyl, 3,3-Dimethylbutyl, 1-Ethylbutyl, 2-Ethylbutyl, 1,1,2-Trimethylpropyl, 1,2,2-Trimethylpropyl, 1-Ethyl-1-methylpropyl und 1-Ethyl-2-methylpropyl; Heptyl, Octyl.

- Halogenalkyl:** geradkettige oder verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen (wie vorstehend genannt), wobei in diesen Gruppen teilweise oder vollständig die Wasserstoffatome durch Halogenatome wie vorstehend genannt ersetzt sein können, z.B. C₁-C₃-Halogenalkyl wie Chlormethyl, Brommethyl, Dichlormethyl, Trichlormethyl, Fluormethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Chlorfluormethyl, Dichlorfluormethyl, Chlordifluormethyl, 1-Chlorethyl, 1-Bromethyl, 1-Fluorethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2-Chlor-2-fluorethyl, 2-Chlor-2-difluorethyl, 2,2-Dichlor-2-fluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, Pentafluorethyl und 1,1,1-Trifluorprop-2-yl.
- 10 **Alkenyl:** ungesättigte, geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffreste mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen und einer Doppelbindung in einer beliebigen Position, z.B. C₂-C₆-Alkenyl wie Ethenyl, 1-Propenyl, 2-Propenyl, 1-Methylethenyl, 1-Butenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-1-propenyl, 2-Methyl-1-propenyl, 1-Methyl-2-propenyl, 2-Methyl-2-propenyl, 1-Pentenyl, 2-Pentenyl, 3-Pentenyl, 4-Pentenyl, 1-Methyl-1-butenyl, 2-Methyl-1-butenyl, 3-Methyl-1-butenyl, 1-Methyl-2-butenyl, 2-Methyl-2-butenyl, 3-Methyl-2-butenyl, 1-Methyl-3-butenyl, 2-Methyl-3-butenyl, 3-Methyl-3-butenyl, 1,1-Dimethyl-2-propenyl, 1,2-Dimethyl-1-propenyl, 1,2-Dimethyl-2-propenyl, 1-Ethyl-1-propenyl, 1-Ethyl-2-propenyl, 1-Hexenyl, 2-Hexenyl, 3-Hexenyl, 4-Hexenyl, 5-Hexenyl, 1-Methyl-1-pentenyl, 2-Methyl-1-pentenyl, 3-Methyl-1-pentenyl, 4-Methyl-1-pentenyl, 1-Methyl-2-pentenyl, 2-Methyl-2-pentenyl, 3-Methyl-2-pentenyl, 4-Methyl-2-pentenyl, 1-Methyl-3-pentenyl, 2-Methyl-3-pentenyl, 3-Methyl-3-pentenyl, 4-Methyl-3-pentenyl, 1-Methyl-4-pentenyl, 2-Methyl-4-pentenyl, 3-Methyl-4-pentenyl, 4-Methyl-4-pentenyl, 1,1-Dimethyl-2-butenyl, 1,1-Dimethyl-3-butenyl, 1,2-Dimethyl-1-butenyl, 1,2-Dimethyl-2-butenyl, 1,2-Dimethyl-3-butenyl, 1,3-Dimethyl-1-butenyl, 1,3-Dimethyl-2-butenyl, 1,3-Dimethyl-3-butenyl, 2,2-Dimethyl-3-butenyl, 2,3-Dimethyl-1-butenyl, 2,3-Dimethyl-2-butenyl, 2,3-Dimethyl-3-butenyl, 3,3-Dimethyl-1-butenyl, 3,3-Dimethyl-2-butenyl, 1-Ethyl-1-butenyl, 1-Ethyl-2-butenyl, 1-Ethyl-3-butenyl, 2-Ethyl-1-butenyl, 2-Ethyl-2-butenyl, 2-Ethyl-3-butenyl, 1,1,2-Trimethyl-2-propenyl, 1-Ethyl-1-methyl-2-propenyl, 1-Ethyl-2-methyl-1-propenyl und 1-Ethyl-2-methyl-2-propenyl.
- 25

- Alkynyl:** geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffgruppen mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen und einer Dreifachbindung in einer beliebigen Position, z.B. C₂-C₆-Alkynyl wie Ethinyl, 1-Propinyl, 2-Propinyl, 1-Butinyl, 2-Butinyl, 3-Butinyl, 1-Methyl-2-propinyl, 1-Pentinyl, 2-Pentinyl, 3-Pentinyl, 4-Pentinyl, 1-Methyl-2-butinyl, 1-Methyl-3-butinyl, 2-Methyl-3-butinyl, 3-Methyl-1-butinyl, 1,1-Dimethyl-2-propinyl, 1-Ethyl-2-propinyl, 1-Hexinyl, 2-Hexinyl, 3-Hexinyl, 4-Hexinyl, 5-Hexinyl, 1-Methyl-2-pentinyl, 1-Methyl-3-pentinyl, 1-Methyl-4-pentinyl, 2-Methyl-3-pentinyl, 2-Methyl-4-pentinyl, 3-Methyl-1-pentinyl, 3-Methyl-4-pentinyl, 4-Methyl-1-pentinyl, 4-Methyl-2-pentinyl, 1,1-Dimethyl-2-butinyl, 1,1-Dimethyl-3-butinyl, 1,2-Dimethyl-3-butinyl, 2,2-Dimethyl-3-butinyl, 3,3-Di-
- 30

methyl-1-butinyl, 1-Ethyl-2-butinyl, 1-Ethyl-3-butinyl, 2-Ethyl-3-butinyl und 1-Ethyl-1-methyl-2-propinyl.

Alkoxycarbonyl: eine Alkoxygruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen (wie vorstehend genannt), welche über eine Carbonylgruppe (-CO-) an das Gerüst gebunden ist.

- 5 **Heterocyclyl/Hetaryl:** unsubstituierter oder substituierter, ungesättigter oder ganz oder teilweise gesättigter heterocyclischer 5- bis 7-gliedriger Ring, oder ungesättigter oder ganz oder teilweise gesättigter heterocyclischer 3- bis 8-gliedriger Ring, enthaltend bis zu 4 Stickstoffatome oder alternativ 1 Stickstoffatom und bis zu 2 weitere Heteroatome, ausgewählt aus N, O und S: z.B. Oxiranyl, Aziridinyl, 2-Tetrahydrofuranyl, 3-Tetrahydrofuranyl, 2-Tetrahydrothienyl, 3-Tetrahydrothienyl, 2-Pyrrolidinyl, 3-Pyrrolidinyl, 3-Isloxazolidinyl, 4-Isloxazolidinyl, 5-Isloxazolidinyl, 3-Isythiazolidinyl, 4-Isythiazolidinyl, 5-Isythiazolidinyl, 3-Pyrazolidinyl, 4-Pyrazolidinyl, 5-Pyrazolidinyl, 2-Oxazolidinyl, 4-Oxazolidinyl, 5-Oxazolidinyl, 2-Thiazolidinyl, 4-Thiazolidinyl, 5-Thiazolidinyl, 2-Imidazolidinyl, 4-Imidazolidinyl, 1,2,4-Oxadiazolidin-3-yl, 1,2,4-Oxadiazolidin-5-yl, 1,2,4-Thiadiazolidin-3-yl, 1,2,4-Thiadiazolidin-5-yl, 1,2,4-Triazolidin-3-yl, 1,3,4-Oxadiazolidin-2-yl, 1,3,4-Thiadiazolidin-2-yl, 1,3,4-Triazolidin-2-yl, 2,3-Dihydrofur-2-yl, 2,3-Dihydrofur-3-yl, 2,4-Dihydrofur-2-yl, 2,3-Dihydrothien-2-yl, 2,3-Dihydrothien-3-yl, 2,4-Dihydrothien-2-yl, 2-Pyrrolin-2-yl, 2-Pyrrolin-3-yl, 3-Pyrrolin-2-yl, 3-Pyrrolin-3-yl, 2-Isloxazolin-3-yl, 3-Isloxazolin-3-yl, 4-Isloxazolin-3-yl, 2-Isloxazolin-4-yl, 3-Isloxazolin-4-yl, 4-Isloxazolin-4-yl, 2-Isloxazolin-5-yl, 3-Isloxazolin-5-yl, 4-Isloxazolin-5-yl, 2-Isythiazolin-3-yl, 3-Isythiazolin-3-yl, 4-Isythiazolin-3-yl, 2-Isythiazolin-4-yl, 3-Isythiazolin-4-yl, 4-Isythiazolin-4-yl, 2-Isythiazolin-5-yl, 3-Isythiazolin-5-yl, 4-Isythiazolin-5-yl, 2,3-Dihydropyrazol-1-yl, 2,3-Dihydropyrazol-2-yl, 2,3-Dihydropyrazol-3-yl, 2,3-Dihydropyrazol-4-yl, 2,3-Dihydropyrazol-5-yl, 3,4-Dihydropyrazol-1-yl, 3,4-Dihydropyrazol-3-yl, 3,4-Dihydropyrazol-4-yl, 3,4-Dihydropyrazol-5-yl, 4,5-Dihydropyrazol-1-yl, 4,5-Dihydropyrazol-3-yl, 4,5-Dihydropyrazol-4-yl, 4,5-Dihydropyrazol-5-yl, 2,3-Dihydrooxazol-2-yl, 2,3-Dihydrooxazol-3-yl, 2,3-Dihydrooxazol-4-yl, 2,3-Dihydrooxazol-5-yl, 3,4-Dihydrooxazol-2-yl, 3,4-Dihydrooxazol-3-yl, 3,4-Dihydrooxazol-4-yl, 3,4-Dihydrooxazol-5-yl, 3,4-Dihydrooxazol-2-yl, 3,4-Dihydrooxazol-3-yl, 3,4-Dihydrooxazol-4-yl, 2-Piperidinyl, 3-Piperidinyl, 4-Piperidinyl, 1,3-Dioxan-5-yl, 2-Tetrahydropyranyl, 4-Tetrahydropyranyl, 2-Tetrahydrothienyl, 3-Hexahydropyridazinyl, 4-Hexahydropyridazinyl, 2-Hexahydropyrimidinyl, 4-Hexahydropyrimidinyl, 5-Hexahydropyrimidinyl, 2-Piperazinyl, 1,3,5-Hexahydro-triazin-2-yl und 1,2,4-Hexahydrotriazin-3-yl, 2-Furyl, 3-Furyl, 2-Thienyl, 3-Thienyl, 2-Pyrrolyl, 3-Pyrrolyl, 3-Isloxazolyl, 4-Isloxazolyl, 5-Isloxazolyl, 3-Isythiazolyl, 4-Isythiazolyl, 5-Isythiazolyl, 3-Pyrazolyl, 4-Pyrazolyl, 5-Pyrazolyl, 2-Oxazolyl, 4-Oxazolyl, 5-Oxazolyl, 2-Thiazolyl, 4-Thiazolyl, 5-Thiazolyl, 2-Imidazolyl, 4-Imidazolyl, 1,2,4-Oxadiazol-3-yl, 1,2,4-Oxadiazol-5-yl, 1,2,4-Thiadiazol-3-yl, 1,2,4-Thiadiazol-5-yl, 1,2,4-Triazol-3-yl, 1,3,4-Oxadiazol-2-yl, 1,3,4-Thiadiazol-2-yl und 1,3,4-Triazol-2-yl, 1-Pyrrolyl, 1-Pyrazolyl, 1,2,4-Triazol-1-yl, 1-Imidazolyl, 1,2,3-Triazol-1-yl, 1,3,4-

Triazol-1-yl, 3-Pyridazinyl, 4-Pyridazinyl, 2-Pyrimidinyl, 4-Pyrimidinyl, 5-Pyrimidinyl, 2-Pyrazinyl, 1,3,5-Triazin-2-yl und 1,2,4-Triazin-3-yl.

Alkoxy: gesättigte, geradkettige oder verzweigte Alkoxyreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, wie beispielsweise (aber nicht beschränkt auf) C₁-C₄-Alkoxy wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy, 1-Methylethoxy, Butoxy, 1-Methyl-propoxy, 2-Methylpropoxy, 1,1-Dimethylethoxy

Haloalkoxy: geradkettige oder verzweigte Alkoxygruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen (wie vorstehend genannt), wobei in diesen Gruppen teilweise oder vollständig die Wasserstoffatome durch Halogenatome wie vorstehend genannt ersetzt sein können, wie beispielsweise (aber nicht beschränkt auf) C₁-C₂-Halogenalkoxy wie Chlormethoxy, Brommethoxy, Dichlormethoxy, Trichlormethoxy, Fluormethoxy, Difluormethoxy, Trifluormethoxy, Chlorfluormethoxy, Dichlorfluormethoxy, Chlordifluormethoxy, 1-Chlorethoxy, 1-Bromethoxy, 1-Fluorethoxy, 2-Fluorethoxy, 2,2-Difluorethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, 2-Chlor-2-fluorethoxy, 2-Chlor, 2-difluorethoxy, 2,2-Dichlor-2-fluorethoxy, 2,2,2-Trichlorethoxy, Pentafluor-ethoxy und 1,1,1-Trifluorprop-2-oxy;


Thioalkyl: gesättigte, geradkettige oder verzweigte Alkylthioester mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, wie beispielsweise (aber nicht beschränkt auf) C₁-C₆-Alkylthio wie Methylthio, Ethylthio, Propylthio, 1-Methylethylthio, Butylthio, 1-Methyl-propylthio, 2-Methylpropylthio, 1,1-Dimethylethylthio, Pentylthio, 1-Methylbutylthio, 2-Methylbutylthio, 3-Methylbutylthio, 2,2-Di-methylpropylthio, 1-Ethylpropylthio, Hexylthio, 1,1-Dimethylpropylthio, 1,2-Dimethylpropylthio, 1-Methylpentylthio, 2-Methylpentylthio, 3-Methyl-pentylthio, 4-Methylpentylthio, 1,1-Dimethylbutylthio, 1,2-Dimethylbutylthio, 1,3-Dimethyl-butylthio, 2,2-Dimethylbutylthio, 2,3-Dimethylbutylthio, 3,3-Dimethylbutylthio, 1-Ethylbutylthio, 2-Ethylbutylthio, 1,1,2-Trimethylpropylthio, 1,2,2-Trimethylpropylthio, 1-Ethyl-1-methylpropyl-thio und 1-Ethyl-2-methylpropylthio;

Thiohaloalkyl: geradkettige oder verzweigte Alkylthiogruppen mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen (wie vorstehend genannt), wobei in diesen Gruppen teilweise oder vollständig die Wasserstoffatome durch Halogenatome wie vorstehend genannt ersetzt sein können, wie beispielsweise (aber nicht beschränkt auf) C₁-C₂-Halogenalkylthio wie Chlormethylthio, Brommethylthio, Dichlormethylthio, Trichlormethylthio, Fluormethylthio, Difluormethylthio, Trifluormethylthio, Chlorfluormethylthio, Dichlorfluor-methylthio, Chlordifluormethylthio, 1-Chlorethylthio, 1-Bromethylthio, 1-Fluorethylthio, 2-Fluorethylthio, 2,2-Difluorethylthio, 2,2,2-Trifluorethylthio, 2-Chlor-2-fluorethylthio, 2-Chlor, 2-difluorethylthio, 2,2-Dichlor-2-fluorethylthio, 2,2,2-Trichlorethylthio, Pentafluorethylthio und 1,1,1-Trifluorprop-2-ylthio


Cycloalkyl: mono-, bi- oder tricyclische, gesättigte Kohlenwasserstoffgruppen mit 3 bis 12 Kohlenstoffringgliedern, wie z.B. (aber nicht beschränkt auf) Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, Bicyclo[1, 0, 1]butan, Decaliny, Norbornyl.

Erläuterung der Verfahren und Zwischenprodukte

- 5 Die Cycloalkylamidbenzoxa(thia)zole der Formel (I) lassen sich auf unterschiedliche Weise herstellen. Im Folgenden sind die möglichen Verfahren zunächst schematisch dargestellt. Wenn nicht anders angegeben haben die angegebenen Reste die oben angegebenen Bedeutungen.



Schema 2: Verfahren B



R^{1a} steht für Wasserstoff, C_1 - C_4 -Alkyl, Hydroxy, Sulfanyl (SH) oder Amino.

R^{1b} steht für Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl.


5 Alk¹ steht für Methyl oder Ethyl.

Schema 3: Verfahren C




10

Schema 4: Verfahren D



R^{1c} steht für Fluor, Chlor oder Brom.

Schema 5: Verfahren E




R^{1c} steht für Fluor, Chlor oder Brom.

R^{1d} steht für $\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkoxy}$.

5

Schema 6: Verfahren F




R^{1c} steht für Fluor, Chlor oder Brom.

R^{1e} steht für $(\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkoxy})\text{carbonyl}$.

10

Schema 7: Verfahren G



R^{1f} steht für $\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkylthio}$.


R^{1g} steht für $\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkylsulfinyl}$ oder $\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkylsulfonyl}$.

15

Alk^2 steht für $\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkyl}$.

LG^1 steht für Chlor oder Brom.

Schema 8: Verfahren H



R^{1h} steht für C₁-C₈-Alkylamino oder Di-(C₁-C₈-Alkyl)amino.

Alk^2 steht für C₁-C₈-Alkyl.

5 LG^1 steht für Chlor oder Brom.

Bevorzugte Restdefinitionen der vorstehenden und nachfolgend genannten Formeln und Schemata sind bereits oben angegeben. Diese Definitionen gelten nicht nur für die Endprodukte der Formel (I) sondern auch für alle Zwischenprodukte gleichermaßen.

10 R^{1a} steht bevorzugt für Wasserstoff, Methyl, Hydroxy, Sulfanyl (SH) oder Amino.

R^{1a} steht besonders bevorzugt für Wasserstoff oder Sulfanyl (SH).

R^{1a} steht ganz besonders bevorzugt für Wasserstoff.

R^{1b} steht bevorzugt für Wasserstoff oder Methyl.

R^{1b} steht besonders bevorzugt für Wasserstoff.

15 R^{1c} steht bevorzugt für Chlor oder Brom.

R^{1c} steht besonders bevorzugt für Chlor.

R^{1d} steht bevorzugt für Methoxy oder Ethoxy.

R^{1e} steht bevorzugt für Methoxycarbonyl oder Ethoxycarbonyl.

R^{1f} steht bevorzugt für Methylthio.


20 R^{1g} steht bevorzugt für Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl oder Ethylsulfonyl.

R^{1h} steht bevorzugt für Methylamino oder Dimethylamino.

Alk^2 steht bevorzugt für Methyl oder Ethyl.

Folgende Verbindungen der vorstehenden Schemata sind neu und damit ebenfalls Teil der vorliegenden Erfindung:

5 Nitrobenzoesäure-Derivate der Formel (VIII-a),



in welcher

X^1 und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und


10 R^{2a} für C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

15 sowie Salze davon.

R^{2a} steht bevorzugt für Methylthio, Ethylthio, n-Propylthio, i-Propylthio, n-, i-, s- oder t- Butylthio, Dimethylamino, Trifluormethyl oder Heteroaryl (welches bevorzugt ausgewählt ist aus 1-Imidazolyl, 3-Thiazolyl, 3-Oxazolyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl).

R^{2a} steht besonders bevorzugt für Methoxy oder Trifluormethyl.

20 Aminobenzoessäure-Derivate der Formel (VII-a),



in welcher

X^1 und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und


R^{2b} für C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 -
 5 C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

sowie Salze davon.

R^{2b} steht bevorzugt für Methylthio, Ethylthio, n-Propylthio, i-Propylthio, n-, i-, s- oder t- Butylthio, Dimethylamino, Trifluormethyl oder Heteroaryl (welches bevorzugt ausgewählt ist
 10 aus 1-Imidazolyl, 3-Thiazolyl, 3-Oxazolyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl).

R^{2b} steht besonders bevorzugt für Methoxy oder Trifluormethyl.

Neu sind Verbindungen der Formel (VI-a),



15 in welcher

X^1 und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und


R^{2c} für C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 -
 20 C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

sowie Salze davon.

R^{2c} steht bevorzugt für Methylthio, Ethylthio, n-Propylthio, i-Propylthio, n-, i-, s- oder t- Butylthio, Dimethylamino, Trifluormethyl oder Heteroaryl (welches bevorzugt ausgewählt ist
 25 aus 1-Imidazolyl, 3-Thiazolyl, 3-Oxazolyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl).

R^{2c} steht besonders bevorzugt für Methoxy oder Trifluormethyl.

Neu sind Benzoxa(thia)zolcarbonsäureester der Formel (V-a),



in welcher

5 X^1 , R^{1a} und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und

R^{2d} für C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

10


sowie Salze davon.

R^{2d} steht bevorzugt für Methylthio, Ethylthio, n-Propylthio, i-Propylthio, n-, i-, s- oder t- Butylthio, Dimethylamino, Trifluormethyl oder Heteroaryl (welches bevorzugt ausgewählt ist aus 1-Imidazolyl, 3-Thiazolyl, 3-Oxazolyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl).

15

R^{2d} steht besonders bevorzugt für Methoxy oder Trifluormethyl.

Neu sind Verbindungen der Formel (IV-a),



in welcher

20 X^1 , R^{1a} und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und


R^{2e} für C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Ha-
 5 logen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

sowie Salze davon.

R^{2e} steht bevorzugt für Methylthio, Ethylthio, n-Propylthio, i-Propylthio, n-, i-, s- oder t- Butylthio, Dimethylamino, Trifluormethyl oder Heteroaryl (welches bevorzugt ausgewählt ist
 10 aus 1-Imidazolyl, 3-Thiazolyl, 3-Oxazolyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl).

R^{2e} steht besonders bevorzugt für Methoxy oder Trifluormethyl.

Neu sind Verbindungen der Formel (X-a),



in welcher

15 X^1 , R^3 und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und


R^{2f} für Halogen, Hydroxy, Cyano, Nitro, C_1 - C_8 -Alkyl, C_1 - C_8 -Alkoxy, C_1 - C_8 -Alkylthio, C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Alkylsulfonyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkoxy, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Ha-
 20 logen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Phenyl (welches wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Alkylthio, C_1 - C_6 -Halogenalkyl, C_1 - C_6 -Halogenalkylthio substituiert sein kann), Heteroaryl, Heterocyclyl steht.
 25

R^{2f} steht bevorzugt für Methylthio, Ethylthio, n-Propylthio, i-Propylthio, n-, i-, s- oder t- Butylthio, Dimethylamino, Dimethylaminosulfonyl, Trifluormethyl, Trichlormethoxy, Trifluor-

methoxy oder Heteroaryl (welches bevorzugt ausgewählt ist aus 1-Imidazolyl, 3-Thiazolyl, 3-Oxazolyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl).

R^{2f} steht besonders bevorzugt für Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Nitro, Methyl, Methoxy oder Trifluormethoxy.

5 Neu sind Verbindungen der Formel (XI-a),



in welcher

X^1 und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und

10 R^{2g} für C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

15 sowie Salze davon.

R^{2g} steht bevorzugt für Methylthio, Ethylthio, n-Propylthio, i-Propylthio, n-, i-, s- oder t- Butylthio, Dimethylamino, Trifluormethyl oder Heteroaryl (welches bevorzugt ausgewählt ist aus 1-Imidazolyl, 3-Thiazolyl, 3-Oxazolyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl).

R^{2g} steht besonders bevorzugt für Methoxy oder Trifluormethyl.


20 Verfahren A

Die bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens A in Schritt ① als Ausgangsstoffe benötigten Nitrobenzoesäure-Derivate der Formel (VIII) sind teilweise neu [siehe oben Verbindungen der Formel (VIII-a)]. Sowohl die neuen als auch die literaturbeschriebenen Verbindungen lassen sich mittels bekannter Methoden herstellen [*Journal of Organic Chemistry* (2008) 73(22), 9121-9124, *Helvetica Chimica Acta* (2008) 91(8), 1435-1442, *Journal of Medicinal Chemistry* (2008) 51(5), 1203-1213, *Tetrahedron* (2007) 63(51), 12646-12654, *Advanced Synthesis & Catalysis* (2007)

349(17+18), 2673-2676, *ChemMedChem* (2007) 2(12), 1708-1712, *Heterocycles* (2008) 75(6), 1425-1433, *Angewandte Chemie, International Edition* (2008) 47(17), 3234-3237, *Chemical Biology & Drug Design* (2008) 71(2), 167-172]. Gegebenenfalls wird Salicylsäure bzw. 2-Sulfanylbenezoesäure zunächst in 4-, 5- und/oder 6-Position mit R^2 substituiert [*Revue Roumaine de Chimie* (1987) 32(2), 215-21] und dann in 3-Position nitriert [*Journal of Medicinal Chemistry* (1986) 29(1), 25-9; *Revue Roumaine de Chimie* (1987) 32(2), 215-21; *Journal of Organic Chemistry* (1994) 59(15), 4297-303] oder es wird 4-, 5-, oder 6-Halogensalicylsäure in 4-, 5- und/oder 6-Position mit R^2 substituiert und anschließend in 3-Position nitriert.

Es ist auch möglich Nitrobenzoesäure-Derivate der Formel (VIII), in welcher R^2 für Halogen, bevorzugt für Fluor, Chlor oder Brom, steht, nach bekannten Verfahren zu derivatisieren [*Journal of Organic Chemistry* (1994) 59(15), 4297-303]. Die bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens A in Schritt ① erhaltenen Aminobenzoesäure-Derivate der Formel (VII) können alternativ zum Verfahren A/Schritt ① teilweise auch nach folgendem Verfahren erhalten werden (für den Fall, dass X^1 für Schwefel steht):

15




3-Aminobenzoesäure-Derivate der Formel (XIV) sind bekannt.

Es ist auch möglich, die Aminobenzoesäure-Derivate der Formel (VII) in Verfahren A ohne Methylierung direkt weiter umzusetzen, z.B. nach Variante a) in Schritt ③. Dadurch entfällt dann auch die Freisetzung der Säure gemäß Schritt ④.

Die bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens A in Schritt ② erhaltenen Benzo-*xa(thia)zol*carbonsäureester der Formel (V) können alternativ zum Verfahren A/Schritt ② teilweise auch nach folgendem Verfahren erhalten werden (für den Fall, dass R^1 für Wasserstoff steht):

Schema 10: Verfahren J



2-Chlor-3-nitrobenzoesäure-Derivate der Formel (XVII) sind bekannt oder können analog den Verbindungen der Formel (VIII) – wie oben beschrieben – erhalten werden.

5 Reaktionsbedingungen für Schritt ① (Verfahren A)

Als geeignete Katalysatoren zur Durchführung der katalytischen Hydrierung kommen alle üblichen Hydrierkatalysatoren, wie beispielsweise Platin-Katalysatoren (z.B. Platin-Platte, Platin-Schwamm, Platin-Schwarz, kolloidales Platin, Platinoxid, Platindraht), Palladium-Katalysatoren (z.B. Palladium-Schwamm, Palladium-Schwarz, Palladiumoxid, Palladium-Kohle, kolloidales Palladium, Palladium-Bariumsulfat, Palladium-Bariumcarbonat, Palladium-Hydroxid), Nickel-Katalysatoren (z.B. reduziertes Nickel, Nickeloxid, Raney-Nickel) infrage. Vorzugsweise verwendet man jedoch Edelmetallkatalysatoren, wie beispielsweise Platin- und Palladium-Katalysatoren gegebenenfalls auf einem geeigneten Träger wie beispielsweise auf Kohlenstoff, besonders bevorzugt Pd/C.

Bei der Hydrierungsreaktion kommen jeweils alle üblichen inerten, organischen Solventien infrage. Vorzugsweise verwendbar sind Alkohole, wie Methanol oder Ethanol, Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon oder Hexamethylphosphorsäuretriamid; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Sulfoxide, wie Dimethylsulfoxid; Sulfone, wie Sulfolan, organische Säuren wie Ameisensäure oder Essigsäure oder Wasser. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen. Besonders bevorzugt verwendet man Alkohole wie Methanol oder Ethanol und Ether wie Dioxan und Tetrahydrofuran sowie deren Gemische.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ① des erfindungsgemäßen Verfahrens A in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 0°C bis +110°C.

5 Zur Durchführung von Schritt ① des erfindungsgemäßen Verfahrens A hydriert man Nitrobenzoesäure-Derivate der Formel (VIII) im Allgemeinen in Gegenwart von 0.1 bis 50 Gewichts-%, vorzugsweise 0.5 bis 10 Gewichts-% Übergangsmetallkatalysator. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Es kann grundsätzlich unter Normaldruck gearbeitet werden. Vorzugsweise arbeitet man bei Normaldruck oder bei Drucken bis zu 15 bar in einer Wasserstoffatmosphäre.

Reaktionsbedingungen für Schritt ② (Verfahren A)

10 Bei Verwendung von Diazomethan als Methylierungsmittel kommen bei der Durchführung von Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens A vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: Alkohole, wie z.B. Methanol, Ethanol oder Isopropanol; aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, 15 Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Chlortoluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan oder Tetrachlorethylen; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester, wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

25 Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens A wird bei Verwendung von Diazomethan gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Säureakzeptors durchgeführt. Als solche kommen übliche anorganische oder organische Basen infrage. Hierzu gehören vorzugsweise Alkalimetallcarbonate oder -hydrogencarbonate, wie z.B. Lithiumcarbonat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Caesiumcarbonat, Kaliumhydrogencarbonat oder Natriumhydrogencarbonat; tertiäre Amine, wie Trimethylamin, Triethylamin, Tributylamin, N,N-Dimethylanilin, N,N-Dimethyl-benzylamin, Pyridin, N-Methylpiperidin, N-Methylmorpholin, N,N-Dimethylaminopyridin, Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicyclononon (DBN) oder Diazabicycloundecen (DBU), sowie Protonenschwamm. (1,8-Bis-dimethylaminonaphthalin).

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens A in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von -78°C bis +50°C, ganz besonders bevorzugt bei 0°C bis 30°C.

- 5 Zur Durchführung von Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens A setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (VII) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Diazomethan sowie 0 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Säureakzeptor ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

10 *Reaktionsbedingungen für Schritt ③ (Verfahren A)*

- a) Bei Verwendung von $R^{1b}-C(OAlk^1)_3$ wird das Reagenz $R^{1b}-C(OAlk^1)_3$ als Lösungsmittel verwendet oder es kommen bei der Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens A vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise
- 15 so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Chlortoluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan oder Tetrachlorethylen; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.
- 20

- Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens A wird bei Verwendung von $R^{1b}-C(OAlk^1)_3$ gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Katalysators durchgeführt. Als solche kommen PPTS, p-TsOH, H_2SO_4 und HCl und andere inerte Säuren in Frage.
- 25

- Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens A in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von 0°C bis +250°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 20°C bis +150°C, ganz besonders bevorzugt bei 40°C bis 120°C.
- 30

Zur Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens A setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (VI) im Allgemeinen 0,5 bis 1000 Mol, vorzugsweise 100 bis 1000 Mol an $R^{1b}-$

C(OAlk¹) sowie 0,01 bis 20 Mol, vorzugsweise 0,1 bis 1 Mol an Säureakzeptor ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

b) Bei Verwendung von Kalium-O-ethylthiocarbonat kommen bei der Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens A vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: Alkohole, wie z.B. Methanol, Ethanol oder Isopropanol; aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Chlortoluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan oder Tetrachlorethylen; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester, wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens A in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von 0°C bis +250°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 20°C bis +200°C, ganz besonders bevorzugt bei der Siedetemperatur des entsprechenden Lösungsmittels.

Zur Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens A setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (VII) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Kalium-O-ethylthiocarbonat ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

c,d) Bei Verwendung von 1,1-Di(1H-imidazol-1-yl)methanimin oder Di-1H-imidazol-1-ylmethanon kommen bei der Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens A vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: Alkohole, wie z.B. Methanol, Ethanol oder Isopropanol; aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol,

Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Chlortoluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan oder Tetrachlorethylen; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester, wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens A in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +250°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 40°C bis +200°C, ganz besonders bevorzugt bei der Siedetemperatur des entsprechenden Lösungsmittels.

Zur Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens A setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (VII) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an 1,1-Di(1H-imidazol-1-yl)methanimin oder Di-1H-imidazol-1-ylmethanon ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

Reaktionsbedingungen für Schritt ④ (Verfahren A)

Die Freisetzung der Säure erfolgt nach üblichen Methoden (Organic Chemistry, J. Clayden, N. Greeves, S. Warren; P. Wothers, *Oxford University Press 2001*), z.B. durch Verseifung der Benzoxa(thia)zolidcarbonsäureester der Formel (V) mit 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise mit 1 bis 5 Mol Lithiumhydroxid, wobei eine 0,1 bis 5 molare Lösung, vorzugsweise eine 1-2 molare wässrige Lösung verwendet wird.

Reaktionsbedingungen für Schritt ⑤ (Verfahren A)

Die Chlorierung in Schritt ⑤ erfolgt nach üblichen Methoden. Die Umsetzung der Benzoxa(thia)zolidcarbonsäuren der Formel (IV) erfolgt mit einem Chlorierungsmittel (z.B. Thionylchlorid/Oxalylchlorid) in Gegenwart eines Verdünnungsmittels (z.B. Toluol oder Methylenchlorid).

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ⑤ des erfindungsgemäßen Verfahrens A in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von 0°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 20°C bis zu der Siedetemperatur des entsprechenden Lösungsmittels.

Zur Durchführung von Schritt ⑤ des erfindungsgemäßen Verfahrens A setzt man pro Mol an Verbindung der Formel IV) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 1,5 Mol an Chlorierungsmittel ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

Reaktionsbedingungen für Schritt ⑥ (Verfahren A)

Als Verdünnungsmittel zur Durchführung von Schritt ⑥ des erfindungsgemäßen Verfahrens A kommen alle inerten organischen Lösungsmittel in Betracht. Hierzu gehören vorzugsweise aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-*t*-butylether, Methyl-*t*-Amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, *n*- oder *i*-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie *N,N*-Dimethylformamid, *N,N*-Dimethylacetamid, *N*-Methylformanilid, *N*-Methylpyrrolidon oder Hexamethylphosphorsäuretriamid; deren Gemische mit Wasser oder reines Wasser.

Schritt ⑥ des erfindungsgemäßen Verfahrens A wird gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Säureakzeptors durchgeführt. Als solche kommen alle üblichen anorganischen oder organischen Basen infrage. Hierzu gehören vorzugsweise Erdalkalimetall- oder Alkalimetallhydride, -hydroxide, -amide, -alkoholate, -acetate, -carbonate oder -hydrogencarbonate, wie beispielsweise Natriumhydrid, Natriumamid, Lithiumdiisopropylamid, Natrium-methylat, Natrium-ethylat, Kalium-*tert*.-butylat, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumacetat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat oder Ammoniumcarbonat, sowie tertiäre Amine, wie Trimethylamin, Triethylamin, Tributylamin, *N,N*-Dimethylanilin, *N,N*-Dimethyl-benzylamin, Pyridin, *N*-Methylpiperidin, *N*-Methylmorpholin, *N,N*-Dimethylaminopyridin, Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicyclononen (DBN) oder Diazabicycloundecen (DBU).

Schritt ⑥ des erfindungsgemäßen Verfahrens A wird gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Kondensationsmittels durchgeführt. Als solche kommen alle üblicherweise für derartige Amidierungsreaktionen verwendbaren Kondensationsmittel infrage. Beispielfhaft genannt seien Säurehalogenidbildner wie Phosgen, Phosphortribromid, Phosphortrichlorid, Phosphorpentachlorid, Phosphoroxychlorid oder Thionylchlorid; Anhydridbildner wie Chlorameisensäureethylester, Chlorameisensäuremethylester, Chlorameisensäureisopropylester, Chlorameisensäureisobutylester oder Methansulfonylchlorid; Carbodiimide, wie *N,N'*-Dicyclohexylcarbodiimid (DCC) oder andere übliche Kon-

densationsmittel, wie Phosphorpentoxid, Polyphosphorsäure, N,N'-Carbonyldiimidazol, 2-Ethoxy-N-ethoxycarbonyl-1,2-dihydrochinolin (EEDQ), Triphenylphosphin/Tetrachlorkohlenstoff oder Brom-tripyrrolidinophosphonium-hexafluorophosphat.

- 5 Schritt ⑥ des erfindungsgemäßen Verfahrens A wird gegebenenfalls in Gegenwart eines Katalysators durchgeführt. Beispielsweise genannt seien 4-Dimethylaminopyridin, 1-Hydroxy-benzotriazol oder Dimethylformamid.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ⑥ des erfindungsgemäßen Verfahrens A in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von 0°C bis 150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 0°C bis 80°C.

- 10 Zur Durchführung von Schritt ⑥ des erfindungsgemäßen Verfahrens A setzt man pro Mol des Benzoxa(thia)zolcarbonsäurechlorids der Formel (II) im Allgemeinen 0,8 bis 15 Mol, vorzugsweise 0,8 bis 8 Mol an Amin der Formel (III) ein.

Verfahren B

- 15 Die bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens B in Schritt ① als Ausgangsstoffe benötigten Nitrobenzoesäure-Derivate der Formel (VIII) sind bereits oben bei Verfahren A beschrieben worden.

Reaktionsbedingungen für Schritt ① (Verfahren B)

- 20 Die Chlorierung in Schritt ① erfolgt nach üblichen Methoden. Die Umsetzung der Nitrobenzoesäure-Derivate der Formel (VIII) erfolgt mit einem Chlorierungsmittel (z.B. Thionylchlorid/Oxalylchlorid) in Gegenwart eines Verdünnungsmittels (z.B. Toluol oder Methylenchlorid).

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ① des erfindungsgemäßen Verfahrens B in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von 0°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 20°C bis zu der Siedetemperatur des entsprechenden Lösungsmittels.

- 25 Zur Durchführung von Schritt ① des erfindungsgemäßen Verfahrens B setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (VIII) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 1,5 Mol an Chlorierungsmittel ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

Reaktionsbedingungen für Schritt ② (Verfahren B)

Als Verdünnungsmittel zur Durchführung von Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens B kommen alle inerten organischen Lösungsmittel in Betracht. Hierzu gehören vorzugsweise aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Petrolether, Hexan, Heptan, 5 Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-Amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2- Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie 10 Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon oder Hexamethylphosphorsäuretriamid; deren Gemische mit Wasser oder reines Wasser.

Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens B wird gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Säureakzeptors durchgeführt. Als solche kommen alle üblichen anorganischen oder organischen Basen 15 infrage. Hierzu gehören vorzugsweise Erdalkalimetall- oder Alkalimetallhydride, -hydroxide, -amide, -alkoholate, -acetate, -carbonate oder -hydrogencarbonate, wie beispielsweise Natriumhydrid, Natriumamid, Lithiumdiisopropylamid, Natrium-methylat, Natrium-ethylat, Kalium-tert.-butylat, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumacetat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat oder Ammoniumcarbonat, sowie tertiäre Amine, wie Trimethylamin, Triethylamin, Tributylamin, N,N-Dimethylanilin, N,N-Dimethyl-benzylamin, Pyridin, N-Methylpiperidin, N-Methylmorpholin, N,N-Dimethylaminopyridin, Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicyclononen (DBN) oder Diazabicycloundecen (DBU). 20

Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens B wird gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Kondensationsmittels durchgeführt. Als solche kommen alle üblicherweise für derartige Amidierungsreaktionen verwendbaren Kondensationsmittel infrage. Beispielfhaft genannt seien Säurehalogenidbildner wie Phosgen, Phosphortribromid, Phosphortrichlorid, Phosphorpentachlorid, Phosphoroxychlorid oder Thionylchlorid; Anhydridbildner wie Chlorameisensäureethylester, Chlorameisensäuremethylester, Chlorameisensäureisopropylester, Chlorameisensäureisobutylester oder Methansulfonylchlorid; Carbodiimide, wie N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid (DCC) oder andere übliche Kon- 25 densationsmittel, wie Phosphorpentoxid, Polyphosphorsäure, N,N'-Carbonyldiimidazol, 2-Ethoxy-N-ethoxycarbonyl-1,2-dihydrochinolin (EEDQ), Triphenylphosphin/Tetrachlorkohlenstoff oder Bromtripyrrolidinphosphonium-hexafluorophosphat. 30

Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens B wird gegebenenfalls in Gegenwart eines Katalysators durchgeführt. Beispielsweise genannt seien 4-Dimethylaminopyridin, 1-Hydroxy-benzotriazol oder Dimethylformamid.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens B in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von 0°C bis 150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 0°C bis 80°C.

Zur Durchführung von Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens B setzt man pro Mol des Nitrobenzoesäurechlorids der Formel (XI) im Allgemeinen 0,8 bis 15 Mol, vorzugsweise 0,8 bis 8 Mol an Amin der Formel (III) ein.

10 *Reaktionsbedingungen für Schritt ③ (Verfahren B)*

Als geeignete Katalysatoren zur Durchführung der katalytischen Hydrierung kommen alle üblichen Hydrierkatalysatoren, wie beispielsweise Platin-Katalysatoren (z.B. Platin-Platte, Platin-Schwamm, Platin-Schwarz, kolloidales Platin, Platinoxid, Platindraht), Palladium-Katalysatoren (z.B. Palladium-Schwamm, Palladium-Schwarz, Palladiumoxid, Palladium-Kohle, kolloidales Palladium, Palladium-Bariumsulfat, Palladium-Bariumcarbonat, Palladium-Hydroxid), Nickel-Katalysatoren (z.B. reduziertes Nickel, Nickeloxid, Raney-Nickel) infrage. Vorzugsweise verwendet man jedoch Edelmetallkatalysatoren, wie beispielsweise Platin- und Palladium-Katalysatoren gegebenenfalls auf einem geeigneten Träger wie beispielsweise auf Kohlenstoff, besonders bevorzugt Pd/C.

Bei der Hydrierungsreaktion kommen jeweils alle üblichen inerten, organischen Solventien infrage. Vorzugsweise verwendbar sind Alkohole, wie Methanol oder Ethanol, Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril; Amide, wie N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon oder Hexamethylphosphorsäuretriamid; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Sulfoxide, wie Dimethylsulfoxid; Sulfone, wie Sulfolan, organische Säuren wie Ameisensäure oder Essigsäure oder Wasser. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen. Besonders bevorzugt verwendet man Alkohole wie Methanol oder Ethanol und Ether wie Dioxan und Tetrahydrofuran sowie deren Gemische.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens B in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 0°C bis +110°C.

Zur Durchführung von Schritt ③ des erfindungsgemäßen Verfahrens B hydriert man Nitrobenzoesäureamide der Formel (X) im Allgemeinen in Gegenwart von 0.1 bis 50 Gewichts-%, vorzugsweise 0.5 bis 10 Gewichts-% Übergangsmetallkatalysator. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Es kann grundsätzlich unter Normaldruck gearbeitet werden. Vorzugsweise arbeitet man bei Normaldruck oder bei Drucken bis zu 15 bar in einer Wasserstoffatmosphäre.

Reaktionsbedingungen für Schritt ④ (Verfahren B)

a) Bei Verwendung von $R^{1b}-C(OAlk^1)_3$ wird das Reagenz $R^{1b}-C(OAlk^1)_3$ als Lösungsmittel verwendet oder es kommen bei der Durchführung von Schritt ④ des erfindungsgemäßen Verfahrens B vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Chlortoluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan oder Tetrachlorethylen; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

Schritt ④ des erfindungsgemäßen Verfahrens B wird bei Verwendung von $R^{1b}-C(OAlk^1)_3$ gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Katalysators durchgeführt. Als solche kommen PPTS, p-TsOH, H_2SO_4 und HCl und andere inerte Säuren in Frage.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ④ des erfindungsgemäßen Verfahrens B in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von 0°C bis +250°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 20°C bis +150°C, ganz besonders bevorzugt bei 40°C bis 120°C.

Zur Durchführung von Schritt ④ des erfindungsgemäßen Verfahrens B setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (IX) im Allgemeinen 0,5 bis 1000 Mol, vorzugsweise 100 bis 1000 Mol an $R^{1b}-C(OAlk^1)$ sowie 0,01 bis 20 Mol, vorzugsweise 0,1 bis 1 Mol an Säureakzeptor ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

b) Bei Verwendung von Kalium-O-ethyldithiocarbonat kommen bei der Durchführung von Schritt ④ des erfindungsgemäßen Verfahrens B vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: Alkohole, wie z.B. Methanol, Ethanol oder Isopropanol; aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Chlortoluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan oder Tetrachlorethylen; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester, wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ④ des erfindungsgemäßen Verfahrens B in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von 0°C bis +250°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 20°C bis +200°C, ganz besonders bevorzugt bei der Siedetemperatur des entsprechenden Lösungsmittels.

Zur Durchführung von Schritt ④ des erfindungsgemäßen Verfahrens B setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (IX) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Kalium-O-ethyldithiocarbonat ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

c,d) Bei Verwendung von 1,1-Di(1H-imidazol-1-yl)methanimin oder Di-1H-imidazol-1-ylmethanon kommen bei der Durchführung von Schritt ④ des erfindungsgemäßen Verfahrens B vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: Alkohole, wie z.B. Methanol, Ethanol oder Isopropanol; aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Chlortoluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan oder Tetrachlorethylen; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxy-

ethan oder Anisol; Ester, wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

- 5 Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ④ des erfindungsgemäßen Verfahrens B in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +250°C, vorzugsweise bei Temperaturen von 40°C bis +200°C, ganz besonders bevorzugt bei der Siedetemperatur des entsprechenden Lösungsmittels.

- 10 Zur Durchführung von Schritt ④ des erfindungsgemäßen Verfahrens B setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (IX) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an 1,1-Di(1H-imidazol-1-yl)methanimin oder Di-1H-imidazol-1-ylmethanon ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

Verfahren C

- 15 Die bei der Durchführung des Verfahrens C als Ausgangsstoffe benötigten Benzoxa(thia)zole der Formel (I-b) können je nach Bedeutung der Reste X^1 , R^1 , R^2 , m und R^3 nach den Verfahren A, B, D, E, F, G oder H (wobei X^2 dann jeweils für Sauerstoff steht) erhalten werden.

Belleau's Reagenz ist 2,4-Bis(4-phenoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetan-2,4-disulfid.

- 20 Bei Verwendung von Belleau's Reagenz als Verschwefelungsreagenz kommen bei Verfahren C vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: Alkohole, wie z.B. Methanol, Ethanol oder Isopropanol; aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Chlortoluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan oder Tetrachlorethylen; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester, wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.
- 30

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens C in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von -78°C bis +50°C, ganz besonders bevorzugt bei 0°C bis 30°C.

- 5 Zur Durchführung des Verfahrens C setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (I-b) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Belleau's Reagenz ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

Verfahren D

- 10 Die bei der Durchführung des Verfahrens D als Ausgangsstoffe benötigten Benzoxa(thia)zole der Formel (I-d) können je nach Bedeutung der Reste X^1 , X^2 , R^2 , m und R^3 nach den Verfahren A, B oder C erhalten werden.

- Bei Verwendung von n -BuLi und $R^{1c}_3C(CO)Cl$ kommen bei Verfahren D vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: Alkohole, wie z.B. Methanol, Ethanol oder Isopropanol; aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Okтан, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Chlortoluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan oder Tetra-
15 chlorethylen; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester, wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n - oder i -Butyronitril oder Benzonitril, m -Chlorbenzonitril.
20 Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.
25

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Verfahren D in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von -78°C bis +50°C, ganz besonders bevorzugt bei -78°C bis 20°C.

- 30 Zur Durchführung des Verfahrens D setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (I-d) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 0,9 bis 1,5 Mol an n -BuLi und 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an $R^{1c}_3C(CO)Cl$ ein.

Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

Verfahren E

- 5 Die bei der Durchführung des Verfahrens E als Ausgangsstoffe benötigten Benzoxa(thia)zole der Formel (I-e) können nach Verfahren D erhalten werden.

Bei Verwendung von einer Base, einem Alkohol, Palladium und einem Liganden als Alkoxygenierungsreagenzien kommen bei Verfahrens E vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, 10 Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Nitrile, 15 wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Verfahren E in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von -78°C bis +50°C, ganz besonders bevorzugt bei 0°C bis 30°C.

- 20 Zur Durchführung des Verfahrens E setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (I-d) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Base, 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Alkohol, 0,01 bis 1 Mol, vorzugsweise 0,1 bis 1 Mol Palladium und 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Ligand ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt 25 nach üblichen Methoden.

Verfahren F

Die bei der Durchführung des Verfahrens F als Ausgangsstoffe benötigten Benzoxa(thia)zole der Formel (I-e) können nach Verfahren D erhalten werden.

- 30 Bei Verwendung von Magnesium und $\text{Cl}_3\text{CR}^{\text{Ic}}$ als Alkoxycarbonylierungsreagenzien kommen bei Verfahren F vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlen-

wasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Verfahren F in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von -78°C bis +50°C, ganz besonders bevorzugt bei 0°C bis 30°C.

Zur Durchführung des Verfahrens F setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (I-f) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Magnesium, 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an $\text{Cl}_3\text{CR}^{1c}$ ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

Verfahren G

Die bei der Durchführung des Verfahrens G als Ausgangsstoffe benötigten Benzoxa(thia)zole der Formel (I-h) können z.B. nach Verfahren A erhalten werden.

Die bei der Durchführung des Verfahrens G weiterhin als Ausgangsstoffe benötigten Alkylchloride bzw. -bromide der Formel (XII) sind bekannt.

Reaktionsbedingungen für Schritt ① (Verfahren G)

Bei Verwendung von Halogenalkan als Alkylierungsmittel kommen bei der Durchführung von Schritt ① des erfindungsgemäßen Verfahrens G vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester, wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder

Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ① des erfindungsgemäßen Verfahrens G in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von -78°C bis +50°C, ganz besonders bevorzugt bei 0°C bis 30°C.

Zur Durchführung von Schritt ① des erfindungsgemäßen Verfahrens G setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (I-h) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Halogenalkan sowie 0 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Säureakzeptor ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

Reaktionsbedingungen für Schritt ② (Verfahren G)

Bei Verwendung von Diazomethan als Oxidationsmittel kommen bei der Durchführung von Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens G vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzol, Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Chlortoluol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethan, Tetrachlorethan oder Tetrachlorethylen; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester, wie Essigsäuremethylester oder Essigsäureethylester; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung von Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens G an einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von -78°C bis +50°C, ganz besonders bevorzugt bei 0°C bis 30°C.

Zur Durchführung von Schritt ② des erfindungsgemäßen Verfahrens G setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (I-i) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Oxidations-

mittel ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktionsdurchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

Verfahren H

- 5 Die bei der Durchführung des Verfahrens H als Ausgangsstoffe benötigten Benzoxa(thia)zole der Formel (I-I) können z.B. nach Verfahren A erhalten werden.

Bei Verwendung von Halogenalkan als Alkylierungsmittel kommen bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens H vorzugsweise folgende Lösungsmittel infrage: aliphatische, alicyclische oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan
10 und technische Kohlenwasserstoffe; beispielsweise so genannte White Spirits mit Komponenten mit Siedepunkten im Bereich beispielsweise von 40°C bis 250°C, Cymol, Benzinfraktionen innerhalb eines Siedeintervalles von 70°C bis 190°C, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, Methyl-t-butylether, Methyl-t-amylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, 1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol; Ester, wie Essigsäuremethyl-
15 ester oder Essigsäureethylester; Ketone, wie Aceton, Butanon, Methyl-isobutylketon oder Cyclohexanon; Nitrile, wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril, m-Chlorbenzonitril. Es ist auch möglich, Gemische der genannten Lösungs- und Verdünnungsmittel einzusetzen.

Die Reaktionstemperaturen können bei der Durchführung des Verfahrens H in einem größeren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von -78°C bis +150°C, vorzugsweise bei Temperaturen von -78°C bis +50°C, ganz besonders bevorzugt bei 0°C bis 30°C.
20

Zur Durchführung von Verfahrens H setzt man pro Mol an Verbindung der Formel (I-I) im Allgemeinen 0,5 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Halogenalkan sowie 0 bis 20 Mol, vorzugsweise 1 bis 5 Mol an Säureakzeptor ein. Die Reaktionsdauer beträgt 1 bis 48 Stunden. Die Reaktions-
25 durchführung erfolgt bevorzugt unter einer Schutzgasatmosphäre wie Stickstoff oder Argon. Die Aufarbeitung erfolgt nach üblichen Methoden.

Bei allen erfindungsgemäßen Verfahren wird im Allgemeinen (wenn nicht anders angegeben) unter Normaldruck gearbeitet. Es ist jedoch auch möglich, unter erhöhtem oder vermindertem Druck – im Allgemeinen zwischen 0,1 bar und 10 bar – zu arbeiten.

- 30 Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Mittel, zum Bekämpfen von unerwünschten Mikroorganismen, umfassend die erfindungsgemäßen Wirkstoffe. Vorzugsweise handelt es sich um fun-

gizide Mittel, welche landwirtschaftlich verwendbare Hilfsmittel, Solventien, Trägerstoffe, oberflächenaktive Stoffe oder Streckmittel enthalten.

- Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen, dadurch gekennzeichnet, dass man die erfindungsgemäßen Wirkstoffe auf die phytopathogenen Pilze
5 und/oder deren Lebensraum ausbringt.

Erfindungsgemäß bedeutet Trägerstoff eine natürliche oder synthetische, organische oder anorganische Substanz, mit welchen die Wirkstoffe zur besseren Anwendbarkeit, v.a. zum Aufbringen auf Pflanzen oder Pflanzenteile oder Saatgut, gemischt oder verbunden sind. Der Trägerstoff, welcher fest oder flüssig sein kann, ist im Allgemeinen inert und sollte in der Landwirtschaft verwendbar sein.

- 10 Als feste oder flüssige Trägerstoffe kommen infrage: z.B. Ammoniumsalze und natürliche Gesteinsmehle, wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und natürliche oder synthetische Silikate, Harze, Wachse, feste Düngemittel, Wasser, Alkohole, besonders Butanol, organische Solventien, Mineral- und Pflanzenöle sowie Derivate hiervon. Mischungen solcher Trägerstoffe
15 können ebenfalls verwendet werden. Als feste Trägerstoffe für Granulate kommen infrage: z.B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material wie Sägemehl, Kokosnussschalen, Maiskolben und Tabakstängel.

- Als verflüssigte gasförmige Streckmittel oder Trägerstoffe kommen solche Flüssigkeiten infrage,
20 welche bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasförmig sind, z.B. Aerosol-Treibgase, wie Halogenkohlenwasserstoffe, sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid.

- Es können in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulverige, körnige oder latexförmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabikum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, sowie natürliche Phospholipide, wie Kephaleine und Lecithine, und
25 synthetische Phospholipide. Weitere Additive können mineralische und vegetabile Öle sein.

- Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z.B. auch organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden. Als flüssige Lösungsmittel kommen im Wesentlichen infrage: Aromaten, wie Xylol, Toluol oder Alkyl-naphthaline, chlorierte Aromaten oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Dichlormethan, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z.B. Erdölfraktionen, mineralische und pflanzliche Öle, Alkohole,
30 le, wie Butanol oder Glykol sowie deren Ether und Ester, Ketone, wie Aceton, Methylethylketon, Meth-

ylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid, sowie Wasser.

Die erfindungsgemäßen Mittel können zusätzlich weitere Bestandteile enthalten, wie z.B. oberflächenaktive Stoffe. Als oberflächenaktive Stoffe kommen Emulgier- und/oder Schaum erzeugende Mittel, 5 Dispergiermittel oder Benetzungsmittel mit ionischen oder nicht-ionischen Eigenschaften oder Mischungen dieser oberflächenaktiven Stoffe infrage. Beispiele hierfür sind Salze von Polyacrylsäure, Salze von Lignosulphonsäure, Salze von Phenolsulphonsäure oder Naphthalinsulphonsäure, Polykondensate von Ethylenoxid mit Fettalkoholen oder mit Fettsäuren oder mit Fettaminen, substituierten Phenolen (vorzugsweise Alkylphenole oder Arylphenole), Salze von Sulphobernsteinsäureestern, Taurinderivate (vorzugsweise Alkyltaurate), Phosphorsäureester von polyethoxylierten Alkoholen oder Phenole, 10 Fettsäureester von Polyolen, und Derivate der Verbindungen enthaltend Sulphate, Sulphonate und Phosphate, z.B. Alkylarylpolyglycolether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate, Eiweißhydrolysate, Lignin-Sulfitablaugen und Methylcellulose. Die Anwesenheit einer oberflächenaktiven Substanz ist notwendig, wenn einer der Wirkstoff und/oder einer der inerten Trägerstoffe nicht in Wasser löslich ist und wenn die Anwendung in Wasser erfolgt. Der Anteil an oberflächenaktiven Stoffen 15 liegt zwischen 5 und 40 Gewichtsprozent des erfindungsgemäßen Mittels.

Es können Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z.B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyanblau und organische Farbstoffe, wie Alizarin-, Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Spurennährstoffe, wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink verwendet werden.

20 Gegebenenfalls können auch andere zusätzliche Komponenten enthalten sein, z.B. schützende Kolloide, Bindemittel, Klebstoffe, Verdicker, thixotrope Stoffe, Penetrationsförderer, Stabilisatoren, Sequestiermittel, Komplexbildner. Im Allgemeinen können die Wirkstoffe mit jedem festen oder flüssigen Additiv, welches für Formulierungszwecke gewöhnlich verwendet wird, kombiniert werden.

Im Allgemeinen enthalten die erfindungsgemäßen Mittel und Formulierungen zwischen 0,05 und 99 25 Gew.-%, 0,01 und 98 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0,1 und 95 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 90 % Wirkstoff, ganz besonders bevorzugt zwischen 10 und 70 Gewichtsprozent.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können als solche oder in Abhängigkeit von ihren jeweiligen physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften in Form ihrer Formulierungen oder den daraus bereiteten Anwendungsformen, wie Aerosole, Kapselsuspensionen, Kaltnebelkonzentrate, Heißnebelkonzentrate, verkapselte Granulate, Feingranulate, fließfähige Konzentrate für die Behandlung von 30 Saatgut, gebrauchsfertige Lösungen, verstäubbare Pulver, emulgierbare Konzentrate, Öl-in-Wasser-Emulsionen, Wasser-in-Öl-Emulsionen, Makrogranulate, Mikrogranulate, Öl dispergierbare Pulver, Öl mischbare fließfähige Konzentrate, Öl mischbare Flüssigkeiten, Schäume, Pasten, Pestizid ummanteltes

Saatgut, Suspensionskonzentrate, Suspensions-Emulsions-Konzentrate, lösliche Konzentrate, Suspensionen, Spritzpulver, lösliche Pulver, Stäubemittel und Granulate, wasserlösliche Granulate oder Tabletten, wasserlösliche Pulver für Saatgutbehandlung, benetzbare Pulver, Wirkstoff-imprägnierte Natur- und synthetische Stoffe sowie Feinstverkapselungen in polymeren Stoffen und in Hüllmassen für Saatgut, sowie ULV-Kalt- und Warmnebel-Formulierungen eingesetzt werden.

Die genannten Formulierungen können in an sich bekannter Weise hergestellt werden, z.B. durch Vermischen der Wirkstoffe mit mindestens einem üblichen Streckmittel, Lösungs- bzw. Verdünnungsmittel, Emulgator, Dispergier- und/oder Binde- oder Fixiermittels, Netzmittel, Wasser-Repellent, gegebenenfalls Sikkative und UV-Stabilisatoren und gegebenenfalls Farbstoffen und Pigmenten, Entschäumer, Konservierungsmittel, sekundäre Verdickungsmittel, Kleber, Gibberelline sowie weiteren Verarbeitungshilfsmitteln.

Die erfindungsgemäßen Mittel umfassen nicht nur Formulierungen, welche bereits anwendungsfertig sind und mit einer geeigneten Apparatur auf die Pflanze oder das Saatgut ausgebracht werden können, sondern auch kommerzielle Konzentrate, welche vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden müssen.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können als solche oder in ihren (handelsüblichen) Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit anderen (bekannten) Wirkstoffen, wie Insektiziden, Lockstoffen, Sterilantien, Bakteriziden, Akariziden, Nematiziden, Fungiziden, Wachstumsregulatoren, Herbiziden, Düngemitteln, Safener bzw. Semiochemicals vorliegen.

Die erfindungsgemäße Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteile mit den Wirkstoffen bzw. Mitteln erfolgt direkt oder durch Einwirkung auf deren Umgebung, Lebensraum oder Lagerraum nach den üblichen Behandlungsmethoden, z.B. durch Tauchen, (Ver-)Spritzen, (Ver-)Sprühen, Berieseln, Verdampfen, Zerstäuben, Vernebeln, (Ver-)Streuen, Verschäumen, Bestreichen, Verstreichen, Gießen (drenchen), Tröpfchenbewässerung und bei Vermehrungsmaterial, insbesondere bei Samen, weiterhin durch Trockenbeizen, Nassbeizen, Schlammbeizen, Inkrustieren, ein- oder mehrschichtiges Umhüllen usw. Es ist ferner möglich, die Wirkstoffe nach dem Ultra-Low-Volume-Verfahren auszubringen oder die Wirkstoffzubereitung oder den Wirkstoff selbst in den Boden zu injizieren.

Die Erfindung umfasst weiterhin ein Verfahren zur Behandlung von Saatgut.

Die Erfindung betrifft weiterhin Saatgut, welches gemäß einem der im vorherigen Absatz beschriebenen Verfahren behandelt wurde. Die erfindungsgemäßen Saatgüter finden Anwendung in Verfahren

zum Schutz von Saatgut vor unerwünschten Mikroorganismen. Bei diesen wird ein mit wenigstens einem erfindungsgemäßen Wirkstoff behandeltes Saatgut verwendet.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel sind auch geeignet für die Behandlung von Saatgut. Ein großer Teil des durch Schadorganismen hervorgerufenen Schadens an Kulturpflanzen wird durch
5 den Befall des Saatguts während der Lagerung oder nach der Aussaat sowie während und nach der Keimung der Pflanze ausgelöst. Diese Phase ist besonders kritisch, weil die Wurzeln und Schösslinge der wachsenden Pflanze besonders empfindlich sind und auch nur eine kleine Schädigung zum Tod der Pflanze führen kann. Es besteht daher ein großes Interesse daran, das Saatgut und die keimende Pflanze durch Einsatz geeigneter Mittel zu schützen.

- 10 Die Bekämpfung von phytopathogenen Pilzen durch die Behandlung des Saatguts von Pflanzen ist seit langem bekannt und ist Gegenstand ständiger Verbesserungen. Dennoch ergeben sich bei der Behandlung von Saatgut eine Reihe von Problemen, die nicht immer zufrieden stellend gelöst werden können. So ist es erstrebenswert, Verfahren zum Schutz des Saatguts und der keimenden Pflanze zu entwickeln, die das zusätzliche Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln nach der Saat oder nach dem Auflaufen der
15 Pflanzen überflüssig machen oder zumindest deutlich verringern. Es ist weiterhin erstrebenswert, die Menge des eingesetzten Wirkstoffs dahingehend zu optimieren, dass das Saatgut und die keimende Pflanze vor dem Befall durch phytopathogene Pilze bestmöglich geschützt werden, ohne jedoch die Pflanze selbst durch den eingesetzten Wirkstoff zu schädigen. Insbesondere sollten Verfahren zur Behandlung von Saatgut auch die intrinsischen fungiziden Eigenschaften transgener Pflanzen einbeziehen,
20 um einen optimalen Schutz des Saatguts und der keimenden Pflanze bei einem minimalen Aufwand an Pflanzenschutzmitteln zu erreichen.

- Die vorliegende Erfindung bezieht sich daher auch auf ein Verfahren zum Schutz von Saatgut und keimenden Pflanzen vor dem Befall von phytopathogenen Pilzen, indem das Saatgut mit einem erfindungsgemäßen Mittel behandelt wird. Die Erfindung bezieht sich ebenfalls auf die Verwendung der
25 erfindungsgemäßen Mittel zur Behandlung von Saatgut zum Schutz des Saatguts und der keimenden Pflanze vor phytopathogenen Pilzen. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf Saatgut, welches zum Schutz vor phytopathogenen Pilzen mit einem erfindungsgemäßen Mittel behandelt wurde.

- Die Bekämpfung von phytopathogenen Pilzen, die Pflanzen nach dem Auflaufen schädigen, erfolgt in erster Linie durch die Behandlung des Bodens und der oberirdischen Pflanzenteile mit Pflanzen-
30 schutzmitteln. Aufgrund der Bedenken hinsichtlich eines möglichen Einflusses der Pflanzenschutzmittel auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen und Tieren gibt es Anstrengungen, die Menge der ausgebrachten Wirkstoffe zu vermindern.

Einer der Vorteile der vorliegenden Erfindung ist es, dass aufgrund der besonderen systemischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel die Behandlung des Saatguts mit diesen Wirkstoffen bzw. Mitteln nicht nur das Saatgut selbst, sondern auch die daraus hervorgehenden Pflanzen nach dem Auflaufen vor phytopathogenen Pilzen schützt. Auf diese Weise kann die unmittelbare Behandlung der Kultur zum Zeitpunkt der Aussaat oder kurz danach entfallen.

Ebenso ist es als vorteilhaft anzusehen, dass die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel insbesondere auch bei transgenem Saatgut eingesetzt werden können, wobei die aus diesem Saatgut wachsende Pflanze in der Lage ist, ein Protein zu exprimieren, welches gegen Schädlinge wirkt. Durch die Behandlung solchen Saatguts mit den erfindungsgemäßen Wirkstoffen bzw. Mitteln können bereits durch die Expression des beispielsweise insektiziden Proteins bestimmte Schädlinge bekämpft werden. Überraschenderweise kann dabei ein weiterer synergistischer Effekt beobachtet werden, welcher zusätzlich die Effektivität zum Schutz gegen den Schädlingsbefall vergrößert.

Die erfindungsgemäßen Mittel eignen sich zum Schutz von Saatgut jeglicher Pflanzensorte, die in der Landwirtschaft, im Gewächshaus, in Forsten oder im Garten- und Weinbau eingesetzt wird. Insbesondere handelt es sich dabei um Saatgut von Getreide (wie Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Hirse und Hafer), Mais, Baumwolle, Soja, Reis, Kartoffeln, Sonnenblume, Bohne, Kaffee, Rübe (z.B. Zuckerrübe und Futterrübe), Erdnuss, Raps, Mohn, Olive, Kokosnuss, Kakao, Zuckerrohr, Tabak, Gemüse (wie Tomate, Gurke, Zwiebeln und Salat), Rasen und Zierpflanzen (siehe auch unten). Besondere Bedeutung kommt der Behandlung des Saatguts von Getreide (wie Weizen, Gerste, Roggen, Triticale und Hafer), Mais und Reis zu.

Wie auch weiter unten beschrieben, ist die Behandlung von transgenem Saatgut mit den erfindungsgemäßen Wirkstoffen bzw. Mitteln von besonderer Bedeutung. Dies betrifft das Saatgut von Pflanzen, die wenigstens ein heterologes Gen enthalten, das die Expression eines Polypeptids oder Proteins mit insektiziden Eigenschaften ermöglicht. Das heterologe Gen in transgenem Saatgut kann z.B. aus Mikroorganismen der Arten *Bacillus*, *Rhizobium*, *Pseudomonas*, *Serratia*, *Trichoderma*, *Clavibacter*, *Glomus* oder *Gliocladium* stammen. Bevorzugt stammt dieses heterologe Gen aus *Bacillus* sp., wobei das Genprodukt eine Wirkung gegen den Maiszünsler (European corn borer) und/oder Western Corn Rootworm besitzt. Besonders bevorzugt stammt das heterologe Gen aus *Bacillus thuringiensis*.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird das erfindungsgemäße Mittel alleine oder in einer geeigneten Formulierung auf das Saatgut aufgebracht. Vorzugsweise wird das Saatgut in einem Zustand behandelt, in dem so stabil ist, dass keine Schäden bei der Behandlung auftreten. Im Allgemeinen kann die Behandlung des Saatguts zu jedem Zeitpunkt zwischen der Ernte und der Aussaat erfolgen. Üblicherweise wird Saatgut verwendet, das von der Pflanze getrennt und von Kolben, Schalen, Stängeln, Hülle, Wolle oder Fruchtfleisch befreit wurde. So kann zum Beispiel Saatgut verwendet wer-

den, das geerntet, gereinigt und bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt von unter 15 Gew.-% getrocknet wurde. Alternativ kann auch Saatgut verwendet werden, das nach dem Trocknen z.B. mit Wasser behandelt und dann erneut getrocknet wurde.

5 Im Allgemeinen muss bei der Behandlung des Saatguts darauf geachtet werden, dass die Menge des auf das Saatgut aufgetragenen erfindungsgemäßen Mittels und/oder weiterer Zusatzstoffe so gewählt wird, dass die Keimung des Saatguts nicht beeinträchtigt bzw. die daraus hervorgehende Pflanze nicht geschädigt wird. Dies ist vor allem bei Wirkstoffen zu beachten, die in bestimmten Aufwand-

10 Die erfindungsgemäßen Mittel können unmittelbar aufgebracht werden, also ohne weitere Komponenten zu enthalten und ohne verdünnt worden zu sein. In der Regel ist es vorzuziehen, die Mittel in Form einer geeigneten Formulierung auf das Saatgut aufzubringen. Geeignete Formulierungen und Verfahren für die Saatgutbehandlung sind dem Fachmann bekannt und werden z.B. in den folgenden Dokumenten beschrieben: US 4,272,417 A, US 4,245,432 A, US 4,808,430 A, US 5,876,739 A, US 2003/0176428 A1, WO 2002/080675 A1, WO 2002/028186 A2.

15 Die erfindungsgemäß verwendbaren Wirkstoffe können in die üblichen Beizmittel-Formulierungen überführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Schäume, Slurries oder andere Hüllmassen für Saatgut, sowie ULV-Formulierungen.

20 Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, indem man die Wirkstoffe mit üblichen Zusatzstoffen vermischt, wie zum Beispiel übliche Streckmittel sowie Lösungs- oder Verdünnungsmittel, Farbstoffe, Netzmittel, Dispergiermittel, Emulgatoren, Entschäumer, Konservierungsmittel, sekundäre Verdickungsmittel, Kleber, Gibberelline und auch Wasser.

25 Als Farbstoffe, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle für derartige Zwecke üblichen Farbstoffe in Betracht. Dabei sind sowohl in Wasser wenig lösliche Pigmente als auch in Wasser lösliche Farbstoffe verwendbar. Als Beispiele genannt seien die unter den Bezeichnungen Rhodamin B, C.I. Pigment Red 112 und C.I. Solvent Red 1 bekannten Farbstoffe.

30 Als Netzmittel, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen, die Benetzung fördernden Stoffe in Frage. Vorzugsweise verwendbar sind Alkyl-naphthalin-Sulfonate, wie Diisopropyl- oder Diisobutyl-naphthalin-Sulfonate.

Als Dispergiermittel und/oder Emulgatoren, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirk-

stoffen üblichen nichtionischen, anionischen und kationischen Dispergiermittel in Betracht. Vorzugsweise verwendbar sind nichtionische oder anionische Dispergiermittel oder Gemische von nichtionischen oder anionischen Dispergiermitteln. Als geeignete nichtionische Dispergiermittel sind insbesondere Ethylenoxid-Propylenoxid Blockpolymere, Alkylphenolpolyglykolether sowie Tristryrylphenolpolyglykolether und deren phosphatierte oder sulfatierte Derivate zu nennen. Geeignete anionische Dispergiermittel sind insbesondere Ligninsulfonate, Polyacrylsäuresalze und Arylsulfonat-Formaldehydkondensate.

Als Entschäumer können in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen schaumhemmenden Stoffe enthalten sein. Vorzugsweise verwendbar sind Silikonentschäumer und Magnesiumstearat.

Als Konservierungsmittel können in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen alle für derartige Zwecke in agrochemischen Mitteln einsetzbaren Stoffe vorhanden sein. Beispielhaft genannt seien Dichlorophen und Benzylalkoholhemiformal.

Als sekundäre Verdickungsmittel, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle für derartige Zwecke in agrochemischen Mitteln einsetzbaren Stoffe in Frage. Vorzugsweise in Betracht kommen Cellulosederivate, Acrylsäurederivate, Xanthan, modifizierte Tone und hochdisperse Kieselsäure.

Als Kleber, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle üblichen in Beizmitteln einsetzbaren Bindemittel in Frage. Vorzugsweise genannt seien Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylacetat, Polyvinylalkohol und Tylose.

Als Gibberelline, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen vorzugsweise die Gibberelline A1, A3 (= Gibberellinsäure), A4 und A7 infrage, besonders bevorzugt verwendet man die Gibberellinsäure. Die Gibberelline sind bekannt (vgl. R. Wegler „Chemie der Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel“, Bd. 2, Springer Verlag, 1970, S. 401-412).

Die erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen können entweder direkt oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser zur Behandlung von Saatgut der verschiedensten Art, auch von Saatgut transgener Pflanzen, eingesetzt werden. Dabei können im Zusammenwirken mit den durch Expression gebildeten Substanzen auch zusätzliche synergistische Effekte auftreten.

Zur Behandlung von Saatgut mit den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen oder den daraus durch Zugabe von Wasser hergestellten Zubereitungen kommen alle üblicherweise für die Beizung einsetzbaren Mischgeräte in Betracht. Im einzelnen geht man bei der Beizung so vor, dass man

das Saatgut in einen Mischer gibt, die jeweils gewünschte Menge an Beizmittel-Formulierungen entweder als solche oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser hinzufügt und bis zur gleichmäßigen Verteilung der Formulierung auf dem Saatgut mischt. Gegebenenfalls schließt sich ein Trocknungsvorgang an.

- 5 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel weisen eine starke mikrobizide Wirkung auf und können zur Bekämpfung von unerwünschten Mikroorganismen, wie Pilzen und Bakterien, im Pflanzenschutz und im Materialschutz eingesetzt werden.

Fungizide lassen sich im Pflanzenschutz zur Bekämpfung von Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes und Deuteromycetes einsetzen.

- 10 Bakterizide lassen sich im Pflanzenschutz zur Bekämpfung von Pseudomonadaceae, Rhizobiaceae, Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae und Streptomycetaceae einsetzen.

Die erfindungsgemäßen fungiziden Mittel können zur Bekämpfung von phytopathogenen Pilzen kurativ oder protektiv eingesetzt werden. Die Erfindung betrifft daher auch kurative und protektive Verfahren zum Bekämpfen von phytopathogenen Pilzen durch die Verwendung der erfindungsgemäßen

- 15 Wirkstoffe oder Mittel, welche auf das Saatgut, die Pflanze oder Pflanzenteile, die Früchten oder den Boden, in welcher die Pflanzen wachsen, ausgebracht wird.

Die erfindungsgemäßen Mittel zum Bekämpfen von phytopathogenen Pilzen im Pflanzenschutz umfassen eine wirksame, aber nicht-phytotoxische Menge der erfindungsgemäßen Wirkstoffe. „Wirksame, aber nicht-phytotoxische Menge“ bedeutet eine Menge des erfindungsgemäßen Mittels, die

20 ausreichend ist, um die Pilzerkrankung der Pflanze ausreichend zu kontrollieren oder ganz abzutöten und die gleichzeitig keine nennenswerten Symptome von Phytotoxizität mit sich bringt. Diese Aufwandmenge kann im Allgemeinen in einem größeren Bereich variieren. Sie hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. vom zu bekämpfenden Pilz, der Pflanze, den klimatischen Verhältnissen und den Inhaltsstoffen der erfindungsgemäßen Mittel.

- 25 Die gute Pflanzenverträglichkeit der Wirkstoffe in den zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten notwendigen Konzentrationen erlaubt eine Behandlung von oberirdischen Pflanzenteilen, von Pflanz- und Saatgut, und des Bodens.

- Erfindungsgemäß können alle Pflanzen und Pflanzenteile behandelt werden. Unter Pflanzen werden hierbei alle Pflanzen und Pflanzenpopulationen verstanden, wie erwünschte und unerwünschte Wildpflanzen oder Kulturpflanzen (einschließlich natürlich vorkommender Kulturpflanzen). Kulturpflanzen können Pflanzen sein, die durch konventionelle Züchtungs- und Optimierungsmethoden oder
- 30 durch biotechnologische und gentechnologische Methoden oder Kombinationen dieser Methoden er-

halten werden können, einschließlich der transgenen Pflanzen und einschließlich der durch Sortenschutzrechte schützbaeren oder nicht schützbaeren Pflanzensorten. Unter Pflanzenteilen sollen alle oberirdischen und unterirdischen Teile und Organe der Pflanzen, wie Spross, Blatt, Blüte und Wurzel verstanden werden, wobei beispielhaft Blätter, Nadeln, Stängel, Stämme, Blüten, Fruchtkörper, Früchte und Samen sowie Wurzeln, Knollen und Rhizome aufgeführt werden. Zu den Pflanzenteilen gehört auch Erntegut sowie vegetatives und generatives Vermehrungsmaterial, beispielsweise Stecklinge, Knollen, Rhizome, Ableger und Samen.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe eignen sich bei guter Pflanzenverträglichkeit, günstiger Warmblüttoxizität und guter Umweltverträglichkeit zum Schutz von Pflanzen und Pflanzenorganen, zur Steigerung der Ernteerträge, Verbesserung der Qualität des Erntegutes. Sie können vorzugsweise als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Sie sind gegen normal sensible und resistente Arten sowie gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien wirksam.

Als Pflanzen, welche erfindungsgemäß behandelt werden können, seien folgende erwähnt: Baumwolle, Flachs, Weinrebe, Obst, Gemüse, wie *Rosaceae sp.* (beispielsweise Kernfrüchte wie Apfel und Birne, aber auch Steinfrüchte wie Aprikosen, Kirschen, Mandeln und Pfirsiche und Beerenfrüchte wie Erdbeeren), *Ribesioideae sp.*, *Juglandaceae sp.*, *Betulaceae sp.*, *Anacardiaceae sp.*, *Fagaceae sp.*, *Moraceae sp.*, *Oleaceae sp.*, *Actinidaceae sp.*, *Lauraceae sp.*, *Musaceae sp.* (beispielsweise Bananenbäume und -plantagen), *Rubiaceae sp.* (beispielsweise Kaffee), *Theaceae sp.*, *Sterculiaceae sp.*, *Rutaceae sp.* (beispielsweise Zitronen, Orangen und Grapefruit); *Solanaceae sp.* (beispielsweise Tomaten), *Liliaceae sp.*, *Asteraceae sp.* (beispielsweise Salat), *Umbelliferae sp.*, *Cruciferae sp.*, *Chenopodiaceae sp.*, *Cucurbitaceae sp.* (beispielsweise Gurke), *Alliaceae sp.* (beispielsweise Lauch, Zwiebel), *Papilionaceae sp.* (beispielsweise Erbsen); Hauptnutzpflanzen, wie *Gramineae sp.* (beispielsweise Mais, Rasen, Getreide wie Weizen, Roggen, Reis, Gerste, Hafer, Hirse und Triticale), *Asteraceae sp.* (beispielsweise Sonnenblume), *Brassicaceae sp.* (beispielsweise Weißkohl, Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Pak Choi, Kohlrabi, Radieschen sowie Raps, Senf, Meerrettich und Kresse), *Fabaceae sp.* (beispielsweise Bohne, Erdnüsse), *Papilionaceae sp.* (beispielsweise Sojabohne), *Solanaceae sp.* (beispielsweise Kartoffeln), *Chenopodiaceae sp.* (beispielsweise Zuckerrübe, Futterrübe, Mangold, Rote Rübe); Nutzpflanzen und Zierpflanzen in Garten und Wald; sowie jeweils genetisch modifizierte Arten dieser Pflanzen.

Wie bereits oben erwähnt, können erfindungsgemäß alle Pflanzen und deren Teile behandelt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform werden wild vorkommende oder durch konventionelle biologische Zuchtmethoden, wie Kreuzung oder Protoplastenfusion erhaltenen Pflanzenarten und Pflanzensorten sowie deren Teile behandelt. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden transgene Pflanzen und Pflanzensorten, die durch gentechnologische Methoden gegebenenfalls in

Kombination mit konventionellen Methoden erhalten wurden (Genetically Modified Organisms) und deren Teile behandelt. Der Begriff „Teile“ bzw. „Teile von Pflanzen“ oder „Pflanzenteile“ wurde oben erläutert. Besonders bevorzugt werden erfindungsgemäß Pflanzen der jeweils handelsüblichen oder in Gebrauch befindlichen Pflanzensorten behandelt. Unter Pflanzensorten versteht man Pflanzen mit neuen Eigenschaften („Traits“), die sowohl durch konventionelle Züchtung, durch Mutagenese oder durch rekombinante DNA-Techniken gezüchtet worden sind. Dies können Sorten, Rassen, Bio- und Genotypen sein.

Das erfindungsgemäße Behandlungsverfahren kann für die Behandlung von genetisch modifizierten Organismen (GMOs), z. B. Pflanzen oder Samen, verwendet werden. Genetisch modifizierte Pflanzen (oder transgene Pflanzen) sind Pflanzen, bei denen ein heterologes Gen stabil in das Genom integriert worden ist. Der Begriff „heterologes Gen“ bedeutet im wesentlichen ein Gen, das außerhalb der Pflanze bereitgestellt oder assembliert wird und das bei Einführung in das Zellkerngenom, das Chloroplastengenom oder das Mitochondriengenom der transformierten Pflanze dadurch neue oder verbesserte agronomische oder sonstige Eigenschaften verleiht, dass es ein interessierendes Protein oder Polypeptid exprimiert oder dass es ein anderes Gen, das in der Pflanze vorliegt bzw. andere Gene, die in der Pflanze vorliegen, herunterreguliert oder abschaltet (zum Beispiel mittels Antisense-Technologie, Cosuppressionstechnologie oder RNAi-Technologie [RNA Interference]). Ein heterologes Gen, das im Genom vorliegt, wird ebenfalls als Transgen bezeichnet. Ein Transgen, das durch sein spezifisches Vorliegen im Pflanzengenom definiert ist, wird als Transformations- bzw. transgenes Event bezeichnet.

In Abhängigkeit von den Pflanzenarten oder Pflanzensorten, ihrem Standort und ihren Wachstumsbedingungen (Böden, Klima, Vegetationsperiode, Ernährung) kann die erfindungsgemäße Behandlung auch zu überadditiven („synergistischen“) Effekten führen. So sind zum Beispiel die folgenden Effekte möglich, die über die eigentlich zu erwartenden Effekte hinausgehen: verringerte Aufwandsmengen und/oder erweitertes Wirkungsspektrum und/oder erhöhte Wirksamkeit der Wirkstoffe und Zusammensetzungen, die erfindungsgemäß eingesetzt werden können, besseres Pflanzenwachstum, erhöhte Toleranz gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen, erhöhte Toleranz gegenüber Trockenheit oder Wasser- oder Bodensalzgehalt, erhöhte Blühleistung, Ernteerleichterung, Reifebeschleunigung, höhere Erträge, größere Früchte, größere Pflanzenhöhe, intensiver grüne Farbe des Blatts, frühere Blüte, höhere Qualität und/oder höherer Nährwert der Ernteprodukte, höhere Zuckerkonzentration in den Früchten, bessere Lagerfähigkeit und/oder Verarbeitbarkeit der Ernteprodukte.

In gewissen Aufwandsmengen können die erfindungsgemäßen Wirkstoffe auch eine stärkende Wirkung auf Pflanzen ausüben. Sie eignen sich daher für die Mobilisierung des pflanzlichen Abwehrsystems gegen Angriff durch unerwünschte phytopathogene Pilze und/oder Mikroorganismen und/oder

Viren. Dies kann gegebenenfalls einer der Gründe für die erhöhte Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Kombinationen sein, zum Beispiel gegen Pilze. Pflanzenstärkende (resistenzinduzierende) Substanzen sollen im vorliegenden Zusammenhang auch solche Substanzen oder Substanzkombinationen bedeuten, die fähig sind, das pflanzliche Abwehrsystem so zu stimulieren, dass die behandelten Pflanzen, wenn sie im Anschluss daran mit unerwünschten phytopathogenen Pilzen inokuliert wurden, einen beträchtlichen Resistenzgrad gegen diese unerwünschten phytopathogenen Pilze aufweisen. Die erfindungsgemäßen Substanzen lassen sich daher zum Schutz von Pflanzen gegen Angriff durch die erwähnten Pathogene innerhalb eines gewissen Zeitraums nach der Behandlung einsetzen. Der Zeitraum, über den eine Schutzwirkung erzielt wird, erstreckt sich im allgemeinen von 1 bis 10 Tagen, vorzugsweise 1 bis 7 Tagen, nach der Behandlung der Pflanzen mit den Wirkstoffen.

Zu Pflanzen und Pflanzensorten, die vorzugsweise erfindungsgemäß behandelt werden, zählen alle Pflanzen, die über Erbgut verfügen, das diesen Pflanzen besonders vorteilhafte, nützliche Merkmale verleiht (egal, ob dies durch Züchtung und/oder Biotechnologie erzielt wurde).

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls vorzugsweise erfindungsgemäß behandelt werden, sind gegen einen oder mehrere biotische Stressfaktoren resistent, d. h. diese Pflanzen weisen eine verbesserte Abwehr gegen tierische und mikrobielle Schädlinge wie Nematoden, Insekten, Milben, phytopathogene Pilze, Bakterien, Viren und/oder Viroide auf.

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind solche Pflanzen, die gegen einen oder mehrere abiotische Stressfaktoren resistent sind. Zu den abiotischen Stressbedingungen können zum Beispiel Dürre, Kälte- und Hitzebedingungen, osmotischer Stress, Staunässe, erhöhter Bodensalzgehalt, erhöhtes Ausgesetztsein an Mineralien, Ozonbedingungen, Starklichtbedingungen, beschränkte Verfügbarkeit von Stickstoffnährstoffen, beschränkte Verfügbarkeit von Phosphornährstoffen oder Vermeidung von Schatten zählen.

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind solche Pflanzen, die durch erhöhte Ertrageigenschaften gekennzeichnet sind. Ein erhöhter Ertrag kann bei diesen Pflanzen z. B. auf verbesserter Pflanzenphysiologie, verbessertem Pflanzenwuchs und verbesserter Pflanzenentwicklung, wie Wasserverwertungseffizienz, Wasserhalteeffizienz, verbesserter Stickstoffverwertung, erhöhter Kohlenstoffassimilation, verbesserter Photosynthese, verstärkter Keimkraft und beschleunigter Abreife beruhen. Der Ertrag kann weiterhin durch eine verbesserte Pflanzenarchitektur (unter Stress- und Nicht-Stress-Bedingungen) beeinflusst werden, darunter frühe Blüte, Kontrolle der Blüte für die Produktion von Hybridsaatgut, Keimpflanzenwüchsigkeit, Pflanzengröße, Internodienzahl und -abstand, Wurzelwachstum, Samengröße, Fruchtgröße, Schotengröße, Schoten- oder Ährenzahl, Anzahl der Samen pro Schote oder Ähre, Samenmasse, verstärkte Samenfüllung, verringerter Samenausfall, verringertes Schotenplatzen sowie Standfestigkeit. Zu weiteren

Ertragsmerkmalen zählen Samenzusammensetzung wie Kohlenhydratgehalt, Proteingehalt, Ölgehalt und Ölzusammensetzung, Nährwert, Verringerung der nährwidrigen Verbindungen, verbesserte Verarbeitbarkeit und verbesserte Lagerfähigkeit.

Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Hybridpflanzen, die bereits die Eigenschaften der Heterosis bzw. des Hybrideffekts exprimieren, was im allgemeinen zu höherem Ertrag, höherer Wüchsigkeit, besserer Gesundheit und besserer Resistenz gegen biotische und abiotische Stressfaktoren führt. Solche Pflanzen werden typischerweise dadurch erzeugt, dass man eine ingezüchtete pollensterile Elternlinie (den weiblichen Kreuzungspartner) mit einer anderen ingezüchteten pollenfertilen Elternlinie (dem männlichen Kreuzungspartner) kreuzt. Das Hybridsaatgut wird typischerweise von den pollensterilen Pflanzen geerntet und an Vermehrer verkauft. Pollensterile Pflanzen können manchmal (z. B. beim Mais) durch Entfahnen (d. h. mechanischem Entfernen der männlichen Geschlechtsorgane bzw. der männlichen Blüten), produziert werden; es ist jedoch üblicher, dass die Pollensterilität auf genetischen Determinanten im Pflanzengenom beruht. In diesem Fall, insbesondere dann, wenn es sich bei dem gewünschten Produkt, da man von den Hybridpflanzen ernten will, um die Samen handelt, ist es üblicherweise günstig, sicherzustellen, dass die Pollenfertilität in Hybridpflanzen, die die für die Pollensterilität verantwortlichen genetischen Determinanten enthalten, völlig restoriert wird. Dies kann erreicht werden, indem sichergestellt wird, dass die männlichen Kreuzungspartner entsprechende Fertilitätsrestorergene besitzen, die in der Lage sind, die Pollenfertilität in Hybridpflanzen, die die genetischen Determinanten, die für die Pollensterilität verantwortlich sind, enthalten, zu restorieren. Genetische Determinanten für Pollensterilität können im Cytoplasma lokalisiert sein. Beispiele für cytoplasmatische Pollensterilität (CMS) wurden zum Beispiel für Brassica-Arten beschrieben. Genetische Determinanten für Pollensterilität können jedoch auch im Zellkerngenom lokalisiert sein. Pollensterile Pflanzen können auch mit Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie Gentechnik, erhalten werden. Ein besonders günstiges Mittel zur Erzeugung von pollensterilen Pflanzen ist in WO 89/10396 beschrieben, wobei zum Beispiel eine Ribonuklease wie eine Barnase selektiv in den Tapetumzellen in den Staubblättern exprimiert wird. Die Fertilität kann dann durch Expression eines Ribonukleasehemmers wie Barstar in den Tapetumzellen restoriert werden.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die mit Methoden der Pflanzenbiotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten werden), die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind herbizidtolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen, die gegenüber einem oder mehreren vorgegebenen Herbiziden tolerant gemacht worden sind. Solche Pflanzen können entweder durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Herbizidtoleranz verleiht, erhalten werden.

Herbizidtolerante Pflanzen sind zum Beispiel glyphosatetolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen, die gegenüber dem Herbizid Glyphosate oder dessen Salzen tolerant gemacht worden sind. So können zum

Beispiel glyphosatetolerante Pflanzen durch Transformation der Pflanze mit einem Gen, das für das Enzym 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphatsynthase (EPSPS) kodiert, erhalten werden. Beispiele für solche EPSPS-Gene sind das AroA-Gen (Mutante CT7) des Bakterium *Salmonella typhimurium*, das CP4-Gen des Bakteriums *Agrobacterium sp.*, die Gene, die für eine EPSPS aus der Petunie, für eine
5 EPSPS aus der Tomate oder für eine EPSPS aus Eleusine kodieren. Es kann sich auch um eine mutierte EPSPS handeln. Glyphosatetolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, dass man ein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-Oxidoreduktase-Enzym kodiert. Glyphosatetolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, dass man ein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-acetyltransferase-Enzym kodiert. Glyphosatetolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten wer-
10 den, dass man Pflanzen, die natürlich vorkommende Mutationen der oben erwähnten Gene enthalten, selektiert.

Sonstige herbizidresistente Pflanzen sind zum Beispiel Pflanzen, die gegenüber Herbiziden, die das Enzym Glutaminsynthase hemmen, wie Bialaphos, Phosphinotricin oder Glufosinate, tolerant gemacht worden sind. Solche Pflanzen können dadurch erhalten werden, dass man ein Enzym exprimiert, das
15 das Herbizid oder eine Mutante des Enzyms Glutaminsynthase, das gegenüber Hemmung resistent ist, entgiftet. Solch ein wirksames entgiftendes Enzym ist zum Beispiel ein Enzym, das für ein Phosphinotricin-acetyltransferase kodiert (wie zum Beispiel das bar- oder pat-Protein aus Streptomyces-Arten). Pflanzen, die eine exogene Phosphinotricin-acetyltransferase exprimieren, sind beschrieben.

Weitere herbizidtolerante Pflanzen sind auch Pflanzen, die gegenüber den Herbiziden, die das Enzym
20 Hydroxyphenylpyruvate-dioxygenase (HPPD) hemmen, tolerant gemacht worden sind. Bei den Hydroxyphenylpyruvate-dioxygenasen handelt es sich um Enzyme, die die Reaktion, in der para-Hydroxyphenylpyruvat (HPP) zu Homogentisat umgesetzt wird, katalysieren. Pflanzen, die gegenüber HPPD-Hemmern tolerant sind, können mit einem Gen, das für ein natürlich vorkommendes resistentes HPPD-Enzym kodiert, oder einem Gen, das für ein mutiertes HPPD-Enzym kodiert, transformiert
25 werden. Eine Toleranz gegenüber HPPD-Hemmern kann auch dadurch erzielt werden, dass man Pflanzen mit Genen transformiert, die für gewisse Enzyme kodieren, die die Bildung von Homogentisat trotz Hemmung des nativen HPPD-Enzyms durch den HPPD-Hemmer ermöglichen. Die Toleranz von Pflanzen gegenüber HPPD-Hemmern kann auch dadurch verbessert werden, dass man Pflanzen zusätzlich zu einem Gen, das für ein HPPD-tolerantes Enzym kodiert, mit einem Gen transformiert,
30 das für ein Prephenatdehydrogenase-Enzym kodiert.

Weitere herbizidresistente Pflanzen sind Pflanzen, die gegenüber Acetolactatsynthase (ALS)-Hemmern tolerant gemacht worden sind. Zu bekannten ALS-Hemmern zählen zum Beispiel Sulfonylharnstoff, Imidazolinon, Triazolopyrimidine, Pyrimidinyloxy(thio)benzoate und/oder Sulfonylaminocarbonyltriazolinon-Herbizide. Es ist bekannt, dass verschiedene Mutationen im Enzym ALS

(auch als Acetohydroxysäure-Synthase, AHAS, bekannt) eine Toleranz gegenüber unterschiedlichen Herbiziden bzw. Gruppen von Herbiziden verleihen. Die Herstellung von sulfonylharnstofftoleranten Pflanzen und imidazolinontoleranten Pflanzen ist in der internationalen Veröffentlichung WO 1996/033270 beschrieben. Weitere sulfonylharnstoff- und imidazolinontolerante Pflanzen sind auch
5 in z.B. WO 2007/024782 beschrieben.

Weitere Pflanzen, die gegenüber Imidazolinon und/oder Sulfonylharnstoff tolerant sind, können durch induzierte Mutagenese, Selektion in Zellkulturen in Gegenwart des Herbizids oder durch Mutationszüchtung erhalten werden.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind insektenresistente transgene Pflanzen, d.h. Pflanzen, die gegen Befall mit gewissen Zielinsekten resistent gemacht wurden. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Insektenresistenz verleiht, erhalten werden.
10

Der Begriff „insektenresistente transgene Pflanze“ umfaßt im vorliegenden Zusammenhang jegliche Pflanze, die mindestens ein Transgen enthält, das eine Kodiersequenz umfaßt, die für folgendes kodiert:
15

- 1) ein insektizides Kristallprotein aus *Bacillus thuringiensis* oder einen insektiziden Teil davon, wie die insektiziden Kristallproteine, die online bei:

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/ beschrieben sind, zusammengestellt wurden, oder insektizide Teile davon, z.B. Proteine der Cry-Proteinklassen Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1F, Cry2Ab, Cry3Ae oder Cry3Bb oder insektizide Teile davon; oder
20

- 2) ein Kristallprotein aus *Bacillus thuringiensis* oder einen Teil davon, der in Gegenwart eines zweiten, anderen Kristallproteins aus *Bacillus thuringiensis* oder eines Teils davon insektizid wirkt, wie das binäre Toxin, das aus den Kristallproteinen Cy34 und Cy35 besteht; oder

- 3) ein insektizides Hybridprotein, das Teile von zwei unterschiedlichen insektiziden Kristallproteinen aus *Bacillus thuringiensis* umfaßt, wie zum Beispiel ein Hybrid aus den Proteinen von 1) oben oder ein Hybrid aus den Proteinen von 2) oben, z. B. das Protein Cry1A.105, das von dem Mais-Event MON98034 produziert wird (WO 2007/027777); oder
25

- 4) ein Protein gemäß einem der Punkte 1) bis 3) oben, in dem einige, insbesondere 1 bis 10, Aminosäuren durch eine andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhere insektizide Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenart zu erzielen und/oder um das Spektrum der ent-
30

sprechenden Zielinsektenarten zu erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die Kodier- DNA während der Klonierung oder Transformation induziert wurden, wie das Protein Cry3Bb1 in Mais-Events MON863 oder MON88017 oder das Protein Cry3A im Mais-Event MIR 604;

- 5 5) ein insektizides sezerniertes Protein aus *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus* oder einen insektiziden Teil davon, wie die vegetativ wirkenden insektentoxischen Proteine (vegetative insecticidal proteins, VIP), die unter

http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/vip.html angeführt sind, z. B. Proteine der Proteinklasse VIP3Aa; oder

- 10 6) ein sezerniertes Protein aus *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus*, das in Gegenwart eines zweiten sezernierten Proteins aus *Bacillus thuringiensis* oder *B. cereus* insektizid wirkt, wie das binäre Toxin, das aus den Proteinen VIP1A und VIP2A besteht.

- 7) ein insektizides Hybridprotein, das Teile von verschiedenen sezernierten Proteinen von *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus* umfaßt, wie ein Hybrid der Proteine von 1) oder ein
15 Hybrid der Proteine von 2) oben; oder

- 8) ein Protein gemäß einem der Punkte 1) bis 3) oben, in dem einige, insbesondere 1 bis 10, Aminosäuren durch eine andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhere insektizide Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenart zu erzielen und/oder um das Spektrum der entsprechenden Zielinsektenarten zu erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die Kodier- DNA während der Klonierung oder Transformation induziert wurden (wobei die Kodierung für ein insektizides Protein erhalten bleibt), wie das Protein VIP3Aa im Baumwoll-
20 Event COT 102.

Natürlich zählt zu den insektenresistenten transgenen Pflanzen im vorliegenden Zusammenhang auch jegliche Pflanze, die eine Kombination von Genen umfasst, die für die Proteine von einer der oben
25 genannten Klassen 1 bis 8 kodieren. In einer Ausführungsform enthält eine insektenresistente Pflanze mehr als ein Transgen, das für ein Protein nach einer der oben genannten Klassen 1 bis 8 kodiert, um das Spektrum der entsprechenden Zielinsektenarten zu erweitern oder um die Entwicklung einer Resistenz der Insekten gegen die Pflanzen dadurch hinauszuzögern, dass man verschiedene Proteine einsetzt, die für dieselbe Zielinsektenart insektizid sind, jedoch eine unterschiedliche Wirkungsweise,
30 wie Bindung an unterschiedliche Rezeptorbindungsstellen im Insekt, aufweisen.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind gegenüber abio-

tischen Streßfaktoren tolerant. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Streßresistenz verleiht, erhalten werden. Zu besonders nützlichen Pflanzen mit Streßtoleranz zählen folgende:

- a. Pflanzen, die ein Transgen enthalten, das die Expression und/oder Aktivität des Gens für die Poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) in den Pflanzenzellen oder Pflanzen zu reduzieren vermag.
 - b. Pflanzen, die ein streßtoleranzförderndes Transgen enthalten, das die Expression und/oder Aktivität der für PARP kodierenden Gene der Pflanzen oder Pflanzenzellen zu reduzieren vermag;
 - c. Pflanzen, die ein streßtoleranzförderndes Transgen enthalten, das für ein in Pflanzen funktionelles Enzym des Nicotinamidadenindinukleotid-Salvage-Biosynthesewegs kodiert, darunter Nicotinamidase, Nicotinatphosphoribosyltransferase, Nicotinsäuremononukleotidadenyltransferase, Nicotinamidadenindinukleotidsynthetase oder Nicotinamidphosphoribosyltransferase.
- Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, weisen eine veränderte Menge, Qualität und/oder Lagerfähigkeit des Ernteprodukts und/oder veränderte Eigenschaften von bestimmten Bestandteilen des Ernteprodukts auf, wie zum Beispiel:
- 1) Transgene Pflanzen, die eine modifizierte Stärke synthetisieren, die bezüglich ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften, insbesondere des Amylosegehalts oder des Amylose/Amylopektin-Verhältnisses, des Verzweigungsgrads, der durchschnittlichen Kettenlänge, der Verteilung der Seitenketten, des Viskositätsverhaltens, der Gelfestigkeit, der Stärkekorngröße und/oder Stärkekornmorphologie im Vergleich mit der synthetisierten Stärke in Wildtyp-pflanzenzellen oder -pflanzen verändert ist, so dass sich diese modifizierte Stärke besser für bestimmte Anwendungen eignet.
 - 2) Transgene Pflanzen, die Nichtstärkekohlenhydratpolymere synthetisieren, oder Nichtstärkekohlenhydratpolymere, deren Eigenschaften im Vergleich zu Wildtyppflanzen ohne genetische Modifikation verändert sind. Beispiele sind Pflanzen, die Polyfructose, insbesondere des Inulin- und Levantyps, produzieren, Pflanzen, die alpha-1,4-Glucane produzieren, Pflanzen, die alpha-1,6-verzweigte alpha-1,4-Glucane produzieren und Pflanzen, die Alternan produzieren.
 - 3) Transgene Pflanzen, die Hyaluronan produzieren.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit veränderten Fasereigenschaften. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Fasereigenschaften verleiht, erhalten werden; dazu zählen:

- a) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderte Form von Cellulosesynthasegenen enthalten,
- b) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderte Form von rsw2- oder rsw3-homologen Nukleinsäuren enthalten;
- 10 c) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhten Expression der Saccharosephosphatsynthase;
- d) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhten Expression der Saccharosesynthase;
- e) Pflanzen wie Baumwollpflanzen bei denen der Zeitpunkt der Durchlaßsteuerung der Plasmodesmen an der Basis der Faserzelle verändert ist, z. B. durch Herunterregulieren der faserselektiven β -1,3-Glucanase;
- 15 f) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit Fasern mit veränderter Reaktivität, z. B. durch Expression des N-Acetylglucosamintransferasegens, darunter auch nodC, und von Chitinsynthasegenen.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Raps oder verwandte Brassica-Pflanzen mit veränderten Eigenschaften der Ölzusammensetzung. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Öleigenschaften verleiht, erhalten werden; dazu zählen:

- a) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem hohen Ölsäuregehalt produziere;
- 25 b) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigen Linolensäuregehalt produzieren.
- c) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigen gesättigten Fettsäuregehalt produzieren.

Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen mit einem oder mehreren Genen, die für ein oder mehrere Toxine kodieren, sind die transgenen Pflanzen, die unter den folgenden Handelsbezeichnungen angeboten werden: YIELD GARD® (zum

Beispiel Mais, Baumwolle, Sojabohnen), KnockOut® (zum Beispiel Mais), BiteGard® (zum Beispiel Mais), BT-Xtra® (zum Beispiel Mais), StarLink® (zum Beispiel Mais), Bollgard® (Baumwolle), Nucotn® (Baumwolle), Nucotn 33B® (Baumwolle), NatureGard® (zum Beispiel Mais), Protecta® und NewLeaf® (Kartoffel). Herbizidtolerante Pflanzen, die zu erwähnen sind, sind zum Beispiel
5 Maissorten, Baumwollsorten und Sojabohnensorten, die unter den folgenden Handelsbezeichnungen angeboten werden: Roundup Ready® (Glyphosatetoleranz, zum Beispiel Mais, Baumwolle, Sojabohne), Liberty Link® (Phosphinotricintoleranz, zum Beispiel Raps), IMI® (Imidazolinontoleranz) und SCS® (Sylfonylharnstofftoleranz), zum Beispiel Mais. Zu den herbizidresistenten Pflanzen (traditionell auf Herbizidtoleranz gezüchtete Pflanzen), die zu erwähnen sind, zählen die unter der Be-
10 zeichnung Clearfield® angebotenen Sorten (zum Beispiel Mais).

Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen, die Transformations-Events, oder eine Kombination von Transformations-Events, enthalten und die zum Beispiel in den Dateien von verschiedenen nationalen oder regionalen Behörden angeführt sind (siehe zum Beispiel http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx und <http://www.agbios.com/dbase.php>).

15 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können außerdem im Materialschutz zum Schutz von technischen Materialien gegen Befall und Zerstörung durch unerwünschten Mikroorganismen, wie z.B. Pilzen und Insekten, eingesetzt werden.

Weiter können die erfindungsgemäßen Verbindungen allein oder in Kombinationen mit anderen Wirkstoffen als Antifouling-Mittel eingesetzt werden.

20 Unter technischen Materialien sind im vorliegenden Zusammenhang nichtlebende Materialien zu verstehen, die für die Verwendung in der Technik zubereitet worden sind. Beispielsweise können technische Materialien, die durch erfindungsgemäße Wirkstoffe vor mikrobieller Veränderung oder Zerstörung geschützt werden sollen, Klebstoffe, Leime, Papier, Wandpappe und Karton, Textilien, Teppiche, Leder, Holz, Anstrichmittel und Kunststoffartikel, Kühlschmierstoffe und andere Materialien
25 sein, die von Mikroorganismen befallen oder zersetzt werden können. Im Rahmen der zu schützenden Materialien seien auch Teile von Produktionsanlagen und Gebäuden, z.B. Kühlwasserkreisläufe, Kühl- und Heizsysteme und Belüftungs- und Klimaanlage, genannt, die durch Vermehrung von Mikroorganismen beeinträchtigt werden können. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung seien als technische Materialien vorzugsweise Klebstoffe, Leime, Papiere und Kartone, Leder, Holz, Anstrichmittel, Kühlschmiermittel und Wärmeübertragungsflüssigkeiten genannt, besonders bevorzugt Holz.
30 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können nachteilige Effekte wie Vermodern, Verfall, Ver-, Entfärbung oder Verschimmeln verhindern. Außerdem können die erfindungsgemäßen Verbindungen zum Schutz vor Bewuchs von Gegenständen, insbesondere von Schiffskörpern, Sieben, Net-

zen, Bauwerken, Kaianlagen und Signalanlagen, welche mit See- oder Brackwasser in Verbindung kommen, eingesetzt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Bekämpfen von unerwünschten Pilzen kann auch zum Schutz von so genannten Storage Goods verwendet werden. Unter „Storage Goods“ werden dabei natürliche Substanzen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs oder deren Verarbeitungsprodukte, welche der Natur entnommen wurden und für die Langzeitschutz gewünscht ist, verstanden. Storage Goods pflanzlichen Ursprungs, wie z.B. Pflanzen oder Pflanzenteile, wie Stiele, Blätter, Knollen, Samen, Früchte, Körner, können in frisch geerntetem Zustand oder nach Verarbeitung durch (Vor-)Trocknen, Befeuchten, Zerkleinern, Mahlen, Pressen oder Rösten, geschützt werden. Storage Goods umfasst auch Nutzholz, sei es unverarbeitet, wie Bauholz, Stromleitungsmasten und Schranken, oder in Form fertiger Produkte, wie Möbel. Storage Goods tierischen Ursprungs sind beispielsweise Felle, Leder, Pelze und Haare. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können nachteilige Effekte wie Vermodern, Verfall, Ver-, Entfärbung oder Verschimmeln verhindern.

Beispielhaft, aber nicht begrenzend, seien einige Erreger von pilzlichen Erkrankungen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, genannt:

- Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger des Echten Mehltaus wie z.B. *Blumeria*-Arten, wie beispielsweise *Blumeria graminis*; *Podosphaera*-Arten, wie beispielsweise *Podosphaera leucotricha*; *Sphaerotheca*-Arten, wie beispielsweise *Sphaerotheca fuliginea*; *Uncinula*-Arten, wie beispielsweise *Uncinula necator*;
- Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger von Rostkrankheiten wie z.B. *Gymnosporangium*-Arten, wie beispielsweise *Gymnosporangium sabinae*; *Hemileia*-Arten, wie beispielsweise *Hemileia vastatrix*; *Phakopsora*-Arten, wie beispielsweise *Phakopsora pachyrhizi* und *Phakopsora meibomia*; *Puccinia*-Arten, wie beispielsweise *Puccinia recondita* oder *Puccinia triticina*; *Uromyces*-Arten, wie beispielsweise *Uromyces appendiculatus*;
- Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger der Gruppe der Oomyceten wie z.B. *Bremia*-Arten, wie beispielsweise *Bremia lactucae*; *Peronospora*-Arten, wie beispielsweise *Peronospora pisi* oder *P. brassicae*; *Phytophthora*-Arten, wie beispielsweise *Phytophthora infestans*; *Plasmopara*-Arten, wie beispielsweise *Plasmopara viticola*; *Pseudoperonospora*-Arten, wie beispielsweise *Pseudoperonospora humuli* oder *Pseudoperonospora cubensis*; *Pythium*-Arten, wie beispielsweise *Pythium ultimum*;
- Blattfleckenkrankheiten und Blattwelken, hervorgerufen durch z.B. *Alternaria*-Arten, wie beispielsweise *Alternaria solani*; *Cercospora*-Arten, wie beispielsweise *Cercospora beticola*; *Cladosporium*-Arten, wie beispielsweise *Cladosporium cucumerinum*; *Cochliobolus*-Arten, wie beispielsweise

Cochliobolus sativus (Konidienform: Drechslera, Syn: Helminthosporium); Colletotrichum-Arten, wie beispielsweise Colletotrichum lindemuthianum; Cycloconium-Arten, wie beispielsweise Cycloconium oleaginum; Diaporthe-Arten, wie beispielsweise Diaporthe citri; Elsinoe-Arten, wie beispielsweise Elsinoe fawcettii; Gloeosporium-Arten, wie beispielsweise Gloeosporium laeticolor;

5 Glomerella-Arten, wie beispielsweise Glomerella cingulata; Guignardia-Arten, wie beispielsweise Guignardia bidwelli; Leptosphaeria-Arten, wie beispielsweise Leptosphaeria maculans; Magnaporthe-Arten, wie beispielsweise Magnaporthe grisea; Microdochium-Arten, wie beispielsweise Microdochium nivale; Mycosphaerella-Arten, wie beispielsweise Mycosphaerella graminicola und M. fijiensis; Phaeosphaeria-Arten, wie beispielsweise Phaeosphaeria nodorum; Pyrenophora-Arten, wie

10 beispielsweise Pyrenophora teres; Ramularia-Arten, wie beispielsweise Ramularia collo-cygni; Rhynchosporium-Arten, wie beispielsweise Rhynchosporium secalis; Septoria-Arten, wie beispielsweise Septoria apii; Typhula-Arten, wie beispielsweise Typhula incarnata; Venturia-Arten, wie beispielsweise Venturia inaequalis;

Wurzel- und Stängelkrankheiten, hervorgerufen durch z.B. Corticium-Arten, wie beispielsweise Corticium graminearum; Fusarium-Arten, wie beispielsweise Fusarium oxysporum; Gaeumannomyces-Arten, wie beispielsweise Gaeumannomyces graminis; Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise Rhizoctonia solani; Tapesia-Arten, wie beispielsweise Tapesia acuformis; Thielaviopsis-Arten, wie beispielsweise Thielaviopsis basicola;

15

Ähren- und Rispenkrankheiten (inklusive Maiskolben), hervorgerufen durch z.B. Alternaria-Arten, wie beispielsweise Alternaria spp.; Aspergillus-Arten, wie beispielsweise Aspergillus flavus; Cladosporium-Arten, wie beispielsweise Cladosporium cladosporioides; Claviceps-Arten, wie beispielsweise Claviceps purpurea; Fusarium-Arten, wie beispielsweise Fusarium culmorum; Gibberella-Arten, wie beispielsweise Gibberella zeae; Monographella-Arten, wie beispielsweise Monographella nivalis; Septoria-Arten, wie beispielsweise Septoria nodorum;

20

Erkrankungen, hervorgerufen durch Brandpilze wie z.B. Sphacelotheca-Arten, wie beispielsweise Sphacelotheca reiliana; Tilletia-Arten, wie beispielsweise Tilletia caries, T. controversa; Urocystis-Arten, wie beispielsweise Urocystis occulta; Ustilago-Arten, wie beispielsweise Ustilago nuda, U. nuda tritici;

25

Fruchtfäule hervorgerufen durch z.B. Aspergillus-Arten, wie beispielsweise Aspergillus flavus; Botrytis-Arten, wie beispielsweise Botrytis cinerea; Penicillium-Arten, wie beispielsweise Penicillium expansum und P. purpurogenum; Sclerotinia-Arten, wie beispielsweise Sclerotinia sclerotiorum;

30

Verticillium-Arten, wie beispielsweise Verticillium albo-atrum;

Samen- und bodenbürtige Fäulen und Welken, sowie Sämlingserkrankungen, hervorgerufen durch z.B. *Fusarium*-Arten, wie beispielsweise *Fusarium culmorum*; *Phytophthora* Arten, wie beispielsweise *Phytophthora cactorum*; *Pythium*-Arten, wie beispielsweise *Pythium ultimum*; *Rhizoctonia*-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*; *Sclerotium*-Arten, wie beispielsweise *Sclerotium rolfsii*;

- 5 Krebserkrankungen, Gallen und Hexenbesen, hervorgerufen durch z.B. *Nectria*-Arten, wie beispielsweise *Nectria galligena*;

Welkeerkrankungen hervorgerufen durch z.B. *Monilinia*-Arten, wie beispielsweise *Monilinia laxa*;

Deformationen von Blättern, Blüten und Früchten, hervorgerufen durch z.B. *Taphrina*-Arten, wie beispielsweise *Taphrina deformans*;

- 10 Degenerationserkrankungen holziger Pflanzen, hervorgerufen durch z.B. *Esca*-Arten, wie beispielsweise *Phaemoniella clamydospora* und *Phaeoacremonium aleophilum* und *Fomitiporia mediterranea*;

Blüten- und Samenerkrankungen, hervorgerufen durch z.B. *Botrytis*-Arten, wie beispielsweise *Botrytis cinerea*;

Erkrankungen von Pflanzenknollen, hervorgerufen durch z.B. *Rhizoctonia*-Arten, wie beispielsweise

- 15 *Rhizoctonia solani*; *Helminthosporium*-Arten, wie beispielsweise *Helminthosporium solani*;

Erkrankungen, hervorgerufen durch bakterielle Erreger wie z.B. *Xanthomonas*-Arten, wie beispielsweise *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae*; *Pseudomonas*-Arten, wie beispielsweise *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*; *Erwinia*-Arten, wie beispielsweise *Erwinia amylovora*;

Bevorzugt können die folgenden Krankheiten von Soja-Bohnen bekämpft werden:

- 20 Pilzkrankheiten an Blättern, Stängeln, Schoten und Samen verursacht durch z.B. *Alternaria* leaf spot (*Alternaria* spec. *atrans tenuissima*), Anthracnose (*Colletotrichum gloeosporoides dematium* var. *truncatum*), Brown spot (*Septoria glycines*), *Cercospora* leaf spot and blight (*Cercospora kikuchii*), *Choanephora* leaf blight (*Choanephora infundibulifera trispora* (Syn.)), *Dactuliophora* leaf spot (*Dactuliophora glycines*), Downy Mildew (*Peronospora manshurica*), Drechslera blight (*Drechslera glycini*), Frogeye Leaf spot (*Cercospora sojae*), *Leptosphaerulina* Leaf Spot (*Leptosphaerulina trifolii*),
 25 *Phyllosticta* Leaf Spot (*Phyllosticta sojaecola*), Pod and Stem Blight (*Phomopsis sojae*), Powdery Mildew (*Microsphaera diffusa*), *Pyrenochaeta* Leaf Spot (*Pyrenochaeta glycines*), *Rhizoctonia* Aerial, Foliage, and Web Blight (*Rhizoctonia solani*), Rust (*Phakopsora pachyrhizi*, *Phakopsora meibomia*), Scab (*Sphaceloma glycines*), *Stemphylium* Leaf Blight (*Stemphylium botryosum*), Target Spot (*Corynespora cassiicola*).
 30

Pilzkrankheiten an Wurzeln und der Stängelbasis verursacht durch z.B. Black Root Rot (*Calonectria crotalariae*), Charcoal Rot (*Macrophomina phaseolina*), Fusarium Blight or Wilt, Root Rot, and Pod and Collar Rot (*Fusarium oxysporum*, *Fusarium orthoceras*, *Fusarium semitectum*, *Fusarium equiseti*), Mycoleptodiscus Root Rot (*Mycoleptodiscus terrestris*), Neocosmospora (*Neocosmospora vasinfecta*),
5 Pod and Stem Blight (*Diaporthe phaseolorum*), Stem Canker (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*), Phytophthora Rot (*Phytophthora megasperma*), Brown Stem Rot (*Phialophora gregata*), Pythium Rot (*Pythium aphanidermatum*, *Pythium irregulare*, *Pythium debaryanum*, *Pythium myriotylum*, *Pythium ultimum*), Rhizoctonia Root Rot, Stem Decay, and Damping-Off (*Rhizoctonia solani*), Sclerotinia Stem Decay (*Sclerotinia sclerotiorum*), Sclerotinia Southern Blight (*Sclerotinia rolfsii*), Thielaviopsis Root
10 Rot (*Thielaviopsis basicola*).

Als Mikroorganismen, die einen Abbau oder eine Veränderung der technischen Materialien bewirken können, seien beispielsweise Bakterien, Pilze, Hefen, Algen und Schleimorganismen genannt. Vorzugsweise wirken die erfindungsgemäßen Wirkstoffe gegen Pilze, insbesondere Schimmelpilze, Holz verfärbende und Holz zerstörende Pilze (Basidiomyceten) sowie gegen Schleimorganismen und Al-
15 gen. Es seien beispielsweise Mikroorganismen der folgenden Gattungen genannt: *Alternaria*, wie *Alternaria tenuis*; *Aspergillus*, wie *Aspergillus niger*; *Chaetomium*, wie *Chaetomium globosum*; *Coniophora*, wie *Coniophora puetana*; *Lentinus*, wie *Lentinus tigrinus*; *Penicillium*, wie *Penicillium glaucum*; *Polyporus*, wie *Polyporus versicolor*; *Aureobasidium*, wie *Aureobasidium pullulans*; *Sclerophoma*, wie *Sclerophoma pityophila*; *Trichoderma*, wie *Trichoderma viride*; *Escherichia*, wie *E-*
20 *schlerichia coli*; *Pseudomonas*, wie *Pseudomonas aeruginosa*; *Staphylococcus*, wie *Staphylococcus aureus*.

Darüber hinaus weisen die erfindungsgemäßen Wirkstoffe auch sehr gute antimykotische Wirkungen auf. Sie besitzen ein sehr breites antimykotisches Wirkungsspektrum, insbesondere gegen Derma-
tophyten und Sprosspilze, Schimmel und diphasische Pilze (z.B. gegen *Candida*-Spezies wie *Candida*
25 *albicans*, *Candida glabrata*) sowie *Epidermophyton floccosum*, *Aspergillus*-Spezies wie *Aspergillus niger* und *Aspergillus fumigatus*, *Trichophyton*-Spezies wie *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporon*-Spezies wie *Microsporon canis* und *audouinii*. Die Aufzählung dieser Pilze stellt keinesfalls eine Beschränkung des erfassbaren mykotischen Spektrums dar, sondern hat nur erläuternden Cha-
rakter.

30 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können daher sowohl in medizinischen als auch in nicht-medi-
zinischen Anwendungen eingesetzt werden.

Beim Einsatz der erfindungsgemäßen Wirkstoffe als Fungizide können die Aufwandmengen je nach Applikationsart innerhalb eines größeren Bereiches variiert werden. Die Aufwandmenge der erfin-
dungsgemäßen Wirkstoffe beträgt

- bei der Behandlung von Pflanzenteilen, z.B. Blättern: von 0,1 bis 10 000 g/ha, bevorzugt von 10 bis 1 000 g/ha, besonders bevorzugt von 50 bis 300g/ha (bei Anwendung durch Gießen oder Tropfen kann die Aufwandmenge sogar verringert werden, vor allem wenn inerte Substrate wie Steinwolle oder Perlit verwendet werden);
- 5 • bei der Saatgutbehandlung: von 2 bis 200 g pro 100 kg Saatgut, bevorzugt von 3 bis 150 g pro 100 kg Saatgut, besonders bevorzugt von 2,5 bis 25 g pro 100 kg Saatgut, ganz besonders bevorzugt von 2,5 bis 12,5 g pro 100 kg Saatgut;
- bei der Bodenbehandlung: von 0,1 bis 10 000 g/ha, bevorzugt von 1 bis 5 000 g/ha.

Diese Aufwandmengen seien nur beispielhaft und nicht limitierend im Sinne der Erfindung genannt.

- 10 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können also eingesetzt werden, um Pflanzen innerhalb eines gewissen Zeitraumes nach der Behandlung gegen den Befall durch die genannten Schaderreger zu schützen. Der Zeitraum, innerhalb dessen Schutz herbeigeführt wird, erstreckt sich im Allgemeinen auf 1 bis 28 Tage, bevorzugt auf 1 bis 14 Tage, besonders bevorzugt auf 1 bis 10 Tage, ganz besonders bevorzugt auf 1 bis 7 Tage nach der Behandlung der Pflanzen mit den Wirkstoffen bzw.
- 15 auf bis zu 200 Tage nach einer Saatgutbehandlung.

- Darüber hinaus kann durch die erfindungsgemäße Behandlung der Mykotoxingehalt im Erntegut und den daraus hergestellten Nahrungs- und Futtermitteln verringert werden. Besonders, aber nicht ausschließlich sind hierbei folgende Mykotoxine zu nennen: Deoxynivalenol (DON), Nivalenol, 15-Ac-DON, 3-Ac-DON, T2- und HT2- Toxin, Fumonisine, Zearalenon, Moniliformin, Fusarin, Diacetoxyscirpenol (DAS), Beauvericin, Enniatin, Fusaroproliferin, Fusarenol, Ochratoxine, Patulin, Mutterkornalkaloide und Aflatoxine, die beispielsweise von den folgenden Pilzen verursacht werden können: *Fusarium spec.*, wie *Fusarium acuminatum*, *F. avenaceum*, *F. crookwellense*, *F. culmorum*, *F. graminearum* (*Gibberella zeae*), *F. equiseti*, *F. fujikoro*i, *F. musarum*, *F. oxysporum*, *F. proliferatum*, *F. poae*, *F. pseudograminearum*, *F. sambucinum*, *F. scirpi*, *F. semitectum*, *F. solani*, *F. sporotrichoides*, *F. langsethiae*, *F. subglutinans*, *F. tricinctum*, *F. verticillioides* u.a. sowie auch von *Aspergillus spec.*, *Penicillium spec.*, *Claviceps purpurea*, *Stachybotrys spec.* u.a.
- 20
- 25

- Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe eignen sich bei guter Pflanzenverträglichkeit, günstiger Warmblüttoxizität und guter Umweltverträglichkeit zum Schutz von Pflanzen und Pflanzenorganen, zur Steigerung der Ernteerträge, Verbesserung der Qualität des Erntegutes und zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen, insbesondere Insekten, Spinnentieren, Helminthen, Nematoden und Mollusken,
- 30 die in der Landwirtschaft, im Gartenbau, bei der Tierzucht, in Forsten, in Gärten und Freizeiteinrichtungen, im Vorrats- und Materialschutz sowie auf dem Hygienesektor vorkommen. Sie können

vorzugsweise als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Sie sind gegen normal sensible und resistente Arten sowie gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien wirksam. Zu den oben erwähnten Schädlingen gehören:

5 Aus der Ordnung der Anoplura (Phthiraptera) z.B. *Damalinia* spp., *Haematopinus* spp., *Linognathus* spp., *Pediculus* spp., *Trichodectes* spp.

10 Aus der Klasse der Arachnida z.B. *Acarus siro*, *Aceria sheldoni*, *Aculops* spp., *Aculus* spp., *Amblyomma* spp., *Argas* spp., *Boophilus* spp., *Brevipalpus* spp., *Bryobia praetiosa*, *Chorioptes* spp., *Dermanyssus gallinae*, *Eotetranychus* spp., *Epitrimerus pyri*, *Eutetranychus* spp., *Eriophyes* spp., *Hemitarsonemus* spp., *Hyalomma* spp., *Ixodes* spp., *Latrodectus mactans*, *Metatetranychus* spp., *Oligonychus* spp., *Ornithodoros* spp., *Panonychus* spp., *Phyllocoptruta oleivora*, *Polyphagotarsonemus latus*, *Psoroptes* spp., *Rhipicephalus* spp., *Rhizoglyphus* spp., *Sarcoptes* spp., *Scorpio maurus*, *Stenotarsonemus* spp., *Tarsonemus* spp., *Tetranychus* spp., *Vasates lycopersici*.

Aus der Klasse der Bivalva z.B. *Dreissena* spp.

Aus der Ordnung der Chilopoda z.B. *Geophilus* spp., *Scutigera* spp.

15 Aus der Ordnung der Coleoptera z.B. *Acanthoscelides obtectus*, *Adoretus* spp., *Agelastica alni*, *Agriotes* spp., *Amphimallon solstitialis*, *Anobium punctatum*, *Anoplophora* spp., *Anthonomus* spp., *Anthrenus* spp., *Apogonia* spp., *Atomaria* spp., *Attagenus* spp., *Bruchidius obtectus*, *Bruchus* spp., *Ceuthorrhynchus* spp., *Cleonus mendicus*, *Conoderus* spp., *Cosmopolites* spp., *Costelytra zealandica*, *Curculio* spp., *Cryptorhynchus lapathi*, *Dermestes* spp., *Diabrotica* spp., *Epilachna* spp., *Faustinus cubae*, *Gibbium psyllodes*, *Heteronychus arator*, *Hylamorpha elegans*, *Hylotrupes bajulus*, *Hypera postica*, *Hypothenemus* spp., *Lachnosterna consanguinea*, *Leptinotarsa decemlineata*, *Lissorhoptrus oryzophilus*, *Lixus* spp., *Lyctus* spp., *Meligethes aeneus*, *Melolontha melolontha*, *Migdolus* spp., *Monochamus* spp., *Naupactus xanthographus*, *Niptus hololeucus*, *Oryctes rhinoceros*, *Oryzaephilus surinamensis*, *Otiorrhynchus sulcatus*, *Oxycetonia jucunda*, *Phaedon cochleariae*, *Phyllophaga* spp.,
20 *Popillia japonica*, *Premnotrypes* spp., *Psylliodes chrysocephala*, *Ptinus* spp., *Rhizobius ventralis*, *Rhizopertha dominica*, *Sitophilus* spp., *Sphenophorus* spp., *Sternechus* spp., *Symphyletes* spp., *Tenebrio molitor*, *Tribolium* spp., *Trogoderma* spp., *Tychius* spp., *Xylotrechus* spp., *Zabrus* spp.

Aus der Ordnung der Collembola z.B. *Onychiurus armatus*.

Aus der Ordnung der Dermaptera z.B. *Forficula auricularia*.

30 Aus der Ordnung der Diplopoda z.B. *Blaniulus guttulatus*.

Aus der Ordnung der Diptera z.B. *Aedes* spp., *Anopheles* spp., *Bibio hortulanus*, *Calliphora erythrocephala*, *Ceratitis capitata*, *Chrysomyia* spp., *Cochliomyia* spp., *Cordylobia anthropophaga*, *Culex* spp., *Cuterebra* spp., *Dacus oleae*, *Dermatobia hominis*, *Drosophila* spp., *Fannia* spp., *Gastrophilus* spp., *Hylemyia* spp., *Hyppobosca* spp., *Hypoderma* spp., *Liriomyza* spp., *Lucilia* spp., *Musca* spp.,
 5 *Nezara* spp., *Oestrus* spp., *Oscinella frit*, *Pegomyia hyoscyami*, *Phorbia* spp., *Stomoxys* spp., *Tabanus* spp., *Tannia* spp., *Tipula paludosa*, *Wohlfahrtia* spp.

Aus der Klasse der Gastropoda z.B. *Arion* spp., *Biomphalaria* spp., *Bulinus* spp., *Deroceras* spp., *Galba* spp., *Lymnaea* spp., *Oncomelania* spp., *Succinea* spp.

Aus der Klasse der Helminthen z.B. *Ancylostoma duodenale*, *Ancylostoma ceylanicum*, *Acylostoma*
 10 *braziliensis*, *Ancylostoma* spp., *Ascaris lubricoides*, *Ascaris* spp., *Brugia malayi*, *Brugia timori*, *Bunostomum* spp., *Chabertia* spp., *Clonorchis* spp., *Cooperia* spp., *Dicrocoelium* spp., *Dictyocaulus filaria*, *Diphyllbothrium latum*, *Dracunculus medinensis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Enterobius vermicularis*, *Faciola* spp., *Haemonchus* spp., *Heterakis* spp., *Hymenolepis nana*, *Hyostromylus* spp., *Loa Loa*, *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Opisthorchis* spp., *Onchocerca*
 15 *volvulus*, *Ostertagia* spp., *Paragonimus* spp., *Schistosomen* spp., *Strongyloides fuelleborni*, *Strongyloides stercoralis*, *Strongyloides* spp., *Taenia saginata*, *Taenia solium*, *Trichinella spiralis*, *Trichinella nativa*, *Trichinella britovi*, *Trichinella nelsoni*, *Trichinella pseudospiralis*, *Trichostrongylus* spp., *Trichuris trichuria*, *Wuchereria bancrofti*.

Weiterhin lassen sich Protozoen, wie *Eimeria*, bekämpfen.

20 Aus der Ordnung der Heteroptera z.B. *Anasa tristis*, *Antestiopsis* spp., *Blissus* spp., *Calocoris* spp., *Campylomma livida*, *Cavelerius* spp., *Cimex* spp., *Creontiades dilutus*, *Dasynus piperis*, *Dichelops furcatus*, *Diconocoris hewetti*, *Dysdercus* spp., *Euschistus* spp., *Eurygaster* spp., *Heliopeltis* spp., *Horcias nobilellus*, *Leptocoris* spp., *Leptoglossus phyllopus*, *Lygus* spp., *Macropes excavatus*, *Miridae*, *Nezara* spp., *Oebalus* spp., *Pentomidae*, *Piesma quadrata*, *Piezodorus* spp., *Psallus seriatus*,
 25 *Pseudacysta perseae*, *Rhodnius* spp., *Sahlbergella singularis*, *Scotinophora* spp., *Stephanitis nashi*, *Tibraca* spp., *Triatoma* spp.

Aus der Ordnung der Homoptera z.B. *Acyrtosipon* spp., *Aeneolamia* spp., *Agonoscena* spp., *Aleurodes* spp., *Aleurolobus barodensis*, *Aleurothrixus* spp., *Amrasca* spp., *Anuraphis cardui*, *Aonidiella* spp., *Aphanostigma piri*, *Aphis* spp., *Arboridia apicalis*, *Aspidiella* spp., *Aspidiotus* spp., *Atanus* spp.,
 30 *Aulacorthum solani*, *Bemisia* spp., *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycolus* spp., *Brevicoryne brassicae*, *Calligypona marginata*, *Carneocephala fulgida*, *Ceratovacuna lanigera*, *Cercopidae*, *Ceroplastes* spp., *Chaetosiphon fragaefolii*, *Chionaspis tegalensis*, *Chlorita onukii*, *Chromaphis juglandicola*, *Chrysomphalus ficus*, *Cicadulina mbila*, *Coccoxylus halli*, *Coccus* spp., *Cryptomyzus ribis*, *Dalbu-*

- lus spp., *Dialeurodes* spp., *Diaphorina* spp., *Diaspis* spp., *Doralis* spp., *Drosicha* spp., *Dysaphis* spp., *Dysmicoccus* spp., *Empoasca* spp., *Eriosoma* spp., *Erythroneura* spp., *Euscelis bilobatus*, *Geococcus coffeae*, *Homalodisca coagulata*, *Hyalopterus arundinis*, *Icerya* spp., *Idiocerus* spp., *Idioscopus* spp., *Laodelphax striatellus*, *Lecanium* spp., *Lepidosaphes* spp., *Lipaphis erysimi*, *Macrosiphum* spp., *Mahanarva fimbriolata*, *Melanaphis sacchari*, *Metcalfiella* spp., *Metopolophium dirhodum*, *Monellia costalis*, *Monelliopsis pecanis*, *Myzus* spp., *Nasonovia ribisnigri*, *Nephotettix* spp., *Nilaparvata lugens*, *Oncometopia* spp., *Orthezia praelonga*, *Parabemisia myricae*, *Paratrioza* spp., *Parlatoria* spp., *Pemphigus* spp., *Peregrinus maidis*, *Phenacoccus* spp., *Phloeomyzus passerinii*, *Phorodon humuli*, *Phylloxera* spp., *Pinnaspis aspidistrae*, *Planococcus* spp., *Protopulvinaria pyriformis*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Pseudococcus* spp., *Psylla* spp., *Pteromalus* spp., *Pyrilla* spp., *Quadraspidotus* spp., *Que-sada gigas*, *Rastrococcus* spp., *Rhopalosiphum* spp., *Saissetia* spp., *Scaphoides titanus*, *Schizaphis graminum*, *Selenaspidus articulatus*, *Sogata* spp., *Sogatella furcifera*, *Sogatodes* spp., *Stictocephala festina*, *Tenalaphara malayensis*, *Tinocallis caryaefoliae*, *Tomaspis* spp., *Toxoptera* spp., *Trialeurodes vaporariorum*, *Trioza* spp., *Typhlocyba* spp., *Unaspis* spp., *Viteus vitifolii*.
- 15 Aus der Ordnung der Hymenoptera z.B. *Diprion* spp., *Hoplocampa* spp., *Lasius* spp., *Monomorium pharaonis*, *Vespa* spp.
- Aus der Ordnung der Isopoda z.B. *Armadillidium vulgare*, *Oniscus asellus*, *Porcellio scaber*.
- Aus der Ordnung der Isoptera z.B. *Reticulitermes* spp., *Odontotermes* spp.
- Aus der Ordnung der Lepidoptera z.B. *Acronicta major*, *Aedia leucomelas*, *Agrotis* spp., *Alabama argil-lacea*, *Anticarsia* spp., *Barathra brassicae*, *Bucculatrix thurberiella*, *Bupalus piniarius*, *Cacoecia podana*, *Capua reticulana*, *Carpocapsa pomonella*, *Cheimatobia brumata*, *Chilo* spp., *Choristoneura fumiferana*, *Clysia ambiguella*, *Cnaphalocerus* spp., *Earias insulana*, *Ephestia kuehniella*, *Euproctis chrysorrhoea*, *Euxoa* spp., *Feltia* spp., *Galleria mellonella*, *Helicoverpa* spp., *Heliothis* spp., *Hofmannophila pseudopretella*, *Homona magnanima*, *Hyponomeuta padella*, *Laphygma* spp., *Lithocolletis blancardella*, *Lithophane antennata*, *Loxagrotis albicosta*, *Lymantria* spp., *Malacosoma neustria*, *Mamestra brassicae*, *Mocis repanda*, *Mythimna separata*, *Oria* spp., *Oulema oryzae*, *Panolis flammea*, *Pectinophora gossypiella*, *Phyllocnistis citrella*, *Pieris* spp., *Plutella xylostella*, *Prodenia* spp., *Pseudaletia* spp., *Pseudoplusia includens*, *Pyrausta nubilalis*, *Spodoptera* spp., *Thermesia gemmatilis*, *Tinea pellionella*, *Tineola bisselliella*, *Tortrix viridana*, *Trichoplusia* spp.
- 25
- 30 Aus der Ordnung der Orthoptera z.B. *Acheta domesticus*, *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Gryllo-talpa* spp., *Leucophaea maderae*, *Locusta* spp., *Melanoplus* spp., *Periplaneta americana*, *Schistocerca gregaria*.

Aus der Ordnung der Siphonaptera z.B. *Ceratophyllus* spp., *Xenopsylla cheopis*.

Aus der Ordnung der Symphyla z.B. *Scutigerella immaculata*.

Aus der Ordnung der Thysanoptera z.B. *Baliothrips biformis*, *Enneothrips flavens*, *Frankliniella* spp., *Heliothrips* spp., *Hercinothrips femoralis*, *Kakothrips* spp., *Rhipiphorothrips cruentatus*, *Scirtothrips* spp., *Taeniothrips cardamoni*, *Thrips* spp.

Aus der Ordnung der Thysanura z.B. *Lepisma saccharina*.

Zu den pflanzenparasitären Nematoden gehören z.B. *Anguina* spp., *Aphelenchoides* spp., *Belonoaimus* spp., *Bursaphelenchus* spp., *Ditylenchus dipsaci*, *Globodera* spp., *Heliocotylenchus* spp., *Heterodera* spp., *Longidorus* spp., *Meloidogyne* spp., *Pratylenchus* spp., *Radopholus similis*, *Rotylenchus* spp., *Trichodorus* spp., *Tylenchorhynchus* spp., *Tylenchulus* spp., *Tylenchulus semipenetrans*, *Xiphinema* spp.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können gegebenenfalls in bestimmten Konzentrationen bzw. Aufwandmengen auch als Herbizide, Safener, Wachstumsregulatoren oder Mittel zur Verbesserung der Pflanzeigenschaften, oder als Mikrobizide, beispielsweise als Fungizide, Antimykotika, Bakterizide, Virizide (einschließlich Mittel gegen Viroide) oder als Mittel gegen MLO (*Mycoplasma*-like-organism) und RLO (*Rickettsia*-like-organism) verwendet werden. Sie lassen sich gegebenenfalls auch als Zwischen- oder Vorprodukte für die Synthese weiterer Wirkstoffe einsetzen.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können ferner beim Einsatz als Insektizide in ihren handelsüblichen Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit Synergisten vorliegen. Synergisten sind Verbindungen, durch die die Wirkung der Wirkstoffe gesteigert wird, ohne daß der zugesetzte Synergist selbst aktiv wirksam sein muß.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können ferner beim Einsatz als Insektizide in ihren handelsüblichen Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischungen mit Hemmstoffen vorliegen, die einen Abbau des Wirkstoffes nach Anwendung in der Umgebung der Pflanze, auf der Oberfläche von Pflanzenteilen oder in pflanzlichen Geweben vermindern.

Der Wirkstoffgehalt der aus den handelsüblichen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen kann in weiten Bereichen variieren. Die Wirkstoffkonzentration der Anwendungsformen kann von 0,00000001 bis zu 95 Gew.-% Wirkstoff, vorzugsweise zwischen 0,00001 und 1 Gew.-% liegen.

Die Anwendung geschieht in einer den Anwendungsformen angepaßten üblichen Weise.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe wirken nicht nur gegen Pflanzen-, Hygiene- und Vorratsschädlinge, sondern auch auf dem veterinärmedizinischen Sektor gegen tierische Parasiten (Ekto- und Endoparasiten) wie Schildzecken, Lederzecken, Räude milben, Laufmilben, Fliegen (stechend und leckend), parasitierende Fliegenlarven, Läuse, Haarlinge, Federlinge und Flöhe. Zu diesen Parasiten gehören:

Aus der Ordnung der Anoplurida z.B. *Haematopinus* spp., *Linognathus* spp., *Pediculus* spp., *Phthirus* spp., *Solenopotes* spp.

Aus der Ordnung der Mallophagida und den Unterordnungen Amblycerina sowie Ischnocerina z.B. *Trimenopon* spp., *Menopon* spp., *Trinoton* spp., *Bovicola* spp., *Werneckiella* spp., *Lepikentron* spp.,
10 *Damalina* spp., *Trichodectes* spp., *Felicola* spp.

Aus der Ordnung Diptera und den Unterordnungen Nematocerina sowie Brachycerina z.B. *Aedes* spp., *Anopheles* spp., *Culex* spp., *Simulium* spp., *Eusimulium* spp., *Phlebotomus* spp., *Lutzomyia* spp., *Culicoides* spp., *Chrysops* spp., *Hybomitra* spp., *Atylotus* spp., *Tabanus* spp., *Haematopota* spp., *Philipomyia* spp., *Braula* spp., *Musca* spp., *Hydrotaea* spp., *Stomoxys* spp., *Haematobia* spp., *Morelia* spp.,
15 *Fannia* spp., *Glossina* spp., *Calliphora* spp., *Lucilia* spp., *Chrysomyia* spp., *Wohlfahrtia* spp., *Sarcophaga* spp., *Oestrus* spp., *Hypoderma* spp., *Gasterophilus* spp., *Hippobosca* spp., *Lipoptena* spp., *Melophagus* spp.

Aus der Ordnung der Siphonaptera z.B. *Pulex* spp., *Ctenocephalides* spp., *Xenopsylla* spp., *Ceratophyllus* spp.

20 Aus der Ordnung der Heteroptera z.B. *Cimex* spp., *Triatoma* spp., *Rhodnius* spp., *Panstrongylus* spp.

Aus der Ordnung der Blattellidae z.B. *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Supella* spp.

Aus der Unterklasse der Acari (Acarina) und den Ordnungen der Meta- sowie Mesostigmata z.B. *Argas* spp., *Ornithodoros* spp., *Otobius* spp., *Ixodes* spp., *Amblyomma* spp., *Boophilus* spp., *Dermacentor* spp., *Haemophysalis* spp., *Hyalomma* spp., *Rhipicephalus* spp., *Dermanyssus* spp., *Raillietia* spp.,
25 *Pneumonyssus* spp., *Sternostoma* spp., *Varroa* spp.

Aus der Ordnung der Actinoptera (Prostigmata) und Acaridida (Astigmata) z.B. *Acarapis* spp., *Cheyletiella* spp., *Ornithocheyletiella* spp., *Myobia* spp., *Psorergates* spp., *Demodex* spp., *Trombicula* spp.,
30 *Listrophorus* spp., *Acarus* spp., *Tyrophagus* spp., *Caloglyphus* spp., *Hypodectes* spp., *Pterolichus*

spp., Psoroptes spp., Chorioptes spp., Otodectes spp., Sarcoptes spp., Notoedres spp., Knemidocoptes spp., Cytodites spp., Laminosioptes spp.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe der Formel (I) eignen sich auch zur Bekämpfung von Arthropoden, die landwirtschaftliche Nutztiere, wie z.B. Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Schweine, Esel, Kamele, Büffel, Kaninchen, Hühner, Puten, Enten, Gänse, Bienen, sonstige Haustiere wie z.B. Hunde, Katzen, Stubenvögel, Aquarienfische sowie sogenannte Versuchstiere, wie z.B. Hamster, Meerschweinchen, Ratten und Mäuse befallen. Durch die Bekämpfung dieser Arthropoden sollen Todesfälle und Leistungsminderungen (bei Fleisch, Milch, Wolle, Häuten, Eiern, Honig usw.) vermindert werden, so daß durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Wirkstoffe eine wirtschaftlichere und einfachere Tierhaltung möglich ist.

Die Anwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe geschieht im Veterinärsektor und bei der Tierhaltung in bekannter Weise durch enterale Verabreichung in Form von beispielsweise Tabletten, Kapseln, Tränken, Drenchen, Granulaten, Pasten, Boli, des feed-through-Verfahrens, von Zäpfchen, durch parenterale Verabreichung, wie zum Beispiel durch Injektionen (intramuskulär, subcutan, intravenös, intraperitoneal u.a.), Implantate, durch nasale Applikation, durch dermale Anwendung in Form beispielsweise des Tauchens oder Badens (Dippen), Sprühens (Spray), Aufgießens (Pour-on und Spot-on), des Waschens, des Einpuderns sowie mit Hilfe von wirkstoffhaltigen Formkörpern, wie Halsbändern, Ohrmarken, Schwanzmarken, Gliedmaßenbändern, Halftern, Markierungsvorrichtungen usw.

Bei der Anwendung für Vieh, Geflügel, Haustiere etc. kann man die Wirkstoffe der Formel (I) als Formulierungen (beispielsweise Pulver, Emulsionen, fließfähige Mittel), die die Wirkstoffe in einer Menge von 1 bis 80 Gew.-% enthalten, direkt oder nach 100 bis 10 000-facher Verdünnung anwenden oder sie als chemisches Bad verwenden.

Außerdem wurde gefunden, daß die erfindungsgemäßen Verbindungen eine hohe insektizide Wirkung gegen Insekten zeigen, die technische Materialien zerstören.

Beispielhaft und vorzugsweise - ohne jedoch zu limitieren - seien die folgenden Insekten genannt:

Käfer wie *Hylotrupes bajulus*, *Chlorophorus pilosis*, *Anobium punctatum*, *Xestobium rufovillosus*, *Ptilinus pecticornis*, *Dendrobium pertinex*, *Ernobius mollis*, *Priobium carpini*, *Lyctus brunneus*, *Lyctus africanus*, *Lyctus planicollis*, *Lyctus linearis*, *Lyctus pubescens*, *Trogoxylon aequale*, *Minthes rugicollis*, *Xyleborus spec.*, *Tryptodendron spec.*, *Apate monachus*, *Bostrychus capucins*, *Heterobostrychus brunneus*, *Sinoxylon spec.*, *Dinoderus minutus*;

Hautflügler wie *Sirex juvencus*, *Urocerus gigas*, *Urocerus gigas taignus*, *Urocerus augur*;

Termiten wie *Kaloterme flavicollis*, *Cryptoterme brevis*, *Heteroterme indicola*, *Reticuliterme flavipes*, *Reticuliterme santonensis*, *Reticuliterme lucifugus*, *Mastoterme darwiniensis*, *Zootermopsis nevadensis*, *Coptoterme formosanus*;

Borstenschwänze wie *Lepisma saccharina*.

- 5 Die Wirkstoffe eignen sich auch zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen im Haushalts-, Hygiene- und Vorratsschutz, insbesondere von Insekten, Spinnentieren und Milben, die in geschlossenen Räumen, wie beispielsweise Wohnungen, Fabrikhallen, Büros, Fahrzeugkabinen u.ä. vorkommen. Sie können zur Bekämpfung dieser Schädlinge allein oder in Kombination mit anderen Wirk- und Hilfsstoffen in Haushaltsinsektizid-Produkten verwendet werden. Sie sind gegen sensible und resistente Arten sowie gegen alle Entwicklungsstadien wirksam. Zu diesen Schädlingen gehören:
- 10

Aus der Ordnung der Scorpionidea z.B. *Buthus occitanus*.

Aus der Ordnung der Acarina z.B. *Argas persicus*, *Argas reflexus*, *Bryobia* ssp., *Dermanyssus gallinae*, *Glyciphagus domesticus*, *Ornithodoros moubat*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Trombicula alfreddugesi*, *Neutrombicula autumnalis*, *Dermatophagoides pteronissimus*, *Dermatophagoides forinae*.

- 15 Aus der Ordnung der Araneae z.B. *Aviculariidae*, *Araneidae*.

Aus der Ordnung der Opiliones z.B. *Pseudoscorpiones chelifer*, *Pseudoscorpiones cheiridium*, *Opiliones phalangium*.

Aus der Ordnung der Isopoda z.B. *Oniscus asellus*, *Porcellio scaber*.

Aus der Ordnung der Diplopoda z.B. *Blaniulus guttulatus*, *Polydesmus* spp.

- 20 Aus der Ordnung der Chilopoda z.B. *Geophilus* spp.

Aus der Ordnung der Zygentoma z.B. *Ctenolepisma* spp., *Lepisma saccharina*, *Lepismodes inquilinus*.

- Aus der Ordnung der Blattaria z.B. *Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Blattella asahinai*, *Leucophaea maderae*, *Panchlora* spp., *Parcoblatta* spp., *Periplaneta australasiae*, *Periplaneta americana*,
- 25 *Periplaneta brunnea*, *Periplaneta fuliginosa*, *Supella longipalpa*.

Aus der Ordnung der Saltatoria z.B. *Acheta domesticus*.

Aus der Ordnung der Dermaptera z.B. *Forficula auricularia*.

Aus der Ordnung der Isoptera z.B. *Kaloterme*s spp., *Reticuliterme*s spp.

Aus der Ordnung der Psocoptera z.B. *Lepinatus* spp., *Liposcelis* spp.

- 5 Aus der Ordnung der Coleoptera z.B. *Anthrenus* spp., *Attagenus* spp., *Dermestes* spp., *Latheticus oryzae*, *Necrobia* spp., *Ptinus* spp., *Rhizopertha dominica*, *Sitophilus granarius*, *Sitophilus oryzae*, *Sitophilus zeamais*, *Stegobium paniceum*.

Aus der Ordnung der Diptera z.B. *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Aedes taeniorhynchus*, *Anopheles* spp., *Calliphora erythrocephala*, *Chrysosoma pluvialis*, *Culex quinquefasciatus*, *Culex pipiens*, *Culex tarsalis*, *Drosophila* spp., *Fannia canicularis*, *Musca domestica*, *Phlebotomus* spp., *Sarcophaga carnaria*, *Simulium* spp., *Stomoxys calcitrans*, *Tipula paludosa*.

- 10 Aus der Ordnung der Lepidoptera z.B. *Achroia grisella*, *Galleria mellonella*, *Plodia interpunctella*, *Tinea cloacella*, *Tinea pellionella*, *Tineola bisselliella*.

Aus der Ordnung der Siphonaptera z.B. *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*, *Pulex irritans*, *Tunga penetrans*, *Xenopsylla cheopis*.

- 15 Aus der Ordnung der Hymenoptera z.B. *Camponotus herculeanus*, *Lasius fuliginosus*, *Lasius niger*, *Lasius umbratus*, *Monomorium pharaonis*, *Paravespula* spp., *Tetramorium caespitum*.

Aus der Ordnung der Anoplura z.B. *Pediculus humanus capitis*, *Pediculus humanus corporis*, *Pemphigus* spp., *Phylloera vastatrix*, *Phthirus pubis*.

Aus der Ordnung der Heteroptera z.B. *Cimex hemipterus*, *Cimex lectularius*, *Rhodinus prolixus*, *Triatoma infestans*.

- 20 Die Anwendung im Bereich der Haushaltsinsektizide erfolgt allein oder in Kombination mit anderen geeigneten Wirkstoffen wie Phosphorsäureestern, Carbamaten, Pyrethroiden, Neo-nicotinoiden, Wachstumsregulatoren oder Wirkstoffen aus anderen bekannten Insektizidklassen.

- 25 Die Anwendung erfolgt in Aerosolen, drucklosen Sprühmitteln, z.B. Pump- und Zerstäubersprays, Nebelautomaten, Foggern, Schäumen, Gelen, Verdampferprodukten mit Verdampferplättchen aus Cellulose oder Kunststoff, Flüssigverdampfern, Gel- und Membranverdampfern, propellergetriebenen Verdampfern, energielosen bzw. passiven Verdampfungssystemen, Mottenpapieren, Mottensäcken und Mottengelen, als Granulate oder Stäube, in Streuködem oder Köderstationen.


Die aufgeführten Pflanzen können besonders vorteilhaft erfindungsgemäß mit den Verbindungen der allgemeinen Formel (I) oder den erfindungsgemäßen Mitteln behandelt werden. Die bei den Wirk-

stoffen bzw. Mitteln oben angegebenen Vorzugsbereiche gelten auch für die Behandlung dieser Pflanzen. Besonders hervorgehoben sei die Pflanzenbehandlung mit den im vorliegenden Text speziell aufgeführten Verbindungen bzw. Mitteln.

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele veranschaulicht. Die Erfindung ist jedoch nicht auf
5 die Beispiele limitiert.


Herstellungsbeispiele

Herstellung von Verbindung Nr. 4




4-tert-Butylcyclohexanamin (III-1) (166.20 mg, 0.970 mmol) wird in Dichlormethan (15 mL) und
10 Triethylamin (0.534 mL, 2.91 mmol) gelöst und dann mit 1,3-Benzoxazol-7-carbonylchlorid (II-1)
versetzt. Nach 10 Minuten werden alle flüchtigen Komponenten abdestilliert. Dann wird der Rück-
stand in Dichlormethan (20 mL) gelöst und zweimal mit gesättigter, wässriger Natriumchloridlösung
gewaschen. Dann wird die organische Phase mit Natriumsulfat getrocknet und der Feststoff abfilt-
riert. Anschließend wird das Lösungsmittel abdestilliert. Man erhält das Produkt N-(4-tert-
15 Butylcyclohexyl)-1,3-benzoxazol-7-carboxamid (450 mg, 1.498 mmol, 58 % der Theorie) als farblo-
sen Feststoff.


Herstellung von Verbindung Nr. II-1




1,3-Benzoxazol-7-carbonsäure (138 mg, 0.920 mmol) wird in Dichlormethan (7 mL) gelöst. Dann
20 wird Oxalylchlorid (0.07 mL, 1.00 mmol) und ein Tropfen DMF zugegeben. Das Reaktionsgemisch
wird für 4 Stunden bei Raumtemperatur gerührt, wodurch man 1,3-Benzoxazol-7-carbonylchlorid
(II-1) erhält. Das Reaktionsgemisch wird dann direkt in die nächste Stufe eingesetzt.

Herstellung von Verbindung Nr. IV-1

- 3-Amino-2-hydroxybenzolcarbonsäure (VII-1) (3.7 g, 24.161 mmol) wird zusammen mit Trimethylorthoformat (80 mL) für 3 Stunden bei 100 °C erhitzt. Dann wird das Trimethylorthoformat abdestilliert und man erhält das Produkt 1,3-Benzoxazol-7-carbonsäure (3.93 g, 24.161 mmol, 100 % der Theorie) als farblosen Feststoff.

Herstellung von Verbindung Nr. VII-1

- 2-Nitrosalicylsäure (VIII-1) (17.50 g, 95.567 mmol) wird in Tetrahydrofuran (613 mL) gelöst und mit Pd/C (10 % Pd, 2.542 g, 2.389 mmol) versetzt. Unter Wasserstoffdruck (20 bar) wird das Reaktionsgemisch für 1 Stunde gerührt. Dann wird das Reaktionsgemisch mit Aktivkohle (10 g) versetzt. Der Feststoff wird abgesaugt und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer entfernt. Man erhält das Produkt 3-Amino-2-hydroxybenzolcarbonsäure (14.7 g, 95.561 mmol, 100 % der Theorie) als farblosen Feststoff.
- Analog den vorangehenden Beispielen sowie entsprechend den allgemeinen Beschreibungen der erfindungsgemäßen Verfahren können die in der folgenden Tabelle 1 genannten Verbindungen der Formel (I) erhalten werden.

Tabelle 1

Nr.	X ¹	X ²	R ¹	R ² _m	R ³
1	S	O	Cl	—	1-Cyancyclohexyl
2	O	O	Me	—	Cyclohexyl
3	O	O	H	—	3-Ethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl
4	O	O	H	—	4- <i>tert</i> -Butylcyclohexyl
5	O	O	H	—	4-Methylcyclohexyl
6	O	O	H	—	4-Ethylcyclohexyl
7	O	O	H	—	4- <i>n</i> -Butylcyclohexyl
8	O	O	H	—	1-(Ethoxymethyl)cyclopentyl
9	O	O	H	—	1-(Methoxymethyl)cyclopentyl
10	O	O	H	—	1-(3-Chlorophenyl)cyclopropyl
11	O	O	H	—	1-(4-Chlor-3-nitrophenyl)cyclopropyl
12	O	O	H	5-Cl	2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl
13	O	O	H	—	(3S,5S,7S)-Tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-1-yl
14	O	O	H	—	(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl
15	O	O	H	—	1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl
16	O	O	H	—	4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)cyclohexyl
17	O	O	H	—	4-(Diethylamino)cyclohexyl
18	O	O	H	—	3,5,7-Trimethyltricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-1-yl
19	O	O	H	—	3-Hydroxy-5,7-dimethyltricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-1-yl
20	O	O	H	—	3,5-Bis(trifluormethyl)cyclohexyl
21	O	O	H	—	3,5-Di(propan-2-yl)cyclohexyl
22	O	O	H	—	3-(Trifluormethyl)cyclohexyl
23	O	O	H	—	(1S,4R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl
24	O	O	H	5-F	2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl
25	O	O	H	—	3,3,5-Trimethylcyclohexyl
26	O	O	H	5-F	3,5-Bis(trifluormethyl)cyclohexyl
27	O	O	H	5-Cl	3,5-Bis(trifluormethyl)cyclohexyl
28	O	O	H	—	4-[2-(4-Hydroxycyclohexyl)propan-2-yl]cyclohexyl
29	O	O	H	5-Br	3,5-Bis(trifluormethyl)cyclohexyl
30	O	O	H	—	2,4,5-Trimethylcyclohexyl
31	O	O	H	—	2,4-Dimethylcyclohexyl
32	O	O	H	—	<i>cis</i> -4- <i>tert</i> -Butylcyclohexyl
33	O	O	H	—	2,6-Diethyl-4-methylcyclohexyl
34	O	O	H	—	2,4,6-Tri(propan-2-yl)cyclohexyl
35	O	O	H	—	1,1'-Bi(cyclohexyl)-4-yl
36	O	O	H	—	Decahydronaphthalen-2-yl
37	O	O	H	—	(1r,3r,5R,7R)-Tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-2-yl
38	S	O	H	—	4- <i>tert</i> -Butylcyclohexyl
39	O	O	H	4-CH=CH-CH=CH-5	4- <i>tert</i> -Butylcyclohexyl
40	O	O	H	—	4,4-Difluorcyclohexyl
41	O	O	H	—	1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]cyclopropyl
42	O	O	H	—	Cyclododecyl
43	O	O	H	—	1,3-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[c]-thiophen-4-yl
44	O	O	H	—	4-Ethoxycyclohexyl
45	O	O	H	—	(1R,2R)-2-(Benzyloxy)cyclopentyl
46	O	O	H	—	(1S,2S)-2-(Benzyloxy)cyclopentyl
47	O	O	H	—	Cyclooctyl
48	O	O	H	—	8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl
49	O	O	H	—	Bicyclo[4.1.0]hept-7-yl

Nr.	X ¹	X ²	R ¹	R ² _m	R ³
50	O	O	H	—	2,2-Dimethylcyclopropyl
51	O	O	H	—	2-Oxoazepan-3-yl
52	O	O	H	—	7-(Acetylamino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-yl
53	O	O	H	—	cis-4-Phenylcyclohexyl
54	O	O	H	—	Cycloheptyl
55	O	O	H	—	1-(Ethoxycarbonyl)piperidin-4-yl
56	O	O	H	—	Tetrahydro-2H-pyran-4-yl
57	O	O	H	—	1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl
58	O	O	H	—	1-(4-Fluorophenyl)cyclopropyl
59	O	O	H	—	1-(4-Nitrophenyl)cyclopropyl
60	O	O	H	—	1-Phenylcyclopropyl
61	O	O	H	—	4-(Trifluormethyl)cyclohexyl
62	O	O	H	—	4-tert-Butylcyclohexyl
63	O	O	H	—	2-Chlor-1-methylcycloprop-2-en-1-yl
64	O	O	H	—	1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-yl
65	O	O	H	—	Decahydronaphthalen-1-yl
66	O	O	H	—	2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl
67	O	O	H	—	1-(Methoxycarbonyl)-4-(trifluormethyl)cyclohexyl
68	O	O	H	—	1-(Methoxycarbonyl)-3-(trifluormethyl)cyclohexyl
69	O	O	H	—	2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-yl
70	O	O	H	—	2,6,6-Trimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofur-4-yl
71	O	O	H	—	2-Phenoxycyclohexyl
72	O	O	H	—	Tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl
73	O	O	H	—	(1R,2S,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl
74	O	O	H	—	(1R,2R,4R)-Bicyclo[2.2.1]hept-2-yl
75	O	O	H	—	3-tert-Butyl-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl
76	O	O	H	—	4-Phenylcyclohexyl
77	O	O	H	—	(1R,5S)-3-Propyl-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl
78	O	O	H	—	(1R,5S)-3-(Propan-2-yl)-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl
79	O	O	H	—	[(1S,2R,5S)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl]methyl

Die Benennung der Stereochemie eines chiralen Restes erfolgt nach seiner Einbindung in das Produkt aus der im Produkt vorhandenen Umgebung heraus.

Tabelle 2: Physikalische Daten

Nr.	Physikalische Daten
1	δ (CDCl ₃) = 1.33-1.92 (m, 10H), 6.17-6.37 (br s, 1H), 7.16-7.50 (m, 2H) 8.00 (dd, 1H); LC-MS: m/z = 320 [M+H] ⁺
2	
3	δ (DMSO-d ₆) = 0.80-1.79 (m, 20H), 4.11-4.30 (m, 1H), 7.49 (t, 1H), 7.75 (d, 1H), 7.96 (d, 1H), 8.07-8.17 (m, 1H), 8.88 (s, 1H); LC-MS: m/z = 315 [M+H] ⁺

Nr.	Physikalische Daten
4	<i>cis</i> -Isomer: δ (DMSO- d_6) = 0.88 (s, 9H), 0.95-1.18 (m, 2H), 1.25-1.48 (m, 2H), 1.78-1.84 (m, 2H), 1.90-1.99 (m, 1H), 2.01-2.09 (m, 2H), 3.68-3.82 (m, 1H), 7.46 (t, 1H), 7.75 (d, 1H), 7.88 (s, 1H), 7.92 (d, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 301 $[M+H]^+$ <i>trans</i> -Isomer: δ (DMSO- d_6) = 0.89 (s, 9H), 1.02-1.19 (m, 2H), 1.25-1.41 (m, 2H), 1.51-1.68 (m, 2H), 1.71-1.85 (m, 2H), 1.90-2.08 (m, 2H), 4.15-4.21 (m, 1H), 7.48 (t, 1H), 7.72 (d, 1H), 7.80 (s, 1H), 7.93 (d, 1H), 8.77 (s, 1H); LC-MS: m/z = 301 $[M+H]^+$
5	<i>cis/trans</i> -Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 0.89 (d, 1.5H), 0.92 (d, 1.5H), 1.31-1.82 (m, 8H), 1.92-1.99 (m, 1H), 3.71-3.83 (m, 0.5H), 4.02-4.10 (m, 0.5H), 7.44-7.49 (m, 1H), 7.71-7.78 (d, 1H), 7.80-7.98 (m, 2H), 8.75 (s, 0.5H), 8.79 (s, 0.5H); LC-MS: m/z = 259 $[M+H]^+$
6	<i>cis/trans</i> -Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 0.85-1.82 (m, 13H), 1.94-2.00 (m, 1H), 3.71-3.83 (m, 0.5H), 4.06-4.13 (m, 0.5H), 7.42-7.50 (m, 1H), 7.71-7.78 (m, 1H), 7.81-7.88 (m, 1H), 7.90-7.95 (m, 1H), 8.75 (s, 0.5H), 8.79 (s, 0.5H); LC-MS: m/z = 273 $[M+H]^+$
7	<i>cis/trans</i> -Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 0.85-1.85 (m, 17H), 1.92-1.99 (m, 1H), 3.71-3.83 (m, 0.5H), 4.06-4.13 (m, 0.5H), 7.42-7.49 (m, 1H), 7.71-7.79 (m, 1H), 7.81-7.93 (m, 2H), 8.75 (s, 0.5H), 8.79 (s, 0.5H); LC-MS: m/z = 301 $[M+H]^+$
8	δ (DMSO- d_6) = 1.12 (t, 3H), 1.58-1.65 (m, 2H), 1.73-1.82 (m, 4H), 2.05-2.13 (m, 2H), 3.51 (q, 2H), 3.65 (s, 2H), 7.46 (t, 1H), 7.65 (s, 1H), 7.75 (dd, 1H), 7.90 (dd, 1H), 8.77 (s, 1H); LC-MS: m/z = 289 $[M+H]^+$
9	δ (DMSO- d_6) = 1.58-1.68 (m, 2H), 1.73-1.82 (m, 4H), 2.05-2.13 (m, 2H), 3.31 (s, 3H), 3.62 (s, 2H), 7.46 (t, 1H), 7.63 (br s, 1H), 7.75 (dd, 1H), 7.90 (dd, 1H), 8.77 (s, 1H); LC-MS: m/z = 275 $[M+H]^+$
10	δ (DMSO- d_6) = 1.35 (br d, 4H), 7.21-7.28 (m, 2H), 7.32-7.34 (m, 2H), 7.48 (t, 1H), 7.77 (dd, 1H), 7.92 (dd, 1H), 8.78 (s, 1H), 8.97 (br s, 1H); LC-MS: m/z = 313 $[M+H]^+$
11	δ (DMSO- d_6) = 1.45 (s, 4H), 7.48 (t, 1H), 7.60 (dd, 1H), 7.66 (d, 1H), 7.78 (d, 1H), 7.90 (d, 1H), 7.94 (dd, 1H), 8.79 (s, 1H), 9.08 (br s, 1H); LC-MS: m/z = 358 $[M+H]^+$
12	δ (DMSO- d_6) = 1.17 (s, 6H), 1.29 (s, 6H), 1.83-1.90 (m, 2H), 2.51-2.59 (m, 2H), 4.25-4.37 (m, 1H), 7.74 (s, 1H), 8.02 (d, 1H), 8.18 (br s, 1H), 8.85 (s, 1H); LC-MS: m/z = 336 $[M+H]^+$
13	δ (DMSO- d_6) = 1.62-1.72 (m, 6H), 2.08-2.15 (m, 3H), 2.12 (s, 6H), 7.41 (br s, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.73 (dd, 1H), 7.79 (dd, 1H), 8.76 (s, 1H); LC-MS: m/z = 297 $[M+H]^+$
14	δ (DMSO- d_6) = 0.85 (s, 3H), 0.91 (s, 3H), 1.05 (s, 3H), 1.12-1.32 (m, 2H), 1.52-1.83 (m, 4H), 2.61-2.69 (m, 1H), 4.04-4.11 (m, 1H), 7.46 (s, 1H), 7.48 (t, 1H), 7.78 (dd, 1H), 7.92 (dd, 1H), 8.79 (s, 1H); LC-MS: m/z = 299 $[M+H]^+$
15	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 0.80-0.93 (m, 6H), 1.09 (t, 3H), 1.10-1.39 (m, 2H), 1.52-1.91 (m, 3H), 2.75 (q, 2H), 4.02-4.11 (m, 0.5H), 4.38-4.49 (m, 0.5H), 7.42-7.50 (m, 2H), 7.72-7.96 (m, 1.5H), 7.99 (dd, 0.5H), 8.75 (s, 0.5H), 8.79 (s, 0.5H); LC-MS: m/z = 299 $[M+H]^+$
16	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 0.90-2.05 (m, 26H), 4.14-4.22 (m, 1H), 7.46-7.50 (m, 1H), 7.76-7.79 (m, 1H), 7.91-7.93 (m, 1H), 8.74-8.75 (m, 1H); LC-MS: m/z = 357 $[M+H]^+$
17	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 0.92-1.11 (m, 6H), 1.38-2.09 (m, 8H), 2.55-2.67 (m, 5H), 3.72-3.83 (m, 0.7H), 4.08-4.12 (m, 0.3H), 7.41-7.49 (m, 1H), 7.72-7.78 (m, 1H), 7.88-7.92 (m, 2H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 326 $[M+H]^+$
18	δ (DMSO- d_6) = 0.89 (s, 9H), 1.02-1.19 (m, 6H), 1.71 (s, 6H), 7.42-7.49 (m, 2H), 7.71 (d, 1H), 7.91 (d, 1H), 8.78 (s, 1H); LC-MS: m/z = 339 $[M+H]^+$
19	δ (DMSO- d_6) = 0.90 (s, 6H), 1.02-1.11 (m, 2H), 1.25 (br d, 2H), 1.32 (br d, 2H), 1.65-1.75 (m, 3H), 1.90 (s, 2H), 4.32 (br s, 1H), 7.41 (t, 1H), 7.52 (br s, 1H), 7.71 (d, 1H), 7.89 (d, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 341 $[M+H]^+$
20	δ (DMSO- d_6) = 1.09 (t, 1H), 1.20-1.31 (m, 1H), 1.45 (q, 1H), 2.02-2.19 (m, 3H), 2.68-2.81 (m, 2H), 4.05-4.15 (m, 1H), 7.48 (t, 1H), 7.73 (d, 1H), 7.94 (d, 1H), 8.25 (d, 1H), 8.76 (s, 1H); LC-MS: m/z = 381 $[M+H]^+$

Nr.	Physikalische Daten
21	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 0.75 – 1.88 (m, 20 H), 2.62 – 2.71 (m, 2H), 4.56 (d, 0.66H), 4.69 (d, 0.34H), 7.38 (br d, 0.34H), 7.48 (t, 1H), 7.68 (br d, 0.66H), 7.75 (d, 1H), 7.91 (d, 1H), 8.85 (s, 1H); LC-MS: m/z = 329 $[M+H]^+$
22	δ (DMSO- d_6) = 1.05 (t, 1H), 1.12 – 2.12 (m, 8H), 3.85 – 3.99 (m, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.72 (d, 1H), 7.91 (d, 1H), 8.05 (d, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 313 $[M+H]^+$
23	δ (DMSO- d_6) = 0.85 (s, 3H), 1.00-1.08 (m, 2H), 1.11 (s, 3H), 1.18 (s, 3H), 1.25 (br d, 1H), 1.41 – 1.52 (m, 1H), 1.61 – 1.73 (m, 2H), 2.60 – 2.68 (dd, 1H), 3.80 (dd, 1H), 7.43-7.50 (m, 1H), 7.78 (dd, 1H), 7.90 – 8.02 (m, 2H), 8.80 (s, 1H); LC-MS: m/z = 299 $[M+H]^+$
24	δ (DMSO- d_6) = 1.00 (t, 3H), 1.15 – 1.45 (m, 9H), 1.90 (dd, 1H), 2.63 – 2.68 (m, 4H), 4.28 – 4.41 (m, 1H), 7.56 (dd, 1H), 7.79 (dd, 1H), 8.19 (br d, 1H), 8.85 (s, 1H); LC-MS: m/z = 320 $[M+H]^+$
25	δ (DMSO- d_6) = 0.75 (t, 1H), 0.89 (d, 3H), 0.94 (s, 3H), 0.98 (s, 3H), 1.02 – 1.09 (m, 1H), 1.17 (t, 1H), 1.33 – 1.39 (m, 1H), 1.62 – 1.78 (m, 2H), 1.91 – 1.99 (m, 1H), 4.00 – 4.20 (m, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.72 (d, 1H), 7.81 (br d, 1H), 7.91 (d, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 287 $[M+H]^+$
26	δ (DMSO- d_6) = 1.21 (q, 1H), 1.42 (q, 2H), 1.92 – 2.05 (m, 1H), 2.10 – 2.20 (m, 2H), 2.61 – 2.81 (m, 2H), 4.06 – 4.13 (m, 1H), 7.60 (dd, 1H), 7.81 (dd, 1H), 8.38 (br d, 1H), 8.85 (s, 1H); LC-MS: m/z = 399 $[M+H]^+$
27	δ (DMSO- d_6) = 1.23 (q, 1H), 1.45 (q, 2H), 1.98 – 2.05 (m, 1H), 2.10 – 2.17 (m, 2H), 2.65 – 2.81 (m, 2H), 4.05 – 4.18 (m, 1H), 7.30 (d, 1H), 8.06 (d, 1H), 8.41 (br d, 1H), 8.89 (s, 1H); LC-MS: m/z = 415 $[M+H]^+$
28	δ (DMSO- d_6) = 0.68 - 0.82 (m, 6H), 1.02 – 2.15 (m, 16 H), 3.71 – 3.82 (m, 2H), 3.89 – 3.98 (m, 1H), 4.15 – 4.20 (m, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.72 (d, 1H), 7.85 (d, 1H), 7.91 (d, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 385 $[M+H]^+$
29	δ (DMSO- d_6) = 1.19 – 1.49 (m, 3H), 1.95 – 2.09 (m, 1H), 2.10 – 2.21 (m, 1H), 2.61-2.80 (m, 2H), 3.95 – 4.20 (m, 1H), 8.31 (d, 1H), 8.41 (d, 1H), 8.83 (s, 1H), 9.52 (d, 1H); LC-MS: m/z = 459 $[M+H]^+$
30	<i>Nicht identifiziertes Stereoisomer</i> : δ (DMSO- d_6) = 0.84 (d, 3H), 0.86 (d, 3H), 0.90 (d, 3H), 1.09 (q, 1H), 1.41-1.75 (m, 5H), 1.83-1.90 (m, 1H), 3.74-3.80 (m, 1H), 7.48 (t, 1H), 7.70 (dd, 1H), 7.94 (dd, 1H), 8.06 (br d, 1H), 8.87 (s, 1H); LC-MS: m/z = 287 $[M+H]^+$
31	Isomerengemisch: LC-MS: m/z = 273 $[M+H]^+$
32	<i>Cis Isomer</i> : δ (DMSO- d_6) = 0.87 (s, 9H), 1.00-1.60 (m, 7H), 1.93 (br d, 2H), 4.15 (br s, 1H), 7.49 (t, 1H), 7.75 (d, 1H), 7.96 (d, 1H), 7.99 (br d, 1H), 8.85 (s, 1H); LC-MS: m/z = 301 $[M+H]^+$
33	Isomerengemisch: LC-MS: m/z = 315 $[M+H]^+$
34	Isomerengemisch: LC-MS: m/z = 371 $[M+H]^+$
35	LC-MS: m/z = 327 $[M+H]^+$
36	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 0.81-2.00 (m, 16H), 3.80-3.91 (m, 0.6H), 4.00-4.11 (m, 0.4H), 7.42-7.56 (m, 1H), 7.70-7.79 (m, 1H), 7.96 (d, 1H), 8.07 (d, 0.4H), 8.18 (d, 0.6H), 8.83-8.90 (m, 1H); LC-MS: m/z = 299 $[M+H]^+$
37	LC-MS: m/z = 297 $[M+H]^+$
38	δ (DMSO- d_6) = 0.85 (s, 9H), 1.01 – 1.20 (m, 2H), 1.32 – 1.49 (m, 2H), 1.51 – 1.60 (m, 1H), 1.75 – 1.89 (m, 2H), 1.91 – 2.05 (m, 2H), 3.71 – 3.79 (m, 1H), 7.62 (t, 1H), 8.11 (d, 1H), 8.22 (d, 1H), 8.38 (d, 1H), 9.39 (s, 1H); LC-MS: m/z = 317 $[M+H]^+$
39	δ (DMSO- d_6) = 0.85 (s, 9H), 0.95 – 1.19 (m, 2H), 1.31 – 1.45 (m, 2H), 1.55 – 1.65 (m, 1H), 1.75 – 1.98 (m, 2H), 1.99 – 2.12 (m, 2H), 3.71 – 3.89 (m, 1H), 7.62 (t, 1H), 7.78 (t, 1H), 8.09 (d, 1H), 8.20 (d, 1H), 8.30 (s, 1H), 8.39 (d, 1H), 8.88 (s, 1H); LC-MS: m/z = 351 $[M+H]^+$
40	δ (DMSO- d_6) = 1.62-1.78 (m, 2H), 1.90-2.18 (m, 6H), 4.00-4.12 (m, 1H), 7.50 (t, 1H), 7.74 (d, 1H), 7.96 (d, 1H), 8.35 (br d, 1H), 8.89 (s, 1H); LC-MS: m/z = 281 $[M+H]^+$
41	δ (DMSO- d_6) = 1.19 – 1.41 (m, 4H), 7.41 – 7.65 (m, 5H), 7.76 (d, 1H), 7.92 (d, 1H), 8.79 (s, 1H), 9.05 (s, 1H); LC-MS: m/z = 347 $[M+H]^+$

Nr.	Physikalische Daten
42	δ (DMSO- d_6) = 1.20 – 1.62 (m, 20 H), 1.64 – 1.78 (m, 2H), 4.15 – 4.28 (m, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.75 (d, 1H), 7.82 (d, 1H), 7.91 (br d, 1H), 8.25 (s, 1H); LC-MS: m/z = 329 $[M+H]^+$
43	δ (DMSO- d_6) = 0.88-1.49 (m, 3H), 1.55 – 1.65 (m, 1H), 1.73 – 1.89 (m, 1H), 1.91 – 2.01 (m, 1H), 2.18 (s, 3H), 2.39 (s, 3H), 2.55 – 2.71 (m, 1H), 2.75 – 2.85 (m, 1H), 5.35 (t, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.78 (d, 1H), 7.91 (d, 1H), 7.98 (br d, 1H), 8.80 (s, 1H); LC-MS: m/z = 341 $[M+H]^+$
44	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 1.01 – 1.19 (m, 3H), 1.21 – 2.02 (m, 8H), 3.35 – 3.51 (m, 1H), 3.35 – 3.51 (m, 1H), 3.78 – 3.82 (m, 1H), 3.83 – 3.95 (m, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.75 (t, 1H), 7.90 (d, 1H), 7.95 (d, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 289 $[M+H]^+$
45	δ (DMSO- d_6) = 1.58 – 1.78 (m, 4H), 1.90 – 1.99 (m, 2H), 2.05 – 2.12 (m, 2H), 3.95 – 4.00 (m, 1H), 4.30 – 4.38 (m, 1H), 7.20 – 7.26 (m, 1H), 7.26 – 7.35 (m, 4H), 7.45 (t, 1H), 7.25 (d, 1H), 7.92 (d, 1H), 8.14 (d, 1H), 8.76 (s, 1H); LC-MS: m/z = 337 $[M+H]^+$
46	δ (DMSO- d_6) = 1.56 – 1.68 (m, 2H), 1.68 – 1.75 (m, 2H), 1.89 – 1.99 (m, 2H), 2.03 – 2.12 (m, 2H), 3.95 – 4.00 (m, 1H), 4.30 – 4.38 (m, 1H), 7.21 – 7.28 (m, 1H), 7.25 – 7.35 (m, 4 H), 7.47 (t, 1H), 7.75 (d, 1H), 7.92 (d, 1H), 8.15 (d, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 337 $[M+H]^+$
47	δ (DMSO- d_6) = 1.49-1.90 (m, 14H), 4.02-4.17 (m, 1H), 7.46 (t, 1H), 7.73 (d, 1H), 7.92 (d, 1H), 7.94 (br d, 1H), 8.76 (s, 1H); LC-MS: m/z = 273 $[M+H]^+$
48	δ (DMSO- d_6) = 2.01 – 2.13 (m, 2H), 2.15 – 2.28 (m, 2H), 2.29 – 2.43 (m, 2H), 2.54 – 2.60 (m, 2H), 2.89 (s, 3H), 3.61 – 3.72 (m, 2H), 4.01 – 4.12 (m, 1H), 7.50 (t, 1H), 7.72 (d, 1H), 7.98 (d, 1H), 8.35 (s, 1H), 8.91 (s, 1H); LC-MS: m/z = 286 $[M+H]^+$
49	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 1.11 – 1.28 (m, 8H), 1.61 – 1.95 (m, 2H), 2.91 – 3.05 (m, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.71 (d, 1H), 7.91 (d, 1H), 8.74 (s, 1H); LC-MS: m/z = 257 $[M+H]^+$
50	δ (DMSO- d_6) = 0.95 – 1.14 (m, 8H), 2.61 – 2.69 (m, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.72 (d, 1H), 7.91 (d, 1H), 7.95 (br s, 1H), 8.76 (s, 1H); LC-MS: m/z = 231 $[M+H]^+$
51	δ (DMSO- d_6) = 1.20 – 1.35 (m, 2H), 1.43 – 1.55 (m, 1H), 1.62 – 1.82 (m, 2H), 1.85 – 1.92 (m, 2H), 2.02 – 2.11 (m, 1H), 4.68 (dd, 1H), 5.69 (s, 1H), 7.51 (t, 1H), 7.91 – 8.03 (m, 2H), 8.45 (d, 1H), 9.89 (s, 1H); LC-MS: m/z = 274 $[M+H]^+$
52	δ (DMSO- d_6) = 1.12 (t, 2H), 1.79 – 1.89 (m, 1H), 2.00 (s, 2H), 2.05 – 2.12 (m, 1H), 2.72 (s, 3H), 4.21 – 4.31 (m, 1H), 7.01 (d, 1H), 7.29 (br s, 1H), 7.48 (t, 1H), 7.78 (d, 1H), 7.91 (d, 1H), 7.98 (br s, 1H), 8.12 (d, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 350 $[M+H]^+$
53	δ (DMSO- d_6) = 1.61 – 1.79 (m, 4H), 1.81 – 2.00 (m, 4H), 2.61 – 2.69 (m, 1H), 4.21 – 4.30 (m, 1H), 7.12 – 7.20 (m, 1H), 7.28 – 7.32 (m, 4H), 7.48 (t, 1H), 7.78 (d, 1H), 7.92 (d, 1H), 8.05 (br d, 1H), 8.81 (s, 1H); LC-MS: m/z = 321 $[M+H]^+$
54	δ (DMSO- d_6) = 1.41-1.80 (m, 10H), 1.88-2.00 (m, 2H), 3.98-4.10 (m, 1H), 7.49 (t, 1H), 7.73 (d, 1H), 7.95 (d, 1H), 8.20 (br d, 1H), 8.87 (s, 1H); LC-MS: m/z = 259 $[M+H]^+$
55	δ (DMSO- d_6) = 1.06 (t, 3H), 1.45 – 1.55 (m, 2H), 1.85 – 1.92 (m, 2H), 2.98 – 3.05 (m, 4H), 3.90 – 3.98 (m, 1H), 4.00 – 4.09 (m, 2H), 7.45 (t, 1H), 7.72 (d, 1H), 7.91 (d, 1H), 8.08 (d, 1H), 8.78 (s, 1H); LC-MS: m/z = 318 $[M+H]^+$
56	δ (DMSO- d_6) = 1.51 – 1.70 (m, 2H), 1.79 – 1.90 (m, 2H), 3.40 – 3.49 (m, 2H), 3.80 – 3.92 (m, 2H), 4.01 – 4.13 (m, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.75 (d, 1H), 7.92 (d, 1H), 8.05 (br d, 1H), 8.78 (s, 1H); LC-MS: m/z = 247 $[M+H]^+$
57	δ (DMSO- d_6) = 1.71 – 2.11 (m, 4H), 2.71 – 2.88 (m, 2H), 5.25 – 5.33 (m, 1H), 7.09 – 7.20 (m, 3H), 7.32 – 7.36 (m, 1H), 7.47 (t, 1H), 7.80 (d, 1H), 7.92 (d, 1H), 8.41 (br d, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 293 $[M+H]^+$
58	δ (DMSO- d_6) = 1.23 – 1.35 (m, 4H), 7.02 – 7.12 (m, 2H), 7.32 – 7.39 (m, 2H), 7.46 (t, 1H), 7.75 (d, 1H), 7.93 (d, 1H), 8.78 (s, 1H), 8.91 (br s, 1H); LC-MS: m/z = 297 $[M+H]^+$
59	δ (DMSO- d_6) = 1.09-1.19 (m, 4H), 7.48 – 7.56 (m, 3H), 7.81 (d, 1H), 7.95 (d, 1H), 8.09 – 8.18 (m, 2H), 8.80 (s, 1H), 9.09 (br s, 1H); LC-MS: m/z = 324 $[M+H]^+$
60	δ (DMSO- d_6) = 1.05 – 1.18 (m, 4H), 7.12 – 7.18 (m, 1H), 7.20 – 7.31 (m, 4H), 7.48 (t, 1H), 7.79 (d, 1H), 7.94 (d, 1H), 8.78 (s, 1H), 8.90 (br s, 1H); LC-MS: m/z = 279 $[M+H]^+$

Nr.	Physikalische Daten
61	δ (DMSO- d_6) = 1.38 – 1.52 (m, 4H), 1.91 – 1.97 (m, 2H), 2.02 – 2.11 (m, 2H), 2.16 – 2.31 (m, 1H), 3.79 – 3.89 (m, 1H), 7.46 (t, 1H), 7.75 (d, 1H), 7.91 (d, 1H), 8.02 (br s, 1H), 8.78 (s, 1H); LC-MS: m/z = 313 $[M+H]^+$
62	δ (DMSO- d_6) = 0.87 (s, 9H), 0.99-1.40 (m, 5H), 1.77-2.08 (m, 4H), 3.70-3.80 (m, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.73 (d, 1H), 7.90 (d, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 301 $[M+H]^+$
63	δ (DMSO- d_6) = 0.00 (s, 3H), 5.69 (s, 1H), 7.50 (t, 1H), 7.82 (d, 1H), 7.98 (d, 1H), 8.81 (s, 1H); LC-MS: m/z = 249 $[M+H]^+$
64	δ (DMSO- d_6) = 1.78-1.87 (m, 1H), 2.07-2.12 (m, 1H), 2.80-2.92 (m, 4H), 4.23-4.27 (m, 1H), 7.07-7.12 (m, 4H), 7.49 (t, 1H), 7.77 (d, 1H), 7.95 (d, 1H), 8.38 (br d, 1H), 8.85 (s, 1H); LC-MS: m/z = 293 $[M+H]^+$
65	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 0.89-2.08 (m, 16H), 3.95-4.02 (m, 1H), 7.49 (t, 1H), 7.77 (d, 1H), 7.94 (d, 1H), 8.77 (s, 1H); LC-MS: m/z = 299 $[M+H]^+$
66	δ (DMSO- d_6) = 3.00 (dd, 2H), 3.30 (dd, 2H), 4.78 (q, 1H), 7.15-7.21 (m, 2H), 7.22-7.31 (m, 2H), 7.49 (t, 1H), 7.78 (d, 1H), 7.97 (d, 1H), 8.69 (d, 1H), 8.88 (s, 1H); LC-MS: m/z = 279 $[M+H]^+$
67	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 1.61-1.90 (m, 9H), 3.65 (s, 3H), 7.49 (t, 1H), 7.69-7.74 (m, 1H), 7.93-7.96 (m, 1H), 8.38 (br d, 1H), 8.77 (s, 1H); LC-MS: m/z = 371 $[M+H]^+$
68	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 1.15-1.90 (m, 9H), 3.68 (s, 3H), 7.47 (t, 1H), 7.74 (d, 1H), 7.96 (d, 1H), 8.78 (s, 1H); LC-MS: m/z = 371 $[M+H]^+$
69	δ (DMSO- d_6) = 1.39 (s, 3H), 1.40 (s, 3H), 3.72-3.87 (m, 2H), 3.99-4.17 (m, 3H), 7.51 (t, 1H), 7.86 (d, 1H), 8.00 (d, 1H), 8.31 (br d, 1H), 8.94 (s, 1H); LC-MS: m/z = 219 $[M+H-C_3H_6O]^+$
70	δ (DMSO- d_6) = 1.01 (s, 3H), 1.11 (s, 3H), 1.58 (dd, 1H), 1.81 (dd, 1H), 2.30-2.58 (m, 5H), 4.98-5.10 (m, 1H), 6.01 (s, 1H), 7.48 (t, 1H), 7.79 (d, 1H), 7.98 (d, 1H), 8.39 (br d, 1H), 8.87 (s, 1H); LC-MS: m/z = 325 $[M+H]^+$
71	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 1.36-2.04 (m, 8H), 4.22-4.28 (m, 1H), 4.69 (br s, 1H), 6.89 (t, 1H), 7.01 (dd, 2H), 7.24 (dd, 2H), 7.45 (t, 1H), 7.78 (d, 1H), 7.85 (br d, 1H), 7.92 (d, 1H), 8.72 (s, 1H); LC-MS: m/z = 337 $[M+H]^+$
72	δ (DMSO- d_6) = 1.62-1.78 (m, 2H), 2.11-2.20 (m, 2H), 2.65-2.80 (m, 4H), 3.86-3.98 (m, 1H), 7.49 (t, 1H), 7.75 (d, 1H), 7.98 (d, 1H), 8.38 (br d, 1H), 8.88 (s, 1H); LC-MS: m/z = 263 $[M+H]^+$
73	δ (DMSO- d_6) = 0.85 (s, 3H), 0.89 (s, 3H), 0.98 (s, 3H), 1.08 (dd, 1H), 1.30-1.38 (m, 2H), 1.66-1.90 (m, 3H), 2.22-2.31 (m, 1H), 4.37-4.43 (m, 1H), 7.47 (t, 1H), 7.73 (dd, 1H), 7.91 (dd, 1H), 8.79 (s, 1H); LC-MS: m/z = 299 $[M+H]^+$
74	δ (DMSO- d_6) = 1.14-1.24 (m, 3H), 1.46-1.59 (m, 4H), 1.69-1.77 (m, 1H), 2.26-2.28 (m, 2H), 3.78-3.82 (m, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.72 (dd, 1H), 7.90 (dd, 1H), 8.75 (s, 1H); LC-MS: m/z = 257 $[M+H]^+$
75	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 1.06 (s, 9H), 1.58-1.60 (m, 1H), 1.68 (br s, 1H), 2.28-2.33 (m, 2H), 2.66-2.78 (m, 1H), 3.83 (dd, 1H), 7.52 (t, 1H), 7.82 (dd, 1H), 8.01 (dd, 1H), 8.87 (s, 1H); LC-MS: m/z = 328 $[M+H]^+$
76	<i>Cis isomer</i> : δ (DMSO- d_6) = 1.63-1.99 (m, 9H), 4.23-4.26 (m, 1H), 7.15-7.19 (m, 1H), 7.28-7.31 (m, 4H), 7.50 (t, 1H), 7.76 (dd, 1H), 7.96 (dd, 1H), 8.23 (br d, 1H), 8.90 (s, 1H); LC-MS: m/z = 321 $[M+H]^+$
77	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 0.87 (t, 3H), 1.43 (sextet, 2H), 1.60-1.68 (m, 1H), 1.71 (br s, 3H), 1.84-1.86 (m, 1H), 2.13 (d, 1H), 2.23-2.35 (m, 5H), 2.68-2.75 (m, 1H), 3.89 (dd, 1H), 7.51 (t, 1H), 7.80 (d, 1H), 7.97 (d, 1H), 8.09 (br d, 1H), 8.91 (s, 1H); LC-MS: m/z = 314 $[M+H]^+$
78	Isomerengemisch: δ (DMSO- d_6) = 1.01 (d, 6H), 1.59-1.62 (m, 1H), 1.69 (br s, 3H), 1.82-1.84 (m, 1H), 2.26-2.43 (m, 3H), 2.60-2.73 (m, 3H), 3.86 (dd, 1H), 7.52 (t, 1H), 7.81 (dd, 1H), 7.99 (dd, 1H), 8.06 (br d, 1H), 8.88 (s, 1H); LC-MS: m/z = 314 $[M+H]^+$

Nr.	Physikalische Daten
79	δ (DMSO- d_6) = 1.08 (s, 3H), 1.19 (s, 3H), 1.52-1.58 (m, 1H), 1.81-2.00 (m, 6H), 2.26-2.43 (m, 2H), 3.33-3.35 (m, 2H), 7.48 (t, 1H), 7.73 (d, 1H), 7.95 (dd, 1H), 8.40 (br t, 1H), 8.88 (s, 1H); LC-MS: m/z = 299 $[M+H]^+$

Anwendungsbeispiele**Beispiel A****Alternaria-Test (Tomate) / protektiv**

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile N,N-Dimethylformamid

5 Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Tomatenpflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von *Alternaria solani* inokuliert und stehen dann 24 h bei 100% relativer Feuchte und 22 °C. Anschließend stehen die Pflanzen bei 96 % relativer Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 20 °C.

15 7 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen 3, 4, 5, 6, 7, 11, 35, 36, 62, 53, 22, 57, 66, 71, 73, 74, 76 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 500 ppm einen Wirkungsgrad von 70 % oder mehr.

Beispiel B**Pyrenophora teres-Test (Gerste) / protektiv**

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile N,N-Dimethylformamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Gerstenpflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer wässrigen Sporensuspension von *Pyrenophora teres* inokuliert und verbleiben dann 48 h bei 100 % relativer Luftfeuchte und 22 °C. Anschließend werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 20 °C aufgestellt.

- 7-9 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 23, 30, 31, 35, 36, 62, 37, 53, 76 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 500 ppm einen Wirkungsgrad von 70 % oder mehr.

Beispiel C**Venturia - Test (Apfel) / protektiv**

Lösungsmittel: 24,5 Gewichtsteile Aceton

24,5 Gewichtsteile Dimethylacetamid

5 Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge besprüht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit einer wässrigen Konidiensuspension des Apfelschorferregers *Venturia inaequalis* inokuliert und verbleiben dann 1 Tag bei ca. 20 °C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine. Die Pflanzen werden dann im Gewächshaus bei ca. 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 90 % aufgestellt.

15 10 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen 4, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 62, 65, 32, 25, 47, 54, 57, 76 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 100 ppm einen Wirkungsgrad von 70 % oder
20 mehr.

Beispiel D**Botrytis-Test (Bohne) / protektiv**

Lösungsmittel: 24,5 Gewichtsteile Aceton

24,5 Gewichtsteile Dimethylacetamid

5 Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge besprüht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden auf jedes Blatt 2 kleine mit *Botrytis cinerea* bewachsene Agarstückchen aufgelegt. Die inokulierten Pflanzen werden in einer abgedunkelten Kammer bei ca. 20 °C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit aufgestellt.

15 2 Tage nach der Inokulation wird die Größe der Befallsflecken auf den Blättern ausgewertet. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen 4, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 3, 62, 65, 32, 25, 47, 54, 53, 22, 57, 76 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250 ppm einen Wirkungsgrad von 70 % oder mehr.

Beispiel E**Septoria tritici-Test (Weizen) / protektiv**

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile N,N-Dimethylacetamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge besprüht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von *Septoria tritici* besprüht. Die Pflanzen verbleiben 48 Stunden bei 20 °C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine. Danach werden die Pflanzen für weitere 60 Stunden unter eine Klarsichthaube bei 15 °C und 100 % relativer Luftfeuchte gestellt. Die Pflanzen werden in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von ca. 15 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % aufgestellt.

- 15 21 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen 5, 6, 7, 53 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 1000 ppm einen Wirkungsgrad von 70 % oder mehr.

Beispiel F**Spodoptera frugiperda-Test (Spritzbehandlung)**

Lösungsmittel: 78,0 Gewichtsteile Aceton

1,5 Gewichtsteile Dimethylformamid

5 Emulgator: 0,5 Gewichtsteile Alkylarylpolyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit emulgatorhaltigem Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Maisblattscheiben (*Zea mays*) werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration gespritzt und nach dem Abtrocknen mit Raupen des Heerwurms (*Spodoptera frugiperda*) besetzt. Nach der gewünschten Zeit wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Raupen abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Raupe abgetötet wurde.

Bei diesem Test zeigt z.B. die erfindungsgemäße Verbindung 7 bei einer Aufwandmenge von 500 g/ha eine Wirksamkeit von 80 % oder mehr.

Beispiel G**Pyricularia-Test (Reis) / protektiv**

Lösungsmittel: 28,5 Gewichtsteile Aceton

Emulgator: 1,5 Gewichtsteile Polyoxyethylen-alkyl-phenyl-ether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach dem Besprühen werden die Pflanzen mit einer wässrigen Sporensuspension von *Pyricularia oryzae* besprüht. Die Pflanzen verbleiben 1 Tag bei ca. 25 °C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine.

5 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

- 15 In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen 4, 13, 14, 15, 36, 49 und 62 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250 ppm einen Wirkungsgrad von 80 % oder mehr.

Beispiel H**Cochliobolus-Test (Reis) / protektiv**

Lösungsmittel: 28,5 Gewichtsteile Aceton

Emulgator: 1,5 Gewichtsteile Polyoxyethylen-alkyl-phenyl-ether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach dem Besprühen werden die Pflanzen mit einer wässrigen Sporensuspension von *Cochliobolus miyabeanus* besprüht. Die Pflanzen verbleiben 1 Tag bei ca. 25 °C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine.

4 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

- 15 In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen 4, 36 und 62 bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250 ppm einen Wirkungsgrad von 80 % oder mehr.

Beispiel I**Boophilus microplus –Test (BOOPMI Injektion)**

Lösungsmittel: Dimethylsulfoxid

5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 10 mg Wirkstoff mit 0,5 ml Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration. Die Wirkstofflösung wird in das Abdomen (*Boophilus microplus*) injiziert, die Tiere werden in Schalen überführt und in einem klimatisierten Raum aufbewahrt. Die Wirkungskontrolle erfolgt auf Ablage fertiler Eier.

10 Nach der gewünschten Zeit wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100%, dass keine Zecke fertile Eier gelegt hat. Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von ≥ 80 % bei einer Aufwandmenge von 20 μ g / Tier:

Bsp. Nr: 3,4,6,7,14,15,16,23,36

Beispiel J**Boophilus microplus – Test (DIP)**

Testtiere: adulte gesogene Weibchen von *Boophilus microplus* Stamm Parkhurst-SP-resistent

Lösungsmittel: Dimethylsulfoxid

- 5 10 mg Wirkstoff werden in 0,5 ml Dimethylsulfoxid gelöst. Zwecks Herstellung einer geeigneten Formulierung verdünnt man die Wirkstofflösung mit Wasser auf die jeweils gewünschte Konzentration. Diese Wirkstoffzubereitung wird in Röhrchen pipettiert. Fünf bis zehn Zecken werden in ein weiteres Röhrchen mit Löchern überführt. Das Röhrchen wird in die Wirkstoffzubereitung getaucht wobei alle Zecken vollständig benetzt werden. Nach Ablaufen der Flüssigkeit werden die Zecken auf
- 10 Filterscheiben in Kunststoffschalen überführt und in einem klimatisierten Raum aufbewahrt. Die Wirkungskontrolle erfolgt nach der gewünschten Zeit auf Ablage fertiler Eier. Eier, deren Fertilität nicht äußerlich sichtbar ist, werden in Glasröhrchen bis zum Larvenschlupf im Klimaschrank aufbewahrt. Eine Wirkung von 100 % bedeutet, dass keine Zecke fertile Eier gelegt hat.

- Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von $\geq$
- 15 80 % bei einer Aufwandmenge von 100 ppm:

Bsp. Nr: 3,23

Beispiel K**Myzus-Test (MYZUPE Spritzbehandlung)**

Lösungsmittel	78	Gewichtsteile Aceton
	1,5	Gewichtsteile Dimethylformamid
5 Emulgator	0,5	Gewichtsteile Alkylarylpolyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit emulgatorhaltigem Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Chinakohlblattscheiben (*Brassica pekinensis*), die von allen Stadien der Grünen Pfirsichblattlaus (*Myzus persicae*) befallen sind, werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration gespritzt.

Nach 5 Tagen wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Blattläuse abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Blattläuse abgetötet wurden. Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von ≥ 80 % bei einer Aufwandmenge von
15 500 g / ha:

Bsp. Nr: 14,15,23,68,72

Beispiel L**Tetranychus-Test, OP-resistent (TETRUR Spritzbehandlung)**

Lösungsmittel:	78,0	Gewichtsteile Aceton
	1,5	Gewichtsteile Dimethylformamid
5 Emulgator:	0,5	Gewichtsteile Alkylarylpolyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit emulgatorhaltigem Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Bohnenblattscheiben (*Phaseolus vulgaris*), die von allen Stadien der Gemeinen Spinnmilbe (*Tetranychus urticae*) befallen sind, werden mit einer Wirkstoffzubereitung der gewünschten Konzentration gespritzt.

Nach 6 Tagen wird die Wirkung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass alle Spinnmilben abgetötet wurden; 0 % bedeutet, dass keine Spinnmilben abgetötet wurden. Bei diesem Test zeigen z. B. die folgenden Verbindungen der Herstellungsbeispiele Wirkung von ≥ 80 % bei einer Aufwand-

15 menge von 500 g/ha:

Bsp. Nr: 3,4,5,6,14,15,23,43,68

Beispiel M**Meloidogyne incognita-Test (MELGIN)**

Lösungsmittel: 78,0 Gewichtsteile Aceton und 1,5Gewichtsteile Dimethylformamid

Emulgator: 0,5 Gewichtsteile Alkylarylpolyglykolether


- 5 Zur Herstellung einer Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration. Gefäße werden mit Sand, Wirkstofflösung, *Meloidogyne incognita*-Ei-Larvensuspension und Salatsamen gefüllt. Die Salatsamen keimen und die Pflänzchen entwickeln sich. An den Wurzeln entwickeln sich die Gallen. Nach 14 Tagen wird die nematizide Wirkung an
- 10 Hand der Gallenbildung in % bestimmt. Dabei bedeutet 100 %, dass keine Gallen gefunden wurden; 0 % bedeutet, dass die Zahl der Gallen an den behandelten Pflanzen der der unbehandelten Kontrolle entspricht.

Bei diesem Test zeigt die Verbindung 10 eine Wirkung von 90 % bei einer Aufwandmenge von 20 ppm.

- 15 Bsp. Nr: 43

Patentansprüche

1. Cycloalkylamidbenzoxa(thia)zole der Formel (I)



in welcher

- 5 X^1 für Sauerstoff oder Schwefel steht,
- X^2 für Sauerstoff oder Schwefel steht,
- R^1 für Wasserstoff, Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, Hydroxy, Sulfanyl (SH), C_1 - C_8 -Alkoxy, (C_1 - C_8 -Alkoxy)carbonyl, Amino, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -Alkyl)amino, C_1 - C_8 -Alkylthio, C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl oder C_1 - C_8 -Alkylsulfonyl steht,
- 10 R^2 für Halogen, Hydroxy, Cyano, Nitro, C_1 - C_8 -Alkyl, C_1 - C_8 -Alkoxy, C_1 - C_8 -Alkylthio, C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Alkylsulfonyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkoxy, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht
- 15
- m für 0, 1 oder 2 steht, wobei zwei benachbarte Reste R^2 für C_4 -Alkenylen stehen, wenn m für 2 steht,
- 20
- R^3 für C_3 - C_{12} -Cycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Amino, C_1 - C_8 -Alkyl-amino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)-amino, C_1 - C_{12} -Alkyl, C_1 - C_8 -Alkoxy, C_1 - C_8 -Alkylthio, C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Alkylsulfonyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), C_1 - C_{12} -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -
- 25

5 Halogenalkylsulfonyl, Halogen-C₁-C₄-alkoxy-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylthio-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfinyl-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfonyl-C₁-C₄-alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl oder C₃-C₆-Cycloalkyl-C₁-C₄-alkyl (welche jeweils im Cycloalkylteil wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder ver-
 10 schieden durch Halogen, Hydroxy, C₁-C₄-Alkyl substituiert sein können), Phenyl, Benzyl, Phenoxy oder Benzyloxy (welche im Phenylring jeweils wiederum gegeben-
 enfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Alkylthio, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₁-C₆-Ha-
 logenalkylthio substituiert sein können), substituiert sein kann, und wobei der Cyclo-
 15 alkylring gegebenenfalls durch O, S oder C=O unterbrochen sein kann,

oder für durch einen Phenylring oder Heteroarylring anelliertes C₃-C₁₂-Cycloalkyl
 steht, wobei das Cycloalkyl oben genannte Substituenten tragen kann und wobei der
 anellierte Phenylring gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden
 durch Halogen, Cyano, Nitro, Amino, C₁-C₈-Alkyl-amino, Di-(C₁-C₈-alkyl)-amino,
 15 (C₁-C₄-Alkyl)carbonylamino, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Alkylthio, C₁-C₆-
 Halogenalkyl, C₁-C₆-Halogenalkylthio substituiert sein kann,

oder für Bicycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich
 oder verschieden durch Hydroxy, Halogen, C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Alkoxy substitu-
 20 iert sein kann, und wobei der Bicycloalkylring gegebenenfalls durch O oder S unter-
 brochen sein kann,

oder für Tricycloalkyl steht, welches gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich
 oder verschieden durch Hydroxy, Halogen, C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Alkoxy substitu-
 25 iert sein kann, und wobei der Tricycloalkylring gegebenenfalls durch O, S oder NR⁴
 unterbrochen sein kann,

25 R⁴ für Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl, (C₁-C₄-Alkoxy)carbonyl oder für (C₁-C₄-
 Alkyl)carbonyl steht,

sowie deren agrochemisch wirksamen Salze.

2. Cycloalkylamidbenzoxa(thia)zole der Formel (I) gemäß Anspruch 1, in welcher


30 X¹ für Sauerstoff steht,

X² für Sauerstoff steht,

R¹ für Wasserstoff steht,

- R^2 für Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Nitro, Methyl, Methoxy, Trifluormethyl oder Trifluormethoxy steht,
- m für 0 oder 1 steht,
- R^3 für 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl, 4-*tert*-Butylcyclohexyl, 4-*n*-Butylcyclohexyl, 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexyl oder 4-*n*-Ethylcyclohexyl steht,
- R^4 für Wasserstoff, Methyl, Methoxycarbonyl oder Methylcarbonyl steht.
3. Verfahren zur Bekämpfung von pflanzenpathogenen Schadpilzen, dadurch gekennzeichnet, dass man Verbindungen der Formel (I) gemäß Anspruch 1 oder 2, auf die pflanzenpathogenen Schadpilze und/oder deren Lebensraum ausbringt.
- 10 4. Mittel zur Bekämpfung von pflanzenpathogenen Schadpilzen, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einer Verbindung der Formel (I) gemäß Anspruch 1 oder 2, neben Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Stoffen.
5. Verwendung von Cycloalkylamidbenzoxa(thia)zolen der Formel (I), gemäß Anspruch 1 oder 2 zur Bekämpfung von pflanzenpathogenen Schadpilzen.
- 15 6. Verfahren zur Herstellung von Mitteln zur Bekämpfung von pflanzenpathogenen Schadpilzen, dadurch gekennzeichnet, dass man Cycloalkylamidbenzoxa(thia)zole der Formel (I) gemäß Anspruch 1 oder 2 mit Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Stoffen vermischt.
7. Verfahren zum Herstellen der Verbindungen der Formel (I) umfassend wenigstens einen der folgenden Schritte der Verfahren A bis H:

Schema 1: Verfahren A




R^{1a} steht für Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl, Hydroxy, Sulfanyl (SH) oder Amino.

R^{1b} steht für Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl.

5 Alk¹ steht für Methyl oder Ethyl.

Schema 2: Verfahren B



R^{1a} steht für Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl, Hydroxy, Sulfanyl (SH) oder Amino.


10 R^{1b} steht für Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl.

Alk¹ steht für Methyl oder Ethyl.

Schema 3: Verfahren C




Schema 4: Verfahren D



$\text{R}^{1\text{c}}$ steht für Fluor, Chlor oder Brom.


Schema 5: Verfahren E



$\text{R}^{1\text{c}}$ steht für Fluor, Chlor oder Brom.

$\text{R}^{1\text{d}}$ steht für $\text{C}_1\text{-C}_8\text{-Alkoxy}$.

Schema 6: Verfahren F




R^{1c} steht für Fluor, Chlor oder Brom.

R^{1e} steht für (C₁-C₈-Alkoxy)carbonyl.

5

Schema 7: Verfahren G




R^{1f} steht für C₁-C₈-Alkylthio.

R^{1g} steht für C₁-C₈-Alkylsulfinyl oder C₁-C₈-Alkylsulfonyl.

10 Alk^2 steht für C₁-C₈-Alkyl.

LG^1 steht für Chlor oder Brom.

Schema 8: Verfahren H




15 R^{1h} steht für C₁-C₈-Alkylamino oder Di-(C₁-C₈-Alkyl)amino.

Alk^2 steht für C₁-C₈-Alkyl.

LG^1 steht für Chlor oder Brom.

worin X^1 , X^2 , R^1 , R^2 , R^3 und m die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben.

8. Nitrobenzoesäure-Derivate der Formel (VIII-a)




in welcher

5 X^1 und m die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben, und

10 R^{2a} für C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

sowie Salze davon.

9. Aminobenzoessäure-Derivate der Formel (VII-a)



15


in welcher

X^1 und m die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben, und

20 R^{2b} für C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

sowie Salze davon.

10. Verbindungen der Formel (VI-a)




in welcher

5 X^1 und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und

R^{2c} für C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfinyl- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylsulfonyl- C_1 - C_4 -alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

sowie Salze davon.

11. Benzoxa(thia)zolcarbonsäureester der Formel (V-a)



in welcher


X^1 , R^{1a} und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und

R^{2d} für C_1 - C_8 -Alkylsulfinyl, C_1 - C_4 -Alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, (C_1 - C_4 -Alkyl)thio(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfinyl(C_1 - C_4 -alkyl), (C_1 - C_4 -Alkyl)sulfonyl(C_1 - C_4 -alkyl), Formyl, C_1 - C_8 -Alkylcarbonyl, C_1 - C_8 -Alkylamino, Di-(C_1 - C_8 -alkyl)amino, C_1 - C_8 -Halogenalkyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylthio, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfinyl, C_1 - C_8 -Halogenalkylsulfonyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkoxy- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -alkylthio- C_1 - C_4 -alkyl, Halogen- C_1 - C_4 -

alkylsulfinyl-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfonyl-C₁-C₄-alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

sowie Salze davon.

12. Verbindungen der Formel (IV-a),



5

in welcher


X¹, R^{1a} und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und

R^{2e} für C₁-C₈-Alkylsulfinyl, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, (C₁-C₄-Alkyl)thio(C₁-C₄-alkyl), (C₁-C₄-Alkyl)sulfinyl(C₁-C₄-alkyl), (C₁-C₄-Alkyl)sulfonyl(C₁-C₄-alkyl), Formyl, C₁-C₈-Alkylcarbonyl, C₁-C₈-Alkylamino, Di-(C₁-C₈-alkyl)amino, C₁-C₈-Halogenalkyl, C₁-C₈-Halogenalkylthio, C₁-C₈-Halogenalkylsulfinyl, C₁-C₈-Halogenalkylsulfonyl, Halogen-C₁-C₄-alkoxy-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylthio-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfinyl-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfonyl-C₁-C₄-alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht,

15

sowie Salze davon.

13. Verbindungen der Formel (X-a)



in welcher


X¹, R³ und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und

20

R^{2f} für Halogen, Hydroxy, Cyano, Nitro, C₁-C₈-Alkyl, C₁-C₈-Alkoxy, C₁-C₈-Alkylthio, C₁-C₈-Alkylsulfinyl, C₁-C₈-Alkylsulfonyl, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, (C₁-C₄-Alkyl)thio(C₁-C₄-alkyl), (C₁-C₄-Alkyl)sulfinyl(C₁-C₄-alkyl), (C₁-C₄-Alkyl)sulfonyl(C₁-

5 C₄-alkyl), Formyl, C₁-C₈-Alkylcarbonyl, C₁-C₈-Alkylamino, Di-(C₁-C₈-alkyl)amino, C₁-C₈-Halogenalkyl, C₁-C₈-Halogenalkoxy, C₁-C₈-Halogenalkylthio, C₁-C₈-Halogenalkylsulfinyl, C₁-C₈-Halogenalkylsulfonyl, Halogen-C₁-C₄-alkoxy-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylthio-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfinyl-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfonyl-C₁-C₄-alkyl, Phenyl (welches wiederum gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Nitro, C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkoxy, C₁-C₆-Alkylthio, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₁-C₆-Halogenalkylthio substituiert sein kann), Heteroaryl, Heterocyclyl steht.

14. Verbindungen der Formel (XI-a),



10

in welcher

X¹ und m die oben angegebenen Bedeutungen haben, und

15 R^{2g} für C₁-C₈-Alkylsulfinyl, C₁-C₄-Alkoxy-C₁-C₄-alkyl, (C₁-C₄-Alkyl)thio(C₁-C₄-alkyl), (C₁-C₄-Alkyl)sulfinyl(C₁-C₄-alkyl), (C₁-C₄-Alkyl)sulfonyl(C₁-C₄-alkyl), Formyl, C₁-C₈-Alkylcarbonyl, C₁-C₈-Alkylamino, Di-(C₁-C₈-alkyl)amino, C₁-C₈-Halogenalkyl, C₁-C₈-Halogenalkylthio, C₁-C₈-Halogenalkylsulfinyl, C₁-C₈-Halogenalkylsulfonyl, Halogen-C₁-C₄-alkoxy-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylthio-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfinyl-C₁-C₄-alkyl, Halogen-C₁-C₄-alkylsulfonyl-C₁-C₄-alkyl, Aryl, Hetaryl, Heterocyclyl steht.

20 15. Verwendung von Verbindungen der Formel (I) gemäß den Anspruch 1 oder 2 zur Behandlung von transgenen Pflanzen.