



(19) **UA** (11) **79 163** (13) **C2**
(51)МПК

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ УКРАИНЫ

(21), (22) Заявка: а200504633, 17.10.2003

(24) Дата начала действия патента: 25.05.2007

(30) Приоритет: 18.10.2002 FR 02/12964

(46) Дата публикации: 25.05.2007 А61Р 35/00
20070101CFI20070115RMUA C07D
497/00 20070101CLI20070115RMUA

(86) Заявка РСТ:
РСТ/FR03/03068, 20031017

(72) Изобретатель:

Кудер Жерар, FR,
Лепифр Франк, FR,
Кеньяр Даниэль-Энри, FR,
Ренар Пьер, FR,
Икман Джон, FR,
Пьер Ален, FR,
Краус-Бертье Лоранс, FR


(73) Патентовладелец:

ЛЕ ЛАБОРАТУАР СЕРВЬЕ, FR

(54) ЗАМЕЩЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ БЕНЗО[Е][1,4]ОКСАЗИНО[3,2-*G*]ИЗОИНДОЛА, СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ, КОТОРАЯ ИХ СОДЕРЖИТ

(57) Реферат:

Соединения формулы (I):



где:

W₁ представляет собой, с атомами углерода, к которым он прикреплен, фенильную группу или пиридинильную группу,

Z представляет собой группу, выбранную из водорода, галогена и групп линейного или разветвленного (C₁-C₆)алкила, арила, арил-(C₁-C₆)алкила, в котором алкильная часть может быть линейной или разветвленной, арилокси, арил-(C₁-C₆)алкокси, в котором

алкоксичасть может быть линейной или разветвленной, гидроксильной и линейной или разветвленной (C₁-C₆)алкокси,

R₁ является таким, как определено в описании,

R₂ представляет собой атом водорода или группу формулы -CH₂CH₂O-R₃,

R₃ и R₄, каждый представляет собой атом водорода, линейную или разветвленную (C₁-C₆)алкильную группу, арильную группу и арил-(C₁-C₆)алкильную группу, в которой алкильная часть может быть линейной или разветвленной,

n представляет собой целое число от 1 до 6 включительно.

Лекарство.

Официальный бюллетень "Промышленная собственность". Книга 1 "Изобретения, полезные модели, топографии интегральных микросхем", 2007, N 7, 25.05.2007. Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины.



(19) **UA** (11) **79 163** (13) **C2**
(51) Int. Cl.

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF
UKRAINE

STATE DEPARTMENT OF INTELLECTUAL
PROPERTY

(12) DESCRIPTION OF PATENT OF UKRAINE FOR INVENTION

(21), (22) Application: a200504633, 17.10.2003

(24) Effective date for property rights: 25.05.2007

(30) Priority: 18.10.2002 FR 02/12964

(46) Publication date: 25.05.2007A61P 35/00
20070101CFI20070115RMUA C07D
497/00 20070101CLI20070115RMUA

(86) PCT application:
PCT/FR03/03068, 20031017

(72) Inventor:

COUDERT GERARD, FR,
LEPIFRE FRANCK, FR,
CAIGNARD DANIEL-HENRI, FR,
RENARD PIERRE, FR,
HICKMAN JOHN, FR,
PIERRE ALAIN, FR,
KRAUS-BERTHIER LAURENCE, FR


(73) Proprietor:

LES LABORATOIRES SERVIER, FR

(54) SUBSTITUTED COMPOUNDS OF BENZO[E][1,4]OXAZINO[3,2-G]ISOINDOLE, METHOD FOR PREPARATION THEREOF AND PHARMACEUTICAL COMPOSITION CONTAINING THEREOF

(57) Abstract:

The invention relates to compounds of formula (I),



wherein:

W₁ represents with the carbon atoms whereto it is bound, a phenyl group or a pyridinyl group;

Z represents a group selected among a hydrogen atom, halogen, a linear or branched C₁-C₆

alkyl, aryl, linear or branched C₁-C₆ arylalkyl, aryloxy, linear or branched C₁-C₆ arylalkoxy, hydroxy, linear or branched C₁-C₆ alkoxy group;

R₁ is such as defined in the description;

R₂ represents a hydrogen atom or a group of formula -CH₂CH₂O-R₈;

R₃ and R₄ represent each a hydrogen atom, a linear or branched C₁-C₆ alkyl, aryl, linear or branched C₁-C₆, arylalkyl group;

n represents an integer between 1 and 6 inclusive.

The invention is useful for preparing medicines.

Official bulletin "Industrial property". Book 1 "Inventions, utility models, topographies of integrated circuits", 2007, N 7, 25.05.2007. State Department of Intellectual Property of the Ministry of Education and Science of Ukraine.



(19) **UA** (11) **79 163** (13) **C2**
(51)МПК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(12) ОПИС ВІНАХОДУ ДО ПАТЕНТУ УКРАЇНИ

(21), (22) Дані стосовно заявки:
а200504633, 17.10.2003

(24) Дата набуття чинності: 25.05.2007

(30) Дані стосовно пріоритету відповідно до Паризької конвенції : 18.10.2002 FR 02/12964

(46) Публікація відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту): 25.05.2007А61Р 35/00 20070101СFІ20070115RМUА С07D 497/00 20070101СLІ20070115RМUА

(86) Номер та дата подання міжнародної заявки відповідно до договору РСТ:
РСТ/FR03/03068, 20031017

(72) Винахідник(и):

Кудер Жерар , FR,
Лепіфр Франк , FR,
Кеньяр Даніель-Енрі , FR,
Ренар Пьер , FR,
Ікман Джон , FR,
Пьер Ален , FR,
Краус-Бертъе Лоранс , FR


(73) Власник(и):

ЛЕ ЛАБОРАТУАР СЕРВЬЕ, FR

(54) ЗАМІЩЕНІ СПОЛУКИ БЕНЗО[Е][1,4]ОКСАЗИНО[3,2-С]ІЗОІНДОЛУ, СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ І ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА ЇХ МІСТИТЬ

(57) Реферат:

Сполуки формули (I):



де:

W₁ являє собою, з атомами вуглецю, до яких він прикріплений, фенільну групу або піридиньну групу,

Z являє собою групу, вибрану з водню,

галогену і груп лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкілу, арилу, арил-(C₁-C₆)алкілу, в якому алкільна частина може бути лінійною або розгалуженою, арилокси, арил-(C₁-C₆)алкокси, в якому алкоксичастина може бути лінійною або розгалуженою, гідрокси і лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкокси,


R₁ є таким, як визначено в описі,

R₂ являє собою атом водню або групу формули -CH₂CH₂O-R₈,

R₃ і R₄, кожний являє собою атом водню, лінійну або розгалужену (C₁-C₆)алкільну групу, арильну групу і арил-(C₁-C₆)алкільну групу, в якій алкільна частина може бути лінійною або розгалуженою,


n являє собою ціле число від 1 до 6 включно.

Ліки.




де R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , W_1 , Z і n є такими ж, як визначено для формули (I).

10 Відповідно до другого переважного втілення, переважні сполуки за даним винаходом являють собою сполуки формули (I), які відповідають більш конкретно формулі (IB):



де R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , Z і n є такими ж, як визначено вище.

20 Відповідно до третього переважного втілення, переважні сполуки за даним винаходом являють собою сполуки формули (I), які відповідають більш конкретно формулі (IC):



де R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , Z і n є такими ж, як визначено вище.

30 В одному втіленні, яке представляє інтерес, група Z , якій віддають перевагу згідно з даним винаходом, являє собою атом водню.

В іншому втіленні, яке представляє інтерес, група R_1 , якій віддають перевагу згідно з даним винаходом, являє собою атом водню і групу $-C(O)-R_5$, де R_5 являє собою більш конкретно атом водню.

Переважно, група R_2 , якій віддають перевагу згідно з даним винаходом, являє собою атом водню і групу $-CH_2CH_2O-R_8$, де R_8 являє собою більш конкретно атом водню.

35 Особливо переважно, переважними сполуками за даним винаходом є ті, де n являє собою ціле число 2.

Особливо переважно, групи R_3 і R_4 , яким віддають перевагу згідно з даним винаходом, які можуть бути однаковими або відрізнятись, кожна являє собою незалежно від іншої лінійну або розгалужену (C_1-C_6) алкільну групу.

40 Сполуки, яким віддають перевагу згідно з даним винаходом, являють собою:


- 2-[2-(диметиламіно)етил]-5-гідроксибензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон,
- 2-[2-(діетиламіно)етил]-5-гідроксибензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон,

2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)-2,3-дигідробензо[а]піроло-[3,4-с]-феноксазин-8-карбальдегід-1,3-діон,

- 45
- 2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)бензо[а]піроло[3,4-с]-феноксазин-1,3-діон,
 - 2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетилметансульфонат)бензо[а]піроло-[3,4-с]феноксазин-1,3-діон,
 - 2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)бензо[е]піридо[2',3':5,6][1,4]-оксазино[3,2-g]ізоіндол-1,3-діон.


Енантіомери, діастереоізомери, N-оксиди, і адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою переважних сумішей утворюють невід'ємну частину винаходу.

50 Винахід відноситься також до способу одержання сполук формули (I), який відрізняється тим, що як вихідний матеріал використовують сполуку формули (II):



де W_1 і Z є такими ж, як визначено для формули (I),


аміно функцію сполуки формули (II) захищають захисною групою P_G , добре відомою кваліфікованому в даній галузі техніки фахівцю з тим, щоб одержати сполуку формули (III):



де P_G являє собою трет-бутоксикарбонільну або феноксикарбонільну групу і W_1 і Z є такими ж, як визначено вище,


65 сполуку формули (III) обробляють літій діізопропіламідом, з наступним дифеніл хлорфосфатом з тим, щоб

одержати сполуку формули (IV):




де P_G , W_1 і Z є такими ж, як визначено вище,

сполуку формули (IV) обробляють у присутності біс(трифеніл-фосфін)паладій хлориду сполукою формули (V):




з тим, щоб одержати сполуку формули (VI):



де P_G , W_1 і Z є такими ж, як визначено вище,

сполуку формули (VI):


- або обробляють в інертній атмосфері диметил ацетилендикарбоксилатом з тим, щоб одержати сполуку формули (VII):



де P_G , W_1 і Z є такими ж, як визначено вище,


сполуку формули (VII):

- або обробляють N-бромсукцинімідом і бензоїл пероксидом з тим, щоб одержати сполуку формули (VIII):




де P_G , W_1 і Z є такими ж, як визначено вище,

сполуку формули (VIII) піддають дії хлористоводневої кислоти з тим, щоб одержати сполуку формули (IX):




де W_1 і Z є такими ж, як визначено вище,

сполуку формули (IX) піддають дії ди-трет-бутил дикарбонату у присутності 4-диметиламінопіридину з тим, щоб одержати сполуку формули (X):




де являє собою одинарний або подвійний зв'язок, W_{oc} являє собою трет-бутоксикарбонільну групу і W_1 і Z є такими ж, як визначено вище,

сполуку формули (X) піддають дії 2,3-дихлор-5,6-диціано-1,4-бензохінону з тим, щоб одержати сполуку формули (XI):




де W_{oc} , W_1 і Z є такими ж, як визначено вище,

сполуку формули (XI) піддають дії натрій метанолату і потім гідролізують з тим, щоб одержати сполуку формули (XII):




де Boc, W₁ і Z є такими ж, як визначено вище,

10 сполуку формули (XII) піддають дії сполуки формули (XIII):




де R₃, R₄ і n є такими ж, як визначено для формули (I) з тим, щоб одержати сполуку формули (I/a), конкретний випадок сполук формули (I):




де Boc, R₃, R₄, W₁, Z і n є такими ж, як визначено вище,

сполуку формули (I/a) необов'язково піддають тим же умовам реакції, що і сполуку формули (VIII) з тим, щоб одержати сполуку формули (I/b), конкретний випадок сполук формули (I):




де R₃, R₄, W₁, Z і n є такими ж, як визначено вище,

- або піддають тим же умовам реакції, що і сполуку формули (X) з тим, щоб одержати сполуку формули (XIV):



де P₆, W₁ і Z є такими ж, як визначено вище,


сполуку формули (XIV) піддають тим же умовам реакції, що і сполуку формули (XII) з тим, щоб одержати сполуку формули (I/c), конкретний випадок сполуки формули (I):



де P₆, R₃, R₄, W₁, Z і n є такими ж, як визначено вище,


сполуку формули (I/c):

- або необов'язково піддають дії мурашиної кислоти з тим, щоб одержати сполуки формул (I/d) і (I/e), конкретні випадки сполук формули (I):




де R₃, R₄, W₁, Z і n є такими ж, як визначено вище,


- або необов'язково піддають дії сполуки формули (XV):




де G являє собою відхідну групу і R_{8a}, який відрізняється від атома водню, має те ж визначення, що і R₈ у формулі (I) з тим, щоб одержати сполуку формули (I/f), конкретний випадок сполук формули (I):



10 де R_2 , R_3 , R_4 , R_{8a} , W_1 , Z і n є такими ж, як визначено вище, для аміно функції сполук формули (I/f) необов'язково знімають захист відповідно до звичайних методів органічного синтезу з тим, щоб одержати сполуку формули (I/g), конкретний випадок сполук формули (I):




20 де R_3 , R_4 , R_{8a} , W_1 , Z і n є такими ж, як визначено вище, сполуки формул (I/b), (I/d) і (I/g) складають сполуки формули (I/h):




30 де R_2 , R_3 , R_4 , W_1 , Z і n є такими ж, як визначено вище, сполуки формули (I/h) необов'язково піддають дії сполуки формули (XVI):


де R_{1a} , який відрізняється від атома водню, має те ж визначення, що і R_1 у формулі (I), і G є таким же, як визначено вище з тим, щоб одержати сполуку формули (I/i), конкретний випадок сполук формули (I):



40 де R_{1a} , R_2 , R_3 , R_4 , W_1 , Z і n є такими ж, як визначено вище, - обробляють N-метилмалеїдом з тим, щоб одержати сполуку формули (XVII):



50 де R_2 , W_1 і Z є такими ж, як визначено вище, сполуку формули (XVII) піддають тим же умовам реакції, що і сполуку формули (VII) з тим, щоб одержати сполуку формули (XVIII):



60 де R_2 , W_1 і Z є такими ж, як визначено вище, сполуку формули (XVIII) піддають тим же умовам реакції, що і сполуку формули (XII) з тим, щоб одержати сполуку формули (I/d), як описано вище,

65 сполуки формул (I/a)-(I/i) складають сукупність сполук формули (I), сполуки якої необов'язково очищують, відповідно до звичайної техніки очищення, можуть, якщо бажано, бути розділені на їх різні ізомери відповідно до звичайної техніки розділення і, якщо бажано, перетворені у їх N-оксиди і, необов'язково, в адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

Винахід відноситься також до сполук формули (X), (XI) і (XIV), які є проміжними сполуками синтезу для застосування при одержанні сполук формули (I).

Сполуки формул (II), (V), (XIII), (XV) і (XVI) є або комерційно доступними сполуками, або сполуками, які одержують відповідно до звичайних способів органічного синтезу, добре відомими кваліфікованому в даній галузі фахівцю.

Сполуки формули (I) володіють цінними фармакологічними властивостями. Вони мають відмінну *in vitro* цитотоксичність не тільки на лініях лейкемії, але також на лініях солідних пухлин, і також мають дію на клітинний цикл і є активними *in vivo* на моделі лейкемії. Такі властивості дають їм можливість бути використаними терапевтично як протипухлинні агенти.

Серед типів раку, які піддаються лікуванню сполуками за даним винаходом, можуть бути згадані наступні, без будь-якого обмеження: аденокарциноми і карциноми, саркоми, гліоми і лейкемії.

Даний винахід відноситься також до фармацевтичних композицій, які включають продукти формули (I), їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксиди або одну з фармацевтично прийнятних адитивних солей з основою або кислотою, самі або у поєднанні з одним або більше інертними, нетоксичними ексципієнтами або носіями.

Серед фармацевтичних композицій відповідно до даного винаходу можуть бути згадані більш конкретно ті, які придатні для орального, парентерального, назального, ректального, під'язикового, очного або респіраторного введення, і особливо таблетки або драже, під'язикові таблетки, саше, желатинові капсули, коржикки, супозиторії, креми, мазі, шкірні гелі, ін'єктовані або придатні для пиття препарати, аерозолі, очні краплі або краплі для носа.

Беручи до уваги характеристику фармакологічних властивостей сполук формули (I), фармацевтичні композиції, які включають вказані сполуки формули (I) як активний інгредієнт, таким чином є особливо корисними у лікуванні різних типів раку.

Корисне дозування змінюється відповідно до віку і ваги пацієнта, шляху введення, природи терапевтичного показання і будь-якого пов'язаного лікування і варіює від 0,1 до 400мг на день за одне або більше введень.

Наступні Приклади ілюструють винахід, але не обмежують його жодним чином. Вихідні матеріали, які залучаються, являють собою відомі продукти або продукти, одержані відповідно до відомих методик.

Структури сполук, які описуються у Прикладах, були визначені відповідно до звичайної спектрофотометричної техніки (інфрачервоний, ядерний магнітний резонанс, мас-спектрометрія і т.д.).

Приготування А: трет-Бутил 3-[(дифеноксифосфорил)окси]-4Н-1,4-бензоксазин-4-карбоксилат

Стадія А: трет-Бутил 2,3-дигідро-4Н-1,4-бензоксазин-3-он-4-карбоксилат

В інертній атмосфері, 73ммол 2Н-1,4-бензоксазин-3-ону розчиняють у 100мл ацетонітрилу у присутності 3,65ммол 4-диметиламінопіридину і 80ммол ди-трет-бутил дикарбонату. Суміш перемішують протягом 4 годин. Після концентрування, залишок додають до етилацетату. Органічну фазу промивають насиченим розчином хлориду натрію, сушать над сульфатом магнію, фільтрують і концентрують. Після випаровування розчинника і очищення хроматографією на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 8/2) виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 72°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}$ 1713, 1779 cm^{-1} ; ν_{COC} 1148 cm^{-1} .

Мас-спектр: m/z 250 (M+1).

Стадія В: трет-Бутил 3-[(дифеноксифосфорил)окси]-4Н-1,4-бензоксазин-4-карбоксилат

У безводній атмосфері, 12ммол TMEDA додають до розчину 10ммол продукту, одержаного на попередній Стадії А, у 50мл безводного ТГФ. Після охолодження розчину до -78°C, 12ммол 2М LDA (у розчині гептан/ТГФ) додають краплями. Після перемішування протягом 2 годин, 12ммол дифеніл хлорфосфату додають краплями до реакційної суміші, яка підтримується при -78°C протягом наступних 2 годин. Після повернення до температури навколишнього середовища, розчин гідролізують і потім екстрагують етилацетатом. Органічну фазу сушать над сульфатом магнію, фільтрують і концентрують. Після очищення залишку хроматографією на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 9/1), виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 64°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}$ 1732 cm^{-1} ; $\nu_{P=O}$ 1313 cm^{-1} .

Мас-спектр: m/z 482 (M+1).

Приготування В: Феніл 3-[(дифеноксифосфорил)окси]-2,3-дигідро-4Н-піридо-[3,2-b][1,4]оксазин-4-карбоксилат

Стадія А: Феніл 2,3-дигідро-4Н-піридо-[3,2-b][1,4]оксазин-3-он-4-карбоксилат

У безводній атмосфері, розчин 10ммол 2Н-піридо-[3,2-b][1,4]оксазин-3-ону в 50мл тетрагідрофурану охолоджують до -78°C. При цій температурі, 11ммол 1,6М розчину n-бутиллітію в гексані додають краплями. Після 30 хвилинного контакту при -78°C, 11ммол феніл хлорформіату додають краплями і перемішування підтримують протягом наступних 2 годин. Після повернення до температури навколишнього середовища, розчин гідролізують і потім екстрагують етилацетатом. Органічну фазу сушать над сульфатом магнію, фільтрують і випаровують. Після очищення хроматографією на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 8/2) виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 97°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}$ 1717 cm^{-1} ; 1803 cm^{-1} .

Мас-спектр: m/z 271 (M+1).

Стадія В: Феніл 3-[(дифеноксифосфорил)окси]-4Н-піридо-[3,2-b][1,4]оксазин-4-карбоксилат

Очікуваний продукт одержують згідно з методикою, описаною на Стадії В Приготування А, починаючи зі сполуки вищезазначеної Стадії.

Точка плавлення: 82°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1749\text{см}^{-1}$; $\nu_{P=O}$ 1294 см^{-1} .

Мас-спектр: m/z 503 (M+1).

Приготування С: 8-(Пінаколбороніл)-1,4-діоксаспіро[4.5]дец-7-ен

Стадія А: 8-(Трифторметил)сульфонілокси-1,4-діоксастро[4.5]дец-7-ен

У безводній атмосфері, 2М розчин 6,4ммол LDA в суміші ТГФ/гептан розбавляють 8мл ТГФ. Температуру знижують до -78°C і потім повільно додають 6,4ммол 1,4-діоксаспіро[4.5]декан-8-ону, розчиненого у 8мл ТГФ. Реакційну суміш перемішують протягом 2 годин при вказаній температурі і додають 9,6ммол N-фенілтрифторметансульфоніміду, розчиненого у 8мл ТГФ. Після перемішування протягом 15 хвилин при -78°C і потім повернення до температури навколишнього середовища протягом ночі, суміш концентрують. Після очищення на нейтральному алюмогелі (нафтовий ефір/етилацетат: 95/5) виділяють очікуваний продукт.

ІЧ (плівка NaCl): $\nu_{C=O}=1692\text{см}^{-1}$; $\nu_{SO_2}=1418\text{см}^{-1}$.

Стадія В: 8-(Пінаколбороніл)-1,4-діоксаспіро[4.5]дец-7-ен

В інертній атмосфері, 0,7ммол продукту, одержаного на попередній Стадії А, 1,05ммол пінаколборану, 0,028ммол біс(трифенілфосфін)паладій(II) хлориду, 0,084ммол трифенілзарзину і 2,1ммол триетиламіну перемішують у 3мл толуолу і потім нагрівають при 80°C протягом 2 годин. Після охолодження, залишок додають до етилацетату і промивають насиченим розчином хлориду натрію. Органічну фазу висушують над сульфатом магнію, фільтрують і концентрують. Після очищення залишку хроматографією на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 9/1), виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 58°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=C}=1635\text{см}^{-1}$; ν_{COC} 1115, 1143 см^{-1} .

Мас-спектр : m/z 267 (M+1).

Приклад 1:

8-(трет-Бутоксикарбоніл)-2-[2-(диметиламіно)етил]-5-гідрокси-2,3-дигідробензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон

Стадія А: трет-Бутил 3-(1,4-діоксаспіро[4.5]дец-7-ен-8-іл)-4Н-1,4-бензоксазин-4-карбоксилат

В інертній атмосфері, 1М розчин 1ммол продукту Приготування А і 5% біс(трифенілфосфін)паладій(II) хлориду в тетрагідрофурані перемішують протягом 10 хвилин при температурі навколишнього середовища. 1,5ммол продукту Приготування С, кілька крапель етанолу і 2ммол 2М водного розчину карбонату натрію додають до реакційної суміші, яку потім нагрівають зі зворотним холодильником протягом однієї години. Після охолодження і гідролізу, розчин екстрагують етилацетатом. Органічну фазу сушать над сульфатом магнію, який фільтрують і концентрують. Після очищення хроматографією на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 6/4), виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 92-93°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1711\text{см}^{-1}$; $\nu_{COC}=1113$, 1163 см^{-1} .

Мас-спектр: m/z 372 (M+1).

Стадія

В:

Диметил

12-(трет-бутоксикарбоніл)-3,3-(1,2-етилендіокси)-1,2,3,4,4а,6а-гексагідро-12Н-бензо[а]феноксазин-5,6-дикарбоксилат

У закритій системі 8ммол продукту, одержаного на попередній Стадії А, і 40ммол диметил ацетиленидикарбоксилату перемішують при 80°C протягом 22 годин. Після очищення за допомогою хроматографії на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 7/3), виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 234-235°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1728\text{см}^{-1}$; $\nu_{COC}=1152\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 514 (M+1).

Стадія

С:

Диметил

12-(трет-бутоксикарбоніл)-3,3-(1,2-етилендіокси)-1,2,3,4-тетрагідро-12Н-бензо[а]феноксазин-5,6-дикарбоксилат

В інертній атмосфері, 0,92ммол продукту, одержаного на попередній Стадії В, і 2,75ммол перекристалізованого N-бромсукциніміду нагрівають у 23мл дистильованого тетрахлориду вуглецю протягом 10 хвилин зі зворотним холодильником, використовуючи 60W лампу, у присутності каталітичної кількості бензоїл пероксиду. Після охолодження, розчин фільтрують і потім концентрують. Після очищення хроматографією на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 6/4), виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: <50°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1701$, 1717, 1733 см^{-1} ; $\nu_{COC}=1152$, 1195 см^{-1} .

Мас-спектр: m/z 512 (M+1).

Стадія D: Диметил 3-оксо-1,3,4,12-тетрагідро-2Н-бензо[а]феноксазин-5,6-дикарбоксилат

3мл 12М хлористоводневої кислоти додають краплями до 0,6ммол продукту, одержаного на попередній Стадії С, розчиненого у 3мл етанолу. Суміш перемішують протягом 1,5 години при температурі навколишнього середовища. Після нейтралізування насиченим розчином гідрокарбонату натрію і екстрагування етилацетатом, органічну фазу сушать над сульфатом магнію, фільтрують і концентрують. Після очищення хроматографією на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 5/5 до 0/10), виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 250-251°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1695$, 1720 см^{-1} ; $\nu_{NH}=3430\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 366 ($M+1$).

Стадія

Е:

Диметил

12-(трет-бутоксикарбоніл)-3-[(трет-бутоксикарбоніл)-окси]-1,2-дигідро-12Н-бензо[а]феноксазин-5,6-дикарбоксила

5 Т В інертній атмосфері, 0,69ммол сполуки, одержаної на попередній Стадії D, розчиняють в 10мл тетрагідрофурану. Після додавання 1,73ммол 4-диметил-амінопіридину і 1,73ммол ди-трет-бутил дикарбонату, суміш перемішують протягом 12 годин. Після концентрування, залишок додають в етилацетат і промивають двічі розчином ІМ хлористоводневої кислоти. Органічну фазу сушать над сульфатом магнію, фільтрують і концентрують, дозволяючи одержати очікуваний продукт.

ІЧ (плівка NaCl): $\nu_{C=O}=1728, 1756\text{см}^{-1}$; $\nu_{COO}=1139\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 568 ($M+1$).

Стадія

F:

Диметил

12-(трет-бутоксикарбоніл)-3-[(трет-бутоксикарбоніл)-окси]-12Н-бензо[а]феноксазин-5,6-дикарбоксилат

15 В інертній атмосфері, 0,62ммол сполуки, одержаної на попередній Стадії E, розчиняють в 5мл толуолу у присутності 4,96ммол 2,3-дихлор-5,6-диціано-1,4-бензохінону і суміш нагрівають при 90°C протягом 24 годин. Після охолодження і концентрування, реакційну суміш додають у дихлорметан і промивають 8% розчином гідроксиду натрію. Водну фазу екстрагують дихлорметаном і органічні фази об'єднують, сушать над сульфатом магнію, фільтрують і концентрують.

20 Після очищення хроматографією на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 7/3), виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 101-102°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1731, 1739, 1756, 1766\text{см}^{-1}$; $\nu_{COO}=1149\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 566 ($M+1$).

25 Стадія G: Диметил 12-(трет-бутоксикарбоніл)-3-гідрокси-12Н-бензо[а]-феноксазин-5,6-дикарбоксилат

30 В інертній атмосфері 0,28ммол сполуки, одержаної на попередній Стадії F, розчиняють в 2мл метанолу у присутності 0,34ммол метанолату натрію. Суміш перемішують при температурі навколишнього середовища протягом 12 годин. Після концентрування і гідролізу, суміш екстрагують етилацетатом, сушать над сульфатом магнію, фільтрують і випаровують. Після очищення хроматографією на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 7/3), виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 90-91°C (розкладання).

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1722\text{см}^{-1}$; $\nu_{COO}=1152\text{см}^{-1}$; $\nu_{OH}=3442\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 466 ($M+1$).

Стадія

Н:

35 8-(трет-Бутоксикарбоніл)-2-[2-(диметиламіно)етил]-5-гідрокси-2,3-дигідробензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон

40 В інертній атмосфері, 0,26ммол сполуки, одержаної на попередній Стадії G, нагрівають при 100°C у 4 мл N,N-диметил етилендіаміну протягом 7 годин. Після охолодження, надлишок діаміну випаровують. Після очищення хроматографією на силікагелі (дихлорметан/метанол: 95/5), виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 190°C (розпад).

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1705, 1762\text{см}^{-1}$; $\nu_{CO}=1249\text{см}^{-1}$; $\nu_{OH}=3446\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 490,5 ($M+1$).

Приклад 2: 2-[2-(Диметиламіно)етил]-5-гідроксибензо[а]піроло[3,4-с]-феноксазин-1,3-діонгідроклорид

45 Змл 12М хлористоводневої кислоти додають краплями до 0,2ммол сполуки Прикладу 1, розчиненої у 4мл етанолу. Реакційну суміш перемішують протягом 1,5 години при температурі навколишнього середовища і потім концентрують. Шляхом додавання етилового ефіру утворюється осад, який відфільтровують, дозволяючи одержати очікуваний продукт.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1686, 1744\text{см}^{-1}$; $\nu_{NH,OH}=3431\text{см}^{-1}$.

50 Мас-спектр: m/z 390 ($M+1$).

Приклад 3:

8-(трет-Бутоксикарбоніл)-2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)-2,3-дигідробензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон

55 Стадія A: Диметил 12-(трет-бутоксикарбоніл)-3-(2-гідроксіетокси)-12Н-бензо[а]феноксазин-5,6-дикарбоксилат
Очікуваний продукт одержують згідно з методикою, описаною на Стадії F Прикладу 1, починаючи зі сполуки Стадії B Прикладу 1.

Точка плавлення: 87-88°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1725\text{см}^{-1}$; $\nu_{OH}=3440\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 510 ($M+1$).

60 Стадія

B:

8-(трет-Бутоксикарбоніл)-2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)-2,3-дигідробензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон

Очікуваний продукт одержують згідно з методикою, описаною на Стадії H Прикладу 1, починаючи зі сполуки вищезазначеної Стадії A.

65 Точка плавлення: >80°C (розпад).

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1707, 1763\text{см}^{-1}$; $\nu_{OH}=3447\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 534 (M+1).

Приклад 4:

5 8-(трет-Бутоксикарбоніл)-2-[2-(диметиламіно)етил]-5-{2-[(метилсульфоніл)окси]етокси}-2,3-дигідробензо[а]піроло-[3,4-с]феноксазин-1,3-діон

В інертній атмосфері, 0,93ммол триетиламіну і потім 0,93ммол мезил хлориду додають до розчину 0,06ммол сполуки Прикладу 3 в 3мл дихлорметану при 0°C. Перемішування підтримують при 0°C протягом 8 годин. При температурі навколишнього середовища, розчин гідролізують і потім екстрагують дихлорметаном. Органічну

10 фазу сушать над сульфатом магнію, фільтрують і концентрують. Після очищення за допомогою хроматографії на силікагелі (дихлорметан/метанол: 95/5), виділяють очікуваний продукт.

Точка плавлення: 70-80°C (смола).

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1707, 1763\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 612 (M+1).

15 Приклад 5:

2-[2-(Диметиламіно)етил]-5-{2-[(метилсульфоніл)окси]етокси}-1,2,3,8-тетрагідробензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон

0,03ммол сполуки Прикладу 4 розчиняють в 1мл мурашиної кислоти і перемішують при температурі навколишнього середовища протягом 3 годин. Після концентрування, залишок додають до дихлорметану і

20 промивають 2М розчином карбонату натрію і потім водою. Органічні фази об'єднують, сушать над сульфатом магнію, фільтрують і концентрують. Після очищення хроматографією на силікагелі (дихлорметан/метанол: 9/1), виділяють очікуваний продукт.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1686, 1702\text{см}^{-1}$; $\nu_{NH}=3432\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 512 (M+1).

25 Приклад 6: 2-[2-(Диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)бензо-[а]-піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон

Очікуваний продукт одержують відповідно до методики Прикладу 5, починаючи зі сполуки Прикладу 3.

Точка плавлення: 216°C (смола).

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1690, 1741\text{см}^{-1}$; $\nu_{NH}=3427\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 434 (M+1).

30 Приклад 7: 8-(Форміл)-2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)-бензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон

Очікуваний продукт одержують в ході очищення хроматографією на силікагелі Прикладу 6.

Точка плавлення: 202°C.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1693, 1732\text{см}^{-1}$; $\nu_{NH}=3428\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 462 (M+1).

35 Приклад 8:

8-(Феноксикарбоніл)-5-(2-гідроксіетокси)-2-метил-2,3-дигідробензо[е]піридо[2',3':5,6][1,4]оксазино [3,2-g]ізоіндол-1,3-діон

Стадія А: Феніл 3-(1,4-діоксаспіро[4.5]дец-7-ен-8-іл)-4Н-піридо[3,2-b][1,4]-оксазин-4-карбоксилат

40 Очікуваний продукт одержують відповідно до методики Стадії Прикладу 1, починаючи зі сполуки Приготування В.

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=\text{ур}$; m/z 393 (M+1).

Стадія

В:

8-(Феноксикарбоніл)-5,5-(1,2-етилендіокси)-2-метил-2,3,3а,3b,4,5,6,7,13а,13b-декагідрообензо[е]піридо[2',3':5,6][1,4]оксазино[3,2-g]ізоіндол-1,3-діон

45 У закритій системі, 1ммол продукту, одержаного на попередній Стадії А, і 3ммол N-метилмалеїміду перемішують при 95°C протягом 2 годин у присутності декількох крапель толуолу. Після очищення хроматографією на силікагелі (нафтовий ефір/етилацетат: 6/4), виділяють продукт.

Точка плавлення: 150°C (смола).

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1701, 1786\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 504 (M+1).

Стадія

С:

8-(Феноксикарбоніл)-5-(2-гідроксіетокси)-2-метил-2,3-дигідробензо[е]піридо[2',3':5,6][1,4]оксазино[3,2-g]ізоіндол-1,3-діон

55 Очікуваний продукт одержують згідно з методикою, описаною на Стадії С Прикладу 1, починаючи зі сполуки вищезазначеної Стадії В.

Точка плавлення: 250°C (смола).

ІЧ (KBr): $\nu_{C=O}=1707, 1752\text{см}^{-1}$; $\nu_{COC}=1191\text{см}^{-1}$; $\nu_{OH}=3463\text{см}^{-1}$.

Мас-спектр: m/z 498 (M+1).

60 Приклад 9:

2-[2-(Диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)бензо[е]піридо-[2',3':5,6][1,4]оксазино[3,2-g]ізоіндол-13-діон

Очікуваний продукт одержують згідно з методикою, описаною на Стадії Н Прикладу 1, починаючи зі сполуки Прикладу 8.

Мас-спектр: m/z 435 (M+1).

65 Приклад 10:

8-(трет-Бутоксикарбоніл)-2-[2-(діетиламіно)етил]-5-гідрокси-2,3-дигідробензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-13-діон
Очікуваний продукт одержують згідно з методикою, описаною на Стадії Н Прикладу 1, починаючи зі сполуки Стадії G Прикладу 1 і N,N-діетилетилендіаміну.

Приклад 11: 2-[2-(Діетиламіно)етил]-5-гідроксибензо[а]піроло[3,4-с]-феноксазин-1,3-діон

Очікуваний продукт одержують згідно з методикою Прикладу 2, починаючи зі сполуки Прикладу 10.

Фармакологічні дослідження сполук за даним винаходом

Приклад 12: In vitro активність

L1210 мишача лейкемія

L1210 мишачу лейкемію використовували in vitro. Клітини культивували в RPMI 1640 повному культуральному середовищі, яке містить 10% фетальну бичачу сироватку, 2мМ глутаміну, 50одиниць/мл пеніциліну, 50 μ Г/мл стрептоміцину і 10мМ Hepes, рН=7,4. Клітини розподіляють на мікропланшетах і піддають дії цитотоксичних сполук протягом 4 дублюючих періодів, або 48 годин. Кількість життєздатних клітин потім визначають шляхом колориметричного аналізу, Microculture Tetrazolmm Assay [J. Carmichael et al., Cancer Res.; 47, 939-942 (1987)]. Результати виражають як IC₅₀, концентрація цитотоксичного агента, що інгібує проліферацію оброблених клітин до 50%. Всі сполуки даного винаходу показують хорошу цитотоксичність відносно цієї клітинної лінії. З метою прикладу, сполука Прикладу 2 має IC₅₀, що складає 0,25 μ М щодо L1210.

Людські клітинні лінії

Сполуки даного винаходу також були тестовані на людських клітинних лініях, що походять від солідних пухлин, згідно з тим же тест-протоколом, що був описаний для L1210 мишачої лейкемії, але з інкубаційними періодами, що складають 4 дні замість 2 днів. З метою прикладу, сполука Прикладу 2 має IC₅₀, що складає 0,27 μ М щодо DU145 карциноми простати, 0,16 μ М щодо A549 недрібноклітинної легеневої карциноми легень, 0,6 μ М щодо HT-29 карциноми ободової кишки і 0,26 μ М щодо KB-3-1 епідермоїдної карциноми.

Такі різні результати очевидно демонструють сильний протипухлинний потенціал сполук за даним винаходом щодо лейкемій і солідних пухлин.

Приклад 13: Дія на клітинний цикл

L1210 клітини інкубують протягом 21 годин при 37°C у присутності різних концентрацій тестованих сполук. Клітини потім фіксують 70% (об./об.) етанолу, двічі промивають в PBS та інкубують протягом 30 хвилин при 20°C в PBS, що містить 100 μ г/мл РНК і 50 μ Г/мл пропідій йодиду. Результати виражають як процент клітин, які накопились у G2+M фазі через 21 годину, порівнянні з контролем (контроль: 20%). Сполуки винаходу представляють особливий інтерес; у концентрації менше ніж 2,5 μ М вони індукують накопичення щонайменше 80% клітин у G2+M фазі через 21 годину.

Приклад 14: In vivo активність

Протипухлинна активність на Р 388 лейкемію

Лінію Р388 (мишача лейкемія) одержували від National Cancer Institute (Frederick, USA). Пухлинні клітини (10⁶ клітин) інокулювали у день 0 в черевну порожнину самиць мишей B6D2F1 (Iffa Credo, France). Використовують шість мишей, які важать від 18 до 20г, на тест-групу. Продукти вводять інтраперітонеальним шляхом у день 1. Протипухлинну активність виражають як % T/C:

$$\%T/C(\text{миша}) = \frac{\text{Середній час виживання тварин, яких обробляють}}{\text{Середній час виживання контрольних тварин}} \times 100$$


Одержані результати демонструють відмінну in vivo активність на Р 388 моделі лейкемії, з T/C, що складає 210% для дози 50мг/кг, разом з низькою токсичністю сполук, вказуючи на відмінний терапевтичний індекс.

Приклад 15: Фармацевтична композиція: ін'єкційний розчин

Сполука Прикладу 2 10мг
Дистильована вода для ін'єкційних розчинів 25мл

Формула винаходу

1. Сполуки формули (I):



де:

W₁ являє собою, з атомами вуглецю, до яких він прикріплений, фенільну групу або піридилну групу,

Z являє собою групу, вибрану з водню, галогену і груп лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкілу, арилу, арил-(C₁-C₆)алкілу, в якому алкільна частина може бути лінійною або розгалуженою, арилокси,

арил-(C₁-C₆)алкокси, в якому алкоксичастина може бути лінійною або розгалуженою, гідрокси і лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкокси,

R₁ являє собою групу, вибрану з водню і груп лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкілу, арилу, арил-(C₁-C₆)алкілу, в якому алкільна частина може бути лінійною або розгалуженою, -C(O)-R₅ і лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкіленового ланцюга, які заміщені однією або більше однаковими або різними групами, вибраними з галогену і груп ціано, -OR₆, -NR₆R₇, -CO₂R₆, -C(O)R₆ і -C(O)-NHR₆, де:

R₅ являє собою групу, вибрану з водню і груп лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкілу, гідрокси, лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкокси, арилу, арил-(C₁-C₆)алкілу, в якому алкільна частина може бути лінійною або розгалуженою і арилокси,

R₆ і R₇, які можуть бути однаковими або відрізнятися, кожний являє собою групу, вибрану з водню і груп лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкілу, арилу і арил-(C₁-C₆)алкілу, в якому алкільна частина може бути лінійною або розгалуженою, або

R₆+R₇ разом утворюють з атомом азоту, який несе їх, моноциклічний гетероцикл, який має 5 або 6 кільцевих членів і необов'язково містить в кільцевій системі другий гетероатом, який вибирають з кисню і азоту,

R₂ являє собою атом водню або групу формули -CH₂CH₂O-R₈, де:

R₈ являє собою групу, вибрану з водню і груп лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкілу, арилу, арил-(C₁-C₆)алкілу, в якому алкільна частина може бути лінійною або розгалуженою, -S(O)_t-R₆ (де R₆ є таким же, як визначено вище, і t являє собою ціле число від 0 до 2, включно) і T₁-R₉ (де T₁ являє собою лінійний або розгалужений (C₁-C₆)алкіленовий ланцюг і R₉ являє собою групу, вибрану з галогену, ціано, -OR₆, -NR₆R₇, -C(O)H, -C(O)OR₆ і -C(O)NR₆R₇, де R₆ і R₇ є такими ж, як визначено вище),


R₃ і R₄, які можуть бути однаковими або відрізнятися, кожний являє собою, незалежно від іншого, групу, вибрану з водню і груп лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкілу, арилу і арил-(C₁-C₆)алкілу, в якому алкільна частина може бути лінійною або розгалуженою, або R₃ і R₄ разом утворюють з атомом азоту, який несе їх, моноциклічний гетероцикл, який має 5 або 6 кільцевих членів і необов'язково містить в кільцевій системі другий гетероатом, який вибирають з кисню і азоту,

n являє собою ціле число від 1 до 6 включно,

їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксид і їх адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою,


де "арил", як повинно бути зрозумілим, означає фенільну, нафтильну, дигідронафтильну, тетрагідронафтильну, інденільну або інданільну групу, кожна з яких необов'язково заміщена однією або більше однаковими або різними групами, вибраними з галогену, лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкілу, лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)тригалоалкілу, гідрокси, лінійного або розгалуженого (C₁-C₆)алкокси і аміно, необов'язково заміщеного однією або двома лінійними або розгалуженими (C₁-C₆)алкільними групами.

2. Сполуки формули (I) за п. 1, які відрізняються тим, що вони представляють сполуки формули (IA):




де R₁, R₂, R₃, R₄, W₁, Z і n є такими ж, як визначено для формули (I), їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксид і їх адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

3. Сполуки формули (I) за п. 1 або 2, які відрізняються тим, що вони представляють сполуки формули (IB):



де R₁, R₂, R₃, R₄, Z і n є такими ж, як визначено вище, їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксид і їх адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

4. Сполуки формули (I), за п. 1 або 2, які відрізняються тим, що вони представляють сполуки формули (IC):



де R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , Z і n є такими ж, як визначено вище, їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксид і їх адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

5. Сполуки формули (I) за будь-яким з пп. 1-4, які відрізняються тим, що Z являє собою атом водню, їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксид і їх адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

6. Сполуки формули (I) за будь-яким з пп. 1-5, які відрізняються тим, що R_1 являє собою атом водню або групу $-C(O)R_5$, де R_5 являє собою більш конкретно атом водню, їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксид і їх адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

7. Сполуки формули (I) за будь-яким з пп. 1-6, які відрізняються тим, що R_2 являє собою атом водню або групу $-CH_2CH_2OR_8$, де R_8 являє собою більш конкретно атом водню, їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксид і їх адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

8. Сполуки формули (I) за будь-яким з пп. 1-7, які відрізняються тим, що n являє собою ціле число 2, їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксид і їх адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

9. Сполуки формули (I) за будь-яким з пп. 1-8, які відрізняються тим, що R_3 і R_4 , які можуть бути однаковими або відрізнятися, кожний являє собою незалежно від іншого лінійну або розгалужену (C_1-C_6) алкільну групу, їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксид і їх адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

10. Сполуки формули (I) за п. 1, які являють собою:

2-[2-(диметиламіно)етил]-5-гідроксибензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон,

2-[2-(діетиламіно)етил]-5-гідроксибензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон,

2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)-2,3-дигідробензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-8-карбальдегід-1,3-діон,


2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)бензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон,

2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетилметансульфонат)бензо[а]піроло[3,4-с]феноксазин-1,3-діон,

2-[2-(диметиламіно)етил]-5-(2-гідроксіетокси)бензо[е]піридо[2',3':5,6][1,4]оксазино[3,2-g]ізоіндол-1,3-діон,


їх енантіомери, діастереоізомери, N-оксид і їх адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

11. Спосіб одержання сполук формули (I) за п.1, який відрізняється тим, що як вихідний матеріал використовують сполуку формули (II):




де W_1 і Z є такими ж, як визначено для формули (I),

аміногрупу сполуки формули (II) захищають захисною групою P_G , добре відомою кваліфікованому фахівцю в даній галузі техніки, з тим, щоб одержати сполуку формули (III):




де P_G являє собою трет-бутоксикарбонільну або феноксикарбонільну групу і W_1 і Z є такими ж, як визначено вище,

сполуку формули (III) обробляють літійдіізопропіламідом, з наступною обробкою дифенілхлорфосфатом з тим, щоб одержати сполуку формули (IV):




де P_G , W_1 і Z є такими ж, як визначено вище,

сполуку формули (IV) обробляють у присутності біс(трифенілфосфін)паладію хлориду сполукою формули (V):




з тим, щоб одержати сполуку формули (VI):




де P_G, W₁ і Z є такими ж, як визначено вище, сполуку формули (VI)

або обробляють в інертній атмосфері диметилацетилендикарбоксилатом з тим, щоб одержати сполуку формули (VII):




де P_G, W₁ і Z є такими ж, як визначено вище, сполуку формули (VII)

або обробляють N-бромсукцинімідом і бензоїл пероксидом з тим, щоб одержати сполуку формули (VIII):




де P_G, W₁ і Z є такими ж, як визначено вище, сполуку формули (VIII)

піддають дії хлористоводневої кислоти з тим, щоб одержати сполуку формули (IX):



де W₁ і Z є такими ж, як визначено вище, сполуку формули (IX)


піддають дії ди-трет-бутил дикарбонату у присутності 4-диметиламінопіридину з тим, щоб одержати сполуку формули (X):




де ----- являє собою одинарний або подвійний зв'язок, Вос являє собою трет-бутоксикарбонільну

групу і W₁ і Z є такими ж, як визначено вище, сполуку формули (X)


піддають дії 2,3-дихлор-5,6-диціано-1,4-бензохінону з тим, щоб одержати сполуку формули (XI):




де Boc, W₁ і Z є такими ж, як визначено вище,
 10 сполуку формули (XI) піддають дії натрію метанолату і потім гідролізують з тим, щоб одержати сполуку формули (XII):




де Boc, W₁ і Z є такими ж, як визначено вище, сполуку формули (XII) піддають дії сполуки формули (XIII):




де R₃, R₄ і n є такими ж, як визначено для формули (I), з тим, щоб одержати сполуку формули (I/a),
 25 конкретний випадок сполук формули (I):




де Boc, R₃, R₄, W₁, Z і n є такими ж, як визначено вище,
 сполуку формули (I/a) необов'язково піддають тим же умовам реакції, що і сполуку формули (VIII), з тим,
 щоб одержати сполуку формули (I/b), конкретний випадок сполук формули (I):



де R₃, R₄, W₁, Z і n є такими ж, як визначено вище,
 50 або піддають тим же умовам реакції, що і сполуку формули (X) з тим, щоб одержати сполуку формули (XIV):




де P_G, W₁ і Z є такими ж, як визначено вище,
 60 сполуку формули (XIV) піддають тим же умовам реакції, що і сполуку формули (XII), з тим, щоб одержати сполуку формули (I/c), конкретний випадок сполуки формули (I):




де P_G , R_3 , R_4 , W_1 , Z і n є такими ж, як визначено вище, сполуку формули (I/c) або необов'язково піддають дії мурашиної кислоти з тим, щоб одержати сполуки формул (I/d) і (I/e), конкретні випадки сполук формули (I):


15



де R_3 , R_4 , W_1 , Z і n є такими ж, як визначено вище, або необов'язково піддають дії сполуку формули (XV):




де G являє собою відхідну групу і R_{8a} , який відрізняється від атома водню, має те ж визначення, що і R_8 у формулі (I), з тим, щоб одержати сполуку формули (I/f), конкретний випадок сполук формули (I):



де P_G , R_3 , R_4 , R_{8a} , W_1 , Z і n є такими ж, як визначено вище, для амінофункції сполук формули (I/f) необов'язково знімають захист

45


відповідно до звичайних методів органічного синтезу з тим, щоб одержати сполуку формули (I/g), конкретний випадок сполук формули (I):



де R_3 , R_4 , R_{8a} , W_1 , Z і n є такими ж, як визначено вище, сполуки формул (I/b), (I/d) і (I/g) складають сполуки формули (I/h):

60


65




де R₂, R₃, R₄, W₁, Z і n є такими ж, як визначено вище,
сполуки формули (I/h) необов'язково піддають дії сполуки формули (XVI):




де R_{1a}, який відрізняється від атома водню, має те ж визначення, що і R₁ у формулі (I), і G є таким же, як визначено вище, з тим, щоб одержати сполуку формули (I/i), конкретний випадок сполук формули (I):



де R_{1a}, R₂, R₃, R₄, W₁, Z і n є такими ж, як визначено вище,
обробляють N-метилмалеймідом з тим, щоб одержати сполуку формули (XVII):



де P_G, W₁ і Z є такими ж, як визначено вище,
сполуку формули (XVII) піддають тим же умовам реакції, що і сполуку формули (VII), з тим, щоб одержати сполуку формули (XVIII):






де P_G, W₁ і Z є такими ж, як визначено вище,
сполуку формули (XVIII) піддають тим же умовам реакції, що і сполуку формули (XII), з тим, щоб одержати сполуку формули (I/d), як описано вище,

сполуки формул (I/a)-(I/i) складають сукупність сполук формули (I), сполуки якої необов'язково бути очищені, відповідно до звичайної техніки очищення, можуть, якщо бажано, бути розділені на їх різні ізомери відповідно до звичайної техніки розділення і, якщо бажано, перетворені у їх N-оксиди і, необов'язково, в адитивні солі з фармацевтично прийнятною кислотою або основою.

12. Фармацевтична композиція, яка містить як активний інгредієнт щонайменше одну сполуку формули (I) відповідно до будь-якого з пп. 1-10, одну або в поєднанні з одним або більше фармацевтично прийнятними інертними, нетоксичними ексципієнтами або носіями.

13. Фармацевтична композиція за п. 12 для застосування як ліків у лікуванні різних видів раку.

14. Сполуки формул (X), (XI) і (XIV):



для застосування як проміжних сполук у синтезі сполук формули (I).

25 Офіційний бюлетень "Промислова власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем", 2007, N 7, 25.05.2007. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

30

35

40

45

50

55

60

65