



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103877200 A

(43) 申请公布日 2014. 06. 25

(21) 申请号 201410114804. 4

(22) 申请日 2014. 03. 13

(71) 申请人 王斌

地址 036900 山西省朔州市应县中医院

(72) 发明人 王斌

(51) Int. Cl.

A61K 36/744 (2006. 01)

A61P 1/02 (2006. 01)

A61K 33/06 (2006. 01)

A61K 33/12 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种用于治疗剥脱性唇炎的中药

(57) 摘要

一种用于治疗剥脱性唇炎的中药,是由下列药物制备而成的:防风、荆芥、薄荷、麻黄、连翘、栀子、黄芩、生石膏、川芎、当归、白芍、甘草、白术、滑石,将上述药物第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升,第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升,每日两次,早晚空腹。

1. 一种用于治疗剥脱性唇炎的中药,是由以下重量的药物制成的:

防风 10 克 荆芥 10 克 薄荷 6 克 麻黄 6 克 连翘 10 克 栀子 10 克 黄芩 10 克
生石膏 10 克 川芎 6 克

当归 10 克 白芍 10 克 甘草 6 克 白术 10 克 滑石 10 克。

2. 根据权利要求 1 所述一种用于治疗剥脱性唇炎的中药,其特征是将所述药物用水煎服成汤剂口服。

一种用于治疗剥脱性唇炎的中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药，特别是涉及一种用于治疗剥脱性唇炎的中药。

背景技术：

[0002] 剥脱性唇炎是唇部粘膜慢性脱屑性炎症。与中医的“唇风”、“紧唇”等相类似。本病多因过食辛辣厚味，脾胃湿热内生，复受风邪外袭，以致风热相搏，引动湿热之邪，循经上蒸，结于唇部，气血凝滞，郁火熏蒸而成。

[0003] 临床上治疗剥脱性唇炎较为棘手，一般的治疗外用膏剂涂抹，治疗病期长，疗效慢，易反弹，达不到治疗的目的。

发明内容：

[0004] 本发明是一种见效快、疗效好，无任何副作用且不反弹的中药制剂。

[0005] 本发明的药物是由以下重量的中药为原料制备而成的：

[0006] 防风 10 克 荆芥 10 克 薄荷 6 克 麻黄 6 克 连翘 10 克 栀子 10 克 黄芩 10 克 生石膏 10 克 川芎 6 克

[0007] 当归 10 克 白芍 10 克 甘草 6 克 白术 10 克 滑石 10 克

[0008] 可以将上述药物制成药剂学上的任何一种内服剂型，本发明优选的剂型是汤剂。

[0009] 本发明的药物的具体制备方法是：将上述药物第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升。

[0010] 使用方法是：将煎好的汤剂口服，每日两次，早晚空腹。

[0011] 中医认为：治疗剥脱性唇炎应以疏散风邪、健脾养血、清热解毒为治疗原则。方中防风、荆芥、麻黄疏散风邪；白术、当归、川芎、白芍健脾养血；黄芩、薄荷、连翘、生石膏、栀子、滑石清热解毒；甘草调和诸药。上述药物配伍使用，协同作用，从而达到治疗的目的。

[0012] 本发明的药物疗效好、见效快、服用方便、无副作用，对剥脱性唇炎有很好的治疗效果。

[0013] 为进一步证明本发明药物的临床疗效和安全性。选择 79 例患者对本发明药物进行临床观察。

[0014] 79 例病人中 4-5 日痊愈者 30 例，6-7 日痊愈者 21 例，8 日以上痊愈者 26 例，无效 2 例。全部使用本发明进行治疗，每日一剂，每日两次，早晚空腹。

[0015] 疗效标准：显效：剥脱性唇炎症状消失；有效：剥脱性唇炎症状缓减或消失；无效：治疗前后无明显变化。

[0016] 表 1 治疗后疗效统计结果

[0017]

患者	例数	显效 (%)	有效 (%)	无效 (%)	总有效率 (%)
4-5 日痊愈者	30	28(93.3)	2(6.7)	0(0)	20(100)

6-7 日痊愈者	21	15 (71. 4)	6 (29. 6)	0 (0)	21 (100)
8 日以上痊愈者	28	12 (42. 3)	14 (50)	2 (7. 7)	26 (92. 3)
总计	79	55 (69. 7)	22 (27. 8)	2 (2. 5)	77 (97. 5)

具体实施方式：

[0018] 防风 10 克 荆芥 10 克 薄荷 6 克 麻黄 6 克 连翘 10 克 栀子 10 克 黄芩 10 克 生石膏 10 克 川芎 6 克

[0019] 当归 10 克 白芍 10 克 甘草 6 克 白术 10 克 滑石 10 克

[0020] 将上述药物混合后煎成汤剂，第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升，每日两次，早晚空服。