



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2016-0111737
(43) 공개일자 2016년09월27일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A23L 1/30 (2006.01) A23K 1/14 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A23L 1/3002 (2013.01)
A23K 10/30 (2016.05)
(21) 출원번호 10-2015-0036783
(22) 출원일자 2015년03월17일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
경희대학교 산학협력단
경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1732 (서천동, 경희대학교 국제캠퍼스내)
(72) 발명자
김호철
서울특별시 동대문구 천장산로11길 17, 204동 1103호 (이문동, 이문삼성래미안아파트)
박주연
경기도 남양주시 진건읍 진건오남로86번길 58, 103동 1202호 (금강아파트)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
안소영


전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 황기, 가시오갈피 및 속단의 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 골길이가 성장 촉진용 조성물

(57) 요약

본 발명은 황기, 가시오갈피 및 속단을 포함하는 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 골길이가 성장 촉진용 조성물을 제공한다. 본 발명의 조성물은 골길이가 성장을 촉진하는 작용효과를 나타낸다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

A23K 20/00 (2016.05)

A61K 36/254 (2013.01)

A61K 36/481 (2013.01)

A61K 36/53 (2013.01)

A23V 2200/30 (2013.01)

A23V 2300/14 (2013.01)

(72) 발명자

박상욱

서울특별시 동대문구 경희대로 26-10, A동 3층 11호 (회기동)

이동현

서울특별시 양천구 목동서로 38, 114동 403호

김영식

경기도 성남시 수정구 복정로158번길 19, 402호 (복정동)

권용범

서울특별시 동대문구 한천로58길 181, 201동 403호 (이문동, 이문2차푸르지오)

명세서

청구범위

청구항 1

황기, 가시오갈피 및 속단을 포함하는 복합 추출물을 함유하는 조성물.

청구항 2

황기, 가시오갈피 및 속단을 포함하는 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 골길리 성장 촉진용 식품 조성물.

청구항 3

제2항에 있어서, 상기 복합 추출물은 황기 추출물 10 내지 50 중량%, 가시오갈피 추출물 30 내지 70 중량% 및 속단 추출물 5 내지 40 중량%를 포함하는 식품 조성물.

청구항 4

제2항에 있어서, 상기 추출물은 물, C1~C4의 알코올 또는 이들의 혼합용매로 추출된 것인 식품 조성물.

청구항 5

제2항에 있어서, 상기 골길리 성장 촉진을 통하여 가족성 저신장, 체질적 성장 지연, 특발성 저신장, 골연골 이형성증, 염색체 이상 (다운 증후군 또는 터너 증후군)에 의한 저신장, 부당 경량아 (자궁 내 성장 지연), 프레더-윌리 증후군에 의한 저신장, 러셀-실버 증후군에 의한 저신장, 누난 증후군에 의한 저신장, 만성 전신성 질환에 의한 저신장, 성장호르몬 결핍증에 의한 저신장, 갑상샘 저하증에 의한 저신장, 쿠싱증후군에 의한 저신장 및 정신사회적 왜소증으로 이루어진 군으로부터 선택된 성장 장애를 예방 또는 개선하는 것인 식품 조성물.

청구항 6

황기, 가시오갈피 및 속단을 포함하는 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 골길리 성장 촉진용 약학 조성물.

청구항 7

황기, 가시오갈피 및 속단을 포함하는 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 골길리 성장 촉진용 사료 조성물.

발명의 설명

기술 분야

본 발명은 황기, 가시오갈피 및 속단의 복합 추출물을 함유하는 조성물에 관한 것이다. 구체적으로 본 발명은 황기, 가시오갈피 및 속단의 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 골길리 성장 촉진용 식품 조성물, 약학 조성물 및 사료 조성물에 관한 것이다.

배경 기술

[0001]

- [0002] 저신장 (short stature)이란 같은 성별을 가진 같은 연령 소아의 키 정규분포 상에서 키가 3 % (100명 중 작은 쪽에서 3번째) 미만인 경우를 말한다. 이러한 저신장의 원인은 질병은 없으나 유전적인 성향 및 체질적으로 키가 작은 정상 변이 저신장과 질병에 의해 2차적으로 오는 저신장으로 구분할 수 있다.
- [0003] 상기 정상 변이 저신장은 다시 가족성 저신장, 체질적 성장 지연 또는 특발성 저신장으로 분류할 수 있다. 상기 가족성 저신장은 유전적으로 키가 작은 경우이며, 체질적 성장 지연은 체질적으로 성장이 늦게 나타나는 것으로 현재 키는 작지만 사춘기가 늦게 나타나 성장이 늦게까지 지속되어 최종 성인 신장은 정상 범위에 도달한다. 또한, 특발성 저신장이란 일반적으로 신장이 평균에 비하여 -2 표준편차점수 미만이거나 3백분위수 이하이면서, 저신장을 유발할만한 원인이 없고, 출생 시 정상체중을 가지고 태어났으며, 사지와 체간 (척추) 체형이 정상이고, 충분한 영양을 섭취하며, 정신사회적 문제가 없으면서, 성장호르몬 분비가 정상인 아동을 지칭한다 (신충호, 성장호르몬 치료의 최신 지견, Korean J Ped. Vol. 49. No. 7. 2006).
- [0004] 한편, 질병에 의해 2차적으로 오는 저신장은 1차성 성장 장애 (내인성 장애) 및 2차성 성장 장애 (외인성 장애)로 구분된다. 상기 1차성 성장 장애로는 골연골 이형성증, 염색체 이상 (다운 증후군 또는 터너 증후군)에 의한 저신장, 부당 경량아 (자궁 내 성장 지연), 프래더-윌리 증후군에 의한 저신장, 러셀-실버 증후군에 의한 저신장, 누난 증후군에 의한 저신장 등이 있을 수 있다. 또한, 상기 2차성 성장 장애로는 영양 결핍에 의한 저신장, 만성 전신성 질환에 의한 저신장, 성장호르몬 결핍증에 의한 저신장, 갑상샘 저하증에 의한 저신장, 성조숙증에 의한 저신장, 쿠싱증후군에 의한 저신장, 정신사회적 요소증 등이 있을 수 있다.
- [0005] 저신장으로 병원을 방문하는 대다수의 소아들은 정상 변이에 속하는 저신장이다. 외국의 연구에 의하면 저신장을 주소로 내원한 환자의 원인을 분석하였을 때, 가족성 및 체질성 저신장이 80 %, 성장호르몬 결핍증이 10 %, 갑상선기능 이상 4 %, 만성신부전 등 만성질환 3 %, 염색체 이상 1 %, 골이형성 1 %, 정신적 질환 1 % 등으로 보고되었다 (성장조절 관련 기능성 평가체계 구축, 2003).
- [0006] 저신장 치료에 주로 사용되고 있는 성장호르몬 제제는 초기에는 소아에서 성장호르몬 결핍증으로 인한 저신장증에만 사용되었으나, 그 사용 영역이 확대되어 터너증후군, 만성 신부전으로 인한 저신장증 및 성인 성장호르몬 결핍증에까지 확대되었으며, 최근에는 FDA에 의하여 부당 경량아 및 Prader-Willi 증후군, 그리고 신장이 -2.25 SD 이하인 특발성 저신장증에 이르기까지 키에 있어서 따라잡기 성장이 어려울 것 같은 소아에게 그 적응증이 확대되게 되었다 (이경아 et al. 특발성 저신장증 소아에서 성장호르몬의 치료효과. 2005, Raben MS. Treatment of a pituitary dwarf with human growth hormone. 1958). 국내에서는 2009년 8월 제조함 인간성장호르몬이 식품의약품안전청으로부터 소아의 특발성 저신장증에 대한 적응증을 새로이 추가해 허가를 받았다.
- [0007] 특히, 특발성 저신장증의 많은 아이들은 1-2년 동안 성장호르몬 사용 후 신장 증가가 관찰되나 최종 성인키의 증가 유무에 대해서는 불명확하다. 성장호르몬 치료 효과에 대한 이제까지의 발표들을 종합한 Cochrane 보고에 의하면, 첫 해에는 성장속도가 사용하지 않은 아이에 비하여 2.86 cm 정도 증가하고, 평균 5.3년간 성장호르몬을 사용하였더니 최종 성인키가 4-6 cm 커진다. 최종 성인키의 증가 효과는 성장호르몬 용량이 높을수록 나타나고, 최종 성인키에 도달할 때까지 써야 나타나며, 저신장증 아동이 성장호르몬 치료 후에 심리적 이득을 얻을 것이냐에 대해서도 일관된 결론은 없다 (신충호, 성장호르몬 치료의 최신 지견, Korean J Ped. Vol. 49. No. 7. 2006). 또한, 특발성 저신장증에서의 성장호르몬 투여는 윤리적으로 질병이 없는 아이에게 치료 약제를 쓰는 것이고, 고용량을 사용하여야 하며, 일반인이 성장호르몬 쓰기에는 비싸 최종 성인키가 2.5 cm 커지는데 35,000달러 들어가는 문제점이 있다. 치료 기간이 길어질수록 성장 효과가 떨어져 용량을 더 올려야 하며, 성장호르몬을 끊으면 일시적으로 성장 속도가 더 줄어들며, 개인마다 치료 효과가 매우 다른데 누가 잘 반응할 것이지를 예측할 수 있는 지표가 없다. 고용량의 성장호르몬을 장기간 사용시 향후 발생할 문제점들에 대한 장기간의 관찰 결과가 없는 상태에서 성장호르몬 사용을 결정하기란 쉽지 않다 (신충호, 성장호르몬 치료의 최신 지견, Korean J Ped. Vol. 49. No. 7. 2006).
- [0008] 한편, 기존의 성장호르몬 주사제는 주 6-7회 매일 밤 자기 전 가정에서 피하주사를 맞게 되어 있다. 매일 주사를 맞아야 하는 성장기 어린이는 육체적 고통과 심리적 부담감을 안게 되고 자녀에게 주사를 놓아야 하는 보호자 입장에서도 번거로움과 심리적 부담감이 적지 않다. 또한, 여행이나 장기 외출시 주사의 냉장보관 및 운반이 어려우며, 가족 외 타인의 시선을 피하여 주사를 놓는 심리적 부담감 등이 있다 (강혜영 et al. 소아 성장호르몬결핍증 치료에 사용되는 성장호르몬 서방형 주사제의 경제성 평가. 2009). 현재 매일 주사제를 투약하고 있는 환자의 보호자를 대상으로 설문조사한 결과, 매일 주사 투약시 환자의 삶의 질 가중치 혹은 효용값은 평균 0.584로(0-100점 scale로 응답한 것을 0-1점 scale로 환산한 값) 정상적인 건강상태의 삶의 질(100점)의 58.4 % 수준인 것으로 조사되었다. 주 1회 주사제로 전환할 경우 예상되는 삶의 질은 평균 0.784로 정상적인 건강상

태의 삶의 질의 78.4 % 수준인 것으로 조사되었다 (강혜영 et al. 소아 성장호르몬결핍증 치료에 사용되는 성장호르몬 서방형 주사제의 경제성 평가. 2009). 일반적으로 성장호르몬을 투여 받는 아동의 3 %는 약물 부작용을 경험하는 것으로 알려져 있다. 관절통, 근육통 등이 생길 수 있으나, 성인보다는 빈도가 낮고 주사 부위에 지방 위축이 생길 수 있으며, 일시적으로 여성형 유방이 생길 수 있다. 또한, 갑상선호르몬을 포함한 호르몬과 대사 물질의 변화가 발생 할 수 있어 3-6개월 간격으로 갑상선기능 검사를 시행하며 부당경량아 중 일부에서는 얼굴 비대칭이 더 심화되기도 한다. 두개강내압상승은 소아에서 잘 발생하며, 특히 터너증후군, 만성신부전 및 기질성 성장호르몬결핍증 환자에서 잘 발생하나 성장호르몬을 끊으면 호전되며, 나중에 성장호르몬을 다시 썼을 때, 일부에서는 재발할 수 있다 (신충호, 성장호르몬 치료의 최신 지견, Korean J Ped. Vol. 49, No. 7. 2006).

[0009] 유럽의약청 (EMA) 및 미국 FDA는 프랑스에서 발표된 「소아기에 "소마트로핀 제제" 투여 환자를 대상으로 한 장기 역학연구」 결과에 따라 소아기 성장부전 치료제 "소마트로핀 제제"의 사망률 증가 위험에 대한 검토를 시작하였다. 프랑스 전역에서 동 제제를 투여 받았던 약 7,000명의 청년층을 분석한 결과 일반인 (프랑스 전체인구 집단)에 비해 "소마트로핀 제제"를 투약했던 환자의 사망률이 약 30 % 높았으며, 사망률 위험은 허가용량 이상 과량 투여 시 증가하였다 (식품의약품안전청, 2010).

[0010] 2009년 국내 연령별 인구분포에 따르면 성장치료를 받는 시기인 5~14세의 인구는 약 6백만 명으로 이 중 저신장증에 해당하는 수는 전체의 3 %인 약 180,000명이며 2009년 기준 보험대상자는 20 % 정도인 36,000명인데 건강보험심사평가원에 따르면 단신질환과 관련, 건강보험의 지원을 받아 성장호르몬 처방을 받은 전체 인원은 2009년 기준 1만 2012명으로 보험대상자인 저신장증 환자 중 24,000여명, 약 66.6 %가 저신장증 치료를 받지 못하고 있다. 저신장증 환자 중 많은 수가 치료를 받지 못하는 것은 보험적용을 받아 성장호르몬 치료를 하게 되어도 1년에 250~300만원의 비용이 발생하며 저신장증의 약 80 %를 차지하는 특발성 저신장증은 보험적용을 받지 못해 1년에 1,000~1,500만원에 달하는 고비용이 경제적인 부담이 될 수 있으며 또한 매일 주사를 맞아야 하는 아이의 육체적 고통, 심리적 부담감 등으로 인한 것으로 추정된다.

[0011] 성장호르몬 치료는 성장효과로만 보면 의학적 연구에서 타 방법에 비해 성장효과는 탁월한 것이 입증되었으나, 비용, 편리성 등 다양한 요소가 복합되어 만족도는 29.1 %밖에 되지 않은 것으로 나타났다 (허경, 박미정, 대학병원 성장클리닉을 내원한 아동에서 설문 조사를 통한 키성장 관리 실태분석, Korean Journal of Pediatrics Vol. 52, No. 5, 2009). 저신장증 치료제의 경우용 제품에 대한 전 세계적인 잠재시장규모가 50억불 이상 (한울 제약, 기업설명회, 2009)으로 예측될 정도로 시장요구가 크다.

[0012] 한편, 동양 문화권 하에서 질병치료 및 건강증진을 목적으로 한약은 매우 선호되고 있어 성장클리닉을 방문한 아동의 부모를 대상으로 조사한 결과 아이의 키를 크게 하기 위해 한의원에서 성장촉진 한약을 복용하는 경우가 성장호르몬 치료를 받는 경우의 13배에 이를 정도로 한약제제에 대한 접근성이 성장호르몬에 비해 매우 높다. 2006년에서 2007년까지 상계백병원 성장클리닉을 방문한 아동 823명 (남아 416명, 여아 407명)의 부모를 대상으로 조사를 한 결과 키를 크게 하기 위해 인위적인 관리를 한 경우는 전체의 33.4 %였고, 이 중 한의원에서 성장촉진 한약을 복용한 경우가 37.8 %로 가장 많았고 키를 키우는데 도움이 되는 보조제를 먹는 경우가 37.1 %였으며 운동/기구 요법이 3.0 %, 성장호르몬 치료를 받은 경우는 2.9 %였다 (허경, 박미정, 대학병원 성장클리닉을 내원한 아동에서 설문 조사를 통한 키성장 관리 실태분석, Korean Journal of Pediatrics Vol. 52, No. 5, 2009). 한방 임상에서 쓰이는 처방들 대부분이 성장 모델에 대한 유효성이 밝혀져 있지 않은 상태이며 이에 따른 약동학 및 약력학적 지표가 부족하다. 임상에서 상용되는 한약에 대하여 우선 동물실험 수준에서 성장모델에 대한 유효성을 밝혀 현대 과학적으로 증명하고 효능이 높은 것들은 개발할 필요가 있다. 성장클리닉을 방문한 아동 823명의 부모를 대상으로 조사를 한 결과 성장치료후의 만족도는 성장호르몬 치료가 29.1 %로 가장 높았고 운동기구는 6.6 %, 한약은 6.2 %, 성장보조제는 2.8 %로 가장 낮았다. 성장호르몬 주사제의 경우 다른 방법에 비해서는 가장 만족도가 높았고, 성장효과로만 보면 의학적 연구에서 타 방법에 비해 성장효과는 탁월한 것이 입증되었으나, 비용, 편리성 등 다양한 요소가 복합되어 만족도는 29.1 %밖에 되지 않은 것으로 나타났다 (허경, 박미정, 대학병원 성장클리닉을 내원한 아동에서 설문 조사를 통한 키성장 관리 실태분석, Korean Journal of Pediatrics Vol. 52, No. 5, 2009).

[0013] 따라서, 천연물에서 유래되며 골길이 성장 촉진 효과가 우수한 제제의 개발이 요구되어 왔다. 이에 본 발명자는 성장 촉진에 이용되는 성장호르몬의 고비용, 저흡수율 및 부작용 등의 문제점을 해결하고자, 천연물을 대상으로 검색하던 중 황기, 가시오갈피 및 속단을 함유하는 복합 추출물의 골길이 성장효능이 우수함을 확인하여 본 발명을 완성하였다.

선행기술문헌

특허문헌

[0014] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제0851855호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0015] 본 발명의 목적은 골길이가 성장 촉진 효과가 우수한 조성물을 제공하는 것이다.

[0016] 또한, 본 발명의 목적은 골길이가 성장 촉진 효과가 우수하면서 저비용으로 제조할 수 있는 조성물을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0017] 본 발명은 생약 복합 추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물을 제공한다. 구체적으로, 본 발명은 생약 복합 추출물을 유효성분으로 포함하는 골길이가 성장 촉진용 식품 조성물, 약학 조성물 및 사료 조성물을 제공한다. 이하, 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.

식품 조성물

[0018] 본 발명은 황기, 가시오갈피 및 속단을 포함하는 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 골길이가 성장 촉진용 식품 조성물을 제공한다.

[0020] 본 발명에 있어서, 황기는 콩과(Leguminosae)에 속한 다년생 초본인 황기 (*Astragalus membranaceus* Bunge) 뿌리의 주피를 벗겨 건조한 것을 말한다.

[0021] 또한, 본 발명에 있어서, 가시오갈피는 오가과식물인 가시오갈피 (*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim) Harms)의 뿌리, 뿌리줄기 또는 줄기를 건조한 것을 말한다.

[0022] 또한, 본 발명에 있어서, 속단은 꿀풀과에 속한 다년생 초본인 속단 (*Phlomis umbrosa* Turczaninow)의 뿌리를 건조한 것을 말한다.

[0023] 본 발명의 일 실시양태에 따르면, 본 발명의 복합 추출물은 황기, 가시오갈피 및 속단의 혼합물의 추출물일 수 있다.

[0024] 본 발명의 다른 실시양태에 따르면, 본 발명의 복합 추출물은 황기 추출물, 가시오갈피 추출물 및 속단 추출물의 혼합물일 수 있다.

[0025] 또한, 상기 복합 추출물은 물, 알코올 또는 이들의 혼합용매로부터 추출할 수 있다. 상기 알코올은 C1~C4의 저급 알코올을 사용하는 것이 바람직하며, 메탄올 또는 에탄올을 사용하는 것이 더욱 바람직하다. 추출방법은 진탕 추출, Soxhlet 추출 또는 환류 추출 방법을 이용할 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 추출온도는 40 내지 100 ℃인 것이 바람직하며, 60 내지 80 ℃인 것이 더욱 바람직하다. 또한, 추출시간은 2 내지 24 시간인 것이 바람직하며, 추출회수는 1 내지 5 회인 것이 바람직하다.

[0026] 본 발명에 있어서, 상기 복합 추출물은 황기 추출물 10 내지 50 중량%, 가시오갈피 추출물 30 내지 70 중량% 및 속단 추출물 5 내지 40 중량%를 포함할 수 있으며, 바람직하게는 황기 추출물 20 내지 40 중량%, 가시오갈피 추출물 40 내지 60 중량% 및 속단 추출물 10 내지 30 중량%를 포함할 수 있다. 상기 범위에서 가장 우수한 골길이 성장 효과를 나타낸다.

[0027] 본 발명의 복합 추출물은 골길이가 성장 효과가 성장 호르몬 수준으로 확인되었으며, 이에 따라 골길이가 성장 촉진용 식품 조성물로 사용될 수 있다.

- [0028] 본 발명의 식품 조성물은 골질이 성장 효과가 있으므로 성장 장애의 예방 또는 개선 용도로 사용될 수 있다.
- [0029] 상기 성장 장애는 정상 변이 저신장증 또는 질병에 의해 2차적으로 오는 저신장증일 수 있다. 상기 정상 변이 저신장증은 가족성 저신장, 체질적 성장 지연, 협의의 특발성 저신장일 수 있다. 또한, 질병에 의해 2차적으로 오는 저신장증은 1차성 성장 장애 (내인성 장애) 또는 2차성 성장 장애 (외인성 성장 장애)일 수 있으며, 상기 1차성 성장 장애로는 골연골 이형성증, 염색체 이상 (다운 증후군 또는 터너 증후군)에 의한 저신장, 부당 경량아 (자궁 내 성장 지연), 프레더-윌리 증후군에 의한 저신장, 러셀-실버 증후군에 의한 저신장, 누난 증후군에 의한 저신장이 있으며, 상기 2차성 성장 장애로는 만성 전신성 질환에 의한 저신장, 성장호르몬 결핍증에 의한 저신장, 갑상샘 저하증에 의한 저신장, 쿠싱증후군에 의한 저신장, 정신사회적 왜소증이 있다.
- [0030] 본 발명에 따른 상기 식품 조성물은 본 발명의 복합 추출물을 그대로 첨가하거나, 다른 식품 조성물, 건강기능 식품 또는 음료에 통상적으로 첨가제 등을 더 포함할 수 있다.
- [0031] 예를 들면, 본 발명의 식품 조성물은 백당, 결정과당, 포도당, D-솔비톨, 만니톨, 이소말토올리고당, 스테비오사이드, 아스파탐, 아세설팜칼륨, 수크랄로오스 등의 감미제, 무수구연산, DL-사과산, 호박산 및 그의 염 등의 산미제, 안식향산 및 그의 유도체 등의 보존제, 여러 가지 영양제, 비타민, 광물 (전해질), 합성 풍미제 및 천연 풍미제 등의 풍미제, 착색제 및 증진제 (치즈, 초콜릿 등), 펙트산 및 그의 염, 알긴산 및 그의 염, 유기산, 보호성 콜로이드 증점제, pH 조절제, 안정화제, 방부제, 글리세린, 알콜, 탄산음료에 사용되는 탄산화제 등을 함유할 수 있다. 또한, 본 발명의 식품 조성물들은 천연 과일 주스 및 야채 음료의 제조를 위한 과육을 함유할 수 있다. 이러한 첨가제의 비율은 본 발명의 식품 조성물 100 중량부 당 약 20 중량부 이하의 범위에서 사용될 수 있다.
- [0032] 본 발명의 식품 조성물이 음료인 경우, 음료에 통상적으로 포함되는 향미제 또는 천연 탄수화물을 더 포함할 수 있다. 상기 천연 탄수화물은 포도당, 과당과 같은 모노사카라이드, 말토오스, 슈크로스와 같은 디사카라이드, 텍스트린, 시크룰텍스크린과 같은 폴리사카라이드 또는 자일리톨, 소르비톨, 에리트리톨과 같은 당 알콜일 수 있다. 또한, 상기 향미제로는 타우마틴, 스테비아 추출물 (레바우디오시드 A, 글리시리히진 등)의 천연 향미제 또는 사카린, 아스파탐 등의 합성 향미제일 수 있다. 상기 식품 조성물이 음료인 경우 천연 탄수화물은 조성물 100 mL 당 일반적으로 약 1 내지 20 g, 바람직하게는 약 5 내지 12 g 포함될 수 있다.
- [0033] 본 발명의 상기 식품 조성물은 분말, 과립, 정제, 캡슐 또는 음료인 형태로 제조되어 식품류, 음료, 껌, 차, 비타민 복합제, 건강보조 식품류로 이용될 수 있다.
- [0034] 또한, 본 발명의 상기 식품 조성물은 골질이 성장 촉진하기 위한 약제, 식품 및 음료 등에 첨가될 수 있다. 예를 들면, 본 발명의 식품 조성물은 식품, 음료, 껌, 차, 비타민 복합제, 건강보조 식품류 등에 첨가될 수 있다.
- [0035] 본 발명의 상기 식품 조성물은 골질이 성장 촉진을 위해 식품 또는 음료에 첨가될 수 있다. 본 발명의 조성물은 식품 전체 중량의 1 내지 5 중량%로 첨가될 수 있으며, 음료 100 mL에 0.02 g 내지 10 g, 바람직하게는 0.3 g 내지 1 g의 비율로 첨가될 수 있다.
- [0036] **약학 조성물**
- [0037] 본 발명은 황기, 가시오갈피 및 속단을 포함하는 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 골질이 성장 촉진용 약학 조성물을 제공한다.
- [0038] 상기 복합 추출물은 본 발명의 식품 조성물의 경우와 동일하게 준비할 수 있다.
- [0039] 본 발명의 약학 조성물은 골질이 성장 효과가 있는 것으로 확인되었으므로 성장 장애의 예방 또는 치료 용도로 사용될 수 있다.
- [0040] 상기 성장 장애는 정상 변이 저신장증 또는 질병에 의해 2차적으로 오는 저신장증일 수 있다. 상기 정상 변이 저신장증은 가족성 저신장, 체질적 성장 지연, 협의의 특발성 저신장일 수 있다. 또한, 질병에 의해 2차적으로 오는 저신장증은 1차성 성장 장애 (내인성 장애) 또는 2차성 성장 장애 (외인성 성장 장애)일 수 있으며, 상기 1차성 성장 장애로는 골연골 이형성증, 염색체 이상 (다운 증후군 또는 터너 증후군)에 의한 저신장, 부당 경량아 (자궁 내 성장 지연), 프레더-윌리 증후군에 의한 저신장, 러셀-실버 증후군에 의한 저신장, 누난 증후군에 의한 저신장이 있으며, 상기 2차성 성장 장애로는 만성 전신성 질환에 의한 저신장, 성장호르몬 결핍증에 의한 저신장, 갑상샘 저하증에 의한 저신장, 쿠싱증후군에 의한 저신장, 정신사회적 왜소증이 있다.

- [0041] 더 나아가, 본 발명의 약학 조성물은 생약 성분을 포함하고 있으므로 부작용 없이 골길이 성장을 촉진할 수 있다.
- [0042] 본 발명의 복합 추출물은 본 발명의 약학 조성물 총 중량에 대하여 0.1 내지 50 중량%로 포함하는 것이 바람직하다. 그러나 상기 함유량은 반드시 이에 한정되는 것은 아니고 환자의 상태 및 질환의 종류 및 진행 정도에 따라 변할 수 있다.
- [0043] 본 발명의 약학 조성물에 있어서, 상기 복합 추출물은 성인 기준 1일 약 1 mg 내지 1 g의 용량으로 단회 내지 수회 투여가 가능하며, 바람직하게는 30 mg 내지 120 mg의 용량으로 단회 내지 수회 투여가 가능하다. 그러나, 본 발명의 복합 추출물의 투여량은 환자의 증증, 나이, 성별, 체중 등의 환자의 상태와 약물의 제형, 투여경로 및 투여 기간에 따라 적절하게 조절될 수 있다.
- [0044] 또한, 본 발명의 약학 조성물은 독성 및 부작용이 없으므로 장기간 복용시에도 안심하고 사용할 수 있다.
- [0045] 본 발명의 약학 조성물은 본 발명의 효과를 해치지 않는 범위 안에서 약제학적으로 허용 가능한 희석제, 결합제, 붕해제, 윤활제, pH 조절제, 산화방지제, 용해보조제 등의 첨가제를 포함할 수 있다.
- [0046] 희석제는 슈가, 전분, 미결정셀룰로오스, 유당 (유당수화물), 포도당, 디-만니톨, 알기네이트, 알칼리토금속염, 클레이, 폴리에틸렌글리콜, 무수인산수소칼슘, 또는 이들의 혼합물 등을 사용할 수 있다.
- [0047] 결합제는 전분, 미결정셀룰로오스, 고분산성 실리카, 만니톨, 디-만니톨, 자당, 유당수화물, 폴리에틸렌글리콜, 폴리비닐피롤리돈 (포비돈), 폴리비닐피롤리돈 공중합체 (코포비돈), 히프로멜로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 천연검, 합성검, 코포비돈, 젤라틴, 또는 이들의 혼합물 등을 사용할 수 있다.
- [0048] 붕해제는 전분글리콘산나트륨, 옥수수전분, 감자전분 또는 전호화전분 등의 전분 또는 변성전분; 벤토나이트, 몬모릴로나이트, 또는 비검 (veegum) 등의 클레이; 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스 또는 카르복시메틸셀룰로오스 등의 셀룰로오스류; 알긴산나트륨 또는 알긴산 등의 알긴류; 크로스카멜로스 (croscarmellose) 나트륨 등의 가교 셀룰로오스류; 구아검, 잔탄검 등의 검류; 가교 폴리비닐피롤리돈 (crospovidone) 등의 가교 중합체; 중탄산나트륨, 시트르산 등의 비등성 제제, 또는 이들의 혼합물을 사용할 수 있다.
- [0049] 윤활제는 탈크, 스테아린산, 스테아린산 마그네슘, 스테아린산 칼슘, 라우릴설페이트나트륨, 수소화식물성오일, 나트륨벤조에이트, 나트륨스테아릴푸마레이트, 글리세릴 베헤네이트, 글리세릴 모노레이트, 글리세릴모노스테아레이트, 글리세릴 팔미토스테아레이트, 콜로이드성 이산화규소 또는 이들의 혼합물 등을 사용할 수 있다.
- [0050] pH 조절제는 초산, 아디프산, 아스코르빈산, 아스코르빈산 나트륨, 에테르산 나트륨, 사과산, 숙신산, 주석산, 푸마르산, 구연산 (시트르산)과 같은 산성화제와 침강 탄산 칼슘, 암모니아수, 메글루민, 탄산 나트륨, 산화 마그네슘, 탄산 마그네슘, 구연산 나트륨, 삼염기칼슘인산염과 같은 염기성화제 등을 사용할 수 있다.
- [0051] 산화방지제는 디부틸 히드록시 톨루엔, 부틸레이티드 히드록시아니솔, 초산 토크페롤, 토크페롤, 프로필 갈레이트, 아황산수소나트륨, 피로아황산나트륨 등을 사용할 수 있다.
- [0052] 용해보조제는 라우릴황산나트륨, 폴리소르베이트 등의 폴리옥시에틸렌 소르비탄 지방산 에스테류, 도큐세이트 나트륨, 폴록사머 (poloxamer) 등을 사용할 수 있다.
- [0053] 본 발명의 약학 조성물은 경구투여를 위하여 정제, 환제, 산제, 과립제, 캡슐제 등의 고형제제로 제제화될 수 있으며, 이러한 고형제제는 상기 복합 추출물과 적어도 하나 이상의 부형제 예를 들면, 전분, 칼슘카보네이트, 수크로스 또는 락토오스, 젤라틴 등을 섞어 제조될 수 있다. 또한 단순한 부형제 이외에 마그네슘 스테아레이트, 탈크 같은 윤활제들도 함께 사용될 수 있다. 또한 상기 약학 조성물이 경구를 위한 현탁제, 내용 액제, 유제, 시럽제 등의 액상제제로 제제화될 수 있으며, 물, 리퀴드 파라핀 이외에 여러 가지 부형제, 예를 들면 습윤제, 감미제, 방향제, 보존제 등이 사용하여 액상제제로 제제화될 수 있다.
- [0054] 또한, 본 발명의 약학 조성물은 비경구 투여를 위한 제제화를 위하여 멸균된 수용액, 비수성용제, 현탁제, 유제, 동결건조제, 좌제가 포함될 수 있다.
- [0055] 비수성용제, 현탁제로는 프로필렌글리콜, 폴리에틸렌 글리콜, 올리브 오일과 같은 식물성 기름, 에틸올레이트와 같은 주사 가능한 에스테르 등이 사용될 수 있다. 좌제의 기제로는 위텟솔, 마크로골, 트윈 61, 카카오지, 라우린지, 글리세로제라틴 등이 사용될 수 있다.
- [0056] 본 발명에서 용어, "투여"는 어떠한 적절한 방법으로 환자에게 본 발명의 약학 조성물을 도입하는 것을 의미하

며, 본 발명의 약학 조성물의 투여 경로는 목적 조직에 도달할 수 있는 한 어떠한 일반적인 경로를 통하여 투여될 수 있다. 경구 투여, 복강 내 투여, 정맥내 투여, 근육내 투여, 피하 투여, 피내 투여, 비내 투여, 폐내 투여, 직장내 투여, 강내 투여, 복강내 투여, 경막내 투여될 수 있으나, 이에 제한되지는 않는다. 예를 들면, 경구, 직장 또는 정맥, 근육, 피하, 자궁내 경막 또는 뇌혈관내 (intracerebroventricular) 주사에 의해 투여될 수 있다.

[0057] 본 발명에 약학 조성물은 일회 투여될 수도 있고, 또는 일정한 시간 간격을 두고 수회 나누어 투여될 수 있다.

[0058] 또한, 본 발명에 따른 약학 조성물은 골길이 성장 촉진 효과를 가진 다른 활성성분을 추가적으로 더 포함할 수 있다.

[0059] 본 발명에 따른 약학 조성물은 골길이 성장을 촉진하기 위하여 단독 또는 호르몬 치료, 약물 치료 등의 다양한 방법들과 병용하여 사용될 수 있다.

[0060] 사료 조성물

[0061] 본 발명은 황기, 가시오갈피 및 속단을 포함하는 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 골길이 성장 촉진용 사료 조성물을 제공한다. 상기 복합 추출물은 약학 조성물의 경우와 동일하게 준비할 수 있다.

[0062] 본 발명의 복합 추출물은 골길이 성장 효과를 나타내므로 동물의 성장 촉진제로서 사료 조성물에 포함될 수 있다.

[0063] 구체적으로, 본 발명에 따른 복합 추출물을 유효성분으로 포함하는 사료는 당업계의 공지된 다양한 형태의 사료로 제조 가능하며, 바람직하게는 농후사료, 조사료 및/또는 특수사료가 포함될 수 있다.

[0064] 농후사료에는 밀, 귀리, 옥수수 등의 곡류를 포함하는 종자 열매류, 곡물을 정제하고 얻는 부산물로서 쌀겨, 밀기울, 보릿겨 등을 포함하는 겨류, 콩, 유채, 깨, 아마인, 코코야자 등을 채유하고 얻는 부산물인 깻묵류와 고구마, 감자 등에서 녹말을 뺀 나머진인 녹말찌꺼기의 주성분인 잔존녹말질류 등의 찌꺼기류, 어분, 물고기찌꺼기, 어류에서 얻은 신선한 액상물 (液狀物)을 농축시킨 것인 피시솔루블 (fish soluble), 육분 (肉粉), 혈분, 우모분, 탈지분유, 우유에서 치즈, 탈지유에서 카제인을 제조할 때의 잔액인 웨이 (whey)를 건조한 건조웨이 등의 동물질사료, 효모, 클로렐라, 해조류 등이 있다.

[0065] 조사료에는 야초, 목초, 풋베기 등의 생초 (生草) 사료, 사료용 순무, 사료용 비트, 순무의 일종인 루터베어거 등의 뿌리채소류, 생초, 풋베기작물, 곡실 (穀實) 등을 사일로에 채워 놓고 젖산발효시킨 저장사료인 사일리지 (silage), 야초, 목초를 베어 건조시킨 건초, 종축용 (種畜用) 작물의 짚, 콩과 식물의 나뭇잎 등이 있다.

[0066] 특수사료에는 굴껍데기, 암염 등의 미네랄 사료, 요소나 그 유도체인 디우레이드이소부탄 등의 요소사료, 천연 사료 원료만을 배합했을 때 부족하기 쉬운 성분을 보충하거나, 사료의 저장성을 높이기 위해서 배합사료에 미량으로 첨가하는 물질인 사료첨가물, 식이보조제 등이 있다.

[0067] 본 발명에 따른 사료 조성물은 다양한 사료 첨가제를 포함할 수 있다.

[0068] 본 발명에서 용어 "사료첨가제"란 영양소 보충 및 체중감소 예방, 사료 내 섬유소의 소화 이용성 증진, 유질 개선, 번식장애 예방 및 수태율 향상, 하절기 고온 스트레스 예방 등 다양한 효과를 목적으로 사료에 첨가하는 물질을 말한다. 본 발명의 사료첨가제는 사료관리법상의 보조사료에 해당하며, 탄산수소나트륨 (중조), 벤토나이트 (bentonite), 산화마그네슘, 복합광물질 등의 광물질제제, 아연, 구리, 코발트, 셀레늄 등의 미량 광물질인 미네랄제제, 케로틴, 비타민 E, 비타민 A, D, E, 니코틴산, 비타민 B 복합체 등의 비타민제, 메티오닌, 리아산 등의 보호아미노산제, 지방산 칼슘염 등의 보호지방산제, 생균제 (유산균제), 효모배양물, 곰팡이 발효물 등의 생균, 효모제 등이 추가로 포함될 수 있다.

[0069] 본 발명에 따른 사료 조성물은 골길이 성장을 목적으로 하는 개체이면 특별히 한정되지 않고, 어떠한 것이든 적용가능하다. 상기 개체는 동물, 예를 들어 비-영장류 (예를 들면, 소, 돼지, 말, 고양이, 개, 래트 및 마우스) 및 영장류 (예를 들면, 원숭이, 예를 들어 사이노몰구스 (cynomolgus) 원숭이 및 침팬지)를 비롯한 포유동물을 나타낸다. 또 다른 구체예에서, 상기 개체는 축산용 동물 (예를 들면, 말, 소, 돼지 등) 또는 애완용 동물 (예를 들면, 개 또는 고양이)이다.

[0070] 본 발명에 따른 사료 조성물의 복용량은 동물의 종 (species), 크기 (size), 무게 (weight), 나이 (age)와 같

은 다수의 요인들에 좌우될 것이다. 원칙적으로, 전형적인 복용량은 동물/일 당 0.001 내지 10 g의 범위일 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않는다.

발명의 효과

본 발명에 따른 복합 추출물은 저농도로 경구 투여(p.o.)함에도 기존 치료제인 성장호르몬 수준의 우수한 골길이 성장 효과를 나타낸다. 따라서, 본 발명의 약학 조성물 및 식품 조성물은 성장 장애를 효과적으로 예방, 개선 또는 치료할 수 있고, 본 발명의 사료 조성물은 동물의 골길이 성장을 촉진하는 작용효과를 나타낸다.

도면의 간단한 설명

도 1은 랫트에서의 테트라사이클린 (tetracyclin) 주사 후, 침착된 후지경골 골단부 성장판에 침착되어 발생하는 발광을 형광현미경으로 촬영한 사진이다 (A : 대조군, B : 양성대조군, C : 복합추출물).

도 2는 랫트에서의 골길이 성장 정도를 나타낸 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 바람직한 제조에 및 실시예를 제시한다. 그러나, 이들 제조에 및 실시예는 본 발명을 보다 쉽게 이해하기 위하여 제공되는 것일 뿐, 본 발명의 범위가 하기 제조에 및 실시예에 의해 한정되는 것은 아니다.

<제조예> 복합 추출물의 제조

황기, 가시오갈피, 속단은 옴니허브에서 구입하여 경희대학교 한의과대학 본초학교실의 검증을 받은 후 각각 표 1과 같은 구성과 중량비가 되도록 중량을 측정하여 마쇄하였다. 시료의 중량의 10 배에 해당하는 70 % 에탄올을 첨가하여 6 시간 환류가열추출기를 이용하여 추출하였다. 이후 감압 회전 농축기를 사용하여 감압 농축하여 각각의 농축액을 얻었으며 이를 이용하여 동결한 후 동결건조기를 이용하여 분말을 수득하였다. 수득한 분말의 수율은 황기 29.0 %, 가시오갈피 7.0 %, 속단 14.8 %이었으며, 동결건조분말을 혼합하여 최종 추출물을 하기 실험의 시료로 사용하였다.

[표 1]

	황기	가시오갈피	속단
중량비	27.0	53.3	19.7

<실시예> 본 발명의 복합 추출물의 골길이 성장 촉진 효과 확인 - 테트라사이클린 염색법

1. 실험동물의 준비

실험동물로 100 g 내외의 4 주령의 스프라그-다울리계 (Sprague-dawley, 샘타코, 대한민국) 암컷 랫트를 구입하여 사료와 물을 충분히 공급하면서 실험환경에 적응하도록 하였다. 1주일 정도의 적응기간을 준 후, 동물실험을 수행하였다.

2. 실험방법

모든 실험 군에서 투여를 시작한지 2 일 후 테트라사이클린 (tetracycline hydrochloride, Sigma T7660) 20 mg/kg을 복강 주사하였다. 투여 2 일 후에 랫트를 경추탈골하여 희생하고 좌우 족경골 (tibia)를 떼어내고 4 °C에서 3 일 동안 고정액에 고정 (fixation)을 시킨 다음, 50 mM EDTA에 1일 동안 방치하여 탈회하고 동결에 대한 보호를 위해 30 % 수크로스 (sucrose)에 하룻밤 동안 담가두었다. 상기의 방법으로 탈수된 골조직을 동결한 후 절단기 (sliding microtome; HM440E, Zeiss, Germany)를 사용하여 40 μm씩 절단함으로써 족경골 (tibia) 근위부 (proximal part)의 시상절편 (sagittal section)을 수집하였다. 골성장 측정을 위하여 40 μm로 수집된 족경골 근위부 시상절편을 슬라이드 글라스 위에 각각 올려놓고 건조한 후 형광 현미경을 통해 400 nm 파장의 자외

선 하에서 촬영하였다 (도 1 참조). 이미지 분석프로그램인 ImageJ (NIH, USA)를 이용하여 성장판과 골 조직 내 테트라사이클린의 침착으로 형성된 형광밴드 사이의 길이를 측정하였고, 성장 효과의 판정을 위해서 대조군과 비교하는 Student's t-test를 사용하였다.

3. 실험군 설정

본 발명의 복합 추출물을 100 mg/kg의 농도로 랫드 체중 100 g 당 1.0 ml의 부피로 2차 증류수에 녹여 투여 하였으며, 대조군은 같은 부피의 2차 증류수를 투여하였다. 추출물은 테트라사이클린 투여 2 일 전부터 실험종료일까지 4 일간 1 일 2 회 경구투여하였다.

양성 대조군은 재조합 인간 성장 호르몬이 골성장을 증가시킨다는 보고에 따라 (Isgaard J, Nilsson A, Lindahl A, Jansson JO, 및 Isaksson OG: Effects of local administration of GH and IGF-1 on longitudinal bone growth in rats. Am J Physiol 250:E367-72., 1986) 재조합 인간 성장호르몬 (recombinant human growth hormone, rhGH; LG Lifescience, Eutropin®) 20 µg/kg을 랫드 체중 100 g 당 0.1 ml의 부피로 피하주사하였다. 양성대조군은 테트라사이클린 투여 2일전부터 실험 종료일까지 4 일간, 1 일 1 회 피하 주사하였고 다른 군은 증류수를 피하주사하였다.

대조군: 증류수

양성대조군: 성장호르몬 20 µg/kg s.c.

복합 추출물 투여군: 황기, 가시오갈피 및 속단의 복합추출물 100 mg/kg p.o.

4. 실험 결과

테트라사이클린 염색법으로 골길이 성장을 직접 측정한 결과 양성 대조군에서 $434.5 \pm 15.2 \mu\text{m/day}$ 로 정상 대조군 $410.0 \pm 17.4 \mu\text{m/day}$ 에 비하여 유의적으로 높은 골길이 성장률이 보였다 (6.0 %, $p < 0.01$). 또한, 황기, 가시오갈피 및 속단의 복합추출물 100 mg/kg (p.o.) 투여군은 $433.5 \pm 21.6 \mu\text{m/day}$ 의 골길이 성장률을 나타냄으로써 정상 대조군대비 유의적으로 골성장 효과가 나타남을 확인하였다 (5.7 %, $p < 0.05$) (도 2). 따라서, 본 발명의 복합 추출물을 투여하였을 때 양성 대조군에 유사한 정도로 골길이 성장 효능을 나타냄을 확인하였다.


상기 실험 결과는 하기 표 2와 같이 정리된다.

[표 2]

	용량(투여경로)	골길이성장 효과(%)
대조군	-	-
양성대조군	20 µg/kg (s.c.)	6.0
복합추출물	100 mg/kg (p.o.)	5.7

도면

도면1



도면2

