

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710181974.4

[51] Int. Cl.

- A61K 36/8905 (2006.01)
- A61K 36/896 (2006.01)
- A61K 36/8967 (2006.01)
- A61K 36/9066 (2006.01)
- A61K 36/9068 (2006.01)
- A61P 35/00 (2006.01)

[43] 公开日 2009年10月7日

[11] 公开号 CN 101549069A

[51] Int. Cl. (续)

- A61K 31/045 (2006.01)
- A61K 31/125 (2006.01)
- A61K 35/55 (2006.01)
- A61K 35/56 (2006.01)
- A61K 35/64 (2006.01)

[22] 申请日 2007.10.13

[21] 申请号 200710181974.4

[71] 申请人 丁达明

地址 312351 浙江省上虞市丁宅乡杨沙村

[72] 发明人 (请求不公开姓名)

权利要求书 1 页 说明书 12 页

[54] 发明名称

抗淋巴癌药品使用及生产方法

[57] 摘要

抗淋巴癌药品, 采用贵州省黎平县境内野生抗癌中草药, 莽草、九牛胆、天青地红、地白、见血飞、散血飞等, 分别制成: 口服药和外用药。采用多途径给药方式, 在病灶周围“靶血围控, 重点治疗, 重点突破”, 是一种新型免疫治疗+局部围控算术杀灭癌细胞方法。弥补了用手术、化疗、放疗在治疗肿瘤时副作用大, 易复发、转移、扩散三大医学难题。且能预防各种妇科肿瘤形成, 特别对各种浅表性良恶性肿瘤(癌)治愈率高, 使用方法简便。用于手术、放疗、化疗用时联合用药, 亦用于单独治疗。对淋巴癌及各种浅表癌症, 治愈率为80%, 对晚期癌患者发生转移、扩散和饮食服药困难的病人创造了治愈和延长生命条件。兼治, 辨证施治, 在病灶周围“靶血围控, 重点治疗, 重点突破”, 是一种新型免疫治疗+局部围控算术杀灭癌

细胞方法。弥补了用手术、化疗、放疗在治疗肿瘤时副作用大, 易复发, 转移, 扩散三大医学难题。且能预防各种肿瘤产生和形成, 特别对妇科肿瘤的良好、恶性淋巴肿瘤的预防发挥积极作用。“四联”抗癌药ABC系列, 在治疗剂量内, 对人体无明显的不良反应。用于手术、放疗、化疗用时联合用药, 亦用于手术化疗, 放疗后巩固治疗, 防止复发, 扩散和转移。而且可以单独治疗各种肿瘤。如子宫颈癌, 乳腺癌、食道癌、肝癌、直肠癌、胃癌, 各种淋巴癌, 尖锐湿疣、子宫肿瘤、囊肿, 宫颈糜烂等。该药和使用方法经过多年来在临床使用显示, 对早、中、晚期癌患者有效率为100%, 治愈率为80%, 对晚期癌患者, 发生转移, 扩散和饮食服药困难的病人, 创造了治愈和或延长生命条件。

1、抗淋巴瘤药品使用及生产方法：其中有内服药 6 个品种，外用涂擦酊剂、膏药和外用冲洗剂，是一整套的抗肿瘤药为一体交叉使用辨证论治药物，在治疗上效果显著，对各种浅表性肿瘤（癌）如：淋巴瘤、舌癌、鼻癌、子宫癌及各种妇科肿瘤等，具有治愈率高，付作用少，药材原料广等特点，其中草药配方尤其重要。

2、抗淋巴瘤药品使用及生产方法是以组合式为一体，减少分散某些抗肿瘤药品的毒性反应，在使用方法上和注意事项上是与众不同的，也是治愈淋巴瘤及其它肿瘤的关键所在。

抗淋巴瘤药品使用及生产方法

癌症是人类严重威胁人民生命和健康的多发病、常见病。多年来，在治疗肿瘤上，手术、放射、化疗是肿瘤治疗的三大手段，但这些方法均有着明显缺陷性。

(1) 手术治疗及放射治疗只是局部治疗，尤其是手术治疗对造血系统肿瘤及发生转移的实体肿瘤的全身治疗无能为力。而且只适合早期病人。

(2) 化疗疗法

①化疗疗法：抗癌药物毒性反应及抗药性的存在和产生，是肿瘤药物治疗的关键问题，几乎所有的抗癌药在杀死肿瘤细胞的同时，也杀伤了正常的组织细胞，尤其是增殖旺盛的骨髓造血细胞及胃肠道细胞。临床上，常由于患者出现骨髓抑制，免疫功能低下，难以忍受的胃肠道反应被迫中断治疗，导致治疗失败。

②化疗是不能彻底消灭癌细胞，是因为化疗杀死肿瘤细胞遵循的是一级动力学规律，即一定量的化疗药物只能杀死一定百分比的肿瘤细胞，亦是对数值的杀死，而不是恒定化疗数量肿瘤细胞的杀灭。加上化疗药物的毒性，化疗的间歇又是必须的，癌细胞在化疗间歇的加快增值，也是不可避免的。如果单用化疗杀灭癌细胞，还需要应用已用化疗的3倍左右的药物，其毒副作用是难以忍受的。

③癌细胞的增殖细胞和“休眠”细胞，化疗药物对于“休眠”状态中的癌细胞，常常是无效的。

④许多抗癌药物，尤其是烷化剂本身就是致癌物质。用这类药物治疗，可以引起机体的DNA链断裂，基因突变和染色体异常，部

分病人在使用这类药物治疗一种癌症后，又因该药物导致第二种癌病发生。此外，化学药物抑制身体细胞免疫，也是化疗后引起第二种原发性肿瘤的因素之一。

本人发明抗淋巴瘤药品使用及生产方法，就是为了克服和弥补手术、放射、化疗治疗上的缺陷，采用多方面，多途径的给药方法，标本兼治，辨证论治，在病灶周围“靶向围控，重点治疗，重点突破”调节人体阴阳平衡。使人体恢复正常。是一种新型免疫治疗+局部围控算术杀灭方法。

采用“四联”抗癌药 ABC 系列具有以下作用和特点：

(1)“四联”抗癌药系列 ABC，对癌症细胞有高度的亲和力和强大的杀伤力。

(2)它具有严格的生化靶点和严格特异性。只对肿瘤细胞有杀灭作用，对正常细胞无损害，是一种新型“靶向”弹头。

(3)它采用不同的抗癌药物，整体和局部相结合，无毒药物和有毒药物相结合，采用不同的治疗手段，通过白天用药，晚上用药交叉使用，减少和分散有毒药物出现的时间，使毒性不增加或降低，起到多种药物杀伤癌细胞协同作用，减少或延缓耐药性的出现，在 24 小时都能保持一定药性，从而使药力从里到外，从上到下，从右到左，里应外合，前呼后应，综合治疗，使癌细胞无喘息的机会。能解决目前使用手术、放射、化疗三大治疗方法中存在的缺陷，即防止肿瘤复发、转移、扩散三大医学难题。

(4)“四联”抗癌药 ABC 系列，它具有对骨髓无抑制对胃肠道无刺激，无恶心呕吐现象，对皮肤和子宫无刺激等副作用。在一定剂量内对人体无明显的不良反应。亦用于手术、放射、化疗患者同时联合用药治疗。亦用于手术、放射、化疗后巩固治疗防止复发、扩散、转移的治疗。而且可以单独治疗各种癌症病人，特别对各种

不能手术和化疗的晚期癌症患者，发生转移，扩散和饮食，服药困难的病人创造了治愈或延长生命条件。

“四联”抗癌药 ABC 系列的作用与机理

1、抗癌药 ABC 系列药物含有渗透因子，能迅速进入癌细胞蛋白质保护层，使癌细胞失去活力，处于“休眠”状态。

2、ABC 系列含有阻击因子，阻止癌细胞营养吸收，处于“饥饿”状态。

3、ABC 系列，含有干扰因子，破坏癌细胞的分子结构，干扰癌细胞的正常生存，使肿瘤细胞处于“分裂”状态。

4、ABC 系列含有毒杀因子，抑制癌细胞生长繁殖，阻止癌细胞转移、扩散。处于“静止”状态，使肿瘤面积只能缩小。

5、ABC 系列具有破坏因子，破坏癌细胞转移功能，切断与免疫系统、淋巴系统，水道系统内在联系和协同作用，使癌细胞转移、扩散功能处于“瘫痪”状态。

6、ABC 系列含有激发免疫因子，激发机体肿瘤周围组织发生免疫细胞反应，从而使 T 淋巴细胞转化和巨噬细胞能力增加，使整体及病灶周围细胞处于兴奋“攻击”状态。

7、ABC 系列含有调节因子，发挥药物双向调节作用，调节脏腑功能，调节肠胃功能，增加饮食，促进造血和血液循环。从而使人体阴阳平衡，提高人体免疫功能，直接间接地杀灭癌细胞。能使手术、放射、化疗后的残留癌细胞和休眠癌细胞呈算术杀灭作用。

8、“四联”抗癌药系列具有适应各种良性和恶性肿瘤，如成人组织性淋巴瘤，宫颈癌、食道癌、子宫绒毛膜上皮癌、皮肤癌、乳腺癌、儿童淋巴瘤、直肠癌、卵巢癌、子宫内膜癌、软组织肿瘤、头颈部肿瘤、血管瘤、脂肪癌、肝癌、胃癌、尖锐湿疣、子宫肌瘤、宫颈糜烂等。经临床应用 55 人，各种癌症和子宫肌瘤。瘤体最大为

20×15×3 cm最小为 1×0.5 cm，其中颈头恶性淋巴瘤大小为 10×8 cm和 6×5 cm不等。临床共治愈 44 人，有效率为 100%，对早、中期患者治愈率为 80%。用“四联”抗癌药 ABC 系列，临床效果看，癌瘤消失时间有长有短，长的为 45 天左右，短的为 30 天，甚至 15 天，平均癌瘤消失时间为 30 天。有效使瘤体开始缩小最长为 20 天，短的为 6 天，平均开始缩小瘤体为 13 天，值得注意的是，使用四联抗癌药 ABC 药物后，癌瘤全部缩小后，应继续用药在三个月以上，如果见瘤体全部消失，马上停止用药，那么一个星期左右，就会发展到跟原来一样大小，因此，必须联合用药，坚持用药消灭残留癌细胞，使人体免疫功能彻底恢复正常。结束了能使看得到摸得着各种实体肿瘤，非手术、放疗、化疗不可的历史。

“四联”抗癌药 ABC 系列

1、口服、抗癌 1 号（气血两虚）型

抗癌 2 号（阴虚火旺）型

抗癌 3 号（气滞血淤）型

抗癌 4 号（邪毒淤结）型

抗癌 5 号（湿热蕴结）型

抗癌 6 号（寒湿困脾）型

2、外用抗癌酊剂

3、外用抗癌膏药

4、外用抗癌栓剂

5、外用抗癌冲洗酊剂

“四联”抗癌药 ABC 的药物组成使用及生产方法

一、抗癌灵 1 号（气血双虚）型癌症

(1) 组成：高丽参 2 份 党参 2 份 黄芪 4 份 当归 2 份 熟地 2 份 川芎 1 份 桃仁 1 份 杏仁 1 份 红花 1 份 白术 2 份 白

芍 1.5 份 香附 1.5 份 白芷 1.5 份 柴胡 1.5 份 海马 1 份 红藤 3 份 见血飞 3 份 天青地红 3 份 天青地白(根) 3 份 弥猴桃(根) 5 份 何首乌 2 份

(2) 功能主治: 疏肝理气、益气养血、活血通经、理气行滞、清热解毒、抗癌, 适用: 气血双虚、胸闷气短、体瘦面黄、脉细弱无力、手足不温、自汗少气、饮食减少、倦怠乏力、腰膝酸无力等癌症病人。

3、用法与用量: 每次一袋(6g), 一日3次, 30天为一个疗程, 停用6天, 继续服维持量每日2—3次, 每次1袋, 直至治愈。

4、注意事项

(1) 孕妇禁服

(2) 儿童低血压慎服, 服用时剂量减半。

(3) 服用本品有明显扩张血管作用, 使血压降低, 如出现心慌、头晕应减少服用量。

(4) 如出现面赤口燥, 口舌生疮, 应停药。

(5) 忌辛酸辣刺激性食品和生冷不易消化食品。忌酒、糖等食品。

5、生产方法

用浸膏粉的制备法, 将以上药物按配制比例称均匀, 进入粉碎机粉碎成细末, 加水煮两次, 第1次3小时, 第2次2小时, 滤过合并, 浓缩至比重1.21(80—85热测)即可, 规格每15粒为2g, 每袋重6g。

二、抗癌灵2号(阴虚火旺型)

(1) 组成: 阿胶1份 黄连2份 生地2份 当归2份 甘草1份 柏子仁1.5份 酸枣仁1.5份 牡蛎1份 龟板1.5份 大黄5份(后下) 红藤4份 见血飞4份 天青地白4份 弥猴桃(根)

4份 九牛胆5份 六月雪5份 芦荟5份 青黛5份 天青地红5份

(2) 功能主治：滋阴降火，养心安神，清热解毒抗癌，适用于心烦不眠，心悸不安，头晕，耳鸣，健忘，五心烦热，口干津少，大便干燥，舌红脉细数等癌症病人。

(3) 用法与用量：每次1袋(6g)，一日2—3次，10天为一个疗程，病终即止，如需要可继续服用。

(4) 注意事项：a、孕妇，低血压者慎服，服用时用量减半。B、本品能下火、通便，癌症患者每天大便次数应保持在2—3次为宜。

c、忌辛酸辣及刺激性食物和生冷不易消化食物，忌酒、糖等甜食。

5、生产方法：用浸膏粉制备法，同抗癌灵1号。

三、抗癌灵：3号（气滞血淤型）

①组成：川芎1份 柴胡1.5份 青皮1.5份 积实1.5份 郁金1.5份 三棱2份 香附1.5份 见血飞5份 红花3份 制草乌1份 制川乌1份 当归2份 散血飞2份 红藤5份 猕猴桃5份 桃仁1份 山地蜂（蜜蜂）2份 丹参3份

②功能主治：疏肝理气，活血祛淤，清热解毒，抗癌消肿。

适用于肿瘤者，脉络阻滞，血行不畅而出现局部刺痛，舌质紫暗，舌有瘀斑或瘀点，苔薄白，黄，脉弦细或涩等癌症病人。

③用法与用量：成人每日3次，每次6g（1袋），隔4小时服1次，20天为一个疗程。

④注意事项：孕妇禁服，低血压者慎服，服用时从小剂量开始。

⑤生产方法：用浸膏粉制备法同抗癌灵1号，规格每15粒为2g 每袋重6g。

四、抗癌灵4号（邪毒淤结型）

①组成：莽草（叶）0.5份 茶树子（去壳）1份 天仙子0.5份 山地蜂（蜜蜂）1份 黑蚂蚁1.5份 见血飞4份 断肠草1份 九牛胆5份 薄荷脑0.2份 桉油0.2份 麝香适量 制草乌1份 制川乌1份 野百合2份 青黛2份 芦荟2份

②功能主治：抗癌消瘤，适用于肿瘤患者，瘤体未消失者，如胃癌、肝癌、肺癌、子宫颈癌、恶性淋巴瘤、直肠癌等良性及恶性肿瘤。

③用法与用量：成人每日服3—4次，每次1袋（6g），隔4小时服1次，30天为一个疗程。

④注意事项：本品有毒，切勿过量，孕妇禁服，低血压者减半，服药应从小剂量开始。忌辛、酸、辣及刺激性食物。

⑤生产方法：用浸膏粉制备法，同抗癌灵1号，规格15粒为2g每袋重6g。

五、抗癌灵5号（湿热蕴结型）

（1）组成：龙胆草1.5份 九牛胆1.5份 柴胡1.5份 黄芩1份 栀子1.5份 泽泻1.5份 木通1.5份 金银花2份 生地1.5份 玄参2份 连翘1.5份 防风2份 白芷1.5份 陈皮1.5份 天青地白3份 天青地红3份 重楼2份 见血飞（根）2份 土茯苓3份 大黄4份（后下）

（2）功能主治：清肝泻火、解毒散结、疏风散邪、适用于脘腹痞闷、呕恶厌食、肢体困重、大小便不畅、面目肌肤发黄、皮肤发痒、身热起伏、汗出不解、舌苔黄腻、脉滑濡数等癌症患者。

（3）用法与用量：成人每日3次，每次1袋6g，隔4小时1次，20天为一个疗程。

（4）注意事项：孕妇和低血压者慎服，服用时应从小剂量开始。

（5）生产方法：浸膏粉制备法，规格每15粒重为2g，每袋重

6g。

六、抗癌灵6号（寒湿困脾型）

①组成：党参2份 附子0.5份 干姜1份 木瓜1.5份 大腹皮1.5份 茯苓1.5份 肉桂1.5份 猪苓1.5份 泽泻1.5份 郁金1.5份 青皮1.5份 白茅草根4份 见血飞4份 散血飞4份 丹参2份 石韦2份 金钱草5份 当归2份 川芎2份

②功能主治：温中健脾、活血通经、行气利水、适用于腹大胀满、按之如鼓、颜面微浮、下肢浮肿、脘腹腔疼胀、精神困倦、小便少、大便溏、舌苔白腻、脉缓等癌症患者。

③用法与用量：成人每日3次，每次1袋6g。

④注意事项：本品以消水消肿为主，如腹胀满或水肿症状消失，即可停药。

⑤生产方法：同抗癌灵1号，用浸膏制备法。规格每15粒重为2g，每袋重6g。

抗癌酊剂（外用）

①成分组成：莽草（叶）5份 雷公滕5份 防风5份 九牛胆10份 野百合10份 天青地红10份 天青地白10份 全蝎5份 蜈蚣5份 见血飞（根）10份 散血飞10份 红花10份 山地蜂（蜜蜂）5份 藤黄5份 黑蚂蚁5份 重楼10份 细辛2份 白附子5份 蓖麻子10份 枇杷叶10份 杏仁10份 生川乌10份 生草乌10份 天南星5份 薄荷脑5份 樟脑5份 桉油5份 丁香酚5份 木姜油5份 麝香粉适量

②功能主治：祛风除湿、清热止痛、抗癌消肿，用于各种肿瘤（癌）、肿痛未消失者。

③用法与用量：癌症患者每日涂擦4—5次，每次用量不超过2g，隔2—3小时涂擦1次，30天为一个疗程，亦可用热蒸肿瘤患处，热

蒸用 10g 药水加水 30g，热蒸时间为 10 分钟。

④注意事项：

- 1、过敏者及孕妇禁用，禁止内服
- 2、本品有毒，不能超量或大面积涂擦，如确有需要，应按时间隔 2 个小时分开涂擦患处。
- 3、使用本品不可盲目停药，应连续使用。

⑤生产方法：

将中草药按比例粉碎，用 50 度高粱酒，浸泡 15 天密封，再用过滤器反复过滤后，按需要量装瓶，配制浓度为 30%。

抗癌膏药（外用）

（1）组成：莽草（叶子）5 份 雷公藤 5 份 防风 6 份 九牛胆 10 份 天青地红（根）10 份 天青地白（根）10 份 全蝎 5 份 蜈蚣 5 份 藤黄 5 份 细辛 5 份 白附子 5 份 草乌 5 份 川乌 5 份 蓖麻子 5 份 野百合 10 份 薄荷脑 5 份 樟脑 5 份 冰片 5 份 桉油 5 份 花椒油 5 份 麝香粉适量 见血飞 10 份 散血飞 10 份

（2）功能主治：

祛风除湿、清热止痛、活血通经、抗癌消肿，用于各种肿瘤（癌）未消失者及肿痛，亦用于风湿、类风湿关节炎及骨质增生等。

（3）用法与用量：加温软化，推于特制布上，贴上患处，膏药应大于患处，每日晚上换 1 次，30 天为一个疗程。

（4）注意事项：有过敏者及孕妇禁用，禁止内服。

（5）生产方法：先将药物按比例称均匀，分碎成细末，用 40% 玉米酒浸泡 20 天过滤，浓缩成精制品，加上助剂成膏，每块重 4g。

抗癌栓剂（外用）

（1）组成：桂枝 5 份 细辛 5 份 莽草叶 2 份 雷公藤 2 份 川乌 5 份 草乌 5 份 九牛胆 10 份 天青地红 10 份 天青地白 10

份 大黄 10 份 黄连 10 份 蓖麻子 5 份 重楼 10 份 见血飞 10 份
散血飞 10 份 防风 10 份 麝香粉适量 藤黄 5 份 薄荷脑 2 份
冰片 5 份 樟脑 2 份

(2) 功能主治：祛风除湿、通经活血、清热解毒、消肿抗癌，适用于各种癌症患者，特别对宫颈癌、直肠癌、子宫内膜癌、妇科尖锐湿疣、肌瘤、囊肿等效果更佳。

(3) 用法与用量：成人每日晚上，使用一粒，用消毒塑料膜套，轻轻推入阴道或肛门。

(4) 注意事项：本品有毒，过敏者慎用，孕妇禁用，妇女月经来潮时停止使用，改为肛门。

(5) 生产方法：

先将药物按比例粉碎，用 40% 玉米酒浸泡 20 天，过滤倒出药液，加热浓缩，加上助剂制成栓剂，每粒重 1g。

抗癌冲洗液（外用）

(1) 组成：莽草 2 份 九牛胆 12 份 草乌 15 份 川乌 15 份
重楼 15 份 天青地红 10 份 天青地白 10 份 桃仁 20 份 大黄 5 份
见血飞 10 份 薄荷脑 2 份 冰片 2 份 麝香适量 白果 10 份
杏仁 10 份 青黛 10 份 芦荟 10 份

(2) 功能主治：清热解毒、活血通经、消瘤抗癌，用于：直肠癌、子宫颈癌、子宫肌瘤、囊肿、尖锐湿疣等肿瘤

(3) 用法与用量

用于妇科肿瘤，每日冲洗 3 次，每次 3g，隔 4 小时 1 次，30 天为一个疗程。

(4) 注意事项：

- ① 本品有毒，应严格掌握剂量和次数
- ② 妇女月经来潮后停止使用。

③年老体弱者慎用，孕妇禁用。如有不良瓜，应减量使用。使用本品不能随便停药，应连续使用3—4个疗程。

(5) 生产方法：先将药物按比例粉碎成细末。用40%玉米酒密封浸泡20天。用过滤器反复过滤，配制成30%水溶液，按需要量罐装。

对手术、放疗和化疗治疗肿瘤的同时，往往给正常机体带来不良影响，有时这种影响不得不中断治疗，而直接影响治疗效果。因此，采用四联抗癌ABC系列及使用方法，对预后手术、放疗、化疗的副作用，提高疗效增强机体抗病（抗癌）能力，减少复发、转移、扩散及减少癌性疼痛发挥可喜疗效。

对手术、放疗前进行四联疗法治疗，一旦有效可以减少肿瘤的体积和延伸范围，使其后的手术在技术上更易处理，并使放射野的设置范围缩小，剂量减少可比常规辅助化疗更早地清除微小转移病灶，也帮助医生判断原发病灶对治疗的有效程度及临床上病灶可能的相应变化。为手术、放射后用药对肿瘤效果进行预测。一般说来，用“四联”疗法，对实体肿瘤如头颈淋巴癌，子宫颈癌及妇科良、恶性肿瘤、血管瘤、直肠癌、皮肤癌、食道癌、乳腺癌、舌癌等等，配合手术、化疗、放射治愈率应在90%以上，对内脏的肿瘤，由于合并症比较多，难度大一些治愈率在50%以上，对癌性疼痛消失的较快。

四联抗癌药ABC系列治疗使用方法，根据癌症发生和发展规律，正气亏虚是产生癌症的病理基础，气血淤滞是癌症发展的主要病机，邪毒蕴结是导致癌症的根本元凶。辩证论是治疗肿瘤总则。在四联抗癌药ABC口服抗癌1号（气血两虚）必须坚持一个疗程，每日3次。

抗癌3号（气滞血淤型）每日3次，但在服药时间应分开，如

每日 7 点，12 点，18 点，服抗癌 1 号。每日 9 点，14 点，20 点，服抗癌 3 号，应坚持一个疗程。

如果肿瘤患者属于（阴虚火旺型）。那么不一定要先服抗癌 1 号，直接用抗癌 2 号加抗癌 3 号，其它内服药，根据病情来调整，可以对症下药，病终即止，但因注意病情的变化，对症下药，也可以作为预防复发，每半年服一个疗程。

外用药

根据肿瘤患者病症来使用外用药，如头颈淋巴瘤、血管癌等，必须每日在肿瘤患处涂擦抗癌酊剂，每日 4 次，每日晚上贴膏药，如果是妇科肿瘤，如子宫颈癌等，应加冲洗酊剂，每日冲洗 3 次，并且每日晚上冲洗完后，加入一粒抗癌栓剂，必须连续使用 3 个疗程，即三个月或更长时间为宜。也可以作为预防复发每半年用一个疗程，对于其它各种肿瘤或转移，扩散淋巴瘤，在使用外擦酊剂时应尽量在肿瘤或附近患处一定要涂擦，直至癌症消失，同时应巩固一个疗程，切勿见瘤消失，马上停止用药，不然容易复发。