

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610134807. X

[51] Int. Cl.

A61K 36/8966 (2006.01)

A61K 36/898 (2006.01)

A61K 9/70 (2006.01)

A61P 15/14 (2006.01)

A61K 33/04 (2006.01)

A61K 35/32 (2006.01)

[43] 公开日 2007 年 6 月 27 日

[11] 公开号 CN 1985945A

[51] Int. Cl. (续)

A61K 35/56 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

[22] 申请日 2006.12.15

[21] 申请号 200610134807. X

[71] 申请人 辽宁路虎进出口贸易有限公司

地址 110002 辽宁省沈阳市和平区南京北街  
107 号

[72] 发明人 何建设

[74] 专利代理机构 沈阳科威专利代理有限责任公司

代理人 王 勇

权利要求书 2 页 说明书 5 页

[54] 发明名称

治疗乳腺疾病的热敷药贴和药膏贴及其制备方法

[57] 摘要

本发明提供了一种治疗乳腺疾病的热敷药贴和药膏贴及其制备方法，所要解决的问题是：市场上推出药物均为药膏贴，直接贴于病患处，靠皮肤吸收药物。由于皮肤吸收药物的能力有限，因此治疗效果不明显。本发明的要点是：它是由热敷药布片和药膏贴组成，其中热敷药贴是指浸过热敷药液的布片，热敷药液是煎热敷药后得到的，热敷药的配方是：生地、当归、赤芍；白术、生山栀、茯苓、丹皮、贝母、柴胡；海藻、丝瓜络丝、连翘。药膏贴的配方是：石见穿、夏枯草、蜂房、鹿角片、穿山甲、牡蛎、青皮；三七粉、蒲公英、连召、山奈、王不留行、丹参。本发明的用途是：治疗乳腺疾病。

1、一种治疗乳腺疾病的热敷药贴和药膏贴，其特征是：它是由热敷药贴和药膏贴组成，其中热敷药贴是指浸过热敷药液的布片，热敷药液是煎热敷药后得到的，

所说的热敷药的配方是：

(1) 生地 8 份~15 份、当归 9 份~18 份、赤芍 10 份~15 份；

(2) 白术 8 份~20 份、生山栀 7 份~15 份、茯苓 8 份~16 份、丹皮 9 份~18 份、贝母 7 份~15 份、柴胡 10 份~18 份；

(3) 海藻 8 份~16 份、丝瓜络丝 6 份~17 份、连翘 8 份~15 份；

所说的药膏贴的配方是：

(1) 石见穿 7 份~14 份、夏枯草 6 份~17 份、蜂房 8 份~20 份、鹿角片 5 份~16 份、穿山甲 5 份~15 份、牡蛎 5 份~18 份、青皮 5 份~18 份；

(2) 三七粉 5 份~15 份、蒲公英 6 份~16 份、连翘 5 份~15 份、山奈 7 份~17 份、王不留行 5 份~16 份、丹参 7 份~17 份。

2、按照权利要求 1 所述的治疗乳腺疾病的热敷药贴和药膏贴，其特征是：所说的热敷药的配方还包括：

(4) 川芎 8g~18g、鸡血藤 9g~17g、香附 5g~20g、红花 5g~19g；

(5) 寄生 8g~19g、大黄 6g~16g、夏枯草 7g~17g、芒硝 8g~19g；

(6) 白芷 5g~15g、小楂肉 10g~15g、橘核 5g~16g、急性子 10g~15g、凤仙花 6g~15g；

所说的药膏贴的配方还包括：

(3) 当归 9g~20g、三棱 5g~19g、全蝎 8g~16g、柴胡 5g~15g、肉桂 5g~16g、没药 5g~16g；

(4) 穿山甲 5g~15g、川乌 8g~18g、草乌 5g~15g、山慈姑 6g~18g、泽兰 5g~20g。

3、制造权利要求 1 所述的治疗乳腺疾病的热敷药贴和药膏贴的方法，其

特征是：

(1) 热敷药贴的制备：精选药材，清洗去泥沙，风干，将配伍好的中药一剂加水 4 公斤，泡制一小时后，高火煎制，每 20 分钟取浓缩汁液一次，可取三次，浓缩，熬至粘稠状。加入渗透剂 8~16 份，将药布片浸入药液中，浸泡 20 分钟，取出，滴净药液，入真空包装袋；

(2) 药膏贴的制备：精选药材，清洗去泥沙，风干，粉碎至 800 目，均匀混合，将 50 克蜂蜜熬制滴水成珠，加入药粉，搅拌均匀，冷却后，加入渗透剂 3~8 份，混合均匀，制作膏贴。

## 治疗乳腺疾病的热敷药贴和药膏贴及其制备方法

### 技术领域

本发明涉及治疗乳腺疾病的热敷药贴和药膏贴及其制备方法。

### 背景技术

乳腺疾病目前为多发病。为治疗该病，市场上推出许多药，口服与外用。其中外用药物均为药膏贴，直接贴于病患处，靠皮肤吸收药物。由于皮肤吸收药物的能力有限，因此治疗效果不明显。严重时，因药物与皮肤发生反应，还容易引起皮炎或皮肤过敏等症状，更使药效大打折扣。

### 发明内容

针对现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种能避免上述不足的治疗乳腺疾病的热敷袋和药膏贴及其制备方法。

本发明的目的是这样实现的：本发明中的产品是由热敷药贴和药膏贴组成，其中热敷药贴是指浸过热敷药液的布片，热敷药液是煎热敷药后得到的，所说的热敷药的配方是：

- 1、生地 8 份~15 份、当归 9 份~18 份、赤芍 10 份~15 份；
- 2、白术 8 份~20 份、生山栀 7 份~15 份、茯苓 8 份~16 份、丹皮 9 份~18 份、贝母 7 份~15 份、柴胡 10 份~18 份；
- 3、海藻 8 份~16 份、丝瓜络丝 6 份~17 份、连翘 8 份~15 份。

热敷药液的制备及使用方法：

制备：精选药材，清洗去泥沙，风干。将配伍好的中药一剂加水，泡制一小时后，高火煎制，每 20 分钟取浓缩汁液一次，可取三次，浓缩，熬至粘稠状。加入渗透剂 8~16 份，将药布片浸入药液中，浸泡 20 分钟，取出，滴净药液，入真空包装袋。

使用方法：每次使用时取出一片，将药片敷于患处，用热水袋热敷 40~60

分钟，早晚各一次。

所说的药膏贴的配方是：

1、石见穿 7 份~14 份、夏枯草 6 份~17 份、蜂房 8 份~20 份、鹿角片 5 份~16 份、穿山甲 5 份~15 份、牡蛎 5 份~18 份、青皮 5 份~18 份；

2、三七粉 5 份~15 份、蒲公英 6 份~16 份、连召 5 份~15 份、山奈 7 份~17 份、王不留行 5 份~16 份、丹参 7 份~17 份。

药膏贴的制备及使用方法：

制备：精选药材，清洗去泥沙，风干。粉碎至 800 目，均匀混合。将 50 克蜂蜜熬制滴水成珠，加入药粉，搅拌均匀。冷却后，加入渗透剂 3~8 份，混合均匀。制作膏贴。

使用方法：药膏贴直接敷于患处，三天一贴，12 天为一疗程。

本发明与现有技术方案相比，热敷药贴可迅速通过皮肤，皮下，脂肪达到病灶部位，活化免疫力，增强免疫力，活血、化瘀、疏通导管、软化病灶组织，缓解药膏贴长时间接触皮肤刺激，有效避免药物直接接触皮肤过敏，促进药物吸收，药效直接发挥作用。

药膏贴，主要是经热敷后贴敷软膏贴，可使药物快速渗透至病灶部位，发挥药物活血、化瘀、软坚、散结的功效。

两者交替使用，能缩短治疗时间及疗程。疗效快，疗效持久，愈后不易复发，本发明属外敷药，避免口服对胃、肝、脾及肠道刺激，无毒副作用，使用安全。

## 具体实施方式

所说的热敷药的配方是：

**热敷药：**

1、生地 8g~15g、当归 9g~18g、赤芍 10g~15g；

2、白术 8g~20g、生山栀 7g~15g、茯苓 8g~16g、丹皮 9g~18g、贝母 7g~15g、柴胡 10g~18g；

3、海藻 8g~16g、丝瓜络丝 6g~17g、连翘 8g~15g;

4、川芎 8g~18g、鸡血藤 9g~17g、香付 5g~20g、红花 5g~19g;

5、寄生 8g~19g、大黄 6g~16g、夏枯草 7g~17g、芒硝 8g~19g;

6、白芷 5g~15g、小楂肉 10g~15g、橘核 5g~16g、急性子 10g~15g、凤仙花 6g~15g。

热敷药方解：本方具有清肝解郁、活血化瘀，消肿止痛的作用。方中生地、当归、赤芍活血化瘀；丹皮活血；生山栀清肝火，消肝热；白术、茯苓、贝母健脾化痰，散结消肿。

热敷药液的制备及使用方法：

制备：精选药材，清洗去泥沙，风干。将配伍好的中药一剂加水 4 公斤，泡制一小时后，高火煎制，每 20 分钟取浓缩汁液一次，可取三次，浓缩，熬至粘稠状。加入渗透剂——二甲基桉枫 15~39g，将药布片浸入药液中，浸泡 20 分钟，取出，滴净药液，入真空包装袋。

使用方法：每次使用时取出一片，将药片敷于患处，用热水袋热敷 40~60 分钟，早晚各一次。

所说的药膏贴的配方是：

1、石见穿 7g~14g、夏枯草 6g~17g、蜂房 8g~20g、鹿角片 5g~15g、牡蛎 5g~18g、青皮 5g~18g;

2、三七粉 5g~15g、蒲公英 6g~16g、连召 5g~15g、山奈 7g~17g、王不留行 5g~16g、丹参 7g~17g;

3、当归 9g~20g、三棱 5g~19g、全蝎 8g~16g、柴胡 5g~15g、肉桂 5g~16g、没药 5g~16g;

4、穿山甲 5g~15g、川乌 8g~18g、草乌 5g~15g、山慈姑 6g~18g、泽兰 5g~20g。

药膏贴方解：本方具有活血化瘀，消肿止痛，软坚散结，解毒散结，散寒止痛，行血调经，行气散风，祛瘀生新石见穿活血化瘀、解毒散结；夏枯

草散结消肿；蜂房攻毒，杀乳痈疔毒；鹿角片清热解毒，软坚散结；牡蛎敛汗淋巴结核；青皮破、散结乳腺炎症；穿山甲消肿排脓，活血通乳。三七活血祛瘀、消肿止痛；蒲公英清热解毒；没药行气止痛，解毒消肿；丹参瘀生新，活血调经，清心除烦；王不留行行血调经，通乳消肿。

药膏贴的制备及使用方法：

制备：精选药材，清洗去泥沙，风干。粉碎至 800 目，均匀混合。将 50 克蜂蜜熬制滴水成珠，加入药粉，搅拌均匀。冷却后，加入渗透剂——二甲基桉枫 5~15g，混合均匀。制作膏贴。

使用方法：药膏贴直接敷于患处，三天一贴，12 天为一疗程。

热敷药贴的作用是，清肝解郁，通筋活络，润燥软坚，促进病变部位血液循环，活血化瘀，散结，祛风消肿止痛。

药膏贴的作用是，活血化瘀，解毒散结，软坚散结，散寒止痛，行血调经，祛瘀生新。

治疗疗效：单纯性乳腺增生 10~15 天即可痊愈；对于乳腺多发性节性增生，效果显著，15~20 天即可痊愈；乳腺结结、肿块可在 15~20 天内软化，痛觉消失，经 2~3 个疗程（一疗程 12 天），临床症状消失，患者达到痊愈。

病例：

**例 1**、患者余凤，女，37 岁，家住沈阳市虎石台镇抗生素小区。该患者自感身体无力，双乳房牵扯性、间歇性疼痛，无肿胀，皮肤无变色，双乳房可触及到多个圆形，质地较硬结结，大者 15mm 及链条状，大者 6\*18mm 肿块及多个结结性增生物，大者 14mm，压痛感明显，与皮肤无粘连，边界清，经本药热敷与外用贴 18 天左右，痛感消失，结结缩小至 3mm，链条状肿块消失，现患者无痛感，无不适。

患者王桂琴，女，47 岁，沈阳市大桥小区。该患者 2 年前自觉双乳房疼痛，活动受限，经省肿瘤医院诊断为双乳房多发性结结性增生，左乳房外上限导管内有 11.0mm 大肿块。经本药 20 天的治疗，肿块缩小至 0.8mm，2 个

疗程后，肿块缩小至 0.3mm，边界清，身体无不适。

**例 2、**患者万秀凤，女，43 岁，家住沈阳市虎石台镇矿建 30 号楼。该患者三年前发现左侧乳房有一小肿块，无疼痛，未治疗。06 年妇女普查时，发现左侧乳房有多个结结及肿块，压痛明显，牵扯痛。经用本药 10 天，压痛感觉消失，一疗程后结结及肿块明显缩小至原 1/5 大小，接续用药一疗程，结结及肿块消失。现该患者工作及生活正常，无复发。

**例 3、**患者徐丽，女，40 岁，家住矿建 31 号楼。该患者 2 年前妇女普查时发现又侧乳房一小结结 0.3mm，无不适。06 年 7 月自觉右侧乳房牵扯性疼痛，后经医院诊断为右侧多发性增生，大者 7.0\*5.0mm。经本药热敷及外用膏贴，一疗程后无牵扯痛，无不适，27 天后，增生全部消失，现患者无复发，自觉良好。

目前经本药治疗患者近千余例，治愈率达 98.9%。