(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101940643 A
(43)申请公布日 2011.01.12

(21)申请号 201010268169.7

(22)申请日 2010.08.26

(71)申请人 魏成振
地址 252300 山东省聊城市阳谷县博济桥办事处王保玉村 33 号

(72)发明人 魏成振

(51)Int.Cl.
A61K 36/748(2006.01)
A61P 35/00(2006.01)
A61P 1/00(2006.01)
A61K 35/413(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54)发明名称

一种治疗胃癌、食道癌的药物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗胃癌、食道癌的药物，是以牛黄 3、檀香 9、半枝莲 12、白花蛇舌草 12、皂角刺 6、当归 15、红花 15、桃仁 15、生山楂 50、木香 30、生甘草 6 组成的。应用本发明药物治疗胃癌、食道癌无毒付做用，治愈后不易复发。应用本发明药物治疗胃癌、食道癌有效率 96%，治愈率 80%。

CN 101940643 A

1. 一种治疗胃癌、食道癌的药物，其特征在于：它是由下述重量份的中药原料组成的，牛黄 3、檀香 9、半枝莲 12、白花蛇舌草 12、皂角刺 6、当归 15、红花 15、桃仁 15、生山楂 50、木香 30、生甘草 6。

2. 根据权利 1 所述的一种治疗胃癌、食道癌的药物，其特征在于：它可以制成散剂、胶囊剂、片剂。

一种治疗胃癌、食道癌的药物

技术领域

[0001] 本发明属于纯中药技术领域，具体地说是一种治疗胃癌、食道癌的药物。

背景技术

[0002] 胃癌、食道癌是现代医学的名词，即祖国医学所说的噎膈是也。传统医学的噎膈包括了胃癌、食道癌、幽门梗阻，它是一种消化道疾病。噎，指咽食物难下，膈，是指胸膈阻塞，吃食物咽不下，或咽下去又吐出来，统称噎膈。噎膈祖国医学认为，有因痰瘀者，有因血瘀者，有因胃气上冲者，有因贲门枯干者致食物难下而成噎膈。，早期症状常不明显，如捉摸不定的上腹部不适、隐痛、嗳气，泛酸、食欲减退、轻度贫血等。从现代医学的角度看，噎膈类似于胃癌、食道癌、幽门梗阻。西医利用多采取手术治疗、放疗和化疗，或采取药物保守疗法，但是，复发率、扩散及转移率在80％以上，死亡率在也是相当高的。手术治疗、放疗和化疗不能不能调整人体内的脏腑的功能，而且还能破坏脏腑的功能，使其功能失调，即给病人造成了经济负担，有的则造成了人财两空。有的利用中药熬成汤药内服效果不明显，如：有的用《医学统旨》五膈宽中散、《医学心语》启膈散治疗效果也不明显，也不能有效的根治胃癌、食道癌。

发明内容

[0003] 本发明的目的就在于提供一种能够有效的治疗胃癌、食道癌的中药药 物。

[0004] 本发明药物由中药配制而成，用后见效快，对发病的患者服药 1-3 个疗程内可达到治愈的目的，且愈后不易复发。

[0005] 本发明的药物，一种治疗胃癌、食道癌的药物，其特征在于：它是由下述重量份的中药原料制作而成的，牛黄 3、檀香 9、半枝莲 12、白花蛇舌草 12、皂角刺 6、当归 15、红花 15、桃仁 15、生山楂 50、木香 30、生甘草 6。将上药混合均匀共粉碎过 300 目筛，将药粉炼蜜为丸，每丸 3 克。

[0006] 本发明的药物可以采用中药制剂中常规方法制备成任何常规内服制剂。可以将共粉碎过 300 目筛的药粉制成散剂、胶囊剂、片剂服用。

[0007] 本发明的药物具有活血祛瘀，清热解毒，消除肿瘤，利水消肿，消食化积之功，达到治愈胃癌、食道癌的目的。

[0008] 服用方法：日服 2 次，每次 1 丸，早晚饭后放入口中含化。

[0009] 治疗疗程：30 天为 1 个疗程，轻者 2-3 个疗程可治愈，重者 3-6 个疗程可治愈，治愈后不易复发。

[0010] 本发明药物治疗效果：治疗胃癌、食道癌效果明显，无毒副作用，愈后不易复发，有效率 96％，治愈率 80％。

[0011] 本发明的药物主治胃癌、食道癌：症见：胃或食道部可摸到包快，腹胀，进食少，胃出现灼热，大便燥结，大便血，胸骨后隐疼，胸闷，食难咽下，脘腹胀满，泛吐粘痰，嗳气，或食后吐出，口渴欲饮，小便黄，气短面白，面浮足肿，消瘦。

[0012] 本发明的药物机理如下：

[0013] 当归：味甘、辛、苦，性温。入肝、心、脾经。具有补血调经，活血 止痛、润肠通便之功。取本品味辛苦，苦泻辛散，故并能活血，气香性温，能行滞解郁，故有止痛作用。破瘀，和胃降逆之功。见（《中医方药学》广东中医学院编，广东人民出版社，1973 年 6 月第一次印刷。见 611-612 页。

[0014] 红花：味辛、性温。入心、肝经。具有活血通经，祛瘀止痛之功。本品辛散温通，长于活血祛瘀通经，血行瘀去，痛自消。（同上，见 549 页）

[0015] 桃仁：味苦、甘，性平。入心、肝、大肠经。具有破血祛瘀，润燥滑肠之功。本品苦能泻血滞，为破血祛瘀要药，主要用于血瘀腹痛（同上，见 550 页）

[0016] 牛黄：味苦、甘，性凉。气芳香。入心、肝经。具有开窍豁痰，息风定惊，清热解毒之功。（同上，见 157-158 页）

[0017] 檀香：味辛，性温。气芳香。入脾、胃、肺经。具有行气止痛之功。多用于胸腹气滞疼痛。（同上，见 494 页）

[0018] 半枝莲：味微苦，性寒。具有清热解毒，利水消肿之功。本品为常用的抗癌药，可用于多种癌症。（同上，见 818 页）

[0019] 白花蛇舌草：味甘、淡。性微寒。具有清热解毒，清利湿热，抗肿瘤之功。本品性味甘寒，具有较强的清热解毒功能，可用于各种热毒症。本品味淡能渗湿利水，寒能清热，故能清利湿热。用于多种肿瘤，对消化道肿瘤疗效较好。（同上，见 179 页）

[0020] 皂角刺：味辛，性温。入肝、胃经。具有消肿溃脓，祛风杀虫之功。用于痈肿处起，或脓成不溃等症。（同上，见 558 页）

[0021] 生山楂：味酸、甘，性微温。入脾、肝、胃经。具有消食导滞哦，化瘀散结之功。本品善消肉食积滞，本品入血分，能化瘀散结。（同上，见 461 页）

[0022] 木香：味辛、味微苦，性温。气芳香。入脾、胃、大肠、胆经。具有行气止痛之功。（同上，见 479-480 页）

[0023] 生甘草：生用味甘、性平。入脾、肺经。具有补脾益气，清热解毒，润肺止咳，缓急止痛，调和诸药之功能。（同上，见 602-603 页）

[0024] 按：方中以当归、红花、桃仁、皂角刺破瘀通经，活血行瘀，消肿止痛，消除肿瘤为君；用牛黄、半枝莲、白花蛇舌草清热解毒，清利湿热为臣；佐以生山楂、檀香、木香消食化积，行气止痛；用甘草化阴生津，调和诸药，诸药合成，相得益彰，具有活血祛瘀，清热解毒，消除肿瘤，利水消肿，消食化积之功，达到治愈胃癌、食道癌的目的。

[0025] 中医学认：胃癌、食道癌起因多为情志不舒，气机不畅所致。气机不畅使肝气郁结，肝胃不和，往往出现脏腑器质性的并发症。中医讲，“忧伤脾，努伤肝”。脾伤则气结，气结则津液不布，津液不布则聚集成痰；肝伤则气郁，气郁则血液运行不畅，血液运行不畅，则成瘀，痰瘀交阻于食道，则食不易进；交阻于胃易吐，腹胀，进食少则生化资源少，久聚胃腑必化火则出现灼热，大便燥结，甚至血管破裂流血。症见进食少，胃出现灼热，大便燥结，大便血，食难咽下，脘腹胀满，胸骨后隐疼，胸闷，泛吐粘痰，嗳气，或食后吐出，口渴欲饮，小便黄，气短面白，面浮足肿，消瘦。本发明选用当归、红花、桃仁、皂角刺破瘀通经，活血行瘀，消肿止痛，使血活瘀自消，则肿瘤消，肿瘤消则疼痛止，肿瘤消则食难咽下，胸骨后隐疼，胸闷，脘腹胀满，嗳气，或食后吐出诸症自好，这就是中医之治本之道理。用牛黄、半枝莲、白花蛇

舌草清热解毒，清利湿热，使热毒清，湿 热祛，则使湿热毒交加的肿瘤自消，则，泛吐粘痰，腹胀，大便燥结，口渴欲饮，小便黄，气短面白，面浮足肿自然消于无影，此正谓中医治本之妙处也；用生山楂、檀香、木香消食化积，行气止痛使胃消化功能增强，以治进食少，食后脘腹胀满，腹痛，嗳气，消瘦；食进，则长肌肉，肌肉长则抗病能力增强，则诸症自好，此为遵循了中医的“有胃气则生，无胃气则死”的治疗大法，也是治本之法；甘草化阴生津，调和诸药；诸药合成达到治愈胃癌的目的。

具体实施方式

[0026] 下面结合实施例对本发明作进一步说明：

[0027] 实施例：取牛黄 3、檀香 9、半枝莲 12、白花蛇舌草 12、皂角刺 6、当归 15、红花 15、桃仁 15、生山楂 50、木香 30、生甘草 6。将上药混合均匀共粉碎过 300 目筛，将药粉炼蜜为丸，每丸 3 克。

[0028] 本发明的药物可以采用中药制剂中常规方法制备成任何常规内服制剂。可以将共粉碎过 300 目筛的药粉制成散剂、胶囊剂、片剂服用。

[0029] 本发明的药物具有活血祛瘀，清热解毒，消除肿瘤，利水消肿，消食化积之功，达到治愈胃癌、食道癌的目的。

[0030] 服用方法：日服 2 次，每次 1 丸，早、晚饭后放入口中含化。

[0031] 治疗疗程：30 天为 1 个疗程，轻者 2-3 个疗程可治愈，重者 3-6 个疗程可治愈，治愈后不易复发。

[0032] 本发明药物治疗效果：治疗胃癌、食道癌效果明显，无毒副作用，愈后不易复发，有效率 96％，发病初期治愈率 80％。

[0033] 本发明主治胃癌、食道癌。症见：胃或食道部可摸到包快，腹胀，进 食少，胃出现灼热，大便燥结，大便血，胸骨后隐疼，胸闷，食难咽下，脘腹胀满，泛吐粘痰，嗳气，或食后吐出，口渴欲饮，小便黄，气短面白，面浮足肿，消瘦。

[0034] 本发明药物治疗胃癌、食道癌的中药的临床观察：

[0035] 1、治疗资料

[0036] 取治疗患者 50 例，其中男 30 例，女 20 例，年龄在 40-60 岁。以上患者皆被 CT 和病理切片检查为中晚期胃癌、食道癌。

[0037] 2、诊断标准

[0038] 胃部疼痛一般或剧烈、可摸见包快，恶心呕吐，腹胀，进食少，胃出现灼热，大便燥结，大便血，食难咽下，脘腹胀满，嗳气，或咽物不利，时有胸骨后疼痛，胸闷，或食后吐出，口渴欲饮，小便黄，气短面白，面浮足肿，消瘦，乏力，精神差。

[0039] 3、治疗方法

[0040] 服本发明药物，日服 2 次，每次 1 丸，早、晚饭后放入口中含化。

[0041] 4、治疗疗程

[0042] 30 天为 1 个疗程，轻者 2-3 个疗程可治愈，重者 3-6 个疗程可治愈，治愈后不易复发。

[0043] 5、疗效评定标准

[0044] 有效：疼痛减轻，食欲增加，精神有所恢复，肿瘤缩小或未进展，病情能稳定。

[0045] 好转：疼痛消失，肿瘤明显缩小，食欲正常，精神好转，时有反复，仍需治疗。

[0046] 痊愈：肿瘤体消失，疼痛消失，食欲正常，精力充沛，恢复正常的工作和劳动。

[0047] 无效：症状术减轻，病情继续恶化。

[0048] 5、治疗结果

[0049] 经用本发明药物治疗上述胃癌患者，经治疗 3 个疗程，其中痊愈 40 例，好转 5 例，有效 3：无效 2 例，有效率 96％，痊愈率 80％，无效率 4％。

[0050] 典型病例

[0051] 1、武某，男，59 岁，河南省台前县长刘村人，2007 年 5 月 16 日来诊，自述，2006 年 7 月被聊城市人民医院及濮阳市人民医院诊断为胃癌，经服用中西药治疗都无效，已花上万元，故来诊，咐停服一切药物，按服用方法，日服 2 次，每次 1 丸，早、晚饭后放入口中含化，服本发明药物 5 天后，患者胃部疼痛，恶心呕吐，腹胀，进食少，胃出现灼热，大便燥结，大便血，脘腹胀满，嗳气，口渴欲饮，小便黄，气短面白，面浮足肿，精神差症状逐渐减轻。咐患者按上述服用方法连续服 3 个疗程，症状全部消失，肿瘤已不存在，一切如正常人，随能下地劳动，随访至今未复发。

[0052] 2、杨某某，女，60 岁，阳谷县七级镇七级南街人，2004 来所就诊，自述，5 年前，患胃病，胃脘胀痛，进食后疼痛加重，呕吐带血，大便燥结，大便血，经济南省立医院诊断为胃溃疡、胃癌，用过中西药都无效，症见，精神低、差，面浮足肿，气短面白，消廋，胃部拒按疼痛，脉细、弦，CT 片看出，胃中偏左部有包快 4.6cmX3.2cm，取本发明药物按服用方法，日服 2 次，每次 1 丸，早、晚饭后放入口中含化，服本发明药物 5 天后，胃脘胀痛，进食后疼痛加重，呕吐带血，大便燥结，大便血，面浮足肿，精神 低症状已好转，咐患者按上述服用方法连续服 3 个疗程，胃脘胀痛，进食后疼痛加重，呕吐带血，大便燥结，大便血，精神低、差，面浮足肿，气短面白，消瘦，胃部拒按，脉细、弦，症状全部消失，再做 CT 片，肿瘤已不存在，一切如正常人，随访至今未见复发。

[0053] 3、张某某，男，59 岁，2004 年 2 月 20 日来诊，自述，2003 年被济南肿瘤医院确诊为食道癌，经在济南肿瘤医院放疗后，不但无效果，反到引起面部三叉神经剧烈疼痛，故而停治，因肿瘤较大，不能进食，只能进流食，进水，症见，精神极差，消瘦，舌苔粘腻，脉细，先用治疗三叉神疼痛的祖传秘方经治疗 3 天好后，随即服用本发明药物，按服用方法，日服 3 次，每次 1 丸，饭后放入口中含化，服本发明药物 7 天后，自觉食道咽物渐渐畅通，随改为日服 2 次，每次服 1 丸，早、晚饭后放入口中含化，连服 3 个疗程，食道部完全畅通，肿瘤已消，精神焕发，食欲正常，吃馒头以及其它食物已无任何不适，肌肉丰满，为防复发，再服 15 天，改为每天服 1 次，每次服 1 丸，晚饭后放入口中含化。