



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105343423 B

(45)授权公告日 2018.12.25

(21)申请号 201510832651.1

A61K 33/06(2006.01)

(22)申请日 2015.11.26

A61K 33/36(2006.01)

A61K 33/04(2006.01)

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 105343423 A

(43)申请公布日 2016.02.24

(73)专利权人 姜义祥

地址 235200 安徽省宿州市张庄寨镇党屯
行政村姜庄自然村140号

(72)发明人 姜义祥 姜庆大

(74)专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 贾波

(56)对比文件

CN 101366899 A,2009.02.18,

CN 101156939 A,2008.04.09,

CN 102961655 A,2013.03.13,

王兆梓等.中药治疗湿疹128例.《中医研
究》.2002,第15卷(第3期),

符中柱等.萆薢渗湿汤联合派瑞松霜治疗肛
门湿疹疗效观察.《中国皮肤性病学杂志》.2004,
第18卷(第6期),

审查员 梁永焯

(51)Int.Cl.

A61K 36/8945(2006.01)

A61P 17/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗湿疹的药物及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗湿疹的药物,属于中
药技术领域。该药物是由煅石膏、紫草、苦参、蛇
床子、枯矾、硫磺、雄黄、何首乌、荆芥、虎杖、苍
术、茯苓、萆薢、泽泻、旋覆花、威灵仙、路路通按
照一定的重量比制成乳膏剂。该药物具有清热解
毒、祛风散寒、健脾利湿、润燥止痒之功效,临床
上可用于治疗急性、亚急性、慢性湿疹。且本发明
能适用于各种肤质人群,无任何副作用,疗效显
著,无后遗症,使用方便,安全。

1. 一种治疗湿疹的药物,其特征在于,它是由以下重量份的原料药制成:

煅石膏20份、紫草10份、苦参10份、蛇床子10份、枯矾6份、硫磺2份、雄黄0.8份、何首乌15份、荆芥8份、虎杖8份、苍术8份、茯苓8份、萆薢4份、泽泻4份、旋覆花15份、威灵仙12份、路路通15份。

2. 一种权利要求1所述的药物的制备方法,其特征在于,它包括以下步骤:

1) 将紫草、苦参、蛇床子、何首乌、荆芥、虎杖、苍术、茯苓、萆薢、泽泻、旋覆花、威灵仙、路路通中加入3-5倍重量的水浸泡1.5-2小时后,煎煮提取3次,每次60分钟,3次提取液合并,过滤,滤液浓缩至在60℃时相对密度为1.20-1.50的浸膏;

2) 将步骤1)所得浸膏真空干燥,然后粉碎过200目筛得混合粉末1;

3) 将煅石膏、枯矾、硫磺、雄黄研磨成粉末过200目筛得混合粉末2;

4) 将步骤2)所得混合粉末1和步骤3)所得混合粉末2加入到常规乳膏基质中搅拌均匀即得成品。

一种治疗湿疹的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种药物,具体的说是一种治疗湿疹的药物及其制备方法。

背景技术

[0002] 湿疹是由多种内外因素引起的瘙痒剧烈的一种皮肤炎症反应。分急性、亚急性、慢性三期。急性期具渗出倾向,慢性期则浸润、肥厚。有些病人直接表现为慢性湿疹。皮损具有多形性、对称性、瘙痒和易反复发作等特点。皮肤湿疹可发生在任何部位,但以外露部位及屈侧为多见;往往呈对称性分布。自觉瘙痒剧烈,病程不规则,常反复发作,迁延难愈。常见特定部位的湿疹有耳湿疹、手足湿疹、乳房湿疹、阴囊湿疹、小腿湿疹等。西医上认为湿疹病因复杂,常为内外因相互作用结果。内因如慢性消化系统疾病、精神紧张、失眠、过度疲劳、情绪变化、内分泌失调、感染、新陈代谢障碍等,外因如生活环境、气候变化、食物等均可影响湿疹的发生。中医认为其发病原因乃先天禀赋不耐,后天失调养;饮食不节,过食醒发动风之食物,炙熄厚味,浓茶烟酒,辛辣刺激之品,伤及脾胃;生湿停饮,使脾为湿困,水湿停滞,或因外感淋雨涉水,久卧湿地。使内外湿邪相搏久而化热,湿热蕴结,充于肌肤腠理,浸淫肌肤而发病,湿热化火可发为急性湿疹,常表现热重于湿,湿热蕴结肌肤则多为慢性湿疹,常表现为湿重于热。湿邪郁久亦可化燥伤阴致脾虚血燥。

[0003] 目前,西医治疗湿疹多采用以内服抗组胺药物,皮质激素类药物临时抑制为多,如口服西药,口服激素,外用溶液洗剂、乳剂、泥膏、油剂、软膏、乳剂等,这些都只是缓解湿疹症状,并不能根治湿疹,因而治疗效果并不好。长期使用激素类药物,副作用大,容易出现药物依赖性皮炎,皮肤潮红,毛细血管扩张,皮肤干燥、粗糙等。而且在治愈率、治疗费用等方面也难以达到满意的效果。因此,湿疹的治疗还是以中医为主,从中医方面从改善患者体质入手,从根本上治愈湿疹,防止复发。

发明内容

[0004] 针对现有技术中存在的问题,本发明提供了一种治疗湿疹的药物。该药物采用纯中药原料,各药物相辅相成,协同作用,具有清热解毒、活血化瘀、祛风止痒、健脾利湿的功效,对湿疹的治疗具有极佳的效果,且愈后不易复发。

[0005] 本发明还提供了一种治疗湿疹的药物的制备方法。

[0006] 本发明采用以下技术方案:

[0007] 一种治疗湿疹的药物,其特征在于,它是由以下重量份的原料药组成:煅石膏15-25份、紫草8-12份、苦参8-12份、蛇床子8-12份、枯矾3-8份、硫磺1-3份、雄黄0.5-1份、何首乌10-20份、荆芥6-10份、虎杖6-10份、苍术6-10份、茯苓6-10份、萆薢3-5份、泽泻3-5份、旋覆花10-20份、威灵仙8-15份、路路通10-20份。

[0008] 优选的,所述的治疗湿疹的药物是由以下重量份的原料药组成:煅石膏20份、紫草10份、苦参10份、蛇床子10份、枯矾6份、硫磺2份、雄黄0.8份、何首乌15份、荆芥8份、虎杖8份、苍术8份、茯苓8份、萆薢4份、泽泻4份、旋覆花15份、威灵仙12份、路路通15份。

[0009] 一种治疗湿疹的药物的制备方法,其特征在于,它包括以下步骤:

[0010] 1)将紫草、苦参、蛇床子、何首乌、荆芥、虎杖、苍术、茯苓、萆薢、泽泻、旋覆花、威灵仙、路路通中加入3-5倍重量的水浸泡1.5-2小时后,煎煮提取3次,每次60分钟,3次提取液合并,过滤,滤液浓缩至在60℃时相对密度为1.20-1.50的浸膏;

[0011] 2)将步骤1)所得浸膏真空干燥,然后粉碎过200目筛得混合粉末1;

[0012] 3)将煅石膏、枯矾、硫磺、雄黄研磨成粉末过200目筛得混合粉末2;

[0013] 4)将步骤2)所得混合粉末1和步骤3)所得混合粉末2加入到常规乳膏基质中搅拌均匀即得成品。

[0014] 本发明药物配方中紫草具有凉血,活血,解毒透疹的功效;苦参具有清热燥湿,杀虫,利尿的功效;蛇床子具有燥湿祛风,杀虫止痒,温肾壮阳的功效;何首乌具有补肝,益肾,养血,祛风的功效;荆芥具有解表散风,透疹的功效;虎杖具有祛风利湿,散瘀定痛,止咳化痰;苍术具有燥湿健脾,祛风散寒,明目的功效;茯苓具有利水渗湿,健脾,宁心的功效;萆薢具有祛风,利湿的功效;泽泻具有利水渗湿,泄热,化浊降脂的功效;旋覆花具有降气,消痰,行水,止呕的功效;威灵仙有祛风湿,通经络的作用;路路通有祛风活络,利水,通经的作用。此外方中的煅石膏具有收湿生肌,敛疮止血的功效;枯矾具有消痰,燥湿,止泻,止血,解毒,杀虫的功效;硫磺外用具有解毒杀虫,止痒疗疮的功效;雄黄外用具有解毒杀虫,燥湿祛痰,截疟的作用。诸药合用,具有清热解毒、祛风散寒、健脾利湿、润燥止痒之功效,临床上可用于治疗急性、亚急性、慢性湿疹。且本发明能适用于各种肤质人群,无任何副作用,疗效显著,无后遗症,使用方便,安全。

具体实施方式

[0015] 下面结合具体实施例对本发明做进一步的详细说明。

[0016] 实施例1

[0017] 一种治疗湿疹的药物,它是由以下重量份的原料药组成:煅石膏15份、紫草8份、苦参8份、蛇床子8份、枯矾3份、硫磺1份、雄黄0.5份、何首乌10份、荆芥6份、虎杖6份、苍术6份、茯苓6份、萆薢3份、泽泻3份、旋覆花10份、威灵仙8份、路路通10份。

[0018] 上述药物的制备方法如下:

[0019] 1)将紫草、苦参、蛇床子、何首乌、荆芥、虎杖、苍术、茯苓、萆薢、泽泻、旋覆花、威灵仙、路路通中加入3-5倍重量的水浸泡1.5-2小时后,煎煮提取3次,每次60分钟,3次提取液合并,过滤,滤液浓缩至在60℃时相对密度为1.20-1.50的浸膏;

[0020] 2)将步骤1)所得浸膏真空干燥,然后粉碎过200目筛得混合粉末1;

[0021] 3)将煅石膏、枯矾、硫磺、雄黄研磨成粉末过200目筛得混合粉末2;

[0022] 4)将步骤2)所得混合粉末1和步骤3)所得混合粉末2加入到常规乳膏基质中搅拌均匀即得成品。其中的乳膏基质为凡士林与羊毛脂按照15:1的重量比加热至熔融,然后搅拌至室温所得。

[0023] 实施例2

[0024] 一种治疗湿疹的药物,它是由以下重量份的原料药组成:煅石膏20份、紫草10份、苦参10份、蛇床子10份、枯矾6份、硫磺2份、雄黄0.8份、何首乌15份、荆芥8份、虎杖8份、苍术8份、茯苓8份、萆薢4份、泽泻4份、旋覆花15份、威灵仙12份、路路通15份。

[0025] 上述药物的制备方法如下:

[0026] 1)将紫草、苦参、蛇床子、何首乌、荆芥、虎杖、苍术、茯苓、萆薢、泽泻、旋覆花、威灵仙、路路通中加入3-5倍重量的水浸泡1.5-2小时后,煎煮提取3次,每次60分钟,3次提取液合并,过滤,滤液浓缩至在60℃时相对密度为1.20-1.50的浸膏;

[0027] 2)将步骤1)所得浸膏真空干燥,然后粉碎过200目筛得混合粉末1;

[0028] 3)将煅石膏、枯矾、硫磺、雄黄研磨成粉末过200目筛得混合粉末2;

[0029] 4)将步骤2)所得混合粉末1和步骤3)所得混合粉末2加入到常规乳膏基质中搅拌均匀即得成品。其中的乳膏基质为凡士林与羊毛脂按照15:1的重量比加热至熔融,然后搅拌至室温所得。

[0030] 实施例3

[0031] 一种治疗湿疹的药物,它是由以下重量份的原料药组成:煅石膏25份、紫草12份、苦参12份、蛇床子12份、枯矾8份、硫磺3份、雄黄1份、何首乌20份、荆芥10份、虎杖10份、苍术10份、茯苓10份、萆薢5份、泽泻5份、旋覆花20份、威灵仙15份、路路通20份。

[0032] 上述药物的制备方法如下:

[0033] 1)将紫草、苦参、蛇床子、何首乌、荆芥、虎杖、苍术、茯苓、萆薢、泽泻、旋覆花、威灵仙、路路通中加入3-5倍重量的水浸泡1.5-2小时后,煎煮提取3次,每次60分钟,3次提取液合并,过滤,滤液浓缩至在60℃时相对密度为1.20-1.50的浸膏;

[0034] 2)将步骤1)所得浸膏真空干燥,然后粉碎过200目筛得混合粉末1;

[0035] 3)将煅石膏、枯矾、硫磺、雄黄研磨成粉末过200目筛得混合粉末2;

[0036] 4)将步骤2)所得混合粉末1和步骤3)所得混合粉末2加入到常规乳膏基质中搅拌均匀即得成品。其中的乳膏基质为凡士林与羊毛脂按照15:1的重量比加热至熔融,然后搅拌至室温所得。

[0037] 为了进一步说明本发明的药物对湿疹的临床治疗效果,本发明在临床中设计以下方案进行对比疗效实验。

[0038] 1、临床资料:临床随机选择200 例患者,所有患者均为湿疹,病程在1周~6个月;其中急性湿疹76例,亚急性湿疹95例,慢性湿疹29例。将上述病例随机均分为治疗组和对照组各100例。

[0039] 2、治疗方法:治疗组使用本发明实施例2制得的药物,每天外涂于皮肤患处,根据患处面积调整用量,以均匀覆盖患处为宜,每天涂抹3次,连续使用一周后观察效果。对照组使用复方地塞米松乳膏,又称为皮炎平,每天涂抹患处3次,以均匀覆盖患处为宜。为确保治疗效果,患者在治疗期间需忌辛辣、鱼腥、海味食物。

[0040] 3、诊断标准:

[0041] 急性湿疹:发病迅速,皮疹呈多形性。主要表现为红斑水肿基础上的丘疹、丘疱疹、水疱、糜烂、渗出、结痂等,损害境界不清,严重时可泛发全身,瘙痒剧烈;

[0042] 亚急性湿疹:为急性炎症减轻后,皮疹以小丘疹、鳞屑和结痂为主,仅有少量的丘疱疹、水疱及糜烂;皮损较为局限,瘙痒仍较剧烈;

[0043] 慢性湿疹:由急性湿疹、亚急性湿疹反复发作转变而来。表现为皮肤粗糙、抓痕、结痂、浸泡肥厚,部分苔藓样变、色素沉着,外周扩散在有丘疱疹。

[0044] 4、疗效判定标准:

[0045] 治愈：皮损完全消退或仅留色素沉着，自觉症状消失；

[0046] 显效：皮损消退60%以上，自觉症状明显减轻或消失；

[0047] 有效：皮损消退30%以上，自觉症状减轻；

[0048] 无效：皮损消退不足30%或无变化。

[0049] 5、临床治疗结果：见表1。

[0050] 表1临床治疗结果

[0051]

	病例数	治愈例	显效例	有效例	无效例	总有效率%
治疗组	100	53	26	20	1	99
对照组	100	38	25	21	16	84

[0052] 由上述结果可知：与对照组相比，本发明的药物乳膏剂对于湿疹的治疗效果要明显高于对照组，对湿疹的治疗总有效率达到99%，而对照组的总有效率84%。且上述所有患者在治疗过程中均未发现任何明显的毒副作用。因而，本发明的药物是一种疗效高的治疗湿疹的药物，且治愈后不易复发，安全，使用方便，在临床上具有广泛的应用推广价值。