




(86) Date de dépôt PCT/PCT Filing Date: 2006/11/28
(87) Date publication PCT/PCT Publication Date: 2007/06/21
(45) Date de délivrance/Issue Date: 2014/07/22
(85) Entrée phase nationale/National Entry: 2008/06/10
(86) N° demande PCT/PCT Application No.: EP 2006/068976
(87) N° publication PCT/PCT Publication No.: 2007/068580
(30) Priorité/Priority: 2005/12/15 (FR0512760)

(51) Cl.Int./Int.Cl. *C07C 65/26* (2006.01),
A61K 31/192 (2006.01), *A61P 17/00* (2006.01),
A61P 17/06 (2006.01), *A61P 17/10* (2006.01)
(72) Inventeurs/Inventors:
BIADATTI, THIBAUD, FR;
THOREAU, ETIENNE, FR
(73) Propriétaire/Owner:
GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT, FR
(74) Agent: ROBIC

(54) Titre : DERIVES BIPHENYLIQUES AGONISTES SELECTIFS DU RECEPTEUR RAR- γ
(54) Title: BIPHENYL DERIVATIVES AS SELECTIVE AGONISTS OF γ RAR RECEPTOR




(57) Abrégé/Abstract:

L'invention concerne de nouveaux composés biphényles de formule (I) (voir formule I) dans laquelle n est un entier compris entre 1 et 3 inclus, ainsi que les sels des composés de formule (I). Elle concerne aussi leur utilisation pour la préparation d'une composition pharmaceutique ou cosmétique pour prévenir et/ou traiter des pathologies dans lesquelles une activité agoniste sélective pour le sous-type gamma de la famille des récepteurs RAR est désirée.

ABRÉGÉ

L'invention concerne de nouveaux composés biphényliques de formule (I)



dans laquelle n est un entier compris entre 1 et 3 inclus, ainsi que les sels des composés de formule (I). Elle concerne aussi leur utilisation pour la préparation d'une composition pharmaceutique ou cosmétique pour prévenir et/ou traiter des pathologies dans lesquelles une activité agoniste sélective pour le sous-type gamma de la famille des récepteurs RAR est désirée.

DERIVES BIPHENYLIQUES AGONISTES SELECTIFS DU RECEPTEUR RAR- γ

La présente invention se rapporte à l'utilisation en thérapie, notamment dans le domaine de la dermatologie, de composés biphenyliques substitués par un radical aromatique à activité sélective pour le sous-type gamma de la famille des récepteurs RAR.

Une famille de composés biphenyliques a été décrite dans la demande de brevet WO 99/10308. Ces composés sont décrits comme ayant une application dans le traitement topique et systémique des affections dermatologiques liées à un désordre de la kératinisation et des affections ophtalmologiques, notamment.

L'activité de ces composés a notamment été mise en évidence par des tests de différenciation des cellules F9 de tératocarcinome embryonnaire de la souris et des tests de différenciation des kératinocytes chez l'homme.

En revanche, ce document ne fait nullement état d'une éventuelle activité spécifique des composés vis-à-vis du sous-type gamma des récepteurs RAR.

En effet, le sous type gamma de la famille des récepteurs RAR est largement majoritaire dans l'épiderme où il représente environ 90% du total des récepteurs (« Retinoic acid receptors and binding proteins in human skin », Elder JT, Astrom A, Pettersson U, Tavakkol A, Krust A, Kastner P, Chambon P, Voorhees JJ : *J Invest Dermatol.* **1992**;98 (6 Suppl): 36S-41S ; ou : "Retinoic acid receptor expression in human skin keratinocytes and dermal fibroblasts in vitro", Redfern CP, Todd C. *J Cell Sci.* **1992**;102 (Pt 1):113-21) et c'est bien l'interaction avec ce récepteur RAR gamma qui est responsable de l'efficacité des rétinoïdes sur l'épiderme (« Retinoic acid receptor gamma mediates topical retinoid efficacy and irritation in animal models », Chen S, Ostrowski J, Whiting G, Roalsvig T, Hammer L, Currier SJ, Honeyman J, Kwasniewski B, Yu KL, Sterzycki R, et al. *J Invest Dermatol.* **1995**;104 (5): 779-83).


Les récepteurs RAR gamma sont donc la seule cible dans le traitement de pathologies au niveau de l'épiderme comme par exemple pour l'acné ou le psoriasis ou toute autre pathologie cutanée traitée par les rétinoïdes.

D'autre part, certains effets secondaires propres à RAR alpha ou RAR beta peuvent être évités si on utilise des composés ayant une action sélective sur RAR gamma.

De façon surprenante, il a maintenant été montré que les composés selon l'invention présentent une activité agoniste sélective pour le sous-type gamma de la famille des récepteurs RAR extrêmement intéressante.

Les composés selon l'invention, agonistes sélectifs du sous-type RAR gamma, permettent ainsi de prévenir et/ou traiter diverses pathologies ou désordres dermatologiques, tout en diminuant les effets secondaires habituellement dus à l'action des actifs sur les sous-types RAR alpha et beta.

La présente invention a donc pour premier objet des composés qui peuvent être représentés par la formule générale suivante :



dans laquelle n est un entier compris entre 1 et 3 inclus, donc égal à 1, 2 ou 3, ainsi que les sels des composés de formule (I).

Selon une forme de réalisation préférée, n est égal à 2 ou 3, et les composés de formule (I) préférés sont choisis parmi l'acide 4'-(3-hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique, et l'acide 4'-(4-hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique.

Par sel pharmaceutiquement acceptable, on entend notamment un sel de métal alcalin, ou un sel alcalino-terreux, ou un sel d'amine organique.


L'invention vise également l'utilisation d'au moins un composé de formule (I) pour la préparation d'une composition pharmaceutique ou cosmétique destinée à prévenir et/ou traiter des pathologies pour lesquelles une activité agoniste sélective pour le sous-type gamma de la famille des récepteurs RAR est désirée.

Une voie de synthèse générale pour préparer les composés de formule (I) est représentée dans le schéma selon la figure 1.

5 Les matières premières et/ou les réactifs utilisés sont disponibles commercialement et/ou peuvent être préparés selon des méthodes connues de la littérature.


10 Selon un autre aspect, la présente invention concerne également un procédé de préparation des composés de formule (I) précédemment décrits comprenant les étapes suivantes :

i) réaction de couplage, par exemple de type couplage de Suzuki entre le composé de formule **1** préparé par exemple comme décrit dans la demande de brevet WO 99/10308 :


**1**

15

et le composé de formule **2** préparé par exemple comme décrit dans la demande de brevet WO 99/10308 :


**2**

pour conduire au composé de formule **3**,


**3**

20


25 ii) réaction d'étherification, par exemple du type étherification de Williamson ou similaire (voir par exemple Lerman, L et. al.; Synthesis 2004, (18), 3043-3046), du composé de formule **3** avec le composé de formule **4**,



dans laquelle X représente un groupe partant permettant une substitution nucléophile, comme par exemple un halogène (de préférence un atome d'iode ou de brome), R représente un hydrogène ou un groupement protecteur approprié tel que décrit dans « protective groups in organic synthesis » (Greene & Wuts, Wiley-interscience 1991), par exemple acétyle ou dimethyl-*tert*-butylsilyle, et n est nombre entier compris entre 1 et 3, de préférence 2 ou 3, pour conduire au composé de formule 5,



iii) dans le cas où R est différent de H, cette réaction ii) est suivie d'une réaction de déprotection de la fonction alcool du composé de formule 5 pour conduire au composé de formule 6,



iv) saponification de la fonction ester du composé obtenu à l'étape précédente, i.e. étape ii) pour les cas où R=H, ou étape iii) pour les cas où R est différent de H, pour conduire au composé de formule (I) correspondant (composé 7 dans la figure 1).

L'étape i) peut par exemple être réalisée en présence de carbonate de potassium, de Tetrakis(triphénylphosphine)palladium dans une solution de toluène.

L'étape ii) peut par exemple être réalisée en présence de carbonate de césium et de diméthylformamide et éventuellement de iodure de potassium.

L'étape iii) peut être réalisée conformément aux réactions de déprotection décrites dans « protective groups in organic synthesis » (Greene & Wuts, Wiley-Interscience 1991).

5 L'étape iv) peut par exemple être réalisée en présence de d'hydroxyde de sodium et de THF.

La présente invention a également pour objet les composés de formule (I) tels que décrits ci-dessus à titre de médicament.

10

Selon un autre aspect, l'invention a pour objet une composition pharmaceutique ou cosmétique caractérisée en ce qu'elle comprend dans un véhicule pharmaceutiquement ou cosmétiquement acceptable au moins un composé de formule (I).

15

Par "véhicule pharmaceutiquement ou cosmétiquement acceptable", on entend un véhicule adapté pour une utilisation en contact avec des cellules d'humains et d'animaux, sans toxicité, irritation, réponse allergique induite et similaires, et proportionné à un rapport avantage/risque raisonnable.

20

L'administration peut être effectuée par voie topique, entérale ou orale, parentérale ou oculaire. Parmi ces voies d'administration, la voie topique est particulièrement préférée.

25

Par voie topique, la composition pharmaceutique selon l'invention est plus particulièrement destinée au traitement de la peau et des muqueuses et peut se présenter sous forme liquide, pâteuse, ou solide, et plus particulièrement sous forme d'onguents, de crèmes, de laits, de pommades, de poudres, de tampons imbibés, de syndets, de solutions, de gels, de sprays, de mousses, de suspensions, 30 de sticks, de shampoings, ou de bases lavantes. Elle peut également se présenter sous forme de suspensions de microsphères ou nanosphères ou de vésicules lipidiques ou polymériques ou de patches polymériques ou gélifiés permettant une libération contrôlée.

35

Les composés sont utilisés par voie topique à une concentration généralement comprise entre 0,001% et 3% en poids, par rapport au poids total de la composition.

Pour une application cosmétique, la composition est de préférence sous forme d'une crème, d'un lait, d'une lotion, d'un gel, de microsphères ou nanosphères ou vésicules lipidiques ou polymériques, d'un savon, d'un shampoing.

5

Par voie entérale ou orale, la composition, peut se présenter sous forme de comprimés, de gélules, de dragées, de sirops, de suspensions, de solutions, de poudres, de granulés, d'émulsions, de suspensions de microsphères ou nanosphères ou de vésicules lipidiques ou polymériques permettant une libération contrôlée. Par voie parentérale, la composition peut se présenter sous forme de solutions ou suspensions pour perfusion ou pour injection.

10

Les composés selon l'invention sont généralement administrés à une dose journalière d'environ 0,01 mg/kg à 30 mg/kg de poids corporel, en 1 à 3 prises.

15

Les composés de l'invention sont utiles, seuls ou en mélange, pour la préparation d'une composition pharmaceutique destinée au traitement et/ou à la prévention de pathologies liées à une déficience de l'activation du récepteur RAR gamma.

20

L'invention concerne également une méthode de traitement thérapeutique ou cosmétique, comprenant l'administration d'une composition pharmaceutique ou cosmétique comprenant au moins un composé de formule (I), ledit composé exerçant une activité agoniste sélective du récepteur RAR gamma.

25

La composition pharmaceutique peut être plus particulièrement destinée à traiter une pathologie pour le traitement de laquelle une activité agoniste sélective du récepteur RAR gamma est désirée, plus particulièrement au niveau des tissus épithéliaux, de la peau et des os.

30

La composition est également utile pour le traitement d'une pathologie liée aux désordres de la différenciation et/ou de la prolifération cellulaire, en particulier dans le domaine de la dermatologie.

35

Plus particulièrement, elle est utile pour le traitement d'une pathologie liée à un désordre de la kératinisation.

Le traitement de l'acné est ainsi envisagé, notamment les acnés vulgaires, comédoniennes, polymorphes, les acnés nodulokystiques, conglobata, les acnés séniles, les acnés secondaires tels que l'acné solaire, médicamenteuse, professionnelle.

5

La composition pharmaceutique comprenant un composé de formule (I) est également utile pour traiter d'autres affections dermatologiques liées à un trouble de la kératinisation avec une composante inflammatoire et/ou immunoallergique et, notamment, toutes les formes de psoriasis, qu'il soit cutané, muqueux ou unguéal.

10

Un composé selon l'invention est également utile dans une composition cosmétique, pour lutter contre le vieillissement cutané, qu'il soit par exemple photoinduit ou chronologique.

15

La composition pharmaceutique ou cosmétique peut permettre en outre la régulation des pigmentations de la peau et le traitement des kératoses actiniques.

20

Dans toutes les applications envisagées, ledit composé peut être associé à un autre agent thérapeutique utile dans le traitement d'une pathologie liée aux désordres de la différenciation ou de la prolifération cellulaire.

25

Comme agents thérapeutiques utilisables dans les compositions selon l'invention, on peut citer les agents modulant la différenciation et/ou la prolifération et/ou la pigmentation cutanée tels que l'acide rétinoïque et ses isomères, le rétinol et ses esters, le rétinol, les rétinoïdes, les estrogènes, les antibactériens, les antibiotiques, les antiparasitaires, les antifongiques, les agents anti-inflammatoires stéroïdiens ou non-stéroïdiens, les agents anesthésiques, les agents antiprurigineux, les agents antiviraux, les agents kératolytiques, les agents anti-radicaux libres, les anti-séborrhéiques, les antipelliculaires, les anti-acnéiques, les agents pour lutter contre la chute des cheveux, la vitamine C et ses dérivés sous réserve, comme cela est indiqué précédemment, que les actifs soient sous forme solubilisée dans la composition selon l'invention.

30

Les exemples suivants illustrent l'invention, sans toutefois la limiter. Les produits de départ utilisés sont des produits connus ou préparés selon des modes opératoires connus.

35

Dans les exemples ci-après, les échantillons ont été analysés par RMN ^1H et RMN ^{13}C , HPLC/MS.

Exemple 1 : Synthèse de l'acide 4'-(3-hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique

a) 4'-Hydroxy-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle:

Dans un tricol, 10 g (31 mmol) de 3'-Bromo-4'-hydroxy-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle (préparé selon EP952974), 8,7 g (37 mmol) d'acide 6-(1,1,4,4-tetraméthyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalène) boronique (préparé selon EP952974), 34 mL (74,6 mmol) d'une solution aqueuse 2M de carbonate de potassium sont placés dans 200 mL de toluène, puis 1,8 g (1,55 mmol) de Tetrakis(triphénylphosphine)palladium sont additionnés sous azote. Le mélange réactionnel est chauffé pendant 24 h à 110 °C. Après refroidissement, la réaction est arrêtée par addition de 200 mL d'eau puis extraite à l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont rassemblées, lavées par une solution de chlorure de sodium saturée et séchées sur sulfate de magnésium. Les solvants sont évaporés puis le résidu est chromatographié sur gel de silice (Heptane/Acétate d'éthyle 80/20). 8g de 4'-Hydroxy-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle sont obtenus sous la forme d'un solide blanc (rendement = 60 %).

b) 4'-[4-(tert-Butyl-dimethyl-silanyloxy)-propoxy]-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle:

Dans un tricol, une solution de 2,1 g (4,9 mmol) de 4'-Hydroxy-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle est introduite dans 24 mL de diméthylformamide, puis 1.9 g (5,9 mmol) de césium carbonate, 1,33 mL (5,9 mmol) de tert-Butyl-(4-iodo-propoxy)-dimethyl-silane et 0,24 g (1,44mmol) de iodure de potassium sont additionnés. Le mélange réactionnel est chauffé pendant 6 h à 80°C. Après refroidissement, le mélange réactionnel est filtré pour éliminer le carbonate de césium (rinçage à l'acétate d'éthyle). Le filtrat est évaporé sous vide. Le brut obtenu sous forme d'huile est chromatographié sur gel de silice (Heptane/ Acétate d'éthyle: 95/5) pour donner 2,75 g de 4'-[4-(tert-Butyl-dimethyl-silanyloxy)-propoxy]-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle sous la forme d'une huile incolore (rendement = 93 %).

c) 4'-(3-Hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle:

Dans un tricol, 6,9 mL (6,9 mmol) d'une solution de fluorure de tétrabutylammonium (1 M) sont ajoutés sur une solution de 2,75 g (4,6 mmol) de 4'-[3-(tert-butyl-dimethyl-silanyloxy)-propoxy]-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle dans 20 mL de tétrahydrofurane. Le mélange réactionnel est agité pendant 4 h à température ambiante. La réaction est arrêtée par l'ajout de 20 mL d'eau puis extraite avec de l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont rassemblées, lavées par une solution aqueuse de chlorure de sodium saturée, et séchées sur sulfate de magnésium. Les solvants sont évaporés. Le brut obtenu sous forme d'huile est chromatographié sur gel de silice (Heptane/ Acétate d'éthyle : 70/30) pour donner 2g de 4'-(3-Hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle sous la forme d'une huile incolore (rendement = 89 %).

d) Acide 4'-(3-Hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique:

2,05 mL (2,05 mmol) d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (1 M) sont ajoutés sur une solution de 0,20 g (0,41 mmol) de 4'-(3-Hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle dans 5 mL de tétrahydrofurane. Le mélange réactionnel est agité pendant 48 h en chauffant à 40 °C. On place le mélange réactionnel sous flux d'azote afin d'éliminer le tétrahydrofurane puis on ajoute 2,5 mL (2,5 mmol) d'une solution d'acide chlorhydrique (1 M). Le produit précipite sous forme d'un solide blanc. Après filtration, le produit est lavé deux fois par 5 mL d'éther diéthylique puis placé à l'étuve sous vide pendant une nuit. 0,17 g d'acide 4'-(3-Hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique sont obtenus (solide blanc, pf=317°C, rendement = 90 %).

RMN ¹H (DMSO, 400 MHz) : 1,26 (s, 12H); 1,6 (s, 4H); 1,90 (t, J = 6,2 Hz, 2H); 3,8 (t, J = 6,0 Hz, 2H); 4,09 (t, J = 6,3 Hz, 2H); 7,05 (d, J = 9,2 Hz, 1H); 7,25-7,29 (m, 2H); 7,50-7,52 (m, 5H); 8,01 (d, J = 8,2 Hz, 2H).

Exemple 2 : Synthèse de l'acide 4'-(4-hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique

a) 4'-[4-(tert-butyl-dimethyl-silanyloxy)-butoxy]-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle:

Dans un tricol, une solution de 2,1 g (4,9 mmol) de 4'-Hydroxy-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle (préparé selon exemple 1, étape a) est introduite dans 24 mL de diméthylformamide, puis 1.9 g (5,9 mmol) de carbonate de césium et 1.53 mL (5,9 mmol) de tert-Butyl-(4-iodo-butoxy)-dimethyl-silane sont additionnés. Le mélange réactionnel est chauffé pendant 6 h à 80 °C. Après refroidissement, le mélange réactionnel est filtré pour éliminer le carbonate de césium (rinçage à l'acétate d'éthyle). Le filtrat est évaporé sous vide. Le brut obtenu sous forme d'huile est chromatographié sur gel de silice (Heptane/ Acétate d'éthyle : 95/5) pour donner 2,8 g de 4'-[4-(tert-Butyl-dimethyl-silanyloxy)-butoxy]-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle sous la forme d'une huile incolore (rendement = 93 %).

15

b) 4'-(4-Hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle:

6,8 mL (6,8 mmol) d'une solution de fluorure de tétrabutylammonium (1 M) sont ajoutés sur une solution de 2,8 g (4,5 mmol) de 4'-[4-(tert-Butyl-dimethyl-silanyloxy)-butoxy]-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle dans 20 mL de tétrahydrofurane. Le mélange réactionnel est agité pendant 4 h à température ambiante. La réaction est arrêtée par l'ajout de 20 mL d'eau puis extraite avec de l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont rassemblées, lavées par une solution aqueuse de chlorure de sodium saturée, et séchées sur sulfate de magnésium. Les solvants sont évaporés. Le brut obtenu sous forme d'huile est chromatographié sur gel de silice (Heptane/ Acétate d'éthyle : 70/30) pour donner 2,10 g de 4'-(4-Hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle sous la forme d'une huile incolore (rendement = 93 %).

20

c) Acide 4'-(4-Hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique:

2 mL (2,0 mmol) d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (1 M) sont ajoutés sur une solution de 0,20 g (0,40 mmol) de 4'-(4-Hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylate d'éthyle dans 8 mL de tétrahydrofurane. Le mélange réactionnel est agité pendant 48 h en chauffant à 40 °C. On place le mélange réactionnel sous flux d'azote afin d'éliminer

25

30

le tétrahydrofurane puis on ajoute 2,4 mL (2,4 mmol) d'une solution d'acide chlorhydrique (1 M). Le produit précipite sous forme d'un solide blanc. Après filtration, le produit est lavé deux fois par 5 mL d'éther diéthylique puis séché à l'étuve sous vide pendant une nuit. 0,17 g d'acide 4'-(4-Hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique sont obtenus (solide blanc, pf 235 °C, rendement = 90 %).

RMN ¹H (DMSO, 400 MHz) : 1,24 (s, 12H); 1,56 (m, 2H); 1,64 (s, 4H); 1,78 (m, 2H); 3,48 (t, J = 6,4 Hz, 2H); 3,99 (t, J = 6,5 Hz, 2H); 7,60 (d, J = 8,5Hz, 1H); 7,24-7,27 (m, 2H); 7,46-7,53 (m, 5H); 8,01 (d, J = 8,3 Hz, 2H).

Exemple 3 : Test de transactivation

a) Principe du test :

L'activation des récepteurs par un agoniste (activateur) dans des cellules HeLa conduit à l'expression d'un gène reporter, la luciférase, qui, en présence d'un substrat génère de la lumière. On peut donc mesurer l'activation des récepteurs en quantifiant la luminescence produite après incubation des cellules en présence d'un antagoniste de référence. Les produits activateurs déplacent l'antagoniste de son site permettant ainsi l'activation du récepteur. La mesure de l'activité se fait par la quantification de l'augmentation de la lumière produite. Cette mesure permet de déterminer l'activité activatrice du composé utile dans l'invention.

Dans cette étude, est déterminée une constante qui représente l'affinité de la molécule pour le récepteur. Cette valeur pouvant fluctuer selon l'activité basale et l'expression du récepteur, on la désigne Kd apparent (KdApp).

Pour déterminer cette constante, des « courbes croisées » du produit à tester (par exemple l'acide 4'-(3-hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique ou l'acide 4'-(4-hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique), contre un antagoniste de référence autrement nommé ligand de référence, l'acide 4-(5,5-Dimethyl-8-p-tolyl-5,6-dihydro-naphthalen-2-ylethynyl)-benzoïque, sont réalisées. Le produit à tester est utilisé à 10 concentrations et l'antagoniste de référence à 7 concentrations. Dans chaque puit (d'une plaque à 96 puits), les cellules sont en contact d'une concentration du produit à tester et d'une concentration de l'antagoniste de référence.

Des mesures sont également réalisées pour les témoins agoniste total autrement nommé témoin 100% (l'acide 4-[2-(5,5,8,8 tetramethyl-5,6,7,8 tetrahydronaphtalene-2-yl)propenyl]-benzoïque) et agoniste inverse autrement
 5 nommé témoin 0%, (l'acide 4-[(E)-3-[4-(4-tert-Butyl-phenyl)-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl]-3-oxo-propenyl]-benzoïque).

Ces courbes croisées permettent de déterminer les AC50 (concentration à laquelle on observe 50% d'activation du récepteur) du ligand de référence à différentes
 10 concentrations de produit à tester. Ces AC50 sont utilisées pour calculer la régression de Schild en traçant une droite répondant à l'équation de Schild (« quantitation in receptor pharmacology » Terry P.Kenakin, Receptors and Channels, 2001,7, 371-385).

15 Dans le cas d'un agoniste, l'AC50 est calculée en traçant la courbe du produit à la concentration du ligand de référence donnant 80% d'activation. Le pourcentage d'activation qui correspond au niveau maximum d'activité obtenue est également mesuré.

20 b) Matériels et Méthode :

Les lignées cellulaires HeLa utilisées sont des transfectants stables contenant les plasmides ERE-βGlob-Luc-SV-Neo (gène reporter) et RAR (α, β, γ) ER-DBD-puro. Ces cellules sontensemencées en plaques 96 puits à raison de 10
 25 000 cellules par puit dans 100μl de milieu DMEM sans rouge de phénol et supplémenté par 10% de sérum de veau délipidé. Les plaques sont ensuite incubées à 37°C, 7% CO₂ pendant 4 heures.

Les différentes dilutions du produit à tester, du ligand de référence (l'acide 4-(5,5-dimethyl-8-p-tolyl-5,6-dihydro-naphtalen-2-ylethynyl)-benzoïque), du témoin
 30 100% (l'acide 4-[2-(5,5,8,8 tetramethyl-5,6,7,8 tetrahydronaphtalene-2-yl)propenyl]-benzoïque 100 nM) et du témoin 0% (l'acide 4-[(E)-3-[4-(4-tert-Butyl-phenyl)-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl]-3-oxo-propenyl]-benzoïque 500 nM) sont rajoutées à raison de 5 μl par puits. Les plaques sont ensuite incubées 18 heures à 37 °C, 7% CO₂.

Le milieu de culture est éliminé par retournement et 100 µl d'un mélange 1:1 PBS (solution tampon de phosphate)/Luciférine est ajouté à chaque puit. Après 5 minutes, les plaques sont lues par le lecteur de luminescence.

5

c) Résultats :

Les valeurs des constantes Kd apparent sont indiquées dans le tableau ci-après. Ces valeurs sont comparées à celles des composés de la demande de brevet WO 99/10308 présentant les meilleures activités

	RAR alpha Kdapp (nM)	RAR bêta Kdapp (nM)	RAR gamma Kdapp (nM)
Composé de l'exemple 1	15	4	0,25
Composé de l'exemple 2	4	1	0,03
Composés de WO 99/10308 :			
Acide 3''-methyl-2'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-[1,1' ;4',1'']terphenyl-4''-carboxylique (Exemple41)	2	1	0,25
Acide 3''-hydroxy-2'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-[1,1' ;4',1'']terphenyl-4''-carboxylique (Exemple46)	2	1	0,25
Acide 2''-methoxy-2'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-[1,1' ;4',1'']terphenyl-4''-carboxylique (Exemple44)	4	2	0,5
Acide 2''-hydroxy-2'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-[1,1' ;4',1'']terphenyl-4''-carboxylique (Exemple42)	8	4	1
Acide 6-[2-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-yl]-nicotinique (Exemple47)	4	1	1
Acide 2'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-[1,1' ;4',1'']terphenyl-4''-carboxylique (Exemple14)	2	1	1

Les résultats obtenus avec l'acide 4'-(3-hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique, et l'acide 4'-(4-hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique montrent bien une meilleure sélectivité de ces composés pour le sous-type gamma du récepteur RAR en comparaison avec les deux autres sous-types RARalpha et RARbêta. Ils montrent également une meilleure activité et une meilleure sélectivité en comparaison avec les composés RAR les plus actifs décrits dans la demande de brevet WO 99/10308.

Ces composés sont donc des agonistes ou activateurs sélectifs du récepteur RARgamma.

Exemple 4 : Exemples de formulations

Dans cet exemple, on a illustré diverses formulations concrètes à base des composés selon l'invention.

A- VOIE ORALE

(a) Comprimé de 0,2 g

	- Acide 4'-(3-hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique	0,001 g
20	- Amidon	0,114 g
	- Phosphate bicalcique	0,020 g
	- Silice	0,020 g
	- Lactose	0,030 g
	- Talc	0,010 g
25	- Stéarate de magnésium	0,005 g

(b) Suspension buvable en ampoules de 5 ml

	- Acide 4'-(4-hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique	0,001 g
30	- Glycérine	0,500 g
	- Sorbitol à 70%	0,500 g
	- Saccharinate de sodium	0,010 g
	- Parahydroxybenzoate de méthyle	0,040 g
	- Arome	qs
35	- Eau purifiée	qsp 5 ml

B- VOIE PARENTERALE

(a) *Composition*

- | | | |
|---|---|--------|
| 5 | - Acide 4'-(3-hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique | 0,05 % |
| | - Polyéthylène glycol | 20% |
| | - Solution de NaCl à 0.9% | qs 100 |

10

(b) Composition de cyclodextrine injectable

- | | | |
|----|--|-------------|
| - | Acide 4'-(4-hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique | 0,1mg |
| | β- cyclodextrine | 0,10 g |
| 15 | Eau pour injectable | qsp.10,00 g |

C- VOIE TOPIQUE

(a) *Onguent*


- | | | |
|----|--|-----------|
| - | Acide 4'-(3-hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro- | |
| 20 | naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique | 0,300 g |
| | - Vaseline blanche codex | qsp 100 g |

(b) Crème Eau-dans-Huile non ionique

- | | | |
|----|---|-----------|
| | - Acide 4'-(4-hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro- | |
| 25 | naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique | 0,100 g |
| | - Mélange d'alcools de lanoline émulsifs, de cires et d'huiles ("Eucerine | |
| | anhydre" vendu par BDF) | 39,900 g |
| | - Parahydroxybenzoate de méthyle | 0,075 g |
| | - Parahydroxybenzoate de propyle | 0,075 g |
| 30 | - Eau déminéralisée stérile | qsp 100 g |

(c) Lotion

- | | | |
|----|--|----------|
| 35 | - Acide 4'-(4-hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique | 0,100 g |
| | - Polyéthylène glycol (PEG 400) | 69,900 g |
| | - Ethanol à 95% | 30,000 g |

REVENDICATIONS**1. Composés biphényliques de formule (I)**

dans laquelle n est un entier compris entre 1 et 3 inclus, ainsi que les sels des composés de formule (I).

2. Composés selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il est choisi parmi l'un des composés suivants :

- l'acide 4'-(3-hydroxy-propoxy)-3'-(5,5,8,8-tetraméthyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique ; et
- l'acide 4'-(4-hydroxy-butoxy)-3'-(5,5,8,8-tetraméthyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphtalen-2-yl)-biphenyl-4-carboxylique.

3. Composition pharmaceutique ou cosmétique caractérisée en ce qu'elle comprend dans un véhicule pharmaceutiquement ou cosmétiquement acceptable au moins un composé de formule (I) selon la revendication 1 ou 2.**4. Composition selon la revendication 3, caractérisée en ce qu'elle est sous forme adaptée pour une administration par voie topique.****5. Composition selon la revendication 4, caractérisée en ce que la quantité de composé de formule (I) est comprise entre 0,001 % et 3% en poids par rapport au poids total de la composition.**

6. Utilisation d'un composé de formule (I) tel que défini dans la revendication 1 ou 2 pour la préparation d'une composition pharmaceutique destinée à la prévention et/ou au traitement de pathologies liées à une déficience de l'activation du récepteur RAR gamma.


7. Utilisation selon la revendication 6, pour le traitement d'une pathologie liée aux désordres de la différenciation et/ou de la prolifération cellulaire.

8. Utilisation selon la revendication 6 ou 7 pour le traitement de l'acné.


9. Utilisation selon la revendication 6 ou 7, pour le traitement du psoriasis.

10. Procédé de préparation d'un composé de formule (I) selon la revendication 1 ou 2, comprenant les étapes suivantes :


i) la réaction de Suzuki entre le composé de formule 1




et le composé de formule 2




pour conduire au composé de formule 3,




ii) étherification du composé de formule 3 avec le composé de formule 4,



dans laquelle X représente un groupe partant permettant une substitution nucléophile, R représente un hydrogène ou un groupement protecteur, et n est nombre entier compris entre 1 et 3, inclus pour conduire au composé de formule 5,



iv) la saponification de la fonction ester du composé obtenu à l'étape précédente, et dans le cas où le groupement R est différent de H, une étape iii) supplémentaire de déprotection de la fonction alcool du composé de formule 5 effectuée entre les étapes ii) et iv) pour conduire au composé de formule 6 :



11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que X est un halogène.

12. Procédé selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce que R est un groupement protecteur choisi parmi acétyle et diméthyl-tert-butylsilyle.

1/1




Figure 1

