



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК


(19) **SU** (11) **1136808** **A**

4(51) A 61 H 39/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 3557838/28—13
(22) 10.01.83
(46) 30.01.85. Бюл. № 4
(72) Т. А. Соболева и А. Ф. Жаркин
(71) Волгоградский государственный медицинский институт
(53) 613.647(088.8)
(56) И. Стояновский Д. Справочник по иглоукалыванию и прижиганию, Кишинев, «Карта Молдовеска», 1977, с. 230

(54) (57) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ путем воздействия на точки акупунктуры, отличающийся тем, что, с целью исключения побочных явлений, дополнительно воздействуют микроиглами на точки акупунктуры ушной раковины ТА-23, ТА-28, ТА-55 по 5-10 сут, а на корпоральные точки воздействуют тормозным методом первым вариантом в течение трех курсов с перерывами от 7 до 14 дней между первым и вторым и от 20 до 60 дней между вторым и третьим курсами.

(19) **SU** (11) **1136808** **A**

Изобретение относится к медицине, а именно к рефлексотерапии.

Известен способ лечения больных с климактерическим синдромом путем воздействия на точки акупунктуры [1].

Недостаток этого способа — возникновение побочных явлений.

Цель изобретения — исключение побочных явлений.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу лечения больных климактерическим синдромом путем воздействия на точки акупунктуры дополнительно воздействуют микроиглами на точки акупунктуры ушной раковины ТА-23, ТА-28, ТА-55 по 5-10 сут, а на корпоральные точки воздействуют тормозным методом первым вариантом в течение трех курсов с перерывами 7—14 дней между первым и вторым и 20—60 дней между вторым и третьим курсами.

Способ осуществляют следующим образом.

Кнопочные микроиглы вводят в аурикулярные точки сроком на 5-10 сут одновременно проводят курсовую иглотерапию в корпоральные точки по схеме.

1 сеанс CI—11, E—36,

2. сеанс: T—14, Y—11, CI—15.

3 сеанс: MC—6, PP—9, P—6.

4 сеанс: CI—10, CI—11, E—36.

5 сеанс: T—20 и, отступая от нее кпереди, кзади, вправо и влево на 1 см, вводят четыре иглы.

6 сеанс: CI—II, E—36,

7 сеанс: T—14, Y—II, CI—15,

8 сеанс: MC—6, PP—9, P—6.

9 сеанс: CI—10, CI—II, E—36.

10 сеанс: T—20, и отступая от нее кпереди, кзади, вправо и влево на 1 см, вводят четыре иглы.

11 сеанс: T—14, I—II, CI—15.

12 сеанс: CI—II, E—36.

Сеансы ежедневные, метод тормозной, вариант первый.

Второй курс повторяется через 7—14 суток, третий — через 20—60 сут после второго. Второй и третий курсы состоят из 10. сеансов с той же очередностью и сочетанием точек, что и в первом. Отличием является лишь 10-й последний сеанс, состоящий из воздействия на точки CI—II и E—36.

Рефлексотерапия по методу обеспечивает стойкий положительный эффект у 78,5% больных. Улучшение общего состояния отмечалось в процессе проведения первого курса лечения по предложенному методу после третьего сеанса, а исчезновение клинических симптомов — после второго курса. Нормализация функции вегетативной нервной системы и стойкое выздоровление с прослеженной продолжительностью более трех лет наступила после третьего курса. Лечение не сопровождалось ни осложнениями, ни побочными явлениями.

По прототипу выздоровление получено в 15%, улучшение общего самочувствия наступало после 6—7 сеансов. После второго курса наблюдалось исчезновение части клинических симптомов. Длительность ремиссии в пределах 12 месяцев, после чего вновь появлялись признаки климактерического синдрома в прежней силе.

Редактор И. Ковальчук
Заказ 10353/3

Составитель Н. Арцыбашева

Техред И. Верес

Тираж 722

Корректор Г. Решетник

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж—35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4