(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102423480 A
(43)申请公布日 2012.04.25

(21)申请号 201110433963.7

(22)申请日 2011.12.09

(71)申请人 崔皓
地址 264400 山东省文登市米山东路西 3 号威海市文登中心医院

(72)发明人 崔皓 宁同波 孙孝红

(51)Int.Cl.
A61K 36/9068(2006.01)
A61P 1/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54)发明名称

用于胃下垂的枳白黄香仁汤

(57)摘要

本发明涉及中药配方领域，具体地说是一种用于胃下垂的枳白黄香仁汤，采用枳壳、枳实、白扁豆、白术、炙黄芪、黄精、降香、香附、土木香、丁香、柏子仁、胡黄连、升麻、生姜、延胡孛、吴茱萸、炙甘草、龙眼肉为原料药，用水浸泡，煎熬后去渣得滤液，其技术特征是，原料药组成的重量百分比计为，枳壳 5 ～ 8%、枳实 5 ～ 8%、白扁豆 7 ～ 10%、白术 4 ～ 6%、炙黄芪 12 ～ 16%、黄精 4 ～ 6%、降香 6 ～ 9%、香附 2 ～ 5%、土木香 2 ～ 4%、丁香 1 ～ 3%、柏子仁 2 ～ 5%、胡黄连 4 ～ 7%、升麻 4 ～ 6%、生姜 4 ～ 6%、延胡孛 5 ～ 8%、吴茱萸 1 ～ 3%、炙甘草 4 ～ 7%、龙眼肉 5 ～ 8%。本发明治疗胃下垂疗效高，无毒副作用，患者易于接受，具有补中益气固摄，疏肝行气和胃，化痰解郁消食等功效，适用于早、中、晚各期胃下垂。

CN 102423480 A

1. 一种用于胃下垂的枳白黄香仁汤，其特征是：采用枳壳、枳实、白扁豆、白术、炙黄芪、黄精、降香、香附、土木香、丁香、柏子仁、胡黄连、升麻、生姜、延胡孛、吴茱萸、炙甘草、龙眼肉为原料药，用水浸泡，煎熬后去渣得滤液，原料药组成的重量百分比计为，枳壳 5 ～ 8%、枳实 5 ～ 8%、白扁豆 7 ～ 10%、白术 4 ～ 6%、炙黄芪 12 ～ 16%、黄精 4 ～ 6%、降香 6 ～ 9%、香附 2 ～ 5%、土木香 2 ～ 4%、丁香 1 ～ 3%、柏子仁 2 ～ 5%、胡黄连 4 ～ 7%、升麻 4 ～ 6%、生姜 4 ～ 6%、延胡孛 5 ～ 8%、吴茱萸 1 ～ 3%、炙甘草 4 ～ 7%、龙眼肉 5 ～ 8%。

用于胃下垂的枳白黄香仁汤

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中成药制剂，具体地说是一种用于胃下垂的枳白黄香仁汤。

背景技术

[0002] 众所周知，胃下垂是指以胃小弯角切迹低于髂山脊联线以下，十二指肠球部向左偏移为主要体征的一种病症。以 30 ～ 50 岁多见，女性多于男性，临床上有一系列消化道症状如腹胀、上腹疼痛、食欲不振、消化不良、便秘、恶心呕吐、振水声等。由于胃下垂一系列症状，长期折磨患者，使其精神负担过重，易产生失眠、头痛等精神症状，严重折磨着患者身心健康，为临床常见病。西医多采用对症及适时手术方法，不仅效果欠佳且患者难于接受。

发明内容

[0003] 本发明的目的就是为了克服上述现有的技术不足，提供一种成本低，治疗胃下垂疗效高，无毒副作用，患者容易接受，具有补中益气固摄，疏肝行气和胃，化痰解郁消食等功效，适用于早、中、晚各期胃下垂。

[0004] 本发明解决上述技术问题采用的技术方案是：一种用于胃下垂的枳白黄香仁汤，采用枳壳、枳实、白扁豆、白术、炙黄芪、黄精、降香、香附、土木香、丁香、柏子仁、胡黄连、升麻、生姜、延胡孛、吴茱萸、炙甘草、龙眼肉为原料药，用水浸泡，煎熬后去渣得滤液，其技术特征是，原料药组成的重量百分比计为，枳壳 5 ～ 8%、枳实 5 ～ 8%、白扁豆 7 ～ 10%、白术 4 ～ 6%、炙黄芪 12 ～ 16%、黄精 4 ～ 6%、降香 6 ～ 9%、香附 2 ～ 5%、土木香 2 ～ 4%、丁香 1 ～ 3%、柏子仁 2 ～ 5%、胡黄连 4 ～ 7%、升麻 4 ～ 6%、生姜 4 ～ 6%、延胡孛 5 ～ 8%、吴茱萸 1 ～ 3%、炙甘草 4 ～ 7%、龙眼肉 5 ～ 8%。

[0005] 本发明的效果是，治疗胃下垂疗效高，无毒副作用，患者易于接受，具有补中益气固摄，疏肝行气和胃，化痰解郁消食等功效，适用于早、中、晚各期胃下垂。

具体实施方式

[0006] 下面结合实施例对本发明作进一步的描述：

[0007] 实施例 1：采用枳壳、枳实、白扁豆、白术、炙黄芪、黄精、降香、香附、土木香、丁香、柏子仁、胡黄连、升麻、生姜、延胡孛、吴茱萸、炙甘草、龙眼肉为原料药制备而成。其组分（重量%）每付为枳壳 6、枳实 6、白扁豆 9、白术 6、炙黄芪 14、黄精 5、降香 8、香附 3、土木香 3、丁香 2、柏子仁 3、胡黄连 5、升麻 6、生姜 5、延胡孛 6、吴茱萸 2、炙甘草 5、龙眼肉 6。取上述 18 味原料药总重量为 173 克，先将丁香捣碎，在室温下将 18 味中草药加水至 900-1000ml，浸泡 4 ～ 5 小时，然后煎熬 80 ～ 90 分钟，去渣得滤液 200ml 左右，药渣再加水 200 ～ 300ml，煎熬 30 ～ 40 分钟，去渣得滤液 100ml，共得 300ml 左右药汁，即制得枳白黄香仁汤，装入无菌玻璃瓶内，密封瓶盖备用，每日 1 剂分 2 次口服，每次空腹服 150ml。同时配合运动疗法，仰卧起坐每日 1-2 次，每次 10-20 分钟，饭后 1-2 小时进行，口服枳白黄香仁汤 15 天为一疗程，休息 3-5 日再进行下一疗程，一般 3 个疗程。

[0008] 本发明主药枳壳化学成为酸橙果皮含挥发油及黄酮类成分。酸橙煎剂对家兔离体和在本子宫都有显著兴奋作用，能使子宫收缩力、紧张度增加，甚至出现强直性收缩。胃瘘慢性实验和肠瘘慢性实验证明对机体完整的胃肠运动具有一定的兴奋作用，能使胃肠运动收缩节律增强而有力。性味苦、辛、酸温，归脾、胃经。具有理气宽中，行滞消胀功效，用于胸胁、气滞、胀满疼痛，食积不化，痰饮内停；胃下垂、脱肛、子宫脱垂。枳实性味苦、辛、酸、温、归脾、胃经。具有破气消积，化痰消痞功效，用于积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻胸，结胸、胃下垂、脱肛、子宫脱垂。白扁豆性味甘、微温归脾、胃经。具有健脾化湿、和中消暑功效，用于脾胃虚弱，食欲不振，大便溏泻，白带过多，暑湿吐泻，胸闷腹胀。白术性味苦、甘、温、归脾、胃经。具有健脾益气、燥湿利水、止汗、安胎功效。用于脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸、水肿、自汗，胎动不安。炙黄芪性味甘、温、归肺、脾经。具有益气补中功效，用于气虚乏力，食少便溏。黄精性味甘、平、归脾、肺、胃经。具有补气养阴，健脾、润肺，益肾功效。用于脾胃虚弱，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热清渴。降香性味辛、温、归肝、脾经，具有行气活血，止痛、止血功效，用于脘腹疼痛，肝郁胁痛，胸脾刺痛，跌打损伤，外伤出血。香附性味辛、微苦、微甘、平。归肝、脾、三焦经。具有行气解郁，调经止痛功效，用于肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀痛，消化不良，胸脘痞闷，寒疝腹痛，乳房胀痛，月经不调，经闭痛经。土木香性味辛、苦、温，归肝、脾经。具有健脾和胃，调气解郁，止痛安胎功效，用于胸胁、脘腹胀痛，呕吐泻痢，胸胁挫伤，岔气作痛，胎动不安。丁香性味辛、温、归脾、胃、肺、肾经。具有温中降逆，补肾助阳功效。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。柏子仁性味甘、平，归心、肾、大肠经。具有养心安神，止汗、润肠功效，用于虚烦失眠，心悸怔忡，阴虚盗汗，肠燥便秘。胡黄连性味苦、寒，归肝、胃、大肠经。具有清湿热，除骨蒸，消疳热功效，用于湿热泻痢，黄疸、痔瘘、骨蒸潮热等。升麻性味辛、微甘、微寒，归肺、脾、胃、大肠经。具有发表透疹，清热解暑，升举阳气功效，用于风热头痛，齿痛、口疮、咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑，脱肛、子宫脱垂。生姜性味辛、微温，归肺、脾、胃经。具有解表散寒，温中止呕，化痰止咳功效，用于风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽。延胡索性味辛、苦、温，归肝，脾经。具有活血利气止痛功效，用于胸胁，脘腹疼痛，经闭痛经，产生瘀阻，跌打肿痛。吴茱萸性味辛、苦、热，有小毒，归肝、脾、胃、肾经。具有散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻功效。用于阙阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，正更泄泻等。炙甘草性味甘、平，归心、肺、脾、胃经。具有补脾和胃，益气复脉功效。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代。龙眼肉性味甘、温，归心脾经。具有补益心脾，养血安神功效。用于气血不足，心悸怔忡，健忘失眠，血虚萎黄。18味中草药巧妙组方，合理配伍，药物相使配伍，辅药可以提高主药功效；相须配伍，提高性能，功效相同药物疗效；相畏配伍，使其药物毒副作用减轻或消失。药物相互协调作用，共奏胃下垂之特效。

[0009] 本发明各原料还可按下表所列比例（重量百分比）混合的实施例来实现，其加工工艺与实施例 1 相同

[0010]

实施例	枳壳	枳实	白扁豆	白术	炙黄芪	黄精	降香	香附	土木香	丁香	柏子仁	胡黄连	升麻	生姜	延胡孛	吴茱萸	炙甘草	龙眼肉
二	6	8	7	6	12	6	6	5	2	3	2	7	4	6	5	3	4	8
三	8	5	10	4	16	4	9	2	4	1	5	4	6	4	8	1	4	5
四	5	7	8	5	13	5	7	4	3	2	4	6	5	5	6	2	7	6
五	7	6	9	5	14	5	8	3	3	2	3	5	6	5	7	2	5	5

[0011] 下面结合我院，即山东省威海市文登中心医院进行的临床试验对本发明作进一步、详细地描述：

[0012] 1、病例选择：所选病例均结合临床症状体征，经 X 线胃肠饮餐检查确定为胃下垂患者，属于中医“胃缓”范畴 66 例，男 27 例，女 39 例；年龄 32 至 59 岁；早期 29 例，中期 23 例，晚期 14 例。

[0013] 2、治疗方法：每日 1 剂分 2 次口服，早晚各一次，每次空腹服 150ml。同时配合运动疗法，仰卧起坐每日 1-2 次，每次 10-20 分钟，饭后 1-2 小时进行，口服枳白黄香仁汤 15 天为一疗程，休息 3-5 日再进行下一疗程，治疗 3 个疗程。

[0014] 3、疗效评价：

[0015] 痊愈：临床症状体征消失，X 线复查：胃下极回升至正常位置。

[0016] 显效：临床症状体征明显减轻，X 线复查：胃下极回升 4 厘米以上。

[0017] 有效：临床症状体征减轻，X 线复查：胃下极回升 1 厘米以上。

[0018] 无效：临床症状体征无改善，X 线复查胃下极位置无改变。

[0019] 4、治疗效果：使用本发明 66 例，治疗 3 个疗程，应用疗效评价标准进行治疗效果评价：痊愈 18 例；显效 29 例；有效 10 例；无效 9 例，总有效率为 86.4%。