



(19) **RU** <sup>(11)</sup> **2 174 976** <sup>(13)</sup> **C2**  
(51) МПК<sup>7</sup> **C 07 D 207/12, A 61 K 31/40, A 61 P 1/00**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

(21), (22) Заявка: 96116925/04, 23.08.1996  
(24) Дата начала действия патента: 23.08.1996  
(30) Приоритет: 26.08.1995 DE 19531464.6  
(43) Дата публикации заявки: 10.12.1998  
(46) Дата публикации: 20.10.2001  
(56) Ссылки: DE 4215213 A1, 11.11.1993. DE 4034785, 07.05.1992. SU 1342412 A3, 30.09.1987.  
(98) Адрес для переписки:  
129010, Москва, ул. Большая Спасская 25,  
стр.3, ООО "Юридическая фирма Городисский  
и Партнеры", Лебедевой Н.Г.

(71) Заявитель:  
МЕРК ПАТЕНТ ГМБХ (DE)  
(72) Изобретатель: Инге ШТЕЙН (DE),  
Хольгер БЕЕРЕС (DE), Клаус ББЕШМАНН  
(DE), Штеффен НОЙЕНФЕЛЬД (DE), Эндрю  
БАРБЕР (GB)  
(73) Патентообладатель:  
МЕРК ПАТЕНТ ГМБХ (DE)  
(74) Патентный поверенный:  
Лебедева Наталья Георгиевна

(54) N-МЕТИЛ-N-/(1S-)-1-ФЕНИЛ-2-((3S)-3-ГИДРОКСИПИРРОЛИДИН-1-ИЛ)-ЭТИЛ-/2,2-ДИФЕНИЛАЦЕТАМИД

(57)  
Изобретение относится к  
N-метил-N-/(1S-)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипи  
рролидин-1-ил)-этил-/2,2-дифенилацетамиду,  
который может быть использован при лечении  
воспалительных заболеваний кишечника.  
Соединение получают взаимодействием  
охлажденного от - 5 до 10°C раствора  
1-/(1S)-3-гидроксипирролидин-1-ил-(2-S)-2-мет  
иламино-2-фенилэтана в растворителе с

дифенилацетилхлоридом при молярном  
соотношении исходных реагентов 1:0,75-1:1,65  
соответственно и при молярном соотношении  
исходных реагентов и растворителя (0,8-1,2):  
(0,9-1,3): (14-22). Полученный после реакции  
сырой продукт перекристаллизовывают в  
теплом состоянии из растворителя.  
T<sub>пл</sub> 221-226°C. Соединение, полученное  
таким образом, является термодинамически  
устойчивым. 2 с. п. ф-лы.



RUSSIAN AGENCY  
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(19) **RU** <sup>(11)</sup> **2 174 976** <sup>(13)</sup> **C2**  
(51) Int. Cl.<sup>7</sup> **C 07 D 207/12, A 61 K 31/40,**  
**A 61 P 1/00**

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 96116925/04, 23.08.1996  
(24) Effective date for property rights: 23.08.1996  
(30) Priority: 26.08.1995 DE 19531464.6  
(43) Application published: 10.12.1998  
(46) Date of publication: 20.10.2001  
(98) Mail address:  
129010, Moskva, ul. Bol'shaja Spasskaja 25,  
str.3, OOO "Juridicheskaja firma Gorodisskij  
i Partnery", Lebedevoj N.G.

(71) Applicant:  
MERK PATENT GMBKh (DE)  
(72) Inventor: Inge ShTEJN (DE),  
Khol'ger BEERES (DE), Klaus BBEShMANN  
(DE), Shteffen NOJENFEL'D (DE), Ehndrju  
BARBER (GB)  
(73) Proprietor:  
MERK PATENT GMBKh (DE)  
(74) Representative:  
Lebedeva Natal'ja Georgievna

(54) **N-METHYL-N-[(1S)-1-PHENYL-2((3S)-3-HYDROXYPYRROLIDINE-1-Y1)-ETHYL]-2,2-DIPHENYLACETAMIDE**

(57) Abstract:

FIELD: organic chemistry. SUBSTANCE:  
invention relates to  
N-methyl-N-[(1S)-1-phenyl-2-  
((3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-yl)-ethyl]-2,2-  
diphenylacetamide that can be used in  
treatment of patients with intestine  
inflammatory diseases. Compounds is  
synthesized by interaction of  
1-[(1S)-3-hydroxypyrrolidine-1-yl]  
-(2S)-2-methylamino-2- phenylethane solution  
cooled from -5 C to 10 C with diphenyl-

-acetyl chloride in solvent in molar ratio  
of the parent reagent from 1:0.75 to 1:1.65,  
respectively, and in molar ratio of the  
parent reagents to solvent =  
(0.8-1.2):(0.9-1.3):(14-22). Crude product  
synthesized by this reaction is  
recrystallized in its warm state from  
solvent. Melting point of synthesized  
compound is 221-226 C. Compound synthesized  
by the proposed method is resistant  
thermodynamically. EFFECT: improved method  
of synthesis, valuable properties. 2 cl, 10 ex

Изобретение относится к новой термостойкой форме N-метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин 2-ил)-этил]-2,2-дифенилацетамида и к способу получения и выделения этого соединения в этой новой форме, а также к применению его для изготовления лекарственных средств, которые содержат это соединение и/или одну из его физиологически не вызывающих опасений солей.

Соединения с этой структурной формулой, а также вышеуказанное соединение и соответствующий способ его получения описаны в выложенном описании изобретения (выкладке) ФРГ 42 15 213 A1.

Было найдено, что уже из выкладки ФРГ 42 15 213 A1 известно соединение N-метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин 1-ил)-этил]-2,2-дифенилацетамид, особенно эффективное фармацевтическое соединение, которое в качестве лекарственного средства особенно пригодно для лечения воспалительных заболеваний кишечника. В частности, это соединение применяют при этом показании и оно эффективно, так как оно одновременно смягчает связанные с этим заболеванием боли и в случае угрожающей или вызванной воспалительным заболеванием кишечника острой кишечной непроходимости снова нормализует или приводит в действие моторику кишечника, не вызывая осязаемых побочных действий.

Опыты по получению известного по способу из выкладки ФРГ 42 15 213 A1 соединения показали, что это соединение получают в различных формах.

Поэтому задачей изобретения было получение N-метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин 1-ил)-этил]-2,2-дифенилацетамида в термостойкой форме и разработка способа получения этого соединения, в результате которого получают термостойкий продукт, стабильный при хранении и пригодный для изготовления лекарственных форм.

Предметом изобретения является, следовательно, термостойкий, стабильный, способный к хранению N-метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин 1-ил)-этил]-2,2-дифенилацетамид и его применение в качестве лекарственного средства для лечения воспалительных заболеваний кишечника, и фармацевтические лекарственные формы, которые содержат это соединение как составную часть и поэтому применяют для эффективного лечения воспалительных заболеваний кишечника и связанных с этим симптомов болезни, а также для лечения сильных болей, особенно повышенной болевой чувствительности.

Предметом изобретения является также применение этого соединения в качестве лекарственного средства для лечения болей и повышенной болевой чувствительности, появляющихся при болях в спине, при ожоговых повреждениях, солнечных ожогах и при ревматических заболеваниях, а также появляющихся при этом воспалительных реакций. Предметом изобретения является также применение этого лекарственного средства для лечения послеоперационных болей, реакций повышенной болевой чувствительности и появляющейся часто

после брюшной операции кишечной непроходимости. Другим предметом изобретения является применение соответствующего соединения в лекарственных формах для лечения нейродермита.

Кроме того, предметом этого изобретения является способ получения термостойкого, стойкого при хранении N-метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин 1-ил)-этил]-2,2-дифенилацетамида.

Соединение согласно изобретению и его физиологически не вызывающие опасений соли показывают особенно хорошие обезболивающие действия. В этой связи они антагонизируют, в частности, обусловленные воспалением гипералгезии, но они эффективны также и при борьбе с воспалительными явлениями, так что они имеют широкий спектр действия.

Опыты показали, что соединения согласно изобретению в "Writhing Test" действуют на мышей или крыс (Метод ср. Siegmund et al., Proc. Soc. Exp. Biol. 95, (1957), 729-731). Обезболивающее действие как таковое можно затем обнаружить в "Tail-Flick-Test" на мышах и крысах (Методика ср. d'Amour и Smith, Y. Pharmacol. Exp. Ther. 72, (1941), 74-79), затем в "Hot plate test" (ср. Schmauss и Yaksh, Y. Pharmacol. Exp. Ther. 228, (1984), 1-12 и цитированная там литература). Особенно сильные действия можно наблюдать на крысах в модели индуцированной карагенином повышенной болевой чувствительности (ср. Bartoszyk и Wild, Neuzoscience Letter, 101 (1989) 95. При этом это соединение не показывает никакой психической зависимости или лишь небольшую склонность к ней.

Кроме того, соответствующими опытами, проведенными известными методами, обнаружили ярко выраженные противовоспалительные, мочегонные, противосудорожные, нейрозащитные действия. Соединение показывает высокое средство к связыванию на каппа-рецепторах.

Соединение согласно изобретению в противоположность другим соединениям с подобным спектром действия, особенно пригодно для применения в фармацевтических лекарственных формах для лечения воспалительных заболеваний кишечника, так как оно наряду с обезболивающим и противовоспалительным действием может нормализовать вызванные заболеванием нарушения моторики кишечника. Особенно оно пригодно, чтобы снова приводить в действие моторику кишечника, если воспалительное заболевание кишечника угрожает или уже привело к непроходимости кишечника. Это соединение можно применять также для лечения послеоперационной кишечной непроходимости и связанных с этим болей.

Соединение согласно изобретению по причине вышеописанной фармакологической эффективности оказалось особенно пригодным в лечении ожогов, а именно, как ожогов под воздействием высокой температуры или под воздействием пламени, так и сильных солнечных ожогов. В частности, при этих показаниях назначением подходящих фармацевтических лекарственных форм, которые содержат активное вещество по

изобретению, кроме самих болей и реакций повышенной болевой чувствительности, можно также оказывать влияние на воспалительные процессы. Возможно также предотвращение или лечение рефлекторной кишечной непроходимости, появляющейся при самых тяжелых ожогах.

В этой связи были обнаружены также симптомы, которые указывают на благоприятное действие при лечении аллергий от воздействия солнца, тем более что под влиянием соединения согласно изобретению аллергические кожные реакции быстро ослабевают и связанный с этим зуд быстро уменьшается. Соответствующие положительные результаты были получены также при лечении нейродермита. В частности, при этом заболевании под воздействием вышеназванного активного вещества зуд кожи уменьшается и это оказывает благоприятное влияние на появляющиеся в результате заболевания воспалительные реакции.

Далее, это активное вещество оказалось особенно эффективным при лечении ревматических заболеваний и боли в спине. Особенно выгодно в этой связи то, что оно эффективно как против связанных с этим болей, но оно также оказывает положительное влияние на появляющиеся при ревматических заболеваниях воспалительные процессы и приводит к улучшению общего самочувствия пациента. При этом оказалось, что нет отрицательного влияния на нормальную моторику желудочно-кишечного тракта.

Во всех описанных здесь областях показаний особенно эффективным оказалось применение N-метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипропилидин-1-ил)-этил]-2,2-дифенил-ацетамид-гидрохлорида в качестве лекарственного средства в самых различных лекарственных формах.

Химические и физические исследования характеристики этого соединения согласно изобретению показали, что его в зависимости от изготовления и хранения получают в различных формах.

В частности, до сих пор были обнаружены четыре различные формы проявления, которые значительно отличаются друг от друга. Тип I представляет собой сольват. Эта форма легко превращается в другой кристаллический тип, который в следующем тексте обозначается как тип II. При медленном нагревании типа I происходит выделение растворителя. После этого данные рентгендифрактометрии, инфракрасного анализа и точки плавления соответствуют данным типа II.

Полученное по известному до сих пор и описанному в предыдущей заявке ФРГ 42 15 213 A1 способу соединение получается как тип II и имеет область плавления 196-200°C (см. также (Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 4 (5), 679(1994)) и теплоту плавления 100 Дж/г.

Обозначаемую как тип III форму получают, если тип II хранят при экстремальных условиях при влажности воздуха около 73-95%.

Характеризованная ниже как тип IV модификация имеет в противоположность модификации типа II область плавления около 220-226°C и теплоту плавления около 120-128

Дж/г.

Более высокая точка плавления и более высокая теплота плавления соединения согласно изобретению показывают, что существует термодинамически устойчивая кристаллическая модификация, причем обе полученные кристаллические модификации II и IV монокрипны друг к другу.

Это обстоятельство можно подтвердить другими наблюдениями. При очень быстром охлаждении полученного из термодинамически неустойчивой кристаллической модификации (точка плавления 196-200 °C) расплава с 210°C до -78°C и при 5-часовом хранении при -78°C термостойкое соединение (221-226°C) медленно выкристаллизовывается.

Эти два типа отличаются не только своим поведением при плавлении. Они отличаются также своей стабильностью при хранении. После хранения типа II в сушильном шкафу при 170°C было обнаружено частичное превращение в тип IV. Во время DSC-определения Differential Scanning Calorimetry) кристаллической модификации типа II при медленном нагревании выше точки плавления выкристаллизовывается

приблизительно при 200°C кристаллический тип IV, который расплавляется приблизительно при 220-226°C. Кристаллический тип IV обнаруживают также,

если расплав типа II (едва выше 200°C) резко охлаждают и в течение 12-16 ч хранят при комнатной температуре. Поэтому в то время, как тип II оказался неустойчивым, тип IV представляет термодинамически устойчивую модификацию. В результате целенаправленных опытов кристаллизации

было найдено, что добавкой затравочных кристаллов типа IV получают только кристаллическую модификацию IV. Однако в противоположность этому затравливанием при помощи затравочных кристаллов типа II получают прежде всего кристаллическую модификацию IV. Кроме того, растворимость кристаллического типа IV в водном растворе ниже растворимости типа II. Она составляет около 45-70% растворимости типа II.

После семимесячного хранения соединений, полученных по описанному в более ранней заявке ФРГ 45 15 213 A1 способу, можно было установить при комнатной температуре начинающееся превращение в термостойкую кристаллическую модификацию IV. Это означает, что полученное согласно описанному в этом изобретении способу соединение, в противоположность другой кристаллической модификации, является

стойким при хранении. После семимесячного хранения соединений, полученных по описанному в более ранней заявке ФРГ 45 15 213 A1 способу, можно было установить при комнатной температуре начинающееся превращение в термостойкую кристаллическую модификацию IV. Это означает, что полученное согласно описанному в этом изобретении способу соединение, в противоположность другой кристаллической модификации, является

стойким при хранении. В присутствии растворителей (например, воды) полученное соединение может образовывать сольваты.

При применении соединения согласно изобретению с кристаллической модификацией типа II в рецептурах лекарственных средств при более длительном хранении может происходить превращение кристаллических модификаций.

Хотя существующие до сих пор исследования эффективности лекарственного средства до сих пор показывали относительную независимость от кристаллической модификации, но не

исключаются различия благодаря возможно измененной биоприменяемости. Поэтому для применения в твердых рецептурах лекарственного средства следует обращать внимание на то, что применяют стойкую кристаллическую модификацию типа IV, или на то, что при использовании типа II применяют присадки, благодаря которым происходит долгосрочная стабилизация этого кристаллического типа.

Неожиданно оказалось, что не только вид и способ переработки полученного после самой реакции сырого продукта оказывают влияние на модификацию, но также имеют значение уже условия, при которых реагируют друг с другом продукты выделения. При этом было найдено, что играют роль особенно температуры реакции и отношения растворителей.

В частности, оказалось, что кристаллический тип IV получают, если превращение продуктов выделения 1-[(1S)-3-гидроксипирролидин-1-ил]-(2S)-2-метиламино-2-фенилэтана и дифенилацетилхлорида происходит при низких температурах, особенно при -5 до 10°C, предпочтительно при 0 до 8°C.

Далее, для этой цели оказалось выгодным, чтобы молярное соотношение продуктов выделения 1-[(1S)-3-гидроксипирролидин-1-ил]-(2S)-2-метиламино-2-фенилэтана и дифенилацетилхлорида составляло 1:0,75 - 1:1,65, предпочтительно 1:1,1 - 1:1,3.

При этом молярное соотношение исходных соединений

1-[(1S)-3-гидроксипирролидин-1-ил]-(2S)-2-метиламино-2-фенилэтана и дифенилацетилхлорида и примененного растворителя следует выбирать таким образом, чтобы продукты выделения были в растворе, а растворитель был по возможности только в небольшим избытке. Если в качестве растворителя выбирают тетрагидрофуран, то оказывается выгодным, если молярное соотношение вышеназванных продуктов выделения и растворителя составляет приблизительно (0,8-1,2):(0,9-1,3):(14-22). Особенно эффективным оказалось соотношение (0,9-1,1):(1-1,2):(16-19).

Особенно выгодной оказалась очень медленная добавка растворенного в одной части используемого растворителя дифенилацетилхлорида, а именно, особенно при поддерживаемой низкой температуре. Для полноты реакции перемешивают еще некоторое время при такой же температуре, однако по возможности не более чем около 4 ч. Оптимальным оказалось дополнительное перемешивание в течение 1,5-2,5 ч.

Для очистки полученного таким способом сырого продукта проводят перекристаллизацию из подходящего растворителя. При этом выгодно выбирать такое количество растворителя, чтобы продукт выкристаллизовывался уже в теплом состоянии.

При применении этанола этого достигают при молярных отношениях около 1 моль продукта, в пересчете на 75-125 моль, особенно на 85-115 моль растворителя.

В зависимости от выбора растворителя, из которого выкристаллизовывают, очищенный продукт уже после короткого охлаждения осаждается в кристаллической модификации типа IV. При применении этанола это

происходит после охлаждения температур около 55-45°C. При этом оказалось выгодным сохранять эту температуру в течение всего выкристаллизовывания.

5 Для соединения согласно изобретению оказалось особенно выгодным, чтобы оно на основе своей структуры не могло пересекать очевидный гемато-энцефалический барьер и поэтому не проявляло бы потенциала зависимости. До сих пор не были обнаружены никакие побочные действия, которые ограничивали бы каким-нибудь образом использование выгодных действий заявленных активностей.

10 Поэтому соединение согласно изобретению и его физиологически не вызывающие опасений соли можно применять для изготовления фармацевтических препаратов, причем их получают в 15 подходящей дозировочной форме вместе по меньшей мере с веществом-носителем или вспомогательным веществом, если требуется, с одним или несколькими активными 20 веществами. Полученные таким путем лекарственные формы можно применять в качестве лекарственных средств в медицине или ветеринарии. Как вещества-носители 25 пригодны органические или неорганические вещества, которые подходят для кишечного (например, орального или ректального) или парентерального назначения и которые не вступают в реакцию с соединением по изобретению, например, вода, растительные 30 масла, бензиловые спирты, полиэтиленгликоли, глицеринтриацетат и другие глицириды жирной кислоты, желатина, соевый лецитин, углеводы, как лактоза или крахмал, стеарат магния, тальк или целлюлоза.

35 Для орального применения служат особенно таблетки, драже, капсулы, сиропы, соки или капли. Особый интерес представляют специальные лаковые таблетки и капсулы со стойкими к действию желудочного сока покрытиями или оболочками. Для ректального 40 применения служат свечи, для парентерального применения растворы, преимущественно маслянистые или водные растворы, затем суспензии, эмульсии или имплантаты.

45 Заявленное согласно изобретению активное вещество можно также лиофилизировать, и полученный лиофилизат можно применять, например, для изготовления препаратов для инъекций.

50 Указанные лекарственные формы могут быть стерилизованы и/или могут содержать вспомогательные вещества, как консерванты, стабилизаторы и/или вещества с высокой поверхностной активностью, эмульгаторы, соли для влияния на осмотическое давление, буферные вещества, красители и/или 55 ароматические вещества. Они могут, если требуется, содержать также одно или несколько других активных веществ, напр. одно или несколько витаминов, мочегонных средств, противовоспалительных средств.

60 Соединение согласно изобретению 1, как правило, по аналогии с другими известными, имеющимися в торговле для заявленных показаний препаратами назначают преимущественно при дозировках приблизительно между 1 и 50 мг, особенно между 5 и 30 мг на единицу дозировки. Ежедневная доза составляет предпочтительно

между приблизительно 0,02 и 20 мг/кг, особенно между 0,2 и 0,4 мг/кг веса тела.

Однако специальная доза для каждого отдельного пациента зависит от самых различных факторов, например, от возраста, веса тела, от общего состояния здоровья, от пола, от питания, от времени назначения и способа назначения, от скорости выделения, от комбинации лекарственных веществ и от тяжести соответствующего заболевания, которое лечат. Предпочитают оральное назначение.

Ниже указаны примеры, которые служат для наглядности изобретения, однако изобретение не ограничено данными примерами.

Ниже все температуры даны в °C

Сравнительный пример

N-метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин-1-ил)-этил]-2,2-дифенилацетамид-гидрохлорид (тип II)

В аппаратуру объемом 500 мл помещают 22 г 1-[(1S)-3-гидроксипирролидин-1-ил]-(2S)-2-метил-амино-2-фенилэтана и растворяют в 150 мл тетрагидрофурана. При перемешивании прикалывают раствор, состоящий из 150 мл тетрагидрофурана и 24,1 г дифенилацетилхлорида, при 10-20°C в течение одного часа, причем вначале образуется осадок, который однако в ходе реакции снова растворяется. К концу реакции снова образуется осадок. Перемешивают еще 12 ч при комнатной температуре. Затем охлаждают приблизительно на 5°C и осажденный продукт отсасывают. Отделенный продукт промывают приблизительно 100 мл тетрагидрофурана и сушат. Таким образом получают 39 г сырого продукта. Последний перекристаллизовывают приблизительно с 250 мл этанола и 1 г активированного угля.

Выход: 33 г N-метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин-1-ил)-этил]-2,2-дифенилацетамид-гидрохлорида (73,2% от теории).

Точка плавления: 196-200°C

Теплота плавления: 100 Дж/г

pKa: 7,4

Растворимость в воде при 20°C: 1,16 г/100 мл

Растворимость в метаноле при 20°C: 6,31 г/100 мл

Пример 1:

N-метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин-1-ил)-этил]-2,2-дифенилацетамид-гидрохлорид (тип IV)

В охлажденный на 0 до 8°C реакционный раствор, состоящий из 9 г 1-[(1S)-3-гидроксипирролидин-1-ил]-(2S)-метиламино-2-фенилэтана и 40 мл тетрагидрофурана, медленно прикалывают при перемешивании в течение 75 мин раствор, состоящий из 10,5 г хлорангидрида дифенилуксусной кислоты и 17 мл тетрагидрофурана. Затем перемешивают при 120°C при одинаковой температуре. Осаждающий при этом как осадок реакционный продукт отсасывают и сушат. Таким образом получают 17 г сырого продукта, которые перекристаллизовывают из 180 мл этанола. Во время этой перекристаллизации полученный продукт осаждается при 50°C как стойкий кристаллический тип IV.

Выход: 13 г

N-метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин-1-ил)-этил]-2,2-дифенилацетамид-гидрохлорида (70,6% от теории).

Точка плавления: 221-226°C

Теплота плавления: 124 Дж/г

pKa: 7,4

Растворимость в воде при 20°C: 0,76 г/100 мл

Растворимость в метаноле при 20°C: 4,26 г/100 мл.

Нижеследующие примеры относятся к фармацевтическим лекарственным формам

Пример А: Стекланные пузырьки для инъекций

Раствор 100 г активного вещества формулы 1 и 5 г динатрийгидрогенфосфата в 3 л дважды дистиллированной воды доводят при помощи 2 н. соляной кислоты до pH 6,5, фильтруют в стерильных условиях, разливают в пузырьки для инъекций, подвергают лиофилизации в стерильных условиях и закрывают в стерильных условиях. Каждый пузырек для инъекций содержит 5 мг активного вещества.

Пример В: Свечи

Расплавляют смесь из 20 г активного вещества формулы 1, 100 г соевого лецитина и 1400 г масла какао, заливают в формы и охлаждают. Каждая свеча содержит 20 мг активного вещества.

Пример С: Раствор

Приготовляют раствор из 1 г активного вещества формулы 1, 9,38 г  $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , 28,48 г  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$  и 0,1 г хлористого бензалкония в 940 мл дважды дистиллированной воды. Устанавливают величину pH 6,8, дополняют до 1 л и стерилизуют облучением.

Пример: Мазь

Смешивают 500 мг активного вещества формулы 1 с 99,5 г вазелина при асептических условиях.

Пример Е: Таблетки

Смесь 1 кг активного вещества, 4 кг лактозы, 1,2 кг картофельного крахмала, 0,2 кг талька и 0,1 кг стеарата магния прессуют обычным способом в таблетки, таким образом, чтобы каждая таблетка содержала 10 мг активного вещества.

Пример Г: Драже

Аналогично примеру Е прессуют таблетки, которые затем обычным способом покрывают оболочкой из сахарозы, картофельного крахмала, талька, трагента и красителя.

Пример С: Капсулы

2 кг активного вещества вносят обычным способом в капсулы из твердой желатины, так что каждая капсула содержит 20 мг активного вещества.

Пример Н: Ампулы

Раствор 1 кг активного вещества в 60 л дважды дистиллированной воды фильтруют в стерильных условиях, заливают в ампулы, подвергают лиофилизации в стерильных условиях и закрывают в стерильных условиях. Каждая ампула содержит 10 мг активного вещества.

## Формула изобретения:

1.

N-Метил-N-[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин-1-ил)этил]-2,2-дифенилацетамид-гидрохлорид в термостойкой кристаллической модификации с температурой плавления 221-226°C.

2. Способ получения N-метил-N[(1S)-1-фенил-2-((3S)-3-гидроксипирролидин-1-ил)этил]-2,2-дифенилацетамид-гидрохлорида в термостойкой кристаллической модификации с температурой плавления 221-226 °С, отличающийся тем, что в охлажденный от -5 °С до 10 °С реакционный раствор, внесенный в аппаратуру и состоящий из 1-[(1S)-3-гидроксипирролидин-1-ил]

5  
10

-(2S)-2-метиламино-2-фенилэтана и растворителя, медленно прикапывают растворимый в том же растворителе дифенилацетилхлорид при молярном соотношении исходных реагентов 1:0,75-1:1,65 соответственно и при молярном соотношении исходных реагентов и растворителя (0,8-1,2):(0,9-1,3):(14-22), а полученный после реакции сырой продукт перекристаллизовывают в теплом состоянии из растворителя.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60