


(19) 中华人民共和国国家知识产权局



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102671070 A

(43) 申请公布日 2012.09.19

(21) 申请号 201210178306.7

(22) 申请日 2012.06.01

(71) 申请人 雷喻天

地址 615099 四川省西昌市张家屯巷 112 号
8 幢 2 单元 5 号

(72) 发明人 雷喻天

(74) 专利代理机构 成都中亚专利代理有限公司

51126

代理人 陈亚石

(51) Int. Cl.

A61K 36/90 (2006.01)

A61K 36/896 (2006.01)

A61K 36/88 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种治疗癌症或肿瘤的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗癌症或肿瘤的中药组合物，其特征在于由内服药和外用药组成，内服药和外用药协同使用；本发明使用安全性好，治愈效果显著，使用简单，尤其适用于胃癌、食道癌、肝癌等癌症的治疗。

1. 一种治疗癌症或肿瘤的中药组合物，其特征在于由内服药和外用药组成，内服药和外用药协同使用；

所述内服药由以下重量份的中药制成：

金银花 4-6 份，白花蛇舌草 4-6 份，半边莲 2-4 份，半枝莲 2-4 份，猕猴桃 8-12 份，菝葜 8-12 份，八仙草 8-12 份，金果榄 3-5 份，积雪草 3-5 份，野百合 4-6 份，喜树果 3-5 份；

所述外用药的原料药由以下重量份的中药组成：

忍冬藤 6-10 份，野菊花 6-8 份，红杜鹃 8-12 份，虎杖 6-8 份，臭茉莉 6-8 份，通光散 6-10 份，七叶一枝花 6-8 份，金剪刀 8-12 份，一枝蒿 2-4 份，白毛藤 6-8 份，水仙根 6-8 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗癌症或肿瘤的中药组合物，其特征在于：

所述内服药由以下重量份的中药制成：

金银花 5 份，白花蛇舌草 5 份，半边莲 3 份，半枝莲 3 份，猕猴桃 10 份，菝葜 10 份，八仙草 10 份，金果榄 4 份，积雪草 4 份，野百合 5 份，喜树果 4 份；

所述外用药的原料药由以下重量份的中药组成：

忍冬藤 8 份，野菊花 7 份，红杜鹃 10 份，虎杖 7 份，臭茉莉 7 份，通光散 8 份，七叶一枝花 7 份，金剪刀 10 份，一枝蒿 3 份，白毛藤 7 份，水仙根 7 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗癌症或肿瘤的中药组合物，其特征在于所述内用药其制备方法为：

(1) 将金银花、白花蛇舌草、半边莲、半枝莲、猕猴桃、菝葜、八仙草、金果榄、积雪草、野百合以及喜树果粉碎成细度为 20-50 目的中药粉末，然后将前述中药粉末加 10 倍水煎煮三次，每次 1-2h，滤过，合并滤液，浓缩成比重为 1.35 的浸膏，加 90~95% 的乙醇进行醇沉，回收乙醇并浓缩，在 45~50℃ 下干燥，得干浸膏；

(2) 将干浸膏加入辅料，制成药剂。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗癌症或肿瘤的中药组合物，其特征在于所述外用药的制备方法为：

(1) 将忍冬藤、野菊花、红杜鹃、虎杖、臭茉莉、通光散、七叶一枝花、金剪刀、一枝蒿、白毛藤以及水仙根，粉碎成细度为 20-50 目的中药粉末；

(2) 将上述中药粉末放入 52-56° 的 10 倍粮食白酒中充分浸泡一星期即得外用药。

5. 根据权利要求 3 所述的治疗癌症或肿瘤的中药组合物，其特征在于所述内用药为通过常规的制药手段制成每片含有干浸膏 100-150 毫克的片剂。

6. 根据权利要求 1、2、5 任意一项所述的药物组合物在制备治疗癌症药物中的用途。

7. 根据权利要求 6 所述的用途，其特征在于：所述的癌症为胃癌、食道癌、肝癌。

一种治疗癌症或肿瘤的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药,尤其涉及一种治疗癌症或肿瘤的中药组合物。

背景技术

[0002] 各种癌症、肿瘤均因长期气阻、血热、血瘀引起血小板聚集成包块,随着病毒、炎症逐渐加重,侵害正体。目前医学界治疗各种肿瘤癌症包块以切除、化疗为主,配合服药,治愈病例极少,同时还产生很大的副作用。癌症成为难治之症。有些癌症能够手术治疗,而对于不能手术治疗的癌症患者只能采用药物治疗,用以延长患者的生命。目前用于治疗这类疾病的药物很多,大体可以分为两类,一类是化学合成药,一类是中药复方制剂。化学合成药副作用较大,远期疗效不佳,不宜长期服用,特别是对于一些肠胃病患者或者肝肾功能不全者要求慎用。而中医治癌的原则是:扶阳为纲,用清、消、活、化、攻、软、散、祛、脱、扶、调,标本兼治之法,治愈癌症或肿瘤。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述技术中的不足,而提供一种治疗肿瘤或癌症的中药组合物及其制备方法,其使用安全性好,治愈效果显著,使用简单,尤其适用于胃癌、食道癌等癌症的治疗。

[0004] 本发明选用以下中药材,将这些中药材组合使得各药物产生协同效应,从而能够达到更有效的治疗效果。

[0005] 金银花:性甘寒气芳香,甘寒清热而不伤胃,芳香透达又可祛邪。金银花既能宣散风热,还善清解血毒,用于各种热性病,如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等证,均效果显著。

[0006] 白花蛇舌草:性寒。主要功效是清热解毒、消痛散结、利尿除湿。尤善治疗各种类型炎症。在临床实践中,发现白花蛇舌草若配伍得当,可治疗多种疾病。

[0007] 半边莲:具备利尿消肿,清热解毒等功效,可用于治疗大腹水肿、面足浮肿、痈肿疔疮、蛇虫咬伤等。

[0008] 半枝莲:具清热解毒、活血祛瘀、消肿止痛、抗癌等功能。

[0009] 猕猴桃:猕猴桃富含抗氧化剂,具有抗癌、抗炎和抗过敏的功效。可以阻断强致癌物亚硝胺的合成,减少胃癌和食道癌的发生。用于热病烦渴,或胃热口渴;热壅反胃呕吐,或食欲减退;热湿小便不利,或石淋。

[0010] 萝卜:性味甘、酸、平,无毒。主风湿痹痛;淋浊;带下;泄泻;痢疾;痈肿疮毒;顽癣;烧烫伤;解毒,驱风,疮科要药,有发汗,驱风,利尿及治淋病,癌症,消渴症的功用。叶捣烂外敷治恶疮。

[0011] 八仙草:清热解毒,消肿止痛。治痈肿,阑尾炎,近用于治癌。

[0012] 金果榄:具清热解毒,利咽,止痛之功效。用于咽喉肿痛,痈疽疗毒,泄泻,痢疾,脘腹热痛。

- [0013] 积雪草 :具湿通淋 ;清热解毒 ;散瘀消肿之功效。
- [0014] 野百合 :有散积、消肿的功效,近试用作抗癌药。
- [0015] 喜树果 :抗癌,散结,破血化瘀用于多种肿瘤,如胃癌、肠癌、绒毛膜上皮癌、淋巴肉瘤等。
- [0016] 忍冬藤 :具有清热解毒,疏风通络的疗效。可用于温病发热,疮痈肿毒,热毒血痢,风湿热痹。
- [0017] 野菊花 :具清热解毒 ;疏风平肝 ;消肿之功效。
- [0018] 红杜鹃 :清热解毒,外用治痈肿。
- [0019] 虎杖 :清热解毒,利胆退黄,祛风利湿,散瘀定痛,止咳化痰。用于关节痹痛,湿热黄疸,经闭,癰瘕,咳嗽痰多,水火烫伤,跌扑损伤,痈肿疮毒。
- [0020] 臭茉莉 :有散积、消炎之功效。
- [0021] 通光散 :主治 :清热解毒 ;止咳平喘 ;通利湿通乳 ;搞癌。主咽喉肿痛 ;肺热咳喘 ;湿热黄疸 ;小便不利 ;乳汁不通 ;疮疖 ;癌肿。
- [0022] 七叶一枝花 :具败毒抗癌、消肿止痛、清热定惊、镇咳平喘的功效。
- [0023] 金剪刀 :别名河边威灵仙、铜脚威灵仙,为毛茛科植物湖州铁线莲的全草。用于祛风除湿 ;散结消肿。治疗深部脓肿、脑瘤。
- [0024] 一枝蒿 :具有祛风解表 ;健胃消积 ;活血散瘀等功效。
- [0025] 白毛藤 :具有清热、利湿、祛风、解毒的功效,可治疗疟疾、黄疸、水肿、淋病、风湿关节痛、丹毒、疔疮等症。
- [0026] 水仙根 :治痈肿疮毒,具抗癌之功效。
- [0027] 本发明药物组分的用量也是经过发明人进行大量摸索总结得出的,各组分用量在下述重量范围内都具有较好的疗效 :

一种治疗癌症或肿瘤的中药组合物,由内服药和外用药组成,内服药和外用药协同使用;

所述内服药由以下重量份的中药制成:

金银花 4-6 份,白花蛇舌草 4-6 份,半边莲 2-4 份,半枝莲 2-4 份,猕猴桃 8-12 份,菝葜 8-12 份,八仙草 8-12 份,金果榄 3-5 份,积雪草 3-5 份,野百合 4-6 份,喜树果 3-5 份;

所述外用药的原料药由以下重量份的中药组成:

忍冬藤 6-10 份,野菊花 6-8 份,红杜鹃 8-12 份,虎杖 6-8 份,臭茉莉 6-8 份,通光散 6-10 份,七叶一枝花 6-8 份,金剪刀 8-12 份,一枝蒿 2-4 份,白毛藤 6-8 份,水仙根 6-8 份。

[0028] 最优的,所述的治疗癌症或肿瘤的中药组合物,其内服药由以下重量份的中药制成:

金银花 5 份,白花蛇舌草 5 份,半边莲 3 份,半枝莲 3 份,猕猴桃 10 份,菝葜 10 份,八仙草 10 份,金果榄 4 份,积雪草 4 份,野百合 5 份,喜树果 4 份;

其外用药的原料药由以下重量份的中药组成:

忍冬藤 8 份,野菊花 7 份,红杜鹃 10 份,虎杖 7 份,臭茉莉 7 份,通光散 8 份,七叶一枝花 7 份,金剪刀 10 份,一枝蒿 3 份,白毛藤 7 份,水仙根 7 份。

[0029] 最优的,所述内用药其制备方法为:

(1) 将金银花、白花蛇舌草、半边莲、半枝莲、猕猴桃、菝葜、八仙草、金果榄、积雪草、野

百合以及喜树果粉碎成细度为 20-50 目的中药粉末,然后将前述中药粉末加 10 倍水煎煮三次,每次 1-2h,滤过,合并滤液,浓缩成比重为 1.35 的浸膏,加 90~95% 的乙醇进行醇沉,回收乙醇并浓缩,在 45~50℃ 下干燥,得干浸膏;

(2) 将干浸膏加入辅料,制成药剂。

[0030] 最优的,所述外用药的制备方法为:

(1) 将忍冬藤、野菊花、红杜鹃、虎杖、臭茉莉、通光散、七叶一枝花、金剪刀、一枝蒿、白毛藤以及水仙根,粉碎成细度为 20-50 目的中药粉末;

(2) 将上述中药粉末放入 52-56° 的 10 倍粮食白酒中充分浸泡一星期即得外用药。

[0031] 本发明的内服药可以采用中药制剂的常规方法制备成任何常规内服制剂。例如可以将这些中药研磨成粉末混合均匀制成散剂冲服;也可以将这些中药一起水煎,然后浓缩成水煎液制成;

最优的,所述内用药为通过常规的制药手段制成每片含有干浸膏 100-150 毫克的片剂。

[0032] 本申请人依据如下原则:

(1) 调理阴阳:将阴阳调理平衡、病魔不侵。

[0033] (2) 调理气机:人体阴阳、气血、脏腑、经络的生理功能无不依赖于气机的升降出入,气机正常,疾病可出。

[0034] (3) 扶正祛邪:正气旺,而邪不侵,扶正有助于祛邪,祛邪有利于安正。

[0035] (4) 标本兼治:中医治癌,力求治本,根据疾病的主、次、缓、急,分清标本,根据“缓则治本”,“急则治标”,或标本同治的原则,针对性治疗,在治疗过程中,采用“虚则补之”、“实则泻之”、“软则化之”、“裂则阻之”、“移则固之”、“发则抑之”、“衰则脱之”等等之法,进行治疗。

[0036] 通过大量的配方实践,最终得出能从以下:

(1) 消炎解毒,围阻裂变;

(2) 化瘀软坚,抑制转移;

(3) 扶阳固本,诱癌排除;

三个方面同时攻克癌症的本发明中药组合物。

[0037] 本发明使用安全性好,治愈效果显著,使用简单,尤其适用于胃癌、食道癌、肝癌等癌症的治疗。

具体实施方式

[0038] 实施例 1

内用药:将金银花 50g,白花蛇舌草 50g,半边莲 30g,半枝莲 30g,猕猴桃 100g,菝葜 100g,八仙草 100g,金果榄 40g,积雪草 40g,野百合 50g,喜树果 40g 粉碎成细度为 20-50 目的中药粉末,然后将前述中药粉末加 10 倍水煎煮三次,每次 1-2h,滤过,合并滤液,浓缩成比重为 1.35 的浸膏,加 90~95% 的乙醇进行醇沉,回收乙醇并浓缩,在 45~50℃ 下干燥,得干浸膏;将所得干浸膏通过常规的制药手段制成每片含有干浸膏 100-150 毫克的片剂。

[0039] 外用药:将忍冬藤 80g,野菊花 70g,红杜鹃 100g,虎杖 70g,臭茉莉 70g,通光散 80g,七叶一枝花 70g,金剪刀 100g,一枝蒿 30g,白毛藤 70g,水仙根 70g 粉碎成细度为 20-50

目的中药粉末；再将所得中药粉末放入 52-56° 的 10 倍粮食白酒中充分浸泡一星期即得外用药。

[0040] 内服药片剂的用量为每次 4-8 片，每日四次，可和开会直接吞服，也可用开水化散口服。

[0041] 外用药可以直接搽于患部相对应的体表处，也可先用药用纱布等物在外用药中充分浸泡后，再将浸泡后的药用纱布等物敷贴患部相对应的体表处。

[0042] 实施例 2

制备方法同实施例 1，不同的是：

内服药的中药组分和用量为：金银花 40g，白花蛇舌草 40g，半边莲 20g，半枝莲 20g，猕猴桃 80g，菝葜 80g，八仙草 80g，金果榄 30g，积雪草 30g，野百合 40g，喜树果 30g；

外用药的中药组分和用量为：忍冬藤 60g，野菊花 60g，红杜鹃 80g，虎杖 60g，臭茉莉 60g，通光散 60g，七叶一枝花 60g，金剪刀 80g，一枝蒿 20g，白毛藤 60g，水仙根 60g。

[0043] 实施例 3

制备方法同实施例 1，不同的是：

内服药的中药组分和用量为：金银花 60g，白花蛇舌草 60g，半边莲 40g，半枝莲 40g，猕猴桃 120g，菝葜 120g，八仙草 120g，金果榄 50g，积雪草 50g，野百合 60g，喜树果 50g；

外用药的中药组分和用量为：忍冬藤 100g，野菊花 80g，红杜鹃 120g，虎杖 80g，臭茉莉 80g，通光散 100g，七叶一枝花 80g，金剪刀 120g，一枝蒿 40g，白毛藤 80g，水仙根 80g。

[0044] 采用本发明联合用药即内服药和外用药协同使用，通过近十年的应用，已经治好数百位癌症患者，治愈率在 70% 以上，复发率不到 10%。

[0045] 临床试验病例

病例一

王某某，男，56 岁，四川蓬安县福德镇人，于 2010 年 12 月 29 日上午 9:06 分被医院诊断为食道癌、胃癌。其具体表现为：体瘦、面黄白、脸上有网状筋块、眼凸无神、有气无力、不能行走、不能呼吸冷空气、气逆、呃逆、声音特大、呕吐奇臭泡沫痰、胃部疼痛、贲门部位拒按、胃部上有大肿块、按之坚硬疼痛剧烈、不能进软食，进食则难下咽，咽下食物立即呕吐、一吐 10-20 分钟，闻油则呕吐、不戴口罩呼吸冷空气则呕吐，呕吐时食道胃部疼痛剧烈，舌苔黄厚、干裂、脉象浮数、大便稀少、小便黄浓，据多家大医院判定，只能活十数天，家属和患者本人均无心再求医治。

[0046] 取本发明实施例 1 所制得的药品进行医治；

内用药：服用内用药 6 片，开水化散口服，慢慢咽下，一日四次。

[0047] 外用药：将充分浸泡外用药的纱布敷贴在胃肿块及贲门所处位置的体表部，每次敷贴 6 小时，一日四次。

[0048] 患者经过三天用药，效果明显：能食米糊能进食。呕吐减缓，胃部、贲门部疼痛减少，连续内服药和外用药协同用药一个疗程即七天后，患者能独立行走。不戴口罩，呃逆呕吐减半。胃部、贲门部疼痛减轻，后经过 6 个疗程的连续治疗：患者面色正常，能食各种肉食，呃逆呕吐停止。行走上五楼不喘不呃逆，一气而上，消化正常。食道部胃部肿块全无，重按也无疼痛，舌苔正常，大小便正常，脉象平稳，后去原医院复查，已全部恢复健康。

[0049] 病例二

何某某，女，73岁，四川蓬安县城人，被医院诊断为肝癌、胃癌，具体表现为：全身发黄、面黄肌瘦、卧床不能动、肝区肿块特大、轻按则剧痛，有少量腹水，胃部肿块坚硬、不能进食、进食则呕吐、呃逆吐癌痰、胀痛呻吟，大便稀溏、小便茶黄，舌苔黄厚，脉象浮无力。

[0050] 取本发明实施例1所制得的药品进行医治；

内用药：服用内用药6片，开水化散口服，慢慢咽下，一日四次。

[0051] 外用药：将充分浸泡外用药的纱布敷贴在肝区胃部所对应的体表处，每天疗每次敷贴6小时，一日四次。

[0052] 患者经过七天第一个疗程的治疗，整个病情好转，肿块疼痛减轻，肿块明显变小变软，可以进服汤食，呕吐减少，舌苔变薄，脉象浮而无力，大小便基本上无变化，三个疗程（二十一天）后患者基本上能独立下床，上厕所，九个疗程（六十三天后），患者一切正常，可外出自理家务。

[0053] 病例三

杜某某，男63岁，贵州省兴义市安龙县德卧镇人，2010年3月2日被诊断出转移性（肝癌）胃癌，具体表现为：面蜡黄白、无气无力、腰疼、胃痛、拒按、肝区疼痛、胃部喜冷饮有肿块，按之坚硬，舌白厚，脉象：左寸洪，右迟沉。

[0054] 取本发明实施例1所制得的药品进行医治；

内用药：服用内用药6片，开水化散口服，慢慢咽下，一日四次。

[0055] 外用药：将充分浸泡外用药的纱布敷贴在肝区胃部所对应的体表处，每天疗每次敷贴6小时，一日四次。

[0056] 2011年3月9号复诊：精神恢复，面色转红，肾区痛减，肝区、胃部无疼痛，肿块缩小，饭量增加，大小便基本正常，继续用药，于4月26日打电话问之，一切正常，已下地干活。

[0057] 病例四

余某某，女，86岁，四川南充人，2010年12月15日诊断为胃癌，具体表现为：卧病床不能动，无法下床，不能进食，胸部胃腹部肿块，疼痛，按之坚硬，大便秘结，小便少黄，舌苔厚干黄，脉象沉细无力。

[0058] 取本发明实施例1所制得的药品进行医治；

内用药：服用内用药8片，开水化散口服，慢慢咽下，一日四次。

[0059] 外用药：将充分浸泡外用药的纱布敷贴在肝区胃部所对应的体表处，每天疗每次敷贴6小时，一日四次。

[0060] 2011年1月9日复诊：能进少食，肿块减半，按之滑动，大便少结，小便正常，舌苔正常，继续联合用药，后跟踪了解基本恢复健康。