




MD 763 Z 2014.11.30

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **763** (13) **Z**
(51) Int.Cl: *C12G 1/06* (2006.01)
C12H 1/00 (2006.01)
C12H 1/12 (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE
DE SCURTĂ DURATĂ**

(21) Nr. depozit: s 2013 0122 (22) Data depozit: 2013.07.09	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2014.04.30, BOPI nr. 4/2014
(71) Solicitant: INSTITUȚIA PUBLICĂ INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD (72) Inventatori: TARAN Nicolae, MD; TROȚCHII Ivan, BY; TARAN Marina, MD; PONOMARIOV Irina, MD (73) Titular: INSTITUȚIA PUBLICĂ INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD	

(54) **Procedeu de stabilizare a vinului spumant (variante)**

(57) **Rezumat:**

1
Invenția se referă la industria vinicolă, și
anume la un procedeu de stabilizare a vinului
spumant contra tulburărilor cristaline sau
coloidale.

Procedeu, conform invenției, prevede
adăugarea în vinul spumant după fermentarea
secundară a licorii de expediție prealabil tratate
cu acid metatartric în doză de 0,5...3,0 g/L sau
cu gumă arabică sau carboximetilceluloză în
doză de 1,0...4,0 g/L. Licoarea de expediție se

2
adaugă în vinul spumant reieșind din calculul
de 25...100 mg/L de acid metatartric sau
50...200 mg/L de gumă arabică sau
carboximetilceluloză în produsul finit.

Rezultatul constă în sporirea stabilității
vinurilor spumante.

Revendicări: 2

MD 763 Z 2014.11.30

(54) Process for stabilization of sparkling wine (embodiments)

(57) Abstract:

1
The invention relates to the wine industry, in particular to a process for stabilization of sparkling wine against crystalline or colloidal turbidities.

The process, according to the invention, provides the addition into the sparkling wine after secondary fermentation of expedition liquor pretreated with metatartaric acid in a dose of 0.5...3.0 g/L or gum arabic or

2
carboxymethylcellulose in a dose of 1.0...4.0 g/L. The expedition liquor is added into the sparkling wine at a rate of 25...100 mg/L of metatartaric acid or 50...200 mg/L of gum arabic or carboxymethylcellulose in the finished product.

The result is to increase the stability of sparkling wines.

Claims: 2

(54) Способ стабилизации игристых вин (варианты)

(57) Реферат:

1
Изобретение относится к винодельческой промышленности, а именно к способу стабилизации игристых вин против кристаллических или коллоидальных помутнений.

Способ, согласно изобретению, предусматривает введение в игристое вино после вторичного брожения экспедиционного ликера предварительно обработанного метавинной кислотой в дозе 0,5...3,0 г/л

2
или гуммиарабикой или карбоксиметилцеллюлозой в дозе 1,0...4,0 г/л. Экспедиционный ликер вводится в игристое вино исходя из расчета 25...100 мг/л метавинной кислоты или 50...200 мг/л гуммиарабики или карбоксиметилцеллюлозы в готовом продукте.

Результат состоит в повышении стабильности игристых вин.

П. формулы: 2

Descriere:

Invenția se referă la industria vinicolă, și anume la un procedeu de stabilizare a vinului spumant contra tulburărilor cristaline sau coloidale.

Se cunoaște procedeul de fabricare a vinurilor spumante, care prevede tratarea vinurilor materie primă în scopul stabilizării producției finite contra tulburărilor cristaline și coloidale. În acest scop vinurile materie primă asamblate sau cupajate sunt tratate cu diferite substanțe de cleire (gelatină, clei de pește, bentonită sau altele) pentru stabilizarea lor contra tulburărilor coloidale. Pentru stabilizarea vinurilor contra tulburărilor cristaline, cupajele de vinuri materie primă se tratează cu frig la temperatura de -3...-5°C în decurs de 3...10 zile. Dar tratările tehnologice menționate se efectuează doar la etapa vinului materie primă (cupaje) și nu poate fi efectuată după fermentarea secundară în cazul producerii vinurilor spumante clasice în sticle sau în rezervoare metalice în cazul necesității stabilizării vinurilor spumante originale [1].

Este cunoscut procedeul de stabilizare a vinurilor contra tulburărilor cristaline în baza utilizării acidului metatartric în dozele până la 100 mg/L, dar acest procedeu nu este utilizat la producerea vinurilor spumante [2].

De asemenea este cunoscut procedeul de stabilizare a vinurilor contra tulburărilor coloidale în baza utilizării gumei arabice și carboximetilcelulozei, care se dozează în vinurile tratate înainte de îmbuteliere în calitate de substanțe care pot inhiba depunerile de sediment ale substanțelor macromoleculare instabile [3].

Mai este cunoscut procedeul de stabilizare a vinurilor contra tulburărilor coloidale în baza utilizării acidului metatartric în cantitate de 50...100 mg/L [4].

În practica vinicolă, acest procedeu tehnologic este utilizat pentru stabilizarea vinurilor liniștite seci roșii și a celor alcoolizate tari, nestabile la tulburările provocate de surplusul substanțelor fenolice.

Problema pe care o rezolvă prezenta invenție constă în sporirea stabilității vinurilor spumante originale naturale contra tulburărilor cristaline și coloidale la etapa vinului impregnat cu dioxid de carbon după fermentarea secundară în sticle sau rezervoare metalice ($p \geq 3,5$ atm).

Procedeul, conform invenției, înlătură dezavantajele menționate mai sus prin aceea că procesul de stabilizare a vinului impregnat cu dioxid de carbon se efectuează la ultima etapă de fabricare, când în vinul spumant brut se adaugă licoarea de expediție, în care prealabil a fost dozată cantitatea necesară de acid metatartric (în cazul stabilizării contra tulburărilor cristaline) sau de gumă arabică sau carboximetilceluloză (în cazul stabilizării vinului spumant contra tulburărilor coloidale). Cercetările efectuate au demonstrat posibilitatea utilizării licorii de expediție tratate prealabil cu acid metatartric sau gumă arabică sau carboximetilceluloză în scopul stabilizării vinurilor spumante finite impotriva tulburărilor cristaline sau coloidale.

Esența invenției constă în aceea că procedeul de stabilizare a vinului spumant prevede adăugarea în vinul spumant după fermentarea secundară a licorii de expediție prealabil tratate cu acid metatartric în doză de 0,5...3,0 g/L, totodată licoarea de expediție se adaugă în vinul spumant reieșind din calculul de 25...100 mg/L de acid metatartric în produsul finit.

Procedeul de stabilizare a vinului spumant prevede adăugarea în vinul spumant după fermentarea secundară a licorii de expediție prealabil tratate cu gumă arabică sau carboximetilceluloză în doză de 1,0...4,0 g/L, totodată licoarea de expediție se adaugă în vinul spumant reieșind din calculul de 50...200 mg/L de gumă arabică sau carboximetilceluloză în produsul finit.

Rezultatul constă în sporirea stabilității vinurilor spumante.

În scopul stabilizării vinurilor spumante originale contra tulburărilor cristaline, licoarea de expediție este tratată prealabil cu acid metatartric în doză de 0,75...3,0 g/L, ce corespunde după dozarea licorii și acordarea concentrației de acid metatartric în vinul finit de 25...100 mg/L pentru vinul spumant original demisec; în doză de 0,5...2,0 g/L, ce corespunde concentrației de acid metatartric în vinul finit de 25...100 mg/L pentru vinul spumant original demidulce și în doză de 0,5...1,5 g/L de acid metatartric în licoare pentru vinul spumant dulce, ce corespunde concentrației de acid metatartric în vinul finit de 25...100 mg/L.

Pentru a obține concentrația acidului metatartric de 100 mg/L în vinul spumant original, în licoarea de expediție se adaugă acid metatartric în doză de 3,0 g/L pentru vinul demisec; 2,0 g/L pentru vinul demidulce și 1,5 g/L pentru vinul dulce. În scopul stabilizării vinurilor spumante finite contra tulburărilor coloidale, licoarea de expediție se tratează cu gumă arabică sau carboximetilceluloză în doză de 0,70...3,00 g/L în vederea obținerii cantităților necesare de zaharuri (vin spumant de marca demisec, demidulce sau dulce), ceea ce corespunde concentrației substanțelor de stabilizare în produsul finit de 50...100 mg/L.

MD 763 Z 2014.11.30

4

În vinurile spumante clasice licoarea de expediție tratată respectiv cu acid metatartric sau cu gumă arabică sau carboximetilceluloză în dozele stabilite reieșind din calculul necesar pentru asigurarea cantității necesare de zaharuri în vinul spumant finit (brut, extrasec, sec, demisec și dulce) se dozează direct în sticle după procesul de degorjaj. În producția finită de spumant clasic dozele de acid metatartric, de gumă arabică sau de carboximetilceluloză sunt identice cu dozele administrate vinurilor spumante naturale.

Cercetările au fost efectuate pe un lot experimental de vinuri spumante demidulci, obținut din vinuri materie primă nestabile la tulburările cristaline (netratate cu frig) și nestabile la tulburările coloidale (netratate cu gelatină). Testarea producției finite de vinuri spumante originale la tulburările coloidale și cristaline a demonstrat instabilitatea vinului la expunerea la frig (-4°C timp de 3 zile). În scopul stabilizării la tulburările cristaline în vinul spumant prealabil răcit la temperatura de 0°C a fost adăugată licoarea de expediție tratată prealabil cu acid metatartric în volum de 50 mL în doză de 0,5, 1,0 și 2,0 g/L, ce corespunde concentrației acidului metatartric de 25, 50 și 100 mg/L în produsul finit. După dozarea licorii de expediție și condiționarea vinului spumant după zaharuri la marca „demidulce” vinul experimental a fost supus menținerii de control timp de 10 zile la temperatura de 20°C , apoi a fost testat la stabilitate contra tulburărilor cristaline. Rezultatele obținute sunt prezentate în tab. 1.

Tabelul 1

Influența tratării vinurilor spumante albe demidulci cu acid metatartric contra tulburărilor cristaline

Doza de acid metatartric, mg/L	Predispunerea vinurilor spumante la tulburări cristaline	Durata de stabilitate, luni
Martor (fără tratare)	+	1
25	-	6
50	-	12
100	-	18

Legendă: + nestabil; - stabil

Din rezultatele prezentate în tab.1 se poate menționa că dozarea acidului metatartric în vinul spumant concomitent cu licoarea de expediție (marca vinului spumant „demidulce”), în dozele 50...100 mg/L permite stabilizarea produsului finit contra tulburărilor cristaline.

În scopul stabilizării vinului spumant contra tulburărilor coloidale în vinul prealabil răcit la temperatura de 0°C a fost dozată licoarea de expediție tratată cu gumă arabică în volum de 50 mL în dozele de 1,0, 2,0 și 4,0 g/L, ce corespunde concentrației gumei arabice de 50, 100 și 200 mg/L în produsul finit. După dozarea licorii de expediție în scopul obținerii vinului spumant original „demidulce” vinul experimental a fost supus menținerii de control timp de 10 zile la temperatura de 20°C , apoi a fost testat la stabilitate contra tulburărilor coloidale. Rezultatele obținute sunt prezentate în tab. 2.

Tabelul 2

Influența tratării vinurilor spumante albe demidulci cu gumă arabică contra tulburărilor coloidale

Doza de gumă arabică, mg/L	Predispunerea la tulburări coloidale	Durata de stabilitate, luni
Martor (fără tratare)	+	1
50	-	12
100	-	18
200	-	18

Legendă: + nestabil; - stabil

Din rezultatele prezentate în tab.2 se poate menționa că dozarea gumei arabice concomitent cu licoarea de expediție în vinul spumant în vederea obținerii concentrației gumei arabice în produsul finit de 50...200 mg/L permite stabilizarea vinului spumant contra tulburărilor cristaline.

De asemenea în scopul stabilizării vinului spumant demidulce contra tulburărilor coloidale în vinul prealabil răcit la temperatura de 0°C a fost dozată licoarea de expediție tratată cu carboximetilceluloză în volum de 50 mL în dozele de 0,1, 2,0 și 4,0 g/L, ce corespunde concentrației carboximetilcelulozei de 50, 100 și 200 mg/L în produsul finit. După dozarea licorii de expediție și condiționarea vinului spumant după zaharuri la marca „demidulce”, vinul experimental a fost supus menținerii de control timp de 10 zile la temperatura de 20°C , apoi a fost testat la stabilitate contra tulburărilor coloidale. Rezultatele obținute sunt prezentate în tab. 3.

Influența tratării vinurilor spumante demidulci cu carboximetilceluloză contra tulburărilor coloidale

Doza de carboximetilceluloză, mg/L	Predispunerea la tulburări coloidale	Durata de stabilitate, luni
Martor (fără tratare)	+	1
50	-	12
100	-	18
200	-	18

5 Legendă: + nestabil; - stabil

Din rezultatele prezentate în tab. 3 se poate menționa că dozarea carboximetilcelulozei concomitent cu licoarea de expediție în vinul spumant în vederea obținerii concentrației de 50...200 mg/L permite stabilizarea produsului finit contra tulburărilor coloidale. Aprecierea organoleptică a vinurilor spumante după dozarea acidului metatartric în dozele de 25...100 mg/L și gumei arabice și carboximetilcelulozei în dozele 50...200 mg/L a demonstrat că substanțele sus-menționate nu influențează negativ asupra calității vinurilor spumante tratate.

Din cele expuse se poate concluziona că rezultatul constă în sporirea stabilității vinurilor spumante contra tulburărilor cristaline și coloidale.

Procedeul se realizează în felul următor.

15 La unitățile vinicole specializate în producerea vinurilor spumante și dotate cu utilaj tehnologic special se fabrică vinul spumant conform regulilor generale în vigoare, în care după fermentarea secundară și răcirea vinului impregnat cu CO₂ (p≥3,5 atm) se introduce licoarea de expediție tratată prealabil cu acid metatartric sau gumă arabică, sau carboximetilceluloză, în dozele 0,5...3,0 g/L în vederea obținerii concentrației uneia din substanțele menționate mai sus în produsul finit în intervalul 20 25...100 mg/L.

După stabilizare vinul spumant se filtrează izobaric și se transportă la îmbuteliere.

Exemplul 1

25 Vinul spumant clasic din soiul Chardonnay a fost caracterizat ca instabil contra tulburărilor cristaline provocate de sărurile acidului tartric (KH-Tartrat). În scopul stabilizării produsului finit după fermentarea secundară și răcirea vinului conform instrucțiunii tehnologice de preparare, în licoarea de expediție s-a dozat acid metatartric în doză de 1,5 g/L, apoi licoarea de expediție cu zaharitatea de 75% care conține acid metatartric a fost dozată în fiecare sticlă cu vin spumant până la concentrația acidului metatartric în vin de 100 mg/L, ce corespunde volumului de licoare de 50 mL la 750 mL de vin pentru marca „demisec”. După dozarea licorii de expediție, sticla a fost astupată, agitată și supusă menținerii de control.

30 După 10 zile de păstrare la temperatura de 18°C, vinul spumant alb clasic a fost apreciat ca un produs finit stabil la tulburările cristaline.

Exemplul 2

35 Vinul spumant original din cupajul de vinuri Aligote, Pinot și Sauvignon a fost caracterizat ca instabil contra tulburărilor coloidale provocate de sedimentarea substanțelor macromoleculare. În scopul stabilizării produsului finit după fermentarea secundară și răcirea vinului, în licoarea de expediție s-a dozat gumă arabică în doză de 1,5 g/L, apoi licoarea de expediție tratată în volum de 666,6 L a fost dozată în rezervorul cu vin spumant demidulce cu volumul 10000 L până la concentrația gumei arabice în vin spumant de 100 mg/L.

40 După dozarea gumei arabice concomitent cu licoarea de expediție, vinul spumant demidulce răcit a fost supus filtrării izobarice și îndreptat spre îmbutelierea izobarică în sticle. După perioada de păstrare de control vinul spumant original demidulce tratat cu gumă arabică a fost caracterizat ca stabil la tulburările coloidale.

Exemplul 3

45 Vinul spumant original din cupajul de vin Aligote, Pinot și Sauvignon a fost caracterizat ca instabil contra tulburărilor coloidale provocate de sedimentarea substanțelor macromoleculare. În scopul stabilizării produsului finit după fermentarea secundară și răcirea vinului, în licoarea de expediție s-a dozat carboximetilceluloză în doză de 1,5 g/L, apoi licoarea de expediție tratată în volum de 666,6 L a fost dozată în rezervorul cu volumul 10000 L vin spumant demidulce până la concentrația carboximetilcelulozei în vinul spumant de 100 mg/L.

50 După dozarea carboximetilcelulozei concomitent cu licoarea de expediție, vinul spumant demidulce răcit a fost supus filtrării izobarice și îndreptat spre îmbutelierea izobarică în sticle. După perioada de

păstrare de control vinul spumant original demidulce tratat cu carboximetilceluloză a fost caracterizat ca stabil la tulburările coloidale.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. Reguli generale privind fabricarea producției vinicole. Chișinău, 2010, p. 387-388
2. Pomohaci N., Cotea V., Stoian V. ș. a. Oenologie. Îngrijirea, stabilizarea și îmbutelierea vinurilor. Vol. 2, București, Ceres, 2001, p. 202-203
3. Волуйко Г. Г., Мехуэла Н. А. Стабилизация виноградных вин. Москва, Агропромиздат, 1987, p. 67
4. Таран Н. Г., Зинченко В. И. Современные технологии стабилизации вин. ASM, Кишинев, 2006, p. 143

(57) Revendicări:

1. Procedeu de stabilizare a vinului spumant, care prevede adăugarea în vinul spumant după fermentarea secundară a licorii de expediție prealabil tratate cu acid metatartric în doză de 0,5...3,0 g/L, totodată licoarea de expediție se adaugă în vinul spumant reieșind din calculul de 25...100 mg/L de acid metatartric în produsul finit.

2. Procedeu de stabilizare a vinului spumant, care prevede adăugarea în vinul spumant după fermentarea secundară a licorii de expediție prealabil tratate cu gumă arabică sau carboximetilceluloză în doză de 1,0...4,0 g/L, totodată licoarea de expediție se adaugă în vinul spumant reieșind din calculul de 50...200 mg/L de gumă arabică sau carboximetilceluloză în produsul finit.

Șef secție:

COLESNIC Inesa

Examinator:

DUBĂSARU Nina

Redactor:

LOZOVANU Maria

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii

(21) Nr. depozit: s 2013 0122 (32) Data de prioritate recunoscută:
 (22) Data depozit: 2013.07.09 Raport de documentare internațională: ☐ da
 (71) Solicitant: **INSTITUȚIA PUBLICĂ INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE
 HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD**
 (54) **Titlul: Procedeu de fabricare a vinului spumant**

II. Clasificarea obiectului invenției:

(51) **Int.Cl:** *C12G 1/06* (2006.01)
C12H 1/00 (2006.01)
C12H 1/12 (2006.01)

III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)

MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta):

C12G 1/06
 C12H 1/00
 C12H 1/12
 stabilizarea
 gumă
 tartric
 carboximetilceluloză

"Worldwide" (Espacenet):

EA, CIS (Eapatis):

C12G 1/06
 C12H 1/00
 C12H 1/12
 стабилизация
 винная
 карбоксиметилцелулоза

SU (nonpublic):

Alte BD –
www.google.com
www.wikipedia.com

IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate

<http://vinocenter.ru/metody-stabilizacii-vina.html>
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
<http://www.spbvino.ru/content/page/id/4>

V. Documente considerate a fi relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D	Reguli generale privind fabricarea producției vinicole. Chișinău, 2010, p. 387-388	1
A, D	Pomohaci N., Cotea V., Stoian V., și alții. Îngrijirea, stabilizarea și îmbutelierea vinurilor. Oenologie. Vol. 2, Ceres, București, 2001, p. 202-203	1
A, D	Волуйко Г. Г., Мехуэла Н. А. Стабилизация виноградных вин. Агропромиздат, Москва, 1987, с. 67	1
A, D, C	Таран Н. Г., Зинченко В. И. Современные технологии стабилизации вин. ASM, Кишинев, 2006, p. 143	1
A	MD 2020 G2 2002.10.31	1
A	MD 2243 G2 2003.11.30	1
A	MD 4047 C1 2010.06.30	1
A	MD 2309 C2 2003.11.30	1
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general		T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur		E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie		D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare		C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
		& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate		L – document citat cu alte scopuri
Data finalizării documentării 2013.12.16		
Examinator DUBĂSARU Nina		