



S U O M I - F I N L A N D
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	945835
(51) Kv.1k.6 - Int.c1.6	
C 08F 8/30	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	12.12.94
(24) Alkupäivä - Löpdag	03.06.93
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	26.01.95
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/EP93/01395
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
13.06.92 DE 4219384 P	

(71) Hakija - Sökande

1. BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, BRD, (DE)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Bauer, Gerhard, Friedrich-Vogler-Strasse 4, 6940 Weinheim, BRD, (DE)
2. Aydin, Oral, Sophienstrasse 14, 6800 Mannheim 1, BRD, (DE)
3. Bott, Kaspar, Werderstrasse 57, 6800 Mannheim 1, BRD, (DE)
4. Neuhauser, Horst, Salierstrasse 24, 6724 Dudenhofen, BRD, (DE)
5. Ley, Gregor, In den Trankstuecken, 6719 Wattenheim, BRD, (DE)
6. Zosel, Albrecht, Ringweg 9, 6940 Weinheim, BRD, (DE)
7. Wild, Jochen, St.-Martin-Strasse 22, 6701 Ruppertsberg, BRD, (DE)
8. Harreus, Albrecht, Teichgasse 13, 6700 Ludwigshafen, BRD, (DE)
9. Wistuba, Eckehardt, Im Obergarten 7, 6702 Bad Duerkheim, BRD, (DE)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Dispersioita ja liuoksia, jotka sisältävät hydroksyyliamiiniyhdisteitä silloitusaineina
Dispersioner eller lösningar innehållande hydroxylaminföreningar som tvärbindningsmedel

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee radikaalipolymeroimalla aikaansaadun polymeerin, kondensaatiopolymeerin tai additiopolymeerin dispersiota tai liuosta, josta polymeerista aldehydyryhmät -CHO tai ketoryhmät -CO- muodostavat 0,001 - 20 paino-% ja joka dispersio tai liuos sisältää silloitteena yhdistettä, joka käsittää vähintään kaksi H₂N-O-ryhmää tai siitä johdettua oksiimieetteriryhmää.

Uppfinningen avser en dispersion eller lösning av polymer, kondensationspolymer eller additionspolymer, vilka har framställts via radikal polymerisation, i vilka polymerer aldehydgrupperna -CHO eller ketogruupperna -CO- bildar 0,001 - 20 vikt-% och vilken dispersion eller lösning innehåller via brobildning en förening som innehåller minst två H₂N-O-grupper eller därifrån härledda oximetergrupper.