



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118845788 A

(43) 申请公布日 2024. 10. 29

(21) 申请号 202410709847.0

A61P 5/24 (2006.01)

(22) 申请日 2018.08.14

A61P 5/38 (2006.01)

(30) 优先权数据

A61P 5/00 (2006.01)

62/545,406 2017.08.14 US

A61P 3/00 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

(62) 分案原申请数据

201880038569.3 2018.08.14

(71) 申请人 云杉生物科学公司

地址 美国加利福尼亚州

(72) 发明人 A·豪尔顿 H·格伯 M·黄

(74) 专利代理机构 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262

专利代理师 王玉桂 武晶晶

(51) Int. Cl.

A61K 31/5377 (2006.01)

A61P 15/08 (2006.01)


权利要求书2页 说明书50页 附图3页

(54) 发明名称


促肾上腺皮质激素释放因子受体拮抗剂

(57) 摘要

本发明提供了促肾上腺皮质激素释放因子受体拮抗剂。更具体地,本发明提供了包括-(4-氯-2-(吗啉-4-基)噻唑-5-基)-7-(1-乙基丙基)-2,5-二甲基吡唑并(1,5-a)嘧啶的新型药物组合物以及将所述药物组合物用于治疗先天性肾上腺皮质增生症(CAH)的方法。



1. 一种治疗有需要的受试者的先天性肾上腺皮质增生症 (CAH) 的方法, 所述方法包括施用包括化合物1:



或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物, 其中化合物1

以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

2. 根据权利要求1所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1200毫克/天之间的剂量施用。

3. 根据权利要求1或2所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1000毫克/天之间的剂量施用。


4. 根据权利要求1到3中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。

5. 根据权利要求1到4中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约100毫克/天与约600毫克/天之间的剂量施用。

6. 一种治疗有需要的受试者的先天性肾上腺皮质增生症 (CAH) 的方法, 所述方法包括:

(iv) 测量所述有需要的受试者的激素水平;


(v) 施用化合物1:



或其药学上可接受的盐或溶剂化物;

(vi) 重复步骤 (i) 和 (ii), 直到所述激素水平达到预定范围, 然后进行化合物1的每日给药的维持疗法。


7. 一种改善有需要的受试者的雄激素过多症状的方法, 所述方法包括施用包括化合物1:



或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物, 其中化合物1


以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

8. 一种治疗有需要的受试者的月经不调、排卵障碍或不孕症的方法,所述方法包括施

用包括化合物1:  或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物,


其中化合物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

9. 一种改善有需要的受试者的代谢症状的方法,所述方法包括施用包括化合物1:

 或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物,其中化合物1

以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

10. 一种改善有需要的受试者的生活质量的方法,所述方法包括施用包括化合物1:

 或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物,其中化合物1

以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用,其中治疗使生活质量得到改善。

促肾上腺皮质激素释放因子受体拮抗剂

[0001] 申请是申请日为2018年08月14日、申请号为201880038569.3、发明名称为“促肾上腺皮质激素释放因子受体拮抗剂”的中国专利申请(其对应PCT申请的申请日为2018年08月14日、申请号为(PCT/US2018/046760)的分案申请。

[0002] 交叉引用

[0003] 本申请要求于2017年8月14日提交的美国临时专利申请第62/545,406号的权益,所述美国临时申请通过引用整体并入本文。


背景技术

[0004] 促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)是一种41氨基酸肽,所述肽为垂体前叶的阿黑皮素原(POMC)源性肽分泌的主要生理调节剂。除了在垂体处起到内分泌作用外,CRF的免疫组织化学定位已经表明,所述激素在中枢神经系统中广泛分布于下丘脑外,并产生与大脑中的神经递质或神经调质作用一致的各种自主、电生理和行为效应。还有证据表明,CRF在整合免疫系统对生理、心理和免疫应激源的应答方面发挥着重要作用。

发明内容

[0005] 本发明提供了包括3-(4-氯-2-(吗啉-4-基)噻唑-5-基)-7-(1-乙基丙基)-2,5-二甲基吡唑并(1,5-a)嘧啶的新型药物组合物以及使用此类药物组合物治疗先天性肾上腺皮质增生症(CAH)的方法。

[0006] 在一方面,本公开提供了一种治疗有需要的受试者的先天性肾上腺增生症(CAH)的方法,所述方法包括施用包括化合物1:



或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物,其中化

合物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

[0008] 在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1200毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1000毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约100毫克/天与约600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约400毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以约200毫克/天的剂量施用。

[0009] 在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物呈微粒的形式。在一些实施例中,所述微粒的平均尺寸介于约1 μm 与约20 μm 之间。在一些实施例中,所述微粒的平均尺寸介于约5 μm 与约15 μm 之间。在一些实施例中,所述微粒的平均尺寸小于约10 μm 。

[0010] 在一些实施例中,所述药物组合物呈胶囊或片剂的形式。在一些实施例中,所述药物组合物呈胶囊的形式。在一些实施例中,所述胶囊为硬明胶胶囊。在一些实施例中,所述胶囊为软明胶胶囊。在一些实施例中,所述胶囊使用选自以下组成的组的材料形成:天然明胶、合成明胶、果胶、酪蛋白、胶原蛋白、蛋白质、改性淀粉、聚乙烯吡咯烷酮、丙烯酸聚合物、纤维素衍生物和其任何组合。

[0011] 在一些实施例中,所述药物组合物不含另外的赋形剂。在一些实施例中,所述药物组合物进一步包括一种或多种药学上可接受的赋形剂。

[0012] 在一些实施例中,所述药物组合物呈片剂的形式。在一些实施例中,所述药物组合物进一步包括一种或多种药学上可接受的赋形剂。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约1mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约5mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约10mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约10mg与约300mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约10mg与约100mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约50mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约100mg与约400mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约100mg与约300mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约150mg与约250mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

[0013] 在一些实施例中,所述药物组合物包括约400mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约300mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约250mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约200mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约150mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约100mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约80mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约60mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约50mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约30mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

[0014] 在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约2到约6小时的化合物1 T_{max} 。在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约3到约5小时的化合物1 T_{max} 。在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约6小时的化合物1 T_{max} 。在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约5小时的化合物1 T_{max} 。在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约4小时的化合物1 T_{max} 。在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约3小

时的化合物1T_{max}。

[0015] 在一些实施例中,所述药物组合物在进食状态下施用。在一些实施例中,所述药物组合物在禁食状态下施用。在一些实施例中,所述药物组合物每天施用一次。在一些实施例中,所述药物组合物每天施用两次。在一些实施例中,所述药物组合物每天施用三次。

[0016] 在一些实施例中,所述方法进一步包括施用糖皮质激素。在一些实施例中,与不包括施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物的方法相比,所施用的糖皮质激素的量减少。在一些实施例中,所使用的糖皮质激素的量从超生理量减少到生理量。在一些实施例中,糖皮质激素的量减少约5%、约10%、约15%、约20%、约25%、约30%、约35%、约40%、约45%、约50%、约55%或约60%。

[0017] 在一些实施例中,与高剂量糖皮质激素治疗相关的症状减少。在一些实施例中,与高剂量糖皮质激素疗法相关的所述症状为肥胖症、胰岛素抵抗、代谢异常、高血压、心血管疾病或骨质疏松症。在一些实施例中,所述糖皮质激素为倍氯米松、倍他米松、布地奈德、可的松、地塞米松、氢化可的松、甲基强的松龙、泼尼松龙、泼尼松或去炎松。

[0018] 在一些实施例中,所述糖皮质激素为氢化可的松。在一些实施例中,所述氢化可的松以小于约15毫克/天的剂量施用。在一些实施例中,所述氢化可的松以小于约10毫克/天的剂量施用。在一些实施例中,所述氢化可的松以小于约5毫克/天的剂量施用。

[0019] 在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素同时施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素按顺序施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在24小时之内按顺序施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在8小时之内按顺序施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在2小时之内按顺序施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在30分钟之内按顺序施用。


[0020] 在一些实施例中,所述方法进一步包括施用盐皮质激素。在一些实施例中,所述盐皮质激素为氟氢可的松。

[0021] 在一些实施例中,所述药物组合物在临睡前施用。在一些实施例中,所述药物组合物在睡觉前小于约4小时施用。在一些实施例中,所述药物组合物在睡觉前小于约2小时施用。在一些实施例中,所述药物组合物在睡觉前小于约30分钟施用。在一些实施例中,所述药物组合物在晚上施用。在一些实施例中,所述药物组合物在晚上约10点施用。在一些实施例中,所述药物组合物在促肾上腺皮质激素 (ACTH) 的预期昼夜节律释放之时或之前施用。在一些实施例中,所述药物组合物在促肾上腺皮质激素 (ACTH) 的预期昼夜节律释放之前约3-4小时施用。

[0022] 在一些实施例中,CAH为典型CAH。在一些实施例中,CAH为非典型CAH。

[0023] 在一方面,本公开提供了一种治疗有需要的受试者的先天性肾上腺增生症 (CAH) 的方法,所述方法包括: (i) 测量所述有需要的受试者的激素水平; (ii) 施用化合物1;

[0024]



或其药学上可接受的盐或溶剂化物;以及 (iii) 重复步骤 (i)

和 (ii), 直到所述激素水平达到预定范围, 然后进行化合物1的每日给药的维持疗法。

[0025] 在一些实施例中, 所述激素为17 α -羟基孕酮 (17-OHP)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、睾酮或雄烯二酮。在一些实施例中, 所述激素为17-OHP, 并且所述预定范围为约200ng/dL到约400ng/dL。在一些实施例中, 所述激素为ACTH, 并且所述预定范围低于约100pg/mL。在一些实施例中, 所述激素为睾酮, 并且所述预定范围为约14ng/dL到约76ng/dL。在一些实施例中, 所述激素为雄烯二酮, 并且所述预定范围在男性中为约30ng/dL到约150ng/dL。在一些实施例中, 所述激素为雄烯二酮, 并且所述预定范围在女性中为约40ng/dL到约200ng/dL。

[0026] 在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约1200毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约1000毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约400毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以约200毫克/天的剂量施用。

[0027] 在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1200毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1000毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约400毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以约50毫克/天的剂量施用。

[0028] 在一些实施例中, 化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物呈微粒的形式。在一些实施例中, 所述微粒的平均尺寸介于约1 μ m与约20 μ m之间。在一些实施例中, 所述微粒的平均尺寸介于约5 μ m与约15 μ m之间。在一些实施例中, 所述微粒的平均尺寸小于约10 μ m。

[0029] 在一些实施例中, 化合物1配制在呈胶囊或片剂形式的药物组合物中。在一些实施例中, 所述药物组合物呈胶囊的形式。在一些实施例中, 所述胶囊为硬明胶胶囊。在一些

实施例中,所述胶囊为软明胶胶囊。在一些实施例中,所述胶囊使用选自以下组成的组的材料形成:天然明胶、合成明胶、果胶、酪蛋白、胶原蛋白、蛋白质、改性淀粉、聚乙烯吡咯烷酮、丙烯酸聚合物、纤维素衍生物和其任何组合。

[0030] 在一些实施例中,所述药物组合物不含另外的赋形剂。在一些实施例中,所述药物组合物进一步包括一种或多种药学上可接受的赋形剂。在一些实施例中,所述药物组合物呈片剂的形式。在一些实施例中,所述药物组合物进一步包括一种或多种药学上可接受的赋形剂。

[0031] 在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约1mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约5mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约10mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约10mg与约300mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约10mg与约100mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约50mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约100mg与约400mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约100mg与约300mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约150mg与约250mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

[0032] 在一些实施例中,所述药物组合物包括约400mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约300mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约250mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约200mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约150mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约100mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约80mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约60mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约50mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约30mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

[0033] 在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约2到约6小时的化合物1 $T_{\max}$ 。在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约3到约5小时的化合物1 $T_{\max}$ 。在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约6小时的化合物1 $T_{\max}$ 。在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约5小时的化合物1 $T_{\max}$ 。在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约4小时的化合物1 $T_{\max}$ 。在一些实施例中,所述药物组合物在受试者中提供约3小时的化合物1 $T_{\max}$ 。

[0034] 在一些实施例中,所述药物组合物在进食状态下施用。在一些实施例中,所述药物组合物在禁食状态下施用。在一些实施例中,所述药物组合物每天施用一次。在一些实施例中,所述药物组合物每天施用两次。在一些实施例中,所述药物组合物每天施用三次。

[0035] 在一些实施例中,所述方法进一步包括施用糖皮质激素。在一些实施例中,与不包括施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物的方法相比,所施用的糖皮质激素的量减少。在一些实施例中,所使用的糖皮质激素的量从超生理量减少到生理量。在一些实施例中,糖皮质激素的量减少约5%、约10%、约15%、约20%、约25%、约30%、约35%、约40%、约45%、约50%、约55%或约60%。

[0036] 在一些实施例中,与高剂量糖皮质激素治疗相关的症状减少。在一些实施例中,与高剂量糖皮质激素疗法相关的所述症状为肥胖症、胰岛素抵抗、代谢异常、高血压、心血管疾病或骨质疏松症。在一些实施例中,所述糖皮质激素为倍氯米松、倍他米松、布地奈德、可的松、地塞米松、氢化可的松、甲基强的松龙、泼尼松龙、泼尼松或去炎松。在一些实施例中,所述糖皮质激素为氢化可的松。

[0037] 在一些实施例中,所述氢化可的松以小于约15毫克/天的剂量施用。在一些实施例中,所述氢化可的松以小于约10毫克/天的剂量施用。在一些实施例中,所述氢化可的松以小于约5毫克/天的剂量施用。

[0038] 在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素同时施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素按顺序施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在24小时之内按顺序施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在8小时之内按顺序施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在2小时之内按顺序施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在30分钟之内按顺序施用。

[0039] 在一些实施例中,所述方法进一步包括施用盐皮质激素。在一些实施例中,所述盐皮质激素为氟氢可的松。

[0040] 在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在临睡前施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在睡觉前小于约4小时施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在睡觉前小于约2小时施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在睡觉前小于约30分钟施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在晚上施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在晚上10点施用。


[0041] 在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在促肾上腺皮质激素(ACTH)的预期昼夜节律释放之时或之前施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在促肾上腺皮质激素(ACTH)的预期昼夜节律释放之前约3-4小时施用。

[0042] 在一些实施例中,CAH为典型CAH。在一些实施例中,CAH为非典型CAH。

[0043] 在一些实施例中,所述有需要的受试者为约12到约20岁。

[0044] 在一方面,本公开提供了一种改善有需要的受试者的雄激素过多症状的方法,所述方法包括施用包括化合物1:

[0045]




或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物,其中化合

物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,所述雄激素过多症状选自自由以下组成的组:痤疮、多毛症和脱发。

[0046] 在一方面,本公开提供了一种治疗有需要的受试者的月经不调、排卵障碍或不孕症的方法,所述方法包括施用

[0047]

包括化合物1:




或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组

合物,其中化合物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

[0048] 在一方面,本公开提供了一种改善有需要的受试者的代谢症状的方法,所述方法

包括施用

包括化合物1:




或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组

合物,其中化合物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,所述代谢症状选自自由以下组成的组:体重、BMI、腰围、血压和血糖控制。

[0049] 在一方面,本公开提供了一种改善有需要的受试者的生活质量的方法,所述方法包括施用包括化合物1:

[0050]



或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物,其中化合

物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天的剂量施用,其中治疗使生活质量得到改善。

[0051] 通过引用并入

[0052] 本说明书中所提及的所有公开、专利以及专利申请通过引用并入本文,其程度如同每个单独的公开、专利或专利申请被专门地且单独地指示通过引用并入。

附图说明

[0053] 本发明的新颖特征在所附权利要求中具体阐述。通过参考以下对说明性实施例进行阐述的详细说明以及附图,将获得对本发明的特征和优点的更好理解,所述实施例中利用了本发明的原理,在附图中:

[0054] 图1示出了以每个水平每天给药一次14天后,患有CAH的患者中的化合物1;

[0055] 图2展示了由于施用化合物1而产生的跨不同受试者的ACTH衰减;

[0056] 图3展示了由于施用化合物1而产生的17-OHP的减少;

[0057] 图4展示了由于施用化合物而产生的雄烯二酮的减少。

具体实施方式

[0058] CRF已经涉及精神病状和神经疾病(包含抑郁症和焦虑症)以及以下:阿尔茨海默氏病(Alzheimer's disease)、亨廷顿氏病(Huntington's disease)、进行性核上性麻痹、肌萎缩侧索硬化症、帕金森氏病(Parkinson's disease)、癫痫、偏头痛、酒精和物质滥用及相关戒断症状、肥胖症、代谢综合征、先天性肾上腺皮质增生症(CAH)、库兴氏病(Cushing's disease)、高血压、中风、肠易激综合征、应激性胃溃疡、经前综合征、性功能障碍、早产、炎症性病状、过敏、多发性硬化症、内脏痛、睡眠病状、垂体肿瘤或异位垂体源性肿瘤、慢性疲劳综合征和纤维肌痛。

[0059] 已经鉴定出CRF受体亚型CRF1和CRF2,并且所述CRF受体亚型在大脑内非均匀分布,由此表明潜在的功能多样性。例如,广泛分布的大脑CRF1受体在暴露于环境应激源时与情绪密切相关。值得注意的是,CRF1受体而非CRF2受体似乎对选择性的焦虑样行为进行介导。更具离散性的隔膜下丘脑分布和替代性内源性配体的可用性表明CRF2受体具有不同的功能作用。例如,据报道,相对于CRF1受体,对CRF2具有优先亲和力的新型CRF家族神经肽会抑制食欲,而不会产生在选择性CRF1激动的情况下观察到的行为激活情况。在其它情况下,CRF2激动产生的影响与针对CRF1拮抗剂或CRF1基因缺失报告的影响类似。例如,虽然已经提出将CRF2激动剂作为抗肥胖剂,但CRF1拮抗剂对于肥胖症而言也可能是一种重要治疗方法。

[0060] 对CAH的治疗基于根据婴儿期到成年期的诊断使用各种药物使激素和类固醇水平正常化。糖皮质激素目前是CAH的标准治疗方法,其既用于纠正内源性皮质醇缺乏,也用于降低垂体中升高的ACTH水平,ACTH水平升高是雄激素产量增加的驱动因素。与皮质醇替代疗法足以进行治疗的爱迪生氏病(Addison's disease)(肾上腺功能不全)的治疗不同,CAH的治疗还必须降低ACTH产量,以同样控制随后的雄激素过量。因此,糖皮质激素治疗的目标包含皮质醇替代疗法和ACTH抑制,以防止女性的男性化和月经失调。需要盐皮质激素替代疗法以达到正常的血浆肾素活性,从而维持患有盐消耗形式的CAH的患者的正常血压、电解质平衡和容量状态。

[0061] 糖皮质激素治疗方案必须支持正常的生理机能,并且还必须确保在可能引发强烈

应激反应(例如, 并发疾病、运动、低血压)的事件期间可以获得足够的皮质醇。还需要进行仔细监测, 以避免因治疗不足而引起阿狄森氏综合征(Addisonian syndrome)。盐皮质激素治疗过度可能导致高血压, 而治疗不足可能导致低血压、盐流失、疲劳和对糖皮质激素的需求增加。用于监测治疗功效的典型实验室测试包含测量17-OHP、雄烯二酮、睾酮、肾素活性和电解质的血浆浓度。

[0062] 在患有CAH的成人患者中, 心血管疾病(包含肥胖症、高血压和胰岛素抵抗)的风险因子的普遍率增加。一项针对一大群小儿CAH患者和成人CAH患者的研究(n=244)表明, 虽然为患者开具了各种糖皮质激素治疗方案, 但患者经常表现出激素控制不良和上述不良后果。CAH的治疗包含用糖皮质激素(儿童通常使用氢化可的松, 而成人通常使用治疗指数较窄的更有效的药剂, 如地塞米松)和盐皮质激素(通常为氟氢可的松)(对于失盐, 如过必要的话)使皮质醇缺乏正常化。然而, 实现对过量雄激素的充分抑制所需的糖皮质激素剂量通常远高于患有爱迪生氏病的患者中仅用于皮质醇替代疗法的正常生理剂量。糖皮质激素暴露的这种增加可能导致CAH患者的心血管风险因子增加、葡萄糖耐受不良和骨密度降低。

[0063] CRF被认为是促肾上腺皮质激素(“ACTH”)、 β -内啡肽和其它促黑皮素原(“POMC”)源性肽从垂体前叶的基底释放和应激诱导释放的主要生理调节剂。CRF的分泌通过与CRF₁受体(G蛋白偶联受体B类家族的成员)结合使垂体前叶中的皮质激素释放ACTH。

[0064] 由于CRF₁的生理学意义, 具有显著CRF受体结合活性并且能够拮抗CRF₁受体的具有生物活性的小分子的形成仍然是期望的目标, 并且一直是正在进行的针对焦虑症、抑郁症、肠易激综合征、创伤后应激病状和物质滥用的治疗的研究和开发的主题。

[0065] 在下丘脑促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)的控制下, 垂体激素ACTH刺激胆固醇的摄取并驱动孕烯醇酮的合成, 从而引发肾上腺中的类固醇生成。肾上腺皮质由三个区域构成, 这些区域产生不同种类的激素, 其中许多激素通过这一途径被ACTH动员性胆固醇驱动。由于突变或缺失而引起的这些酶的缺乏使底物浓度增加。在通过21-羟化酶基因(CYP21A2)的突变或缺失产生的最常见形式的CAH中, 肾上腺由于类固醇前体、孕酮和17-羟孕酮(17-OHP)的积累而产生强效雄激素。在这些情况下, 17-OHP的血浆水平可能达到正常浓度的10-1000倍。这些增加导致雄激素, 特别是雄烯二酮、睾酮和二羟基睾酮的过量产生, 从而导致女性男性化。此外, CAH中的21-羟化酶缺乏导致糖皮质激素和盐皮质激素, 特别是皮质醇和醛固酮的生物合成不足。皮质醇是下丘脑CRF分泌和垂体ACTH释放的关键负反馈调节剂。糖皮质激素合成和释放的缺乏会消除对下丘脑和垂体的约束, 从而使ACTH水平升高。过度的ACTH刺激导致束状带和网状带的肥大, 从而导致肾上腺增生。

[0066] 在一个实施例中, 可用于治疗CAH的CRF受体拮抗剂为3-(4-氯-2-(吗啉-4-基)噻唑-5-基)-7-(1-乙基丙基)-2,5-二甲基吡唑并(1,5-a)嘧啶。

[0067] 某些定义

[0068] 除非另外定义, 否则本文所用的所有技术术语和科学术语的含义与本领域的普通技术人员通常所理解的含义相同。虽然在本文描述的实施例的实践或测试中可以使用类似于或等同于本文描述的方法和材料的任何方法和材料, 但是现在描述某些优选的方法、装置和材料。

[0069] 如本文和所附权利要求中所使用的, 单数形式“一个/一种(a, an)”和“所述”包含复数指代物, 除非上下文另外明确指出。因此, 例如, 提及“一种赋形剂”即提及本领域的技

术人员已知的一种或多种赋形剂和其等效物,等等。

[0070] 贯穿本申请,术语“约”用于表示某个值包含用于测定所述值的装置或方法的标准误差水平。

[0071] 权利要求中对术语“或”的使用用于意指“和/或”,除非明确指出其仅指代替方案或替代方案相互排斥,但本公开支持仅指代替方案以及指代“和/或”的定义。

[0072] 术语“包括”、“具有”和“包含”为开放式连接动词。这些动词中的一个或多个的任何形式或时态,如“包括(comprises)”、“包括(comprising)”、“具有(has)”、“具有(having)”、“包含(includes)”和“包含(including)”,也是开放式的。例如,任何“包括”、“具有”或“包含”一个或多个步骤的方法不限于仅拥有那些一个或多个步骤,并且还涵盖其它未列出的步骤。

[0073] 当与治疗剂结合使用时,“施用”是指全身施用治疗剂或局部施用治疗剂,如直接施用到靶组织中或上,或是指对患者施用治疗剂,由此治疗剂积极影响其靶组织。药物组合物的“施用”可以通过注射、局部施用和口服施用或通过仅其它方法或其它方法与其它已知技术的组合来实现。

[0074] “药学上可接受的”意味着载体、稀释剂或赋形剂必须与组合物的其它成分相容,并且对其接受者无害。

[0075] 术语“药物组合物”是指包括至少一种活性成分(如化合物1)的组合物,借此所述组合物适于在哺乳动物(例如但不限于人)中研究指定的功效性结果。本领域的普通技术人员将理解和领会适合于基于技术人员的需要测定活性成分是否具有期望的功效性结果的技术。

[0076] 术语“超生理量”描述的是与健康个体中所见的平均水平相比升高的激素水平。

[0077] 术语“生理量”描述的是健康个体中所见的平均激素水平。

[0078] 本文所用的“治疗有效量”或“有效量”是指研究者、兽医、医生或其它临床医生寻求在组织、系统、动物、个体或人中引起生物或药物反应的活性化合物或药剂的量,所述生物或药物反应包含以下中的一个或多个:(1) 预防疾病;例如,预防可能易患疾病、病症或病状但尚未经历或显示出疾病的病理或症状的个体的所述疾病、病症或病状,(2) 抑制疾病;例如,抑制经历或显示出疾病、病症或病状的病理或症状的个体的所述疾病、病症或病状(即,阻止病理和/或症状的进一步发展),和(3) 减轻疾病;例如,减轻经历或显示出疾病、病症或病状的病理或症状的个体的所述疾病、病症或病状(即,逆转病理和/或症状)。


[0079] 本文使用的术语“治疗(treat)”、“治疗(treated)”、“治疗(treatment)”或“治疗(treating)”在一些实施例中指治疗性治疗,而在其它实施例中指预防性(prophylactic或preventative)措施,其中目的是预防或减缓(减轻)不期望的生理学病症、病状或疾病,或获得有益或期望的临床结果。出于本文所述的目的,有益的或期望的临床结果包含但不限于缓解症状;减轻病症、病状或疾病的程度;稳定病症、病状或疾病的状态(即,使其不恶化);延迟病症、病状或疾病的发作或减缓其进展;改善病症、病状或疾病状态;和缓解(无论是部分地还是全部)(无论是可检测的还是不可检测的)或增强或改善病症、病状或疾病。治疗包含引发临床上显著的反应,而不会产生过度水平的副作用。治疗还包含与未接受治疗的情况下的预期生存期相比延长生存期。治疗的预防性益处包含预防病症、延缓病症进展、稳定病症或降低病症发生的可能性。如本文所用的,“治疗(treat)”、“经

治疗(treated)”、“治疗(treatment)”或“治疗(treating)”在一些实施例中包含预防。

[0080] 尽管本文中已经示出并描述了本发明的优选实施例,但是对于本领域的技术人员来说将明显的是,此类实施例仅通过举例方式提供。在不背离本发明的情况下,本领域的技术人员现在将想到许多变化、改变和替代。应理解的是,在实践本发明时可以采用在本文描述的本发明的实施例的各种替代方案。意图是,以下权利要求限定本发明的范围,并且以下权利要求覆盖处于这些权利要求和其等效物的范围内的方法和结构。

[0081] 化合物

[0082] 本文公开了3-(4-氯-2-(吗啉-4-基)噻唑-5-基)-7-(1-乙基丙基)-2,5-二甲基吡唑并[1,5-a]嘧啶(或替代性地,4-(4-氯-5-(2,5-二甲基-7-(戊-3-基)吡唑并[1,5-a]嘧啶-3-基)噻唑-2-基)吗啉)、其药学上可接受的盐和/或溶剂化物:



在一些实施例中,将4-(4-氯-5-(2,5-二甲基-7-(戊-3-

基)吡唑并[1,5-a]嘧啶-3-基)噻唑-2-基)吗啉称为化合物1。在一些实施例中,将3-(4-氯-2-(吗啉-4-基)噻唑-5-基)-7-(1-乙基丙基)-2,5-二甲基吡唑并[1,5-a]嘧啶称为化合物1。

[0084] 药物组合物

[0085] 本文公开了一种包含化合物1的药物组合物、其药学上可接受的盐和/或溶剂化物。

[0086] 剂型

[0087] 在一些实施例中,本文所述的药物组合物以单位剂型提供。如本文所用的,“单位剂型”是根据良好的医学实践适合于以单个剂量向动物(优选地,哺乳动物)受试者施用的含有一定量化合物1的组合物。然而,制备单个剂型或单位剂型并不意味着所述剂型每天施用一次或每个治疗疗程施用一次。设想的是,此类剂型每天施用一次、两次、三次或更多次,并且可以以输注方式施用经一段时间(例如,约30分钟到约2-6小时),或者可以以连续输注方式施用,并且可以在治疗疗程期间给予一次以上,但是未具体排除单次施用。

[0088] 药物组合物以适合于待治疗(或预防)疾病的方式施用。合适的剂量以及合适的施用时长和频率将由如患者的状况、患者疾病的类型和严重性、活性成分的具体形式以及施用方法等因素决定。通常,合适的剂量和治疗方案以足以提供治疗和/或预防益处(例如,临床结果改善,如完全或部分缓解更加频繁、或无疾病和/或整体生存期更长或症状严重性减轻)的量提供一种或多种组合物。最佳剂量通常使用实验模型和/或临床试验来测定。最佳剂量取决于患者的身体质量、体重或血容量。

[0089] 在一些实施例中,本文所述的药物组合物被配制为口服剂型。合适的口服剂型包含例如片剂、丸剂、小袋或胶囊。在一些实施例中,所述药物组合物包括一种或多种另外的药学上可接受的赋形剂。关于药学上可接受的赋形剂的列表,参见例如《雷明顿:药学科学

与实践(Remington:The Science and Practice of Pharmacy)》(Gennaro,第21版,麦克出版有限公司(Mack Pub.Co.),伊斯顿,宾夕法尼亚州(2005))。

[0090] 胶囊

[0091] 在一些实施例中,所述药物组合物被配制为胶囊。在一些实施例中,所述药物组合物被配制为硬凝胶胶囊。在一些实施例中,所述药物组合物被配制为软凝胶胶囊。

[0092] 在一些实施例中,所述胶囊使用包含但不限于以下的材料形成:天然或合成明胶、果胶、酪蛋白、胶原蛋白、蛋白质、改性淀粉、聚乙烯吡咯烷酮、丙烯酸聚合物、纤维素衍生物或其任何组合。在一些实施例中,所述胶囊使用以下形成:防腐剂、着色剂和遮光剂、调味剂和甜味剂、糖、耐胃液物质或其任何组合。在一些实施例中,所述胶囊经过包衣。在一些实施例中,覆盖所述胶囊的包衣包含但不限于即释包衣、保护性包衣、肠溶包衣或迟释包衣、缓释包衣、屏障包衣、密封包衣或其组合。在一些实施例中,本文中的胶囊是硬的或软的。在一些实施例中,所述胶囊是无缝的。在一些实施例中,将所述胶囊拆开,使得颗粒洒在软食物上且不经咀嚼吞咽。在一些实施例中,所述胶囊的形状和尺寸也可以有所变化。胶囊形状的实例包含但不限于圆形、椭圆形、管状、长方形、螺旋状或非标准形状。所述胶囊的尺寸可以根据颗粒的体积而变化。在一些实施例中,基于颗粒和粉末的体积调整胶囊的尺寸。硬明胶胶囊或软明胶胶囊可以根据常规方法制造为包括标准胶囊形状的单主体单元。单主体软明胶胶囊通常可以以例如3到22量滴(1量滴等于0.0616mL)的尺寸和椭圆形、长方形或其它形状的形状提供。明胶胶囊还可以根据常规方法制造为例如通常呈标准形状和各种标准尺寸(通常命名为(000)、(00)、(0)、(1)、(2)、(3)、(4)和(5))的密封或未密封的两件式硬明胶胶囊。最大数字对应于最小尺寸。在一些实施例中,本文所述的药物组合物(例如,胶囊)整体吞咽。

[0093] 在一些实施例中,所述胶囊包括一种或多种药学上可接受的赋形剂。在一些实施例中,所述胶囊不含另外的赋形剂。

[0094] 在一些实施例中,针对不溶性原料药开发、制造并商业化胶囊。在一些实施例中,如果在水中的溶解度小于0.002mg/mL,则原料药是不溶的。在一些实施例中,所述胶囊的剂量强度高达200mg。在一些实施例中,所述胶囊中的原料药使用USP设备I在溶出介质中立即释放。在一些实施例中,所述胶囊中的原料药使用USP设备II在溶出介质中立即释放。

[0095] 片剂

[0096] 难溶性药物可能难以使用如高剪切湿法制粒等标准技术来配制。难溶性药物的最佳递送可能需要复杂的技术,如固溶体或无定形分散体(热熔挤出或喷雾干燥)、纳米调配物或基于脂质的调配物。疏水性原料药可能根据USP标准被视为难溶的,并且已知难以用水和其它赋形剂进行制粒。这可能是由于用于即释调配物的大多数已知赋形剂是水溶性的或水溶胀性的。制备难溶的高剂量原料药的片剂可能需要高浓度的原料药。然而,当药物浓度增加到超过一定水平时,颗粒形成可能变得越来越困难。此外,在一定的载药量下,颗粒形成可能变得不可能。

[0097] 在一些实施例中,所述药物组合物被配制为片剂。

[0098] 在一些实施例中,所述片剂任选地用一种或多种药学上可接受的赋形剂通过压缩、模制或挤出来制备。在一些实施例中,压缩片剂通过压缩任选地与药学上可接受的赋形剂混合的呈自由流动形式的化合物1制备。在一些实施例中,模制片剂通过模制用惰性液体

稀释剂润湿的粉末状化合物1的混合物制备。在一些实施例中,所述片剂通过热熔挤出制备。在一些实施例中,挤出片剂通过在受控条件下迫使包括化合物1的混合物穿过孔口或模具来制备。在一些实施例中,所述片剂经过包衣或刻痕。在一些实施例中,所述片剂被配制成提供化合物1的缓释或控释。在一些实施例中,针对不溶性原料药开发、制造并商业化片剂。在一些实施例中,如果在水中的溶解度小于0.002mg/mL,则原料药是不溶的。在一些实施例中,所述片剂的剂量强度高达200mg。在一些实施例中,所述片剂中的原料药使用USP设备I在溶出介质中立即释放。在一些实施例中,所述片剂中的原料药使用USP设备II在溶出介质中立即释放。

[0099] 在一些实施例中,片剂尺寸小于约1000mg、小于约800mg、小于约600mg、小于约400mg或小于约200mg。在一些实施例中,所述片剂的剂量强度大于约50mg、大于约100mg、大于约150mg、大于约200mg或大于约250mg。在一些实施例中,对于大于约50mg的剂量强度,所述片剂尺寸小于约1000mg。在一些实施例中,对于大于约100mg的剂量强度,片剂尺寸小于800mg。在一些实施例中,对于大于约150mg的剂量强度,片剂尺寸小于600mg。在一些实施例中,对于大于约200mg的剂量强度,片剂尺寸小于400mg。在一些实施例中,对于200mg的剂量强度,片剂尺寸小于400mg。在一些实施例中,所述片剂的超过约20%溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约40%溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约50%溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约60%溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约70%溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约80%溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约20%在不到24小时内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约20%在不到12小时内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约20%在不到6小时内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约20%在不到3小时内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约20%在不到2小时内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约20%在不到60分钟内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约40%在不到60分钟内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约50%在不到60分钟内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约60%在不到60分钟内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约70%在不到60分钟内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过约80%在不到60分钟内溶出在常规溶出介质中。在一些实施例中,所述片剂的超过70%在60分钟内溶出在常规溶出介质中。

[0100] 在一些实施例中,所述片剂以商业规模生产。

[0101] 在一些实施例中,所述片剂包括一种或多种药学上可接受的赋形剂。

[0102] 在一些实施例中,所述片剂用包衣材料(例如,密封剂)包衣。在一些实施例中,所述包衣材料是水溶性的。在一些实施例中,所述包衣材料包括聚合物、增塑剂、颜料或其任何组合。在一些实施例中,所述包衣材料呈薄膜包衣的形式,例如光泽薄膜、非pH依赖性薄膜包衣、水性薄膜包衣、干粉薄膜包衣(例如,完全干粉薄膜包衣)或其任何组合。在一些实施例中,所述包衣材料是高粘性的。在一些实施例中,所述包衣材料提供低水渗透水平。在一些实施例中,所述包衣材料提供氧气屏障保护。在一些实施例中,所述包衣材料允许立即崩解以实现化合物1的速释。在一些实施例中,所述包衣材料是着色的、透明的或白色的。在

一些实施例中,包衣为肠溶包衣。示例性包衣材料包含但不限于:聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、丙烯酸酯-甲基丙烯酸共聚物、甲基丙烯酸酯-甲基丙烯酸共聚物、醋酸邻苯二甲酸纤维素、醋酸琥珀酸纤维素、羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酸酯、羟丙基甲基纤维素醋酸琥珀酸酯、聚醋酸乙烯邻苯二甲酸酯、虫胶、醋酸偏苯三酸纤维素、海藻酸钠、玉米蛋白和其任何组合。

[0103] 药学上可接受的赋形剂

[0104] 在一些实施例中,所述药物组合物包括药学上可接受的赋形剂。在一些实施例中,所述组合物不含药学上可接受的赋形剂。本文所用的术语“药学上可接受的赋形剂”是指适于向哺乳动物施用的一种或多种相容的固体或包封物质。本文所用的术语“相容的”意味着组合物的组分能够以不存在相互作用的方式与主题化合物混合并且能够彼此混合,所述相互作用在普通使用情况下将大幅降低组合物的药物功效。在一些实施例中,药学上可接受的赋形剂的纯度足够高且毒性足够低,以使其适于优选地向被治疗的动物,优选地哺乳动物施用。

[0105] 可以充当药学上可接受的赋形剂的物质的一些实例包含:

[0106] • 氨基酸,如丙氨酸、精氨酸、天冬酰胺、天冬氨酸、半胱氨酸、谷氨酰胺、谷氨酸、甘氨酸、组氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、丝氨酸、苏氨酸、色氨酸、酪氨酸和缬氨酸。在一些实施例中,氨基酸为精氨酸。在一些实施例中,氨基酸为L-精氨酸。

[0107] • 单糖,如葡萄糖(右旋糖)、阿拉伯糖、甘露醇、果糖(左旋糖)和半乳糖。

[0108] • 纤维素和其衍生物,如羧甲基纤维素钠、乙基纤维素和甲基纤维素。

[0109] • 固体润滑剂,如滑石、硬脂酸、硬脂酸镁和硬脂酰富马酸钠。

[0110] • 多元醇,如丙二醇、甘油、山梨醇、甘露醇和聚乙二醇。

[0111] • 乳化剂,如聚山梨醇酯。

[0112] • 润湿剂,如月桂基硫酸钠、**Tween®**、司盘、烷基硫酸盐和乙氧基化烷基硫酸盐。

[0113] • 稀释剂,如碳酸钙、微晶纤维素、磷酸钙、淀粉、预胶化淀粉、碳酸钠、甘露醇和乳糖。

[0114] • 粘合剂,如淀粉(玉米淀粉和马铃薯淀粉)、明胶、蔗糖羟丙基纤维素(HPC)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和羟丙基甲基纤维素(HPMC)。

[0115] • 崩解剂,如淀粉和藻酸。

[0116] • 超级崩解剂,如lac-di-sol、交联羧甲基纤维素钠、羟基乙酸淀粉钠和交联聚维酮。

[0117] • 助流剂,如二氧化硅。

[0118] • 着色剂,如FD&C染料。

[0119] • 甜味剂和调味剂,如阿斯巴甜、糖精、薄荷醇、薄荷和水果调味剂。

[0120] • 防腐剂,如苯扎氯铵、PHMB、氯丁醇、硫柳汞、乙酸苯汞、硝酸苯汞、对羟基苯甲酸酯和苯甲酸钠。

[0121] • 张力调节剂,如氯化钠、氯化钾、甘露醇和甘油。

[0122] • 抗氧化剂,如亚硫酸氢钠、丙酮亚硫酸氢钠、甲醛次硫酸钠、硫脲和EDTA。

- [0123] • pH调节剂,如NaOH、碳酸钠、乙酸钠、HCl和柠檬酸。
- [0124] • 冷冻保护剂,如磷酸钠或磷酸钾、柠檬酸、酒石酸、明胶和碳水化合物(如右旋糖、甘露醇和葡聚糖)。
- [0125] • 阳离子表面活性剂,如西曲溴铵、苯扎氯铵和氯化十六烷基吡啶。
- [0126] • 阴离子表面活性剂,如烷基硫酸盐、烷基乙氧基硫酸盐、脂肪酸盐、羧酸盐、硫酸盐和磺酸盐。
- [0127] • 非离子表面活性剂,如聚氧乙烯衍生物、聚氧丙烯衍生物、多元醇衍生物、多元醇酯、聚氧乙烯酯、泊洛沙姆、乙二醇酯、甘油酯、山梨糖醇酐衍生物、聚乙二醇(PEG-40、PEG-50、PEG-55)和脂肪醇的醚。
- [0128] • 有机材料,如碳水化合物和改性碳水化合物、乳糖、 α -乳糖一水合物、喷雾干燥乳糖和无水乳糖、淀粉和预糊化淀粉、蔗糖、甘露醇、山梨醇、纤维素、粉状纤维素和微晶纤维素。
- [0129] • 无机材料,如磷酸钙(无水磷酸氢钙、磷酸氢钙和磷酸钙)。
- [0130] • 共加工稀释剂。
- [0131] • 表面活性剂,如月桂基硫酸钠。
- [0132] • 压缩助剂。
- [0133] • 防粘剂,如二氧化硅和滑石。

[0134] 量

[0135] 在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约400mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约300mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约200mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约100mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约90mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约80mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约70mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约60mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约50mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约40mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约30mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约1mg与约20mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或

药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括介于约50mg与约70mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

[0141] 在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约100mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约100mg与约400mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约100mg与约300mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约150mg与约250mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括介于约100mg与约200mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

[0142] 在一些实施例中,所述药物组合物包括约500mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约400mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约300mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约250mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约200mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约150mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约100mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约90mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约80mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约70mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约60mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约50mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约40mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约30mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约20mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,所述药物组合物包括约10mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

[0143] 颗粒尺寸

[0144] 在一些实施例中,所述药物组合物在呈片剂或胶囊形式时包括呈微粒的形式的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸为约1 μ m到约100 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸为约1 μ m到约50 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸为约1 μ m到约30 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸为约1 μ m到约20 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸为约5 μ m到约15 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸为约1 μ m到约10 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸为约3 μ m到约10 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸为约4 μ m到约9 μ m。

[0145] 在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸小于约100 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸小于约80 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸小于约60 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸小于约50 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸小于约40 μ m。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸小于约30 μ m。在一

些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸小于约20 μm 。在一些实施例中,化合物1的微粒的平均尺寸小于约10 μm 。

[0146] 药代动力学

[0147] 在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约1到约8小时的 T_{max} 。在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约2到约7小时的 T_{max} 。在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约2到约6小时的 T_{max} 。在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约3到约5小时的 T_{max} 。

[0148] 在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约8小时的 T_{max} 。在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约7小时的 T_{max} 。在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约6小时的 T_{max} 。在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约5小时的 T_{max} 。在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约4小时的 T_{max} 。在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约3小时的 T_{max} 。在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约2小时的 T_{max} 。在一些实施例中,化合物1被配制为胶囊或片剂以在受试者中提供约1小时的 T_{max} 。

[0149] 稳定性

[0150] 本文所述的药物组合物在包含冷藏条件、环境条件和加速条件的各种储存条件下稳定。本文所用的稳定是指药物组合物在给定的储存期结束时初始化合物1的量为约95%或更多并且总杂质或相关物质的量为约5%w/w或更少。杂质的百分比是根据杂质相对于化合物1的量计算的。稳定性通过HPLC或任何其它已知的测试方法进行评估。在一些实施例中,稳定的药物组合物具有约5%w/w、约4%w/w、约3%w/w、约2.5%w/w、约2%w/w、约1.5%w/w、约1%w/w或约0.5%w/w的总杂质或相关物质。在其它实施例中,稳定的药物组合物具有约5%w/w的总杂质或相关物质。在又其它实施例中,稳定的药物组合物具有约4%w/w的总杂质或相关物质。在又其它实施例中,稳定的药物组合物具有约3%w/w的总杂质或相关物质。在又其它实施例中,稳定的药物组合物具有约2%w/w的总杂质或相关物质。在又其它实施例中,稳定的药物组合物具有约1%w/w的总杂质或相关物质。

[0151] 在冷藏条件下,本文所述的药物组合物稳定,持续至少1个月、至少2个月、至少3个月、至少6个月、至少9个月、至少12个月、至少15个月、至少18个月、至少24个月、至少30个月和至少36个月。在一些实施例中,冷藏条件为 $5 \pm 5^\circ\text{C}$ 。在一些实施例中,冷藏条件为约 0°C 、约 0.1°C 、约 0.2°C 、约 0.3°C 、约 0.4°C 、约 0.5°C 、约 0.6°C 、约 0.7°C 、约 0.8°C 、约 0.9°C 、约 1°C 、约 1.1°C 、约 1.2°C 、约 1.3°C 、约 1.4°C 、约 1.5°C 、约 1.6°C 、约 1.7°C 、约 1.8°C 、约 1.9°C 、约 2°C 、约 2.1°C 、约 2.2°C 、约 2.3°C 、约 2.4°C 、约 2.5°C 、约 2.6°C 、约 2.7°C 、约 2.8°C 、约 2.9°C 、约 3°C 、约 3.1°C 、约 3.2°C 、约 3.3°C 、约 3.4°C 、约 3.5°C 、约 3.6°C 、约 3.7°C 、约 3.8°C 、约 3.9°C 、约 4°C 、约 4.1°C 、约 4.2°C 、约 4.3°C 、约 4.4°C 、约 4.5°C 、约 4.6°C 、约 4.7°C 、约 4.8°C 、约 4.9°C 、约 5°C 、约 5.1°C 、约 5.2°C 、约 5.3°C 、约 5.4°C 、约 5.5°C 、约 5.6°C 、约 5.7°C 、约 5.8°C 、约 5.9°C 、约 6°C 、约 6.1°C 、约 6.2°C 、约 6.3°C 、约 6.4°C 、约 6.5°C 、约 6.6°C 、约 6.7°C 、约 6.8°C 、约 6.9°C 、约 7°C 、约 7.1°C 、约 7.2°C 、约 7.3°C 、约 7.4°C 、约 7.5°C 、约 7.6°C 、约 7.7°C 、约 7.8°C 、约 7.9°C 、约 8°C 、约 8.1°C 、约 8.2°C 、约 8.3°C 、约 8.4°C 、约 8.5°C 、约 8.6°C 、约 8.7°C 、

约8.8℃、约8.9℃、约9℃、约9.1℃、约9.2℃、约9.3℃、约9.4℃、约9.5℃、约9.6℃、约9.7℃、约9.8℃、约9.9℃或约10℃。在加速条件下,本文所述的药物组合物稳定,持续至少1个月、至少2个月、至少3个月、至少4个月、至少5个月、至少6个月、至少7个月、至少8个月、至少9个月、至少10个月、至少11个月、至少12个月、至少18个月或至少24个月。本文所述药物组合物的加速条件包含处于或高于环境水平的温度(例如,25±5℃)。在一些情况下,加速条件为约40±2℃。在一些情况下,加速条件为约35℃、约40℃、约45℃、约50℃、约55℃或约60℃。本文所述药物组合物的加速条件还包含处于或高于环境水平的相对湿度(RH)(55±10% RH)。在其它情况下,加速条件为高于约65% RH、约70% RH、约75% RH或约80% RH。在另外的情况下,加速条件为环境湿度下约40℃或60℃。在又另外的情况下,加速条件为75±5% RH湿度下约40±2℃。

[0152] 在一些实施例中,所述药物组合物在约5±5℃到25±5℃下稳定,持续至少12个月。在一个实施例中,所述药物组合物在约5±5℃下稳定,持续至少12个月。在一个实施例中,所述药物组合物在约25±5℃下稳定,持续至少12个月。在一个实施例中,所述药物组合物在约5±5℃下稳定,持续至少24个月。在一个实施例中,所述药物组合物在约25±5℃下稳定,持续至少24个月。


[0153] 使用方法

[0154] 本文公开了一种治疗有需要的受试者的先天性肾上腺皮质增生症(CAH)的方法,所述方法包括施用包括化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物。在一些实施例中,CAH为典型CAH。在一些实施例中,CAH为非典型CAH。在一些实施例中,本文所述的方法使激素水平降低。此类激素包含脱氧皮质酮、11-脱氧皮质醇、皮质醇、皮质酮、醛固酮、孕烯醇酮、17 α -羟孕烯醇酮、孕酮、17 α -羟孕酮(17-OHP)、脱氢表雄酮、雄烯二醇、雄烯二酮、睾酮、二氢睾酮、雌酮、雌二醇、雌三醇和促肾上腺皮质激素(ACTH)。在一些实施例中,本文所述的方法使17 α -羟孕酮(17-OHP)减少。在一些实施例中,本文所述的方法使促肾上腺皮质激素(ACTH)(也称为促肾上腺皮质激素)减少。

[0155] 本文还公开了一种治疗有需要的受试者的先天性肾上腺皮质增生症(CAH)的方法,所述方法包括:

[0156] (i) 测量所述有需要的受试者的激素水平;

[0157] (ii) 施用化合物1:



[0159] (iii) 重复步骤(i)和(ii),直到所述激素水平达到预定范围,然后进行化合物1的每日给药的维持疗法。

[0160] 在一些实施例中,激素为17 α -羟孕酮(17-OHP)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、睾酮或雄烯二酮。

[0161] 在一些实施例中,激素为17-OHP,并且预定范围为约200ng/dL到约400ng/dL。在一些实施例中,激素为17-OHP,并且预定范围为小于约400ng/dL、小于约350ng/dL、小于约300ng/dL、小于约250ng/dL或小于约200ng/dL。

[0162] 在一些实施例中,激素为ACTH,并且预定范围为低于约100pg/mL。在一些实施例中,激素为ACTH,并且预定范围为低于约100pg/mL、低于约90pg/mL或低于约80pg/mL。

[0163] 在一些实施例中,激素为睾酮,并且预定范围为约14ng/dL到约76ng/dL。在一些实施例中,激素为睾酮,并且预定范围为小于约76ng/dL、小于约70ng/dL、小于约65ng/dL、小于约60ng/dL、小于约55ng/dL、小于约50ng/dL、小于约45ng/dL、小于约40ng/dL、小于约35ng/dL、小于约30ng/dL、小于约25ng/dL、小于约20ng/dL或小于约15ng/dL。

[0164] 在一些实施例中,激素为雄烯二酮,并且预定范围在男性中为约30ng/dL到约200ng/dL。在一些实施例中,激素为雄烯二酮,并且预定范围在男性中为小于约200ng/dL、小于约150ng/dL、小于约100ng/dL、小于约50ng/dL或小于约30ng/dL。

[0165] 在一些实施例中,激素为雄烯二酮,并且预定范围在女性中为约40ng/dL到约150ng/dL。在一些实施例中,激素为雄烯二酮,并且预定范围在女性中为小于约150ng/dL、小于约100ng/dL、小于约50ng/dL、或小于约40ng/dL。

[0166] 在一些实施例中,本文所述的方法包含每月一次、每月两次、每月三次、每周一次、每周两次、每周三次、每两天一次、每天一次、每天两次、每天三次或每天四次地施用包括化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物。在一些实施例中,本文所述的方法每天一次地施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,本文所述的方法每天两次地施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

[0167] 在一些实施例中,本文所述的方法包含每天施用约1mg到约2000mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,化合物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约50毫克/天与约1500毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约50毫克/天与约1400毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约50毫克/天与约1300毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约50毫克/天与约1200毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约50毫克/天与约1100毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约50毫克/天与约1000毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约50毫克/天与约900毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约50毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约60毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约70毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约80毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约90毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约100毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约100毫克/天与约700毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约100毫克/天与约600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约150毫克/天与约600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约200毫克/天与约600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约200毫克/天与约500毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以介于约200毫克/天与约

400毫克/天之间的剂量施用。

[0168] 在一些实施例中,化合物1以约500毫克/天的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以约400毫克/天的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以约300毫克/天的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以约200毫克/天的剂量施用。在一些实施例中,化合物1以约100毫克/天的剂量施用。

[0169] 在一些实施例中,每天施用约100mg到约1600mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约200mg到约1600mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约200mg到约1200mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约200mg到约1000mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约200mg到约800mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约100mg到约800mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约200mg到约800mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约100mg到约600mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约200mg到约600mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约300mg到约600mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约100mg到约400mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约200mg到约400mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用约300mg到约400mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

[0170] 在一些实施例中,每天施用少于约2000mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约1800mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约1600mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约1400mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约1200mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约1000mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约800mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约600mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约500mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约400mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约300mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。在一些实施例中,每天施用少于约200mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

[0171] 在一些实施例中,本文所述的方法包含施用本文所述的药物组合物,其中所述受试者处于进食状态。在一些实施例中,本文所述的方法包含施用本文所述的药物组合物,其中所述受试者处于禁食状态。

[0172] 在一些实施例中,本文所述的方法包含在临睡前施用本文所述的药物组合物。

[0173] 在一些实施例中,本文所述的方法包含在睡觉前小于约4小时施用本文所述的药物组合物。在一些实施例中,本文所述的方法包含在睡觉前小于约3小时施用本文所述的药物组合物。在一些实施例中,本文所述的方法包含在睡觉前小于约2小时施用本文所述的药物组合物。在一些实施例中,本文所述的方法包含在睡觉前小于约1小时施用本文所述的药


物组合物。在一些实施例中,本文所述的方法包含在睡觉前小于约30分钟施用本文所述的药物组合物。

[0174] 在一些实施例中,本文所述的方法包含在晚上施用本文所述的药物组合物。

[0175] 在一些实施例中,本文所述的方法包含在晚上约11点施用本文所述的药物组合物。在一些实施例中,本文所述的方法包含在晚上约10点施用本文所述的药物组合物。在一些实施例中,本文所述的方法包含在晚上约9点施用本文所述的药物组合物。在一些实施例中,本文所述的方法包含在晚上约8点施用本文所述的药物组合物。

[0176] 在一些实施例中,本文所述的方法包含在促肾上腺皮质激素 (ACTH) 的预期昼夜节律释放之时或之前施用本文所述的药物组合物。在一些实施例中,本文所述的方法包含在促肾上腺皮质激素 (ACTH) 的预期昼夜节律释放前约3-4小时施用本文所述的药物组合物。在一些实施例中,所述有需要的受试者为约12到约20岁。

[0177] 在一方面,本公开提供了一种改善有需要的受试者的雄激素过多症状的方法,所述方法包括施用包括化合物1:




或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物,其中化

合物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,所述雄激素过多症状选自以下组成的组:痤疮、多毛症和脱发。

[0179] 在一方面,本公开提供了一种治疗有需要的受试者的月经不调、排卵障碍或不孕

症的方法,所述方法包括施用包括化合物1:




或其药学上可接受的盐或

溶剂化物的药物组合物,其中化合物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

[0180] 在一方面,本公开提供了一种改善有需要的受试者的代谢症状的方法,所述方法


包括施用包括化合物1:



或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组

合物,其中化合物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,所述代谢症状选自由以下组成的组:体重、BMI、腰围、血压和血糖控制。

[0181] 在一方面,本公开提供了一种改善有需要的受试者的生活质量的方法,所述方法包括施用包括化合物1:



[0182]

或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物,其中化合

物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天的剂量施用,其中治疗使生活质量得到改善。

[0183] 组合疗法

[0184] 本文公开了一种治疗有需要的受试者的先天性肾上腺皮质增生症 (CAH) 的方法,所述方法包括施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素的组合。在一些实施例中,与不包括施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物的方法相比,所施用的糖皮质激素的量减少。

[0185] 在一些实施例中,本文所述的方法将所施用的糖皮质激素的量从超生理量减少到生理量。

[0186] 在一些实施例中,本文所述的方法减少与高剂量糖皮质激素疗法有关的症状。在一些实施例中,与高剂量糖皮质激素疗法相关的所述症状为肥胖症、胰岛素抵抗、代谢异常、高血压、心血管疾病或骨质疏松症。

[0187] 在一些实施例中,与不包括施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物的方法相比,所施用的糖皮质激素的量减少约5%、约10%、约15%、约20%、约25%、约30%、约35%、约40%、约45%、约50%、约55%、约60%、约65%、约70%、约80%或约90%。在一些实施例中,与不包括施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物的方法相比,所施用的糖皮质激素的量减少约5%、约10%、约15%、约20%、约25%、约30%、约35%、约40%、约45%、约50%、约55%或约60%。

[0188] 在一些实施例中,与不包括施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物的方法相比,所施用的糖皮质激素的量减少约1%到约90%、约1%到约60%、约1%到约30%、约1%到约10%、约10%到约50%、约10%到约40%、约10%到约30%、约15%到约25%、约20%到约30%、约5%到约25%、约20%到约50%、约30%到约60%或约40%到约70%。

[0189] 在一些实施例中,糖皮质激素以介于约0.1毫克/天与约25毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约20毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约15毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约12毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约11毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约10毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约9毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约8毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约7毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约6毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约5毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约4毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约3毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约1毫克/天与约2毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约3毫克/天与约13毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约5毫克/天与约11毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约8毫克/天与约11毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约9毫克/天与约12毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约9毫克/天与约10毫克/天之间的剂量施用。在一些实施例中,糖皮质激素以介于约5毫克/天与约10毫克/天之间的剂量施用。

[0190] 在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素同时施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在一种药物组合物中施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在单独的药物组合物中同时施用。

[0191] 在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素按顺序施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在24小时之内施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在12小时之内施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在8小时之内施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在6小时之内施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在4小时之内施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在2小时之内施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在1小时之内施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在30分钟之内施用。在一些实施例中,化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和糖皮质激素在10分钟之内施用。

[0192] 在一些实施例中,所述糖皮质激素为倍氯米松、倍他米松、布地奈德、可的松、地塞米松、氢化可的松、甲基强的松龙、泼尼松龙、泼尼松或去炎松。在一些实施例中,所述糖皮质激素为氢化可的松。

[0193] 在一些实施例中,糖皮质激素为氢化可的松,并且所施用的剂量小于15-25毫克/天的推荐剂量。

[0194] 在一些实施例中,糖皮质激素为泼尼松,并且所施用的剂量小于5-7.5毫克/天的推荐剂量。


[0195] 在一些实施例中,糖皮质激素为泼尼松龙,并且所施用的剂量小于4-6毫克/天的推荐剂量。

[0196] 在一些实施例中,糖皮质激素为地塞米松,并且所施用的剂量小于0.25-0.5毫克/天的推荐剂量。

[0197] 本文公开了一种治疗有需要的受试者的先天性肾上腺皮质增生症 (CAH) 的方法,所述方法包括施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物糖皮质激素;和任选地盐皮质激素的组合。在一些实施例中,盐皮质激素为氟氢可的松,并且剂量小于0.05-0.2毫克/天的推荐剂量。

[0198] 本发明提供了包括但不限于以下实施方式:

[0199] 1.一种治疗有需要的受试者的先天性肾上腺皮质增生症 (CAH) 的方法,所述方法包括施用包括化合物1:



物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

[0201] 2.根据实施方式1所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1200毫克/天之间的剂量施用。

[0202] 3.根据实施方式1或2所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1000毫克/天之间的剂量施用。

[0203] 4.根据实施方式1到3中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。

[0204] 5.根据实施方式1到4中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约100毫克/天与约600毫克/天之间的剂量施用。

[0205] 6.根据实施方式1到5中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约400毫克/天之间的剂量施用。

[0206] 7.根据实施方式1到6中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以约200毫克/天的剂量施用。

[0207] 8.根据实施方式1到7中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物呈微粒的形式。

[0208] 9.根据实施方式8所述的方法,其中所述微粒的平均尺寸介于约1 μ m与约20 μ m之间。

[0209] 10.根据实施方式8或9所述的方法,其中所述微粒的平均尺寸介于约5 μ m与约15 μ m之间。

- [0210] 11. 根据实施方式8到10中任一项所述的方法, 其中所述微粒的平均尺寸小于约10 μm 。
- [0211] 12. 根据实施方式1到11中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物呈胶囊或片剂的形式。
- [0212] 13. 根据实施方式1到12中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物呈胶囊的形式。
- [0213] 14. 根据实施方式13所述的方法, 其中所述胶囊为硬明胶胶囊。
- [0214] 15. 根据实施方式13所述的方法, 其中所述胶囊为软明胶胶囊。
- [0215] 16. 根据实施方式13到15中任一项所述的方法, 其中所述胶囊使用选自以下组成的组的材料形成: 天然明胶、合成明胶、果胶、酪蛋白、胶原蛋白、蛋白质、改性淀粉、聚乙烯吡咯烷酮、丙烯酸聚合物、纤维素衍生物和其任何组合。
- [0216] 17. 根据实施方式13到16中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物不含另外的赋形剂。
- [0217] 18. 根据实施方式13到16中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物进一步包括一种或多种药学上可接受的赋形剂。
- [0218] 19. 根据实施方式1到12中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物呈片剂的形式。
- [0219] 20. 根据实施方式19所述的方法, 其中所述药物组合物进一步包括一种或多种药学上可接受的赋形剂。
- [0220] 21. 根据实施方式1到20中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约1mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0221] 22. 根据实施方式1到21中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约5mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0222] 23. 根据实施方式1到22中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约10mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0223] 24. 根据实施方式1到23中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约10mg与约300mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0224] 25. 根据实施方式1到24中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约10mg与约100mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0225] 26. 根据实施方式1到23中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约50mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0226] 27. 根据实施方式1到23中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约100mg与约400mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0227] 28. 根据实施方式1到24中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约100mg与约300mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0228] 29. 根据实施方式1到24中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约150mg与约250mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0229] 30. 根据实施方式1到23中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约400mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

- [0230] 31. 根据实施方式1到24中任一项所述的方法,其中所述药物组合物包括约300mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0231] 32. 根据实施方式1到24中任一项所述的方法,其中所述药物组合物包括约250mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0232] 33. 根据实施方式1到24中任一项所述的方法,其中所述药物组合物包括约200mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0233] 34. 根据实施方式1到24中任一项所述的方法,其中所述药物组合物包括约150mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0234] 35. 根据实施方式1到25中任一项所述的方法,其中所述药物组合物包括约100mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0235] 36. 根据实施方式1到25中任一项所述的方法,其中所述药物组合物包括约80mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0236] 37. 根据实施方式1到25中任一项所述的方法,其中所述药物组合物包括约60mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0237] 38. 根据实施方式1到25中任一项所述的方法,其中所述药物组合物包括约50mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0238] 39. 根据实施方式1到25中任一项所述的方法,其中所述药物组合物包括约30mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0239] 40. 根据实施方式1到39中任一项所述的方法,其中所述药物组合物在受试者中提供约2到约6小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0240] 41. 根据实施方式1到40中任一项所述的方法,其中所述药物组合物在受试者中提供约3到约5小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0241] 42. 根据实施方式1到40中任一项所述的方法,其中所述药物组合物在受试者中提供约6小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0242] 43. 根据实施方式1到41中任一项所述的方法,其中所述药物组合物在受试者中提供约5小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0243] 44. 根据实施方式1到41中任一项所述的方法,其中所述药物组合物在受试者中提供约4小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0244] 45. 根据实施方式1到41中任一项所述的方法,其中所述药物组合物在受试者中提供约3小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0245] 46. 根据实施方式1到45中任一项所述的方法,其中所述药物组合物在进食状态下施用。
- [0246] 47. 根据实施方式1到45中任一项所述的方法,其中所述药物组合物在禁食状态下施用。
- [0247] 48. 根据实施方式1到47中任一项所述的方法,其中所述药物组合物每天施用一次。
- [0248] 49. 根据实施方式1到47中任一项所述的方法,其中所述药物组合物每天施用两次。
- [0249] 50. 根据实施方式1到47中任一项所述的方法,其中所述药物组合物每天施用三

次。

[0250] 51. 根据实施方式1到50中任一项所述的方法,其进一步包括施用糖皮质激素。

[0251] 52. 根据实施方式51所述的方法,其中与不包括施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物的方法相比,所施用的糖皮质激素的量减少。

[0252] 53. 根据实施方式52所述的方法,其中所使用的糖皮质激素的量从超生理量减少到生理量。

[0253] 54. 根据实施方式52所述的方法,其中糖皮质激素的量减少约5%、约10%、约15%、约20%、约25%、约30%、约35%、约40%、约45%、约50%、约55%或约60%。

[0254] 55. 根据实施方式52到54中任一项所述的方法,其中与高剂量糖皮质激素疗法相关的症状减少。

[0255] 56. 根据实施方式55所述的方法,其中与高剂量糖皮质激素疗法相关的所述症状为肥胖症、胰岛素抵抗、代谢异常、高血压、心血管疾病或骨质疏松症。

[0256] 57. 根据实施方式51到56中任一项所述的方法,其中所述糖皮质激素为倍氯米松、倍他米松、布地奈德、可的松、地塞米松、氢化可的松、甲基强的松龙、泼尼松龙、泼尼松或去炎松。

[0257] 58. 根据实施方式51到57中任一项所述的方法,其中所述糖皮质激素为氢化可的松。

[0258] 59. 根据实施方式58所述的方法,其中所述氢化可的松以小于约15毫克/天的剂量施用。

[0259] 60. 根据实施方式58或59所述的方法,其中所述氢化可的松以小于约10毫克/天的剂量施用。

[0260] 61. 根据实施方式58到60中任一项所述的方法,其中所述氢化可的松以小于约5毫克/天的剂量施用。

[0261] 62. 根据实施方式51到61中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素同时施用。

[0262] 63. 根据实施方式51到62中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素按顺序施用。

[0263] 64. 根据实施方式51到62中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在24小时之内按顺序施用。

[0264] 65. 根据实施方式51到62中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在8小时之内按顺序施用。

[0265] 66. 根据实施方式51到62中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在2小时之内按顺序施用。

[0266] 67. 根据实施方式51到62中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在30分钟之内按顺序施用。

[0267] 68. 根据实施方式1到67中任一项所述的方法,其进一步包括施用盐皮质激素。

[0268] 69. 根据实施方式68所述的方法,其中所述盐皮质激素为氟氢可的松。

[0269] 70. 根据实施方式1到69中任一项所述的方法,其中所述药物组合物在临睡前施用。

[0270] 71. 根据实施方式1到70中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在睡觉前小于约4小时施用。

[0271] 72. 根据实施方式1到70中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在睡觉前小于约2小时施用。

[0272] 73. 根据实施方式1到70中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在睡觉前小于约30分钟施用。

[0273] 74. 根据实施方式1到70中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在晚上施用。

[0274] 75. 根据实施方式1到70中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在晚上约10点施用。

[0275] 76. 根据实施方式1到70中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在促肾上腺皮质激素 (ACTH) 的预期昼夜节律释放之时或之前施用。

[0276] 77. 根据实施方式1到70中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在促肾上腺皮质激素 (ACTH) 的预期昼夜节律释放之前约3-4小时施用。

[0277] 78. 根据实施方式1到77中任一项所述的方法, 其中CAH为典型CAH。


[0278] 79. 根据实施方式1到77中任一项所述的方法, 其中CAH为非典型CAH。

[0279] 80. 一种治疗有需要的受试者的先天性肾上腺皮质增生症 (CAH) 的方法, 所述方法包括:

[0280] (iv) 测量所述有需要的受试者的激素水平;

[0281] (v) 施用化合物1:

[0282]



或其药学上可接受的盐或溶剂化物;

[0283] (vi) 重复步骤 (i) 和 (ii), 直到所述激素水平达到预定范围, 然后进行化合物1的每日给药的维持疗法。

[0284] 81. 根据实施方式80所述的方法, 其中所述激素为17 α -羟基孕酮 (17-OHP)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、睾酮或雄烯二酮。

[0285] 82. 根据实施方式81所述的方法, 其中所述激素为17-OHP, 并且所述预定范围为约200ng/dL到约400ng/dL。

[0286] 83. 根据实施方式81所述的方法, 其中所述激素为ACTH, 并且所述预定范围为低于约100pg/mL。

[0287] 84. 根据实施方式81所述的方法, 其中所述激素为睾酮, 并且所述预定范围为约14ng/dL到约76ng/dL。

[0288] 85. 根据实施方式81所述的方法, 其中所述激素为雄烯二酮, 并且所述预定范围在男性中为约30ng/dL到约150ng/dL。

[0289] 86. 根据实施方式81所述的方法, 其中所述激素是雄烯二酮, 并且所述预定范围在

女性中为约40ng/dL到约200ng/dL。

[0290] 87. 根据实施方式80到86中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

[0291] 88. 根据实施方式80到87中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约1200毫克/天之间的剂量施用。

[0292] 89. 根据实施方式80到88中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约1000毫克/天之间的剂量施用。

[0293] 90. 根据实施方式80到89中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。

[0294] 91. 根据实施方式80到90中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约600毫克/天之间的剂量施用。

[0295] 92. 根据实施方式80到91中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约200毫克/天与约400毫克/天之间的剂量施用。

[0296] 93. 根据实施方式80到92中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以约200毫克/天的剂量施用。

[0297] 94. 根据实施方式80到86中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

[0298] 95. 根据实施方式94所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1200毫克/天之间的剂量施用。

[0299] 96. 根据实施方式94或95所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约1000毫克/天之间的剂量施用。

[0300] 97. 根据实施方式94到96中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约800毫克/天之间的剂量施用。

[0301] 98. 根据实施方式94到97中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与约600毫克/天之间的剂量施用。

[0302] 99. 根据实施方式94到98中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于约50毫克/天与400毫克/天之间的剂量施用。

[0303] 100. 根据实施方式94到99中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以介于50毫克/天与200毫克/天之间的剂量施用。

[0304] 101. 根据实施方式94到99中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物以约50毫克/天的剂量施用。

[0305] 102. 根据实施方式80到101中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物呈微粒的形式。

[0306] 103. 根据实施方式102所述的方法, 其中所述微粒的平均尺寸介于约1 μ m与约20 μ m之间。

[0307] 104. 根据实施方式102或103所述的方法, 其中所述微粒的平均尺寸介于约5 μ m与约15 μ m之间。

[0308] 105. 根据实施方式102到104中任一项所述的方法, 其中所述微粒的平均尺寸小于约10 μ m。

- [0309] 106. 根据实施方式80到105中任一项所述的方法, 其中化合物1配制在呈胶囊或片剂的形式药物组合物中。
- [0310] 107. 根据实施方式106所述的方法, 其中所述药物组合物呈胶囊的形式。
- [0311] 108. 根据实施方式107所述的方法, 其中所述胶囊为硬明胶胶囊。
- [0312] 109. 根据实施方式107所述的方法, 其中所述胶囊为软明胶胶囊。
- [0313] 110. 根据实施方式106到109中任一项所述的方法, 其中所述胶囊使用选自以下组成的组的材料形成: 天然明胶、合成明胶、果胶、酪蛋白、胶原蛋白、蛋白质、改性淀粉、聚乙烯吡咯烷酮、丙烯酸聚合物、纤维素衍生物和其任何组合。
- [0314] 111. 根据实施方式106到110中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物不含另外的赋形剂。
- [0315] 112. 根据实施方式106到110中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物进一步包括一种或多种药学上可接受的赋形剂。
- [0316] 113. 根据实施方式106所述的方法, 其中所述药物组合物呈片剂的形式。
- [0317] 114. 根据实施方式113所述的方法, 其中所述药物组合物进一步包括一种或多种药学上可接受的赋形剂。
- [0318] 115. 根据实施方式106到114中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约1mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0319] 116. 根据实施方式106到115中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约5mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0320] 117. 根据实施方式106到116中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约10mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0321] 118. 根据实施方式106到117中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约10mg与约300mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0322] 119. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约10mg与约100mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0323] 120. 根据实施方式106到117中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约50mg与约500mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0324] 121. 根据实施方式106到117中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约100mg与约400mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0325] 122. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约100mg与约300mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0326] 123. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括介于约150mg与约250mg之间的化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0327] 124. 根据实施方式106到117中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约400mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0328] 125. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约300mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0329] 126. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约250mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。

- [0330] 127. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约200mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0331] 128. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约150mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0332] 129. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约100mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0333] 130. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约80mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0334] 131. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约60mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0335] 132. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约50mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0336] 133. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物包括约30mg化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物。
- [0337] 134. 根据实施方式106到133中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在受试者中提供约2到约6小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0338] 135. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在受试者中提供约3到约5小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0339] 136. 根据实施方式106到118中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在受试者中提供约6小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0340] 137. 根据实施方式106到135中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在受试者中提供约5小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0341] 138. 根据实施方式106到135中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在受试者中提供约4小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0342] 139. 根据实施方式106到135中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在受试者中提供约3小时的化合物1 $T_{\max}$ 。
- [0343] 140. 根据实施方式106到139中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在进食状态下施用。
- [0344] 141. 根据实施方式106到140中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物在禁食状态下施用。
- [0345] 142. 根据实施方式106到141中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物每天施用一次。
- [0346] 143. 根据实施方式106到141中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物每天施用两次。
- [0347] 144. 根据实施方式106到141中任一项所述的方法, 其中所述药物组合物每天施用三次。
- [0348] 145. 根据实施方式80到144中任一项所述的方法, 其进一步包括施用糖皮质激素。
- [0349] 146. 根据实施方式145所述的方法, 其中与不包括施用化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物的方法相比, 所施用的糖皮质激素的量减少。

[0350] 147. 根据实施方式145所述的方法,其中所使用的糖皮质激素的量从超生理量减少到生理量。

[0351] 148. 根据实施方式145所述的方法,其中糖皮质激素的量减少约5%、约10%、约15%、约20%、约25%、约30%、约35%、约40%、约45%、约50%、约55%或约60%。

[0352] 149. 根据实施方式145到148中任一项所述的方法,其中与高剂量糖皮质激素疗法相关的症状减少。

[0353] 150. 根据实施方式149所述的方法,其中与高剂量糖皮质激素疗法相关的所述症状为肥胖症、胰岛素抵抗、代谢异常、高血压、心血管疾病或骨质疏松症。

[0354] 151. 根据实施方式145到150中任一项所述的方法,其中所述糖皮质激素为倍氯米松、倍他米松、布地奈德、可的松、地塞米松、氢化可的松、甲基强的松龙、泼尼松龙、泼尼松或去炎松。

[0355] 152. 根据实施方式145到151中任一项所述的方法,其中所述糖皮质激素为氢化可的松。

[0356] 153. 根据实施方式152所述的方法,其中所述氢化可的松以小于约15毫克/天的剂量施用。

[0357] 154. 根据实施方式152或153所述的方法,其中所述氢化可的松以小于约10毫克/天的剂量施用。

[0358] 155. 根据实施方式152到154中任一项所述的方法,其中所述氢化可的松以小于约5毫克/天的剂量施用。

[0359] 156. 根据实施方式152到155中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素同时施用。

[0360] 157. 根据实施方式152到155中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素按顺序施用。

[0361] 158. 根据实施方式152到155中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在24小时之内按顺序施用。

[0362] 159. 根据实施方式152到155中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在8小时之内按顺序施用。

[0363] 160. 根据实施方式152到155中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在2小时之内按顺序施用。

[0364] 161. 根据实施方式152到155中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物和所述糖皮质激素在30分钟之内按顺序施用。

[0365] 162. 根据实施方式80到161中任一项所述的方法,其进一步包括施用盐皮质激素。

[0366] 163. 根据实施方式162所述的方法,其中所述盐皮质激素为氟氢可的松。

[0367] 164. 根据实施方式80到163中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在临睡前施用。

[0368] 165. 根据实施方式80到163中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在睡觉前小于约4小时施用。

[0369] 166. 根据实施方式80到163中任一项所述的方法,其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在睡觉前小于约2小时施用。

[0370] 167. 根据实施方式80到163中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在睡觉前小于约30分钟施用。

[0371] 168. 根据实施方式80到163中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在晚上施用。

[0372] 169. 根据实施方式80到163中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在晚上10点施用。

[0373] 170. 根据实施方式80到163中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在促肾上腺皮质激素 (ACTH) 的预期昼夜节律释放之时或之前施用。


[0374] 171. 根据实施方式80到163中任一项所述的方法, 其中化合物1或其药学上可接受的盐或溶剂化物在促肾上腺皮质激素 (ACTH) 的预期昼夜节律释放之前约3-4小时施用。

[0375] 172. 根据实施方式80到171中任一项所述的方法, 其中CAH为典型CAH。

[0376] 173. 根据实施方式80到171中任一项所述的方法, 其中CAH为非典型CAH。

[0377] 174. 根据实施方式1到173中任一项所述的方法, 其中所述有需要的受试者为约12岁到约20岁。


[0378] 175. 一种改善有需要的受试者的雄激素过多症状的方法, 所述方法包括施用包括化合物1:



物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

[0380] 176. 根据实施方式175所述的方法, 其中所述雄激素过多症状选自由以下组成的组: 痤疮、多毛症和脱发。


[0381] 177. 一种治疗有需要的受试者的月经不调、排卵障碍或不孕症的方法, 所述方法



合物, 其中化合物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

[0382] 178. 一种改善有需要的受试者的代谢症状的方法, 所述方法包括施用包括化合物1:

[0383]




或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物,其中化合

物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用。

[0384] 179. 根据实施方式178所述的方法, 其中所述代谢症状选自由以下组成的组: 体重、BMI、腰围、血压和血糖控制。

[0385] 180. 一种改善有需要的受试者的生活质量的方法, 所述方法包括施用包括化合物1:

[0386]



或其药学上可接受的盐或溶剂化物的药物组合物, 其中化合

物1以介于约50毫克/天与约1600毫克/天之间的剂量施用, 其中治疗使生活质量得到改善。

[0387] 实例

[0388] 以下实例进一步说明本发明, 但不应被解释为以任何方式限制本发明的范围。具体地, 处理条件仅仅是示例性的, 并且本领域的普通技术人员可以容易地改变所述处理条件。

[0389] 除非本文中另外指明或另外明显与上下文矛盾, 否则可以按合适的顺序执行本文中描述的所有方法。本文中提供的任何和所有实例或示例性语言 (例如, “如”) 的使用仅旨在更好地说明本发明, 而不对本发明的范围构成限制, 除非另外指示。除非另有说明, 否则本文中使用的技术术语和科学术语的含义与本发明所属领域的技术人员通常所理解的含义相同。

[0390] 实例1: 药物组合物

[0391] 将药物组合物制造为含有200mg被微粒化为平均尺寸为10微米或更小的化合物1的1号白色硬明胶胶囊。药物组合物不含另外的赋形剂。

[0392] 实例2: 药物组合物的稳定性

[0393] 稳定性数据汇总

[0394] 表1中提供了药物组合物稳定性研究的汇总。药物组合物为化合物1, 所述化合物以3种强度配置——1mg、5mg和50mg——整齐地填充到未添加赋形剂的0号胶囊中。将胶囊泡罩包装在聚氯乙烯 (PVC) 基薄膜中。

[0395] 在长期和加速条件下, 在这三个批次中未观察到整个稳定性研究过程中评估的属性中的任何属性的任何显著趋势。

[0396] 表1. 稳定性汇总

批号	强度	CCS	稳定性 条件	可获得 数据
[0397]	#1	PVC 基泡罩包 装	25°C/60% RH	6 个月
			40°C/75% RH	6 个月
	#2	PVC 基泡罩包 装	25°C/60% RH	6 个月
			40°C/75% RH	6 个月
	#3	PVC 基泡罩包 装	25°C/60% RH	6 个月
			40°C/75% RH	6 个月
	#4	75 mL HDPE 瓶	25°C/60% RH	1 个月
			40°C/75% RH	9 个月
	#5	30 mL HDPE 瓶	25°C/60% RH	6 个月
			40°C/75% RH	6 个月
	#6	30 mL HDPE 瓶	25°C/60% RH	6 个月
			40°C/75% RH	6 个月

[0398] CCS=容器封塞系统;CRC=儿童安全封口;DoM=生产日期;HDPE=高密度聚乙烯;
PVC=聚氯乙烯

[0399] 稳定性方案

[0400] 表2、表3和表4提供了各种药物组合物的稳定性方案。

[0401] 表2. 稳定性方案

[0402]

测试	接受标准	时间（月）			
		T ₀	1	3	6
外观	0 号蓝色胶囊含有黄色粉末，泡罩包装和箔背衬完好	X	A,B	A,B	A,B
测定	报告（标示量%）	X	A,B	A,B	A,B
有关物质	报告 RRT 和每个单独物种%以及总计	X	A,B	A,B	A,B
崩解度	报告	X	A,B	A,B	A,B

[0403] RRT=相对保留时间

[0404] X-研究开始时执行的测试

[0405] A-在25±2°C/60±5% RH的长期条件下储存的样品B-在40±2°C/75±5% RH的加速条件下储存的样品

[0406] 表3. 稳定性方案 (30mL HDPE瓶中200mg胶囊)

测试	接受标准	时间 (月)			
		T ₀	1	3	6
外观	1 号白色胶囊含有灰白色至黄色粉末	X	A,B	A,B	A,B
测定 (%LC)	90.0-110.0	X	A,B	A,B	A,B
有关物质 任何未指定杂质 (%)	≤1.0 ≤2.0	X	A,B	A,B	A,B
总杂质 (%)					
崩解度 (分钟)	NMT 15	X	A,B	A,B	A,B
水活性	报告结果	X	A,B	A,B	A,B

[0408] LC=标示量;NMT=不超过

[0409] X-研究开始时执行的测试

[0410] A-在 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}/60 \pm 5\%$ RH的长期条件下储存的样品B-在 $40 \pm 2^{\circ}\text{C}/75 \pm 5\%$ RH的加速条件下储存的样品

[0411] 表4.待用于第2阶段临床研究的批次的稳定性方案(30mL HDPE瓶中200mg胶囊)

测试	接受标准	时间 (月)					
		T ₀	1	3	6	9	12
外观	1 号白色胶囊含有灰白色至黄色粉末	X	B	A,B	A,B	A	A
测定 (%LC)	90.0-110.0	X	B	A,B	A,B	A	A
有关物质 任何未指定杂质 (%)	≤1.0 ≤2.0	X	B	A,B	A,B	A	A
总杂质 (%)							
崩解度 (分钟)	NMT 15	X	B	A,B	A,B	A	A
水活性	报告结果	X	n/a	n/a	n/a	A	A
微生物计数 好氧微生物总计数 (CFU/g) 酵母和霉菌组合总计数 (CFU/g)	NMT 2000 CFU/g NMT 200 CFU/g	X	n/a	n/a	n/a	A	A
对指定微生物大肠杆菌的测试 (/g)	不存在	X	n/a	n/a	n/a	A	A

[0413] CFU=菌落形成单位;LC=标示量;n/a=不适用;NMT=不超过X-研究开始时执行

的测试

[0414] A-在 $25\pm 2^{\circ}\text{C}/60\pm 5\%$ RH的长期条件下储存的样品

[0415] B-在 $40\pm 2^{\circ}\text{C}/75\pm 5\%$ RH的加速条件下储存的样品

[0416] 支持性数据表明,药物组合物稳定,持续至少6个月(研究结束)。在长期条件和加速条件下未观察到不利趋势。在整个研究中测定结果是一致的,并且在稳定性研究期间未观察到新的相关物质种类。储存在泡罩包装配置中的批次的所报告的稳定性结果被视为支持30mL HDPE瓶、感应密封和防儿童开启瓶盖的更新包装配置。任一种配置中都没有赋形剂,并且两种配置都可以避光。

[0417] 实例3:第1阶段临床研究

[0418] 已经在健康成年志愿者中在2项第1阶段研究中研究了化合物1。

[0419] 研究1是一项首次在人体中进行的研究,其研究了口服给予的化合物1的单次递增剂量对健康成人受试者的安全性、耐受性和PK。安全性和耐受性评估是在较大范围的单一口服剂量内进行的,并且直到对先前剂量的安全性数据进行了审查之后才进行剂量递增。来自这项研究的数据用于研究2的剂量选择。

[0420] 由2个部分组成的多剂量研究(研究2)测定化合物1的重复每日剂量的安全性和耐受性,并研究对酒精依赖治疗的相关性的生物标志物的影响。B部分研究化合物1与咪达唑仑(细胞色素P450 3A4[CYP3A4]底物)的相互作用,从而测定化合物1是否显著抑制由CYP3A4代谢的药物的代谢。

[0421] 在研究1中,以2mg、10mg、50mg、150mg、400mg或800mg(在进食状态下)和150mg(在禁食状态下)的单个P0剂量向健康成年受试者施用化合物1。在稍晚时间出现吸收,从而实现在进食状态下给药后介于4到6小时的峰值 $C_{\max}$ 。

[0422] 表5提供了每种剂量水平下的PK参数的汇总。当在进食状态下给予化合物1时,达到最大血浆浓度的中位时间($T_{\max}$) 在4与6小时之间出现。当在禁食状态下以150mg给予化合物1时,中位 $T_{\max}$ 为10.05小时且范围介于6与12小时之间,从而表明在禁食状态下吸收可能延迟。单个P0剂量(进食和禁食状态)后的平均半衰期($t_{1/2}$) 介于31与44小时之间,范围为11到101小时。表观分布容积(V_z/F) 较大且似乎可变性较大,其中在2个最高剂量水平400mg和800mg下观察到最大可变性。

[0423] 表5. 化合物1在以单个口服剂量向健康志愿者(全都为进食状态)施用后的药代动力学参数汇总

PK 参数	几何平均数 (CV%)					
	分析物 = 血浆化合物 1					
	2 mg	10 mg	50 mg	150 mg	400 mg	800 mg
N	6	6	6	6	6	6
$C_{\max}$ (ng/mL)	0.867 (53)	3.01 (87)	19.5 (39)	93.4 (22)	207 (92)	382 (110)
$T_{\max}^a$ (小 时)	6.00 (4.00- 6.00)	4.00 (2.00- 6.00)	4.00 (3.00-6.00)	4.00 (3.00- 6.00)	4.00 (3.00- 6.00)	6.00 (4.00- 6.00)
$t_{1/2}^b$ (小 时)	NC (NC)	NC (NC)	31 (10.8- 53.4)	29.2 (20.0- 41.5)	44.2 (20.2- 101)	41.9 (24.1- 67.8)
$AUC_{0-t_{\text{最后}}}$ (ng•h/mL)	NC (NC)	NC (NC)	152 (60)	891 (26)	2300 (103)	4390 (100)
$AUC_{0-\infty}$ (ng•h/mL)	NC (NC)	NC (NC)	165 (64)	956 (25)	2580 (93)	4850 (95)
CL/F (L/h)	NC (NC)	NC (NC)	302 (64)	157 (25)	155 (93)	165 (95)
V_z/F (L)	NC (NC)	NC (NC)	13500 (45)	6620 (38)	9890 (212)	9970 (144)
V_{ss}/F (L)	NC (NC)	NC (NC)	8080 (36)	4600 (33)	6580 (152)	6820 (120)

[0425] AUC = 血浆浓度-时间曲线下的面积; CL/F = 口服清除率; $C_{\max}$ = 最大血浆浓度; CV = 变化系数; NC = 无法计算; $t_{1/2}$ = 消除半衰期; $T_{\max}$ = 达到最大血浆浓度的时间; V_{ss}/F = 稳态时的分布容积; V_z/F = 终末阶段的分布容积

[0426] a中位数 (范围)

[0427] b几何平均数 (范围)

[0428] 作为此单剂量递增研究的一部分,进行食物效应PK研究,以检查在150mg剂量水平下在进食状态和禁食状态两者下化合物1的暴露情况。在这2个给药组中的每个给药组中,总共向6名受试者施用150mg化合物1。在这6名受试者中,4名受试者在进食状态和禁食状态下接受相同剂量的化合物1。与在标准化早餐后5分钟内给予的相同剂量下的平均浓度-时间曲线相比,在禁食状态下施用化合物1产生更平坦的平均浓度-时间曲线(即,具有显著更低的吸收)。150mg剂量在进食状态下产生的平均 $AUC_{0-\infty}$ 值和 $C_{\max}$ 值分别为禁食状态下的值的约3倍和11倍。表6提供了在进食状态和禁食状态两者下在150mg剂量水平下的PK参数的汇总。

[0429] 表6. 化合物1在以单个口服剂量向健康志愿者施用后的药代动力学参数汇总 (进食状态相对于禁食状态)

药代动力学参数	几何平均数 (CV%)	
	分析物 = 血浆化合物 1	
	150 mg 进食	150 mg 禁食
N	6	6
$C_{\max}$ (ng/mL)	93.4 (22)	8.22 (83)
$T_{\max}^a$ (小时)	4.00 (3.00-6.00)	10.05 (6.00-12.00)
$t_{1/2}^b$ (小时)	29.2 (20.0-41.5)	38.4 (24.2-88.5)
$AUC_{0-t_{\text{最后}}}$ (ng•h/mL)	891 (26)	288 (48)
$AUC_{0-\infty}$ (ng•h/mL)	956 (25)	331 (44)
CL/F (L/h)	157 (25)	454 (44)
V_z/F (L)	6620 (38)	25100 (81)
V_{ss}/F (L)	4600 (33)	25200 (68)

[0431] AUC = 血浆浓度-时间曲线下的面积; CL/F = 表观总体清除率; $C_{\max}$ = 最大血浆浓度; CV = 变化系数; N = 受试者数量; NC = 无法计算; PK = 药代动力学; $T_{\max}$ = 达到最大血浆浓度的时间; $t_{1/2}$ = 消除半衰期; V_{ss}/F = 血管外施用后的终末阶段期间的稳态时的表观分布容积; V_z/F = 血管外施用后的终末阶段期间的表观分布容积。

[0432] a中位数 (范围)

[0433] b几何平均数 (范围)

[0434] 针对在进食状态下施用时的50到800mg化合物1, 分别分析对PK参数 $AUC_{0-\infty}$ 和 $C_{\max}$ 的比例化剂量反应关系(dose proportionality)。分析结果表明, 剂量每增加一倍, $AUC_{0-\infty}$ 可能预期比比例化剂量反应关系下预期的 $AUC_{0-\infty}$ 增加1.74倍。 $C_{\max}$ 似乎高于比例化剂量反应关系, 但正式测试并无定论, 因为90%置信区间部分处于0.8-1.25区间内。基于 $AUC_{0-\infty}$ 或 $C_{\max}$ 无法得出跨进食状态下的所施用剂量具有比例化剂量反应关系。

[0435] 还在多剂量剂量递增研究(研究2)中对PK进行评估。在研究的A部分中, 将受试者分为3个群组, 并且受试者接受50mg、150mg或200mg化合物1或安慰剂, 持续14天(每个群组中至少有6名受试者接受化合物1, 并且2名受试者接受安慰剂)。给药2周后, 化合物1的血液浓度接近稳态水平, 并且累积比介于2.51到3.65之间。B部分研究化合物1与咪达唑仑(CYP3A4底物)的相互作用, 从而测定此化合物是否显著抑制由CYP3A4代谢的药物的代谢, 采集血液样品系列以测定在已经施用单个剂量的化合物1后和在稳定状态下的研究药物血浆浓度。所有给药都在进食状态下发生。还在给药期之前和给药期期间对日皮质醇水平进行评估并且对在葡萄糖钳夹条件下的日皮质醇水平进行评估。

[0436] 化合物1的总体浓度时间曲线显示, 吸收适度延迟, 其中在口服给药后5小时的中

值时达到 $C_{\max}$ 。与单剂量研究(研究1)一致,浓度似乎以双指数方式下降,其特征为在前24小时内迅速下降。每天多次给药2周后,化合物1的 $t_{1/2}$ 超过100小时;因此,化合物1的累积比介于2.51到3.65之间(参见表7)。 $T_{\max}$ 似乎跨各个剂量具有一致性。对于150mg和200mg而言,总体半衰期、经过权重归一化的CL/F和V/F一致。然而,后2个参数的值在50mg剂量水平下几乎翻了一番。表观清除率和分布容积的可变性(CV%)较大,并且未随着权重归一化而降低。

[0437] 表7. 在研究的A部分中单次(第1天)和多次(第14天)口服50mg、150mg和200mg化合物1后化合物1的非隔室药代动力学参数汇总

	几何平均数 (CV%)					
	50 mg 第 1 天	150 mg 第 1 天	200 mg 第 1 天	50 mg 第 14 天	150 mg 第 14 天	200 mg 第 14 天
N	8	9	7	8	9	6
$C_{\max}$ (ng/mL)	22.7 (59)	127 (52)	143 (62)	50.3 (56)	222 (58)	314 (93)
$T_{\max}^a$ (小时)	4.52 (3.00-10.00)	5.00 (5.00-6.00)	5.00 (2.00-5.00)	5.00 (3.00-5.00)	5.00 (3.00-5.03)	5.00 (3.00-5.00)
有效 $t_{1/2}^b$ (小时)	NC NC	NC NC	NC NC	37.7 (27.4)	32.7 (29.7)	52.0
$AUC_{0-\infty}$ (ng•hr/mL)	NC NC	NC NC	NC NC	980 (53.8)	4680 (104)	5660 (122)
$AUC_{0-24 \text{ 小时}}$ (ng•hr/mL)	97.6 (58)	590 (56)	559 (55 ^c)	273 (56)	1480 (66)	2040 (98)
$C_{\text{平均}}$ (ng/mL)	NC NC	NC NC	NC NC	11.4 (56)	61.7 (66)	85.0 (98)
CL_{aa}/F (L/hr)	NC NC	NC NC	NC NC	183 (56)	101 (66)	98 (98)
WT-归一化						
Cl_{aa}/F (L/hr/kg)	NC NC	NC NC	NC NC	2.88 (46.9)	1.42 (72.9)	1.50 (89.9)
V_z/F (L)	NC NC	NC NC	NC NC	33500 (90)	17600 (59)	16300 (76)
V_{ss}/F (L)	NC NC	NC NC	NC NC	12900 (91)	6170 (40)	5080 (78)
WT-归一化						
V_{ss}/F (L/kg)	NC NC NC	NC NC NC	NC NC NC	204 (71.3) 2.80	86.5 (41.0) 2.51	77.4 (68.6) 3.65
RA	NC	NC	NC	(27.4)	(29.7)	(34.4)

[0438] AUC = 血浆浓度-时间曲线下的面积; CL/F = 表观清除率; $C_{\max}$ = 最大血浆浓度; RA

=以第14天 AUC_{0-24} /第1天 AUC_{0-24} 的形式计算的累积比; $t_{1/2}$ =终末半衰期;有效 $t_{1/2}$ =通过累积比计算的半衰期; T_{max} =达到最大血浆浓度的时间; V_{ss}/F =稳态时的分布容积; V_z/F =终末阶段的分布容积;WT-归一化=经过权重归一化的a中位数(范围)。

[0439] b几何平均数(范围)。

[0440] c $n=6$,中途退出受试者306未包含在汇总统计数据的计算中。

[0441] 表8呈现了测试剂量范围内的 AUC_{0-24} 和 C_{max} 的比例化剂量反应关系评估的结果。对于 AUC_{0-24} 和 C_{max} ,第1天和第14天的经过调整的平均斜率全都高于值1,从而表明随剂量增加, AUC_{0-24} 值和 C_{max} 值的增加略大于比例增加。

[0442] 表8.通过幂模型对血浆化合物1进行的比例化剂量反应关系评估的汇总

[0443]	参数	天数	平均斜率	标准误差	斜率的 90% CI	CV%
	AUC_{0-24} (ng hr/mL)	1	1.40	0.194	(1.069,1.737)	59.3
		14	1.48	0.221	(1.104,1.864)	69.1
	C_{max} (ng/mL)	1	1.41	0.185	(1.092,1.728)	57.5
		14	1.33	0.210	(0.972,1.693)	64.8

[0444] AUC =血浆浓度-时间曲线下的面积; C_{max} =最大血浆浓度

[0445] 安全性

[0446] 在对健康成年志愿者进行的2项第1阶段研究(研究1和研究2)中对化合物1的安全性进行评估。在两项研究中,对不良事件(AE)、临床实验室测试、生命体征(仰卧血压和脉搏率)和心电图(ECG)进行评估。总体而言,在研究1中,化合物1的耐受性良好。

[0447] 当以高达200mg的多个剂量施用,化合物1在研究的健康受试者群体中总体上具有良好的耐受性。在研究1中,研究对酒精依赖治疗的相关性的生物标志物的影响。使用成瘾研究中心调查问卷(Research Center Inventory Questionnaire)(ARCI-49)的五个组来比较化合物1相对于安慰剂的影响:分别地,吗啡-苯丙胺组量表测量欣快感;麦角酸二乙酰胺组量表评估烦躁不安和躯体变化;戊巴比妥-氯丙嗪-乙醇组量表测量镇静作用;苯丙胺组(BG)量表测量智力效率和精力;安非他明组量表测量d-安非他明的影响。每个组中均未观察到相对于基线的变化或与安慰剂相比的差别的系统模式或剂量反应。

[0448] 总之,健康的男性和女性受试者对化合物1的高达800mg的单个口服剂量和高达200mg的多个剂量耐受良好。

[0449] 实例4:第2阶段临床研究

[0450] 第2阶段研究的群组A包含用于治疗患有典型CAH的成人的化合物1的6周多剂量剂量递增研究。在筛选之后,符合条件的患者将被纳入为期6周的治疗期,然后是为期4周的洗脱/安全随访期。

[0451] 该群组将在大约9名患者中进行,所述患者将每天接受化合物1,持续长达6周。化合物1将以每日口服剂量施用。患者将每隔2周通过三种递增的剂量强度经历化合物1的滴定。患者将在基线下进行过夜PK/PD评估,所述PK/PD评估包含施用第一剂后针对PK/PD的给药前过夜评估和给药后过夜评估。在每个为期2周的给药期结束时,患者将返回进行单一过夜访视,以进行稳态PK/PD评估。在患者最后一次给药后30天,将进行门诊随访。初始群组(群组A)完成后,研究将继续针对多达3个连续群组(群组B、C和D)的多次给药剂量渐升法

(MAD) 设计以进一步评估各种SPR001给药方案的安全性、PK和PD并鉴别最佳剂量方案。每个群组将经历为期2周的导入期(run-in period)、为期2周的治疗期和为期30天的洗脱和安全性随访期。在将在筛选期间发生的导入期期间,受试者将在纸质日记中记录所服用的糖皮质激素药物的每个剂量、每次进餐的时间以及其每天就寝和醒来的时间,以确保符合背景糖皮质激素方案以及其日常生活的稳定性。

[0452] 群组B中的患者将以200mg BID接受研究药物,其中早上一剂,晚上一剂,所述剂量在就餐时服用或在食用标准化零食时服用。对于群组C和D,剂量水平以及给药频率和定时将基于先前群组的临时数据测定。然而,每个连续群组的剂量水平将被限制为前一群组的每日剂量水平的两倍。

[0453] 研究设计

[0454] • 研究类型:干预性

[0455] • 主要目的:治疗

[0456] • 研究阶段:第2阶段

[0457] • 干预性研究模型:顺序分配

[0458] • 群组数量:多达4

[0459] • 设盲:未设盲

[0460] • 分配:非随机

[0461] • 纳入人数:多达约27人[预期]

[0462] 药组和干预

	药组	所分配干预
[0463]	实验: 群组 A 将向第一群组的 9 名患者以 200 毫克每天的剂量强度施用化合物 1, 持续 2 周, 然后增加到 600 毫克每天, 持续 2 周, 然后增加到 1,000 毫克每天, 持续 2 周。	药物: 化合物 1 200 mg 胶囊
	实验: 群组 B 将向群组 B 患者以 200 mg 的剂量施用化合物 1, 每天两次 (BID), 持续 2 周。	药物: 化合物 1 200 mg 胶囊
[0464]	实验: 群组 C 群组 C 的剂量/剂量方案将基于来自先前群组的安全性和 PK/PD 数据的临时审查测定	药物: 化合物 1 50 mg 或 200 mg 胶囊
	实验: 群组 D 群组 C 的剂量/剂量方案将基于来自先前群组的安全性和 PK/PD 数据的临时审查测定	药物: 化合物 1 50 mg 或 200 mg 胶囊

[0465] 结果量度 (Outcome Measure)

[0466] 主要结果量度:

[0467] 1. 评估化合物1在患有CAH的受试者中的安全性。

[0468] 2. 评估通过测量17-OHP相对于基线的百分比变化和绝对变化测量的化合物1在患有典型CAH的受试者中的功效。

[0469] 次要结果量度:

[0470] 3.探究引起ACTH、雄烯二酮和睾酮的血浆浓度的药效学变化的一个或多个化合物1剂量,所述药效学变化是通过相对于剂量基线的绝对变化和百分比变化测量的。

[0471] 4.测定化合物1在患有CAH的受试者中的药代动力学。

[0472] 5.探究药效学与药代动力学之间的潜在关系。

[0473] 探究

[0474] 6.探究引起尿液中药效学生物标志物的变化的一个或多个化合物1剂量,所述变化是通过相对于剂量基线的绝对变化和百分比变化来测量的。

[0475] 合格标准

[0476] • 最小年龄:18岁

[0477] • 最大年龄:

[0478] • 性别:全部

[0479] • 基于性别:否

[0480] • 接受健康志愿者:否

[0481] • 标准:纳入

[0482] 标准:

[0483] 纳入标准:

[0484] • 18岁或以上的男性和女性患者。

[0485] • 由于21-羟化酶缺乏而患有典型CAH的书面诊断

[0486] • 筛选时17-OHP升高

[0487] • 正接受稳定的糖皮质激素替代方案,持续最少30天

[0488] 排除标准:

[0489] • 临床上显著不稳定的医疗病症、疾病或慢性病

[0490] • 临床上显著的精神病状

[0491] • 临床上显著的异常实验室发现或评估

[0492] • 双侧肾上腺切除术或垂体功能减退史

[0493] • 妊娠女性或哺乳女性

[0494] • 在30天内使用任何其它研究性药物

[0495] • 无法理解和遵守研究程序、无法理解风险和/或不愿提供书面知情同意。

[0496] 结果:

[0497] 第2阶段研究表明化合物1整体耐受性良好。在探究了宽范围的剂量(5倍范围)之后,所述研究测定一系列安全剂量(参见图1)。

[0498] 关于患者对化合物1的反应,80%的患者显示出ACTH减少(参见图2)。总的来说,ACTH的衰减证明了靶标参与和功能性CRF₁受体拮抗作用。80%的患者受试者表现出ACTH减少。70%的受试者表现出ACTH减少25%以上。40%的受试者在治疗后处于正常范围内。

[0499] 17-OHP的减少证明了基于标准指南对疾病的“控制”。这使得类固醇逐渐减少。80%的受试者表现出17-OHP减少(参见图3)。50%的受试者表现出17-OHP减少25%以上。50%的受试者治疗后处于指南范围内(1200ng/dL)。

[0500] 化合物1减弱了A4的晨间上升,这表明控制过量雄激素产生和相关症状的能力(参

见图4)。100%的受试者表现出雄烯二酮减少(在不同剂量下)。60%的受试者表现出雄烯二酮减少25%以上。50%的受试者治疗后处于正常参考范围内。

[0501] 实例5:为期3个月的第2阶段研究

[0502] 此研究为一项为期3个月的第2阶段研究,旨在评估化合物1在患有典型CAH的受试者中的安全性和功效。此研究将调查化合物1与替代糖皮质激素和盐皮质激素的组合在3个月内用于治疗CAH病的扩展使用情况。

[0503] 此研究将纳入多达约24名符合条件的受试者,这些受试者将每天接受化合物1,持续长达3个月。化合物1将以每日口服剂量施用。在每个为期2周的给药期结束时,患者将返回进行晨间实验室评估。在患者最后一次给药后30天,将进行门诊随访。

[0504] 研究设计

[0505] • 研究类型:干预性

[0506] • 主要目的:治疗

[0507] • 研究阶段:第2阶段

[0508] • 干预性研究模型:顺序分配

[0509] • 药组数量1

[0510] • 设盲:未设盲

[0511] • 分配:非随机

[0512] • 纳入人数:多达约24人[预期]

[0513] 结果量度(Outcome Measure)

[0514] 主要结果量度:

[0515] 1. 评估化合物1在患有CAH的受试者中的安全性。

[0516] 次要结果量度:

[0517] 2. 从激素变化方面评估化合物1在患有CAH的受试者中的功效。

[0518] 探究:

[0519] 3. 评估化合物1对患有CAH的受试者的生活质量的影响、代谢参数、探究性肾上腺激素和精液分析。

[0520] 合格标准:

[0521] • 最小年龄:18岁

[0522] • 最大年龄:

[0523] • 性别:全部

[0524] • 基于性别:否

[0525] • 接受健康志愿者:否

[0526] • 标准:纳入

[0527] 标准:

[0528] 纳入标准:

[0529] • 18岁或以上的男性和女性患者。

[0530] • 由于21-羟化酶缺乏而患有典型CAH的书面诊断

[0531] • 筛选时17-OHP升高

[0532] • 正接受稳定的糖皮质激素替代方案,持续最少30天

[0533] 排除标准:

- [0534] • 临床上显著不稳定的医疗病症、疾病或慢性病
- [0535] • 临床上显著的精神病状
- [0536] • 临床上显著的异常实验室发现或评估
- [0537] • 双侧肾上腺切除术或垂体功能减退史
- [0538] • 妊娠女性或哺乳女性
- [0539] • 在30天内使用任何其它研究性药物
- [0540] • 无法理解和遵守研究程序、无法理解风险和/或不愿提供书面知情同意。

[0541] 实例6: 青少年研究

[0542] 此研究为一项第2阶段的开放标签多剂量研究,旨在为使用化合物1治疗患有典型CAH的12到17岁青少年提供概念证明。此研究将评估为期2周使用化合物1进行的治疗的安全性、功效和PK。每个受试者将经历筛选期间为期2周的日记导入期、为期2周的治疗期以及为期30天的洗脱和安全性随访期。

[0543] 计划采用多达3个连续剂量群组(群组1、群组2和群组3)的适应性设计,以鉴别患有典型CAH的青少年的最佳剂量强度和方案。每个群组将首先纳入3名受试者,然后可能基于前3名受试者的临时数据再纳入3名受试者,每个群组总共6名受试者。然而,如果6名受试者的安全性、功效和PK结果无定论,则一个群组可以扩展为最多12名受试者。群组1将QD接受200mg研究药物。仅当需要进一步研究最佳剂量强度或方案时,才依次激活群组2和群组3;这些群组的剂量强度和给药频率和定时将根据一个或多个先前群组的临时数据测定。然而,向每个连续群组施用的剂量强度将被限制为向前一群组施用的每日剂量强度的两倍。

[0544] 尽管存在糖皮质激素(GC)方案(包括任何目前可用的方案:氢化可的松、泼尼松/泼尼松龙和/或地塞米松),但本研究仍将纳入CAH控制不充分的患者。在实践中,CAH患者通常使用超生理剂量的GC治疗,所述剂量对于许多青少年患者既有毒又无效。在此人群中,GC与多种充分描述的短期毒性和长期毒性相关,包含:生长迟缓、体重增加、高血压、高血糖症、高脂血症和库欣样特征(Cushingoid feature)。

[0545] 用化合物1治疗此患者人群的目标是减少关键激素结果量度(或使其正常化),这可以减少所述人群的GC替代物需求量,从而改善关注的临床结果(包括生长速度)。此人群中的激素结果量度的改善也有望延迟青春期提前和骨骼成熟,最终使患有CAH的青少年的身高改善。

[0546] 结果量度

[0547] 主要结果量度:

[0548] 1. 评估化合物1在患有CAH的青少年受试者中的安全性。

[0549] 次要结果量度:

[0550] 2. 评估化合物1引起患有CAH的青少年受试者血液中的主要药效学生物标志物的变化的一种或多种剂量。

[0551] 3. 研究化合物1对患有CAH的青少年患者的生活质量的影响。

[0552] 4. 测定化合物1在患有CAH的青少年受试者中的药代动力学。

[0553] 5. 研究患有CAH的青少年受试者的药效学与药代动力学之间的潜在关系。

[0554] 探究

[0555] 6.探究化合物1引起患有CAH的青少年受试者血液和尿液中的探究性药效学生物标志物的变化的一种或多种剂量。

[0556] 合格标准

[0557] 纳入标准:

[0558] • 12到17岁男性和女性受试者

[0559] • 由于21-羟化酶缺乏而患有典型CAH的书面诊断

[0560] • 筛选时17-OHP升高

[0561] • 正接受稳定的糖皮质激素替代方案,持续最少30天

[0562] 排除标准:

[0563] • 临床上显著不稳定的医疗病症、疾病或慢性病

[0564] • 临床上显著的精神病状

[0565] • 临床上显著的异常实验室发现或评估

[0566] • 双侧肾上腺切除术或垂体功能减退史

[0567] • 妊娠女性或哺乳女性

[0568] • 在30天内使用任何其它研究性药物

[0569] • 无法理解和遵守研究程序、无法理解风险和/或不愿提供书面知情同意。

[0570] 实例7:第3阶段临床研究

[0571] 此研究为一项为期24周的化合物1用于治疗典型CAH的随机双盲安慰剂对照研究。在筛选之后,符合条件的患者将被纳入为期24周的治疗期,然后是为期4周的安全随访期。

[0572] 研究中的受试者将按1:1的比例随机化,以接受化合物1或匹配的安慰剂,持续长达24周。化合物1或安慰剂将以每日口服剂量施用。患者将大约每月返回进行研究访视。在患者最后一次给药后30天,将进行门诊随访。最初计划最多纳入约150名患者。

[0573] 与第2阶段研究的设计一致,尽管存在糖皮质激素(GC)方案(包括任何目前可用的方案:氢化可的松、泼尼松/泼尼松龙和/或地塞米松),但第3阶段的临床研究仍将寻求纳入CAH未获充分控制的患者。在实践中,CAH患者通常使用超生理剂量的GC治疗,所述剂量对于大部分患者既有毒又无效。GC与成人中的多种充分描述的短期和长期毒性相关,包含:体重过度增加、高血压、高血糖、高脂血症和库欣样特征。

[0574] 研究设计:

[0575] • 研究类型:干预性

[0576] • 主要目的:治疗

[0577] • 研究阶段:第3阶段

[0578] • 干预性研究模型:随机对照试验

[0579] • 分配:随机

[0580] • 纳入人数:150[预期]

[0581] 结果量度

[0582] 主要结果量度

[0583] 1.评估化合物1在CAH患者中减少A4和17-OHP的功效。

[0584] 次要结果量度

[0585] 2.从关键激素变化方面评估化合物1在CAH患者中的功效。

- [0586] 3. 评估化合物1在改善CAH患者生活质量和/或情绪方面的功效。
- [0587] 4. 评估化合物1在改善CAH患者雄激素过多症状方面的功效。
- [0588] 5. 评估化合物1在改善CAH患者代谢参数方面的功效。
- [0589] 6. 评估化合物1在CAH患者中的安全性。
- [0590] 合格标准
- [0591] • 最小年龄:16岁
- [0592] • 最大年龄:
- [0593] • 性别:全部
- [0594] • 基于性别:否
- [0595] • 接受健康志愿者:否
- [0596] • 标准:纳入
- [0597] 标准
- [0598] 纳入标准:
- [0599] • 16岁或以上的男性和女性患者。
- [0600] • 由于21-羟化酶缺乏而患有典型CAH的书面诊断
- [0601] • 17-OHP升高
- [0602] • 正接受稳定的糖皮质激素替代方案,持续最少30天
- [0603] 排除标准:
- [0604] • 临床上显著不稳定的医疗病症、疾病或慢性病
- [0605] • 临床上显著的精神病状
- [0606] • 临床上显著的异常实验室发现或评估
- [0607] • 双侧肾上腺切除术或垂体功能减退史
- [0608] • 妊娠女性或哺乳女性
- [0609] • 在30天内使用任何其它研究性药物
- [0610] • 无法理解和遵守研究程序、无法理解风险和/或不愿提供书面知情同意。
- [0611] 实例8:第3阶段OLE和类固醇节制研究
- [0612] 在完成在实例7中描述的研究时,将为符合条件的患者提供参加长达1年的开放标签扩展研究的机会。所述开放标签研究将允许所有符合条件的患者在参与第3阶段计划期间接受活性研究药物。在开放标签阶段,患者将每1-3个月接受一次研究评估,并且将针对长期安全性和功效对患者进行评估(包含激素终点和此人群中的所关注的长期临床结果量度两者)。
- [0613] 尽管存在糖皮质激素(GC)方案(包括任何目前可用的方案:氢化可的松、泼尼松/泼尼松龙和/或地塞米松),但进一步的研究可能寻求纳入CAH未获充分控制的患者。此类CAH患者通常使用超生理剂量的GC治疗,所述剂量对于大部分患者既有毒又无效。GC与成人中的多种充分描述的短期和长期毒性相关,包含:体重过度增加、高血压、高血糖、高脂血症和库欣样特征。
- [0614] 在GC的剂量将保持稳定的治疗期(例如12周)之后,本研究中的患者的GC的剂量将从超生理剂量逐渐降低到更低的剂量,所述更低的剂量等于或接近于与GC的生理剂量相当的剂量。

[0615] 尽管本文中已经示出并描述了本发明的优选实施例,但是对于本领域的技术人员来说将明显的是,此类实施例仅通过举例方式提供。在不背离本发明的情况下,本领域的技术人员现在将想到许多变化、改变和替代。应理解的是,在实践本发明时可以采用在本文描述的本发明的实施例的各种替代方案。意图是,以下权利要求限定本发明的范围,并且以下权利要求覆盖处于这些权利要求和其等效物的范围内的方法和结构。




图1




图2




图3




图4