



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105797044 A

(43)申请公布日 2016.07.27

(21)申请号 201610354825.2

(22)申请日 2016.05.26

(71)申请人 张晓燕

地址 264300 山东省威海市荣成市石岛管
理区港湾街道永安北路7-2号

(72)发明人 张晓燕

(51)Int.Cl.

A61K 36/9062(2006.01)

A61P 1/04(2006.01)

A61K 35/618(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗胃溃疡的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗胃溃疡的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:黄芪10-30份,蒲公英10-20份,海螵蛸10-20份,灵芝5-15份,娑罗子10-20份,白茅根10-20份,泽泻10-20份,白芷5-15份,仙人掌10-20份,石斛10-20份,隔山撬10-20份,木香5-15份,徐长卿10-20份,大黄10-20份,沙棘10-20份,高良姜5-15份,陈皮10-20份,吴茱萸10-20份,石菖蒲10-20份,佛手5-15份,延胡索10-20份,饭团根10-20份,甘草5-15份。本发明中药组合物具有疏肝补肾、健脾和胃、活血止痛、温中祛寒的功效,其治疗胃溃疡疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗胃溃疡的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪10-30份,蒲公英10-20份,海螵蛸10-20份,灵芝5-15份,娑罗子10-20份,白茅根10-20份,泽泻10-20份,白芷5-15份,仙人掌10-20份,石斛10-20份,隔山撬10-20份,木香5-15份,徐长卿10-20份,大黄10-20份,沙棘10-20份,高良姜5-15份,陈皮10-20份,吴茱萸10-20份,石菖蒲10-20份,佛手5-15份,延胡索10-20份,饭团根10-20份,甘草5-15份。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗胃溃疡的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪20份,蒲公英15份,海螵蛸15份,灵芝10份,娑罗子15份,白茅根15份,泽泻15份,白芷10份,仙人掌15份,石斛15份,隔山撬15份,木香10份,徐长卿15份,大黄15份,沙棘15份,高良姜10份,陈皮15份,吴茱萸15份,石菖蒲15份,佛手10份,延胡索15份,饭团根15份,甘草10份。

一种治疗胃溃疡的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医用配制品,尤其是一种治疗胃溃疡的中药组合物。

背景技术

[0002] 胃溃疡是位于贲门至幽门之间的慢性溃疡,是消化性溃疡的一种,常见于慢性胃炎病人,几乎所有的胃溃疡者都有慢性活动性胃炎。长期饮用酒精,浓茶,吸烟,服用阿司匹林、皮质类固醇等药物,进食时间不规则、进食量差别大等均能直接损伤胃、十二指肠黏膜,造成胃溃疡。临床上通常表现为饥饿不适、饱胀暖气、泛酸或餐后定时的慢性中上腹疼痛,严重时可有黑便与呕血。目前,临床上治疗胃溃疡一般以内服保护胃粘膜的西药为主,初期治疗具有一定效果,但长期用药会对胃产生很大的刺激,使病情加重。

[0003] 中医认为,胃溃疡多因先天秉赋不足、胃脾虚弱、脏腑功能失调、气血阴阳异常等有关;外因多与饮食不节、嗜酒过度、寒邪直中脾胃等有关。

[0004] 根据中医理论,针对胃溃疡的发病机理,以疏肝和胃、温中祛寒为治则,进行辩证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中采用内服保护胃粘膜的西药治疗胃溃疡存在副作用大的不足,本发明提供一种配制方便、疗效显著、作用可靠、无副作用的治疗胃溃疡的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗胃溃疡的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪10-30份,蒲公英10-20份,海螵蛸10-20份,灵芝5-15份,娑罗子10-20份,白茅根10-20份,泽泻10-20份,白芷5-15份,仙人掌10-20份,石斛10-20份,隔山撬10-20份,木香5-15份,徐长卿10-20份,大黄10-20份,沙棘10-20份,高良姜5-15份,陈皮10-20份,吴茱萸10-20份,石菖蒲10-20份,佛手5-15份,延胡索10-20份,饭团根10-20份,甘草5-15份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗胃溃疡的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:黄芪20份,蒲公英15份,海螵蛸15份,灵芝10份,娑罗子15份,白茅根15份,泽泻15份,白芷10份,仙人掌15份,石斛15份,隔山撬15份,木香10份,徐长卿15份,大黄15份,沙棘15份,高良姜10份,陈皮15份,吴茱萸15份,石菖蒲15份,佛手10份,延胡索15份,饭团根15份,甘草10份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:黄芪具有益气固表、敛汗固脱、托疮生肌、利水消肿的功效;蒲公英具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋的功效;海螵蛸具有收敛止血、固精止带、制酸止痛、收湿敛疮的功效;灵芝具有益气血、安心神、健脾胃的功效;娑罗子具有理气宽中、和胃止痛的功效;白茅根具有凉血止血、清热利尿的功效;泽泻具有利水渗湿、泄热通淋的功效;白芷具有解表散寒、祛风通窍、活血止痛、燥湿止带、消肿排脓的功效;仙人掌具有行气活血、清热解毒、凉

血止血、清肺止咳的功效；隔山撬具有补肝肾、强筋骨、健脾胃、解毒的功效；木香具有行气止痛、调中导滞的功效；徐长卿具有镇痛、止咳、利尿消肿、活血解毒的功效；大黄具有泻火消积、清热解毒、凉血止血、祛瘀止咳的功效；沙棘具有止咳祛痰、消食化滞、活血散瘀的功效；高良姜具有温胃散寒、消食止痛的功效；陈皮具有理气健脾、调中利水、燥湿化痰的功效；吴茱萸具有散寒止痛、降逆止呕、助阳止泻的功效；石菖蒲具有化痰开窍、化湿行气、祛风利痹、消肿止痛的功效；佛手具有舒肝理气、和胃止痛的功效；延胡索具有活血散瘀、理气止痛的功效；饭团根具有清热解毒、祛湿利尿、健脾胃、利关节的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏疏肝补肾、健脾和胃、活血止痛、温中祛寒之功效，对胃溃疡达到标本兼治的目的。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，未出现毒副作用，总有效率91.2%，治愈率达66.7%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

[0011] 实施例1

一种治疗胃溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪20g，蒲公英15g，海螵蛸15g，灵芝10g，娑罗子15g，白茅根15g，泽泻15g，白芷10g，仙人掌15g，石斛15g，隔山撬15g，木香10g，徐长卿15g，大黄15g，沙棘15g，高良姜10g，陈皮15g，吴茱萸15g，石菖蒲15g，佛手10g，延胡索15g，饭团根15g，甘草10g。

[0012] 实施例2

一种治疗胃溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪30g，蒲公英10g，海螵蛸20g，灵芝5g，娑罗子20g，白茅根10g，泽泻20g，白芷5g，仙人掌20g，石斛10g，隔山撬20g，木香5g，徐长卿20g，大黄10g，沙棘20g，高良姜5g，陈皮20g，吴茱萸10g，石菖蒲20g，佛手5g，延胡索20g，饭团根10g，甘草15g。

[0013] 实施例3

一种治疗胃溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪10g，蒲公英20g，海螵蛸10g，灵芝15g，娑罗子10g，白茅根20g，泽泻10g，白芷15g，仙人掌10g，石斛20g，隔山撬10g，木香15g，徐长卿10g，大黄20g，沙棘10g，高良姜15g，陈皮10g，吴茱萸20g，石菖蒲10g，佛手15g，延胡索10g，饭团根20g，甘草5g。

[0014] 实施例4

一种治疗胃溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪23g，蒲公英12g，海螵蛸18g，灵芝7g，娑罗子18g，白茅根12g，泽泻18g，白芷7g，仙人掌18g，石斛12g，隔山撬18g，木香7g，徐长卿18g，大黄12g，沙棘18g，高良姜7g，陈皮18g，吴茱萸12g，石菖蒲18g，佛手7g，延胡索18g，饭团根12g，甘草13g。

[0015] 实施例5

一种治疗胃溃疡的中药组合物，其中药原料及重量配比为：黄芪17g，蒲公英18g，海螵蛸12g，灵芝13g，娑罗子12g，白茅根18g，泽泻12g，白芷13g，仙人掌12g，石斛18g，隔山撬

12g,木香13g,徐长卿12g,大黄18g,沙棘12g,高良姜13g,陈皮12g,吴茱萸18g,石菖蒲12g,佛手13g,延胡索12g,饭团根18g,甘草7g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡15~20分钟,再加水没过药面约6厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮20~30分钟;第二次煎煮,加水没过药面约6厘米,水沸后煎煮15~20分钟。两次煎煮去渣取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例1所给出的一种治疗胃溃疡的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本发明中药组合物应用于临床观察病例57例,其中男26例,女31例,年龄25~65岁。

[0018] 二、诊断标准:

- 1、周期性发作,常与季节变化、精神因素、饮食失调或长期服用消炎药有关;
- 2、剑突(心窝)下或上腹部呈烧灼性、啮咬性或饥饿性疼痛或夜间疼痛,疼痛可以因进食、饮水、服用制酸药而缓解;
- 3、或伴有烧心、吐酸水、嗝气、贫血、黑色或柏油样大便等症状;
- 4、X 线检查可见溃疡“龛影”,大便潜血试验阳性等;
- 5、其他检查,如胃镜、胃酸测定等。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一天一剂,水煎两遍取汁约300ml,分早、晚两次饭前半小时温热服用,五天为一疗程。服药期间忌食生冷、辛辣之物。

[0020] 四、疗效标准:

- 1、治愈:临床表现均完全消失、镜下溃疡消失或是疤痕形成而无充血水肿;
- 2、有效:临床表现明显改善,溃疡面缩小50% 以上或溃疡面干净、仅存在少量苔膜;
- 3、无效:临床表现无缓解、溃疡面无变化或加重。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药5-10个疗程,治愈38例,有效14例,无效5例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例1:王某,男,35岁。自述近半个月来上腹持续疼痛,泛酸,嗝气,食欲不振,口服奥美拉唑肠溶片后,症状也没有缓解,3天前出现黑色血便的现象。经检验诊断为:胃溃疡。服用本发明的中药组合物制备的药剂3个疗程后,疼痛感明显减轻,进食好转,大便正常;继续服用4个疗程,症状消失,治愈。

[0023] 病例2:孙某,女,56岁。就诊时自述2年前患有胃溃疡,给予以制酸及保护胃粘膜药物治疗,症状缓解。近期再次出现上腹胀痛、嗝气、泛酸等症状。服用本发明的中药组合物制备的药剂4个疗程,胃部胀痛感减轻,嗝气,泛酸等症状明显好转;续服3个疗程后,各症状消失,治愈。