



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103340963 B

(45) 授权公告日 2015. 05. 13

(21) 申请号 201310309631. 7

(22) 申请日 2013. 07. 23

(73) 专利权人 肖振锋

地址 236400 安徽省阜阳市临泉县瓦店镇肖
坡行政村中肖坡 34 号

(72) 发明人 肖振锋

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务
所 34108

代理人 徐宝泉

(51) Int. Cl.

A61K 36/752(2006. 01)

A61P 43/00(2006. 01)

审查员 刘鑫

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗伤暑的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗伤暑的药物及其制备方法,它主要是由香菇、扁豆、厚朴花、黄连、柴胡、黄芩、白芍药按一定重量配比制备而成,本发明药物具有清热利湿,健脾和中,消暑化湿的功效,用于治疗伤暑见效快,疗效好,治愈率高。

1. 一种治疗伤暑的药物,其特征在於:它是由下列重量范围内的原料药制成:

香 茹 10-20 克 扁 豆 10-20 克 厚朴花 8-15 克
黄 连 8-15 克 柴 胡 8-15 克 黄 芩 8-15 克
白芍药 10-20 克 山 楂 10-20 克 青 皮 10-20 克
陈 皮 10-20 克 车前子 8-15 克 甘 草 8-15 克。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料药的用量为:

香 茹 15 克 扁 豆 15 克 厚朴花 10 克
黄 连 10 克 柴 胡 10 克 黄 芩 10 克
白芍药 15 克 山 楂 15 克 青 皮 15 克
陈 皮 15 克 车前子 10 克 甘 草 10 克。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法,它包括下列步骤:

(一) 备料

(1) 香菇:取原药材,拣去杂质,晒干;

(2) 扁豆:拣净杂质,置沸水中稍煮,至种皮鼓起、松软时,捞出,浸入冷水中,脱去皮,晒干;

(3) 厚朴花:拣净杂质,去梗,筛去泥屑;

(4) 黄连:拣去杂质,洗净泥砂,润透,切片,阴干;

(5) 柴胡:拣去杂质,除去残茎,洗净泥沙,捞出,润透后及时切片,随即晒干;

(6) 黄芩:拣去杂质,除去残茎,用凉水浸润或置开水中稍浸捞出,切片,晒干;

(7) 白芍药:拣去杂质,分开大小个,用水浸泡至八成透,捞出,晒晾,润至内外湿度均匀,切片,干燥;

(8) 山楂:拣净杂质,筛净去核;

(9) 青皮:拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透,切片,晒干;

(10) 陈皮:取原药材,除去杂质及变黑的果皮,抢水洗净,润软,切丝,晒干或低温干燥,筛去灰屑;

(11) 车前子:拣去杂质,筛去泥屑,空粒;

(12) 甘草:拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,凉干;

(二) 制备

(1) 将所述重量的香菇、扁豆、厚朴花、黄连、柴胡、黄芩、白芍药、山楂、青皮、陈皮、车前子、甘草药物放入煎药容器内,加 6 倍量水进行浸泡,浸泡 100 分钟后,武火煎煮沸腾 25 分钟,再用文火煎煮 25 分钟,过滤得第一次煎煮液;

(2) 将过滤的药渣加水 4 倍量,武火煎煮沸腾,再用文火煎煮 15 分钟,过滤得第二次煎煮液;

(3) 将两次煎煮液混合,再用文火煎煮 15 分钟,将煎煮液分为 3 剂服用。

一种治疗伤暑的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗伤暑的药物及其制备方法,属中药领域。

背景技术

[0002] 伤暑又称“感暑”,指夏季伤於暑邪,出现多汗身热,心烦口渴、气粗、四肢疲乏、小便赤涩等“阳暑”症候。伤暑有阴、阳之分,“动而得之者为阳暑”,我们平时所指的中暑大多指此。患者多在烈日下劳作,或长途行走,或因在高温、通风不良、湿度较高的环境下长时间劳作所引发。这种中暑往往病情重而危急。但由于近代人们生活、生产和保健条件的改善,人们也重视预防,所以,在现实生活中,发生的病例并不多。而“阴暑”是过于避热贪凉引起,即所谓“静而得之者为阴暑”。由于天气炎热,人们毛孔开张,腠理疏松,人们睡眠、午休和纳凉之时,若过于避热趋凉,如夜间露宿室外,或坐卧于阴寒潮湿之地,或在树阴下、水亭中、阳台上乘凉时间过长,或运动劳作后立即用冷水浇头冲身,或立即快速饮进大量冷水或冰镇饮料,或睡眠时被电扇强风对吹,均可导致风、寒、湿邪侵袭机体而引发“阴暑”。出现身热头痛、无汗恶寒、关节酸痛、腹痛腹泻等症。目前,西药治疗伤暑效果不佳,且有较多副作用,因此,人们对快速有效治疗伤暑的中药存在很大的需求。

发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究及临床反复的试验和验证,终于找到了有效治疗伤暑的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种能够有效治疗伤暑的组合药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选用香菇、扁豆、厚朴花、黄连、柴胡、黄芩、白芍药、山楂、青皮、陈皮、车前子、甘草药物进行组合的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效治疗伤暑的复发。其中选用香菇是因为其性味微辛,凉,有清热利湿的功能,治中暑吐泻,痢疾,湿热浮肿,齿龈炎,背痛,带状疱疹。选用扁豆是因为其性味甘,平,入脾、胃经,有健脾和中,消暑化湿的功能,治暑湿吐泻,脾虚呕逆,食少久泄,水停消渴,赤白带下,小儿疳积。选用厚朴花是因为其性味苦辛,温,有理气,化湿的功能,治胸膈胀闷。选用黄连是因为其性味苦,寒,入心、肝、胃、大肠经,有泻火,燥湿,解毒,杀虫的功能,治时行热毒、伤寒,热盛心烦,痞满呕逆,菌痢,热泻腹痛,肺结核,吐、衄、下血,消渴,疳积,蛔虫病,百日咳,咽喉肿痛,火眼,口疮,痈疽疮毒,湿疹,汤火烫伤。选用柴胡是因为其性味苦,凉,入肝、胆经,有和解表里,疏肝,升阳的功能,治寒热往来,胸满胁痛,口苦耳聋,头痛目眩,疟疾,下利脱肛,月经不调,子宫下垂。选用黄芩是因为其性味苦寒,入心肺、胆、大肠经,有泻实火,除湿热,止血安胎的功能,治壮热烦渴,肺热咳嗽。选用白芍药是因为其性味苦酸,凉,入肝、脾经,有养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗的功能,治胸腹胁肋疼痛,泻痢腹痛,自汗盗汗,阴虚发热,月经不调,崩漏,带下。选用山楂是因为其性味酸甘,微温,入脾、胃、肝经,有消食积,散瘀血,驱绦虫的功能,治肉积,癥瘕,痰饮,痞满,吞酸,泻痢,肠风,腰痛,疝气,产后儿枕痛,

恶露不尽,小儿乳食停滞。选用青皮是因为其性味苦辛,微温,入肝、胆经,有疏肝破气,散结消痰的功能,治胸胁胃脘疼痛,疝气,食积,乳肿,乳核,久疔癥块。选用陈皮是因为其性味苦、辛,温,归肺、脾经,有理气健脾,燥湿化痰的功能,治胸脘胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。选用车前子是因为其性味甘,寒,入肾、膀胱经,有利水,清热,明目,祛痰的功能,治小便不通,淋浊,带下,尿血,暑湿泻痢,咳嗽多痰,湿痹,目赤障翳。选用甘草是因为其性味甘平,入脾、胃、肺经,有和中缓急,润肺,解毒,调和诸药的功能,炙用治脾胃虚弱,食少,腹痛便溏,劳倦发热,肺痿咳嗽,心悸,惊痫,生用治咽喉肿痛,消化性溃疡,痈疽疮疡,解药毒及食物中毒。

[0007] 本发明组合的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各组分的用量在上述重量范围内都具有较好疗效

[0008]	香 茹	10-20 克	扁 豆	10-20 克	厚朴花	8-15 克
[0009]	黄 连	8-15 克	柴 胡	8-15 克	黄 芩	8-15 克
[0010]	白芍药	10-20 克	山 楂	10-20 克	青 皮	10-20 克
[0011]	陈 皮	10-20 克	车前子	8-15 克	甘 草	8-15 克

[0012] 优选用量为

[0013]	香 茹	15 克	扁 豆	15 克	厚朴花	10 克
[0014]	黄 连	10 克	柴 胡	10 克	黄 芩	10 克
[0015]	白芍药	15 克	山 楂	15 克	青 皮	15 克
[0016]	陈 皮	15 克	车前子	10 克	甘 草	10 克

[0017] 本发明药物的制备方法如下

[0018] 一、备料

[0019] 1、香菇:取原药材,拣去杂质,晒干;

[0020] 2、扁豆:拣净杂质,置沸水中稍煮,至种皮鼓起、松软时,捞出,浸入冷水中,脱去皮,晒干;

[0021] 3、厚朴花:拣净杂质,去梗,筛去泥屑;

[0022] 4、黄连:拣去杂质,洗净泥砂,润透,切片,阴干;

[0023] 5、柴胡:拣去杂质,除去残茎,洗净泥沙,捞出,润透后及时切片,随即晒干;

[0024] 6、黄芩:拣去杂质,除去残茎,用凉水浸润或置开水中稍浸捞出,切片,晒干;

[0025] 7、白芍药:拣去杂质,分开大小个,用水浸泡至八成透,捞出,晒晾,润至内外湿度均匀,切片,干燥;

[0026] 8、山楂:拣净杂质,筛净去核;

[0027] 9、青皮:拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透,切片,晒干;

[0028] 10、陈皮:取原药材,除去杂质及变黑的果皮,抢水洗净,润软,切丝,晒干或低温干燥,筛去灰屑;

[0029] 11、车前子:拣去杂质,筛去泥屑,空粒;

[0030] 12、甘草:拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,凉干。

[0031] 二、制备

[0032] 1、将所述重量的香菇、扁豆、厚朴花、黄连、柴胡、黄芩、白芍药、山楂、青皮、陈皮、车前子、甘草药物放入煎药容器内,加6倍量水进行浸泡,浸泡100分钟后,武火煎煮沸腾25分钟,再用文火煎煮25分钟,过滤得第一次煎煮液。

[0033] 2、将过滤的药渣加水4倍量，武火煎煮沸腾，再用文火煎煮15分钟，过滤得第二次煎煮液。

[0034] 3、将两次煎煮液混合，再用文火煎煮15分钟，将煎煮液分为3剂服用。

[0035] 本发明药物具有清热利湿，健脾和中，消暑化湿的功效，用于治疗伤暑，疗程短、见效快、治愈后不复发、无毒副作用。

具体实施方式

[0036] 以下通过试验例来进一步阐述本发明所述药物的有益效果，这些试验例包括了本发明药物的动物毒性试验报告和临床观察资料。

[0037] [试验例1] 本发明药物的动物毒性试验报告

[0038] 取家兔40只，雌雄兼用，体重2.0—2.5kg，分两组，每组20只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超剂量组为20ml/kg，正常量为10ml/kg，给药方式为灌胃法给药，每天2次，连服7天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0039] [试验例2] 本发明药物治疗伤暑的临床观察资料

[0040] 1、一般资料

[0041] 收治门诊患者共220例，其男性患者160例，女性患者60例。

[0042] 2、诊断标准

[0043] 伤暑其症日间发热，头疼眩晕，躁乱不宁，无气以动，亦无气以言，或身如针刺，小便短赤，轻者烦热口渴，气粗、四肢疲乏；重者烦心、喘喝、妄言，昏闷不醒。

[0044] 3、治疗方法

[0045] 选用上述药剂，给患者服用，每次服用1剂，每天早、中、晚各服1次，7天为一个疗程，连续服用2个疗程。

[0046] 4、疗效评定标准

[0047] 显效：伤暑症状消失，体质恢复正常；

[0048] 好转：伤暑症状明显好转，体质逐步恢复；

[0049] 无效：达不到好转标准者。

[0050] 5、治疗结果(见下表)

[0051]

类型	病例总数	治疗时间	显效		好转		无效		总有效率%
			例数	显效率%	例数	好转率%	例数	无效率%	
伤暑患者	220	14天	210	95.45	8	3.64	2	0.91	99.09

[0052] 在上述的治疗中，用本发明药物治疗伤暑患者220例，结果显效210例，显效率为95.45%，好转8例，好转率为3.64%，无效2例，总有效率为99.09%。