

00200033

7253

**KÖZZÉTÉTELI
PÉLDÁNY**

Képviselő:

INTERINNO Szabadalmi Iroda

NP2276 FAJTANEVŰ BELTENYÉSZTETT KUKORICAVONAL

SYNGENTA SEEDS S.A.S. Saint Sauveur, Franciaország

Feltaláló:

CAMIN Gilles, Saint Sauveur, Franciaország

Bejelentés napja: 2002. 02. 19.

A találmány tárgya NP2276 fajtanevű beltenyésztett kukoricavonal

A találmány szerinti kukorica vonal hasonló az NP2171 jelű beltenyésztett kukorica vonalhoz, azonban a jelen növény szemtípusa közbülső típus és a növény valamivel magasabb.

A találmány célja jól kombájnolható, jó terméshozamú kukorica növény előállítása.

A találmány szerinti kukoricavonalra az jellemző, hogy a levéllemez és a szár által bezárt szög kicsi, a levéllemez állása egyenes, a szár cikcakkossága hiányzik, a harmatgyökerek antociános színeződése közepes, a címer hímvirágzás időpontja közepes-késői, a kalászkapelyva alapjának antociános színeződése hiányzik vagy nagyon gyenge, a kalászkapelyva antociános színeződése az alap nélkül gyenge, a portok antociános színeződése gyenge, a főtenhely kalászkáinak tömörsége közepes, a főtenhely és az oldalágak közötti szög kicsi-közepes, az oldalágak állása egyenes, az elsőrendű elágazások száma nagyon kevés-keves, a cső bibe megjelenésének időpontja közepes- késői, a bibe antociános színeződésű, a bibe antociános színeződésének intenzitása nagyon gyenge, a levélhüvely antociános színeződése gyenge, a címer legalsó oldalág feletti főtenhely hossza közepes, a legfelső oldalág feletti főtenhely hossza közepes, a növény magassága közepes, a főcsőeredés magasságának viszonya a növénymagassághoz kicsi, a levéllemez szélessége közepes, a csőkocsány hossza rövid-közepes, a cső hossza közepes, vastagsága közepes, alakja kúpos-hengeres, a szemsorok száma közepes, a szemtípus közbülső típusú, a szemkorona színe

sárgásnarancs, a szem hátoldalának színe narancs, a csutka antociános színeződése jelen van, intenzitása gyenge.

A növényt az 1. ábrán mutatjuk be.

A találmány szerinti beltenyészett kukoricavonalat az alábbiakban részletesebben ismertetjük.

Levél:	a levéllemez és a szár által lezárt szög	kicsi(3)
Levél:	a levéllemez állása	egyenes(1)
Szár:	cikcakkossága	hiányzik(1)
Szár:	a harmatgyökerek antociános színeződése	közepes(5)
Címer:	a hímvirágzás időpontja	közepestől-későig(6)
Címer:	a kalászkapelyva alapjának antociános színeződése	hiányzik v.nagyon gyenge(1)
Címer:	a kalászkapelyva antociános színeződése az alap nélkül	gyenge(3)
Levél:	a portok antociános színeződése	gyenge(3)
Címer	a főtenhely kalászkáinak tömörsége	közepes(5)
Címer:	a főtenhely és az oldalágak közötti szög	kicsi-közepes(3-5)
Címer:	az oldalágak állása	egyenes(1)
Címer:	az elsőrendű elágazások száma	nagyon kevés-kevés(1-3)
Cső:	a bibe megjelenésének időpontja	közepestől későig(6)
Cső:	a bibe antociános színeződése	jelen van(9)
Cső:	a bibe antociános színeződésének	

	intenzitása	nagyon gyenge(1)
Levél:	a levélhüvely antociános színeződése	gyenge(3)
Címer:	a legalsó oldalág feletti főtengely hossza	közepes(5)
Címer:	a legfelső oldalág feletti főtengely hossza	közepes(5)
Növény:	magassága	közepes(5)
Növény:	a főcsőeredés magasságának viszonya a növénymagassághoz	kicsi(3)
Levél:	a levéllemez szélessége	közepes(5)
Cső:	a csőkocsány hossza	rövid-közepes(3-5)
Cső:	hossza	közepes(5)
Cső:	vastagsága	közepes(5)
Cső:	alakja	kúpos-hengeres(2)
Cső:	a szemsorok száma	közepes(5)
Cső:	szemtípus:	közbülső típus(3)
Cső:	a szemkorona színe	sárgásnarancs(4)
Cső:	a szem hátoldalának színe	narancs(5)
Cső:	a csutka antociános színeződése	jelen van(9)
Cső:	a csutka antociános színeződésének intenzitása	gyenge

A kukoricavonal előnye a jó kombájnlhatóság.

SZABADALMI IGÉNYPONT

Beltenyésztett kukoricavonal, a z z a l j e l l e m e z v e , hogy a levéllemez és a szár által bezárt szög kicsi, a levéllemez állása egyenes, a szár cikcakkossága hiányzik, a harmatgyökerek antociános színeződése közepes, a címer hímvirágzás időpontja közepes-késői, a kalászkapelyva alapján antociános színeződése hiányzik vagy nagyon gyenge, a kalászkapelyva antociános színeződése az alap nélkül gyenge, a portok antociános színeződése gyenge, a főtenhely kalászkáinak tömörsége közepes, a főtenhely és az oldalágak közötti szög kicsi-közepes, az oldalágak állása egyenes, az elsőrendű elágazások száma nagyon kevés-kevés, a cső bibe megjelenésének időpontja közepes- késői, a bibe antociános színeződésű, a bibe antociános színeződésének intenzitása nagyon gyenge, a levélhüvely antociános színeződése gyenge, a címer legelső oldalág feletti főtenhely hossza közepes, a legfelső oldalág feletti főtenhely hossza közepes, a növény magassága közepes, a főcsőeredés magasságának viszonya a növénymagassághoz kicsi, a levéllemez szélessége közepes, a csőkocsány hossza rövid-közepes, a cső hossza közepes, vastagsága közepes, alakja kúpos-hengeres, a szemsorok száma közepes, a szemtípus közbülső típusú, a szemkorona színe sárgásnarancs, a szem hátoldalának színe narancs, a csutka antociános színeződése jelen van, intenzitása gyenge.

5 elöl
7 1 dbra elöl
6 elöl

A meghatalmazott:

SZABADALMI IGAZGATÓSÁG
 Budapest, Magyar Köztársaság

61

