



(12) 发明专利申请



(10) 申请公布号 CN 115671241 A

(43) 申请公布日 2023. 02. 03

(21) 申请号 202211476751.1

(22) 申请日 2022.11.23

(71) 申请人 台州市第二人民医院

地址 317299 浙江省台州市天台县福溪街
道水南东路2号

(72) 发明人 徐文俊

(74) 专利代理机构 杭州品众专利代理事务所

(特殊普通合伙) 33459

专利代理师 陈玲

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006.01)

A61K 9/70 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

妇科炎症贴

(57) 摘要

本发明公开了妇科炎症贴,该妇科炎症贴的药膏部分组成为:乳香:30~60份、没药:30~60份、桔核:30~60份、姜黄:30~60份、制甘遂:100~130份、细辛:100~130份、炒白芥子:100~130份、麻黄:30~60份、萆薢:30~60份、白芷:30~60份、石菖蒲:100~130份、虎杖:100~130份、墓头回:100~130份;制备方法包括以下步骤:S1,将如下原料:乳香、没药、桔核、姜黄、制甘遂、细辛、炒白芥子、麻黄、萆薢、白芷、石菖蒲、虎杖、墓头进行切断处理;本发明妇科炎症贴,敷于神阙、气海、关元、子宫及中极,同时配合磁疗灯加热烤,隔日一次,每次30分钟,连续治疗7-14天,使得很多病例患者在贴附后痊愈,很多患者在贴敷后症状稍改善。

1. 妇科炎症贴,其特征在于:该妇科炎症贴的药膏部分组成为:

乳香:30~60份、没药:30~60份、桔核:30~60份、姜黄:30~60份、制甘遂:100~130份、细辛:100~130份、炒白芥子:100~130份、麻黄:30~60份、萆薢:30~60份、白芷:30~60份、石菖蒲:100~130份、虎杖:100~130份、墓头回:100~130份。

2. 根据权利要求1所述妇科炎症贴,其特征在于:该妇科炎症贴的药膏的制备方法包括以下步骤:

S1,将如下原料:乳香、没药、桔核、姜黄、制甘遂、细辛、炒白芥子、麻黄、萆薢、白芷、石菖蒲、虎杖、墓头进行切断处理,然后将切断后的各种药材添加于粉碎机中,对药材进行粉碎处理,得到混合物;

S2,对步骤S1中的粉碎后的混合物,投入至研磨机中进行研磨处理,得到粉料一;

S3,对步骤S2中的粉料一进行过筛处理,对小颗粒的药粉进行收集,然后将残留在筛网上的大颗粒药粉重新投入研磨机中,继续进行研磨,直至研磨筛分后的药粉可以通过筛网,得到过筛后的粉料二;

S4,对步骤S3中的粉料二进行装瓶保存;

S5,用称量勺,对瓶中的粉料二进行称量取用,取药粉适量与黄酒共调成膏糊状,取空白穴位贴,将药膏涂在空白贴中央位置,即得炎症贴。

3. 根据权利要求2所述妇科炎症贴,其特征在于:在步骤S1中,药材切段后的长度小于1cm。

4. 根据权利要求2所述妇科炎症贴,其特征在于:在步骤S2中,混合物的研磨时长为40~60min。

5. 根据权利要求2所述妇科炎症贴,其特征在于:在步骤S3中,筛网为60~80目。

6. 根据权利要求2所述妇科炎症贴,其特征在于:在步骤S5中,称量勺内部设置有称量器,可以直接对取用的药材进行称量处理。

妇科炎症贴

技术领域

[0001] 本发明涉及妇科炎症技术领域,具体涉及妇科炎症贴。

背景技术

[0002] 妇科炎症是女性常见病多发病,针对急慢性盆腔炎、附件炎、宫颈炎、子宫内膜炎及阴道炎等妇科常见炎性疾病,我科反复临床实践,一方面注重提高临床辩证治疗效,另一方面追求临床上的实效性、简便性,推出一款针对女性妇科炎性疾病的外敷药贴方。鉴于以上缺陷,实有必要设计妇科炎症贴。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供妇科炎症贴,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:妇科炎症贴,该妇科炎症贴的药膏部分组成为:

[0005] 乳香:30~60份、没药:30~60份、桔核:30~60份、姜黄:30~60 份、制甘遂:100~130份、细辛:100~130份、炒白芥子:100~130份、麻黄:30~60份、萆薢:30~60份、白芷:30~60份、石菖蒲:100~130 份、虎杖:100~130份、墓头回:100~130份。

[0006] 优选的,该妇科炎症贴的药膏的制备方法包括以下步骤:

[0007] S1,将如下原料:乳香、没药、桔核、姜黄、制甘遂、细辛、炒白芥子、麻黄、萆薢、白芷、石菖蒲、虎杖、墓头进行切断处理,然后将切断后的各种药材添加于粉碎机中,对药材进行粉碎处理,得到混合物;

[0008] S2,对步骤S1中的粉碎后的混合物,投入至研磨机中进行研磨处理,得到粉料一;

[0009] S3,对步骤S2中的粉料一进行过筛处理,对小颗粒的药粉进行收集,然后将残留在筛网上的大颗粒药粉重新投入研磨机中,继续进行研磨,直至研磨筛分后的药粉可以通过筛网,得到过筛后的粉料二;

[0010] S4,对步骤S3中的粉料二进行装瓶保存;

[0011] S5,用称量勺,对瓶中的粉料二进行称量取用,取药粉适量与黄酒共调成膏糊状,取空白穴位贴,将药膏涂在空白贴中央位置,即得炎症贴。

[0012] 优选的,在步骤S1中,药材切段后的长度小于1cm。

[0013] 优选的,在步骤S2中,混合物的研磨时长为40~60min。

[0014] 优选的,在步骤S3中,筛网为60~80目。

[0015] 优选的,在步骤S5中,称量勺内部设置有称量器,可以直接对取用的药材进行称量处理。

[0016] 与现有技术相比,本发明妇科炎症贴,敷于神阙、气海、关元、子宫及中极穴,外盖麝香壮骨膏固定。同时配合磁疗灯加热烤。非经期治疗,隔日一次,每次30分钟,连续治疗7-14天,使得很多病例患者在贴附后痊愈,很多患者在贴敷后症状稍改善。

具体实施方式

[0017] 下面对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0018] 本发明提供一种技术方案:妇科炎症贴,该妇科炎症贴的药膏部分组成为:

[0019] 实施例一:

[0020] 乳香:30份、没药:30份、桔核:30份、姜黄:30份、制甘遂:100 份、细辛:100份、炒白芥子:100份、麻黄:30份、萆薢:30份、白芷: 30份、石菖蒲:100份、虎杖:100份、墓头回:100份。

[0021] 其中,该妇科炎症贴的药膏的制备方法包括以下步骤:

[0022] S1,将如下原料:乳香、没药、桔核、姜黄、制甘遂、细辛、炒白芥子、麻黄、萆薢、白芷、石菖蒲、虎杖、墓头进行切断处理,然后将切断后的各种药材添加于粉碎机中,对药材进行粉碎处理,得到混合物;

[0023] S2,对步骤S1中的粉碎后的混合物,投入至研磨机中进行研磨处理,得到粉料一;

[0024] S3,对步骤S2中的粉料一进行过筛处理,对小颗粒的药粉进行收集,然后将残留在筛网上的大颗粒药粉重新投入研磨机中,继续进行研磨,直至研磨筛分后的药粉可以通过筛网,得到过筛后的粉料二;

[0025] S4,对步骤S3中的粉料二进行装瓶保存;

[0026] S5,用称量勺,对瓶中的粉料二进行称量取用,取药粉适量与黄酒共调成膏糊状,取空白穴位贴,将药膏涂在空白贴中央位置,即得炎症贴。

[0027] 其中,在步骤S1中,药材切段后的长度小于1cm。

[0028] 其中,在步骤S2中,混合物的研磨时长为40~60min。

[0029] 其中,在步骤S3中,筛网为60~80目。

[0030] 其中,在步骤S5中,称量勺内部设置有称量器,可以直接对取用的药材进行称量处理。

[0031] 实施例二:

[0032] 乳香:45份、没药:45份、桔核:45份、姜黄:45份、制甘遂:115 份、细辛:115份、炒白芥子:115份、麻黄:45份、萆薢:45份、白芷: 45份、石菖蒲:115份、虎杖:115份、墓头回:115份。

[0033] 其中,该妇科炎症贴的药膏的制备方法包括以下步骤:

[0034] S1,将如下原料:乳香、没药、桔核、姜黄、制甘遂、细辛、炒白芥子、麻黄、萆薢、白芷、石菖蒲、虎杖、墓头进行切断处理,然后将切断后的各种药材添加于粉碎机中,对药材进行粉碎处理,得到混合物;

[0035] S2,对步骤S1中的粉碎后的混合物,投入至研磨机中进行研磨处理,得到粉料一;

[0036] S3,对步骤S2中的粉料一进行过筛处理,对小颗粒的药粉进行收集,然后将残留在筛网上的大颗粒药粉重新投入研磨机中,继续进行研磨,直至研磨筛分后的药粉可以通过筛网,得到过筛后的粉料二;

[0037] S4,对步骤S3中的粉料二进行装瓶保存;

[0038] S5,用称量勺,对瓶中的粉料二进行称量取用,取药粉适量与黄酒共调成膏糊状,取空白穴位贴,将药膏涂在空白贴中央位置,即得炎症贴。

[0039] 其中,在步骤S1中,药材切段后的长度小于1cm。

[0040] 其中,在步骤S2中,混合物的研磨时长为40~60min。

[0041] 其中,在步骤S3中,筛网为60~80目。

[0042] 其中,在步骤S5中,称量勺内部设置有称量器,可以直接对取用的药材进行称量处理。

[0043] 实施例三:

[0044] 乳香:60份、没药:60份、桔核:60份、姜黄:60份、制甘遂:130 份、细辛:130份、炒白芥子:130份、麻黄:60份、萆薢:60份、白芷: 60份、石菖蒲:130份、虎杖:130份、墓头回:130份。

[0045] 其中,该妇科炎症贴的药膏的制备方法包括以下步骤:

[0046] S1,将如下原料:乳香、没药、桔核、姜黄、制甘遂、细辛、炒白芥子、麻黄、萆薢、白芷、石菖蒲、虎杖、墓头进行切断处理,然后将切断后的各种药材添加于粉碎机中,对药材进行粉碎处理,得到混合物;

[0047] S2,对步骤S1中的粉碎后的混合物,投入至研磨机中进行研磨处理,得到粉料一;

[0048] S3,对步骤S2中的粉料一进行过筛处理,对小颗粒的药粉进行收集,然后将残留在筛网上的大颗粒药粉重新投入研磨机中,继续进行研磨,直至研磨筛分后的药粉可以通过筛网,得到过筛后的粉料二;

[0049] S4,对步骤S3中的粉料二进行装瓶保存;

[0050] S5,用称量勺,对瓶中的粉料二进行称量取用,取药粉适量与黄酒共调成膏糊状,取空白穴位贴,将药膏涂在空白贴中央位置,即得炎症贴。

[0051] 其中,在步骤S1中,药材切段后的长度小于1cm。

[0052] 其中,在步骤S2中,混合物的研磨时长为40~60min。

[0053] 其中,在步骤S3中,筛网为60~80目。

[0054] 其中,在步骤S5中,称量勺内部设置有称量器,可以直接对取用的药材进行称量处理。

[0055] 综上所述,本发明妇科炎症贴,本发明妇科炎症贴,敷于神阙、气海、关元、子宫及中极穴,外盖麝香壮骨膏固定。同时配合磁疗灯加热烤。非经期治疗,隔日一次,每次30分钟,连续治疗7-14天,使得很多病例患者在贴附后痊愈,很多患者在贴敷后症状稍改善;

[0056] 经过2000例患者的临床使用,其中657例患者为宫颈炎性疾病;565例患者为急慢性盆腔炎性疾病;434例为急慢性阴道炎疾病;200例为急慢性附件炎疾病;144例为急慢性子宫内膜炎疾病;年龄最大的45岁,年龄最小的为16岁,贴服时需配合TDP灯局部加热10分钟,每次贴敷4小时,4-7日为一周期。

[0057] 有654例贴1周后痊愈,有1122例贴2周后痊愈,还有123例贴4周后痊愈,有67例贴敷症状稍改善,复查指标提示有效,但未痊愈;有34例效果不太明显,即无效。总有效率为98.30%,总治愈率为94.95%。

[0058] 在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可

以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0059] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。