

(19) 中华人民共和国国家知识产权局



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105596862 A

(43) 申请公布日 2016. 05. 25

(21) 申请号 201610086439. X

(22) 申请日 2016. 02. 15

(71) 申请人 韩立志

地址 276826 山东省日照市海滨五路 35 号
地矿家园 3 号楼 1 单元 601 室

(72) 发明人 韩立志

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61P 1/14(2006. 01)

A61P 1/08(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

A61K 31/7016(2006. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种用于产后伤食治疗与护理的药物及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种用于产后伤食治疗与护理的药物及制备方法,属中药领域;本发明药物有效成分的原料组成为:剪刀草、豇豆、饴糖、胡麻草、白芷、佛手柑、竹茹、黄杨木、罗勒、党参、扁豆衣、紫檀、金丝带、桂丁、玳玳花和酒饼叶;本发明药物药方配伍合理,针对脾胃虚弱、气血不足、胃热呕呃、四肢乏力等致病因,选用健脾和胃、舒肝理气、镇静安神、补中止呕之药材合理配伍,制成药物能够调节患者全身机能,达到探病求源、标本兼治的目的,经临床验证,对治疗产后伤食具有极好的疗效。可广泛应用于产后伤食的临床治疗。

1.一种用于产后伤食治疗与护理的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 剪刀草35-59份 | 豇豆33-58份 | 饴糖31-55份 | 胡麻草33-55份 |
| 白芷28-53份 | 佛手柑27-51份 | 竹茹27-51份 | 黄杨木26-46份 |
| 罗勒26-46份 | 党参25-43份 | 扁豆衣25-43份 | 紫檀23-41份 |
| 金丝带23-38份 | 桂丁22-35份 | 玳玳花21-33份 | 酒饼叶18-28份。 |

2.根据权利要求1所述的一种用于产后伤食治疗与护理的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 剪刀草53份 | 豇豆51份 | 饴糖49份 | 胡麻草49份 |
| 白芷46份 | 佛手柑45份 | 竹茹45份 | 黄杨木41份 |
| 罗勒41份 | 党参38份 | 扁豆衣38份 | 紫檀36份 |
| 金丝带34份 | 桂丁31份 | 玳玳花30份 | 酒饼叶25份。 |

3.根据权利要求1所述的一种用于产后伤食治疗与护理的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 剪刀草47份 | 豇豆45份 | 饴糖43份 | 胡麻草43份 |
| 白芷40份 | 佛手柑39份 | 竹茹39份 | 黄杨木36份 |
| 罗勒36份 | 党参34份 | 扁豆衣34份 | 紫檀32份 |
| 金丝带31份 | 桂丁28份 | 玳玳花27份 | 酒饼叶23份。 |

4.根据权利要求1所述的一种用于产后伤食治疗与护理的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

| | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| 剪刀草41份 | 豇豆39份 | 饴糖37份 | 胡麻草37份 |
| 白芷34份 | 佛手柑33份 | 竹茹33份 | 黄杨木31份 |
| 罗勒31份 | 党参30份 | 扁豆衣30份 | 紫檀29份 |
| 金丝带28份 | 桂丁25份 | 玳玳花24份 | 酒饼叶21份。 |

5.一种如权利要求1-4任一项所述的用于产后伤食治疗与护理的药物的制备方法,其特征在于:包括以下工艺步骤:

(1)将剪刀草和罗勒切细捣碎,滤过取汁液备用;

(2)将豇豆微波烘干,研末,得到过100目的细粉,备用;

(3)将饴糖、胡麻草、白芷、佛手柑、竹茹、党参、扁豆衣、紫檀、桂丁和玳玳花放入容器中,加入蒸馏水煮沸提取3次,首次加10-15倍量蒸馏水浸泡4-5小时,加热煮沸提取3-4小时;第二次加8-10倍量蒸馏水加热煮沸提取2-3小时,第三次加6-8倍量蒸馏水加热煮沸提取1-2小时,合并提取液,滤过,得滤液,浓缩成干浸膏备用;

(4)将黄杨木、金丝带和酒饼叶放入容器中,浸入10倍量体积浓度70%乙醇溶液浸泡4小时,加热提取,滤过,静置后,回收乙醇并浓缩至60℃相对密度为1.12-1.15的稠膏备用;

(5)将步骤(1)-(4)制得的汁液、细粉、干浸膏以及稠膏混合,制成药物,即为所述的用于产后伤食治疗与护理的药物。

一种用于产后伤食治疗与护理的药物及制备方法

所属技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,尤其涉及一种用于产后伤食治疗与护理的药物及制备方法。

背景技术

[0002] 产后因饮食不当,而致纳呆,脘腹胀满,甚则嗳腐泛酸,恶心呕吐等证,称为“产后伤食”。

[0003] 产后脾胃功能未复,如饮食失节,情志抑郁,或素有脾胃宿疾,产后脾气更虚,则食积于胃,运化失司而致本病。

[0004] 产后伤食的早期症状主要有食积碍胃、肝郁伤食和脾虚伤食。新产后脾胃功能未复,饮食失节,食积于胃;或过食油腻肥甘之品,导致胃纳呆滞,脾运失职。平素脾胃失健,产后脏腑功能不足,肝失疏泄,肝气横逆犯胃,脾更弱,食入不化。素有脾胃宿疾,产后脾气更虚,运化无力,食入不化。

[0005] 产后伤食的危害不可轻视,由于产后没有注意保健,会引起的肠梗阻、肠黏连等疾病。

[0006] 目前对产后伤食的治疗主要有药物疗法,现有药物治疗缓慢,且具有副作用,效果不理想;随着现代医学的不断发展,护理也逐渐得到重视,对病人进行正确的护理对于疾病的恢复将具有重要意义,为此,我们急需研制一种安全无副作用的药物来帮助患者摆脱产后伤食带来的痛苦。

发明内容

[0007] 本发明提供了一种用于产后伤食治疗与护理的药物及制备方法;本发明药物药方配伍合理,针对脾胃虚弱、气血不足、胃热呕呃、四肢乏力等致病因,选用健脾和胃、舒肝理气、镇静安神、补中止呕之药材合理配伍,制成药物能够调节患者全身机能,达到探病求源、标本兼治的目的,经临床验证,对治疗产后伤食具有极好的疗效。可广泛应用于产后伤食的临床治疗。

[0008] 为实现上述目的,本发明的技术方案实施如下:

[0009] 一种用于产后伤食治疗与护理的药物,制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

剪刀草 35-59 份 豆豆 33-58 份 馏糖 31-55 份 胡麻草 33-55 份

白芷 28-53 份 佛手柑 27-51 份 竹茹 27-51 份 黄杨木 26-46 份

[0010] 罗勒 26-46 份 党参 25-43 份 扁豆衣 25-43 份 紫檀 23-41 份

金丝带 23-38 份 桂丁 22-35 份 珊瑚花 21-33 份 酒饼叶 18-28 份。

[0011] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

- 剪刀草 53 份 豇豆 51 份 馄糖 49 份 胡麻草 49 份
白芷 46 份 佛手柑 45 份 竹茹 45 份 黄杨木 41 份
[0012] 罗勒 41 份 党参 38 份 扁豆衣 38 份 紫檀 36 份
金丝带 34 份 桂丁 31 份 珊瑚花 30 份 酒饼叶 25 份。
- [0013] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：
剪刀草 47 份 豇豆 45 份 馄糖 43 份 胡麻草 43 份
白芷 40 份 佛手柑 39 份 竹茹 39 份 黄杨木 36 份
[0014] 罗勒 36 份 党参 34 份 扁豆衣 34 份 紫檀 32 份
金丝带 31 份 桂丁 28 份 珊瑚花 27 份 酒饼叶 23 份。
- [0015] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：
剪刀草 41 份 豇豆 39 份 馄糖 37 份 胡麻草 37 份
白芷 34 份 佛手柑 33 份 竹茹 33 份 黄杨木 31 份
[0016] 罗勒 31 份 党参 30 份 扁豆衣 30 份 紫檀 29 份
金丝带 28 份 桂丁 25 份 珊瑚花 24 份 酒饼叶 21 份。
- [0017] 一种用于产后伤食治疗与护理的药物的制备方法，包括以下工艺步骤：
[0018] (1) 将剪刀草和罗勒切细捣碎，滤过取汁液备用；
[0019] (2) 将豇豆微波烘干，研末，得到过100目的细粉，备用；
[0020] (3) 将饴糖、胡麻草、白芷、佛手柑、竹茹、党参、扁豆衣、紫檀、桂丁和珊瑚花放入容器中，加入蒸馏水煮沸提取3次，首次加10-15倍量蒸馏水浸泡4-5小时，加热煮沸提取3-4小时；第二次加8-10倍量蒸馏水加热煮沸提取2-3小时，第三次加6-8倍量蒸馏水加热煮沸提取1-2小时，合并提取液，滤过，得滤液，浓缩成干浸膏备用；
[0021] (4) 将黄杨木、金丝带和酒饼叶放入容器中，浸入10倍量体积浓度70%乙醇溶液浸泡4小时，加热提取，滤过，静置后，回收乙醇并浓缩至60℃相对密度为1.12-1.15的稠膏备用；
[0022] (5) 将步骤(1)-(4)制得的汁液、细粉、干浸膏以及稠膏混合，制成药物，即为所述的用于产后伤食治疗与护理的药物。
[0023] 本发明所用中药的药性如下：
[0024] 剪刀草：味苦、辛，性凉。祛风清热，行气活血，解毒消肿。主感冒发热，食积腹痛，呕吐，泄泻，痢疾，白喉，咽喉肿痛，痈肿丹毒，荨麻疹，毒虫咬伤，跌打伤出血。《泉州本草》载：“清热解毒，祛风止痛，消痈止痢。治妇人血崩，乳痈，赤白痢。外敷痈疽肿毒。”
[0025] 豇豆：味甘、咸，性平；归脾、肾经。健脾利湿，补肾涩精。主脾胃虚弱，泄泻，痢疾，吐逆，消渴，肾虚腰痛，遗精，白带，白浊，小便频数。《四川中药志》载：“滋阴补肾，健脾胃，消食。治食积腹胀，白带，白浊及肾虚遗精。”
[0026] 馄糖：味甘，性温；归脾、胃、肺经。补中益气，健脾和胃，润肺止咳。主治脾胃虚弱，干性咳嗽，肺燥咳嗽。《长沙药解》载：“补脾精，化胃气，生津，养血，缓里急，止腹痛。”

[0027] 胡麻草:味酸,微辛;性温。散瘀止血,消肿止痛。主咯血,咳血,吐血,跌打骨折,内伤瘀血,风湿痹痛。

[0028] 白芷:味辛,性温;归肺、脾、胃经。祛风除湿,通窍止痛,消肿排脓。主感冒头痛,眉棱骨痛,牙痛,鼻塞,鼻渊,湿胜久泻,妇女白带,痈疽疮疡,毒蛇咬伤。《药性论》载:“治心腹血刺痛,除风邪,主女人血崩及呕逆,明目、止泪出,疗妇人沥血、腰腹痛;能蚀脓。”

[0029] 佛手柑:味辛、苦,性温;归肝、胃、脾、肺经。舒肝理气,和胃化痰。主肝气郁结之胁痛,胸闷,肝胃不和,脾胃气滞之脘腹胀痛,暖气,恶心,久咳痰多。《滇南本草》载:“补肝暖胃,止呕吐,消胃寒痰,治胃气疼痛,止面寒疼,和中行气。”

[0030] 竹茹:味甘,性微寒;归脾、胃、胆经。清热化痰,除烦止呕,安胎凉血。主肺热咳嗽,烦热惊悸,胃热呕呃,妊娠恶阻,胎动不安,吐血,衄血,尿血,崩漏。《本草蒙筌》载:“主胃热呃逆,疗噎膈呕哕。”

[0031] 黄杨木:味苦,性平;归心、肝、肾经。祛风除湿,理气,止痛。主风湿痹痛,胸腹气胀,疝气疼痛,牙痛,跌打伤痛。《四川中药志》载:“治风湿,牙痛,气痛,疝痛,胸腹气胀,跌打损伤,妇人难产,及暑月疖疮。”

[0032] 罗勒:味辛、甘,性温;归肺、脾、胃、大肠经。疏风解表,化湿和中,行气活血,解毒消肿。主感冒头痛,发热咳嗽,中暑,食积不化,不思饮食,脘腹胀满疼痛,哎吐泻痢,风湿痹痛,遗精,月经不调,牙痛口臭,胬肉遮睛,皮肤湿疮,癰疹瘙痒,跌打损伤,蛇虫咬伤。广州部队《常用中草药手册》载:“消肿,散瘀止痛。治胃肠胀气,消化不良,胃痛,肠炎腹泻,外感风寒,头痛,胸痛,跌打瘀肿,风湿痹痛,湿疹皮炎。”

[0033] 党参:味甘,性平;归脾、肺经。健脾补肺,益气生津。主脾胃虚弱,食少便溏,四肢乏力,肺虚喘咳,气短自汗,气微两亏诸证。《中药材手册》载:“治虚劳内伤,肠胃中冷,滑泻久痢,气喘烦渴,发热自汗,妇女血崩、胎产诸病。”

[0034] 扁豆衣:味甘、苦,性温;归脾、大肠经。消暑化湿,健脾和胃。主暑湿内蕴,呕吐泄泻,胸闷纳呆,脚气浮肿,妇女带下。《安徽药材》载:“补脾化湿,止泻痢。治食物中毒性上吐下泻,解酒精中毒。”

[0035] 紫檀:味咸,性平;归肝经。祛瘀和营,止血定痛,解毒消肿。主头痛,心腹痛,恶露不尽,小便淋痛,风毒痈肿,金疮出血。《本草经疏》载:“紫真檀,主恶毒风毒。凡毒必因热而发,热甚则生风,而营血受伤,毒乃生焉。此药咸能入血,寒能除热,则毒自消矣。弘景以之敷金疮、止血止痛者,亦取此意耳。宜与番降真香同为极细末,敷金疮良。”

[0036] 金丝带:味甘、苦,性平。除风湿,止血止痛,调经活血,镇静安神,健脾胃。治劳伤腰腿痛,外伤出血,月经不调,子宫脱垂,白带,精神病,癫痫,半身不遂,阳痿,头晕目眩。

[0037] 桂丁:味辛、甘,性温;归脾、胃、肺经。温中散寒,止痛,止呃。主心胸疼痛,胃腹冷痛,恶心,嗳气,呃逆,呕吐,肺寒咳喘。《中药志》载:“温中散寒,治胃脘寒痛呕哕。”

[0038] 珊瑚花:味辛、甘、微苦,性平。理气宽胸,和胃止呕。主胸中痞闷,脘腹胀痛,不思饮食,恶心呕吐。《饮片新参》载:“理气宽胸,开胃止呕。”

[0039] 酒饼叶:味苦、辛,性温,有小毒;归脾、肝经。祛风利湿,化瘀止痛,健脾和胃,截疟杀虫。主风湿骨痛,疟疾,水肿,跌打损伤,风疹,疥癣,烂脚。《陆川本草》载:“止痛,截疟,杀疥癣虫。治跌打损伤,风湿骨痛,寒疟,汗斑,疥癣。”

[0040] 本发明与现有技术相比,具有以下有益效果:

[0041] 本发明药物药方配伍合理,针对脾胃虚弱、气血不足、胃热呕呃、四肢乏力等致病因,选用健脾和胃、舒肝理气、镇静安神、补中止呕之药材合理配伍,制成药物能够调节患者全身机能,达到探病求源、标本兼治的目的,经临床验证,对治疗产后伤食具有极好的疗效。可广泛应用于产后伤食的临床治疗。

具体实施方式

[0042] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。

[0043] 实施例1

[0044] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为:

剪刀草 58g 豇豆 57g 馄糖 54g 胡麻草 54g

[0045] 白芷 52g 佛手柑 50g 竹茹 50g 黄杨木 45g

罗勒 45g 党参 44g 扁豆衣 44g 紫檀 40g

[0046] 金丝带 37g 桂丁 34g 珊瑚花 32g 酒饼叶 27g。

[0047] 本发明药物制备方法的工艺步骤为:

[0048] (1)将剪刀草和罗勒切细捣碎,虑过取汁液备用;

[0049] (2)将豇豆微波烘干,研末,得到过100目的细粉,备用;

[0050] (3)将饴糖、胡麻草、白芷、佛手柑、竹茹、党参、扁豆衣、紫檀、桂丁和珊瑚花放入容器中,加入蒸馏水煮沸提取3次,首次加10-15倍量蒸馏水浸泡4-5小时,加热煮沸提取3-4小时;第二次加8-10倍量蒸馏水加热煮沸提取2-3小时,第三次加6-8倍量蒸馏水加热煮沸提取1-2小时,合并提取液,滤过,得滤液,浓缩成干浸膏备用;

[0051] (4)将黄杨木、金丝带和酒饼叶放入容器中,浸入10倍量体积浓度70%乙醇溶液浸泡4小时,加热提取,滤过,静置后,回收乙醇并浓缩至60℃相对密度为1.12-1.15的稠膏备用;

[0052] (5)将步骤(1)-(4)制得的汁液、细粉、干浸膏以及稠膏混合,制成药物,即为所述的用于产后伤食治疗与护理的药物。

[0053] 用法用量:口服,每日3次,每次2片,5天为一疗程,2-4个疗程即可痊愈,病情严重者遵医嘱酌增用量。

[0054] 实施例2

[0055] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为:

剪刀草 53g 豇豆 51g 馄糖 49g 胡麻草 49g

白芷 46g 佛手柑 45g 竹茹 45g 黄杨木 41g

[0056] 罗勒 41g 党参 38g 扁豆衣 38g 紫檀 36g

金丝带 34g 桂丁 31g 珊瑚花 30g 酒饼叶 25g。

[0057] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例1相同。

[0058] 实施例3

- [0059] 剪刀草 47g 豇豆 45g 馅糖 43g 胡麻草 43g
白芷 40g 佛手柑 39g 竹茹 39g 黄杨木 36g
- [0060] 罗勒 36g 党参 34g 扁豆衣 34g 紫檀 32g
金丝带 31g 桂丁 28g 珊瑚花 27g 酒饼叶 23g。
- [0061] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例1相同。
- [0062] 实施例4
- [0063] 本发明药物有效成分的原料组成及重量数为：
剪刀草 41g 豇豆 39g 馅糖 37g 胡麻草 37g
白芷 34g 佛手柑 33g 竹茹 33g 黄杨木 31g
罗勒 31g 党参 30g 扁豆衣 30g 紫檀 29g
金丝带 28g 桂丁 25g 珊瑚花 24g 酒饼叶 21g。
- [0064] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例1相同。
- [0065] 临床资料：
- [0066] 1、病例选择：
作为产后伤食治疗与护理的药物,选择我院或外院确诊的产后伤食患者200例临床观察,病人随机分成两组,治疗组100例,女性100例,年龄20-45岁,平均年龄30.7岁,病程1个月-1年;对照组100例,女性100例,年龄22-40岁,平均年龄31.2岁,病程病程1个月-1年。两组病例的病程、症状轻重程度基本一致,无显著差异,具有可比性。
- [0067] 2、药物选择：
治疗组患者服用本发明药物,每日3次,每次2片,饭后半小时内温开水送服,5天为一疗程,连续服用2-4个疗程,病情严重者遵医嘱酌增用量。
- [0068] 对照组服用乳酸菌素片,按说明书用,病情严重者遵医嘱酌增用量。
- [0069] 3、疗效判定：
(1)治愈：产后头痛、产后全身酸痛、妊娠呕吐、恶心与呕吐、产道血肿等症状消失，身体恢复正常。
(2)有效：上述症状有所缓解。
(3)无效：病症无变化。
- [0070] 4、结果：
服用本发明药物的治疗组中,治愈70例,有效28例,无效2例,治愈率为70%,总有效率98%。
对照组中治愈30例,有效29例,无效41例,治愈率为30%,总有效率59%。
以上结果显示,治疗组治愈率和总有效率明显高于对照组。
- [0071] 5、典型病例举例：
(1)林某,女,26岁,个体,广东广州人。患者生产后出现腹胀、不思饮食等症状,吃过无数中药,未有好转。后经朋友介绍来我院就诊,经检查确诊为:产后伤食。服用本发明药物2个疗程,上述症状好转,继续服用本发明药物2个疗程,上述症状消失,随访未复发,彻底

治愈。

[0082] (2)、胡某,女,30岁,机关干部,安徽芜湖人。患者因产后过度饮食出现胃纳差、消化不良等症状,被家人送至我院就诊。经医生检查确诊为:产后伤食。后服用本发明药物1个疗程,上述症状减轻,身体好转,继续服用本发明药物1个疗程,上述症状消失,随访未复发,彻底治愈。

[0083] (3)、高某,女,36岁,教师,浙江温州人。患者曾患有产前忧郁症,生产后出现不思饮食的症状,来我院就诊时,患者面色微黄,神疲乏力。经检查确诊为产后伤食。后服用本发明药物1个疗程后,上述症状好转,继续服用本发明药物1个疗程后,面色红润,上述症状均除,身体痊愈,随访未复发。

[0084] (4)、田某,女,29岁,销售员,湖北黄冈人。患者产后因饮食不当,而导致纳呆,脘腹胀满,甚则嗳腐泛酸,恶心呕吐等证。后来我院就诊。给予服用本发明药物1个疗程,上述症状减轻,继续服用本发明药物2个疗程,上述症状消失,身体痊愈,随访未复发,彻底治愈。

[0085] (5)、宋某,女,33岁,银行职员,河南平顶山人。患者产后因和丈夫吵嘴生气,患气逆,胸膈不利。后来我院就诊。服用本发明药物2个疗程后,上述症状减轻,身体好转,继续服用本发明药物2个疗程后,上述症状消失,身体恢复正常,随访未复发。

[0086] (6)、徐某,女,22岁,自由职业,山东菏泽人。患者产后出现头痛、恶心、呕吐等症状,在当地医院诊治未有好转,遂来我院就诊,经检查诊断为产后伤食。后服用本发明药物1个疗程,上述症状好转,继续服用本发明药物2个疗程后,上述症状消失,身体痊愈,随访未复发。