



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101185740 B

(45) 授权公告日 2010.12.29

(21) 申请号 200710301088.0

(22) 申请日 2007.12.11

(73) 专利权人 叶明伟

地址 311400 浙江省富阳市鹤山路 22 号

(72) 发明人 叶明伟 陈亮 程峰

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994 (2006.01)

A61P 11/00 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1228993 A, 1999.09.22, 权利要求 1-2.

CN 1498655 A, 2004.05.26, 权利要求 1-5.

审查员 卞志家

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药

(57) 摘要

本发明涉及一种中药制剂,即一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药。其药物是由下述重量份的原料制成的:白茅根 18-20 克,薏苡仁、香附、防己、葶苈子各 10-12 克,桑叶、茜草根、杏仁、旱莲草各 8-10 克,丹皮、川贝各 5-7 克,鲜大蒜 30-35 克。它具有配方新颖、成本低廉、制备方便、效果显著的特点。

1. 一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药,其特征在于该药物是由下述原料制成的:白茅根 18-20 克,薏苡仁、香附、防己、葶苈子各 10-12 克,桑叶、茜草根、杏仁、旱莲草各 8-10 克,丹皮、川贝各 5-7 克,鲜大蒜 30-35 克。

一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中药制剂,即治疗风热犯肺型咯血效果十分理想的一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药。

背景技术：

[0002] 咯血是指喉头以下包括气管、支气管和肺部的呼吸道出血,经口腔咯出。引起咯血的病因比较复杂,一般认为跟呼吸系统疾病有关。咯血的一般症状表现为:先喉头发痒,自感有腥味,然后咳嗽,或血与痰液混合而出,有时带泡沫。小量咯血与咳嗽、咳痰同时出现,即痰中带血,而大咯血时有大量鲜红色血液突然咯出。风热犯肺型咯血是由外感风热之气,逼气上行所致,其症状表现为:口渴、咽痛、痰黄、先咳嗽后咯血,痰中夹血。目前国内外治疗风热犯肺型咯血的方法较多,如西医治疗法,常用药物有止血敏、安络血、咳美芬等;如中医治疗法,常用药物有银翘散、金沸草散等。但是在治疗效果、治疗费用等方面不令人满意。

发明内容：

[0003] 本发明的目的是针对目前在治疗风热犯肺型咯血上的不足之处,并提供一种新的中药原料组合、疗效显著的治疗风热犯肺型咯血的内服中药及制备方法。

[0004] 本发明的技术方案是这样实现的：

[0005] 一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药,其药物是由下述重量份的原料制成的:白茅根 18-20 克,薏苡仁、香附、防己、葶苈子各 10-12 克,桑叶、茜草根、杏仁、旱莲草各 8-10 克,丹皮、川贝各 5-7 克,鲜大蒜 30-35 克。

[0006] 一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药,其药物的制备方法为:将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内,加入洁净水,加水量以浸过药面 2-3cm 为宜,煎熬前先浸泡半小时,使原料充分湿润,以利药汁充分煎出,然后,用武火煮沸,再改用文火煎熬,当煎熬 20 分钟左右,即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止,滤去药渣,取药汁即成。

[0007] 一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药,其治疗原则是以清宣肺热、凉血止血为主,以疏肝健脾为辅。药物中桑叶、防己具有祛风作用;白茅根、丹皮、旱莲草、桑叶具有清热凉血及止血作用;茜草根、杏仁、川贝具有化痰止咳作用。上述 8 味中药经辨证配伍,能有效地发挥出清宣肺热、凉血止血的功效。此外,辅以薏苡仁健脾,香附疏肝,葶苈子泻肺利水,鲜大蒜抗菌、解毒。以此达到治愈风热犯肺型咯血之目的。

[0008] 本发明具有如下特点:配方新颖、成本低廉、制备方便、效果显著。

[0009] 服用方法：

[0010] 1、药量:每日一剂。每剂先后煎二次,将头煎、二煎两次煎成的汤剂合并后,分两次服用。

[0011] 2、服药时间:上、下午各一次。在饭后两小时服药。

[0012] 3、药温控制:温服。

[0013] 禁忌事项：

[0014] 服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

[0015] 实施例 1：一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药的原料组合为：白茅根 18 克，薏苡仁、香附、防己、葶苈子各 10 克，桑叶、茜草根、杏仁、旱莲草各 8 克，丹皮、川贝各 5 克，鲜大蒜 30 克。药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

[0016] 实施例 2：一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药的原料组合为：白茅根 20 克，薏苡仁、香附、防己、葶苈子各 12 克，桑叶、茜草根、杏仁、旱莲草各 10 克，丹皮、川贝各 7 克，鲜大蒜 35 克。药物的制备方法为：将上述中药原料按配比量放入煎药器具砂锅、瓦罐或铝锅内，加入洁净水，加水量以浸过药面 2-3cm 为宜，煎熬前先浸泡半小时，使原料充分湿润，以利药汁充分煎出，然后，用武火煮沸，再改用文火煎熬，当煎熬 20 分钟左右，即每剂煎成 180-200 毫升药汁时停止，滤去药渣，取药汁即成。

[0017] 临床治疗效果：

[0018] 疗效标准：一种治疗风热犯肺型咯血的内服中药治疗风热犯肺型咯血之疗效判断主要依据于风热犯肺型咯血症状是否消失。服药 7 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——风热犯肺型咯血症状全部消失；好转——风热犯肺型咯血症状明显减轻；无效——服药 1 个疗程后，风热犯肺型咯血症状毫无消失。

[0019] 效果：用本发明药物治疗风热犯肺型咯血患者 22 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 19 例，好转 3 例，治愈率为 86%，有效率为 100%。

[0020] 典型病例：

[0021] 李某，男，45 岁，农民。2004 年 3 月就诊。患者自述从 3 天前开始，口渴、咽痛、呛咯血，胸肋牵痛。诊查舌边红、脉弦数。确诊为风热犯肺型咯血。采用本发明内服中药，先服 4 剂，咯血基本停止，伴随症状明显减轻。继而又服 3 剂，咯血及伴随症状全部消失。3 个月后随访，未见复发。