

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公表特許公報(A)

(11)公表番号
特表2024-533371
(P2024-533371A)

(43)公表日 令和6年9月12日(2024.9.12)

(51)国際特許分類
C 1 2 N 15/113 (2010.01)

F I
C 1 2 N 15/113

Z Z N A


審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全262頁)			
(21)出願番号	特願2024-515376(P2024-515376)	(71)出願人	521488705
(86)(22)出願日	令和4年9月7日(2022.9.7)		アリゴス セラピューティクス, インコ
(85)翻訳文提出日	令和6年5月8日(2024.5.8)		ーポレーテッド
(86)国際出願番号	PCT/US2022/042808		アメリカ合衆国 9 4 0 8 0 カリフォル
(87)国際公開番号	WO2023/039005		ニア州, サウスサンフランシスコ, コー
(87)国際公開日	令和5年3月16日(2023.3.16)		ポレート ドライブ 1, 2 エヌディー
(31)優先権主張番号	63/241,935		フロア
(32)優先日	令和3年9月8日(2021.9.8)	(74)代理人	110002572
(33)優先権主張国・地域又は機関	米国(US)		弁理士法人平木国際特許事務所
(81)指定国・地域	AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA ,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,A T,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR ,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC, 最終頁に続く	(72)発明者	ベージェルマン, レオニド
			アメリカ合衆国 9 4 0 8 0 カリフォル
			ニア州, サウスサンフランシスコ, コー
			ポレート ドライブ 1, 2 エヌディー
			フロア
		(72)発明者	ラジュワンシ, ヴィヴェク クマル
			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 修飾された短い干渉核酸 (s i n A) 分子及びそれらの使用

(57)【要約】

修飾ヌクレオチドを含む短い干渉核酸 (s i n A) 分子、組成物、及び方法、及びそれらの使用が記載される。

【選択図】 図 1




【特許請求の範囲】

【請求項 1】

以下の構造：

【化 1】




10

を含む、ヌクレオチドであって、式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である、ヌクレオチド。

【請求項 2】

以下の構造：

【化 2】




20

を含み、式中、 R_y が、核酸塩基である、請求項 1 に記載のヌクレオチド。

【請求項 3】

以下の構造：

【化 3】



(f N)


30

を含む、ヌクレオチド。

【請求項 4】

以下の構造：

【化 4】



(a p N)

40


を含む、ヌクレオチドであって、式中、 R_y が、核酸塩基である、ヌクレオチド。

【請求項 5】

R_y が、ウラシルであり、前記構造が、以下である、請求項 4 に記載のヌクレオチド。

50

【化 5】




(a p U)

10

【請求項 6】

以下の構造：

【化 6】



20


30

を含む、ヌクレオチドホスフェート模倣体であって、式中、 R_y が、核酸塩基であり、 R^{15} が、H 又は CH_3 である、ヌクレオチドホスフェート模倣体。

【請求項 7】

以下の構造：

【化 7】



40


を含む、ヌクレオチドホスフェート模倣体であって、式中、 R_y が、核酸塩基であり、 R^{15} が、H 又は CH_3 である、ヌクレオチドホスフェート模倣体。

【請求項 8】

前記ヌクレオチドホスフェート模倣体が、以下の構造：

50

【化 8】




10

を含む、請求項 7 に記載のヌクレオチドホスフェート模倣体。

【請求項 9】

以下：


【化 9】



20

(式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である)、

【化 10】



30

(式中、 R_y が、核酸塩基である)、及びそれらの任意の組み合わせから選択される少なくとも 1 個、少なくとも 2 個、少なくとも 3 個、少なくとも 4 個、又は少なくとも 5 個のヌクレオチドを含む、短い干渉核酸 (s i N A) 分子であって、任意選択で、前記ヌクレオチド (複数可) が、前記 s i N A のシード領域に位置する、及び／又はそれを不安定化することが可能である、s i N A 分子。


【請求項 10】

センス鎖及びアンチセンス鎖を含む、短い干渉核酸 (s i N A) 分子であって、前記アンチセンスが、

40

50

【化 1 1】



10

20

から選択されるその 5' 末端にヌクレオチドホスフェート模倣体を含み、式中、 R_y が、核酸塩基であり、 R^{15} が、H 又は CH_3 である、s i N A 分子。

30

【請求項 1 1】

短い干渉核酸 (s i N A) 分子であって、

(a) 標的遺伝子に対応する RNA に対して少なくとも約 60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は 100% 同一である第 1 のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、前記第 1 のヌクレオチド配列が、

(v) 15~30 ヌクレオチド長であり、

(v i) 2'-O-メチルヌクレオチド及び 2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される 15 個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも 1 つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、前記第 1 のヌクレオチド配列の 5' 末端から 3、5、7、8、9、10、11、12、14、17、及び／又は 19 位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドであるか、又は少なくとも 1 つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも 1 つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、

40

前記標的遺伝子に対応する前記 RNA に対して少なくとも約 60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は 100% 相補的である第 2 のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、前記第 2 のヌクレオチド配列が、

(v i i) 15~30 ヌクレオチド長であり、

(v i i i) 2'-O-メチルヌクレオチド及び 2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される 15 個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも 1 つの修飾ヌクレオ

50

チドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含むか、あるいは

(b) 標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である第1のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、前記第1のヌクレオチド配列が、

(i) 15~30ヌクレオチド長であり、

(ii) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、

10

前記標的遺伝子に対応する前記RNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である第2のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、前記第2のヌクレオチド配列が、

(iii) 15~30ヌクレオチド長であり、

(iv) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、前記第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含む、

前記センス鎖及び／又は前記アンチセンス鎖が、請求項1~5のいずれか一項に記載の少なくとも1個、少なくとも2個、少なくとも3個、少なくとも4個、又は少なくとも5個のヌクレオチドを含む、siNA分子。

20

【請求項12】

短い干渉核酸 (siNA) 分子であって、

(a) 標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である第1のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、前記第1のヌクレオチド配列が、

(i) 15~30ヌクレオチド長であり、

(ii) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、前記第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、5、7、8、9、10、11、12、14、17、及び／又は19位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドであるか、又は少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、

30

前記標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である第2のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、前記第2のヌクレオチド配列が、

(iii) 15~30ヌクレオチド長であり、

(iv) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含むか、あるいは

40

(b) 標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である第1のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、前記第1のヌクレオチド配列が、

(i) 15~30ヌクレオチド長であり、

(ii) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-

50

フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、

前記標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である第2のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、前記第2のヌクレオチド配列が、

(i i i) 15～30ヌクレオチド長であり、

(i v) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、前記第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含み、


10

前記アンチセンス鎖が、請求項6～8のいずれか一項に記載のヌクレオチドホスフェート模倣体をその5'末端に含む、siNA分子。

【請求項13】

前記アンチセンス鎖が、

【化12】



20

30

40

から選択される5'安定化エンドキャップを含み、式中、 R_y が、核酸塩基であり、 R^{15} が、H又は CH_3 である、請求項9又は11に記載のsiNA。

【請求項14】

前記アンチセンス鎖が、式(1)～式(16)、式(9X)～式(12X)、式(16X)、式(9Y)～式(12Y)、式(16Y)、式(21)～式(36)、式36X、式(41)～(56)、式(49X)～(52X)、式(49Y)～(52Y)、式56

50

10



式(2)

式 (3)

式(4)



式(6)

式(7)



式(9)

式(9X)

式(9Y)



式(10X)

式 (10Y)



式(11X)

式(11Y)



式(12X)


式 (12Y)




式 (14)

式 (15)


【化 13 - 2】




式(16)




式(16X)




式(16Y)




式(21)




式(22)




式(23)




式(24)




式(25)




式(26)




式(27)




式(28)




式(29)




式(30)




式(31)




式(32)




式(33)




式(34)




式(35)




式(36)




式(36X)




式(41)



式(42)



式(43)



式(44)

10


20

30


40

50


【化 1 3 - 3】




式 (45)




式 (46)




式 (47)




式 (48)



式 (49)




式 (49X)




式 (49Y)


10



式 (50)




式 (50X)




式 (50Y)


20




式 (51)




式 (51X)




式 (51Y)



式 (52)




式 (52X)




式 (52Y)


30




式 (53)




式 (54)




式 (55)



式 (56)



式 (56X)




式 (56Y)


40

50


【化 1 3 - 4】



式 (61)



式(62)



式(63)

10

からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含み、式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である、請求項 9 又は 11 に記載の *s i N A* 分子。

【請求項 15】

前記アンチセンス鎖が、式 (71) ~ 式 (86)、式 (79X) ~ 式 (82X)、式 (79Y) ~ (82Y)、式 86X、式 86X'、式 86Y、及び式 86Y' :


20

30

40

50

【化 1 4 - 1】




式(71)

式(72)

式(73)


式(74)



式(75)

式(76)

式(77)




式(78)

式(79)

式(79X)


式(79Y)



式(80)

式(80X)


式(80Y)



式(81)

式(81X)


式(81Y)



式(82)

式(82X)

式(82Y)



式(83)

式(84)

式(85)

10


20

30


40

50


【化 1 4 - 2】



式 (86)




式 (86X)




式 (86X')

10



式 (86Y)



式 (86Y')

からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含み、式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である、請求項 9 又は 11 に記載の siNA 分子。

20

【請求項 16】


前記アンチセンス鎖が、式 (1A) ~ (15A)、式 (1A-1) ~ (7A-1)、式 (1A-2) ~ (7A-2)、式 (1A-3) ~ (7A-3)、式 (1A-4) ~ (7A-4)、式 (9B) ~ (12B)、式 (9AX) ~ (12AX)、式 (9AY) ~ (12AY)、式 (9BX) ~ (12BX)、及び式 (9BY) ~ (12BY) からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含む、請求項 9 又は 11 に記載の siNA。

30

40

50

【化 15 - 1】




式(1A)

式(2A)

式(3A)

式(4A)




式(1A-1)

式(2A-1)

式(3A-1)

式(4A-1)




式(1A-2)

式(2A-2)

式(3A-2)

式(4A-2)




式(1A-3)

式(2A-3)

式(3A-3)

式(4A-3)




式(1A-4)

式(2A-4)

式(3A-4)

式(4A-4)



式(5A)

式(5A-1)

式(5A-2)

10


20

30


40

50


【化 15 - 2】




式(5A-3)




式(5A-4)




式(6A)




式(6A-1)




式(6A-2)




式(6A-3)




式(6A-4)




式(7A)




式(7A-1)




式(7A-2)




式(7A-3)




式(7A-4)




式(8A)



式(9A)



式(9AX)



式(9AY)

10


20

30


40

50


【化 15 - 3】




式(9B)




式(9BX)




式(9BY)



式(10A)




式(10AX)




式(10AY)


10




式(10B)




式(10BX)




式(10BY)



式(11A)




式(11AX)




式(11AY)


20




式(11B)




式(11BX)




式(11BY)



式(12A)




式(12AX)




式(12AY)


30



式(12B)



式(12BX)




式(12BY)

40

50

【化 1 5 - 4】



10

【請求項 1 7】

前記アンチセンス鎖が、式 (2 1 A) ~ (3 5 A)、式 (2 9 B) ~ (3 2 B)、式 (2 9 A X) ~ (3 2 A X)、式 (2 9 A Y) ~ (3 2 A Y)、式 (2 9 B X) ~ (3 2 B X)、及び式 (2 9 B Y) ~ (3 2 B Y) からなる群から選択される 5' 安定化エンドキヤップを含む、請求項 9 又は 1 1 に記載の s i N A。







20

30

40

50

【化 16 - 1】



10


20

30


40

50


【化 16 - 2】



式 (31A)




式 (31AX)




式 (31AY)


10




式 (31B)




式 (31BX)




式 (31BY)



式 (32A)




式 (32AX)




式 (32AY)


20



式 (32B)




式 (32BX)




式 (32BY)


30



式 (33A)



式 (34A)




式 (35A)

40

【請求項 18】

前記アンチセンス鎖が、式 (71A) ~ (86A)、式 (79XA) ~ (82XA)、式 (79YA) ~ (82YA)、式 (86XA)、式 (86X'A)、式 (86Y)、及び式 (86Y') からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含む、請求項 9 又は 11 に記載の siNA。

【化 17-1】




式(71A)

式(72A)

式(73A)


式(74A)



式(75A)

式(76A)

式(77A)




式(78A)

式(79A)

式(79XA)


式(79YA)



式(80A)

式(80XA)

式(80YA)



式(81A)

式(81XA)

式(81YA)

10


20

30

40

50

【化 17-2】




式 (82A)

式 (82XA)

式 (82YA)

10




式 (83A)

式 (84A)

式 (85A)

20




式 (86A)

式 (86XA)

式 (86X'A)

30



式 (86Y)

式 (86Y')

40

【請求項 19】

前記センス鎖及び／又は前記アンチセンス鎖が、独立して、1個以上のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む、請求項9～18のいずれか一項に記載の s i N A。

【請求項 20】

前記センス鎖及び／又は前記アンチセンス鎖が、独立して、1個以上のメシルホスホロアミデートヌクレオシド間連結を含む、請求項9～19のいずれか一項に記載の s i N A

。

【請求項 21】

前記 s i N A が、リン酸化ブロッカーを更に含む、請求項9～20のいずれか一項に記

50

載の s i N A。

【請求項 2 2】

前記センス鎖が、少なくとも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 個、又はそれより多くのホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む、請求項 9～21 のいずれか一項に記載の s i N A 分子。

【請求項 2 3】

(i) 前記センス鎖の少なくとも 1 個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結が、前記第 1 のヌクレオチド配列の 5' 末端から 1 及び 2 位置の前記ヌクレオチド間にあり、(ii) 少なくとも 1 個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結が、前記第 1 のヌクレオチド配列の 5' 末端から 2 及び 3 位置の前記ヌクレオチド間にある、請求項 22 に記載の s i N A 分子。

10

【請求項 2 4】

前記アンチセンス鎖が、少なくとも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 個、又はそれより多くのホスホロチオエートヌクレオシド間連結を更に含む、請求項 9～23 のいずれか一項に記載の s i N A 分子。

【請求項 2 5】

(i) 前記アンチセンス鎖の少なくとも 1 個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結が、前記第 2 のヌクレオチド配列の前記 5' 末端から 1 及び 2 位置の前記ヌクレオチド間にあり、

(ii) 前記アンチセンス鎖の少なくとも 1 個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結が、前記第 2 のヌクレオチド配列の前記 5' 末端から 2 及び 3 位置の前記ヌクレオチド間にあり、

20

(iii) 前記アンチセンス鎖の少なくとも 1 個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結が、前記第 2 のヌクレオチド配列の前記 3' 末端から 1 及び 2 位置の前記ヌクレオチド間にあり、(iv) 少なくとも 1 個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結が、前記第 2 のヌクレオチド配列の前記 3' 末端から 2 及び 3 位置の前記ヌクレオチド間にある、請求項 24 に記載の s i N A 分子。

【請求項 2 6】

前記センス鎖が、少なくとも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 個、又はそれより多くのメシルホスホロアミデートヌクレオシド間連結を含む、請求項 9～25 のいずれか一項に記載の s i N A 分子。

30

【請求項 2 7】

(i) 前記センス鎖の少なくとも 1 個のメシルホスホロアミデートヌクレオシド間連結が、前記第 1 のヌクレオチド配列の前記 5' 末端から 1 及び 2 位置の前記ヌクレオチド間にあり、(ii) 少なくとも 1 個のメシルホスホロアミデートヌクレオシド間連結が、前記第 1 のヌクレオチド配列の前記 5' 末端から 2 及び 3 位置の前記ヌクレオチド間にある、請求項 26 に記載の s i N A 分子。

【請求項 2 8】

前記アンチセンス鎖が、少なくとも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 個、又はそれより多くのメシルホスホロアミデートヌクレオシド間連結を更に含む、請求項 9～27 のいずれか一項に記載の s i N A 分子。

40

【請求項 2 9】

(i) 前記アンチセンス鎖の少なくとも 1 個のメシルホスホロアミデートヌクレオシド間連結が、前記第 2 のヌクレオチド配列の前記 5' 末端から 1 及び 2 位置の前記ヌクレオチド間にあり、

(ii) 前記アンチセンス鎖の少なくとも 1 個のメシルホスホロアミデートヌクレオシド間連結が、前記第 2 のヌクレオチド配列の前記 5' 末端から 2 及び 3 位置の前記ヌクレオチド間にあり、

(iii) 前記アンチセンス鎖の少なくとも 1 個のメシルホスホロアミデートヌクレオシド間連結が、前記第 2 のヌクレオチド配列の前記 3' 末端から 1 及び 2 位置の前記ヌク

50

レオチド間にあり、(iv) 少なくとも1個のメシルホスホロアミデートヌクレオシド間連結が、前記第2のヌクレオチド配列の前記3'末端から2及び3位置の前記ヌクレオチド間にある、請求項28に記載の siNA 分子。

【請求項30】

センス鎖及びアンチセンス鎖を含む短い干渉核酸 (siNA) であって、前記センス鎖及び／又はアンチセンス鎖が、独立して、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個、又はそれより多くのメシルホスホロアミデートヌクレオシド間連結を含む、短い干渉核酸 (siNA)。


【請求項31】

前記 siNA が、ガラクトサミンを更に含む、請求項9～30のいずれか一項に記載の siNA。

【請求項32】

前記ガラクトサミンが、式 (VI)：

【化18】



の N-アセチルガラクトサミン (GalNAc) であり、式中、

m が、1、2、3、4、又は5であり、

各 n が、独立して、1又は2であり、

p が、0又は1であり、

各 R が、独立して、Hであり、

各 Y が、独立して、 $-O-P(=O)(SH)-$ 、 $-O-P(=O)(O)-$ 、 $-O-P(=O)(OH)-$ 、及び $-O-P(S)S-$ から選択され、

Z が、H又は第2の保護基であり、

いずれかの L がリンカーであるか、又は L 及び Y が組み合わさってリンカーであり、

A が、H、OH、第3の保護基、活性化基、又はオリゴヌクレオチドである、請求項31に記載の siNA。

【請求項33】

前記ガラクトサミンが、式 (VII)：

10


20

30

40

50

【化 19】



10

の N-アセチルガラクトサミン (GalNAc) であり、式中、 R^Z が、OH 又は SH であり、各 n が、独立して、1 又は 2 である、請求項 31 に記載の s i N A。

【請求項 34】

- (i) 前記 s i N A の少なくとも 1 つの末端が、平滑末端であり、
- (i i) 前記 s i N A の少なくとも 1 つの末端が、オーバーハングを含み、前記オーバーハングが、少なくとも 1 つのヌクレオチドを含むか、又は
- (i i i) 前記 s i N A の両方の末端が、オーバーハングを含み、前記オーバーハングが、少なくとも 1 つのヌクレオチドを含む、請求項 9 ～ 33 のいずれか一項に記載の s i N A。

20

【請求項 35】

- (i) 前記標的遺伝子が、ウイルス遺伝子であるか、
- (i i) 前記標的遺伝子が、遺伝子であり、DNA ウイルス由来であるか、
- (i i i) 前記標的遺伝子が、二本鎖 DNA (dsDNA) ウイルス由来の遺伝子であるか、
- (i v) 前記標的遺伝子が、ヘパドナウイルス由来の遺伝子であるか、
- (v) 前記標的遺伝子が、B 型肝炎ウイルス (HBV) 由来の遺伝子であるか、
- (v i) 前記標的遺伝子が、遺伝子型 A ～ J のうちのいずれか 1 つの HBV 由来の遺伝子であるか、又は
- (v i i) 前記標的遺伝子が、HBV の前記 S 遺伝子若しくは X 遺伝子から選択される、請求項 9 ～ 34 のいずれか一項に記載の s i N A。

30

【請求項 36】

表 1、表 2、表 3、表 4、又は表 5 に示される、s i N A。

【請求項 37】

請求項 9 ～ 36 のいずれか一項に記載の s i N A、及び薬学的に許容される賦形剤を含む、組成物。

40

【請求項 38】

請求項 9 ～ 36 のいずれか一項に記載の 2、3、4、5、6、7、8、9、10 個、又はそれより多くの s i N A を更に含む、請求項 37 に記載の組成物。

【請求項 39】

追加の治療薬剤を更に含む、請求項 37 又は 38 に記載の組成物。

【請求項 40】

前記追加の治療薬剤が、ヌクレオチド類似体、ヌクレオシド類似体、カプシドアセンブリモジュレーター (CAM)、組換えインターフェロン、侵入阻害剤、小分子免疫モジュレーティブ、及びオリゴヌクレオチド療法から選択される、請求項 39 に記載の組成物。

【請求項 41】

50

前記オリゴヌクレオチド療法が、追加の s i N A、アンチセンスオリゴヌクレオチド（A S O）、N A P、又は S T O P S（商標）である、請求項 4 0 に記載の組成物。

【請求項 4 2】

疾患の治療を必要とする対象においてそれを行う方法であって、請求項 9 ～ 3 6 のいずれか一項に記載の s i N A 又は請求項 3 7 ～ 4 1 のいずれか一項に記載の組成物を前記対象に投与することを含む、方法。

【請求項 4 3】

前記疾患が、D N A ウイルス又は二本鎖 D N A（d s D N A）ウイルスによって任意選択で引き起こされるウイルス性疾患である、請求項 4 3 に記載の方法。

【請求項 4 4】

前記 d s D N A ウイルスが、ヘパドナウイルスである、請求項 4 3 に記載の方法。

【請求項 4 5】

前記ヘパドナウイルスが、B 型肝炎ウイルス（H B V）であり、任意選択で、前記 H B V が、H B V 遺伝子型 A ～ J から選択される、請求項 4 4 に記載の方法。

【請求項 4 6】

追加の H B V 治療薬剤を投与することを更に含む、請求項 4 5 に記載の方法。

【請求項 4 7】

前記 s i N A 又は前記組成物及び前記追加の H B V 治療薬剤が、同時に投与されるか、又は順次投与される、請求項 4 6 に記載の方法。

【請求項 4 8】

前記追加の H B V 治療薬剤が、ヌクレオチド類似体、ヌクレオシド類似体、カプシドアセンブリモジュレーター（C A M）、組換えインターフェロン、侵入阻害剤、小分子免疫モジュレーター、及びオリゴヌクレオチド療法から選択される、請求項 4 6 又は 4 7 に記載の方法。

【請求項 4 9】

前記ウイルス性疾患が、コロナウイルスによって引き起こされる疾患であり、任意選択で、前記コロナウイルスが、S A R S - C o V - 2 である、請求項 4 3 に記載の方法。

【請求項 5 0】

前記疾患が、肝臓疾患である、請求項 4 2 に記載の方法。

【請求項 5 1】

前記肝臓疾患が、非アルコール性脂肪肝疾患（N A F L D）又は肝細胞がん腫（H C C）である、請求項 5 0 に記載の方法。

【請求項 5 2】

前記 N A F L D が、非アルコール性脂肪性肝炎（N A S H）である、請求項 5 1 に記載の方法。

【請求項 5 3】

肝臓疾患治療薬剤を前記対象に投与することを更に含む、請求項 5 0 ～ 5 2 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 5 4】

前記肝臓疾患治療薬剤が、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体（P P A R）アゴニスト、ファルネソイド X 受容体（F X R）アゴニスト、脂質改変剤、及びインクレチン系療法から選択される、請求項 5 3 に記載の方法。

【請求項 5 5】

（i）前記 P P A R アゴニストが、P P A R α アゴニスト、デュアル P P A R α / δ アゴニスト、P P A R γ アゴニスト、及びデュアル P P A R α / γ アゴニストから選択されるか、（i i）前記脂質改変剤が、アラムコールであるか、又は（i i i）前記インクレチン系療法が、グルカゴン様ペプチド 1（G L P - 1）受容体アゴニスト若しくはジペプチルペプチダーゼ 4（D P P - 4）阻害剤である、請求項 5 4 に記載の方法。

【請求項 5 6】

前記 s i N A 又は前記組成物及び前記肝臓疾患治療薬剤が、同時に投与されるか、又は

10

20

30

40

50

順次投与される、請求項 42～55 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 57】

前記 s i N A 又は前記組成物が、少なくとも 1 mg / k g、2 mg / k g、3 mg / k g、4 mg / k g、5 mg / k g、6 mg / k g、7 mg / k g、8 mg / k g、9 mg / k g、10 mg / k g、11 mg / k g、12 mg / k g、13 mg / k g、14 mg / k g、又は 15 mg / k g の用量で投与される、請求項 42～56 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 58】

前記 s i N A 又は前記組成物が、0.5 mg / k g～50 mg / k g、0.5 mg / k g～40 mg / k g、0.5 mg / k g～30 mg / k g、1 mg / k g～50 mg / k g、1 mg / k g～40 mg / k g、1 mg / k g～30 mg / k g、1 mg / k g～20 mg / k g、3 mg / k g～50 mg / k g、3 mg / k g～40 mg / k g、3 mg / k g～30 mg / k g、3 mg / k g～20 mg / k g、3 mg / k g～15 mg / k g、3 mg / k g～10 mg / k g、4 mg / k g～50 mg / k g、4 mg / k g～40 mg / k g、4 mg / k g～30 mg / k g、4 mg / k g～20 mg / k g、4 mg / k g～15 mg / k g、4 mg / k g～10 mg / k g、5 mg / k g～50 mg / k g、5 mg / k g～40 mg / k g、5 mg / k g～30 mg / k g、5 mg / k g～20 mg / k g、5 mg / k g～15 mg / k g、又は 5 mg / k g～10 mg / k g の用量で投与される、請求項 42～56 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 59】

前記 s i N A 又は前記組成物が、少なくとも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、又は 10 回投与される、請求項 42～58 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 61】

前記 s i N A 又は前記組成物が、1 日に少なくとも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、又は 10 回、1 週間に少なくとも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、又は 10 回、又は 1 ヶ月に少なくとも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、又は 10 回投与される、請求項 42～59 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 61】

前記 s i N A 又は前記組成物が、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、又は 21 日ごとに少なくとも 1 回投与される、請求項 42～59 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 62】

前記 s i N A 又は前記組成物が、少なくとも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、又は 21 日間、又は少なくとも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、35、40、45、50、51、52、53、54、又は 55 週間の期間にわたって投与される、請求項 42～59 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 63】

前記 s i N A 又は前記組成物が、5 mg / k g 又は 10 mg / k g の単回用量で、10 mg / k g の 3 回用量で 1 週間に 1 回、10 mg / k g の 3 回用量で 3 日に 1 回、又は 10 mg / k g の 5 回用量で 3 日に 1 回投与される、請求項 42～62 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 64】

前記 s i N A 又は前記組成物が、1 mg / k g～15 mg / k g、1 mg / k g～10 mg / k g、2 mg / k g～15 mg / k g、2 mg / k g～10 mg / k g、3 mg / k g～15 mg / k g、又は 3 mg / k g～10 mg / k g の範囲の 6 回用量で投与され、前記第 1 回用量及び第 2 回用量が、任意選択で、少なくとも 3 日間隔を置いて投与され、前記第 2 回用量及び第 3 回用量は、任意選択で、少なくとも 4 日間隔を置いて投与され、前記第 3 回用量及び第 4 回用量、第 4 回用量及び第 5 回用量、並びに／又は第 5 回用量

及び第6回用量が、任意選択で、少なくとも7日間隔を置いて投与される、請求項42～62のいずれか一項に記載の方法。

【請求項65】

前記s i N A又は前記組成物が、粒子又はウイルスベクターで投与され、前記ウイルスベクターが、任意選択で、アデノウイルス、アデノ随伴ウイルス(AAV)、アルファウイルス、フラビウイルス、単純ヘルペスウイルス、レンチウイルス、麻疹ウイルス、ピコルナウイルス、ポックスウイルス、レトロウイルス、及びラブドウイルスのベクターから選択される、請求項42～64のいずれか一項に記載の方法。

【請求項66】

前記ウイルスベクターが、組換えウイルスベクターである、請求項65に記載の方法。

【請求項67】

前記ウイルスベクターが、AAVrh.74、AAVrh.10、AAVrh.20、AAV-1、AAV-2、AAV-3、AAV-4、AAV-5、AAV-6、AAV-7、AAV-8、AAV-9、AAV-10、AAV-11、AAV-12、及びAAV-13から選択される、請求項65又は66に記載の方法。

【請求項68】

前記s i N A又は前記組成物が、全身的に投与されるか、又は局所的に投与される、請求項42～67のいずれか一項に記載の方法。

【請求項69】

前記s i N A又は前記組成物が、静脈内、皮下、又は筋肉内に投与される、請求項42～68のいずれか一項に記載の方法。

【請求項70】

対象の疾患を治療するための、請求項9～36のいずれか一項に記載のs i N A、又は請求項37～41のいずれか一項に記載の組成物の、使用。

【請求項71】

前記疾患が、DNAウイルス若しくは二本鎖DNA(dsDNA)ウイルス又は前記疾患によって任意選択で引き起こされるウイルス性疾患である、請求項70に記載の使用。

【請求項72】

前記疾患が、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)及び肝細胞がん腫(HCC)から任意選択で選択される、肝臓疾患である、請求項70に記載の使用。

【請求項73】

対象の疾患の治療に使用するための、請求項9～36のいずれか一項に記載のs i N A、又は請求項37～41のいずれか一項に記載の組成物。

【請求項74】

前記疾患が、DNAウイルス又は二本鎖DNA(dsDNA)ウイルス又は前記疾患によって任意選択で引き起こされるウイルス性疾患である、請求項73に記載のs i N A又は組成物。

【請求項75】

前記疾患が、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)及び肝細胞がん腫(HCC)から任意選択で選択される、肝臓疾患である、請求項73に記載のs i N A又は組成物。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願の相互参照

本出願は、2021年9月8日に出願された米国仮出願第63/241,935号に対する優先権を主張するものであり、その開示は、参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。

【0002】

修飾ヌクレオチドを含む短い干渉核酸(s i N A)分子、組成物、及び方法、及びそれらの使用が記載される。

10

20

30

40

50

【背景技術】

【0003】

RNA干渉（RNAi）は、内因性寄生性核酸及び外因性病原性核酸の両方に対する抵抗性を媒介し、タンパク質コード遺伝子の発現を調節する、二本鎖RNAに対する生物学的応答である。短い干渉核酸（siNA）、例えば、siRNAは、様々な疾患を治療するためのRNAi療法のために開発されてきた。例えば、RNAi療法は、代謝性疾患、神経変性疾患、がん、及び病原性感染症の治療のために提案されてきた（例えば、Rondindone, Biotechniques, 2018, 40(4S), doi.org/10.2144/000112163、Boudreau and Davidson, Curr Top Dev Biol, 2006, 75:73-92、Chalbatani et al., Int J Nanomedicine, 2019, 14:3111-3128、Arbutnot, Drug News Perspect, 2010, 23(6):341-50、及びChernikov et al., Front. Pharmacol., 2019, doi.org/10.3389/fphar.2019.00444を参照されたい、それらの各々が、参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる）。しかしながら、RNAi療法の主な制限は、siRNAを標的細胞に効果的に送達する能力及び、siRNAの分解である。

10

【0004】

本開示は、修飾核酸塩基を含むsiNA分子を提供することによって、siNA分子の送達及び安定性を改善する。本開示のsiNA分子は、siNA分子の送達及び安定性を改善するための最適化された組み合わせ及び数の修飾ヌクレオチド、ヌクレオチド長、設計（平滑末端又はオーバーハング、ヌクレオシド間連結、コンジュゲート）、並びに修飾パターンを提供する。

20

【発明の概要】

【0005】

本明細書に記載されるのは、新規の修飾核酸塩基モノマー、ホスフェート模倣体、及び／又は他の修飾を含む、短い干渉核酸（siNA）分子である。本明細書に記載されるのはまた、様々な疾患及び状態を治療するために開示されるsiNA分子を使用する方法である。

30


【0006】

第1の態様では、本開示は、以下の構造：


40

50

【化 1】




(f B)、



(f (4 n h) Q)、

10



又は

(f N)

20


を含むヌクレオチド、並びに前述のヌクレオチドのうちのいずれか1つ又はこれらのヌクレオチドの組み合わせを含む核酸配列及び s i N A を提供する。

【0007】

第2の態様では、本開示は、以下の構造：

【0008】


【化 2】



30

を含むヌクレオチドを提供し、式中、 R_x は、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である。例えば、ヌクレオチドは、以下の構造：

【化 3】




40

を含み得、式中、 R_y は、核酸塩基である。

【0009】

第3の態様では、本開示は、以下の構造：


【化 4】



(a p N)

50


【化 5】



10

第 4 の態様では、本開示は、以下の構造：

【化 6】



20


30

40

【 0 0 1 1 】

50

は、アンチセンス鎖は、
【化 7】



10

20

30

から選択される 5' 安定化エンドキャップを含み得、式中、 R_y は、核酸塩基であり、 R^{15} は、H 又は CH_3 である。

【0012】

本開示は、センス鎖及びアンチセンス鎖を含む短い干渉核酸 (s i N A) 分子を提供し、アンチセンスは、その 5' 末端に第 4 の態様に一致するヌクレオチドホスフェート模倣体を含む。

【0013】

本開示は、短い干渉核酸 (s i N A) 分子であって、

(a) 標的遺伝子に対応する RNA に対して少なくとも約 60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は 100% 同一である第 1 のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、第 1 のヌクレオチド配列が、

40

15 ~ 30 ヌクレオチド長であり、

2' - O - メチルヌクレオチド及び 2' - フルオロヌクレオチドから独立して選択される 15 個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも 1 つの修飾ヌクレオチドが、2' - O - メチルヌクレオチドであり、第 1 のヌクレオチド配列の 5' 末端から 3、5、7、8、9、10、11、12、14、17、及び / 又は 19 位置のヌクレオチドが、2' - フルオロヌクレオチドであるか、又は少なくとも 1 つの修飾ヌクレオチドが、2' - O - メチルヌクレオチドであり、少なくとも 1 つの修飾ヌクレオチドが、2' - フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、

標的遺伝子に対応する RNA に対して少なくとも約 60%、65%、70%、75%、

50

80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である第2のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、第2のヌクレオチド配列が、

15～30ヌクレオチド長であり、

2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含むか、あるいは

(b) 標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である第1のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、第1のヌクレオチド配列が、

10

(i) 15～30ヌクレオチド長であり、

(ii) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である第2のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、第2のヌクレオチド配列が、

(iii) 15～30ヌクレオチド長であり、

(iv) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選 20
択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含み、

センス鎖及び／又はアンチセンス鎖が、第1、第2、又は第3の態様による、少なくとも1個、少なくとも2個、少なくとも3個、少なくとも4個、又は少なくとも5個のヌクレオチドを含む、siNA分子を提供する。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は


、
【0014】

30

40

50

【化 8】



10

20

又は

30

から選択される 5' 安定化エンドキャップを含み得、式中、 R_y は、核酸塩基であり、 R^{15} は、H 又は CH_3 である。

【0015】

本開示は、短い干渉核酸 (siNA) 分子であって、

(a) 標的遺伝子に対応する RNA に対して少なくとも約 60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は 100% 同一である第 1 のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、第 1 のヌクレオチド配列が、

15 ~ 30 ヌクレオチド長であり、

2' -O-メチルヌクレオチド及び 2' -フルオロヌクレオチドから独立して選択される 15 個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも 1 つの修飾ヌクレオチドが、2' -O-メチルヌクレオチドであり、第 1 のヌクレオチド配列の 5' 末端から 3、5、7、8、9、10、11、12、14、17、及び／又は 19 位置のヌクレオチドが、2' -フルオロヌクレオチドであるか、又は少なくとも 1 つの修飾ヌクレオチドが、2' -O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも 1 つの修飾ヌクレオチドが、2' -フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、

40

標的遺伝子に対応する RNA に対して少なくとも約 60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は 100% 相補的である第 2 のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、第 2 のヌクレオチド配列が、

15 ~ 30 ヌクレオチド長であり、

2' -O-メチルヌクレオチド及び 2' -フルオロヌクレオチドから独立して選択される

50

15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含むか、あるいは

(b) 標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である第1のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、第1のヌクレオチド配列が、

(i) 15~30ヌクレオチド長であり、

(ii) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である第2のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、第2のヌクレオチド配列が、

(iii) 15~30ヌクレオチド長であり、

(iv) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含む、

アンチセンス鎖が、第4の態様によるヌクレオチドホスフェート模倣体をその5'末端に含む、siNA分子を提供する。

【0016】

開示されるsiNA分子のいくつかの実施形態では、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖は、独立して、1つ以上のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。

【0017】

開示されるsiNA分子のいくつかの実施形態では、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖は、独立して、1つ以上のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。

【0018】

開示されるsiNA分子のいくつかの実施形態では、siNAは、リン酸化ブロッカー、ガラクトサミン、及び／又は5'安定化エンドキャップを更に含む。

【0019】

開示されるsiNA分子のいくつかの実施形態では、センス鎖は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個、又はそれより多くのホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、(i) センス鎖の少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第1のヌクレオチド配列の5'末端から1及び2位置のヌクレオチド間にあり、(ii) 少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第1のヌクレオチド配列の5'末端から2及び3位置のヌクレオチド間にある。

【0020】

開示されるsiNA分子のいくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個、又はそれより多くのホスホロチオエートヌクレオシド間連結を更に含む。いくつかの実施形態では、(i) アンチセンス鎖の少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の5'末端から1及び2位置のヌクレオチド間にあり、(ii) アンチセンス鎖の少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2及び3位置のヌクレオチド間にあり、(iii) アンチセンス鎖の少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の3'末端から1及び2位置のヌクレオチド間にあり、並びに／又は(iv) 少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の3

10

20

30

40

50

’末端から2及び3位置のヌクレオチド間にある。

【0021】

開示される s i N A 分子のいくつかの実施形態では、センス鎖は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個、又はそれより多くのメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、(i) センス鎖の少なくとも1個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結は、第1のヌクレオチド配列の5’末端から1及び2位置のヌクレオチド間にあり、(ii) 少なくとも1個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結は、第1のヌクレオチド配列の5’末端から2及び3位置のヌクレオチド間にある。

【0022】

開示された s i N A 分子のいくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個、又はそれより多くのメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を更に含む。いくつかの実施形態では、(i) アンチセンス鎖の少なくとも1個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の5’末端から1及び2位置のヌクレオチド間にあり、(ii) アンチセンス鎖の少なくとも1個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の5’末端から2及び3’末端のヌクレオチド間にあり、(iii) アンチセンス鎖の少なくとも1個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の3’末端から1及び2’位置のヌクレオチド間にあり、並びに／又は(iv) 少なくとも1個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の3’末端から2及び3位置のヌクレオチド間にある。

【0023】

本開示は、センス鎖及びアンチセンス鎖を含む短い干渉核酸(s i N A)を更に提供し、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖は、独立して、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個、又はそれより多くのメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。

【0024】

開示される s i N A 分子のいくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、式(1)～式(16)、式(9X)～式(12X)、式(16X)、式(9Y)～式(12Y)、式(16Y)、式(21)～式(36)、式36X、式(41)～(56)、式(49X)～(52X)、式(49Y)～(52Y)、式56X、式56Y、式(61)、式(62)、及び式(63)：

10


20

30

40

50

【化 9 - 1】




式(1)

式(2)

式(3)


式(4)



式(5)

式(6)

式(7)




式(8)

式(9)

式(9X)


式(9Y)



式(10)

式(10X)


式(10Y)



式(11)

式(11X)


式(11Y)



式(12)

式(12X)

式(12Y)



式(13)

式(14)

式(15)

10


20

30


40

50


【化 9 - 2】




式(16)




式(16X)




式(16Y)




式(21)




式(22)




式(23)




式(24)




式(25)




式(26)




式(27)




式(28)




式(29)




式(30)




式(31)




式(32)




式(33)




式(34)




式(35)




式(36)




式(36X)




式(41)



式(42)



式(43)



式(44)

10


20

30


40

50


【化 9 - 3】




式(45)




式(46)




式(47)




式(48)




式(49)




式(49X)




式(49Y)




式(50)




式(50X)




式(50Y)




式(51)




式(51X)




式(51Y)




式(52)




式(52X)




式(52Y)




式(53)




式(54)




式(55)



式(56)



式(56X)



式(56Y)

10


20

30


40

50


【化 9 - 4】



式 (61)



式 (62)



式 (63)

10

からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含み、式中、 R_x は、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である。

【0025】

開示される siNA 分子のいくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、式 (71) ~ 式 (86)、式 (79X) ~ 式 (82X)、式 (79Y) ~ (82Y)、式 86X、式 86X'、式 86Y、及び式 86Y' :


20

30


40

50


【化 10 - 1】




式(71)




式(72)




式(73)




式(74)




式(75)




式(76)




式(77)




式(78)




式(79)




式(79X)




式(79Y)




式(80)




式(80X)




式(80Y)




式(81)




式(81X)




式(81Y)




式(82)




式(82X)




式(82Y)



式(83)



式(84)



式(85)

10


20

30


40

50


【化 10 - 2】




式 (86)




式 (86X)



式 (86X')



式 (86Y)



式 (86Y')

10

からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含み、式中、 R_x は、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である。

20

【0026】


開示される siNA 分子のいくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、式 (1A) ~ (15A)、式 (1A-1) ~ (7A-1)、式 (1A-2) ~ (7A-2)、式 (1A-3) ~ (7A-3)、式 (1A-4) ~ (7A-4)、式 (9B) ~ (12B)、式 (9AX) ~ (12AX)、式 (9AY) ~ (12AY)、式 (9BX) ~ (12BX)、及び式 (9BY) ~ (12BY) からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含む。

30

40

50

【化 1 1 - 1】



10


20

30


40

50


【化 1 1 - 2】




式(5A-3)




式(5A-4)




式(6A)




式(6A-1)




式(6A-2)




式(6A-3)




式(6A-4)




式(7A)




式(7A-1)




式(7A-2)




式(7A-3)




式(7A-4)




式(8A)



式(9A)



式(9AX)



式(9AY)

10


20

30


40

50


【化 1 1 - 3】




式 (9B)




式 (9BX)




式 (9BY)




式 (10A)




式 (10AX)




式 (10AY)




式 (10B)




式 (10BX)




式 (10BY)




式 (11A)




式 (11AX)




式 (11AY)




式 (11B)




式 (11BX)




式 (11BY)




式 (12A)




式 (12AX)




式 (12AY)



式 (12B)



式 (12BX)



式 (12BY)

10


20

30

40

50

【化 1 1 - 4】



10

【 0 0 2 7】

開示される *siNA* 分子のいくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、式 (2 1 A) ~ (3 5 A)、式 (2 9 B) ~ (3 2 B)、式 (2 9 A X) ~ (3 2 A X)、式 (2 9 A Y) ~ (3 2 A Y)、式 (2 9 B X) ~ (3 2 B X)、及び式 (2 9 B Y) ~ (3 2 B Y) からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含む。


20

30

40

50

【化 1 2 - 1】




式 (21A)

式 (22A)

式 (23A)


式 (24A)



式 (25A)

式 (26A)

式 (27A)




式 (28A)

式 (29A)

式 (29AX)


式 (29AY)



式 (29B)

式 (29BX)


式 (29BY)



式 (30A)

式 (30AX)

式 (30AY)



式 (30B)

式 (30BX)

式 (30BY)

10


20

30


40

50


【化 1 2 - 2】




式 (31A)




式 (31AX)




式 (31AY)




式 (31B)




式 (31BX)




式 (31BY)




式 (32A)




式 (32AX)




式 (32AY)




式 (32B)




式 (32BX)




式 (32BY)



式 (33A)



式 (34A)



式 (35A)

【0028】

開示される *s i N A* 分子のいくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、式 (71A) ~ (86A)、式 (79XA) ~ (82XA)、式 (79YA) ~ (82YA)、式 (86XA)、式 (86X'A)、式 (86Y)、及び式 (86Y') からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含む。

10


20

30

40

50

【化 1 3 - 1】




式 (71A)

式 (72A)

式 (73A)


式 (74A)



式 (75A)

式 (76A)

式 (77A)




式 (78A)

式 (79A)

式 (79XA)


式 (79YA)



式 (80A)

式 (80XA)

式 (80YA)



式 (81A)

式 (81XA)

式 (81YA)

10


20

30

40

50

【化 1 3 - 2】




式 (82A)

式 (82XA)

式 (82YA)

10




式 (83A)

式 (84A)

式 (85A)

20




式 (86A)

式 (86XA)

式 (86X'A)

30



式 (86Y)


式 (86Y')

40

【 0 0 2 9】

開示される *s i N A* 分子のいくつかの実施形態では、*s i N A* は、ガラクトサミンを含む。いくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、式 (V I) :

【化 1 4】



10

の N-アセチルガラクトサミン (GalNAc) であり、式中、

m が、1、2、3、4、又は 5 であり、

各 n が、独立して、1 又は 2 であり、

p が、0 又は 1 であり、

各 R が、独立して、H であり、

各 Y が、独立して、 $-O-P(=O)(SH)-$ 、 $-O-P(=O)(O)-$ 、 $-O-P(=O)(OH)-$ 、及び $-O-P(S)S-$ から選択され、

Z が、H、又は第 2 の保護基であり、

いずれかの L がリンカーであるか、又は L 及び Y が、組み合わせてリンカーであり、

A が、H、OH、第 3 の保護基、活性化基、又はオリゴヌクレオチドである。


20

【0030】

開示される siNA 分子のいくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、式 (VII)

:

【化 1 5】



30

の N-アセチルガラクトサミン (GalNAc) であり、式中、 R^Z は、OH 又は SH であり、各 n は、独立して、1 又は 2 である。

40

【0031】

開示される siNA 分子のいくつかの実施形態では、(i) siNA の少なくとも 1 つの末端は、平滑末端であり、(ii) siNA の少なくとも 1 つの末端は、オーバーハングを含み、オーバーハングは、少なくとも 1 つのヌクレオチドを含むか、又は (iii) siNA の両方の末端は、オーバーハングを含み、オーバーハングは、少なくとも 1 つのヌクレオチドを含む。

【0032】

開示される siNA 分子のいくつかの実施形態では、(i) 標的遺伝子は、ウイルス遺伝子であるか、(ii) 標的遺伝子は、DNA ウイルス由来の遺伝子であるか、(iii) 標的遺伝子は、二本鎖 DNA (dsDNA) ウイルス由来の遺伝子であるか、(iv)

50

標的遺伝子は、ヘパドナウイルス由来の遺伝子であるか、(v) 標的遺伝子は、B型肝炎ウイルス(HBV)由来の遺伝子であるか、(vi) 標的遺伝子は、遺伝子型A～Jのいずれか1つのHBV由来の遺伝子であるか、又は(vii) 標的遺伝子は、HBVのS遺伝子若しくはX遺伝子から選択される。

【0033】

本開示は、表1、表2、表3、表4、及び表5に示されるs i N Aを提供する。

【0034】

本開示は、本明細書に開示されるs i N Aと、薬学的に許容される賦形剤と、を含む組成物を提供する。いくつかの実施形態では、組成物は、本明細書に開示される2、3、4、5、6、7、8、9、10個、又はそれより多くのs i N Aを更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、組成物は、追加の治療薬剤を更に含んでもよい。例えば、追加の治療薬剤は、ヌクレオチド類似体、ヌクレオシド類似体、カプシドアセンブリモジュレーター(CAM)、組換えインターフェロン、侵入阻害剤、小分子免疫モジュレーター、及び追加のs i N A、アンチセンスオリゴヌクレオチド(ASO)、NAP、又はSTOPS(商標)などのオリゴヌクレオチド療法から選択される。

【0035】

本開示は、本明細書に開示されるs i N A又は本明細書に開示されるs i N Aを含む組成物を対象に投与することを含む、それを必要とする対象における疾患の治療方法を提供する。本開示は、対象における疾患を治療するための開示されるs i N A及び組成物の使用を更に提供する。本開示は、対象における疾患の治療に使用するためのs i N A及び組成物を更に提供する。

【0036】

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、疾患は、DNAウイルス又は二本鎖DNA(dsDNA)ウイルスによって任意選択で引き起こされるウイルス性疾患である。いくつかの実施形態では、dsDNAウイルスは、ヘパドナウイルスである。いくつかの実施形態では、ヘパドナウイルスは、B型肝炎ウイルス(HBV)であり、任意選択で、HBVは、HBV遺伝子型A～Jから選択される。いくつかの実施形態では、方法及び使用は、追加のHBV治療薬剤を投与することを更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、s i N A又は組成物及び追加のHBV治療薬剤は、同時に投与されるか、又は順次投与される。いくつかの実施形態では、追加のHBV治療薬剤は、ヌクレオチド類似体、ヌクレオシド類似体、カプシドアセンブリモジュレーター(CAM)、組換えインターフェロン、侵入阻害剤、小分子免疫モジュレーター、及びオリゴヌクレオチド療法から選択される。いくつかの実施形態では、ウイルス性疾患は、コロナウイルスによって引き起こされる疾患であり、任意選択で、コロナウイルスは、SARS-CoV-2である。

【0037】

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、疾患は、肝臓疾患である。いくつかの実施形態では、肝臓疾患は、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)又は肝細胞がん腫(HCC)である。いくつかの実施形態では、NAFLDは、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)である。いくつかの実施形態は、肝臓疾患治療薬剤を対象に投与することを更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、肝臓疾患治療薬剤は、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体(PPAR)アゴニスト、ファルネソイドX受容体(FXR)アゴニスト、脂質改変剤、及びインクレチン系療法から選択される。いくつかの実施形態では、(i) PPARアゴニストは、PPAR α アゴニスト、デュアルPPAR α / δ アゴニスト、PPAR γ アゴニスト、及びデュアルPPAR α / γ アゴニストから選択されるか、(ii) 脂質改変剤は、アラムコールであるか、又は(iii) インクレチン系療法は、グルカゴン様ペプチド1(GLP-1)受容体アゴニスト若しくはジペプチジルペプチダーゼ4(DPP-4)阻害剤である。いくつかの実施形態では、s i N A又は組成物及び肝臓疾患治療薬剤は、同時に投与されるか、又は順次投与される。

【0038】

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、少なくとも

1 mg/kg、2 mg/kg、3 mg/kg、4 mg/kg、5 mg/kg、6 mg/kg、7 mg/kg、8 mg/kg、9 mg/kg、10 mg/kg、11 mg/kg、12 mg/kg、13 mg/kg、14 mg/kg、又は15 mg/kgの用量で投与される。

【0039】

開示される方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、0.5 mg/kg～50 mg/kg、0.5 mg/kg～40 mg/kg、0.5 mg/kg～30 mg/kg、1 mg/kg～50 mg/kg、1 mg/kg～40 mg/kg、1 mg/kg～30 mg/kg、1 mg/kg～20 mg/kg、3 mg/kg～50 mg/kg、3 mg/kg～40 mg/kg、3 mg/kg～30 mg/kg、3 mg/kg～20 mg/kg、3 mg/kg～15 mg/kg、3 mg/kg～10 mg/kg、4 mg/kg～50 mg/kg、4 mg/kg～40 mg/kg、4 mg/kg～30 mg/kg、4 mg/kg～20 mg/kg、4 mg/kg～15 mg/kg、4 mg/kg～10 mg/kg、5 mg/kg～50 mg/kg、5 mg/kg～40 mg/kg、5 mg/kg～30 mg/kg、5 mg/kg～20 mg/kg、5 mg/kg～15 mg/kg、又は5 mg/kg～10 mg/kgの用量で投与される。

10

【0040】

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、又は10回投与される。

【0041】

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、1日に少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、又は10回、1週間に少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、又は10回、又は1ヶ月に少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、又は10回投与される。

20

【0042】

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、又は21日ごとに少なくとも1回投与される。

【0043】

開示された方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、又は21日間、又は少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、35、40、45、50、51、52、53、54、又は55週間の期間にわたって投与される。

30

【0044】

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、5 mg/kg又は10 mg/kgの単回用量で、10 mg/kgの3回用量で1週間に1回、10 mg/kgの3回用量で3日に1回、又は10 mg/kgの5回用量で3日に1回投与される。

40

【0045】

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、1 mg/kg～15 mg/kg、1 mg/kg～10 mg/kg、2 mg/kg～15 mg/kg、2 mg/kg～10 mg/kg、3 mg/kg～15 mg/kg、又は3 mg/kg～10 mg/kgの範囲の6回用量で投与され、第1回用量及び第2回用量は、任意選択で、少なくとも3日間隔を置いて投与され、第2回用量及び第3回用量は、任意選択で、少なくとも4日間隔を置いて投与され、第3回用量及び第4回用量、第4回用量及び第5回用量、並びに／又は第5回用量及び第6回用量は、任意選択で、少なくとも7日間隔を置いて投与される。

【0046】

50

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、粒子又はウイルスベクターで投与され、ウイルスベクターは、任意選択で、アデノウイルス、アデノ随伴ウイルス（A A V）、アルファウイルス、フラビウイルス、単純ヘルペスウイルス、レンチウイルス、麻疹ウイルス、ピコルナウイルス、ポックスウイルス、レトロウイルス、及びラブドウイルスのベクターから選択される。いくつかの実施形態では、ウイルスベクターは、組換えウイルスベクターである。いくつかの実施形態では、ウイルスベクターは、A A V r h . 7 4、A A V r h . 1 0、A A V r h . 2 0、A A V - 1、A A V - 2、A A V - 3、A A V - 4、A A V - 5、A A V - 6、A A V - 7、A A V - 8、A A V - 9、A A V - 1 0、A A V - 1 1、A A V - 1 2、及びA A V - 1 3から選択される。

【0047】

10

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、全身的に投与されるか、又は局所的に投与される。

【0048】

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、s i N A又は組成物は、静脈内、皮下、又は筋肉内に投与される。

【0049】

前述の概要及び以下の発明を実施するための形態は、例示的及び説明的であり、特許請求される本開示の更なる説明を提供することを意図している。他の目的、利点、及び新規の特徴は、以下の図面の簡単な説明及び本開示の詳細な説明から、当業者に容易に明らかになるであろう。

20

【図面の簡単な説明】

【0050】

【図1】例示的なs i N A分子を示す。

【図2】例示的なs i N A分子を示す。

【図3 A - 3 D】例示的な二本鎖s i N A分子を示す。

【図3 E - 3 H】例示的な二本鎖s i N A分子を示す。

【図4】ビヒクル（G 0 1）、対照2、d s - s i N A - 0 0 9、又はd s - s i N A - 0 1 0で治療されたA A V - H B Vマウス由来の血清H B s A gの変化のグラフを示す。

【図5 A】ビヒクル（G 0 1）、対照2、d s - s i N A - 0 1 7（G a l N A cの添加を伴う）、又はd s - s i N A - 0 1 8（G a l N A cの添加を伴う）で治療されたA A V - H B Vマウス由来の血清H B s A gの変化のグラフを示す。

30

【図5 B】ビヒクル（G 0 1）、対照2、対照7、又は対照8で治療されたA A V - H B Vマウス由来の血清H B s A gの変化のグラフを示す。

【図6】ビヒクル（G 0 1）、対照2、d s - s i N A - 0 1 1、d s - s i N A - 0 1 2、又はd s - s i N A - 0 1 3で治療されたA A V - H B Vマウス由来の血清H B s A gの変化のグラフを示す。

【図7】ビヒクル（G 0 1）、対照2、d s - s i N A - 0 2 6、d s - s i N A - 0 2 7、d s - s i N A - 0 2 8、d s - s i N A - 0 2 9、d s - s i N A - 0 3 0、d s - s i N A - 0 3 1、又はd s - s i N A - 0 3 2で治療されたA A V - H B Vマウス由来の血清H B s A gの変化のグラフを示す。

40

【図8】ビヒクル（G 0 1）、対照2、d s - s i N A - 0 4 6、d s - s i N A - 0 4 7、d s - s i N A - 0 4 8、又はd s - s i N A - 0 4 9で治療されたA A V - H B Vマウス由来の血清H B s A gの変化のグラフを示す。

【発明を実施するための形態】

【0051】

本明細書に開示されるのは、塩基の代わりに独自の化学部分を含み得、中央フラノース環の3'及び4'炭素間の結合（すなわち、アンロックドヌクレオチド）を欠き得、及び／又はリン酸模倣基（そのようなヌクレオチドは、以降「ヌクレオチドホスフェート模倣体」と称され得る）を有し得る新規の修飾ヌクレオベースモノマーである。また、本明細書に開示されるのは、修飾核酸塩基（すなわち、ヌクレオチド）を含む短い干渉核酸（s i

50

NA) 分子である。

【0052】


一般に、本明細書に記載の siNA 分子は、二本鎖 siNA (ds-siNA) 分子であってもよい。本明細書に記載の siNA 分子は、2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから選択される修飾ヌクレオチドを含んでいてもよい。本明細書に記載の siNA 分子は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、若しくは10個、又はそれより多くのホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含んでいてもよい。本明細書に記載の siNA 分子は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、若しくは10個、又はそれより多くのメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含んでいてもよい。本明細書に記載の siNA 分子は、少なくとも1つのリン酸化ブロッカーを含んでいてもよい。本明細書に記載の siNA 分子は、5' 安定化エンドキャップ (本開示のヌクレオチドホスフェート模倣体を含むが、これらに限定されない) を含んでいてもよい。本明細書に記載の siNA 分子は、ガラクトサミンを含んでいてもよい。本明細書に記載の siNA 分子は、1つ以上の平滑末端を含んでいてもよい。本明細書に記載の siNA 分子は、1つ以上のオーバーハングを含んでいてもよい。

10


【0053】

例えば、本開示は、以下の構造を含む修飾ヌクレオチドを提供する：

【化16】




20



30

(式中、 R_y が核酸塩基である)、並びに


【化17】



40

の構造を含む修飾ヌクレオチド (式中、 R_x が核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又はHである)。いくつかの実施形態では、修飾ヌクレオチドは、以下の構造：

【化18】



を含み得、式中、 R_y が、核酸塩基である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミ


50

ン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

【0054】


本開示はまた、本開示の s i N A のいずれかのアンチセンス鎖の 5' 末端で安定化エンドキャップとして機能することができるヌクレオチドホスフェート模倣体を提供する。本開示のヌクレオチドホスフェート模倣体としては、以下の構造が挙げられるが、これらに限定されない：

【化19】





式中、 R_y は、核酸塩基であり、 R^{15} は、H又は CH_3 である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。いくつかの実施形態では、本開示のヌクレオチドホスフェート模倣体としては、以下の構造が挙げられるが、これらに限定されない：

【化 20 - 1】




(omeco-d3U)、




(omeco-d3T)、


(omeco-d3C)、




(omeco-d3G)、




(omeco-d3A)、




(4hU)、



(4hT)、



(4hC)、



(4hG)、

10


20

30


40

50


【化 2 0 - 2】



(4 h A) 、




(v - m u n




U) 、

(v - m u n T) 、




10




(v - m u n C) 、

(v - m u n G) 、


20



(v - m u n A) 、




(c 2 o



30

- 4 h U) 、

(c 2 o - 4 h T) 、




(c 2 o - 4 h C) 、


40

50


【化 2 0 - 3】




(c 2 o - 4 h G) 、



(c 2 o - 4 h A) 、




10




(o m e c o - m u n U) 、


(o m e c o - m u n T) 、



20




(o m e c o - m u n C) 、




(o m e c o - m u n G) 、

(o m e c o - m u n A) 、




30



(o m e c o - m u n U) 、

(o m




e c o - m u n T) 、


(o m e c o - m u n C) 、

40


【化 2 0 - 4】




(o m e c o - m u n G) 、



(o m e c o - m u n A) 、




10




(4 h - v p - U) 、

(4 h - v p - C) 、

20




(4 h - v p - T) 、




(4 h - v p - G) 、

(4 h - v p - A) 、

30




(c o c - 4 h U) 、



40

50


【化 20-5】



(coc-4hC)、


(coc-4hT)、

10



(coc-4hG)、及び

20



(coc-4hA)

であり、 R^{15} は、H又は CH_3 である。

【0055】

本開示の短干渉核酸 (s i N A) 分子は、前述の修飾ヌクレオチドのうちの少なくとも1個、少なくとも2個、少なくとも3個、少なくとも4個、若しくは少なくとも5個、及び／又は前述のヌクレオチドホスフェート模倣体のうちの1つを、アンチセンス鎖の5'末端に含んでもよい。

30

実際、本開示の短い干渉核酸 (s i N A) 分子は、

(a) 標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である第1のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、第1のヌクレオチド配列が、

(i) 15～30ヌクレオチド長であり、

(ii) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、5、7、8、9、10、11、12、14、17、及び／又は19位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドであるか、又は少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、

40

標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である第2のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、第2のヌクレオチド配列が、

(iii) 15～30ヌクレオチド長であり、

(iv) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立し

50

て選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含むか、あるいは

(b) 標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である第1のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、第1のヌクレオチド配列が、

(i) 15~30ヌクレオチド長であり、

(ii) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、

標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である第2のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、第2のヌクレオチド配列が、

(iii) 15~30ヌクレオチド長であり、

(iv) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含むか、あるいは

(c) 標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である第1のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であって、第1のヌクレオチド配列が、

(i) 15~30ヌクレオチド長であり、

(ii) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、5、7、8、9、10、11、12、14、17、及び／又は19位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドであるか、又は少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、センス鎖と、


標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である第2のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であって、第2のヌクレオチド配列が、

(iii) 15~30ヌクレオチド長であり、

(iv) 2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含み、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドであり、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含む、

センス鎖及び／又はアンチセンス鎖が、


【化21】




(式中、 R_x は、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又はHである) から選択される

少なくとも 1 個、少なくとも 2 個、少なくとも 3 個、少なくとも 4 個、又は少なくとも 5 個の修飾ヌクレオチドを含む限りにおいて、並びに／又はアンチセンス鎖が、


【化 2 2】



(omeco-d3U)、




(4h 10




U)、

(v-mun)、



(c2o-4



h)、及び

(omeco-munU、 R^{15} が CH_3 である場合)

20

(式中、 R^{15} は、H又は CH_3 である)から選択されるヌクレオチドリソ酸模倣体を含む限りにおいてである。

【0056】

更に、本開示の siNA は、各々独立して、1 個以上のホスホロチオエートヌクレオシド間連結、1 個以上のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結、又はそれらの組み合わせを含むセンス鎖及び／又はアンチセンス鎖を含んでもよい。siNA は、リン酸化ブロッカー、ガラクトサミン、及び／又は(上述のもの以外の)5'安定化エンドキャップを含んでもよい。siNA は、ガラクトサミンなどの標的化部分にコンジュゲートされてもよい。

30

【0057】

本明細書に更に開示されるのは、本明細書に記載される siNA 分子のうちの 2 つ以上を含む組成物である。

【0058】

本明細書に更に開示されるのは、記載される siNA 分子のいずれかと、薬学的に許容される担体又は希釈剤と、を含む組成物である。そのような組成物はまた、追加の治療剤を含んでもよく、又は追加の治療剤と併せて(同時に又は連続的に)投与されてもよい。

40

【0059】

本明細書に更に開示されるのは、医薬として使用するための、本明細書に記載される siNA 分子のうちの 2 つ以上を含む組成物である。

【0060】

本明細書に更に開示されるのは、医薬として使用するための、記載される siNA 分子のいずれかと、薬学的に許容される担体又は希釈剤と、を含む組成物である。そのような薬剤はまた、追加の治療剤を含んでもよく、又は追加の治療剤と併せて(同時に又は連続的に)投与されてもよい。

【0061】

50

本明細書に更に開示されるのは、疾患の治療を必要とする対象においてそれを行う方法であって、本明細書に記載の $s i N A$ 分子（又はそれらの組み合わせ）又は組成物／医薬のいずれかを対象に投与することを含む、方法である。

【0062】

本明細書に更に開示されるのは、疾患を治療するための医薬の製造における、本明細書に記載の $s i N A$ 分子のいずれか（又はそれらの組み合わせ）の使用である。

【0063】

短い干渉核酸（ $s i N A$ ）分子

上述のように、本開示は、修飾ヌクレオチドを含む $s i N A$ 分子を提供する。本明細書に記載の $s i N A$ 分子のいずれも、二本鎖 $s i N A$ （ $ds-s i N A$ ）分子であってもよい。「 $s i N A$ 分子」及び「 $ds-s i N A$ 分子」という用語は、互換的に使用されてもよい。いくつかの実施形態では、 $ds-s i N A$ 分子は、センス鎖と、アンチセンス鎖と、を含む。

【0064】

本開示の目的のために、本明細書に開示される $s i N A$ 分子は、概して、（a）少なくとも1つのリン酸化ブロッカー、コンジュゲート化部分、及び／又は5'安定化エンドキャップと、（b）短い干渉核酸（ $s i N A$ ）と、を含んでもよい。いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、本明細書に開示されるリン酸化ブロッカーである。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、本明細書に開示されるガラクトサミンである。いくつかの実施形態では、5'安定化エンドキャップは、本明細書に開示される5'安定化エンドキャップである。

【0065】

$s i N A$ は、本明細書に開示される第1のヌクレオチド、第2のヌクレオチド、センス鎖、又はアンチセンス鎖配列のうちのいずれかを含んでいてもよい。 $s i N A$ は、5～100、5～90、10～100、10～90、10～80、10～70、10～60、10～50、10～30、10～25、15～100、15～90、15～80、15～70、15～60、15～50、15～30、又は15～25個のヌクレオチドを含んでいてもよい。 $s i N A$ は、少なくとも5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、又は40個のヌクレオチドを含んでいてもよい。 $s i N A$ は、50、45、40、39、38、37、36、35、34、33、32、31、30、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、又は19個以下のヌクレオチドを含んでいてもよい。ヌクレオチドは、修飾ヌクレオチドであってもよい。 $s i N A$ は、一本鎖であってもよい（ $ss-s i N A$ ）。 $s i N A$ は、二本鎖であってもよい（ $ds-s i N A$ ）。

【0066】

$ds-s i N A$ は、（a）15～30、15～25、15～24、15～23、15～22、15～21、17～30、17～25、17～24、17～23、17～22、17～21、18～30、18～25、18～24、18～23、18～22、18～21、19～30、19～25、19～24、19～23、19～22、19～21、20～25、20～24、20～23、21～25、21～24、又は21～23個のヌクレオチドを含むセンス鎖と、（b）15～30、15～25、15～24、15～23、15～22、15～21、17～30、17～25、17～24、17～23、17～22、17～21、18～30、18～25、18～24、18～23、18～22、18～21、19～30、19～25、19～24、19～23、19～22、19～21、20～25、20～24、20～23、21～25、21～24、又は21～23個のヌクレオチドを含むアンチセンス鎖と、を含んでいてもよい。 $ds-s i N A$ は、（a）約15、16、17、18、19、20、21、22、又は23個のヌクレオチドを含むセンス鎖と、（b）約15、16、17、18、19、20、21、22、又は23個のヌクレオチドを含むアンチセンス鎖と、を含んでいてもよい。 $ds-s i N A$ は、（a）約19

個のヌクレオチドを含むセンス鎖と、(b) 約21個のヌクレオチドを含むアンチセンス鎖と、を含んでいてもよい。ds-siNAは、(a) 約21個のヌクレオチドを含むセンス鎖と、(b) 約23個のヌクレオチドを含むアンチセンス鎖と、を含んでいてもよい。

【0067】

本明細書に開示されるsiNA分子のいずれかは、ホスホジエステル(PO)リンカー、ホスホロチオエート(PS)リンカー、ホスホロジチオエートリンカー、メシルホスホルアミデート(Ms)、及びPS-模倣体リンカーから独立して選択される1つ以上のリンカーを更に含み得る。いくつかの実施形態では、PS-模倣体リンカーは、硫黄リンカーである。いくつかの実施形態では、リンカーは、ヌクレオシド間リンカーである。代替的又は追加的に、リンカーは、少なくとも1つのリン酸化ブロッカー、コンジュゲート化部分、又は5'安定化エンドキャップに対し、siNA分子のヌクレオチドを接続してよい。いくつかの実施形態では、リンカーは、リン酸化ブロッカー又は5'安定化エンドキャップに対し、コンジュゲート化部分を接続する。

【0068】

本開示の例示的なsiNA分子を図1に示す。図1に示されるように、例示的なsiNA分子は、センス鎖(101)と、アンチセンス鎖(102)と、を含む。センス鎖(101)は、第1のオリゴヌクレオチド配列(103)を含んでいてもよい。第1のオリゴヌクレオチド配列(103)は、1つ以上のホスホロチオエートヌクレオシド間連結(109)を含んでいてもよい。ホスホロチオエートヌクレオシド間連結(109)は、第1のオリゴヌクレオチド配列(103)の5'末端又は3'末端のヌクレオチド間であってもよい。ホスホロチオエートヌクレオシド間連結(109)は、第1のオリゴヌクレオチド配列(103)の5'末端からの第1の3個のヌクレオチド間であってもよい。第1のオリゴヌクレオチド配列(103)は、1つ以上の2'-フルオロヌクレオチド(110)を含んでいてもよい。第1のオリゴヌクレオチド配列(103)は、1つ以上の2'-オームethylヌクレオチド(111)を含んでいてもよい。第1のオリゴヌクレオチド配列(103)は、2'-フルオロヌクレオチド(110)及び2'-オームethylヌクレオチド(111)から独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含んでいてもよい。センス鎖(101)は、リン酸化ブロッカー(105)を更に含んでいてもよい。センス鎖(101)は、ガラクトサミン(106)を更に含んでいてもよい。アンチセンス鎖(102)は、第2のオリゴヌクレオチド配列(104)を含んでいてもよい。第2のオリゴヌクレオチド配列(104)は、1つ以上のホスホロチオエートヌクレオシド間連結(109)を含んでいてもよい。ホスホロチオエートヌクレオシド間連結(109)は、第2のオリゴヌクレオチド配列(104)の5'末端又は3'末端のヌクレオチド間であってもよい。ホスホロチオエートヌクレオシド間連結(109)は、第2のオリゴヌクレオチド配列(104)の5'末端からの第1の3個のヌクレオチド間であってもよい。ホスホロチオエートヌクレオシド間連結(109)は、第2のオリゴヌクレオチド配列(104)の3'末端からの第1の3個のヌクレオチド間であってもよい。第2のオリゴヌクレオチド配列(104)は、1つ以上の2'-フルオロヌクレオチド(110)を含んでいてもよい。第2のオリゴヌクレオチド配列(104)は、1つ以上の2'-オームethylヌクレオチド(111)を含んでいてもよい。第2のオリゴヌクレオチド配列(104)は、2'-フルオロヌクレオチド(110)及び2'-オームethylヌクレオチド(111)から独立して選択される15個以上の修飾ヌクレオチドを含んでいてもよい。アンチセンス鎖(102)は、5'安定化エンドキャップ(107)を更に含んでいてもよい。siNAは、1つ以上の平滑末端を更に含んでいてもよい。代替的に、又は追加的に、siNAの一端は、オーバーハング(108)を含んでいてもよい。オーバーハング(108)は、センス鎖(101)の一部であってもよい。オーバーハング(108)は、アンチセンス鎖(102)の一部であってもよい。オーバーハング(108)は、第1のヌクレオチド配列(103)とは異なってもよい。オーバーハング(108)は、第2のヌクレオチド配列(104)とは異なってもよい。オーバーハング(108)は、第1のヌクレ

オチド配列（１０３）の一部であってもよい。オーバーハング（１０８）は、第２のヌクレオチド配列（１０４）の一部であってもよい。オーバーハング（１０８）は、１個以上のヌクレオチドを含んでいてもよい。オーバーハング（１０８）は、１個以上のデオキシリボヌクレオチドを含んでいてもよい。オーバーハング（１０８）は、１個以上の修飾ヌクレオチドを含んでいてもよい。オーバーハング（１０８）は、１個以上の修飾リボヌクレオチドを含んでいてもよい。センス鎖（１０１）は、アンチセンス鎖（１０２）よりも短くてもよい。センス鎖（１０１）は、アンチセンス鎖（１０２）と同じ長さであってもよい。センス鎖（１０１）は、アンチセンス鎖（１０２）よりも長くてもよい。

【００６９】

本開示の例示的な *s i N A* 分子を図２に示す。図２に示されるように、例示的な *s i N A* 分子は、センス鎖（２０１）と、アンチセンス鎖（２０２）と、を含む。センス鎖（２０１）は、第１のオリゴヌクレオチド配列（２０３）を含んでいてもよい。第１のオリゴヌクレオチド配列（２０３）は、１つ以上のホスホロチオエートヌクレオシド間連結（２０９）を含んでいてもよい。ホスホロチオエートヌクレオシド間連結（２０９）は、第１のオリゴヌクレオチド配列（２０３）の５'末端又は３'末端のヌクレオチド間であってもよい。ホスホロチオエートヌクレオシド間連結（２０９）は、第１のオリゴヌクレオチド配列（２０３）の５'末端からの第１の３個のヌクレオチド間であってもよい。第１のオリゴヌクレオチド配列（２０３）は、１つ以上の２'-フルオロヌクレオチド（２１０）を含んでいてもよい。第１のオリゴヌクレオチド配列（２０３）は、１つ以上の２'-オ-メチルヌクレオチド（２１１）を含んでいてもよい。第１のオリゴヌクレオチド配列（２０３）は、２'-フルオロヌクレオチド（２１０）及び２'-オ-メチルヌクレオチド（２１１）から独立して選択される１５個以上の修飾ヌクレオチドを含んでいてもよい。センス鎖（２０１）は、リン酸化ブロッカー（２０５）を更に含んでいてもよい。センス鎖（２０１）は、ガラクトサミン（２０６）を更に含んでいてもよい。アンチセンス鎖（２０２）は、第２のオリゴヌクレオチド配列（２０４）を含んでいてもよい。第２のオリゴヌクレオチド配列（２０４）は、１つ以上のホスホロチオエートヌクレオシド間連結（２０９）を含んでいてもよい。ホスホロチオエートヌクレオシド間連結（２０９）は、第２のオリゴヌクレオチド配列（２０４）の５'末端又は３'末端のヌクレオチド間であってもよい。ホスホロチオエートヌクレオシド間連結（２０９）は、第２のオリゴヌクレオチド配列（２０４）の５'末端からの第１の３個のヌクレオチド間であってもよい。ホスホロチオエートヌクレオシド間連結（２０９）は、第２のオリゴヌクレオチド配列（２０４）の３'末端からの第１の３個のヌクレオチド間であってもよい。第２のオリゴヌクレオチド配列（２０４）は、１つ以上の２'-フルオロヌクレオチド（２１０）を含んでいてもよい。第２のオリゴヌクレオチド配列（２０４）は、１つ以上の２'-オ-メチルヌクレオチド（２１１）を含んでいてもよい。第２のオリゴヌクレオチド配列（２０４）は、２'-フルオロヌクレオチド（２１０）及び２'-オ-メチルヌクレオチド（２１１）から独立して選択される１５個以上の修飾ヌクレオチドを含んでいてもよい。アンチセンス鎖（２０２）は、５'安定化エンドキャップ（２０７）を更に含んでいてもよい。*s i N A* は、１つ以上のオーバーハング（２０８）を更に含んでいてもよい。オーバーハング（２０８）は、センス鎖（２０１）の一部であってもよい。オーバーハング（２０８）は、アンチセンス鎖（２０２）の一部であってもよい。オーバーハング（２０８）は、第１のヌクレオチド配列（２０３）とは異なってもよい。オーバーハング（２０８）は、第２のヌクレオチド配列（２０４）とは異なってもよい。オーバーハング（２０８）は、第１のヌクレオチド配列（２０３）の一部であってもよい。オーバーハング（２０８）は、第２のヌクレオチド配列（２０４）の一部であってもよい。オーバーハング（２０８）は、第１のヌクレオチド配列（２０３）の３'末端に隣接していてもよい。オーバーハング（２０８）は、第１のヌクレオチド配列（２０３）の５'末端に隣接していてもよい。オーバーハング（２０８）は、第２のヌクレオチド配列（２０４）の３'末端に隣接していてもよい。オーバーハング（２０８）は、第２のヌクレオチド配列（２０４）の５'末端に隣接していてもよい。オーバーハング（２０８）は、１個以上のヌクレオチドを含んで

10

20

30

40

50

いてもよい。オーバーハング（208）は、1個以上のデオキシリボヌクレオチドを含んでもよい。オーバーハング（208）は、TT配列を含んでもよい。オーバーハング（208）は、1個以上の修飾ヌクレオチドを含んでもよい。オーバーハング（208）は、本明細書に開示される1個以上の修飾ヌクレオチド（例えば、2'-フルオロヌクレオチド、2'-O-メチルヌクレオチド、2'-フルオロヌクレオチド模倣体、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体、又は修飾核酸塩基を含むヌクレオチド）を含んでもよい。オーバーハング（208）は、1個以上の修飾リボヌクレオチドを含んでもよい。センス鎖（201）は、アンチセンス鎖（202）よりも短くてもよい。センス鎖（201）は、アンチセンス鎖（202）と同じ長さであってもよい。センス鎖（201）は、アンチセンス鎖（202）よりも長くてもよい。

10

【0070】

図3A～3Hは、例示的なds-siNA修飾パターンを示す。図3A～3Gに示されるように、例示的なds-siNA分子は、以下の式を有していてもよく、

$$5' - A_n^1 B_n^2 A_n^3 B_n^4 A_n^5 B_n^6 A_n^7 B_n^8 A_n^9 - 3' \\ 3' - C_q^1 A_q^2 B_q^3 A_q^4 B_q^5 A_q^6 B_q^7 A_q^8 B_q^9 A_q^{10} B_q^{11} A_q^{12} - 5'$$

式中、

上鎖が、標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である第1のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であり、第1のヌクレオチド配列が、15～30個のヌクレオチドを含み、

20

下鎖が、標的遺伝子に対応するRNAに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である第2のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であり、第2のヌクレオチド配列が、15～30個のヌクレオチドを含み、

各Aが、独立して、2'-O-メチルヌクレオチド、又は5'安定化エンドキャップ若しくはリン酸化ブロッカーを含むヌクレオチドであり、

Bが、2'-フルオロヌクレオチドであり、

Cが、オーバーハングヌクレオチドを表し、2'-O-メチルヌクレオチド、デオキシヌクレオチド、又はウラシルであり、

$n^1 = 1 \sim 6$ ヌクレオチド長であり、

30

各 n^2 、 n^6 、 n^8 、 q^3 、 q^5 、 q^7 、 q^9 、 q^{11} 、及び q^{12} が、独立して、0～1ヌクレオチド長であり、

各 n^3 及び n^4 が、独立して、1～3ヌクレオチド長であり、

n^5 が、1～10ヌクレオチド長であり、

n^7 が、0～4ヌクレオチド長であり、

各 n^9 、 q^1 、及び q^2 が、独立して、0～2ヌクレオチド長であり、

q^4 が、0～3ヌクレオチド長であり、

q^6 が、0～5ヌクレオチド長であり、

q^8 が、2～7ヌクレオチド長であり、

q^{10} が、2～11ヌクレオチド長である。

40

ds-siNAは、コンジュゲート化部分を更に含んでもよい。コンジュゲート化部分は、本明細書に開示されるガラクトサミンのいずれかを含んでもよい。ds-siNAは、(i)センス鎖の5'末端から1及び2位置並びに2及び3位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(ii)アンチセンス鎖の5'末端から1及び2位置、2及び3位置、19及び20位置、並びに20及び21位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を更に含んでもよい。

ds-siNAは、5'安定化エンドキャップを更に含んでもよい。5'安定化エンドキャップは、ビニルホスホネートであってもよい。5'安定化エンドキャップは、アンチセンス鎖の5'末端に結合していてもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更

50

に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の 5' 末端から 1 位置の 2'-O-メチルヌクレオチドは、5' 安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の 5' 末端から 1 位置の 2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の 3' 末端から 1 位置の 2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の 5' 末端から 1 位置の 2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の 3' 末端から 1 位置の 2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。例示的な ds-siNA 分子は、以下の式を有していてもよく、

10

$$\begin{array}{l} 5' - A_2 - 4 B_1 A_1 - 3 B_2 - 3 A_2 - 10 B_0 - 1 A_0 - 4 B_0 - 1 A_0 - 2 - 3' \\ 3' - G_2 A_0 - 2 B_0 - 1 A_0 - 3 B_0 - 1 A_0 - 5 B_0 - 1 A_2 - 7 B_1 A_2 - 11 B_1 A_1 - 5' \end{array}$$

式中、

上鎖が、標的遺伝子に対応する RNA に対して少なくとも約 60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は 100% 同一である第 1 のヌクレオチド配列を含むセンス鎖であり、第 1 のヌクレオチド配列が、15~30 個のヌクレオチドを含み、

下鎖が、標的遺伝子に対応する RNA に対して少なくとも約 60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は 100% 相補的である第 2 のヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖であり、第 2 のヌクレオチド配列が、15~30 個のヌクレオチドを含み、

20

各 A が、独立して、2'-O-メチルヌクレオチド、又は 5' 安定化エンドキャップ若しくはリン酸化ブロッカーを含むヌクレオチドであり、

B が、2'-フルオロヌクレオチドであり、

C が、オーバーハングヌクレオチドを表し、2'-O-メチルヌクレオチド、デオキシヌクレオチド、又はウラシルであり、

ds-siNA は、コンジュゲート化部分を更に含んでもよい。コンジュゲート化部分は、本明細書に開示されるガラクトサミンのいずれかを含んでもよい。ds-siNA は、(i) センス鎖の 5' 末端から 1 及び 2 位置並びに 2 及び 3 位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(ii) アンチセンス鎖の 5' 末端から 1 及び 2 位置、2 及び 3 位置、19 及び 20 位置、並びに 20 及び 21 位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を更に含んでもよい。

30

ds-siNA は、5' 安定化エンドキャップを更に含んでもよい。5' 安定化エンドキャップは、ビニルホスホネートであってもよい。ビニルホスホネートは、重水素化ビニルホスホネートであってもよい。重水素化ビニルホスホネートは、モノ-重水素化ビニルホスホネートであってもよい。重水素化ビニルホスホネートは、モノ-ジ-重水素化ビニルホスホネートであってもよい。5' 安定化エンドキャップは、アンチセンス鎖の 5' 末端に結合していてもよい。5' 安定化エンドキャップは、アンチセンス鎖の 3' 末端に結合していてもよい。5' 安定化エンドキャップは、センス鎖の 5' 末端に結合していてもよい。5' 安定化エンドキャップは、センス鎖の 3' 末端に結合していてもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖の 5' 末端から 1 位置の 2'-O-メチルヌクレオチドは、5' 安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の 5' 末端から 1 位置の 2'-O-メチルヌクレオチドは、5' 安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の 5' 末端から 1 位置の 2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の 3' 末端から 1 位置の 2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の 5' 末端から 1 位置の 2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の

40

50

3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。

【0071】

図3A～3Hに示される例示的なds-siNAは、(i)19～21個のヌクレオチドを含むセンス鎖と、(ii)21～23個のヌクレオチドを含むアンチセンス鎖と、を含む。ds-siNAは、任意選択で、(iii)コンジュゲート化部分を更に含んでもよく、コンジュゲート化部分(例えば、図3A～3GでG3として示されるGalNAc)は、センス鎖又はアンチセンス鎖の3'末端又は5'末端に接続する。ds-siNAは、アンチセンス鎖の5'末端から20及び21位置のヌクレオチドからなる2個のヌクレオチドオーバーハングを含んでもよい。ds-siNAは、アンチセンス鎖の5'末端から22及び23位置のヌクレオチドからなる2個のヌクレオチドオーバーハングを含んでもよい。ds-siNAは、1、2、3、4、5、6個、又はそれより多くのホスホロチオエート(ps)ヌクレオシド間連結又はメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結(Ms)を更に含んでもよい。少なくとも1つのホスホロチオエートヌクレオシド間連結又はメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結(Ms)は、センス鎖の5'末端から1及び2位置、又は2及び3位置のヌクレオチド間にあってもよい。少なくとも1つのホスホロチオエートヌクレオシド間連結又はメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結(Ms)は、アンチセンス鎖の5'末端から1及び2位置、又は2及び3位置のヌクレオチド間にあってもよい。少なくとも1つのホスホロチオエートヌクレオシド間連結又はメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結(Ms)は、アンチセンス鎖の5'末端から19及び20位置、20及び21位置、21及び22位置、又は22及び23位置のヌクレオチド間にあってもよい。図3A～3Hに示されるように、センス鎖中の4～6個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドであってもよい。図3A～3Hに示されるように、アンチセンス鎖中の2～5個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドであってもよい。図3A～3Hに示されるように、センス鎖中の13～15個のヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドであってもよい。図3A～3Hに示されるように、アンチセンス鎖中の14～19個のヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドであってもよい。図3A～3Hに示されるように、ds-siNAは、センス鎖及びアンチセンス鎖上の2'-フルオロヌクレオチド間に塩基対を含有しない。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。

【0072】

図3Aに示されるように、ds-siNAは、(a)19個のヌクレオチドからなるセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から3、7～9、12、及び17位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から1、2、4～6、10、11、13～16、18、及び19位置にある、センス鎖と、(b)21個のヌクレオチドからなるアンチセンス鎖であって、アンチセンス鎖の5'末端から2及び14位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドであり、1、3～13、及び15～21位置のヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含んでもよい。ds-siNAは、センス鎖の3'末端に結合したコンジュゲート化部分を更に含んでもよい。ds-siNAは、(i)センス鎖の5'末

端から1及び2位置並びに2及び3位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(i i) アンチセンス鎖の5'末端から1及び2位置、2及び3位置、19及び20位置、並びに20及び21位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P、f2P、又はfXヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-O-メチルヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖中の1つ以上のヌクレオチドは、フラノース環の3'位置と4'位置との間の結合が切断されている3'、4'セコ修飾ヌクレオチドであってもよい(例えば、mun34)。

【0073】

図3Bに示されるように、ds-siNAは、(a) 19個のヌクレオチドからなるセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から3、7、8、及び17位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から1、2、4～6、9～16、18、及び19位置にある、センス鎖と、(b) 21個のヌクレオチドからなるアンチセンス鎖であって、アンチセンス鎖の5'末端から2及び14位置のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドであり、1、3～13、及び15～21位置の

ヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含んでもよい。ds-siNAは、センス鎖の3'末端に結合したコンジュゲート化部分を更に含んでもよい。ds-siNAは、(i)センス鎖の5'末端から1及び2位置並びに2及び3位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(ii)アンチセンス鎖の5'末端から1及び2位置、2及び3位置、19及び20位置、並びに20及び21位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、vmunヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、vmunヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、vmunヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、vmunヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P、f2P、又はfXヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-O-メチルヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖中の1つ以上のヌクレオチドは、フラノース環の3'位置と4'位置との間の結合が切断されている3'、4'セコ修飾ヌクレオチドであってもよい（例えば、mun34）。

10

20

30

40

50

【0074】
図3Cに示されるように、ds-siNAは、(a)19個のヌクレオチドからなるセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から3、7~9、12、及び17位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から1、2、4~6、10、11、13~16、18、及び19位置にある、センス鎖と、(b)

21個のヌクレオチドからなるアンチセンス鎖であって、アンチセンス鎖中のヌクレオチドが、交互1:3修飾パターンを含み、1個のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドであり、3個のヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含んでいてもよい。ds-siNAは、センス鎖の3'末端に結合したコンジュゲート化部分を更に含んでいてもよい。ds-siNAは、(i)センス鎖の5'末端から1及び2位置並びに2及び3位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(ii)アンチセンス鎖の5'末端から1及び2位置、2及び3位置、19及び20位置、並びに20及び21位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を更に含んでいてもよい。ds-siNAは、アンチセンス鎖上に2~5個の交互1:3修飾パターンを含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P、f2P、又はfXヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P、f2P、又はfXヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-O-メチルヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖中の1つ以上のヌクレオチドは、フラノース環の3'位置と4'位置との間の結合が切断されている3'、4'セコ修飾ヌクレオチド

であってもよい（例えば、mun34）。

【0075】

図3Dに示されるように、ds-siNAは、(a) 19個のヌクレオチドからなるセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から5及び7～9位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から1～4、6、及び10～19位置にある、センス鎖と、(b) 21個のヌクレオチドからなるアンチセンス鎖であって、アンチセンス鎖中のヌクレオチドが、交互1:3修飾パターンを含み、1個のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドであり、3個のヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含んでいてもよい。ds-siNAは、センス鎖の3'末端に結合したコンジュゲート化部分を更に含んでいてもよい。ds-siNAは、(i) センス鎖の5'末端から1及び2位置並びに2及び3位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(ii) アンチセンス鎖の5'末端から1及び2位置、2及び3位置、19及び20位置、並びに20及び21位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を更に含んでいてもよい。ds-siNAは、アンチセンス鎖上に2～5個の交互1:3修飾パターンを含んでいてもよい。交互1:3修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から2、6、10、14、及び／又は18位置のいずれかのヌクレオチド位置で始まってもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P

10

20

30

40

50

、 f_2P 、又は f_X ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、 f_B 、 f_N 、 $f(4nh)Q$ 、 f_4P 、 f_2P 、又は f_X ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-O-メチルヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖中の1つ以上のヌクレオチドは、フラノース環の3'位置と4'位置との間の結合が切断されている3'、4'セコ修飾ヌクレオチドであってもよい（例えば、 m_{un34} ）。

【0076】

図3Eに示されるように、 $ds-siNA$ は、(a) 19個のヌクレオチドからなるセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から5及び7～9位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から1～4、6、及び10～19位置にある、センス鎖と、(b) 21個のヌクレオチドからなるアンチセンス鎖であって、アンチセンス鎖中のヌクレオチドが、交互1：2修飾パターンを含み、1個のヌクレオチドが、2'-フルオロヌクレオチドであり、2個のヌクレオチドが、2'-O-メチルヌクレオチドである、アンチセンス鎖と、を含んでいてもよい。 $ds-siNA$ は、センス鎖の3'末端に結合したコンジュゲート化部分を更に含んでいてもよい。 $ds-siNA$ は、(i) センス鎖の5'末端から1及び2位置並びに2及び3位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(ii) アンチセンス鎖の5'末端から1及び2位置、2及び3位置、19及び20位置、並びに20及び21位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を更に含んでいてもよい。 $ds-siNA$ は、アンチセンス鎖上に2～5個の交互1：2修飾パターンを含んでいてもよい。交互1：2修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から2、5、8、14、及び／又は17位置のいずれかのヌクレオチド位置で始まっていてもよい。いくつかの実施形態では、 $ds-siNA$ は、(a) 19個のヌクレオチドからなるセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から5及び7～9位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から1～4、6、及び10～19位置にある、センス鎖と、(b) 21個のヌクレオチドからなるアンチセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、アンチセンス鎖の5'末端から2、5、8、14、及び17位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から1、3、4、6、7、9-13、15、16、及び18～21位置にある、アンチセンス鎖と、を含む。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、 d_2vd_3 ヌクレオチド、 d_2vd_3U ヌクレオチド、 $omeco-d_3$ ヌクレオチド、 $omeco-d_3U$ ヌクレオチド、 $4h$ ヌクレオチド、 $4hU$ ヌクレオチド、 $v-mun$ ヌクレオチド、 c_2o-4h ヌクレオチド、 $omeco-mun$ ヌクレオチド、 d_2vm ヌクレオチド、又は d_2vmA ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、 d_2vd_3 ヌクレオチド、 d_2vd_3U ヌクレオチド、 $omeco-d_3$ ヌクレオチド、 $omeco-d_3U$ ヌクレオチド、 $4h$ ヌクレオチド、 $4hU$ ヌクレオチド、 $v-mun$ ヌクレオチド、 c_2o-4h ヌクレオチド、 $omeco-mun$ ヌクレ

オチド、 $d2vm$ ヌクレオチド、又は $d2vmA$ ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、 $d2vd3$ ヌクレオチド、 $d2vd3U$ ヌクレオチド、 $omeco-d3$ ヌクレオチド、 $omeco-d3U$ ヌクレオチド、 $4h$ ヌクレオチド、 $4hU$ ヌクレオチド、 $v-mun$ ヌクレオチド、 $c2o-4h$ ヌクレオチド、 $omeco-mun$ ヌクレオチド、 $d2vm$ ヌクレオチド、又は $d2vmA$ ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、 $d2vd3$ ヌクレオチド、 $d2vd3U$ ヌクレオチド、 $omeco-d3$ ヌクレオチド、 $omeco-d3U$ ヌクレオチド、 $4h$ ヌクレオチド、 $4hU$ ヌクレオチド、 $v-mun$ ヌクレオチド、 $c2o-4h$ ヌクレオチド、 $omeco-mun$ ヌクレオチド、 $d2vm$ ヌクレオチド、又は $d2vmA$ ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、 fB 、 fN 、 $f(4nh)Q$ 、 $f4P$ 、 $f2P$ 、又は fX ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、 fB 、 fN 、 $f(4nh)Q$ 、 $f4P$ 、 $f2P$ 、又は fX ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-O-メチルヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖中の1つ以上のヌクレオチドは、フラノース環の3'位置と4'位置との間の結合が切断されている3'、4'セコ修飾ヌクレオチドであってもよい（例えば、 $mun34$ ）。

10

20

30

40

50

【0077】

図3Fに示されるように、 $ds-siNA$ は、(a) 19個のヌクレオチドからなるセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から5及び7～9位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から1～4、6、及び10～19位置にある、センス鎖と、(b) 21個のヌクレオチドからなるアンチセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、アンチセンス鎖の5'末端から2、6、14、及び16位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、アンチセンス鎖の5'末端から1、3～5、7～13、15、及び17～21位置にある、アンチセンス鎖と、を含んでもよい。 $ds-siNA$ は、センス鎖の3'末端に結合したコンジュゲート化部分を更に含んでもよい。 $ds-siNA$ は、(i) センス鎖の5'末端から1及び2位置並びに2及び3位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(ii) アンチセンス鎖の5'末端から1及び2位置、2及び3位置、19及び20位置、並びに20及び21位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、 fB 、 fN 、 $f(4nh)Q$ 、 $f4P$ 、 $f2P$ 、又は fX ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、 $f4P$ ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から2、6、14、及び16位置の2'-フルオロヌクレオチドのうちの少なくとも1、2、3、又は4個は、 $f4P$ ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から2、6、14、及び16位置の2'-フルオロヌクレオチドのうちの少なくとも1つは、 $f4P$ ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から2、6、14、及び16位置の2'-フルオロヌクレオチドのうちの少なくとも2つは、 $f4P$ ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から2、6、14、及び16位置の2'-フルオロヌクレオチドのうちの3個以下は、 $f4P$ ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチ

[illegible]

チドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P、f2P、又はfXヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P、f2P、又はfXヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-O-メチルヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖中の1つ以上のヌクレオチドは、フラノース環の3'位置と4'位置との間の結合が切断されている3'、4'セコ修飾ヌクレオチドであってもよい（例えば、mun34）。

【0078】

図3Gに示されるように、ds-siNAは、(a)21個のヌクレオチドからなるセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から5、9～11、14、及び19位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から1～4、6～8、12、13、15～18、20、及び21位置にある、センス鎖と、(b)23個のヌクレオチドからなるアンチセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、アンチセンス鎖の5'末端から2及び14位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、アンチセンス鎖の5'末端から1、3～13、及び15～23位置にある、アンチセンス鎖と、を含んでいてもよい。ds-siNAは、センス鎖の3'末端に結合したコンジュゲート化部分を更に含んでいてもよい。ds-siNAは、(i)センス鎖の5'末端から1及び2位置並びに2及び3位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(ii)アンチセンス鎖の5'末端から1及び2位置、2及び3位置、19及び20位置、並びに20及び21位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチ

ルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、v-munヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P、f2P、又はfXヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P、f2P、又はfXヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-O-メチルヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖中の1つ以上のヌクレオチドは、フラノース環の3'位置と4'位置との間の結合が切断されている3'、4'セコ修飾ヌクレオチドであってもよい（例えば、mun34）。

【0079】

図3Hに示されるように、ds-siNAは、(a) 21個のヌクレオチドからなるセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から7及び9～11位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、センス鎖の5'末端から1～6、8、及び12～21位置にある、センス鎖と、(b) 23個のヌクレオチドからなるアンチセンス鎖であって、2'-フルオロヌクレオチドが、アンチセンス鎖の5'末端から2、6、14、及び16位置にあり、2'-O-メチルヌクレオチドが、アンチセンス鎖の5'末端から1、3～5、7～13、15、及び17～23位置にある、アンチセンス鎖と、を含んでもよい。任意選択で、アンチセンス鎖の5'末端から22及び23位置のヌクレオチドは、アンロックドヌクレオチドであってもよい。任意選択で、ds-siNAは、センス鎖の3'末端に接続したコンジュゲート化部分（図示せず）を更に含んでもよい。ds-siNAは、任意選択で、アンチセンス鎖の5'末端に接続するビニルホスホネート（図示）を含んでもよいが、いくつかの実施形態では、本明細書に開示する5'エンド

キャップも同様に好適であってもよい。ds-siNAは、(i) センス鎖の5'末端から1及び2位置、2及び3位置、並びに20及び21位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(ii) アンチセンス鎖の5'末端から1及び2位置、2及び3位置、21及び22位置、並びに22及び23位置のヌクレオチド間にあるホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、センス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、vmunヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hUヌクレオチド、vmunヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の5'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、vmunヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、vmunヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖の3'末端から1位置の2'-O-メチルヌクレオチドは、d2vd3ヌクレオチド、d2vd3Uヌクレオチド、omeco-d3ヌクレオチド、omeco-d3Uヌクレオチド、4hヌクレオチド、4hUヌクレオチド、vmunヌクレオチド、c2o-4hヌクレオチド、omeco-munヌクレオチド、d2vmヌクレオチド、又はd2vmAヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P、f2P、又はfXヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-フルオロヌクレオチドは、fB、fN、f(4nh)Q、f4P、f2P、又はfXヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、センス鎖又はアンチセンス鎖上の少なくとも1、2、3、4個、又はそれより多くの2'-O-メチルヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、センス鎖及び／又はアンチセンス鎖中の1つ以上のヌクレオチドは、フラノース環の3'位置と4'位置との間の結合が切断されている3'、4'セコ修飾ヌクレオチドであってもよい（例えば、mun34）。

【0080】

siNAセンス鎖

10

20

30

40

50

本明細書に記載の s i N A 分子のいずれかは、センス鎖を含んでいてもよい。センス鎖は、第 1 のヌクレオチド配列を含んでいてもよい。第 1 のヌクレオチド配列は、15～30、15～25、15～23、17～23、19～23、又は19～21ヌクレオチド長であってよい。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列は、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、又は30ヌクレオチド長である。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列は、少なくとも19ヌクレオチド長である。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列は、少なくとも21ヌクレオチド長である。

【0081】

いくつかの実施形態では、センス鎖は、第 1 のヌクレオチド配列と同じ長さである。いくつかの実施形態では、センス鎖は、第 1 のヌクレオチド配列よりも長い。いくつかの実施形態では、センス鎖は、第 1 のヌクレオチド配列よりも1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多いヌクレオチドを更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖は、デオキシリボ核酸（DNA）を更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、DNAは、チミン（T）である。いくつかの実施形態では、センス鎖は、TT配列を更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖は、第 1 のヌクレオチド配列に隣接する1つ以上の修飾ヌクレオチドを更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上の修飾ヌクレオチドは、本明細書に開示される修飾ヌクレオチド（例えば、2'-フルオロヌクレオチド、2'-O-メチルヌクレオチド、2'-フルオロヌクレオチド模倣体、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体、又は修飾核酸塩基を含むヌクレオチド）のいずれかから独立して選択される。

10

20

【0082】

いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列は、2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15、16、17、18、19、20、21、22、23個、又はそれより多い修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列中のヌクレオチドの70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%が、2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される修飾ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列中のヌクレオチドの100%が、2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される修飾ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、2'-O-メチルヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。

30

【0083】

いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列の約15～30、15～25、15～24、15～23、15～22、15～21、17～30、17～25、17～24、17～23、17～22、17～21、18～30、18～25、18～24、18～23、18～22、18～21、19～30、19～25、19～24、19～23、19～22、19～21、20～25、20～24、20～23、21～25、21～24、又は21～23個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列の約2～20個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列の約5～25個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列の約10～25個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列の約12～25個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列の少なくとも約10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、又は22個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第 1 のヌクレオチド配列の少なくとも約12個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつ

40

50

30

40

50

20

30

40

50


いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、5、7、8、9

、10、11、12、14、17、及び／又は19位置の少なくとも1、2、3、4、5、6、又は7個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、5、7、8、9、10、11、12、14、17、及び／又は19位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、5、7、8、9、10、11、12、14、17、及び／又は19位置の少なくとも2個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、5、7、8、9、10、11、12、14、17、及び／又は19位置の少なくとも3個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、5、7、8、9、10、11、12、14、17、及び／又は19位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から5位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から7位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から8位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から9位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から10位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から11位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から12位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から14位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から17位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から19位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、7、8、9、12、及び／又は17位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、7、8、及び／又は17位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から3、7、8、9、12、及び／又は17位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から5、7、8、及び／又は9位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の5'末端から5、9、10、11、12、及び／又は19位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。

【0087】

いくつかの実施形態では、2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、式(V)のヌクレオチド模倣体であり、

【化23】




式中、 R_x は、独立して、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又はHであり、 Q^1 及

び Q^2 は、独立して、S 又は O であり、 R^5 は、独立して、 $-OCD_3$ 、 $-F$ 、又は $-OCH_3$ であり、 R^6 及び R^7 は、独立して、H、D、又は CD_3 である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

【0088】

いくつかの実施形態では、2'-フルオロ又は 2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、式(16)～式(20)のヌクレオチド模倣体であり、

【化24】



10


式中、 R_x が、独立して、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H であり、 R^2 が、F 又は $-OCH_3$ である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

【0089】

いくつかの実施形態では、センス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方は、各々独立して、以下の化学構造：

20

【化25】



30

を有する少なくとも1個、少なくとも2個、少なくとも3個、少なくとも4個、又は少なくとも5個以上の修飾ヌクレオチドを含み得、式中、 R_y は核酸塩基であり、 R_x は核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。


40

【0090】

いくつかの実施形態では、センス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方は、各々独立して、以下の化学構造：

50

【化 2 6】



10


を有する少なくとも1個、少なくとも2個、少なくとも3個、少なくとも4個、又は少なくとも5個以上の修飾ヌクレオチドを含み得、式中、 R_y は核酸塩基である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

20

【0091】

本開示の目的のために、修飾ヌクレオチドは、センス鎖の任意の位置にあってもよい。いくつかの実施形態では、修飾ヌクレオチドは、5'末端に対してセンス鎖の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、又は23位置にあり得る。例えば、修飾ヌクレオチドが、


【化 2 7】



30

である場合、それは、5'末端に対してセンス鎖の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、又は23位置に位置し得る。いくつかの実施形態では、修飾ヌクレオチドが、

【化 2 8】



40

である場合、センス鎖の5'末端に対して、3、16、17、又は18位置に位置し得る。

【0092】

いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列は、リボ核酸(RNA)を含むか、それからなるか、又は本質的にそれからなる。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列は、修飾RNAを含むか、それからなるか、又は本質的にそれからなる。いくつかの実施形態では、修飾RNAは、2'-O-メチルRNA及び2'-フルオロRNAから選択される。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列の15、16、17、18、19、20、21、22、又は23個の修飾ヌクレオチドは、独立して、2'-O-メチルRNA及び2'-フルオロRNAから選択される。

50

【0093】

いくつかの実施形態では、センス鎖は、ホスホジエステル（PO）ヌクレオシド間連結、ホスホロチオエート（PS）ヌクレオシド間連結、メシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結（Ms）、ホスホロジチオエートヌクレオシド間連結、及びPS-模倣体ヌクレオシド間連結から独立して選択される1つ以上のヌクレオシド間連結を更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、PS-模倣体ヌクレオシド間連結は、スルホヌクレオシド間連結である。

【0094】

いくつかの実施形態では、センス鎖は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、若しくは15個、又はそれより多くのホスホロチオエートヌクレオシド間連結を更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖は、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、若しくは3個、又はそれより少ないホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、センス鎖は、2～10、2～8、2～6、1～5、1～4、1～3、又は1～2個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、センス鎖は、1～2個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、センス鎖は、2～4個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第1のヌクレオチド配列の5'末端から1及び2位置のヌクレオチド間にある。いくつかの実施形態では、少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第1のヌクレオチド配列の5'末端から2及び3位置のヌクレオチド間にある。いくつかの実施形態では、センス鎖は、第1のヌクレオチド配列の5'末端から1～3位置のヌクレオチド間にある2個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。

【0095】

いくつかの実施形態では、センス鎖は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、若しくは15個、又はそれより多くのメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖は、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、若しくは3個、又はそれより少ないメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、センス鎖は、2～10、2～8、2～6、1～5、1～4、1～3、又は1～2個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、センス鎖は、1～2個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、センス鎖は、2～4個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。

【0096】

いくつかの実施形態では、センス鎖は、以下の「修飾ヌクレオチド」と題されるサブセクションに開示される修飾ヌクレオチドのいずれかを含んでもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖は、5'安定化エンドキャップを含んでもよく、5'安定化エンドキャップは、以下の「5'安定化エンドキャップ」と題されるサブセクションに開示されるものから選択されてもよい。

【0097】

s i N A アンチセンス鎖

本明細書に記載のs i N A分子のいずれかは、アンチセンス鎖を含んでもよい。アンチセンス鎖は、第2のヌクレオチド配列を含んでもよい。第2のヌクレオチド配列は、15～30、15～25、15～23、17～23、19～23、又は19～21ヌクレオチド長であってよい。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、又は30ヌクレオチド長である。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、少なくとも19ヌクレオチド長である。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、少なくとも21ヌクレオチド長である。

【0098】

いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、第2のヌクレオチド配列と同じ長さである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、第2のヌクレオチド配列よりも長い。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、第2のヌクレオチド配列よりも1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多いヌクレオチドを更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、センス鎖と同じ長さである。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、センス鎖よりも長い。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、センス鎖よりも1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多いヌクレオチドを更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、デオキシリボ核酸（DNA）を更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、DNAは、チミン（T）である。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、TT配列を更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、第2のヌクレオチド配列に隣接する1つ以上の修飾ヌクレオチドを更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、1つ以上の修飾ヌクレオチドは、本明細書に開示される修飾ヌクレオチド（例えば、2'-フルオロヌクレオチド、2'-O-メチルヌクレオチド、2'-フルオロヌクレオチド模倣体、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体、又は修飾核酸塩基を含むヌクレオチド）のいずれかから独立して選択される。

10

【0099】

いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される15、16、17、18、19、20、21、22、23個、又はそれより多い修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列中のヌクレオチドの70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%が、2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される修飾ヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列中のヌクレオチドの100%が、2'-O-メチルヌクレオチド及び2'-フルオロヌクレオチドから独立して選択される修飾ヌクレオチドである。

20

【0100】

いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の約15~30、15~25、15~24、15~23、15~22、15~21、17~30、17~25、17~24、17~23、17~22、17~21、18~30、18~25、18~24、18~23、18~22、18~21、19~30、19~25、19~24、19~23、19~22、19~21、20~25、20~24、20~23、21~25、21~24、又は21~23個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の約2~20個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の約5~25個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の約10~25個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の約12~25個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の少なくとも10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、又は22個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の少なくとも約12個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の少なくとも約13個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の少なくとも約14個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の少なくとも約15個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の少なくとも約16個の修飾ヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の少なくとも約17個の修飾

30

40

50


フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5個以下の修飾ヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の4個以下の修飾ヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の3個以下の修飾ヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の2個以下の修飾ヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の少なくとも1個の修飾ヌクレオチドは、2'-フルオロピリミジンである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の1、2、3、4、5、又は6個の修飾ヌクレオチドは、2'-フルオロピリミジンである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の少なくとも1個の修飾ヌクレオチドは、2'-フルオロプリンである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の1、2、3、4、5、又は6個の修飾ヌクレオチドは、2'-フルオロプリンである。いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。

10

【0102】

いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチド又は2'-O-メチルヌクレオチドは、2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体である。いくつかの実施形態では、2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、式(V)のヌクレオチド模倣体であり、

20




式中、 R_x は、独立して、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又はHであり、 Q^1 及び Q^2 は、独立して、S又はOであり、 R^5 は、独立して、 $-OCD_3$ 、 $-F$ 、又は $-OCH_3$ であり、 R^6 及び R^7 は、独立して、H、D、又は CD_3 である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

30

【0103】

いくつかの実施形態では、2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、式(16)～式(20)のヌクレオチド模倣体であり、

【化30】



40


式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又はHであり、 R^2 が、独立して、F又は $-OCH_3$ である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

【0104】

いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖、センス鎖、又はその両方は、各々独立して、以下の化学構造：

50

【化 3 1】



10


20

を有する少なくとも1個、少なくとも2個、少なくとも3個、少なくとも4個、又は少なくとも5個以上の修飾ヌクレオチドを含み得、式中、 R_y は核酸塩基であり、 R_x は核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又はHである。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

【0105】

いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖、センス鎖、又はその両方は、各々独立して、以下の化学構造：

【化 3 2】



30

を有する少なくとも1個、少なくとも2個、少なくとも3個、少なくとも4個、又は少なくとも5個以上の修飾ヌクレオチドを含み得、式中、 R_y は核酸塩基である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

40

【0106】

本開示の目的のために、修飾ヌクレオチドは、アンチセンス鎖の任意の位置にあってもよい。いくつかの実施形態では、修飾ヌクレオチドは、5'末端に対してアンチセンス鎖の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、又は23位置にあり得る。

【0107】

いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置の少なくとも1、2、3、4、5、6、7、

50

8、又は9個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置の少なくとも2個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置の少なくとも3個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置の少なくとも4個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、6、8、10、14、16、17、及び／又は18位置の少なくとも5個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2及び／又は14位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、6、及び／又は16位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、6、14、及び／又は16位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、6、10、14、及び／又は18位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2、5、8、14、及び／又は17位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から5位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から6位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から8位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から10位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から14位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から16位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から17位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の5'末端から18位置のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。

【0108】

いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列中のヌクレオチドは、交互1:3修飾パターンで整列し、1個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドであり、3個のヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドであり、交互1:3修飾パターンは、少なくとも2回生じる。いくつかの実施形態では、交互1:3修飾パターンは、2~5回生じる。いくつかの実施形態では、交互1:3修飾パターンのうちの少なくとも2つは、連続して生じる。いくつかの実施形態では、交互1:3修飾パターンのうちの少なくとも2つは、非連続的に生じる。いくつかの実施形態では、少なくとも1、2、3、4、又は5つの交互1:3修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から2、6、10、14、及び／又は18のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの交互1:3修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から2のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの交互1:3修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から6のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの交互1:3修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から10のヌクレオチ

ド位置で始まる。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの交互1:3修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から14のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの交互1:3修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から18のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。

【0109】

いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列中のヌクレオチドは、交互1:2修飾パターンで整列し、1個のヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチドであり、2個のヌクレオチドは、2'-O-メチルヌクレオチドであり、交互1:2修飾パターンは、少なくとも2回生じる。いくつかの実施形態では、交互1:2修飾パターンは、2~5回生じる。いくつかの実施形態では、交互1:2修飾パターンのうちの少なくとも2つは、連続して生じる。いくつかの実施形態では、交互1:2修飾パターンのうちの少なくとも2つは、非連続的に生じる。いくつかの実施形態では、少なくとも1、2、3、4、又は5個の交互1:2修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から2、5、8、14、及び/又は17のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの交互1:2修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から2のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの交互1:2修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から5のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの交互1:2修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から8のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの交互1:2修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から14のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの交互1:2修飾パターンは、アンチセンス鎖の5'末端から17のヌクレオチド位置で始まる。いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。

【0110】

いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、リボ核酸(RNA)を含むか、それからなるか、又は本質的にそれからなる。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、修飾RNAを含むか、それからなるか、又は本質的にそれからなる。いくつかの実施形態では、修飾RNAは、2'-O-メチルRNA及び2'-フルオロRNAから選択される。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列の15、16、17、18、19、20、21、22、又は23個の修飾ヌクレオチドは、独立して、2'-O-メチルRNA及び2'-フルオロRNAから選択される。いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド模倣体である。

【0111】

いくつかの実施形態では、センス鎖は、ホスホジエステル(PO)ヌクレオシド間連結、ホスホロチオエート(PS)ヌクレオシド間連結、ホスホロジチオエートヌクレオシド間連結、及びPS-模倣体ヌクレオシド間連結から独立して選択される1つ以上のヌクレオシド間連結を更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、PS-模倣体ヌクレオシド間連結は、スルホヌクレオシド間連結である。

【0112】

いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、若しくは15個、又はそれより多くのホスホロチオエートヌクレオシド間連結を更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、若しくは3個、又はそれより少ないホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、2~10、2~8、2~6、1~5、1~4、1~3、又は1~2個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、2~10、2~8、2~6、1~5、1~4、1~3、又は1~2個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、2~8個のホスホロチオエートヌクレオ

シド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、3～8個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、4～8個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の5'末端から1及び2位置のヌクレオチド間にある。いくつかの実施形態では、少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の5'末端から2及び3位置のヌクレオチド間にある。いくつかの実施形態では、少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の3'末端から1及び2位置のヌクレオチド間にある。いくつかの実施形態では、少なくとも1個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結は、第2のヌクレオチド配列の3'末端から2及び3位置のヌクレオチド間にある。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、第1のヌクレオチド配列の5'末端から1～3位置のヌクレオチド間にある2個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、第1のヌクレオチド配列の3'末端から1～3位置のヌクレオチド間にある2個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、(a)第1のヌクレオチド配列の5'末端から1～3位置のヌクレオチド間にある2個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、(b)第1のヌクレオチド配列の3'末端から1～3位置のヌクレオチド間にある2個のホスホロチオエートヌクレオシド間連結と、を含む。

10

【0113】

いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、若しくは15個、又はそれより多くのメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、若しくは3個、又はそれより少ないメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、2～10、2～8、2～6、1～5、1～4、1～3、又は1～2個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、2～10、2～8、2～6、1～5、1～4、1～3、又は1～2個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、2～8個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、3～8個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、4～8個のメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む。

20

30

【0114】

いくつかの実施形態では、ds-siNAの少なくとも1つの末端は、平滑末端である。いくつかの実施形態では、ds-siNAの少なくとも1つの末端は、オーバーハングを含み、オーバーハングは、少なくとも1つのヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、ds-siNAの両方の末端は、オーバーハングを含み、オーバーハングは、少なくとも1つのヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、オーバーハングは、1～5個のヌクレオチド、1～4個のヌクレオチド、1～3個のヌクレオチド、又は1～2個のヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、オーバーハングは、1～2個のヌクレオチドからなる。

40

【0115】

いくつかの実施形態では、センス鎖は、以下の「修飾ヌクレオチド」と題されるサブセクションに開示される修飾ヌクレオチドのいずれかを含んでもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖は、5'安定化エンドキャップを含んでもよく、5'安定化エンドキャップは、以下の「5'安定化エンドキャップ」と題されるサブセクションに開示されるものから選択されてもよい。

【0116】

修飾ヌクレオチド

50

本明細書に開示される *s i N A* 分子は、1つ以上の修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるセンス鎖は、1つ以上の修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される第1のヌクレオチド配列のいずれかは、1つ以上の修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるアンチセンス鎖は、1つ以上の修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される第2のヌクレオチド配列のいずれかは、1つ以上の修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、1つ以上の修飾ヌクレオチドは、第1のヌクレオチド配列に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドは、第1のヌクレオチド配列の5'末端に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドは、第1のヌクレオチド配列の3'末端に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドは、第1のヌクレオチド配列の5'末端に隣接し、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドは、第1のヌクレオチド配列の3'末端に隣接する。いくつかの実施形態では、1つ以上の修飾ヌクレオチドは、第2のヌクレオチド配列に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドは、第2のヌクレオチド配列の5'末端に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドは、第2のヌクレオチド配列の3'末端に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドは、第2のヌクレオチド配列の5'末端に隣接し、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドは、第2のヌクレオチド配列の3'末端に隣接する。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるセンス鎖又は第1のヌクレオチド配列のいずれかの中の2'-O-メチルヌクレオチドは、修飾ヌクレオチドで置き換えられる。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるアンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列のいずれかの中の2'-O-メチルヌクレオチドは、修飾ヌクレオチドで置き換えられる。

10

20

【0117】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される *s i N A* 分子、*s i N A*、センス鎖、第1のヌクレオチド配列、アンチセンス鎖、及び第2のヌクレオチド配列のいずれかは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、若しくは30個、又はそれより多くの修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、*s i N A* 分子、*s i N A*、センス鎖、第1のヌクレオチド配列、アンチセンス鎖、又は第2のヌクレオチド配列中のヌクレオチドの1%、2%、3%、4%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、70%、75%、80%、85%、86%、87%、88%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%、又は100%が修飾ヌクレオチドである。

30

【0118】


いくつかの実施形態では、修飾ヌクレオチドは、2'-フルオロヌクレオチド、2'-O-メチルヌクレオチド、2'-フルオロヌクレオチド模倣体、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体、ロックド核酸、アンロックド核酸、及び修飾核酸塩基を含むヌクレオチドからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、アンロックド核酸は、2'，3'-アン

40

【0119】


いくつかの態様では、本開示の *s i N A* は、

【化33】




50

(式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である)、
【化 3 4】




(式中、 R_y が、核酸塩基である)、
【化 3 5】

10




20




(式中、 R_y が、核酸塩基である)、又はそれらの組み合わせから選択される少なくとも 1 つの修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、 $s i N A$ は、これらの修飾ヌクレオチドの少なくとも 2 つ、少なくとも 3 つ、少なくとも 4 つ、又は少なくとも 5 つ、若しくはそれより多くを含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、センス鎖は、
【化 3 6】

30



(式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、H である)、
【化 3 7】


40




(式中、 R_y が、核酸塩基である)、

50

【化 3 8】




10



(式中、 R_y が、核酸塩基である)、又はそれらの組み合わせのうちの少なくとも1個、少なくとも2個、少なくとも3個、少なくとも4個、又は少なくとも5つ以上を含み得る。いくつかの実施形態では、アンチセンス鎖は、


【化 3 9】



20

(式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、Hである)、


【化 4 0】




30

(式中、 R_y が、核酸塩基である)、

【化 4 1】




40



50


(式中、 R_y が、核酸塩基である)、又はそれらの組み合わせのうちの少なくとも1つ、少なくとも2つ、少なくとも3つ、少なくとも4つ、又は少なくとも5つ以上を含み得る。いくつかの実施形態では、センス鎖及びアンチセンス鎖の両方は、各々独立して、

【化42】




(式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、Hである)、

【化43】




(式中、 R_y が、核酸塩基である)、

【化44】




30



(式中、 R_y が、核酸塩基である)、又はそれらの組み合わせのうちの少なくとも1つ、少なくとも2つ、少なくとも3つ、少なくとも4つ、又は少なくとも5つ以上を含み得る。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。例えば、

【化45】




40


のいくつかの実施形態では、修飾ヌクレオチドは、

50

【化 4 6】




(a p U)、




(a p C)、

10




(a p T)、



(a p G)、又は

20



(a p A)

の構造を有し得る。

【0120】


いくつかの実施形態では、本明細書に開示される s i R N A のいずれかは、2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体などの他の修飾ヌクレオチドを任意選択で含み得る。例えば、開示される s i N A は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、若しくは10個、又はそれより多くの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体を含み得る。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるセンス鎖のいずれかは、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、若しくは10個、又はそれより多くの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体を含む。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される第1のヌクレオチド配列のいずれかは、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、若しくは10個、又はそれより多くの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体を含む。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるアンチセンス鎖のいずれかは、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、若しくは10個、又はそれより多くの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体を含む。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される第2のヌクレオチド配列のいずれかは、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、若しくは10個、又はそれより多くの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体を含む。いくつかの実施形態では、2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、式(16)～式(20)のヌクレオチド模倣体であり、

30

40

50

【化 4 7】



式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又はHであり、 R^2 が、独立して、F又は $-OCH_3$ である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

10

【0 1 2 1】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される siNA 分子は、少なくとも1つの2'-フルオロヌクレオチドと、少なくとも1つの2'-O-メチルヌクレオチドと、少なくとも1つの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体と、を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、第1のヌクレオチド配列に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、第1のヌクレオチド配列の5'末端に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、第1のヌクレオチド配列の3'末端に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、第2のヌクレオチド配列に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、第2のヌクレオチド配列の5'末端に隣接する。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの2'-フルオロ又は2'-O-メチルヌクレオチド模倣体は、第2のヌクレオチド配列の3'末端に隣接する。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列は、2'-フルオロヌクレオチド模倣体を含まない。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列は、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体を含まない。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、2'-フルオロヌクレオチド模倣体を含まない。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、2'-O-メチルヌクレオチド模倣体を含まない。


20

30

【0 1 2 2】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される siRNA、センス鎖、第1のヌクレオチド配列、アンチセンス鎖、又は第2のヌクレオチド配列のいずれかは、


【化 4 8】



40

(式中、 R_x が核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又はHである)、又は

【化 4 9】



(式中、 R_y が核酸塩基である)である、少なくとも1つの修飾ヌクレオチドを含む。

50

【0123】

リン酸化ブロッカー


本明細書に更に開示されるのは、リン酸化ブロッカーを含む $s i N A$ 分子である。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるセンス鎖又は第1のヌクレオチド配列のいずれかの中の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するヌクレオチドで置き換えられる。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるアンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列のいずれかの中の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するヌクレオチドで置き換えられる。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるセンス鎖又は第1のヌクレオチド配列のいずれかの中の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるアンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列のいずれかの中の2'-O-メチルヌクレオチドは、リン酸化ブロッカーを含有するように更に修飾される。

10

【0124】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される $s i N A$ 分子のいずれかは、式 (I V)

【化50】



20

のリン酸化ブロッカー（式中、 R_y が、核酸塩基であり、 R^4 が、 $-O-R^{30}$ 又は $-N R^{31} R^{32}$ であり、 R^{30} が、 C_1-C_8 置換又は非置換アルキルであり、 R^{31} 及び R^{32} が、それらが接続する窒素と一緒に、置換又は非置換複素環式環を形成する）を含む。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。


【0125】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される $s i N A$ 分子のいずれかは、式 (I V)

30

のリン酸化ブロッカーを含み、

【化51】




式 (I V)、式中、 R_y が、核酸塩基であり、 R^4 が、 $-OCH_3$ 又は $-N(CH_2CH_2)_2O$ である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

40

【0126】

いくつかの実施形態では、 $s i N A$ 分子は、(a) 式 (I V) :

【化52】




のリン酸化ブロッカー（式中、 R_y が、核酸塩基であり、 R^4 が、 $-O-R^{30}$ 又は $-N R^{31} R^{32}$ であり、 R^{30} が、 C_1-C_8 置換又は非置換アルキルであり、 R^{31} 及び R^{32}

50

³ 2 が、それらが接続する窒素と一緒にあって、置換又は非置換複素環式環を形成する) と、(b) 短い干渉核酸 (s i N A) と、を含み、リン酸化ブロッカーは、s i N A にコンジュゲートする。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。

【0127】

いくつかの実施形態では、s i N A 分子は、(a) 式 (I V) のリン酸化ブロッカー：
【化53】



式 (I V) (式中、R_y が、核酸塩基であり、R⁴ が、-OCH₃ 又は -N(CH₂CH₂)₂O である) と、(b) 短い干渉核酸 (s i N A) と、を含み、リン酸化ブロッカーは、s i N A にコンジュゲートする。

【0128】

いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、1つ以上のリンカーは、独立して、ホスホジエステルリンカー、ホスホロチオエートリンカー、メシルホスホルアミデートリンカー、及びホスホロジチオエートリンカーからなる群から選択される。

【0129】

コンジュゲート化部分


本明細書に更に開示されるのは、コンジュゲート化部分を含む s i N A 分子である。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、ガラクトサミン、ペプチド、タンパク質、ステロール、脂質、リン脂質、ビオチン、フェノキサジン、活性薬物基質、コレステロール、フェナントリジン、アントラキノン、アクリジン、フルオレセイン、ローダミン、クマリン、及び染料から選択される。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の3'末端に

結合している。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、1つ以上のリンカーは、独立して、ホスホジエステルリンカー、ホスホロチオエートリンカー、ホスホロジチオエートリンカー、及びメシルホスホルアミデートリンカーからなる群から選択される。

【0130】

いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、ガラクトサミンである。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される *s i N A* のいずれかは、ガラクトサミンであるコンジュゲート化部分に結合している。いくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、*N*-アセチルガラクトサミン (*G a l N A c*) である。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される *s i N A* 分子のいずれかは、*G a l N A c* を含む。いくつかの実施形態では、*G a l N A c* は、式 (V I) を有し、

【化54】



式中、*m* が、1、2、3、4、又は5であり、各 *n* が、独立して、1又は2であり、*p* が、0又は1であり、各 *R* が、独立して、*H*、又は第1の保護基であり、各 *Y* が、独立して、 $-O-P(=O)(SH)-$ 、 $-O-P(=O)(O)-$ 、 $-O-P(=O)(OH)-$ 、 $-O-P(S)S-$ 、及び $-O-$ から選択され、*Z* が、*H*、又は第2の保護基であり、いずれかの *L* がリンカーであるか、又は *L* 及び *Y* が、組み合わせてリンカーであり、*A* が、*H*、*OH*、第3の保護基、活性化基、又はオリゴヌクレオチドである。いくつかの実施形態では、第1の保護基は、アセチルである。いくつかの実施形態では、第2の保護基は、トリメトキシトリチル (*T M T*) である。いくつかの実施形態では、活性化基は、ホスホラミダイト基である。いくつかの実施形態では、ホスホラミダイト基は、シアノエトキシ *N*，*N*-ジイソプロピルホスホラミダイト基である。いくつかの実施形態では、リンカーは、*C 6-NH 2* 基である。いくつかの実施形態では、*A* は、短い干渉核酸 (*s i N A*) 又は *s i N A* 分子である。いくつかの実施形態では、*m* は、3である。いくつかの実施形態では、*R* は *H* であり、*Z* は *H* であり、*n* は1である。いくつかの実施形態では、*R* は *H* であり、*Z* は *H* であり、*n* は2である。

【0131】

いくつかの実施形態では、*G a l N A c* は、式 (V I I) :

10


20

30

40

50

【化 5 5】



10

20

であり、式中、 R^Z は、OH又はSHであり、各 n は、独立して、1又は2である。いくつかの実施形態では、標的化リガンドは、GalNAcであり得、標的化リガンドは、1、2、3、4、5、又は6個のGalNAc単位を含んでもよい。いくつかの実施形態では、標的リガンドは、GalNAc2、GalNAc3、GalNAc4（式VIIのGalNAc、式中、 $n=1$ 及び $R^Z=OH$ である）、GalNAc5、及びGalNAc6から選択されるGalNAcであってもよい。

【0132】



いくつかの実施形態では、GalNAcは、GalNAcアミダイト（すなわち、化合物40-9、実施例22を参照されたい）、GalNAc4 CPG（すなわち、化合物40-8、実施例22及び実施例23を参照されたい）、GalNAcホフォラミダイト、又はGalNAc4-ps-GalNAc4-ps-GalNAc4であってもよい。これらのGalNAc部分を以下に示す。

30

40

50

【表 1】

GalNAc 4 部分
GalNAc4 ホスホロアミダイト 
GalNAc4 CPG 

10

20

【0133】

GalNAc 3、GalNAc 4、GalNAc 5 及び GalNAc 6 は、1、2、又は 3 部分を用いた合成中に、本明細書に開示される siNA にコンジュゲートされてもよい。GalNAc 1 及び GalNAc 2 などの更なる GalNAc 部分は、合成後コンジュゲーションを使用して 5' 及び 3' - GalNAc を形成するために使用することができる。

30









【0134】

GalNAc ホスホロアミダイト

40

50

【表 2】

GalNAc ビルディングブロック	オリゴへの付着後(命名法)
GalNAc-3 ホスホロアミダイト 	 (GalNAc3-(PS)2-p)
GalNAc-4 ホスホロアミダイト 	 (GalNAc4-(PS)2-p)
GalNAc-5 ホスホロアミダイト 	 (GalNAc5-(PS)2-p)
GalNAc-6 ホスホロアミダイト 	 (GalNAc6-(PS)2-p)

いくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、センス鎖又は第1のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、1、2、3、4、若しくは5個

、又はそれより多くのリンカーを介して、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の3'末端に結合している。いくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、ガラクトサミンは、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、アンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、1つ以上のリンカーは、独立して、ホスホジエステル（p又はpo）リンカー、ホスホロチオエート（ps）リンカー、メシルホスホルアミデートリンカー（Ms）、ホスホラミダイト（HEG）リンカー、トリエチレングリコール（TEG）リンカー、及び／又はホスホロジチオエートリンカーからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、1つ以上のリンカーは、p-（PS）2、（PS）2-p-TEG-p、（PS）2-p-HEG-p、及び（PS）2-p-（HEG-p）2からなる群から独立して選択される。

10

【0135】

いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、脂質部分である。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるs i N Aのいずれかは、脂質部分であるコンジュゲート化部分に結合している。脂質部分の例としては、限定されないが、コレステロール部分、チオエーテル、例えば、ヘキシル-S-トリチルチオール、チオコレステロール、脂肪族鎖、例えば、ドデカンジオール又はウンデシル残基、リン脂質、例えば、ジ-ヘキサデシル-r a c-グリセロール又はトリエチルアンモニウム 1-ジ-O-ヘキサデシル-r a c-グリセロール-S-H-ホスホネート、ポリアミン又はポリエチレングリコール鎖、アダマンタン酢酸、パルミチル部分、又はオクタデシルアミン若しくはヘキシルアミノ-カルボニル-オキシコレステロール部分が挙げられる。

20

【0136】

いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、活性薬物基質である。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるs i N Aのいずれかは、活性薬物基質であるコンジュゲート化部分に結合している。活性薬物基質の例としては、限定されないが、アスピリン、ワルファリン、フェニルブタゾン、イブプロフェン、スプロフェン、フェンブフェン、ケトプロフェン、（5）-（+）-プラノプロフェン、カルプロフェン、ダンシルサルコシン、2，3，5-トリヨード安息香酸、フルフェナム酸、葉酸、ベンゾチアジアジド、クロロチアジド、ジアゼピン、インドメチシン、バルビツレート、セファロスポリン、サルファ剤、抗糖尿病薬、抗菌剤、又は抗生物質が挙げられる。

30

【0137】

5'安定化エンドキャップ

本明細書では、5'安定化エンドキャップを含むs i N A分子が更に開示される。本明細書で使用される場合、「5'安定化エンドキャップ」及び「5'エンドキャップ」という用語は、互換的に使用される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるセンス鎖又は第1のヌクレオチド配列のいずれかの中の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するヌクレオチドで置き換えられる。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるアンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列のいずれかの中の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するヌクレオチドで置き換えられる。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるセンス鎖又は第1のヌクレオチド配列のいずれかの中の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるアンチセンス鎖又は第2のヌクレオチド配列のいずれかの中の2'-O-メチルヌクレオチドは、5'安定化エンドキャップを含有するように更に修飾される。

40

【0138】

いくつかの実施形態では、5'安定化エンドキャップは、5'ホスフェート模倣体である。いくつかの実施形態では、5'安定化エンドキャップは、修飾5'ホスフェート模倣体である。いくつかの実施形態では、修飾5'ホスフェートは、化学修飾5'ホスフェートである。いくつかの実施形態では、5'安定化エンドキャップは、5'-ビニルホスホネートで

50

ある。いくつかの実施形態では、5'-ビニルホスホネートは、5'-(E)-ビニルホスホネート又は5'-(Z)-ビニルホスホネートである。いくつかの実施形態では、5'-ビニルホスホネートは、重水素化ビニルホスホネートである。いくつかの実施形態では、重水素化ビニルホスホネートは、モノ-重水素化ビニルホスホネートである。いくつかの実施形態では、重水素化ビニルホスホネートは、ジ-重水素化ビニルホスホネートである。いくつかの実施形態では、5'安定化エンドキャップは、ホスフェート模倣体である。ホスフェート模倣体の例は、Parmar et al., J Med Chem, 2018 61(3): 734-744、国際公開第2018/045317号及び同第2018/044350号、並びに米国特許第10,087,210号に開示されており、それらの各々が、参照によりその全体が組み込まれる。

10

【0139】

いくつかの態様では、本開示は、以下から選択されるヌクレオチドホスフェート模倣体を含むs i N Aを提供する：


20

30


40

50

【化 5 6】




(omeco-d3ヌクレオチド)、





(4hヌク

10



レオチド)、


(v-munヌクレオチド)、



(c2o-4hヌクレオチド)、


(omceomun*エナンチオマー

20




1)、

(omceomun*エナンチオマー2)、



30



(4h-vpヌクレオチド)、及び

(c2o-4hヌクレオチ


ド)、

式中、 R_y は、核酸塩基であり、 R^{15} は、H又は CH_3 である。いくつかの実施形態では、核酸塩基は、チミン、シトシン、グアニン、アデニン、ウラシル、及びそれらの類似体又は誘導体から選択される。いくつかの実施形態では、本開示のヌクレオチドホスフェート模倣体としては、以下の構造が挙げられるが、これらに限定されない：


40

50


【化 5 7 - 1】



(o m e c o - d 3 U) 、




(o



10


m e c o - d 3 T) 、

(o m e c o - d 3 C) 、




(o m e c o - d 3 G) 、


20




(o m e c o - d 3 A) 、



(4




(4 h T) 、




(4 h

h U) 、



C) 、


(4 h G) 、



40

50

【化 5 7 - 2】



10


20

30


40

50


【化 5 7 - 3】



(c 2 o - 4 h A) 、




(o m




10

e c o - m u n U) 、

(o m e c o - m u n T) 、




(o m e c o - m u n C) 、




20

(o m e c o - m u n G) 、

(o m e c o - m u n A) 、




(o m e c o - m u n U) 、




(o m

30



e c o - m u n T) 、

(o m e c o - m u n C) 、




(o m e c o - m u n G) 、


40

50


【化 5 7 - 4】



(o m e c o - m u n A) 、




(4




10

h - v p - U) 、


(4 h - v p - C) 、



(4 h - v p - T) 、




20




(4 h - v p - G) 、


(4 h - v p - A) 、



(c o c - 4 h U) 、



30




(c o c - 4 h C) 、

(c o c - 4 h T) 、

40


50

【化 5 7 - 5】



(coc-4hG)、及び

10



(coc-4hA)

であり、式中、 R^{15} は、H又は CH_3 である。

【0140】

いくつかの態様では、本開示は、以下から選択されるヌクレオチドホスフェート模倣体を含むs i N Aを提供する：


20

30


40

50


【化 5 8】



(o m e c o - d 3 U) 、




(4 h



U) 、


(v - m u n) 、

(4 h - v p -




U) 、

(c 2 o - 4 h) 、




20

(c o c



- 4 h U) 、

(o m e c o - m u n U、式中、R¹⁵がCH₃であ

30


る) 、及び

式中、R¹⁵がH又はCH₃である。いくつかの実施形態では、これらの新規のヌクレオチドホスフェート模倣体（例えば、o m e c o - d 3ヌクレオチド、4 hヌクレオチド、v - m u nヌクレオチド、c 2 o - 4 hヌクレオチド、c o c - 4 hヌクレオチド、o m e c o - m u nヌクレオチド、4 h - v pヌクレオチド、又はd 2 v mヌクレオチド）の1つは、アンチセンス鎖の5'末端に位置するが、これらの新規のヌクレオチドホスフェート模倣体は、センス鎖の5'末端、アンチセンス鎖の3'末端、又はセンス鎖の3'末端 40に組み込まれてもよい。

【0 1 4 1】

追加的又は代替的に、本明細書に開示されるs i N A分子は、センス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方に、式(I a)


【化 5 9】



の 5' - 安定化エンドキャップを含み得、式中、 R_x は、H、核酸塩基、アリール、又はヘテロアリールであり、 R^{26} は、

10

【化 6 0】



20

$-CH=CD-Z$ 、 $-CD=CH-Z$ 、 $-CD=CD-Z$ 、 $-(CR^{21}R^{22})_n-Z$ 、又は $-(C_2-C_6 \text{ アルケニレン})-Z$ であり、 R^{20} は、Hであるか、又は R^{26} 及び R^{20} は一緒になって、 $-(CR^{21}R^{22})_n-Z$ 又は $-(C_2-C_6 \text{ アルケニレン})-Z$ で置換された 3～7 員の炭素環式環を形成し、 n は、1、2、3、又は 4 であり、 Z は、 $-ONR^{23}R^{24}$ 、 $-OP(O)OH(CH_2)_mCO_2R^{23}$ 、 $-OP(S)OH(CH_2)_mCO_2R^{23}$ 、 $-P(O)(OH)_2$ 、 $-P(O)(OH)(OCH_3)$ 、 $-P(O)(OH)(OCD_3)$ 、 $-SO_2(CH_2)_mP(O)(OH)_2$ 、 $-SO_2NR^{23}R^{25}$ 、 $-NR^{23}R^{24}$ 、 $-NR^{23}SO_2R^{24}$ であり、 R^{21} 及び R^{22} のいずれかは、独立して、水素又は C_1-C_6 アルキルであるか、又は R^{21} 及び R^{22} は一緒になってオキソ基を形成し、 R^{23} は、水素又は C_1-C_6 アルキルであり、 R^{24} は、 $-SO_2R^{25}$ 若しくは $-C(O)R^{25}$ であるか、又は R^{23} 及び R^{24} はそれらが結合している窒素と一緒に、置換若しくは非置換の複素環式環を形成し、 R^{25} は、 C_1-C_6 アルキルであり、 m は、1、2、3、又は 4 である。いくつかの実施形態では、 R^1 は、アリールである。いくつかの実施形態では、アリールは、フェニルである。


30

【0 1 4 2】

追加的又は代替的に、本明細書に開示される siNA 分子は、センス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方に、式 (I b)

40


【化 6 1】



の 5' - 安定化エンドキャップを含み得、式中、 R_x は、H、核酸塩基、アリール、又はヘテロアリールであり、 R^{26} は、

50

【化 6 2】



10

$-\text{CH}=\text{CD}-\text{Z}$ 、 $-\text{CD}=\text{CH}-\text{Z}$ 、 $-\text{CD}=\text{CD}-\text{Z}$ 、 $-(\text{CR}^{21}\text{R}^{22})_n-\text{Z}$ 、又は $-(\text{C}_2-\text{C}_6\text{アルケニレン})-\text{Z}$ であり、 R^{20} は、 H であるか、又は R^{26} 及び R^{20} は一緒になって、 $-(\text{CR}^{21}\text{R}^{22})_n-\text{Z}$ 又は $-(\text{C}_2-\text{C}_6\text{アルケニレン})-\text{Z}$ で置換された3～7員の炭素環式環を形成し、 n は、1、2、3、又は4であり、 Z は、 $-\text{ONR}^{23}\text{R}^{24}$ 、 $-\text{OP}(\text{O})\text{OH}(\text{CH}_2)_m\text{CO}_2\text{R}^{23}$ 、 $-\text{OP}(\text{S})\text{OH}(\text{CH}_2)_m\text{CO}_2\text{R}^{23}$ 、 $-\text{P}(\text{O})(\text{OH})_2$ 、 $-\text{P}(\text{O})(\text{OH})(\text{OCH}_3)$ 、 $-\text{P}(\text{O})(\text{OH})(\text{OCD}_3)$ 、 $-\text{SO}_2(\text{CH}_2)_m\text{P}(\text{O})(\text{OH})_2$ 、 $-\text{SO}_2\text{NR}^{23}\text{R}^{25}$ 、 $-\text{NR}^{23}\text{R}^{24}$ 、 $-\text{NR}^{23}\text{SO}_2\text{R}^{24}$ であり、 R^{21} 及び R^{22} のいずれかは、独立して、水素又は C_1-C_6 アルキルであるか、又は R^{21} 及び R^{22} は一緒になってオキソ基を形成し、 R^{23} は、水素又は C_1-C_6 アルキルであり、 R^{24} は、 $-\text{SO}_2\text{R}^{25}$ 若しくは $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{25}$ であるか、又は R^{23} 及び R^{24} はそれらが結合している窒素と一緒に、置換若しくは非置換の複素環式環を形成し、 R^{25} は、 C_1-C_6 アルキルであり、 m は、1、2、3、又は4である。いくつかの実施形態では、 R^{21} は、アリールである。いくつかの実施形態では、アリールは、フェニルである。


20

【0143】

追加的又は代替的に、本明細書に開示される *s i N A* 分子は、センス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方に、式 (I c)

30

【化 6 3】




の5'安定化エンドキャップを含み得、式中、 R_x は、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H であり、 R^{26} が、

40

50

【化 6 4】



10

—CH=CD—Z、—CD=CH—Z、—CD=CD—Z、—(CR²¹R²²)_n—Z、又は—(C₂—C₆アルケニレン)—Zであり、R²⁰が、水素であるか、又はR²⁶及びR²⁰が、一緒になって、—(CR²¹R²²)_n—Z若しくは—(C₂—C₆アルケニレン)—Zで置換された3～7員の炭素環式環を形成し、nが、1、2、3、又は4であり、

Zが、—ONR²³R²⁴、—OP(O)OH(CH₂)_mCO₂R²³、—OP(S)OH(CH₂)_mCO₂R²³、—P(O)(OH)₂、—P(O)(OH)(OCH₃)、—P(O)(OH)(OCD₃)、—SO₂(CH₂)_mP(O)(OH)₂、—SO₂NR²³R²⁵、—NR²³R²⁴、又は—NR²³SO₂R²⁴であり、R²¹及びR²²のいずれかが、独立して、水素若しくはC₁—C₆アルキルであるか、又はR²¹及びR²²が一緒になってオキソ基を形成し、R²³が、水素又はC₁—C₆アルキルであり、R²⁴が、—SO₂R²⁵若しくは—C(O)R²⁵であるか、又は

20

【0144】


R²³及びR²⁴が、それらが結合している窒素と一緒に、置換又は非置換複素環式環を形成し、R²⁵が、C₁～C₆アルキルであり、mが、1、2、3、又は4である。いくつかの実施形態では、R¹は、アリールである。いくつかの実施形態では、アリールは、フェニルである。

【0145】

追加的又は代替的に、本明細書に開示されるs i N A分子は、センス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方に、式(I I a)

30


【化 6 5】



の5'安定化エンドキャップを含み得、式中、Rxが、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又はHであり、R²⁶が、

40


【化 6 6】



10

—CH₂SO₂NHCH₃、又は

【化 6 7】



であり、R⁹が、—SO₂CH₃又は—COCH₃であり、

【化 6 8】



20


が、二重結合又は単結合であり、R¹⁰ = —CH₂PO₃H又は—NHCH₃であり、R¹¹が、—CH₂—又は—CO—であり、R¹²が、Hであり、R¹³が、CH₃であるか、又はR¹²及びR¹³が、一緒になって、—CH₂CH₂CH₂—を形成する。いくつかの実施形態では、R¹は、アリールである。いくつかの実施形態では、アリールは、フェニルである。

【0146】

30

追加的又は代替的に、本明細書に開示される siNA 分子は、センス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方に、式 (IIb)

【化 6 9】




の 5' 安定化エンドキャップを含み得、式中、R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H であり、R²⁶ が、

40

50


【化 7 0】



10

-CH₂SO₂NHCH₃、又は

【化 7 1】

であり、R⁹が、-SO₂CH₃又は-COCH₃であり、

20

【化 7 2】

— —


が、二重結合又は単結合であり、R¹⁰=-CH₂PO₃H又は-NHCH₃であり、R¹¹が、-CH₂-又は-CO-であり、R¹²が、Hであり、R¹³が、CH₃であるか、又はR¹²及びR¹³が、一緒になって、-CH₂CH₂CH₂-を形成する。いくつかの実施形態では、R¹は、アリールである。いくつかの実施形態では、アリールは、フェニルである。

【0147】

追加的又は代替的に、本明細書に開示される siNA 分子は、センス鎖、アンチセンス鎖、又はその両方に、式 (II I)

30

【化 7 3】



の 5' 安定化エンドキャップを含み得、式中、R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H であり、L が、-CH₂-、-CH=CH-、-CO-、又は -CH₂CH₂-であり、A が、-ONHCOCH₃、-ONHSO₂CH₃、-PO₃H、-OP(SOH)CH₂CO₂-H、-SO₂CH₂PO₃H、-SO₂NHCH₃、-NHHSO₂CH₃、又は -N(SO₂CH₂CH₂CH₂)である。いくつかの実施形態では、R¹は、アリールである。いくつかの実施形態では、アリールは、フェニルである。


40

【0148】

追加的又は代替的に、本明細書に開示される siNA 分子は、式 (1) ~ 式 (16)、式 (9X) ~ 式 (12X)、式 (16X)、式 (9Y) ~ 式 (12Y)、式 (16Y)、式 (21) ~ 式 (36)、式 36X、式 (41) ~ (56)、式 (49X) ~ (52X)、式 (49Y) ~ (52Y)、式 56X、式 56Y、式 (61)、及び式 (62)：

50

【化 7 4 - 1】




式(1)

式(2)

式(3)

式(4)




式(5)

式(6)

式(7)

10




式(8)

式(9)

式(9X)

式(9Y)




式(10)

式(10X)

式(10Y)

20




式(11)

式(11X)

式(11Y)


30



式(12)

式(12X)

式(12Y)



式(13)


式(14)

式(15)


40

50


【化 7 4 - 2】




式 (16)




式 (16X)




式 (16Y)




式 (21)




式 (22)




式 (23)




式 (24)




式 (25)




式 (26)




式 (27)




式 (28)




式 (29)




式 (30)




式 (31)




式 (32)




式 (33)




式 (34)




式 (35)




式 (36)




式 (36X)




式 (41)



式 (42)



式 (43)



式 (44)

10


20

30


40

50


【化 7 4 - 3】




式(45)




式(46)




式(47)




式(48)




式(49)




式(49X)




式(49Y)




式(50)




式(50X)




式(50Y)




式(51)




式(51X)




式(51Y)




式(52)




式(52X)




式(52Y)




式(53)




式(54)




式(55)



式(56)



式(56X)



式(56Y)

10


20

30


40

50

【化 7 4 - 4】



式 (61)



式 (62)

10


からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含み得、式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である。

【0149】


いくつかの実施形態では、本明細書に開示される *s i N A* 分子のいずれかは、式 (50)、式 (50X)、式 (50Y)、式 (56)、式 (56X)、式 (56Y)、式 (61)、式 (62)、及び式 (63)：

20


【化 7 5】




式 (50)




式 (50X)




式 (50Y)



式 (56)




式 (56X)




式 (56Y)


30



式 (61)



式 (62)



式 (63)

40

からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含み、式中、 R_x が、核酸塩基、


50

アリール、ヘテロアリール、又はHである。

【0150】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される *s i N A* 分子のいずれかは、式(71)～式(86)、式(79X)～式(82X)、式(79Y)～(82Y)、式86X、式86X'、式86Y、及び式86Y'：

【化76-1】




式(71)

式(72)

式(73)


式(74)



式(75)

式(76)

式(77)




式(78)

式(79)

式(79X)


式(79Y)



式(80)

式(80X)


式(80Y)



式(81)

式(81X)


式(81Y)



式(82)

式(82X)

式(82Y)



式(83)

式(84)

式(85)

10


20

30


40

50


【化 7 6 - 2】




式 (86)




式 (86X)



式 (86X')



式 (86Y)



式 (86Y')

10


からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含み、式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である。

20


【0151】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される s i N A 分子のいずれかは、式 (78)、式 (79)、式 (79X)、式 (79Y)、式 (86)、式 (86X)、及び式 (86X') :


【化 7 7】




式 (78)



式 (79)




式 (79X)




式 (79Y)


30



式 (86)



式 (86X)



式 (86X')

40


からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含み、式中、 R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である。

【0152】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される s i N A 分子のいずれかは、式 (1A) ~ (15A)、式 (1A-1) ~ (7A-1)、式 (1A-2) ~ (7A-2)、式 (1A-3) ~ (7A-3)、式 (1A-4) ~ (7A-4)、式 (9B) ~ (12B)、式 (9AX) ~ (12AX)、式 (9AY) ~ (12AY)、式 (9BX) ~ (12BX)、及び式 (9BY) ~ (12BY) からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含む。

50

【化 7 8 - 1】



10


20

30


40

50


【化 7 8 - 2】




式(5A-3)




式(5A-4)




式(6A)




式(6A-1)




式(6A-2)




式(6A-3)




式(6A-4)




式(7A)




式(7A-1)




式(7A-2)




式(7A-3)




式(7A-4)




式(8A)



式(9A)



式(9AX)



式(9AY)

10


20

30


40

50


【化 7 8 - 3】




式 (9B)




式 (9BX)




式 (9BY)




式 (10A)




式 (10AX)




式 (10AY)




式 (10B)




式 (10BX)




式 (10BY)




式 (11A)




式 (11AX)




式 (11AY)




式 (11B)




式 (11BX)




式 (11BY)




式 (12A)




式 (12AX)




式 (12AY)



式 (12B)



式 (12BX)



式 (12BY)

10


20

30


40

50


【化 7 8 - 4】



式 (13A)



式 (14A)



式 (15A)

10

【 0 1 5 3】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される s i N A 分子のいずれかは、式 (2 1 A) ~ (3 5 A)、式 (2 9 B) ~ (3 2 B)、式 (2 9 A X) ~ (3 2 A X)、式 (2 9 A Y) ~ (3 2 A Y)、式 (2 9 B X) ~ (3 2 B X)、及び式 (2 9 B Y) ~ (3 2 B Y) からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含む。







20

30

40

50

【化 7 9 - 1】



10


20

30


40

50


【化 7 9 - 2】




式 (31A)




式 (31AX)




式 (31AY)




式 (31B)




式 (31BX)




式 (31BY)




式 (32A)




式 (32AX)




式 (32AY)




式 (32B)




式 (32BX)




式 (32BY)



式 (33A)



式 (34A)



式 (35A)

【 0 1 5 4】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される s i N A 分子のいずれかは、式 (7 1 A) ~ (8 6 A)、式 (7 9 X A) ~ (8 2 X A)、式 (7 9 Y A) ~ (8 2 Y A)、式 (8 6 X A)、式 (8 6 X ' A)、式 (8 6 Y)、及び式 (8 6 Y ') からなる群から選択される 5' 安定化エンドキャップを含む。

10


20

30

40

50

【化 80 - 1】




式(71A)

式(72A)

式(73A)

式(74A)

10




式(75A)

式(76A)

式(77A)

20




式(78A)

式(79A)

式(79XA)

式(79YA)

30




式(80A)

式(80XA)

式(80YA)

40




式(81A)

式(81XA)

式(81YA)

50

【化 8 0 - 2】




式(82A)

式(82XA)

式(82YA)

10




式(83A)

式(84A)

式(85A)

20




式(86A)

式(86XA)

式(86X'A)

30



式(86Y)


式(86Y')

40

【0155】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される s i N A 分子のいずれかは、式(78A)、式(79A)、式(79XA)、式(79YA)、式(86A)、式(86XA)、及び式(86X'A)からなる群から選択される5'安定化エンドキャップを含む。

【化 8 1】



10

20

【0156】

いくつかの実施形態では、5'安定化エンドキャップは、アンチセンス鎖の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、5'安定化エンドキャップは、1、2、3、4、若しくは5個、又はそれより多くのリンカーを介して、アンチセンス鎖の5'末端に結合している。いくつかの実施形態では、1つ以上のリンカーは、独立して、ホスホジエステル(p又はpo)リンカー、ホスホロチオエート(ps)リンカー、メシルホスホルアミデート(Ms)リンカー、ホスホラミダイト(HEG)リンカー、トリエチレングリコール(TEG)リンカー、及び／又はホスホロジチオエートリンカーからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、1つ以上のリンカーは、p-(PS)2、(PS)2-p-TEG-p、(PS)2-p-HEG-p、及び(PS)2-p-(HEG-p)2からなる群から独立して選択される。

30

【0157】

上述のように、本開示は、本明細書に記載されるsiNA分子、センス鎖、アンチセンス鎖、第1のヌクレオチド配列、又は第2のヌクレオチド配列のいずれかを含む組成物を提供する。本開示のsiNA及びその組成物は、様々な疾患及び状態(例えば、ウイルス性疾患、肝臓疾患など)の治療に使用することができる。

【0158】

リンカー

いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるsiRNA、センス鎖、第1のヌクレオチド配列、アンチセンス鎖、及び／又は第2のヌクレオチド配列のいずれかは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23個、又はそれより多くのヌクレオシド間リンカーを含む。いくつかの実施形態では、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、又はそれより多くのヌクレオシド間リンカーは、独立して、ホスホジエステル(p又はpo)リンカー、ホスホロチオエート(ps)リンカー、メシルホスホルアミデート(Ms)リンカー、又はホスホロジチオエートリンカーからなる群から選択される。

40

【0159】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるsiRNA、センス鎖、第1のヌクレオチド配列、アンチセンス鎖、及び／又は第2のヌクレオチド配列のいずれかは、コンジュゲート化部分、リン酸化ブロッカー、及び／又は5'エンドキャップをsiRNA、セ

50

ンス鎖、第 1 のヌクレオチド配列、アンチセンス鎖、及び／又は第 2 のヌクレオチド配列に接続する 1、2、3、4 個、又はそれより多くのリンカーを更に含む。いくつかの実施形態では、1、2、3、4 個、又はそれより多くのリンカーは、独立して、ホスホジエステル (p 又は p o) リンカー、ホスホロチオエート (p s) リンカー、メシルホスホルアミデート (M s) リンカー、ホスホラミダイト (H E G) リンカー、トリエチレングリコール (T E G) リンカー、及び／又はホスホロジチオエートリンカーからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、1 つ以上のリンカーは、p - (P S) 2、(P S) 2 - p - T E G - p、(P S) 2 - p - H E G - p、及び (P S) 2 - p - (H E G - p) 2 からなる群から独立して選択される。

【0160】

10

例示的な s i N A

上記のように、本明細書に開示される s i N A は、2' - フルオロヌクレオチド f B、f N、又は 4 (4 n h) Q などの修飾ヌクレオチドを含み得る。f 2 P、f 4 P、及び f X などの他の 2' - フルオロヌクレオチドも、本開示の s i N A に組み込まれ得る。開示される 2' - フルオロヌクレオチド (例えば、f B、f N、又は 4 (4 n h) Q であって、表中で太字である) を含む s i N A は、本開示の 2' - フルオロヌクレオチドのうちの 1 つ以上を含んでよく、1 つ以上の 2' - フルオロヌクレオチドは、センス鎖若しくはアンチセンス鎖、又はその両方に存在してよい。表 1 は、これらの 2' - フルオロヌクレオチドを含む例示的な s i N A を示す。

20

30

40





50

表1-2' -フルオロヌクレオチドを含む s i N A

名称	SS/AS 5' から 3'
ds-siNA-001	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 1)
	mAps f2P psmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmCfCmAfCmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 2)
ds-siNA-002	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 3)
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmC f4P mAfCmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 4)
ds-siNA-003	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 5)
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmCfCmA f2P mCmAmCpsmGpsmA (配列番号 6)
ds-siNA-004	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 7)
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmC f2P mAf f2P mCmAmCpsmGpsmA (配列番号 8)
ds-siNA-005	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 9)
	mAps fB psmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmCfCmAfCmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 10)
ds-siNA-006	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 11)
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmC fB mAfCmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 12)
ds-siNA-007	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 13)
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmC fB mAf B mCmAmCpsmGpsmA (配列番号 14)
ds-siNA-008	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 15)
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmC f2P mAfCmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 16)
ds-siNA-023	5'-mCpsmCpsmGmUfGmUfGf(4nh)QfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA- p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 63)
	3'- mCpsmUpsmGmGfCmAfAmCmGmUmGmAfAmGmCfGmApsfGpsd 2vd3U - 5' (配列番号 64)
ds-siNA-024	5'-mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA- p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 65)

40

【表 3 - 2】

	3'- mCpsmUpsmGmGfCmAmCfAmCmGmUmGmAfAmGf(4nh)QfGmAmApsfGpsd2vd 3U-5' (配列番号 66)
ds-siNA-025	5'-mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p- (ps)2GalNAc4 (配列番号 67)
	3'- mCpsmUpsmGmGf(4nh)QmAmCfAmCmGmUmGmAfAmGmCfGmAmApsfGpsd2v d3U-5' (配列番号 68)
mX=2'-O-メチルヌクレオチド、fX=2'-フルオロヌクレオチド、5dcd3X=式 17 のヌクレオチド、 5dfX=式 16 のヌクレオチド、vX=5' ビニルホスホネートヌクレオチド、d2vX=重水素化 5' ビニル ホスホネートヌクレオチド、vmX=5' ビニルホスホネート、2'-O-メチルヌクレオチド、  f4P=  f2P=  fB=  f(4nh)Q= 、ps=ホスホロチオエート連結、X は、核酸塩基(例えば、A、G、C、U、又は T)である。	

【0161】

追加的又は代替的に、本開示の siNA はまた、新規のヌクレオチドホスフェート模倣体（例えば、omeco-d3U、4hU、v-mun、c2o-4h、omeco-mun、d2vma、coc-4h、4H-VPヌクレオチド）を組み込んでもよい。表 2 は、これらのヌクレオチドホスフェート模倣体を含む例示的な siNA を示す。開示された新規のリン酸模倣体（例えば、omeco-d3U、4hU、v-mun、c2o-4h、omeco-mun、coc-4h、又は d2vma）を含み、表中に太字で示されている）を含む siNA は、本開示の新規のリン酸模倣体のうちの 1 つ以上を含み得、1 つ以上の新規のリン酸模倣体は、センス鎖若しくはアンチセンス鎖、又はその両方に存在し得る。

10

20

30

40

50

【表 4 - 1】

表 2 - スクレオチドホスフェート模倣体を含む s i N A

名称	SS/AS 5' から 3'
ds-siNA-009	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmAp-ps2-GalNAc4 (配列番号 17)
	omeco- d3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 18)
ds-siNA-010	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmAp-ps2-GalNAc4 (配列番号 19)
	4h UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 20)
ds-siNA-011	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmAp-ps2-GalNAc4 (配列番号 21)
	d2vd3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 22)
ds-siNA-012	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 23)
	v-mun UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 24)
ds-siNA-013	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 25)
	c2o-4h UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 26)
ds-siNA-014	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 27)
	omeco- mun UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 28)
ds-siNA-015	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 29)
	omeco- mun UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 30)
ds-siNA-016	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 33)
	d2vmApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmCfCmA f2P mCmAmCpsmGpsmA (配列番号 34)
ds-siNA-050	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 111)
	coc-4h UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsm UpsmC (配列番号 112)

10

20


30

40

50

【表 4 - 2】

mX=2'-O-メチルヌクレオチド、fX=2'-フルオロヌクレオチド、5dcd3X=式 17 のヌクレオチド、5dfX=式 16 のヌクレオチド、vX=5' ビニルホスホネートヌクレオチド、d2vX=重水素化 5' ビニルホスホネートヌクレオチド、vmX=5' ビニルホスホネート、2'-O-メチルヌクレオチド、



10


20

30

【 0 1 6 2】

追加的又は代替的に、本開示の s i N A はまた、新規のアンロックドヌクレオチドモノマーを組み込んでよい。これらの新規のアンロックドヌクレオチドは、


【化 8 2】



40


(式中、R_x が、核酸塩基、アリール、ヘテロアリール、又は H である)、又はより具体的には、

【化 8 3】



50

(式中、 R_y が、核酸塩基である) の構造を有し得る。これらのアンロックヌクレオチドは、2' ~ 3' 結合が欠損している (例えば、
【化 8 4】



）当該技術分野で既知のアンロック核酸 (UNA) とは異なる。表 3 は、これらのアンロックヌクレオチドを含む例示的な $s i N A$ を示す。3'、4' UNA (例えば、 $m u n 3$ 10 4) を含む $s i N A$ は、開示される 3'、4' UNA のうちの 1 つ以上を含んでよく、1 つ以上の 3'、4' UNA は、センス鎖若しくはアンチセンス鎖、又はその両方に存在してよい。

20

30

40

50

【表 5 - 1】

表 3 - 修飾されたアンロックドヌクレオチドを含む s i N A

名称	SS/AS(5' から 3')
ds-siNA-017	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA (配列番号 35)
	mUpsfGpsmAmAfGmun34CmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 36)
ds-siNA-018	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA (配列番号 37)
	mUpsfGpsmAmAfGmCmun34GfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 38)
ds-siNA-019	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 39)
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmun34GfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUps mC (配列番号 40)
ds-siNA-034	mCpsmCpsmun34GmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA (配列番号 93)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)
ds-siNA-035	mCpsmCpsmGmun34UfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA (配列番号 95)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)
ds-siNA-036	mCpsmCpsmGmUfGmun34UfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA (配列番号 96)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)
ds-siNA-037	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmun34CmUmUmCmGmCmUmUmCmA (配列番号 97)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)
ds-siNA-038	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmun34UmUmCmGmCmUmUmCmA (配列番号 98)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)
ds-siNA-039	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmun34UmCmGmCmUmUmCmA (配列番号 99)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)
ds-siNA-040	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmumun34CmGmCmUmUmCmA (配列番号 100)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)

10

20

30



40



50


【表 5 - 2】

ds-siNA-041	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmC mun34G mCmUmUmCmA (配列番号 101)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)
ds-siNA-042	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmC Gmun34C mUmUmCmA (配列番号 102)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)
ds-siNA-043	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmC mun34U mUmCmA (配列番号 103)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)
ds-siNA-044	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCm Umun34U mCmA (配列番号 104)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC(配列 番号 94)
ds-siNA-045	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUm mun34C mA (配列番号 105)
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)

mX=2'-*O*-メチルヌクレオチド、fX=2'-フルオロヌクレオチド、5dcd3X=式 17 のヌクレオチド、
5dfX=式 16 のヌクレオチド、vX=5' ビニルホスホネートヌクレオチド、d2vX=重水素化 5' ビニ
ルホスホネートヌクレオチド、vmX=5' ビニルホスホネート、2'-*O*-メチルヌクレオチド、

、mun34C=、mun34G=

、unG=

、ps=ホスホロチオエート連結、X は、核酸塩基(例えば、A、G、
C、U、又は T)である。

【0163】

追加的又は代替的に、本開示の siNA はまた、1 個以上のメシルホスホルアミデート
ヌクレオシド間連結を組み込んでもよい。メシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結
(「yp」としても知られる)は、

10


20

30

40

50


【化 8 5】



の構造を有し得る。表 4 は、これらのメシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結を含む例示的な $s i N A$ を示す。メシルホスホルアミデートヌクレオシド間連結（「 $y p$ 」と表中に太字で示される）を含む $s i N A$ は、1 個以上の $y p$ 連結を含んでいてもよく、1 個以上の $y p$ 連結は、センス鎖若しくはアンチセンス鎖、又はその両方に存在してよい。

【表 6】

表 4－メシルホスホルアミデートヌクレオシド間結合を含む $s i N A$

名称	SS/AS(5' から 3')
ds-siNA-020	5'-mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU- p(ps)2-GalNAc4 (配列番号 69)
	3'-mApsmGpsmCmAmCfCmAfCmCmUmGmAmAmGmAfGmAmGmU ypfUypm A-5' (配列番号 70)
ds-siNA-021	5'-mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU- p(ps)2-GalNAc4 (配列番号 71)
	3'-mA ypmGypm CmAmCfCmAfCmCmUmGmAmAmGmAfGmAmGmU psfUpsm A-5' (配列番号 72)
ds-siNA-022	5'-mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU- p(ps)2-GalNAc4 (配列番号 73)
	3'-mA ypmGypm CmAmCfCmAfCmCmUmGmAmAmGmAfGmAmGmU ypfUypm A-5' (配列番号 74)
mX=2'-O-メチルヌクレオチド、fX=2'-フルオロヌクレオチド、ps=ホスホロチオエート連結、X は、核酸塩基(例えば、A、G、C、U、又は T)であり、yp=  である。	

【0164】

追加的又は代替的に、本開示の $s i N A$ はまた、 $R y$ が核酸塩基（例えば、U、A、G、T、C）を表す

10


20

30

40


50

【化 8 6】



の構造を有する「a p N」と称される新規モノマーを組み込んでもよく、いくつかの実施形態では、a p Nは、

【化 8 7】



の構造を有する「a p U」であり得る。表 5 は、これらの修飾ヌクレオチドを含む例示的な s i N A を示す。a p U ヌクレオチド（「a U」と示され、表中で太字で示される）を含む s i N A は、1 個以上の a p U ヌクレオチドを含んでいてもよく、1 個以上の a p U ヌクレオチドは、センス鎖若しくはアンチセンス鎖、又はその両方に存在してよい。

10

20

30

40

50

【表 7 - 1】

表 5 - 修飾された a p Uヌクレオチドを含む s i N A

名称	SS/AS(5' から 3')
ds-siNA-026	mCpsmCpsmGaUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 77)
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 78)
ds-siNA-027	mCpsmCpsmGmUfGaUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 79)
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 80)
ds-siNA-028	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUaUmCmGmCmUmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 81)
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 82)
ds-siNA-029	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCaUmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 83)
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 84)
ds-siNA-030	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUaUmCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 85)
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 86)
ds-siNA-031	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 87)
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGaUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 88)
ds-siNA-032	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 89)
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsaUpsmC (配列番号 90)
ds-siNA-033	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 91)
	aUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 92)

10

20


30

40

50

【表 7 - 2】

mX=2'-O-メチルヌクレオチド、fX=2'-フルオロヌクレオチド、5dcd3X=式 17 のヌクレオチド、5dfX=式 16 のヌクレオチド、vX=5' ビニルホスホネートヌクレオチド、d2vX=重水素化 5' ビニルホスホネートヌクレオチド、vmX=5' ビニルホスホネート、2'-O-メチルヌクレオチド、



10

【0165】

標的遺伝子

理論に拘束されることを望まないが、細胞内に入ると、本明細書に開示される ds-siNA 分子のいずれかは、細胞中のタンパク質と相互作用して、RNA 誘導サイレンシング複合体 (RISC) を形成し得る。ds-siNA が RISC の一部であるとき、ds-siNA は巻き戻されて一本鎖 siNA (ss-siNA) を形成し得る。ss-siNA は、ds-siNA のアンチセンス鎖を含んでもよい。アンチセンス鎖は、相補的メッセンジャー RNA (mRNA) に結合してもよく、これにより、mRNA をコードする遺伝子がサイレンシングされる。

20

【0166】

標的遺伝子は、細胞中の任意の遺伝子であってもよい。いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、ウイルス遺伝子である。いくつかの実施形態では、ウイルス遺伝子は、DNA ウイルス由来である。いくつかの実施形態では、DNA ウイルスは、二本鎖 DNA (dsDNA) ウイルスである。いくつかの実施形態では、dsDNA ウイルスは、ヘパドナウイルスである。いくつかの実施形態では、ヘパドナウイルスは、B 型肝炎ウイルス (HBV) である。いくつかの実施形態では、HBV は、HBV 遺伝子型 A ~ J から選択される。いくつかの実施形態では、ウイルス性疾患は、RNA ウイルスによって引き起こされる。いくつかの実施形態では、RNA ウイルスは、一本鎖 RNA ウイルス (ssRNA ウイルス) である。いくつかの実施形態では、ssRNA ウイルスは、ポジティブセンス一本鎖 RNA ウイルス ((+) ssRNA ウイルス) である。いくつかの実施形態では、(+) ssRNA ウイルスは、コロナウイルスである。いくつかの実施形態では、コロナウイルスは、β-コロナウイルスである。いくつかの実施形態では、β-コロナウイルスは、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2 (SARS-CoV-2) (2019 年の新型コロナウイルス、又は 2019-nCoV の暫定名でも知られている)、ヒトコロナウイルス OC43 (hCoV-OC43)、中東呼吸器症候群関連コロナウイルス (MERS-CoV、2012 年の新型コロナウイルス、又は 2012-nCoV の暫定名でも知られている)、及び重症急性呼吸器症候群関連コロナウイルス (SARS-CoV、SARS-CoV-1 としても知られている) からなる群から選択される。いくつかの実施形態では、β-コロナウイルスは、COVID-19 の原因物質である SARS-CoV-2 である。いくつかの例示的な標的遺伝子は、本明細書の最後の表 17 に示される。

30

40

【0167】

いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、HBV の S 遺伝子又は X 遺伝子から選択される。いくつかの実施形態では、HBV は、その全体が参照により組み込まれる、GenBank 受託番号 U95551.1 のヌクレオチド配列に対応する、配列番号 55 のヌクレオチド配列に示されるゲノム配列を有する。

50

【0168】

例示的なHBVゲノム配列は、その全体が参照により組み込まれる、Genbank受託番号KC315400.1に対応する配列番号60に示される。配列番号60のヌクレオチド2307～3215、1～1623は、ポリメラーゼタンパク質をコードするポリメラーゼ／RT遺伝子配列に対応する。配列番号60のヌクレオチド2848～3215、1～835は、大きなSタンパク質をコードするPreS1／S2／S遺伝子配列に対応する。配列番号60のヌクレオチド3205～3215、1～835は、中間のSタンパク質をコードするPreS2／S遺伝子配列に対応する。配列番号60のヌクレオチド155～835は、小さなSタンパク質をコードするS遺伝子配列に対応する。配列番号60のヌクレオチド1374～1838は、Xタンパク質をコードするX遺伝子配列に対応する。配列番号60のヌクレオチド1814～2452は、プレコア／コアタンパク質をコードするPreC／C遺伝子配列に対応する。配列番号60のヌクレオチド1901～2452は、コアタンパク質をコードするC遺伝子配列に対応する。HBVゲノムは、ウィルスプロモーター（preS2、preS1、Core、及びX）並びにエンハンサー要素（ENH1及びENH2）などのウィルス調節エレメントを更に含む。配列番号60のヌクレオチド1624～1771は、ENH2に対応する。配列番号60のヌクレオチド1742～1849は、Coreプロモーターに対応する。配列番号60のヌクレオチド1818～3215、1～1930は、コア及びポリメラーゼタンパク質をコードするプレゲノムRNA（pgRNA）に対応する。

10

【0169】

20

いくつかの実施形態では、センス鎖は、HBVのX領域又はHBVのS領域から始まるウィルス標的RNA配列に少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的であるか、又はそのウィルス標的RNA配列にハイブリダイズする配列を含む。ウィルス標的は、例えば、acc.KC315400.1（遺伝子型B、「gt B」）における、又はA、C、若しくはD遺伝子型のいずれか1つにおける標的部位の5'末端から始まってもよい。当業者は、例えば、Wing-Kin Sung, et al., Nature Genetics 44:765 (2012)に記載されているようなHBV位置について理解するであろう。いくつかの実施形態では、S領域は、小さなSタンパク質の開始（遺伝子型B KC315400.1単離物、位置番号155）からXタンパク質（遺伝子型B KC315400.1単離物、位置番号1373）の開始前までと定義される。いくつかの実施形態では、X領域は、Xタンパク質（遺伝子型B KC315400.1単離物、位置番号1374）の始まりからDR2部位（遺伝子型B KC315400.1単離物、位置番号1603）の終わりまでと定義される。

30

【0170】

いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、配列番号55の200～720、又は1100～1700位置内の15～30、15～25、15～23、15～22、15～21、17～25、17～23、17～22、17～21、又は19～21個のヌクレオチドに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%又は100%相補的である。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、配列番号55の200～280、300～445、460～510、650～720、1170～1220、1250～1300、又は1550～1630位置内の15～30、15～25、15～23、15～22、15～21、17～25、17～23、17～22、17～21、又は19～21個のヌクレオチドに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%又は100%相補的である。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、配列番号55の200～230、250～280、300～330、370～400、405～445、460～500、670～700、1180～1210、1260～1295、1520～1550、又は1570～1610位置内の15～30、15～25、15～23、15～22、15～21、17～25、17～23、17～22、17～21、又は19～21個のヌクレ

40

50

オチドに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である。いくつかの実施形態では、第2のヌクレオチド配列は、配列番号55の203、206、254、305、375、409、412、415、416、419、462、466、467、674、676、1182、1262、1263、1268、1526、1577、1578、1580、1581、1583、又は1584位置で開始する15~30、15~25、15~23、15~22、15~21、17~25、17~23、17~22、17~21、又は19~21個のヌクレオチドに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%相補的である。

【0171】

いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチドは、配列番号55内のヌクレオチド領域に対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一であるが、例外として、配列番号55中のチミン(Ts)が、ウラシル(U)で置き換えられている。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列は、配列番号55の200~720、又は1100~1700位置内の15~30、15~25、15~23、15~22、15~21、17~25、17~23、17~22、17~21、又は19~21個のヌクレオチドに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%又は100%同一である。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列は、配列番号55の200~280、300~445、460~510、650~720、1170~1220、1250~1300、又は1550~1630位置内の15~30、15~25、15~23、15~22、15~21、17~25、17~23、17~22、17~21、又は19~21個のヌクレオチドに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%又は100%同一である。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列は、配列番号55の200~230、250~280、300~330、370~400、405~445、460~500、670~700、1180~1210、1260~1295、1520~1550、又は1570~1610位置内の15~30、15~25、15~23、15~22、15~21、17~25、17~23、17~22、17~21、又は19~21個のヌクレオチドに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である。いくつかの実施形態では、第1のヌクレオチド配列は、配列番号55の203、206、254、305、375、409、412、415、416、419、462、466、467、674、676、1182、1262、1263、1268、1526、1577、1578、1580、1581、1583、又は1584位置で開始する15~30、15~25、15~23、15~22、15~21、17~25、17~23、17~22、17~21、又は19~21個のヌクレオチドに対して少なくとも約60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、又は100%同一である。

【0172】

いくつかの疾患を引き起こすコロナウイルスは、非構造タンパク質(nsp)をコードするゲノムの領域、より具体的には、nsp8~nsp15をコードする領域において、高度な相同性を共有する。実際、2019-nCoVの約12900ヌクレオチド~約19900ヌクレオチドのβ-コロナウイルスの約7kB配列にわたって約65%の同一性が存在し、nsp8~nsp15のゲノムスパンのいくつかのサブセクションは、95%以上の同一性を含み得る。この領域内の全ての遺伝子は、複製に関連する非構造タンパク質をコードする。したがって、ゲノムのこのセグメントは、MERS-CoV、SARS-CoV-1、及びSARS-CoV-2などの複数の異なるタイプのコロナウイルスに対して広範囲の治療を提供できるsiNAによる標的化に適している。

【0173】

いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、SARS-CoV-2のゲノムから選択される。いくつかの実施形態では、SARS-CoV-2は、参照によりその全体が組み込ま

10

20

30

40

50

50

8～14717、14722～14748、14750～14777、14821～14846、14854～14873、14875～14903、14962～14990、14992～15020、15055～15140、15172～15200、15310～15332、15346～15367、15496～15518、15622～15644、15838～15869、15886～15905、15985～16010、16057～16079、16186～16205、16430～16448、16822～16865、16954～16976、17008～17042、17080～17111、17137～17156、17269～17289、17530～17549、17563～17582、17680～17699、17746～17765、17857～17876、17956～17975、18100～18122、18196～18218、19618～19639、19783～19802、19831～19850、20107～20130、20776～20795、21502～21524、24302～24325、24446～24465、24620～24651、24662～24684、25034～25057、25104～25128、25364～25387、25502～25530、26191～26227、26232～26267、26269～26330、26332～26394、26450～26481、26574～26600、27003～27064、27093～27111、27183～27212、27382～27407、27511～27533、27771～27818、28270～28296、28397～28434、28513～28546、28673～28692、28706～28726、28744～28794、28799～28827、28946～28972、28976～29034、29144～29172、29174～29196、29228～29259、29285～29305、29342～29394、29444～29463、29543～29566、29598～29630、29652～29687、29689～29731、29733～29757、又は29770～29828位置内の15～30、15～25、15～23、15～22、15～21、17～25、17～23、17～22、17～21、又は19～21個のヌクレオチド、好ましくは19～21個のヌクレオチド、より好ましくは19～21個のヌクレオチドに同一である。

【0174】

いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、SARS-CoVのゲノムから選択される。いくつかの実施形態では、SARS-CoVは、参照によりその全体が組み込まれる、GenBank受託番号NC__004718.3のヌクレオチド配列に対応するゲノムを有する。

【0175】

いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、MERS-CoVのゲノムから選択される。いくつかの実施形態では、MERS-CoVは、参照によりその全体が組み込まれる、GenBank受託番号NC__019843.3のヌクレオチド配列に対応するゲノムを有する。

【0176】

いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、hCoV-OC43のゲノムから選択される。いくつかの実施形態では、hCoV-OC43は、参照によりその全体が組み込まれる、GenBank受託番号NC__006213.1のヌクレオチド配列に対応するゲノムを有する。

【0177】

いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、肝臓代謝に関与する。いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、電子輸送鎖の阻害剤である。いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、MCJタンパク質(MCJ/DnaJC15又はメチル化制御されたJタンパク質)をコードする。いくつかの実施形態では、MCJタンパク質は、参照によりその全体が組み込まれる、GenBank受託番号NM__013238.3のヌクレオチド配列に対応する配列番号56のmRNA配列によってコードされる。

【0178】

いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、T A Zである。いくつかの実施形態では、T A Zは、参照によりその全体が組み込まれる、G e n B a n k 受託番号 N M _ 0 0 0 1 1 6 . 5 のヌクレオチド配列に対応する、配列番号 5 7 のヌクレオチド配列を含む。

【0179】

いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、アンジオポエチン様 3 (A N G P T L 3) である。いくつかの実施形態では、A N G P T L 3 は、参照によりその全体が組み込まれる、G e n B a n k 受託番号 N M _ 0 1 4 4 9 5 . 4 のヌクレオチド配列に対応する、配列番号 6 0 のヌクレオチド配列を含む。

いくつかの実施形態では、標的遺伝子は、ジアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ 2 (D G A T 2) である。いくつかの実施形態では、D G A T 2 は、参照によりその全体が組み込まれる、G e n B a n k 受託番号 N M _ 0 0 1 2 5 3 8 9 1 . 1 のヌクレオチド配列に対応する、配列番号 5 9 のヌクレオチド配列を含む。

【0180】

組成物

上述のように、本開示は、本明細書に記載される s i N A 分子、センス鎖、アンチセンス鎖、第 1 のヌクレオチド配列、又は第 2 のヌクレオチド配列のいずれかを含む組成物を提供する。組成物は、本明細書に記載される 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 個、又はそれより多くの s i N A 分子を含んでいてもよい。組成物は、いずれか 1 つの配列番号 1 及び 2 のヌクレオチド配列を含む第 1 のヌクレオチド配列を含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、組成物は、配列番号 5 1 ~ 7 4 のうちのいずれか 1 つのヌクレオチド配列を含む第 2 のヌクレオチド配列を含む。いくつかの実施形態では、組成物は、配列番号 1 及び 2 のうちのいずれか 1 つのヌクレオチド配列を含むセンス鎖を含む。いくつかの実施形態では、組成物は、配列番号 5 1 ~ 7 4 のうちのいずれか 1 つのヌクレオチド配列を含むアンチセンス鎖を含む。

【0181】

代替的に、組成物は、(a) リン酸化ブロッカーと、(b) 短い干渉核酸 (s i N A) と、を含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、本明細書に開示されるリン酸化ブロッカーのいずれかである。いくつかの実施形態では、s i N A は、本明細書に開示される s i N A のいずれかである。いくつかの実施形態では、s i N A は、本明細書に記載されるセンス鎖、アンチセンス鎖、第 1 のヌクレオチド配列、又は第 2 のヌクレオチド配列のいずれかを含む。いくつかの実施形態では、s i N A は、本明細書に記載されるセンス鎖、アンチセンス鎖、第 1 のヌクレオチド配列、又は第 2 のヌクレオチド配列のいずれかを含む。いくつかの実施形態では、s i N A は、1 つ以上の修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、1 つ以上の修飾ヌクレオチドは、独立して、2' -フルオロヌクレオチド及び 2' -O -メチルヌクレオチドから選択される。いくつかの実施形態では、2' -フルオロヌクレオチド又は 2' -O -メチルヌクレオチドは、本明細書に開示される 2' -フルオロ又は 2' -O -メチルヌクレオチド模倣体のいずれかから独立して選択される。いくつかの実施形態では、s i N A は、本明細書に開示される修飾パターンのいずれかを含むヌクレオチド配列を含む。

【0182】

いくつかの実施形態では、組成物は、(a) コンジュゲート化部分と、(b) 短い干渉核酸 (s i N A) と、を含む。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、本明細書に開示されるガラクトサミンのいずれかである。いくつかの実施形態では、s i N A は、本明細書に開示される s i N A のいずれかである。いくつかの実施形態では、s i N A は、本明細書に記載されるセンス鎖、アンチセンス鎖、第 1 のヌクレオチド配列、又は第 2 のヌクレオチド配列のいずれかを含む。いくつかの実施形態では、s i N A は、本明細書に記載されるセンス鎖、アンチセンス鎖、第 1 のヌクレオチド配列、又は第 2 のヌクレオチド配列のいずれかを含む。いくつかの実施形態では、s i N A は、1 つ以上の修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、1 つ以上の修飾ヌクレオチドは、独立し

て、2'-フルオロヌクレオチド及び2'-オ-メチルヌクレオチドから選択される。いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチド又は2'-オ-メチルヌクレオチドは、本明細書に開示される2'-フルオロ又は2'-オ-メチルヌクレオチド模倣体のいずれかから独立して選択される。いくつかの実施形態では、s i N Aは、本明細書に開示される修飾パターンのいずれかを含むヌクレオチド配列を含む。

【0183】

いくつかの実施形態では、組成物は、(a) 5'安定化エンドキャップと、(b) 短い干渉核酸(s i N A)と、を含む。いくつかの実施形態では、5'安定化エンドキャップは、本明細書に開示される5'安定化エンドキャップのいずれかである。いくつかの実施形態では、s i N Aは、本明細書に開示されるs i N Aのいずれかである。いくつかの実施形態では、s i N Aは、本明細書に記載されるセンス鎖、アンチセンス鎖、第1のヌクレオチド配列、又は第2のヌクレオチド配列のいずれかを含む。いくつかの実施形態では、s i N Aは、1つ以上の修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、1つ以上の修飾ヌクレオチドは、独立して、2'-フルオロヌクレオチド及び2'-オ-メチルヌクレオチドから選択される。いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチド又は2'-オ-メチルヌクレオチドは、本明細書に開示される2'-フルオロ又は2'-オ-メチルヌクレオチド模倣体のいずれかから独立して選択される。いくつかの実施形態では、s i N Aは、本明細書に開示される修飾パターンのいずれかを含むヌクレオチド配列を含む。

【0184】

いくつかの実施形態では、組成物は、(a) 少なくとも1つのリン酸化ブロッカー、コンジュゲート化部分、又は5'安定化エンドキャップと、(b) 短い干渉核酸(s i N A)と、を含む。いくつかの実施形態では、リン酸化ブロッカーは、本明細書に開示されるリン酸化ブロッカーのいずれかである。いくつかの実施形態では、コンジュゲート化部分は、本明細書に開示されるガラクトサミンのいずれかである。いくつかの実施形態では、5'安定化エンドキャップは、本明細書に開示される5'安定化エンドキャップのいずれかである。いくつかの実施形態では、s i N Aは、本明細書に開示されるs i N Aのいずれかである。いくつかの実施形態では、s i N Aは、本明細書に記載されるセンス鎖、アンチセンス鎖、第1のヌクレオチド配列、又は第2のヌクレオチド配列のいずれかを含む。いくつかの実施形態では、s i N Aは、1つ以上の修飾ヌクレオチドを含む。いくつかの実施形態では、1つ以上の修飾ヌクレオチドは、独立して、2'-フルオロヌクレオチド及び2'-オ-メチルヌクレオチドから選択される。いくつかの実施形態では、2'-フルオロヌクレオチド又は2'-オ-メチルヌクレオチドは、本明細書に開示される2'-フルオロ又は2'-オ-メチルヌクレオチド模倣体のいずれかから独立して選択される。いくつかの実施形態では、s i N Aは、本明細書に開示される修飾パターンのいずれかを含むヌクレオチド配列を含む。

【0185】

組成物は、医薬組成物であってもよい。いくつかの実施形態では、医薬組成物は、1つ以上の薬学的に許容される担体(添加剤)及び／又は希釈剤とともに製剤化される、ある量の本明細書に記載されるs i N A分子のうちの1つ以上を含む。医薬組成物は、固体又は液体形態での投与のために特別に製剤化されてもよく、以下に適合されるものを含む。

(1) 経口投与、例えば、ドレンチ(水性若しくは非水性の溶液若しくは懸濁液)、錠剤、例えば、口腔、舌下、及び全身吸収を標的としたもの、ボ-ラス、粉末、顆粒、舌に適用するためのペースト、(2) 例えば、滅菌溶液若しくは懸濁液、若しくは徐放性製剤などの、例えば、皮下、筋肉内、静脈内若しくは硬膜外注射による、非経口投与、(3) 例えば、クリーム、軟膏、又は皮膚に適用される制御放出性パッチ若しくはスプレーなどの、局所投与、(4) 例えば、ベッサリー、クリーム若しくはフォームとしての腔内又は直腸内、(5) 舌下、(6) 眼、(7) 経皮、あるいは(8) 鼻腔。

【0186】

本明細書で使用される「治療有効量」という語句は、任意の医学的治療に適用可能な合理的な利益／リスク比で動物において細胞の少なくとも亜集団において所望ないくつかの

治療効果をもたらすのに有効な、本開示の *s i N A* を含む化合物、材料、又は組成物の量を意味する。

【0187】

「薬学的に許容される」という語句は、本明細書では、健全な医学的判断の範囲内で、合理的な利益／リスク比に見合った、過度の毒性、刺激、アレルギー反応、又は他の問題若しくは合併症なしでヒト及び動物の組織に接触して使用するのに好適な、化合物、材料、組成物、及び／又は剤形を指すために使用される。

【0188】

湿潤剤、乳化剤及びラウリル硫酸ナトリウム及びステアリン酸マグネシウムなどの滑沢剤、並びに着色剤、放出剤 (*r e l e a s e a g e n t*)、コーティング剤、甘味料、香料及び芳香剤、保存剤及び抗酸化剤もまた、組成物中に存在し得る。

10

【0189】

薬学的に許容される抗酸化剤の例としては、以下が挙げられる。(1) 水溶性抗酸化剤、例えば、アスコルビン酸、塩酸システイン、硫酸水素ナトリウム、メタ亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸ナトリウム等、(2) 油溶性抗酸化剤、例えば、パルミチン酸アスコルビル、ブチル化ヒドロキシアニソール (*B H A*)、ブチル化ヒドロキシトルエン (*B H T*)、レシチン、没食子酸プロピル、 α -トコフェロール等、及び(3) 金属キレート剤、例えば、クエン酸、エチレンジアミン四酢酸 (*E D T A*)、ソルビトール、酒石酸、リン酸等が含まれる。

【0190】

本開示の製剤は、経口、経鼻、局所(頬側及び舌下を含む)、直腸、膣及び／又は非経口投与に好適なものを含む。製剤は、好都合には、単位剤形で提示されてもよく、薬学分野で周知の任意の方法によって調製されてもよい。単一の剤形を作製するために担体材料と組み合わせることができる活性成分の量は、治療される宿主、特定の投与態様に応じて様々である。単一剤形を作製するために担体材料と組み合わせることができる活性成分の量は、概して、治療効果を作製する化合物(例えば、*s i N A* 分子)の量である。概して、100%のうち、この量は、活性成分の約0.1%~約99%、好ましくは約5%~約70%、最も好ましくは約10%~約30%の範囲である。

20

【0191】

ある特定の実施形態では、本開示の製剤は、シクロデキストリン、セルロース、リポソーム、ミセル形成剤、例えば、胆汁酸、及び高分子担体、例えば、ポリエステル及びポリ無水物からなる群から選択される賦形剤と、本開示の化合物(例えば、*s i N A* 分子)とを含む。ある特定の実施形態では、前述の製剤は、本開示の化合物(例えば、*s i N A* 分子)を経口的に生体利用可能にする。

30

【0192】

これらの製剤又は組成物を調製する方法は、本開示の化合物(例えば、*s i N A* 分子)を、担体、及び任意選択で1つ以上の付属成分と会合させるステップを含む。一般に、製剤は、本開示の化合物(例えば、*s i N A* 分子)を液体担体、又は細かく分割された固体担体、又はその両方と均一かつ密接に会合させ、必要に応じて、生成物を成形することによって調製される。

40

【0193】

経口投与に好適な本開示の製剤は、カプセル、カシェ、丸剤、錠剤、ロゼンジ(風味付けされたベース、通常はスクロース及びアカシア又はトラガカントを使用する)、粉末、顆粒、又は水性若しくは非水性液体中の溶液若しくは懸濁液として、又は水中油若しくは油中水液体エマルジョンとして、又はエリキシル若しくはシロップとして、又はパステル(ゼラチン及びグリセリン、若しくはスクロース及びアカシアなどの不活性塩基を使用する)として、及び／又はマウスウォッシュの形態であってよく、それぞれ、活性成分として所定量の本開示の化合物(例えば、*s i N A* 分子)を含有する。本開示の化合物(例えば、*s i N A* 分子)はまた、ポーラス、なめ薬 (*e l e c t u a r y*)、又はペーストとして投与され得る。

50

【0194】

経口投与のための本開示の固体剤形（カプセル、錠剤、丸剤、糖衣剤、粉末、顆粒、トローチ剤など）では、活性成分は、クエン酸ナトリウム又はリン酸ニカルシウムなどの1つ以上の薬学的に許容される担体、及び／又は以下のいずれかと混合される。（1）デンプン、ラクトース、スクロース、グルコース、マンニトール、及び／又はケイ酸などの充填剤又は増量剤、（2）例えば、カルボキシメチルセルロース、アルギン酸塩、ゼラチン、ポリビニルピロリドン、スクロース、及び／又はアカシアなどの結合剤、（3）グリセロールなどの湿潤剤、（4）寒天、炭酸カルシウム、ジャガイモ又はタピオカデンプン、アルギン酸、特定のケイ酸塩、及び炭酸ナトリウムなどの崩壊剤、（5）パラフィンなどの溶液遅延剤、（6）ポロキサマー及びラウリル酸ナトリウムなどの四級アンモニウム化合物及び界面活性剤などの吸収促進剤、（7）例えば、セチルアルコール、グリセロールモノステアレート、及び非イオン性界面活性剤などの湿潤剤、（8）カオリン及びベントナイトクレーなどなどの吸収剤、（9）タルカ、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸、固体ステアリン酸マグネシウム、ポリエチレングリコール、ラウリルフェートナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、及びこれらの混合物などの潤滑剤、（10）着色剤、並びに（11）セチルアルコールアルコール、及び非イオン性界面活性剤などの制御された放出剤。

10

【0195】

カプセル、錠剤、及び丸剤の場合、薬学的組成物は、緩衝剤も含み得る。同様の種類の固体組成物は、ラクトース又は乳糖、並びに高分子量ポリエチレングリコールなどの賦形剤を使用して、軟質及び硬質殻のゼラチンカプセル中の充填剤としても用いられ得る。

20

【0196】

錠剤は、任意に1種以上の副成分とともに、圧縮又は成形によって製造することができる。圧縮錠剤は、結合剤（例えば、ゼラチン又はヒドロキシプロピルメチルセルロース）、滑沢剤、不活性希釈剤、保存剤、崩壊剤（例えば、デンプングリコール酸ナトリウム又は架橋カルボキシメチルセルロースナトリウム）、界面活性剤又は分散剤を使用して調製できる。成形錠剤は、不活性液体希釈剤で湿らせた粉末化合物の混合物を好適な機械で成形することによって製造することができる。

【0197】

本開示の医薬組成物の錠剤、及び他の固体剤形、例えば、糖衣剤、カプセル、丸剤及び顆粒は、任意選択で、腸溶性コーティング及び薬学的製剤化技術で周知の他のコーティングなどのコーティング及びシェルを用いて割線が入れられるか、又は調製され得る。それらはまた、例えば、所望の放出プロファイルを提供するために様々な割合のヒドロキシプロピルメチルセルロース、他のポリマーマトリックス、リポソーム及び／又はミクロスフェアを使用して、その中の活性成分の徐放又は制御放出を提供するように製剤化することもできる。それらは速放用に製剤化され、例えば凍結乾燥されてもよい。

30

【0198】

これらは、例えば、細菌保持フィルターを通して濾過することによって、又は、使用直前に滅菌水若しくはいくつかの他の滅菌注射用媒体に溶解することができる滅菌固体組成物の形態で滅菌剤を組み込むことによって、滅菌してもよい。これらの組成物はまた、任意に不透明剤（*opaqueing agent*）を含有していてもよく、任意選択で遅延様式で、胃腸管の特定の部分でのみ、又は優先的に有効成分（複数可）を放出する組成物であってもよい。使用できる包埋組成物の例としては、ポリマー物質及びワックスが挙げられる。活性成分はまた、適切であれば、上述の賦形剤のうちの1つ以上とともにマイクロカプセル化された形態であってもよい。

40

【0199】

本開示の化合物（例えば、*s i N A*分子）の経口投与のための液体剤形としては、薬学的に許容されるエマルジョン、マイクロエマルジョン、溶液、懸濁液、シロップ、及びエリキシル剤が挙げられる。活性成分に加えて、液体剤形は、当該技術分野で一般的に使用される不活性希釈剤、例えば、水又は他の溶媒、可溶化剤及び乳化剤、例えば、エチルア

50

ルコール、イソプロピルアルコール、炭酸エチル、酢酸エチル、ベンジルアルコール、安息香酸ベンジル、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、油（特に、綿実油、ラッカセイ油、トウモロコシ油、胚芽油、オリーブ油、ヒマシ油及びゴマ油）、グリセロール、テトラヒドロフリルアルコール、ポリエチレングリコール及びソルビタンの脂肪酸エステル、並びにこれらの混合物を含有してもよい。

【0200】

不活性希釈剤に加えて、経口組成物は、湿潤剤、乳化剤及び懸濁化剤、甘味料、香料、着色料、芳香剤及び保存剤などのアジュバントも含むことができる。

【0201】

懸濁液は、活性化合物（例えば、s i N A分子）に加えて、例えば、エトキシ化イソステアリルアルコール、ポリオキシエチレンソルビトール及びソルビタンエステル、微結晶セルロース、メタ水酸化アルミニウム、ベントナイト、寒天及びトラガカント、並びにこれらの混合物などの懸濁剤を含有してもよい。

10

【0202】

直腸又は腔投与のための本開示の医薬組成物の製剤は、座薬として提示されてもよく、これは、本開示の1つ以上の化合物（例えば、s i N A分子）を、例えば、カカオバター、ポリエチレングリコール、座薬ワックス又はサリチル酸塩を含み、室温では固体であるが、体温では液体であり、したがって、直腸又は腔で融解し、活性化合物（例えば、s i N A分子）を放出する1つ以上の好適な非刺激性賦形剤又は担体と混合することによって調製されてもよい。

20

【0203】

腔投与に好適な本開示の製剤には、好適であることが当該技術分野で既知であるような担体を含有するペッサリー、タンポン、クリーム、ゲル、ペースト、フォーム、又はスプレー製剤も含まれる。

【0204】

本開示の化合物（例えば、s i N A分子）の局所投与又は経皮投与のための剤形としては、粉末、スプレー、軟膏、ペースト、クリーム、ローション、ゲル、溶液、パッチ及び吸入剤が挙げられる。活性化合物（例えば、s i N A分子）は、滅菌条件下で、薬学的に許容される担体と、必要とされ得る任意の防腐剤、緩衝剤、又は推進剤と混合してもよい。

30

【0205】

軟膏、ペースト、クリーム及びゲルは、本開示の活性化合物（例えば、s i N A分子）に加えて、動物及び植物性脂肪、油、ワックス、パラフィン、デンプン、トラガカント、セルロース誘導体、ポリエチレングリコール、シリコン、ベントナイト、ケイ酸、タルク及び酸化亜鉛、又はそれらの混合物などの賦形剤を含有してもよい。

【0206】

粉末及びスプレーは、本開示の化合物（例えば、s i N A分子）に加えて、ラクトース、タルク、ケイ酸、水酸化アルミニウム、ケイ酸カルシウム及びポリアミド粉末などの賦形剤、又はこれらの物質の混合物を含有し得る。スプレーは、クロロフルオロ炭化水素などの通常の噴射剤、及びブタン及びプロパンなどの揮発性非置換炭化水素を追加で含有することができる。

40

【0207】

経皮パッチは、本開示の化合物（例えば、s i N A分子）の身体への制御送達を提供する追加の利点を有する。かかる剤形は、化合物（例えば、s i N A分子）を適切な培地中に溶解又は分散させることによって作製することができる。吸収促進剤もまた、皮膚を通る化合物（例えば、s i N A分子）の流束を増加させるために使用され得る。かかる流束の速度は、速度を制御する膜を提供するか、又はポリマーマトリックス若しくはゲル中に化合物（例えば、s i N A分子）を分散させるかのいずれかによって制御することができる。

【0208】

50

眼用製剤、眼用軟膏、粉末、溶液などもまた、本開示の範囲内であると企図される。

【0209】

非経口投与に好適な本開示の医薬組成物は、1つ以上の薬学的に許容される滅菌等張水溶液若しくは非水溶液、分散液、懸濁液若しくはエマルション、又は使用直前に滅菌注射用溶液若しくは分散液に再構成され得る滅菌粉末と組み合わせた本開示の1つ以上の化合物（例えば、s i N A分子）を含み、糖、アルコール、抗酸化剤、緩衝液、静菌剤、製剤を意図されるレシピエントの血液と等張性にする溶質、又は懸濁剤若しくは増粘剤を含有し得る。

【0210】

本開示の医薬組成物に使用され得る好適な水性及び非水性担体の例としては、水、エタノール、ポリオール（例えば、グリセロール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコールなど）、及びそれらの好適な混合物、オリーブ油などの植物油、及びオレイン酸エチルなどの注射可能な有機エステルが挙げられる。適切な流動性は、例えば、レシチンなどのコーティング材料の使用、分散液の場合は必要な粒子径の維持、及び界面活性剤の使用により維持できる。

【0211】

これらの組成物は、保存剤、湿潤剤、乳化剤、及び分散剤などのアジュバントを含有してもよい。対象化合物に対する微生物の作用の防止は、様々な抗菌剤及び抗真菌剤、例えば、パラベン、クロロブタノール、フェノールソルビン酸などを含むことによって確保し得る。また、糖、塩化ナトリウムなどの等張化剤を組成物に含めることが望ましい場合がある。加えて、モノステアリン酸アルミニウム及びゼラチン等の吸収を遅らせる薬剤を含めることにより、注射可能な薬剤形態の長期吸収がもたらされ得る。

【0212】

場合によっては、薬物の効果を延長するために、皮下注射又は筋肉内注射からの薬物の吸収を遅らせることが望ましい。これは、難水溶性である結晶性又は非晶質の液体懸濁液を使用することにより達成できる。次いで、薬物の吸収速度は、その溶解速度に依存し、次いで、その溶解速度は、結晶サイズ及び結晶形態に依存し得る。代替的に、非経口投与された薬物形態の遅延吸収は、薬物を油性ビヒクルに溶解又は懸濁することにより達成される。

【0213】

注射可能なデポー形態は、ポリラクチド-ポリグリコリドなどの生分解性ポリマー中で対象化合物（例えば、s i N A分子）のマイクロカプセルマトリックスを形成することによって作製される。ポリマーに対する薬物の比率、及び用いられる特定のポリマーの性質に応じて、薬物放出の速度は制御され得る。他の生分解性ポリマーの例には、ポリ（オルトエステル）及びポリ（無水物）が含まれる。注射可能なデポー形態も、薬物を、体組織と適合性のあるリポソーム又はマイクロエマルションに封入することによって調製される。

【0214】

本開示の化合物（例えば、s i N A分子）が、医薬品としてヒト及び動物に投与される場合、本開示の化合物は、それ自体で、又は例えば0.1～99%（より好ましくは、10～30%）の活性成分を薬学的に許容される担体と組み合わせて含有する医薬組成物として与えることができる。

【0215】

治療及び投与

本開示のs i N A分子は、疾患の治療を必要とする対象においてそれを行うために使用されてもよい。いくつかの実施形態では、疾患の治療を必要とする対象においてそれを行う方法は、本明細書に開示されるs i N A分子のいずれかを対象に投与することを含む。いくつかの実施形態では、疾患の治療を必要とする対象においてそれを行う方法は、本明細書に開示される組成物のいずれかを対象に投与することを含む。

【0216】

本開示の調製物（例えば、s i N A分子又は組成物）は、経口的、非経口的、局所的、又は直腸的に与えられ得る。これらはもちろん、各投与経路に好適な形態で与えられる。例えば、これらは、錠剤又はカプセル形態で投与され、注射、注入又は吸入による投与、ローション又は軟膏による局所投与、及び坐剤による直腸投与である。経口投与が好ましい。

【0217】

本明細書で使用される場合、「非経口投与」及び「非経口的に投与される」という語句は、通常、注射による、経腸及び局所投与以外の投与様式を意味し、静脈内、筋肉内、動脈内、くも膜下腔内、被膜内、眼窩内、心臓内、皮内、腹腔内、経気管、皮下、表皮下、関節内、被膜下、くも膜下、脊髄内及び胸腔内注射及び注入を含むが、これらに限定されない。

10

【0218】

本明細書で使用される場合、「全身投与」、「全身的に投与される」、「末梢投与」、及び「末梢的に投与される」という語句は、中枢神経系への直接投与以外の化合物、薬物、又は他の物質の投与であって、その結果、それは患者のシステムに入り、したがって、代謝及び他の同様のプロセス、例えば、皮下投与を受ける、投与を意味する。

【0219】

これらの化合物は、経口的、経鼻的を含む、例えば、スプレー、直腸、腔内、非経口、大槽内、及び局所、例えば、粉末、軟膏又は滴下による、口腔及び舌下を含む、任意の好適な投与経路によって治療のためにヒト及び他の動物に投与され得る。

20

【0220】

選択される投与経路に関係なく、好適な水和形態で使用され得る本開示の化合物（例えば、s i N A分子）及び／又は本開示の医薬組成物は、当業者に既知の従来の方法によって薬学的に許容される剤形に製剤化される。

【0221】

本開示の医薬組成物中の活性成分の実際の投与量レベルは、患者に対して毒性であることなく、特定の患者、組成物、及び投与様式に対して所望の治療応答を達成するのに有効な活性成分の量を得るように変化させてよい。

【0222】

選択された投薬量レベルは、使用される本開示の特定の化合物（例えば、s i N A分子）、又はそのエステル、塩若しくはアミドの活性、投与経路、投与時間、使用される特定の化合物の排泄若しくは代謝速度、吸収速度及び程度、治療期間、使用される特定の化合物と組み合わせて使用される他の薬物、化合物及び／又は材料、治療される患者の年齢、性別、体重、状態、全身の健康及び既往歴、並びに医学分野において周知の同様の因子を含む、様々な因子に依存する。

30

【0223】

当該技術分野で通常の技能を有する医師又は獣医は、必要な薬学的組成物の有効量を、容易に決定及び処方することができる。例えば、医師又は獣医師は、所望の治療効果を達成し、所望の効果が達成されるまで徐々に投与量を増加させるために、医薬組成物に用いられる本開示の化合物（例えば、s i N A分子）の用量を、必要とされるレベルよりも低いレベルで開始することができる。

40

【0224】

一般に、本開示の化合物（例えば、s i N A分子）の好適な1日用量は、治療効果をもたらすのに有効な最低用量の化合物の量である。そのような有効用量は、概して、上述の因子に依存する。好ましくは、化合物は、約0.01mg/kg～約200mg/kg、より好ましくは約0.1mg/kg～約100mg/kg、更により好ましくは約0.5mg/kg～約50mg/kgで投与される。いくつかの実施形態では、本発明の化合物は、0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.16、0.17、0.18、0.19、0.20、0.21、0.22、0.23、0.2

50

4、0.25、0.26、0.27、0.28、0.29、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、又は1mg/kg以上の用量で投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、200、190、180、170、160、150、140、130、120、110、100、95、90、85、80、75、70、65、60、55、50、45、40、35、30、25、20、又は15mg/kg以下の用量で投与される。いくつかの実施形態では、化合物の1日の総用量は、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、130、135、140、145、150、155、160、165、170、175、180、185、190、195、又は100mg以上である。

10

【0225】

本明細書に記載の化合物（例えば、s i N A分子）が、別のものとともに同時投与される場合、有効量は、その化合物を単独で使用する場合よりも少ない場合がある。

【0226】

所望であれば、活性化合物（例えば、s i N A分子）の有効な1日用量は、1日を通して適切な間隔で、任意選択で、単位剤形で別々に投与される、2、3、4、5、6個、又はそれより多いサブ用量として投与されてもよい。好ましい投薬は、1日1回投与である。いくつかの実施形態では、化合物は、1週間に少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、又は21回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、1ヶ月に少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、又は21回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、又は21日に1回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、1、2、3、4、5、6、7、又は8週間に1回投与される。

20

【0227】

疾患

本明細書に記載のs i N A分子及び組成物は、疾患を治療するために対象に投与されてもよい。本明細書に更に開示されるのは、疾患を治療するための医薬の製造における、本明細書に開示されるs i N A分子又は組成物のいずれかの使用である。

30

【0228】

いくつかの実施形態では、疾患は、ウイルス性疾患である。いくつかの実施形態では、ウイルス性疾患は、DNAウイルスによって引き起こされる。いくつかの実施形態では、DNAウイルスは、二本鎖DNA（dsDNA）ウイルスである。いくつかの実施形態では、dsDNAウイルスは、ヘパドナウイルスである。いくつかの実施形態では、ヘパドナウイルスは、B型肝炎ウイルス（HBV）である。

【0229】

いくつかの実施形態では、疾患は、肝臓疾患である。いくつかの実施形態では、肝臓疾患は、非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）である。いくつかの実施形態では、NAFLDは、非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）である。いくつかの実施形態では、肝臓疾患は、肝細胞がん腫（HCC）である。

40

【0230】

本開示のs i N A分子は、疾患の治療又は予防を必要とする対象においてそれを行うために使用されてもよい。いくつかの実施形態では、疾患の治療又は予防を必要とする対象においてそれを行う方法は、本明細書に開示されるs i N A分子のいずれかを対象に投与することを含む。いくつかの実施形態では、疾患の治療又は予防を必要とする対象においてそれを行う方法は、本明細書に開示される組成物のいずれかを対象に投与することを含む。

【0231】

50

本開示の方法及び使用のいくつかの実施形態では、疾患は、呼吸器疾患である。いくつかの実施形態では、呼吸器疾患は、ウイルス感染症である。いくつかの実施形態では、呼吸器疾患は、ウイルス性肺炎である。いくつかの実施形態では、呼吸器疾患は、急性呼吸器感染症である。いくつかの実施形態では、呼吸器疾患は、風邪である。いくつかの実施形態では、呼吸器疾患は、重症急性呼吸器症候群（SARS）である。いくつかの実施形態では、呼吸器疾患は、中東呼吸器症候群（MERS）である。いくつかの実施形態では、疾患は、コロナウイルス疾患2019（例えば、COVID-19）である。いくつかの実施形態では、呼吸器疾患は、咳、のどの痛み、鼻水、くしゃみ、頭痛、発熱、息切れ、筋肉痛、腹痛、疲労、呼吸困難、持続的な胸痛又は圧迫、覚醒困難、嗅覚及び味覚の喪失、筋肉又は関節痛、悪寒、吐き気又は嘔吐、鼻づまり、下痢、喀血、結膜うっ血、痰の生成、胸部圧迫、及び動悸から選択される1つ以上の症状を含むことができる。いくつかの実施形態では、呼吸器疾患は、洞炎、中耳炎、肺炎、急性呼吸窮迫症候群、播種性血管内凝固、心膜炎、及び腎不全から選択される合併症を含むことができる。いくつかの実施形態では、呼吸器疾患は、特発性である。

10

【0232】

いくつかの実施形態では、本開示は、治療有効量の本明細書に開示されるs i N A又は医薬組成物のうちの1つ以上を、それを必要とする対象に投与することを含む、コロナウイルス感染の治療又は予防方法を提供する。いくつかの実施形態において、コロナウイルス感染症は、中東呼吸器症候群（MERS）、重症急性呼吸器症候群（SARS）、及びCOVID-19からなる群から選択される。いくつかの実施形態では、対象は、1つ以上の追加のコロナウイルス治療薬剤で治療されている。いくつかの実施形態では、対象は、1つ以上の追加のコロナウイルス治療薬剤で同時に治療されている。

20

【0233】

s i N Aの投与

本明細書に開示されるs i N Aのいずれかの投与は、当該技術分野で既知の方法によって行われてもよい。いくつかの実施形態では、s i N Aは、皮下（SC）又は静脈内（IV）送達によって投与される。本開示の調製物（例えば、s i N A又は組成物）は、経口的、非経口的、局所的、又は直腸的に与えられ得る。これらはもちろん、各投与経路に好適な形態で与えられる。例えば、これらは、錠剤又はカプセル形態で投与され、注射、注入又は吸入による投与、ローション又は軟膏による局所投与、及び坐剤による直腸投与である。いくつかの実施形態では、皮下投与が好ましい。

30

【0234】

本明細書で使用される場合、「非経口投与」及び「非経口的に投与される」という語句は、通常、注射による、経腸及び局所投与以外の投与様式を意味し、静脈内、筋肉内、動脈内、くも膜下腔内、被膜内、眼窩内、心臓内、皮内、腹腔内、経気管、皮下、表皮下、関節内、被膜下、くも膜下、脊髄内及び胸腔内注射及び注入を含むが、これらに限定されない。

【0235】

本明細書で使用される場合、「全身投与」、「全身的に投与される」、「末梢投与」、及び「末梢的に投与される」という語句は、中枢神経系への直接投与以外の化合物、薬物、又は他の物質の投与であって、その結果、それは患者のシステムに入り、したがって、代謝及び他の同様のプロセス、例えば、皮下投与を受ける、投与を意味する。

40

【0236】

これらの化合物は、経口的、経鼻的を含む、例えば、スプレー、直腸、腔内、非経口、大槽内、及び局所、例えば、粉末、軟膏又は滴下による、口腔及び舌下を含む、任意の好適な投与経路によって治療のためにヒト及び他の動物に投与され得る。

【0237】

選択される投与経路に関係なく、好適な水和形態で使用され得る本開示の化合物（例えば、s i N A）及び／又は本開示の医薬組成物は、当業者に既知の従来の方法によって薬学的に許容される剤形に製剤化される。

50

【0238】

本開示の医薬組成物中の活性成分の実際の投与量レベルは、患者に対して毒性であることなく、特定の患者、組成物、及び投与様式に対して所望の治療応答を達成するのに有効な活性成分の量を得るように変化させてよい。

【0239】

選択された投薬量レベルは、使用される本開示の特定の化合物（例えば、s i N A）、又はそのエステル、塩若しくはアミドの活性、投与経路、投与時間、使用される特定の化合物の排泄若しくは代謝速度、吸収速度及び程度、治療期間、使用される特定の化合物と組み合わせて使用される他の薬物、化合物及び／又は材料、治療される患者の年齢、性別、体重、状態、全身の健康及び既往歴、並びに医学分野において周知の同様の因子を含む、様々な因子に依存する。

10

【0240】

当該技術分野で通常の技能を有する医師又は獣医は、必要な薬学的組成物の有効量を、容易に決定及び処方することができる。例えば、医師又は獣医師は、所望の治療効果を達成し、所望の効果が達成されるまで徐々に投薬量を増加させるために、医薬組成物に用いられる本開示の化合物（例えば、s i N A）の用量を、必要とされるレベルよりも低いレベルで開始することができる。

【0241】

一般に、本開示の化合物（例えば、s i N A）の好適な1日用量は、治療効果をもたらすのに有効な最低用量の化合物の量である。そのような有効用量は、概して、上述の因子に依存する。好ましくは、化合物は、約0.01mg/kg～約200mg/kg、より好ましくは約0.1mg/kg～約100mg/kg、更により好ましくは約0.5mg/kg～約50mg/kgで投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、約1mg/kg～約40mg/kg、約1mg/kg～約30mg/kg、約1mg/kg～約20mg/kg、約1mg/kg～約15mg/kg、又は1mg/kg～約10mg/kgで投与される。いくつかの実施形態では、本発明の化合物は、0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.16、0.17、0.18、0.19、0.20、0.21、0.22、0.23、0.24、0.25、0.26、0.27、0.28、0.29、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、又は1mg/kg以上の用量で投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、又は30mg/kg以上の用量で投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、200、190、180、170、160、150、140、130、120、110、100、95、90、85、80、75、70、65、60、55、50、45、40、35、30、25、20、又は15mg/kg以下の用量で投与される。いくつかの実施形態では、化合物の1日の総用量は、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、130、135、140、145、150、155、160、165、170、175、180、185、190、195、又は100mg以上である。

20

30

40

【0242】

所望であれば、活性化合物（例えば、s i N A）の有効な1日用量は、1日を通して適切な間隔で、任意選択で、単位剤形で別々に投与される、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、又はそれより多い用量又はサブ用量として投与されてもよい。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、又は15回投与される。好ましい投薬は、1日1回投与である。いくつかの実施形態では、化合物は、1週間に少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、又は21回

50

投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、1ヶ月に少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、又は21回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、又は21日に1回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、3日ごとに投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、又は15週間に1回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、毎月投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、又は15ヶ月に1回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、又は53回、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70日間にわたって投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、又は53回、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、又は53週間にわたって投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、又は53ヶ月の期間にわたって投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、又は53回の期間にわたって、1週間に少なくとも1回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、又は70ヶ月の期間にわたって、1週間に少なくとも1回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、1

10

20

30

40

50

4、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、又は70週間の期間にわたって、1週間に少なくとも2回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、又は70ヶ月の期間にわたって、1週間に少なくとも2回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、又は70週間の期間にわたって、2週間に少なくとも1回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、又は70ヶ月の期間にわたって、2週間に少なくとも1回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、又は70週間の期間にわたって、4週間に1回投与される。いくつかの実施形態では、化合物は、少なくとも4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、又は70ヶ月の期間にわたって、4週間に少なくとも1回投与される。

10

20

30

40

50

【0243】

いくつかの実施形態では、本明細書に開示される s i N A 又は組成物のいずれか1つは、粒子又はウイルスベクターで投与される。いくつかの実施形態では、ウイルスベクターは、アデノウイルス、アデノ随伴ウイルス (A A V)、アルファウイルス、フラビウイルス、単純ヘルペスウイルス、レンチウイルス、麻疹ウイルス、ピコルナウイルス、ポックスウイルス、レトロウイルス、又はラブドウイルスのベクターである。いくつかの実施形態では、ウイルスベクターは、組換えウイルスベクターである。いくつかの実施形態では、ウイルスベクターは、A A V r h . 7 4、A A V r h . 1 0、A A V r h . 2 0、A A V - 1、A A V - 2、A A V - 3、A A V - 4、A A V - 5、A A V - 6、A A V - 7、A A V - 8、A A V - 9、A A V - 1 0、A A V - 1 1、A A V - 1 2、及び A A V - 1 3 から選択される。

【0244】

記載される方法の対象は、哺乳動物であってもよく、ヒト及び非ヒト哺乳動物を含む。いくつかの実施形態では、対象は、成体ヒトなどのヒトである。

【0245】

いくつかの実施形態は、ウイルスに感染した対象におけるHBVウイルスを治療するための方法であって、治療有効量の本開示の1つ以上の本開示のs i N A又は本開示の組成物を、それを必要とする対象に投与し、それにより、対象におけるウイルスのウイルス負荷を低減すること、及び／又は対象におけるウイルス抗原のレベルを低減することを含む、方法を含む。s i N Aは、ウイルスにおける標的RNAの一部、例えば、HBVのX領域及び／又はS領域に相補的であってもよく、又はハイブリダイズしてもよい。

【0246】

併用療法

本明細書に開示される方法のいずれかは、対象に追加のHBV治療薬剤を投与することを更に含み得る。本明細書に開示される組成物のいずれかは、追加のHBV治療薬剤を更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、追加のHBV治療薬剤は、ヌクレオチド類似体、ヌクレオシド類似体、カプシドアセンブリモジュレーター（CAM）、組換えインターフェロン、侵入阻害剤、小分子免疫モジュレーター、及びオリゴヌクレオチド療法から選択される。いくつかの実施形態では、追加のHBV治療薬剤は、HBV STOP S（商標）ALG-010133、HBV CAM ALG-000184、ASO1（配列番号61）、ASO2（配列番号62）組換えインターフェロンアルファ2b、IFN-a、PEG-IFN-a-2a、ラミブジン、テルビブジン、アデホビルジピボキシル、クレブジン、エンテカビル、テノホビルアラフェナミド、テノホビルジソプロキシル、NVR3-778、BAY41-4109、JNJ-632、JNJ-3989（ARO-HBV）、RG6004、GSK3228836、REP-2139、REP-2165、AB-729、VIR-2218、RG6346（DCR-HBVS）、JNJ-6379、GLS4、ABI-HO731、JNJ-440、NZ-4、RG7907、EDP-514、AB-423、AB-506、ABI-HO3733、及びABI-H2158から選択される。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチド療法は、核酸ポリマー又はS-抗原輸送阻害オリゴヌクレオチドポリマー（NAP又はSTOPS）、s i RNA、及びASOから選択される。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチド療法は、追加のs i N Aである。いくつかの実施形態では、追加のs i N Aは、ds-s i N A-001~ds-s i N A-025のうちのいずれかから選択される。いくつかの実施形態では、オリゴヌクレオチド療法は、アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）である。いくつかの実施形態では、ASOは、ASO1（配列番号61）又はASO2（配列番号62）である。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるs i N Aのいずれかは、STOPSと同時投与される。例示的なSTOPSは、国際公開第2020/097342号及び米国公開第2020/0147124号に記載されており、これらは両方とも、参照によりそれらの全体が組み込まれる。いくつかの実施形態では、STOPSは、ALG-010133である。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるs i N Aのいずれかは、テノフォビルと同時投与される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示されるs i N Aのいずれかは、CAMと同時投与される。例示的なCAMについては、Berke et al., Antimicrob Agents Chemothe r, 2017, 61 (8): e00560-17, Klumpp, et al., Gas troenterology, 2018, 154 (3): 652-662. e8、国際出願第PCT/US2020/017974号、同第PCT/US2020/026116号、及び同第PCT/US2020/028349号、並びに米国出願第16/789, 298号、同第16/837, 515号、及び同第16/849, 851号を参照されたい。いくつかの実施形態では、CAMは、ALG-000184、ALG-001075、ALG-001024、JNJ-632、BAY41-4109、又はNVR3-778である。いくつかの実施形態では、s i N A及びHBV治療薬剤は、同時に投与される。いくつかの実施形態では、s i N A及びHBV治療薬剤は、同時に投与される。いくつかの実施形態では、s i N A及びHBV治療薬剤は、順次投与される。いくつかの実施形態では、s i N Aは、HBV治療薬剤を投与する前に投与される。いくつかの実施形態で

10

20

30

40

50

は、s i N Aは、H B V治療薬剤を投与した後に投与される。いくつかの実施形態では、s i N A及びH B V治療薬剤は、別々の容器の中にある。いくつかの実施形態では、s i N A及びH B V治療薬剤は、同じ容器の中にある。

【0247】

本明細書に開示される方法のいずれかは、肝臓疾患治療薬剤を対象に投与することを更に含んでいてもよい。本明細書に開示される組成物のいずれかは、肝臓疾患治療薬剤を更に含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、肝臓疾患治療薬剤は、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体（P P A R）アゴニスト、ファルネソイドX受容体（F X R）アゴニスト、脂質改変剤、及びインクレチン系療法から選択される。いくつかの実施形態では、P P A Rアゴニストは、P P A R α アゴニスト、デュアルP P A R α ／ δ アゴニスト、P P A R γ アゴニスト、及びデュアルP P A R α ／ γ アゴニストから選択される。いくつかの実施形態では、デュアルP P A R α アゴニストは、フィブラートである。いくつかの実施形態では、P P A R α ／ δ アゴニストは、エラフィブラノールである。いくつかの実施形態では、P P A R γ アゴニストは、チアゾリジンジオン（T Z D）である。いくつかの実施形態では、T Z Dは、ピオグリタゾンである。いくつかの実施形態では、デュアルP P A R α ／ γ アゴニストは、サログリタザールである。いくつかの実施形態では、F X Rアゴニストは、オベチコールアシス（O C A）である。いくつかの実施形態では、脂質改変剤は、アラムコールである。いくつかの実施形態では、インクレチン系療法は、グルカゴン様ペプチド1（G L P－1）受容体アゴニスト又はジペプチジルペプチダーゼ4（D P P－4）阻害剤である。いくつかの実施形態では、G L P－1受容体アゴニストは、エキセナチド又はリラグルチドである。いくつかの実施形態では、D P P－4阻害剤は、シタグリブチン又はビルダプリブチンである。いくつかの実施形態では、s i N A及び肝臓疾患治療薬剤は、同時に投与される。いくつかの実施形態では、s i N A及び肝臓疾患治療薬剤は、順次投与される。いくつかの実施形態では、s i N Aは、肝臓疾患治療薬剤を投与する前に投与される。いくつかの実施形態では、s i N Aは、肝臓疾患治療薬剤を投与した後に投与される。いくつかの実施形態では、s i N A及び肝臓疾患治療薬剤は、別々の容器の中にある。いくつかの実施形態では、s i N A及び肝臓疾患治療薬剤は、同じ容器の中にある。

【0248】

定義

他の定義がない限り、本明細書で使用される全ての技術用語及び科学用語は、本開示が属する技術分野の当業者によって一般的に理解される意味を有する。以下の参考文献は、本発明で使用される用語の多くの一般的な定義を当業者に提供する。S i n g l e t o n et al., Dictionary of Microbiology and Molecular Biology (2nd ed. 1994)、The Cambridge Dictionary of Science and Technology (Walker編集, 1988)、The Glossary of Genetics, 5th Ed., R. Rieger et al., (編集), Springer Verlag (1991)、及びHale & Marham, The Harper Collins Dictionary of Biology (1991)。本明細書で使用される場合、以下の用語は、別段の指定がない限り、以下にそれらに帰属する意味を有する。本明細書で使用される用語は、特定の実施形態を説明することのみを目的とし、本開示を限定することは意図されていない。

【0249】

本明細書で使用される「a」及び「an」という用語は、「1つ以上」を意味し、文脈が不適切でない限り、複数形を含む。

【0250】

本明細書で使用される場合、「患者」及び「対象」という用語は、本開示の方法によって治療される生物を指す。そのような生物は、好ましくは哺乳動物（例えば、海洋生物、類人猿、ウマ、ウシ、ブタ、イヌ、ネコなど）であり、より好ましくはヒトである。

【0251】

本明細書で使用される場合、「有効量」という用語は、有益な結果又は所望の結果をもたらすのに十分な化合物（例えば、本開示の $s i N A$ ）の量を指す。有効量は、1つ以上の投与、適用、又は投薬量で投与することができ、特定の製剤又は投与経路に限定されることは意図されない。

【0252】

本明細書で使用される場合、「治療すること」という用語は、状態、疾患、障害などの改善をもたらす、又はその症状を改善する、任意の効果、例えば、軽減、低減、調節、緩和、又は排除することを含む。

【0253】

本明細書で使用される場合、「緩和する」及び「緩和すること」という用語は、例えば、少なくとも10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、又は95%重症度を低減させることなどの、状態の重症度を低減することを指す。

【0254】

本明細書で使用される場合、「医薬組成物」という用語は、組成物をインビボ又はエクスピボでの診断的用途又は治療的使用に特に好適であるようにする、活性薬剤と、不活性又は活性の担体との組み合わせを指す。

【0255】

本明細書で使用される場合、「薬学的に許容される担体」という用語は、リン酸緩衝生理食塩水、水、エマルション（例えば、油／水又は水／油エマルション）、及び様々な種類の湿潤剤などの標準的な薬学的担体のいずれかを指す。組成物はまた、安定剤及び防腐剤を含み得る。担体、安定剤及びアジュバントの例については、例えば、Martin, Remington's Pharmaceutical Sciences, 15th Ed., Mack Publ. Co., Easton, PA [1975] を参照されたい。

【0256】

本明細書で使用される「約」という用語は、測定可能な値（例えば、体重、時間、及び用量）を指す場合、指定された値の $\pm 10\%$ 、 $\pm 5\%$ 、 $\pm 1\%$ 、又は $\pm 0.1\%$ などの変動を包含することを意味する。

【0257】

本明細書で使用される場合、「核酸塩基」という用語は、ヌクレオシドを形成する窒素含有生物学的化合物を指す。核酸塩基の例としては、チミン、ウラシル、アデニン、シトシン、グアニン、及びそれらの類似体又は誘導体が挙げられるが、これらに限定されない。

【0258】

本明細書全体を通して、組成物が特定の構成要素を有する、含む（including）、又は含む（comprising）と記載される場合、又はプロセス及び方法が特定のステップを有する、含む（including）、又は含む（comprising）と記載される場合、追加的に、列挙される構成要素から本質的になるか、又はそれからなる本開示の組成物が存在し、列挙される処理ステップから本質的になるか、又はそれからなる本開示によるプロセス及び方法が存在することが企図される。

【0259】

一般的事柄として、パーセンテージを特定する組成物は特に指定されない限り重量によるものである。更に、変数が定義を伴わない場合、変数の以前の定義が制御する。

【0260】

本明細書で引用された全ての刊行物及び特許は、各個々の刊行物又は特許が、参照により本明細書に組み込まれることを明確にかつ個別に示されたかのように、参照により本明細書に組み込まれ、引用された刊行物に関連して方法及び／又は物質を開示し、説明するために、参照により本明細書に組み込まれる。任意の刊行物の引用は、出願日以前のその開示のためのものであり、本開示が、先行開示のためにそのような刊行物に先行する権利がないことを認めるものとして解釈されるべきではない。更に、提供される公開日は、独

10

20

30

40

50

立して確認する必要があり得る実際の公開日とは異なり得る。

【実施例】

【0261】





実施例1：s i N A 合成

この実施例は、d s - s i N A、例えば、表1～5に開示されるs i N A (d s - s i N A I Dによって特定されるような)を合成するための例示的な方法を記載する。

【0262】

2'-O-Meホスホラミダイト5'-O-DMT-デオキシアデノシン(NH-Bz)、3'-O-(2-シアノエチル-N, N-ジイソプロピルホスホラミダイト、5'-O-DMT-デオキシグアノシン(NH-i b u)、3'-O-(2-シアノエチル-N, N-ジイソプロピルホスホラミダイト、5'-O-DMT-デオキシシトシン(NH-Bz)、3'-O-(2-シアノエチル-N, N-ジイソプロピルホスホラミダイト、及び固体支持体は、Chemgenes Corp. MAから購入した。



【化88】





【0263】

2'-F-5'-O-DMT-(NH-Bz) アデノシン-3'-O-(2-シアノエチル-N, N-ジイソプロピルホスホラミダイト、2'-F-5'-O-DMT-(NH-i b u)-グアノシン、3'-O-(2-シアノエチル-N, N-ジイソプロピルホスホラミダイト、5'-O-DMT-(NH-Bz)-シトシン、2'-F-3'-O-(2-シアノエチル-N, N-ジイソプロピルホスホラミダイト、5'-O-DMT-ウリジン、2'-F-3'-O-(2-シアノエチル-N, N-ジイソプロピルホスホラミダイト、及び固体支持体は、Milwaukee WI、USAから購入した。

【化 8 9】



10



20

【0264】

全てのモノマーを、乾燥剤（ P_2O_5 、室温で24時間）を用いて真空乾燥器中で乾燥させた。ヌクレオシド及び普遍的な支持体に結合した固体支持体（CPG）は、LGC及びChemgenesから得た。合成後ワークフローのための化学物質及び溶媒を、VWR/Sigmaなどの商業的に入手可能な供給源から購入し、いかなる精製又は処理もせずに使用した。溶媒（アセトニトリル）及び溶液（アミダイト及び活性化剤）を、合成中に分子ふるいにかけて保管した。

30

【0265】

CPG支持体上に予めロードされたオリゴヌクレオチドの3'残基から始まる標準的なオリゴヌクレオチドホスホラミダイト化学を使用して、オリゴヌクレオチドをDNA/RNAシンセサイザー（Expedite 8909又はABI-394又はMM-48）で合成した。5-（エチルチオ）-1H-テトラゾール活性化剤の存在下での CH_3CN 中の0.1Mのホスホラミダイト溶液の固体結合オリゴヌクレオチドへの伸長カップリング、その後の標準的なキャッピング、酸化及び脱保護により、修飾オリゴヌクレオチドを得た。0.1Mの I_2 、THF：ピリジン；水=7：2：1を酸化剤として使用しつつ、DDTT（（ジメチルアミノ）メチリデン）アミノ-3H-1,2,4-ジチアザオリン-3-チオンを、オリゴリボヌクレオチドホスホロチオエートの合成のための硫黄移送剤として使用した。全ての修飾ホスホロアミダイトの段階的カップリング効率は、98%超であった。

40

50

【表 8】

試薬	詳細な説明
デブロック溶液	ジクロロメタン(DCM)中の 3%ジクロロ酢酸(DCA)
アミダイト濃度	無水アセトニトリル中 0.1M
活性化因子	0.25M エチル-チオ-テトラゾール(ETT)
Cap-A 溶液	ピリジン/THF 中の無水酢酸
Cap-B 溶液	THF 中の 16% 1-メチルイミダゾール
酸化溶液	0.02M I ₂ , THF:ピリジン;水-7:2:1
硫化溶液	ピリジン/アセトニトリル 1:1 中の 0.2M DDTT

10

【0266】

切断及び脱保護：

固体支持体からの脱保護及び切断は、ユニバーサルリンカーを使用したとき、脱保護を 65℃で90分間放置したとき、又は固体支持体をアンモニア（28%）水溶液で55℃で8～16時間加熱して、塩基の不安定な保護基を脱保護したときに、アンモニアメチルアミン（1：1、AMA）の混合物で65℃での15分間で達成された。

【0267】

粗 s i N A の定量又は原料分析

試料を脱イオン水（1.0mL）に溶解し、以下のように定量した。ブランキングを最初に、Thermo Scientific（商標）Nanodrop UV分光光度計又はBioTek（商標）Epoch（商標）プレートリーダー上で水単独（2μL）で行った後、260nmでオリゴ試料読み取りを得た。粗物質を乾燥させ、-20℃で保管する。

20

【0268】

粗 H P L C / L C - M S 分析

粗 H P L C 及び L C - M S 分析には、粗試料の 0.1 O D を分析した。粗 L C - M S データを確認した後、必要に応じて純度に基づいて精製ステップを実行した。

30

【0269】

H P L C 精製

非コンジュゲート化 G a l N a c 修飾オリゴヌクレオチドを、アニオン交換 H P L C によって精製した。緩衝液は、10% C H ₃ C N 中の 20mM リン酸ナトリウム、pH 8.5（緩衝液 A）、及び 10% C H ₃ C N 中の 20mM リン酸ナトリウム、1.0M の N a B r、pH 8.5（緩衝液 B）であった。全長オリゴヌクレオチドを含有する画分をプールした。

【0270】

精製 S i N A の脱塩

次いで、精製した乾燥 s i N A を、S e p h a d e x G - 2 5 M（A m e r s h a m B i o s c i e n c e s）を使用して脱塩した。カートリッジを、10mLの脱イオン水で3回調整した。最後に、2.5mLのRNAseを含まない水に完全に溶解した精製 s i N A を、非常にゆっくりと滴下して溶離させつつカートリッジに適用した。塩を含まない s i N A を、3.5mLの脱イオン水でスクリュウキャップバイアルに直接溶離させた。代替的に、いくつかの非コンジュゲート s i N A を、P a l l A c r o P r e p（商標）3 K M W C O 脱塩プレートを使用して脱塩した。

40

【0271】

I E X H P L C 及びエレクトロスプレー L C / M S 分析

およそ 0.1 O D の s i N A を、水に溶解させ、次いで、I E X - H P L C 及び L C / M S 分析のための H P L C オートサンプラーバイアルにピペティングした。分析 H P

50

LC及びESI LC-MSは、化合物の同一性及び純度が確認された。

【0272】


二本鎖の調製：

一本鎖オリゴヌクレオチド（センス鎖及びアンチセンス鎖）をアニーリングし（モル当量により1：1、90℃で2分間、続いて室温で徐々に冷却）、二本鎖ds-siNAを得た。最終化合物をサイズ排除クロマトグラフィー（SEC）で分析した。

【0273】

実施例2

【化90】



スキームー1

【0274】

PH-ALIG-14-1-1の調製

アルゴンの不活性雰囲気下でパージし、維持した5000mLの3つ口の丸底フラスコに、ウリジン（150.00g、614.24mmol、1.00当量）、ピリジン（2.2L）、TBDPSCl（177.27g、644.95mmol、1.05当量）を入

れた。得られた溶液を、室温で一晩攪拌した。得られた混合物を濃縮した。得られた溶液を $3 \times 1000 \text{ mL}$ のジクロロメタンで抽出し、有機層を合わせた。得られた混合物を、 $3 \times 1 \text{ L}$ の 0.5 N HCl (水溶液) 及び $2 \times 500 \text{ mL}$ の 0.5 N NaHCO_3 (水溶液) で洗浄した。得られた混合物を、 $2 \times 1 \text{ L}$ の H_2O で洗浄した。混合物を無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を濃縮した。これにより、 262 g (粗製) PH-ALIG-14-1-1 を得た。LC-MS (m/z) $483.00 [\text{M} + \text{H}]^+$; $^1\text{H NMR}$ (400 MHz , $\text{DMSO}-d_6$) δ 11.35 (d, $J = 2.2 \text{ Hz}$, 1 H), 7.70 (d, $J = 8.1 \text{ Hz}$, 1 H), 7.64 (m, 4 H), $7.52 - 7.40$ (m, 6 H), 5.80 (d, $J = 4.1 \text{ Hz}$, 1 H), 5.50 (d, $J = 5.1 \text{ Hz}$, 1 H), 5.28 (dd, $J = 8.0, 2.2 \text{ Hz}$, 1 H), 5.17 (d, $J = 5.3 \text{ Hz}$, 1 H), $4.15 - 4.05$ (m, 2 H), $4.00 - 3.85$ (m, 2 H), $3.85 - 3.73$ (m, 1 H), 1.03 (s, 9 H)。

10

【0275】

PH-ALIG-14-1-2の調製

アルゴンの不活性雰囲気でパージし、維持した 10 L の3つ口丸底フラスコに、 MeOH (5000 mL) 中の PH-ALIG-14-1-1 (260.00 g 、 538.7 mmol 、 1.0 当量) の溶液を入れた。これに続いて、 H_2O (1600 mL) 中の NaIO_4 (126.8 g 、 592.6 mmol 、 1.1 当量) の溶液を、 0°C でいくつかのバッチで添加した。得られた溶液を、室温で1時間攪拌した。次いで、 3 L の $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (飽和) を 0°C で添加することによって反応物をクエンチした。得られた溶液を $3 \times 1 \text{ L}$ のジクロロメタンで抽出し、有機層を合わせて、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を濃縮した。これにより、 290 g (粗製) の PH-ALIG-14-1-2 を白色固体として得た。

20

【0276】

PH-ALIG-14-1-3の調製

アルゴンの不活性雰囲気でパージし、維持した 5 L の3つ口丸底フラスコに、 PH-ALIG-14-1-2 (290 g 、 603.4 mmol 、 1.0 当量)、 EtOH (3 L) を入れた。これに続いて、 NaBH_4 (22.8 g 、 603.4 mmol 、 1.0 当量) を 0°C で部分的に添加した。得られた溶液を室温で1時間攪拌した。次いで、 2000 mL の水/氷の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を $3 \times 1000 \text{ mL}$ のジクロロメタンで抽出し、有機層を合わせて、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を濃縮した。これにより、 230 g (粗製) の PH-ALIG-14-1-3 を白色固体として得た。LC-MS: m/z $485.10 [\text{M} + \text{H}]^+$. $^1\text{H NMR}$ (400 MHz , $\text{DMSO}-d_6$) δ 11.28 (d, $J = 2.2 \text{ Hz}$, 1 H), $7.63 - 7.37$ (m, 11 H), 5.84 (dd, $J = 6.4, 4.9 \text{ Hz}$, 1 H), 5.44 (dd, $J = 8.0, 2.2 \text{ Hz}$, 1 H), 5.11 (t, $J = 6.0 \text{ Hz}$, 1 H), 4.78 (t, $J = 5.2 \text{ Hz}$, 1 H), 3.65 (dd, $J = 11.4, 5.7 \text{ Hz}$, 1 H), $3.60 - 3.52$ (m, 5 H), 3.18 (d, $J = 5.2 \text{ Hz}$, 1 H), 0.96 (s, 9 H)。

30

【0277】

PH-ALIG-14-1-4の調製

アルゴンの不活性雰囲気でパージし、維持した 5000 mL の3つ口丸底フラスコに、 DCM (1200 mL) 中の PH-ALIG-14-1-3 (120 g 、 1 当量) の溶液を入れた。これに続いて、 DIEA (95.03 g 、 3 当量) を 0°C で添加した。これに、メタンスルホン酸無水物 (129 g 、 3 当量) を、 0°C で少しずつ添加した。得られた溶液を、室温で1時間攪拌した。次いで、 1000 mL の水/氷の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を $3 \times 500 \text{ mL}$ のジクロロメタンで抽出し、有機層を合わせて、無水硫酸マグネシウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を濃縮した。これにより、黄色固体として 160 g (粗製) の PH-ALIG-14-1-4 が得られた、LC-MS (m/z) $641.05 [\text{M} + \text{H}]^+$

40

50

【0278】

PH-ALIG-14-1-5の調製

1 Lの丸底フラスコに、THF (1600 mL)、DBU (108 g、2.8当量)中のPH-ALIG-14-1-4 (160.00 g、1.00当量)の溶液を入れた。得られた溶液を、30℃で1時間攪拌した。次いで、3000 mLの水／氷の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を3×500 mLのジクロロメタンで抽出し、有機層を合わせて、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を濃縮した。これにより、150 g (粗製)のPH-ALIG-14-1-5が褐色油として得られた、LC-MS: (ES, m/z): 567.25 [M+H]⁺

¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 7.83 (d, J=7.4 Hz, 1H), 7.67-7.55 (m, 4H), 7.55-7.35 (m, 6H), 6.05 (dd, J=5.9, 1.7 Hz, 1H), 5.72 (d, J=7.4 Hz, 1H), 4.81 (dd, J=10.4, 5.8 Hz, 1H), 4.58-4.46 (m, 2H), 4.42 (p, J=5.2, 4.6 Hz, 1H), 4.33 (dd, J=10.6, 5.9 Hz, 1H), 3.79-3.70 (m, 2H), 3.23 (s, 3H), 0.98 (s, 9H)。

10

【0279】

PH-ALIG-14-1-6の調製

アルゴンの不活性雰囲気でパージし、維持した3000 mLの丸底フラスコに、PH-ALIG-14-1-5 (150.00 g、201.950 mmol、1当量)、DMF (1300.00 mL)、安息香酸カリウム (44.00 g、1.0当量)を入れた。得られた溶液を、80℃で1.5時間攪拌した。次いで、500 mLの水／氷の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を3×500 mLのジクロロメタンで抽出した。得られた混合物を3×1000 mLのH₂Oで洗浄した。得られた混合物を濃縮した。残渣を、EA/PE (99:1)を用いたシリカゲルカラムに適用した。収集した画分を合わせて濃縮した。これにより、40 gのPH-ALIG-14-1-6を黄色の油として得た。LC-MS: m/z 571.20 [M+H]⁺; ¹H NMR: (400 MHz, DMSO-d₆) δ 7.97-7.91 (m, 2H), 7.89 (d, J=7.4 Hz, 1H), 7.74-7.51 (m, 7H), 7.51-7.31 (m, 6H), 6.16 (m, 1H), 5.76 (d, J=7.4 Hz, 1H), 4.78 (m, 1H), 4.61 (m, 1H), 4.55-4.46 (m, 2H), 4.38 (m, 1H), 3.82 (d, J=5.0 Hz, 2H), 0.97 (s, 9H)

20

30

【0280】

PH-ALIG-14-1-7Aの調製

2-Lの丸底フラスコに、PH-ALIG-14-1-6 (30.00 g、1当量)、MeOH (1.20 L)、p-トルエンスルホン酸 (4.50 g、0.5当量)を入れた。得られた溶液を70℃で2時間攪拌した。次いで、3 LのNaHCO₃ (飽和)の添加によって反応物をクエンチした。溶液のpH値を、NaHCO₃ (飽和)で7に調整した。得られた溶液を3×1 Lの酢酸エチルで抽出し、有機層を合わせて、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を真空下で濃縮した。粗生成物を、以下の条件 (IntelFlash-1): カラム、シリカゲル; 移動相、PE/EA=50/50を30以内でPE/EA=25/75まで増加; 検出器、254を用いたフラッシュ分取HPLCによって精製した。これにより、11.5 g (7ステップで3.1%収率)のPH-ALIG-14-1-7Aを白色固体として得た。LC-MS: m/z 625.15 [M+Na]⁺; ¹H NMR: (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.37 (d, J=2.3 Hz, 1H), 7.99-7.93 (m, 2H), 7.74-7.65 (m, 1H), 7.63-7.50 (m, 7H), 7.50-7.33 (m, 6H), 6.08 (t, J=6.0 Hz, 1H), 5.49 (m, 1H), 4.60 (m, 1H), 4.43 (m, 1H), 4.03-3.96 (m, 1H), 3.70 (d, J=5.3 Hz, 2H), 3.62-3.49 (m, 2H), 3.21 (s, 3H), 0.97 (s, 9H)

40

50

。

【0281】

PH-ALIG-14-1-7の調製

2 Lの丸底フラスコに、PH-ALIG-14-1-7 A

(11.50 g)を入れた。MeOH (690.00 mL) 中の上記7 MのNH₃ (g) を30℃で導入した。得られた溶液を30℃で一晩攪拌した。得られた混合物を真空下で濃縮した。粗生成物を、以下の条件 (IntelFlash-1) : カラム、シリカゲル ; 移動相、PE/EA=60/40を60以内でPE/EA=1/99まで増加 ; 検出器、254を用いたフラッシュによって精製した。これにより、8.1 g (収率97%) のPH-ALIG-14-1-7を白色固体として得た。LC-MS : m/z 499.35 [M+H]⁺ ; ¹H NMR : (300 MHz, DMSO-d₆) δ 11.31 (s, 1H), 7.64-7.50 (m, 5H), 7.48-7.35 (m, 6H), 6.02 (t, J=5.8 Hz, 1H), 5.45 (d, J=8.0 Hz, 1H), 4.80 (t, J=5.1 Hz, 1H), 3.58 (m, 7H), 3.27 (s, 3H), 0.96 (s, 9H)。

10

【0282】

PH-ALIG-14-1-8の調製

250 mLの丸底フラスコに、PH-ALIG-14-1-7 (8.10 g、1当量)、ピリジン (80.0 mL)、DMTr-Cl (7.10 g、1.3当量)を入れた。フラスコを真空させ、アルゴンで3回フラッシュした。得られた溶液を、室温で2時間攪拌した。次いで、500 mLのNaHCO₃ (飽和)の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を2×500 mLの酢酸エチルで抽出し、有機層を合わせて、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を真空下で濃縮した。粗生成物を、以下の条件 (IntelFlash-1) : カラム、C18 ; 移動相、ACN/H₂O=5/95を30以内でACN/H₂O=95/5まで増加 ; 検出器、254を用いたフラッシュによって精製した。これにより、11.5 g (収率88%) のPH-ALIG-14-1-8を白色固体として得た。LC-MS : m/z 823.40 [M+Na]⁺ ; ¹H NMR : (300 MHz, DMSO-d₆) δ 11.37 (s, 1H), 7.55-7.18 (m, 20H), 6.92-6.83 (m, 4H), 6.14 (t, J=5.9 Hz, 1H), 5.48 (d, J=8.0 Hz, 1H), 3.74 (m, 7H), 3.57 (m, 4H), 3.25 (m, 5H), 0.84 (s, 9H)。

20

30

【0283】

PH-ALIG-14-1-9の調製

1000 mLの丸底フラスコに、PH-ALIG-14-1-8 (11.5 g、1.00当量)、THF (280.00 mL)、TBAF (14.00 mL、1.00当量)を入れた。得られた溶液を、室温で3時間攪拌した。次いで、1 Lの水の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を3×500 mLの酢酸エチルで抽出し、有機層を合わせて、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を真空下で濃縮した。粗生成物を、以下の条件 (IntelFlash-1) : カラム、C18 ; 移動相、ACN/H₂O=5/95を30以内でACN/H₂O=95/5まで増加 ; 検出器、254を用いたフラッシュによって精製した。これにより、7.8 g (収率98%) のPH-ALIG-14-1-9を白色固体として得た。LC-MS : m/z 561.20 [M-H]⁻ ; ¹H NMR : (300 MHz, DMSO-d₆) δ 11.32 (s, 1H), 7.66 (d, J=8.1 Hz, 1H), 7.52-7.39 (m, 2H), 7.39-7.20 (m, 7H), 6.96-6.83 (m, 4H), 6.17 (t, J=5.9 Hz, 1H), 5.63 (d, J=8.0 Hz, 1H), 4.63 (t, J=5.6 Hz, 1H), 3.90-3.46 (m, 9H), 3.26 (s, 5H), 3.19-2.98 (m, 2H)。

40

【0284】

PH-ALIG-14-1-10の調製

50

3-Lの丸底フラスコに、PH-ALIG-14-1-9 (7.80 g、1.00当量)、DCM (300.00 mL)、NaHCO₃ (3.50 g、3当量)を入れた。これに続いて、0℃で攪拌しながら Dess-Martin (7.06 g、1.2当量)を添加し、得られた溶液を0℃で20分間攪拌した。得られた溶液を、室温で5時間攪拌した。反応混合物を、水/氷浴で0℃まで冷却した。次いで、500 mLのNaHCO₃:Na₂S₂O₃=1:1の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を3×500 mLの酢酸エチルで抽出し、有機層を合わせて、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を真空下で濃縮した。粗生成物を、以下の条件(IntelFlash-1):カラム、C18;移動相、ACN/H₂O=5/95を30以内でACN/H₂O=95/5まで増加;検出器、254を用いたフラッシュによって精製した。これにより、5.8 g (収率75%)のPH-ALIG-14-1-1-110を白色固体として得た。LC-MS:m/z 558.80 [M-H]⁻; ¹H NMR:(300 MHz, DMSO-d₆) δ 11.35-11.22 (m, 1H), 9.43 (s, 1H), 7.75 (d, J=8.1 Hz, 1H), 7.49-7.19 (m, 8H), 6.90 (m, 5H), 6.00 (t, J=5.9 Hz, 1H), 5.66 (m, 1H), 4.40 (m, 1H), 3.75 (s, 7H), 3.70-3.56 (m, 3H), 3.29 (d, J=3.7 Hz, 3H)。

10

【0285】

PH-ALIG-14-1-11の調製

250 mLの3つ口丸底フラスコに、THF (150.00 mL)、NaH (1.07 g、60%w、3.00当量)を入れた。フラスコを真空させ、アルゴンで3回フラッシュし、反応混合物を-78℃まで冷却した。これに続いて、[[(ビス[[(2,2-ジメチルプロパノイル) オキシ] メトキシ] ホスホリル) メチル ([(2,2-ジメチルプロパノイル) オキシ] メトキシ) ホスホリル) オキシ] メチル 2,2-ジメチルプロパノエート (60 mL THF中、14.60 g、2.6当量)を、-78℃で10分で攪拌しながら滴下し、得られた溶液を-78℃で30分間攪拌した。これに続いて、-78℃で10分で攪拌しながら、PH-ALIG-14-1-10 (50 mLのTHF中、5.00 g、1.00当量)を滴下した。得られた溶液を、室温で4時間攪拌した。次いで、400 mLのNH₄Cl (飽和)の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を3×400 mLの酢酸エチルで抽出し、有機層を合わせ、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を真空下で濃縮した。粗生成物を、以下の条件(IntelFlash-1):カラム、C18;移動相、ACN/H₂O=5/95を30以内でACN/H₂O=95/5まで増加;検出器、254を用いたフラッシュによって精製した。これにより、7.2 g (粗製)のPH-ALIG-14-1-11a固体が得られた。LC-MS:m/z:865.10 [M-H]⁻

20

30

【0286】

PH-ALIG-14-1-12の調製

500 mLの丸底フラスコに、PH-ALIG-14-1-1-11を入れた。(6.00 g)、H₂O (30.00 mL)、AcOH (120.00 mL)。得られた溶液を50℃で1時間攪拌した。反応混合物を水/氷浴で0℃まで冷却した。次いで、2 LのNaHCO₃ (飽和)の添加によって反応物をクエンチした。溶液のpH値を、NaHCO₃ (飽和)で7に調整した。得られた溶液を3×500 mLの酢酸エチルで抽出し、有機層を合わせて、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を真空下で濃縮した。粗生成物を、以下の条件(IntelFlash-1):カラム、C18;移動相、ACN/H₂O=5/95を30以内でACN/H₂O=95/5まで増加;検出器、254を用いたフラッシュによって精製した。これにより、2.6 g (2ステップで44%)のPH-ALIG-14-1-12を黄色の油として得た。LC-MS:m/z 587.25 [M+Na]⁺; ¹H NMR:(300 MHz, DMSO-d₆) δ 11.31 (s, 1H), 7.73 (d, J=8.1 Hz, 1H), 6.63 (ddd, J=24.2, 17.2, 4.2 Hz, 1H), 6.14-5.96 (m, 2H), 5.

40

50

6.5 – 5.48 (m, 5H), 5.09 (t, $J = 5.6$ Hz, 1H), 4.17 (s, 1H), 3.65 (d, $J = 6.1$ Hz, 2H), 3.52 (m, 2H), 3.27 (s, 3H), 1.15 (d, $J = 3.7$ Hz, 18H); ^{31}P NMR – : (162 MHz, DMSO- d_6) δ 17.96.

【0287】

PH-ALIG-14-1-0の調製

250 mLの3つ口丸底フラスコに、DCM (60.00 mL)、DCI (351.00 mg、1.2当量)、3-[[ビス(ジイソプロピルアミノ)ホスファニル]オキシ]プロパンニトリル (971.00 mg、1.3当量)、4A MSを入れた。フラスコを真空させ、アルゴンで3回フラッシュし、反応混合物を0℃まで冷却した。これに続いて、PH-ALIG-14-1-12 (30 mLのDCM中、1.40 g、1.00当量)を、30秒以内に0℃で攪拌しながら滴下した。得られた溶液を、室温で1時間攪拌した。次いで、50 mLの水の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を3×50 mLの酢酸エチルで抽出し、有機層を合わせた。得られた混合物を3×50 mLのNaCl (飽和)で洗浄した。混合物を無水硫酸マグネシウムで乾燥させた。固形分を濾別した。濾液を真空下で濃縮した。粗生成物を、以下の条件：カラム：Ultimate Diol、2×25 cm、5

10

【化91】

|

20

Im、移動相A：CO₂、移動相B：ACN (0.2% TEA)、流速：50 mL / 分、勾配：イソクラティック30% B、カラム温度 (20℃)：35、背圧 (バル)：100、波長：254 nm、保持時間1 (分)：2.58、試料溶媒：MeOH – HPLC、注入体積：1 mL、実行数：4回を用いたPrep-Archiral-SFCによって精製した。これにより、1.31 g (収率65%)のPH-ALIG-14-1-0を黄色の油として得た。LC-MS：m/z 763.40 [M-H]⁻; ^1H NMR – : (300 MHz, アセトニトリル- d_3) δ 9.05 (s, 1H), 7.51 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 6.64 (dddd, $J = 23.8, 17.1, 4.8, 1.9$ Hz, 1H), 6.23 – 5.92 (m, 2H), 5.70 – 5.51 (m, 5H), 4.38 (d, $J = 4.9$ Hz, 1H), 3.96 – 3.56 (m, 8H), 3.35 (s, 3H), 2.70 (m, 2H), 1.33 – 1.14 (m, 30H); ^{31}P NMR – : (アセトニトリル- d_3) δ 148.75, 148.53, 16.68.

30


【0288】

実施例3

40

50

【化 9 2】



スキームー 2

【0289】

PH-ALIG-14-1-7Bの調製

MeOH (1000 mL) 中の PH-ALIG-14-1-6 (23 g、40.300 mmol、1.00 当量) 及び p-TsOH (9.02 g、52.390 mmol、1.3 当量) の溶液を、アルゴン雰囲気下、40℃で一晩攪拌した。反応物を、飽和重炭酸ナトリウム (水溶液) で 0℃でクエンチした。得られた混合物を、EtOAc (2×500 mL) で抽出した。合わせた有機層を水 (2×500 mL) で洗浄し、無水 MgSO₄ で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、以下の条件：カラム、C18シリカゲル、移動相、水中の ACN、30分間で 10%～90%の勾配、検出器、UV254 nm で逆フラッシュクロマトグラフィーによって精製した。これにより、PH-ALIG-14-1-7B (5.3 g、36.%) を無色の油として得た。LC-MS: (ES, m/z): 365 [M+H]⁺; ¹H-NMR: (300 MHz, DMSO-d₆) δ 11.20 (s, 1H), 8.09–7.78 (m, 2H), 7.63–7.50 (m, 2H), 7.51–7.35 (m, 2H), 5.95 (t, J=5.9 Hz, 1H), 5.51 (d, J=8.1 Hz, 1H), 4.73 (t, J=5.7 Hz, 1H), 4.41 (dd, J=11.9, 3.3 Hz, 1H), 4.17 (dd, J=11.9, 6.3 Hz, 1H), 3.69 (dq, J=10.1, 6.8, 6.3 Hz, 1H), 3.48–3.40 (m, 2H), 3.39–3.29 (m, 2H), 3.07 (s, 3H)。

【0290】

PH-ALIG-14-3-1の調製

250 mL の 3 つ口丸底フラスコに、PH-ALIG-14-1-7B (7.00 g、19.212 mmol、1.00 当量)、ACN (60.00 mL)、H₂O (60.00 mL)、TEMPO (0.72 g、4.611 mmol、0.24 当量)、BAIB (13.61 g、42.267 mmol、2.20 当量) を入れた。得られた溶液を、30℃で一晩攪拌した。次いで、200 mL の水／氷の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を 2×200 mL の酢酸エチルで抽出し、得られた混合物を 2×200 mL の水で洗浄した。混合物を無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、濃縮した。粗生成物を、以下の条件 (IntelFlash-1): カラム、C18シリカゲル; 移動相、ACN/H

$2\text{O} = 5 / 95$ を 30 分以内で $\text{ACN} / \text{H}_2\text{O} = 95 / 5$ まで増加；検出器、 $\text{UV} 254\text{nm}$ を用いたフラッシュ分取 HPLC によって精製し、生成物を得た。これにより、 5g (68.8%) の PH-ALIG-14-3-1 を固体として得た。LC-MS: (ES, m/z): $379 [\text{M} + \text{H}]^+$; ^1H NMR (300MHz , $\text{DMSO}-d_6$) δ 13.24 (s, 1H), 11.31 (d, $J = 2.2\text{Hz}$, 1H), $8.18 - 7.83$ (m, 2H), $7.81 - 7.63$ (m, 2H), $7.61 - 7.42$ (m, 2H), 6.01 (t, $J = 6.0\text{Hz}$, 1H), 5.61 (dd, $J = 8.0, 2.2\text{Hz}$, 1H), $4.72 - 4.40$ (m, 3H), $3.73 - 3.55$ (m, 2H), 3.22 (s, 3H)。

【0291】

PH-ALIG-14-3-2 の調製

250mL の丸底フラスコに、 PH-ALIG-14-3-1 (4.5g 、 11.89mmol 、 1.00 当量)、 DMF (90.00mL)、 Pb(OAc)_4 (15.82g 、 35.679mmol 、 3.00 当量) を入れた。得られた溶液を、 30°C で一晩攪拌した。次いで、 200mL の水／氷の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を $2 \times 200\text{mL}$ の酢酸エチルで抽出し、得られた混合物を $2 \times 200\text{mL}$ の水で洗浄した。混合物を無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、濃縮した。粗生成物を、以下の条件 (IntelFlash-1): カラム、 C18 シリカゲル；移動相、 $\text{ACN} / \text{H}_2\text{O} = 5 / 95$ を 30 分以内で $\text{ACN} / \text{H}_2\text{O} = 95 / 5$ まで増加；検出器、 $\text{UV} 254\text{nm}$ を用いたフラッシュによって精製し、生成物を得た。これにより、 4g の PH-ALIG-14-3-2 を油として得た。LC-MS: (ES, m/z): $415 [\text{M} + \text{Na}]^+$; ^1H NMR (300MHz , $\text{DMSO}-d_6$) δ 11.39 (s, 1H), 7.93 (dd, $J = 24.2, 7.6\text{Hz}$, 2H), $7.75 - 7.46$ (m, 4H), $6.35 - 6.03$ (m, 2H), $5.71 - 5.47$ (m, 1H), $4.60 - 4.14$ (m, 2H), $3.88 - 3.54$ (m, 2H), 3.26 (d, $J = 6.7\text{Hz}$, 3H), 2.03 (d, $J = 49.7\text{Hz}$, 3H)。

【0292】

PH-ALIG-14-3-3 の調製

アルゴンの不活性雰囲気中でパージし、維持した 250mL の 3 つ口丸底フラスコに、 PH-ALIG-14-3-2 (4.00g 、 10.195mmol 、 1.00 当量)、 DCM (80.00mL)、ジメチルヒドロキシメチルホスホネート (22.85g 、 163.114mmol 、 16.00 当量)、 $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ (28.94g 、 203.91mmol 、 20 当量) を入れた。得られた溶液を、室温で一晩攪拌した。次いで、 500mL の水／氷の添加によって反応物をクエンチした。得られた溶液を $2 \times 500\text{mL}$ の酢酸エチルで抽出し、得られた混合物を $2 \times 500\text{mL}$ の水で洗浄した。混合物を無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、濃縮した。残渣を、ジクロロメタン／メタノール ($20 / 1$) を用いてシリカゲルカラムに適用した。これにより、 2g (41.5%) の PH-ALIG-14-3-3 を固体として得た。

LC-MS: (ES, m/z): $490 [\text{M} + \text{H}_2\text{O}]^+$; ^1H -NMR (300MHz , $\text{DMSO}-d_6$) δ 11.39 (d, $J = 5.4\text{Hz}$, 1H), 7.96 (dt, $J = 11.5, 9.3\text{Hz}$, 2H), $7.81 - 7.40$ (m, 4H), $6.29 - 5.98$ (m, 1H), 5.56 (dd, $J = 12.2, 8.1\text{Hz}$, 1H), $5.28 - 4.99$ (m, 1H), 4.29 (dp, $J = 25.1, 5.9\text{Hz}$, 2H), $4.16 - 3.84$ (m, 2H), $3.75 - 3.53$ (m, 7H), 3.28 (d, $J = 12.5\text{Hz}$, 2H)。

【0293】

PH-ALIG-14-3-4 の調製

100mL の丸底フラスコに、 PH-ALIG-14-3-3 (2.00g 、 4.234mmol 、 1.00 当量) を入れ、 THF (20.00mL) 中の 7M NH_3 (g) を添加した。得られた溶液を、 25°C で一晩攪拌した。得られた混合物を、真空下で濃縮

10

20

30

40

50

した。粗生成物を、分取－s f cカラム：L u x 5 u m i－セルロース－5、3 * 2 5 c m、5 μ m、移動相A：C O₂、移動相B：M e O H（0.1% 2 M N H₃－M E O H）、流速：7 0 m L / 分、勾配：イソクラティック5 0 % B、カラム温度（2 5 ° C）：3 5、背圧（b a r）：1 0 0、波長：2 2 0 n m、保持時間1（分）：3.7 5、保持時間2（分）：4.9 2、試料溶媒：M e O H：D C M = 1：1、注入体積：1 m L、実行数：1 5によって精製し、これにより、3 3 0 m g（2 1.2 %）のP H－A L I G－1 4－3－4を固体として得た。1 H－N M R－：（3 0 0 M H z，D M S O－d₆）δ 1 1.1 4（s，1 H），7.6 3（d，J = 8.1 H z，1 H），6.0 6（t，J = 5.9 H z，1 H），5.6 4（d，J = 8.0 H z，1 H），4.8 9（s，1 H），4.6 3（t，J = 5.3 H z，1 H），3.9 8（d，J = 9.8 H z，2 H），3.7 0（d d，J = 1 0.7，1.2 H z，8 H），3.6 3（d d，J = 6.0，3.2 H z，1 H），3.2 9（s，3 H）。

10

【0 2 9 4】

P H－A L I G－1 4－3－0の調製

D C M（1 0 m L）中の3－{ [ビス（ジイソプロピルアミノ）ホスファニル] オキシ } プロパンニトリル（3 2 4.1 0 m g、1.0 7 5 m m o l、1.2 当量）及び1 H－イミダゾール－4，5－ジカルボニトリル（1 2 6.9 9 m g、1.0 7 5 m m o l、1.2 当量）の攪拌溶液に、P H－A L I G－1 4－3－4（3 3 0 m g、0.9 m m o l、1.0 0 当量）を、アルゴン雰囲気下、2 5 ° Cで滴下した。得られた混合物を2 5 ° Cで3 0 分間攪拌した。水／氷で反応物をクエンチした。得られた混合物をE t O A c（2 × 1 0 m L）で抽出した。合わせた有機層を水（2 × 1 0 m L）で洗浄し、無水M g S O₄で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。カラム：U l t i m a t e D i o l、2 * 2 5 c m、5 μ m、移動相A：C O₂、移動相B：A C N、流速：5 0 m L / 分、勾配：イソクラティック3 0 % B、カラム温度（2 5 ° C）：3 5、背圧（パール）：1 0 0、波長：2 5 4 n m、保持時間1（分）：3.9 5、試料溶媒：A C N、注入体積：1 m L、実行数：1 0、これにより、P H－A L I G－1 4－3－0（3 4 9 m g、6 8.4 %）が淡黄色の油として得た。L C－M S：（E S，m / z）：5 6 7.2 5 [M + H]⁺；1 H－N M R：（3 0 0 M H z，D M S O－d₆）δ 1 1.3 8（s，1 H），7.6 4（d d，J = 8.0，1.3 H z，1 H），6.0 9（d t，J = 5.8，3.4 H z，1 H），5.6 5（d d，J = 8.0，3.2 H z，1 H），4.8 3（q，J = 5.5 H z，1 H），4.0 3（d t，J = 9.7，2.2 H z，2 H），3.8 3－3.4 0（m，1 4 H），3.3 0（s，3 H），2.7 7（t，J = 5.9 H z，2 H），1.1 2（d d d，J = 9.2，6.7，1.7 H z，1 2 H）；^{3 1} P N M R（D M S O－d₆）δ 1 4 8.0，1 4 7.6，2 3.1

20

30


【0 2 9 5】

実施例 4


40

50

【化 9 3】



10



スキームー 3

20

【0296】

PH-ALIG-14-3-40の調製

100 mLの丸底フラスコに、2 PH-ALIG-14-3-3 (2.00 g、4.234 mmol、1.00当量)を入れ、THF (20.00 mL)中の7 M NH₃ (g)を添加した。得られた溶液を、25℃で一晩攪拌した。得られた混合物を、真空下で濃縮した。粗生成物を、分取-sfcカラム：Lux 5um i-セルロース-5、3*25 cm、5 μm、移動相A：CO₂、移動相B：MeOH (0.1% 2 M NH₃-MeOH)、流速：70 mL/分、勾配：イソクラティック50% B、カラム温度(℃)：35、背圧(bar)：100、波長：220 nm、保持時間1(分)：3.75、保持時間2(分)：4.92、試料溶媒：MeOH：DCM=1：1、注入体積：1 mL、実行数：15、これにより、320 mg (22.8%)のPH-ALIG-14-3-40を固体として得た。1 H-NMR--14-3-40：(300 MHz, DMSO-d₆) δ 11.11 (s, 1H), 7.70 (d, J=8.0 Hz, 1H), 6.03 (t, J=6.1 Hz, 1H), 5.64 (d, J=8.0 Hz, 1H), 4.97 (s, 1H), 4.76 (t, J=5.3 Hz, 1H), 4.07-3.85 (m, 1H), 3.79 (dd, J=13.9, 9.3 Hz, 1H), 3.73-3.55 (m, 9H), 3.41 (d, J=5.0 Hz, 2H), 3.28 (s, 3H)。

30

【0297】

PH-ALIG-14-3-100の調製

DCM中の3-{[ビス(ジイソプロピルアミノ)ホスファニル]オキシ}プロパンニトリル (517.58 mg、1.717 mmol、1.2当量)及び1H-イミダゾール-4,5-ジカルボニトリル (202.79 mg、1.717 mmol、1.2当量)の攪拌溶液/混合物に、PH-ALIG-14-3-40 (527 mg、1.431 mmol、1.00当量)を、アルゴン雰囲気下、25℃で滴下した。得られた混合物を、25℃で30分間攪拌した。反応物を、水/氷でクエンチした。得られた混合物をEtOAc (2*10 mL)で抽出した。合わせた有機層を水 (2*10 mL)で洗浄し、無水MgSO₄で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。カラム：Ultimate Diol、2*25 cm、5 μm、移動相A：CO₂、移動相B：ACN (0.1% DEA)-HPLC-merk、流速：50 mL/分、勾配：イソクラティック30% B、カラ

40

50



△温度 (°C) : 35、背圧 (バー) : 100、波長 : 254 nm、保持時間 1 (分) : 4.57、試料溶媒 : ACN、注入体積 : 1 mL、実行数 : 10、PH-ALIG-14-3-100 (264.8 mg、31.7%) を淡黄色の油として得た。LC-MS : (ES, m/z) : 567.25 [M-H]⁻; ¹H NMR (300 MHz, DMSO-d₆) δ 13.24 (s, 1H), 11.31 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 8.18-7.83 (m, 2H), 7.81-7.63 (m, 2H), 7.61-7.42 (m, 2H), 6.01 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 5.61 (dd, J = 8.0, 2.2 Hz, 1H), 4.72-4.40 (m, 3H), 3.73-3.55 (m, 2H), 3.22 (s, 3H); ³¹P NMR (DMSO-d₆) δ 148.01, 147.67, 22.8

10


【0298】

実施例 5



【化94】



20



30



40

スキーム 4

【0299】

PH-ALIG-14-4-1の調製

50

H₂O (1.00 L) 中のアスコルビン酸 (100.00 g、567.78 mmol、1.00 当量) 及び CaCO₃ (113.0 g、1129.02 mmol、2 当量) の攪拌混合物に、H₂O₂ (30%) (236.0 g、6938.3 mmol、12.22 当量) を 0℃ で滴下した。得られた混合物を、室温で一晩攪拌した。過酸化物が検出されなくなるまで、混合物を木炭で処理し、70 度に加熱した。得られた混合物を濾過し、濾過ケーキを温水 (3×300 mL) で洗浄した。濾液を減圧下で濃縮した。固体を MeOH (200 mL) で希釈し、混合物を 5 時間攪拌した。得られた混合物を濾過し、濾過ケーキを MeOH (3×80 mL) で洗浄した。濾液を減圧下で濃縮して、L-スレオネート (86 g、96.6%) を白色の粗固体として得た。1H-NMR-: (300 MHz, Deuterium Oxide) δ 4.02 (dd, J=4.6, 2.4 Hz, 1H), 3.91 (ddt, J=7.6, 5.3, 2.2 Hz, 1H), 3.78-3.44 (m, 2H)。

10

【0300】

PH-ALIG-14-4-2 の調製

5 L の丸底フラスコに、L-スレオネート (70.00 g、518.150 mmol、1.00 当量) 及び H₂O (2 L) を室温で添加した。残渣を Dowex 50wX8、H (+) 形態で pH=1 に酸性化した。得られた混合物を 70℃ で 1 時間攪拌した。得られた混合物を濾過し、濾過ケーキを水 (2×1 L) で洗浄した。濾液を減圧下で濃縮した。固体を (2×2 L) と共蒸発させた。次いで、固体を ACN (700.00 mL) で希釈し、TsOH (5.35 g、31.089 mmol、0.06 当量) を添加した。得られた混合物を、空気雰囲気下で、80℃ で、1 時間攪拌した。得られた混合物を濾過し、濾過ケーキを ACN (2×500 mL) で洗浄した。濾液を減圧下で濃縮して、PH-ALIG-14-4-2 (70 g、粗物質) を黄色の油として得た。

20

【0301】

PH-ALIG-14-4-3 の調製

ピリジン (280.00 mL) 中の (PH-ALIG-14-4-2 (粗製 70.0 g、593.2 mmol、1.00 当量) の攪拌溶液に、塩化ベンゾイル (207.62 g、1.483 mol、2.5 当量) を、アルゴン雰囲気下、0℃ で滴下した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で 1 時間攪拌した。反応物を 0℃ で飽和 NaHCO₃ (水溶液) (500 mL) の添加によってクエンチした。得られた混合物を、CH₂Cl₂ (3×500 mL) で抽出した。合わせた有機層を、ブライン (2×300 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、PE/EtOAc で溶出した、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによって精製して、オフホワイト色の固体として (PH-ALIG-14-4-3 (80 g、41.4%)) を得た。LC-MS: (ES, m/z): 327 [M+H]⁺; 1H-NMR: (300 MHz, CDCl₃) δ 8.18-8.04 (m, 4H), 7.68-7.61 (m, 2H), 7.50 (tt, J=7.1, 1.4 Hz, 4H), 5.96-5.57 (m, 2H), 5.11-5.00 (m, 1H), 4.45-4.35 (m, 1H)。

30

【0302】

PH-ALIG-14-4-4 の調製

THF (1.50 L) 中の PH-ALIG-14-4-3 (125 g、383.078 mmol、1.00 当量) の攪拌溶液に、DIBAL-H (1M) (600 mL、2 当量) を、アルゴン雰囲気下、-78℃ で滴下した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下で、-78℃ で 1 時間攪拌した。所望の生成物を、LCMS によって検出した。反応物を、MeOH で、0℃ でクエンチした。得られた混合物を、EtOAc (600 mL) で希釈した。得られた混合物を濾過し、濾過ケーキを EtOAc (3×800 mL) で洗浄した。濾液を減圧下で濃縮した。これにより、PH-ALIG-14-4-4 (73 g、粗物質) が無色固体として得られた。LC-MS: (ES, m/z): 392 [M+Na+ACN]⁺; 1H-NMR-: (400 MHz, クロロホルム-d) δ 8.22-7.99 (m, 8H), 7.62 (dtd, J=7.4, 4.4, 2.2 Hz, 4H), 7.4

40

50

8 (td, $J = 7.8, 2.4 \text{ Hz}$, 8H), 5.87 (d, $J = 4.3 \text{ Hz}$, 1H), 5.77 (dt, $J = 6.6, 3.6 \text{ Hz}$, 1H), 5.56 (d, $J = 4.9 \text{ Hz}$, 2H), 5.50 (t, $J = 4.3 \text{ Hz}$, 1H), 4.73 (s, 1H), 4.63 (ddd, $J = 10.4, 7.9, 6.1 \text{ Hz}$, 2H), 4.28 (dd, $J = 10.3, 3.8 \text{ Hz}$, 1H), 3.99 (dd, $J = 10.6, 3.2 \text{ Hz}$, 1H)。

【0303】

PH-ALIG-14-4-5の調製

DCM (365.00 mL) 中の (PH-ALIG-14-4-4 (73.00 g、222.344 mmol、1.00 当量) 及び DMAP (271.63 mg、2.223 mmol、0.01 当量) 及び ピリジン (365.00 mL) の攪拌溶液に、Ac₂O (24.97 g、244.6 mmol、1.1 当量) を、アルゴン雰囲気下、0℃で滴下した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で1時間攪拌した。反応物を飽和 NaHCO₃ (水溶液) で0℃でクエンチした。得られた混合物を、CH₂Cl₂ (3×500 mL) で抽出した。合わせた有機層を、飽和 CuSO₄ (3×200 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによって精製し、PE/EtOAc で溶出し、PH-ALIG-14-4-5 (60 g、73%) を無色の油として得た。LC-MS: (ES, m/z): 434 [M+Na+ACN]⁺; 1H-NMR: (400 MHz, クロロホルム-d) δ 8.17-8.02 (m, 8H), 7.63 (td, $J = 7.9, 6.6, 3.2, 1.6 \text{ Hz}$, 4H), 7.57-7.44 (m, 8H), 6.66 (d, $J = 4.5 \text{ Hz}$, 1H), 6.40 (s, 1H), 5.83-5.53 (m, 4H), 4.67 (ddd, $J = 23.4, 10.5, 6.2 \text{ Hz}$, 2H), 4.24 (dd, $J = 10.5, 3.8 \text{ Hz}$, 1H), 4.19-4.01 (m, 1H), 2.18 (s, 3H), 2.06 (d, $J = 3.2 \text{ Hz}$, 3H)。

【0304】

PH-ALIG-14-4-6の調製

缶 (500.00 mL) 中の PH-ALIG-14-4-5 (50.00 g、135.005 mmol、1.00 当量) 及び ウラシル (15.13 g、135.005 mmol、1 当量) の攪拌混合物に、BSA (54.81 g、270.010 mmol、2 当量) を、空気雰囲気下で室温で少しずつ添加した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下で、60℃で1時間攪拌した。その後、TMSOTf (90.02 g、405.0 mmol、3 当量) を0℃で滴下した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、60℃で2時間攪拌した。混合物を、飽和 NaHCO₃ (水溶液) で0℃で pH=7 に中和した。得られた混合物を、CH₂Cl₂ (3×400 mL) で抽出した。合わせた有機層を、ブライン (2×400 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、PE/EtOAc (1:1) で溶出した、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによって精製して、PH-ALIG-14-4-6 (43 g、75.4%) を白色固体として得た。LC-MS: (ES, m/z): [M+H]⁺; 423 464 [M+H+ACN]⁺; 1H-NMR: (300 MHz, クロロホルム-d) δ 9.08-8.89 (m, 1H), 8.17-7.94 (m, 4H), 7.70-7.43 (m, 7H), 6.19 (d, $J = 1.9 \text{ Hz}$, 1H), 5.84-5.71 (m, 2H), 5.62 (td, $J = 3.3, 2.8, 1.4 \text{ Hz}$, 1H), 4.59-4.44 (m, 2H), 4.14 (q, $J = 7.2 \text{ Hz}$, 1H)。

【0305】

PH-ALIG-14-4-7の調製

PH-ALIG-14-4-6 (52.00 g、123.108 mmol、1 当量) の溶液を、642 mL の MeOH/H₂O/TEA (5:1:1) に室温で溶解させ、それ以上の発物質が検出されないまで (2~3 時間) 加熱還流した。得られた混合物を減圧下で濃縮した。残渣を EtOAc (600 mL) に溶解し、有機層を水 (5×800 mL) で抽出した。水層を真空下で濃縮して、PH-ALIG-14-4-7 (21 g、粗製

）をオフホワイト固体として得た。粗生成物を、更に精製することなく次のステップで直接使用した。LC-MS-: (ES, m/z): 213 [M-H]⁻; ¹H-NMR: (300 MHz, DMSO-d₆) δ 11.26 (s, 1H), 7.68 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 5.75 (s, 1H), 5.65 (d, J = 1.2 Hz, 1H), 5.59 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 5.39 (s, 1H), 4.10-3.97 (m, 4H)。

【0306】

PH-ALIG-14-4-8の調製

DCM (80.00 mL) 及び DMF (200.00 mL) 中の PH-ALIG-14-4-7 (16.00 g、74.705 mmol、1.00 当量) 及び DBU (22.75 g、149.409 mmol、2 当量) の攪拌混合物に、DMTr-Cl (7.88 g、25.680 mmol、1.1 当量) を、アルゴン雰囲気下、室温で滴下した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で2時間攪拌した。反応物を0℃で飽和 NaHCO₃ (水溶液) (100 mL) の添加によってクエンチした。混合物を EtOAc (3×60 mL) で抽出した。合わせた有機層をブライン (2×50 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、PE (0.5% TEA) / EtOAc (2:3) で溶出した、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによって精製して、PH-ALIG-14-4-8 (25 g、64.8%) をオフホワイト色の固体として得た。LC-MS: (ES, m/z): 515 [M-H]⁻; ¹H-NMR: (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.33 (s, 1H), 7.57 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.45-7.13 (m, 9H), 6.86 (t, J = 8.5 Hz, 4H), 5.94 (d, J = 1.7 Hz, 1H), 5.58 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 5.15 (d, J = 2.6 Hz, 1H), 3.97-3.79 (m, 3H), 3.73 (d, J = 2.3 Hz, 6H), 3.33 (d, J = 2.5 Hz, 1H)。

【0307】

PH-ALIG-14-4-9Aの調製

THF (240.00 mL) 中の PH-ALIG-14-4-8 (6.00 g、11.616 mmol、1.00 当量) の攪拌溶液に、NaH (60%) (1.40 g、35.003 mmol、3 当量) を、アルゴン雰囲気下、0℃で滴下した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下で、0℃で30分間攪拌した。次いで、ジメチルエテニルホスホネート (15.81 g、116.2 mmol、10.00 当量) を添加し、得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で一晩攪拌した。反応物を飽和 NH₄Cl (水溶液) で室温でクエンチした。得られた混合物を EtOAc (3×100 mL) で抽出した。合わせた有機層を、ブライン (3×80 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、以下の条件: カラム、C18 移動相、水中の ACN、30分間で5%~95%の勾配、検出器、UV 254 nmを用いた逆フラッシュクロマトグラフィーによって精製し、PH-ALIG-14-4-9A (3.65 g、48.15%) を白色固体として得た。

LC-MS: (ES, m/z): 675 [M+Na]⁺; ¹H-NMR-: (300 MHz, DMSO-d₆) δ 11.39 (s, 1H), 7.44-7.36 (m, 3H), 7.34-7.21 (m, 7H), 6.93-6.83 (m, 4H), 6.08 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 5.55 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 4.08 (d, J = 11.0 Hz, 1H), 3.92 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 3.82-3.71 (m, 7H), 3.57 (dd, J = 10.9, 3.6 Hz, 6H), 3.30-3.23 (m, 1H), 3.06-2.86 (m, 2H), 1.96 (dt, J = 18.1, 7.1 Hz, 2H)。

【0308】

PH-ALIG-14-4-10Aの調製

AcOH (12.00 mL) 及び H₂O (3.00 mL) 中の PH-ALIG-14-4-9A (2.80 g、4.3 mmol、1.00 当量) の溶液を、大気雰囲気下、室温

で一晩攪拌した。反応物を飽和 NaHCO_3 (水溶液) を 0°C でクエンチした。得られた混合物を、 $3 \times 20\text{ mL}$ の CH_2Cl_2 で洗浄した。水層中の生成物。水層を減圧下で濃縮した。生成物を、以下の条件 (分取 SFC 80-2) : カラム、Green Sep 塩基性、 $3 \times 15\text{ cm}$ 、移動相、 CO_2 (70%) 及び IPA (0.5% 2M $\text{NH}_3\text{-MeOH}$) (30%)、検出器、 $\text{UV } 254\text{ nm}$ を用いた分取 SFC によって精製し、生成物を得た。これにより、 870 mg (57.89%) の PH-ALIG-14-4-10A を白色固体として得た。LC-MS: (ES, m/z): 351 $[\text{M}+\text{Na}]^+$; $^1\text{H-NMR}$: (300 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) δ 11.28 (s, 1H), 7.56 (d, $J=8.1\text{ Hz}$, 1H), 5.86 (d, $J=4.4\text{ Hz}$, 1H), 5.65 (d, $J=1.6\text{ Hz}$, 1H), 5.56 (d, $J=8.1\text{ Hz}$, 1H), 4.17 (d, $J=10.1\text{ Hz}$, 1H), 4.10 (d, $J=4.3\text{ Hz}$, 1H), 4.00 (dd, $J=10.1, 3.9\text{ Hz}$, 1H), 3.87 (dt, $J=4.1, 1.3\text{ Hz}$, 1H), 3.72-3.49 (m, 8H), 2.08 (dd, $J=7.1, 2.8\text{ Hz}$, 1H), 2.05-1.96 (m, 1H)。

10

【0309】

PH-ALIG-14-4-100の調製

250 mL の3つ口の丸底フラスコに、分子ふるい及び ACN (30.00 mL) を室温で添加した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で10分間攪拌した。次いで、攪拌溶液に、3-[[ビス(ジイソプロピルアミノ)ホスファニル]オキシ]プロパンニトリル (1058.46 mg、3.512 mmol、1.5当量) 及び DCI (359.12 mg、3.043 mmol、1.30当量) を添加した。次いで、30 mL の ACN 中のジメチル PH-ALIG-14-4-10A (820.00 mg、2.341 mmol、1.00当量) を、アルゴン雰囲気下で室温で滴下した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で1時間攪拌した。得られた混合物を CH_2Cl_2 (60 mL) で希釈した。合わせた有機層を、濾過後に水 ($3 \times 40\text{ mL}$) で洗浄し、無水 MgSO_4 で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を分取 TLC (PE 中 0.5% の TEA/EtOAc 1:9 中 10% の EtOH) によって精製して、 PH-ALIG-14-4-100 (800 mg、62.1%) を無色油として得た。LC-MS: (ES, m/z): 549 $[\text{M-H}]^-$; $^1\text{H-NMR}$: (300 MHz, $\text{DMSO-}d_6$) δ 11.34 (s, 1H), 7.61 (dd, $J=8.1, 1.7\text{ Hz}$, 1H), 5.80 (dd, $J=15.0, 1.8\text{ Hz}$, 1H), 5.60 (d, $J=8.1\text{ Hz}$, 1H), 4.48-4.23 (m, 2H), 4.17-3.98 (m, 2H), 3.88-3.73 (m, 2H), 3.72-3.51 (m, 10H), 2.79 (q, $J=5.9\text{ Hz}$, 2H), 2.07 (dt, $J=17.9, 7.1, 3.2\text{ Hz}$, 2H), 1.15 (ddd, $J=6.3, 3.8, 2.1\text{ Hz}$, 12H); $^{31}\text{P-NMR}$ ($\text{DMSO-}d_6$) δ 149.71, 149.35, 30.85, 30.75

20

30


【0310】

実施例 6

40

50

【化 9 5】



スキーム-5

【0311】

2の調製：(J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1992, 1943-1952) DMF (2.0 L) 中の1 (150.0 g、1.0 mol) の溶液に、2, 2-ジメトキシプロパン (312.0 g、3.0 mol) 及び p-TsOH (1.7 g、10.0 mmol) を添加し、次いで反応混合物を室温で4時間攪拌し、反応後、溶媒を濃縮して粗生成物を得、これを次のステップに直接使用した。

【0312】

3の調製：(J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1992, 1943-1952) ピリジン (2.0 L) 中の2 (190.0 g、1.0 mol) の溶液に、BzCl (560.0 g、4.0 mol) を添加し、次いで反応混合物を室温で2時間攪拌し、反応後、反応混合物を氷水に注ぎ、EAを添加して抽出し、有機相をブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、濃縮して粗生成物を得て、これをシリカゲルカラム (EA:PE=1:5~1:1) によって精製し、3 (350.0 g、収率87.9%) を得た、ESI-LCMS: m/z = 421.2 [M+Na]⁺。

【0313】

4の調製：(J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1992, 1943-1952) MeCN (3.0 L) 中の3 (240.0 g、815.5 mmol) の溶液に、N-(2-オキソ-1H-ピリミジン-4-イル) ベンズアミド (193.0

g、897.0 mmol) 及びBSA (496.6 g、2.4 mol) を添加し、次いで反応混合物を50℃で30分間攪拌し、次いで反応混合物を0℃まで冷却し、TMSOTf (271.5 g、1.2 mol) を混合物に0℃で添加し、次いで反応混合物を70℃で2時間攪拌し、反応後、溶媒を濃縮して油を得て、次いで混合物を維持するNaHCO₃の溶液に油をわずかにアルカリ性で注ぎ、EAを添加し、有機相をブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、濃縮して粗生成物を得て、これをシリカゲルカラム (EA:EP=1:3~1:1) で精製して4 (180.0 g、収率44.9%) を得た。ESI-LCMS: m/z = 491.2 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.19 (s, 1H), 8.20 (d, J=7.6 Hz, 1H), 8.01-7.84 (m, 4H), 7.73-7.57 (m, 2H), 7.50 (dt, J=10.4, 7.7 Hz, 4H), 7.40 (d, J=7.4 Hz, 1H), 6.03 (d, J=9.4 Hz, 1H), 5.33 (dd, J=9.4, 7.3 Hz, 1H), 4.66 (dd, J=7.3, 5.3 Hz, 1H), 4.45-4.35 (m, 2H), 4.22 (dd, J=13.7, 2.5 Hz, 1H), 1.58 (s, 3H), 1.34 (s, 3H)。

10

【0314】

5の調製: ピリジン (800.0 mL) 中の4 (78.0 g、158.7 mmol) の溶液に、H₂O 及び MeOH (4:1、2 N) の混合溶媒中のNaOH (6.3 g、158.7 mmol) の溶液を添加し、次いで反応混合物を0℃で20分間攪拌し、LC-MS 及び TLC は、原料が消失したことを示し、次いで混合物をNH₄Clの溶液に注ぎ入れ、EAを抽出のために添加し、有機相をブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、濃縮して、粗生成物を得、これをシリカゲルカラム (DCM: MeOH=30:1~10:1) によって精製し、5 (56.0 g、収率91.0%) を得た。ESI-LCMS: m/z = 388.1 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.29 (s, 1H), 8.16 (d, J=7.6 Hz, 1H), 8.08-7.99 (m, 2H), 7.67-7.60 (m, 1H), 7.53 (t, J=7.6 Hz, 2H), 7.35 (d, J=7.6 Hz, 1H), 5.63 (d, J=6.1 Hz, 1H), 5.51 (d, J=9.5 Hz, 1H), 4.35-4.13 (m, 3H), 3.78 (dt, J=9.6, 6.5 Hz, 1H), 3.19 (d, J=5.1 Hz, 1H), 1.53 (s, 3H), 1.32 (s, 3H)。

20

30

【0315】

6の調製: DCM (200.0 mL) 中の5 (15.0 g、38.7 mmol) の溶液に、Ag₂O (35.8 g、154.8 mmol)、CH₃I (54.6 g、387.2 mmol) 及びNaI (1.1 g、7.7 mmol) を添加し、次いで反応混合物を室温で一晩攪拌し、反応後、濾過によって濾液を得、濾液から溶媒を濃縮し、生成物6 (13.0 g、75.2% 収率、) を得た。ESI-LCMS: m/z = 402.30 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.30 (s, 1H), 8.22 (s, 1H), 8.00 (d, J=7.6 Hz, 2H), 7.71-7.20 (m, 4H), 5.56 (d, J=9.3 Hz, 1H), 4.33 (t, J=6.1 Hz, 1H), 4.26 (dd, J=6.2, 2.1 Hz, 1H), 4.20 (d, J=13.5 Hz, 1H), 3.98 (dd, J=13.5, 2.5 Hz, 1H), 3.66 (dd, J=9.3, 6.6 Hz, 1H), 3.34 (s, 3H), 1.57 (s, 3H), 1.32 (s, 3H)。

40

【0316】

7の調製: 6 (12.0 g、29.9 mmol) の溶液に、CH₃COOH (120.0 mL) を添加し、次いで混合物を室温で2時間攪拌し、LC-MS 及び TLC は、原料が消失したことを示し、次いで溶媒を濃縮して、粗生成物7 (10.0 g、収率83.3%) を得た。ESI-LCMS: m/z = 362.1 [M+H]⁺。

【0317】

8の調製: ジオキサン: H₂O = 3:1 (120.0 mL) 中の7 (10.0 g、24

50

． 9 mmol) の溶液に、NaIO₄ (8.8 g、41.5 mmol) を添加し、次いで反応混合物を室温で2時間攪拌し、LC-MS及びTLCは、原料が消失したことを示し、次いで反応混合物を0℃まで冷却し、NaBH₄ (2.4 g、41.5 mmol) を混合物に添加し、0℃で0.5時間攪拌し、LC-MS及びTLCは、原料が消失したことを示し、NH₄Clを混合物に添加してpHをわずかにアルカリ性に調整し、濃縮して粗生成物を得、これをシリカゲルカラム (PE:EA=5:1~1:1) によって精製して8 (8.0 g、収率79.5%) を得た。ESI-LCMS: m/z = 364.1 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.26 (s, 1H), 8.14 (d, J=7.5 Hz, 1H), 8.07-7.94 (m, 2H), 7.67-7.59 (m, 1H), 7.52 (t, J=7.6 Hz, 2H), 7.37 (s, 1H), 5.91 (d, J=6.0 Hz, 1H), 4.77 (t, J=5.6 Hz, 1H), 4.70 (t, J=5.1 Hz, 1H), 3.70 (ddd, J=11.5, 5.0, 2.5 Hz, 1H), 3.57-3.39 (m, 6H), 3.31 (s, 3H)。

10

[0318]

9の調製：ピリジン (50.0 mL) 中の8 (4.0 g、11.0 mmol) の溶液に、DMTrCl (5.5 g、16.5 mmol) を添加し、次いで反応混合物を室温で2時間攪拌したところ、LC-MSは、原料が20.0%であり、生成物対副生成物の比が3.5:1であることを示した。次いで溶媒を濃縮して残渣を得、これをシリカゲルカラムで精製して精製生成物を得、副生成物は合計5 gであり、次いで生成物をSFCで精製して9 (3.0 g、収率40.9%) を得た。ESI-LCMS: m/z = 666.2 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.33 (s, 1H), 8.20 (d, J=7.4 Hz, 1H), 8.04 (d, J=7.7 Hz, 2H), 7.64 (t, J=7.4 Hz, 1H), 7.53 (t, J=7.6 Hz, 2H), 7.40 (d, J=7.8 Hz, 3H), 7.36-7.18 (m, 7H), 6.89 (d, J=8.4 Hz, 4H), 5.96 (d, J=5.7 Hz, 1H), 4.79 (t, J=5.7 Hz, 1H), 3.73 (s, 6H), 3.66-3.46 (m, 4H), 3.37 (s, 3H), 3.16 (ddd, J=10.1, 7.1, 3.0 Hz, 1H), 3.04 (dt, J=10.9, 3.4 Hz, 1H), 2.08 (s, 1H)。

20

[0319]

10の調製：DCM (30.0 mL) 中の9 (2.8 g、4.2 mmol) の溶液に、CEP [N(iPr)₂]₂ (1.3 g、4.2 mmol) 及びDCI (601.2 mg、5.1 mmol) を添加した。混合物を室温で1時間攪拌した。LC-MSは、9が完全に消費されたことを示した。溶液をNaHCO₃溶液で2回洗浄し、ブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させた。次いで濃縮して残渣を得て、これを以下の条件 (Intel Flash-1): カラム、C₁₈シリカゲル、移動相、CH₃CN/H₂O (0.5% NH₄HCO₃) = 1/1を20.0分以内にCH₃CN/H₂O (0.5% NH₄HCO₃) = 1/0まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLCによって精製し、溶出した生成物をCH₃CN/H₂O (0.5% NH₄HCO₃) = 90/10、検出器、UV254 nmで集めた。これにより、10 (2.8 g、収率76.8%) を得た。ESI-LCMS: m/z = 866.2 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.34 (s, 1H), 8.22 (d, J=7.4 Hz, 1H), 8.09-7.98 (m, 2H), 7.64 (t, J=7.4 Hz, 1H), 7.53 (t, J=7.6 Hz, 2H), 7.45 (d, J=7.3 Hz, 1H), 7.39 (d, J=7.5 Hz, 2H), 7.31 (t, J=7.6 Hz, 2H), 7.24 (t, J=9.1 Hz, 5H), 6.89 (d, J=8.8 Hz, 4H), 5.96 (d, J=6.1 Hz, 1H), 4.02-3.86 (m, 1H), 3.84-3.63 (m, 11H), 3.56 (dtq, J=13.3, 6.6, 3.5, 3.1 Hz, 3H), 3.37 (s, 2H), 3.16 (ddd, J=10.0, 6.8, 3.3 Hz, 1H), 3.04 (ddd, J=10.7, 5.5, 3.0 Hz, 1H), 2.75 (td, J=5.9, 2.3 Hz, 2H), 1.18-1.07 (m, 12H); ³¹P NMR (DMSO-

30

40


50

d₆) δ 148.02 (d, J = 12.0 Hz)。

【0320】

実施例 7

【化96】



実施例 7

スキーム 6

【0321】

10の調製：**3** (200.0 g、0.5 mol) のACN (2000.0 mL) 溶液に、N₂下、0℃でDCM (1000.0 mL) 中のSnCl₄の溶液を添加し、反応混合物をN₂雰囲気下、0℃で4時間攪拌した。次いで、反応溶液を飽和重炭酸ナトリウム溶液に注ぎ、得られた生成物を、EA (3×500.0 mL) で抽出した。合わせた有機層を水及びブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、濃縮して粗物質を得て、これをシリカゲルカラム (PE : EA = 5 : 1 ~ 0 : 1) によって精製して、**10** (65.0 g、収率31.4%) を白色固体として得た。ESI-LCMS : m/z = 412.0 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.27 (s, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.74–7.60 (m, 2H), 7.59–7.57 (m, 1H), 7.44–7.40 (m, 2H), 7.24 (s, 2H), 5.90 (d, J = 9.6 Hz, 1H), 5.73 (dd, J = 7.4 Hz, 1H), 4.63 (t, 1H), 4.50–4.30 (m, 2H), 4.21 (dd, J = 13.6 Hz, 1H), 1.61 (s, 3H), 1.35 (s, 3H)。

【0322】

11の調製：DCM (500.0 mL) 中の**10** (40.0 g、97.3 mmol) の溶液に、Et₃N (30.0 g、297.0 mmol) 及びDMAP (1.2 g、9.8

mmol) を室温で添加した。反応混合物を N_2 で 3 回にわたって置き換え、次いで $MMTrCl$ (45.0 g、146.1 mmol) を混合物に添加した。この反応混合物を室温で一晩撹拌した。TLC 及び LC-MS は、10 を消費し、反応混合物を氷水中の $NaHCO_3$ の水溶液に添加したことを示した。次いで、生成物を EA で抽出し、有機相をブラインで洗浄し、有機相を Na_2SO_4 で乾燥させ、次いで濃縮して、粗物質として 11 (66.5 g、) を得、次のステップを直接使用した。

【0323】

12 の調製：ピリジン (600.0 mL) 中の 11 (66.5 g、97.3 mmol) の溶液に、2 N の $NaOH$ ($H_2O:MeOH=4:1$) (200.0 mL) を室温で添加した。次いで反応混合物を $0^\circ C$ で 30 分間撹拌し、LC-MS 及び TLC は、原料が消失したことを示し、次いで混合物を NH_4Cl の溶液に注ぎ、EA を抽出のために添加し、有機相をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、濃縮して粗生成物を得て、これをシリカゲルカラム (EA:PE=1:5~1:1) によって精製し、12 (50.0 g、2 ステップで収率 88.7%) を得た。ESI-LCMS: $m/z=580.4 [M+H]^+$; ^1H NMR (400 MHz, $DMSO-d_6$) δ 8.44 (s, 1H), 7.92 (s, 1H), 7.36-7.16 (m, 13H), 6.89-6.80 (m, 2H), 5.59 (d, $J=6.0$ Hz, 1H), 5.35 (d, $J=9.6$ Hz, 1H), 4.32-4.12 (m, 4H), 4.08-3.95 (m, 3H), 3.72 (s, 3H), 1.99 (s, 3H), 1.54 (s, 3H), 1.32 (s, 3H), 1.17 (t, $J=7.1$ Hz, 3H)。

10

20

【0324】

13 の調製： CH_3I (200.0 mL) 中の 12 (46.0 g、79.4 mmol) の溶液に、 Ag_2O (36.6 g、158.4 mmol) 及び NaI (6.0 g、42.5 mmol) を添加し、次いで反応混合物を室温で 4 時間撹拌し、次いで反応混合物を濾過し、溶媒を濃縮して、生成物 13 (46.0 g、97.6% 収率) を得、次のステップに直接使用した。ESI-LCMS: $m/z=594.3 [M+H]^+$ 。

【0325】

14 の調製： DCM (750.0 mL) 中の DCA (22.5 mL) の撹拌溶液に、13 (46.0 g、77.5 mmol) 及び Et_3Si (185.0 mL) を室温で添加した。反応混合物を、12 時間、室温で撹拌した。反応溶液を減圧下で乾燥するまで蒸発させて、残渣を得て、これを $NaHCO_3$ (50.0 mL) の溶液でスラリー状にして、14 (19.0 g、収率 76%) を得て、これを次のステップに直接的に使用した。

30

【0326】

15 の調製：ピリジン (200.0 mL) 中の 14 (16.0 g、49.7 mmol) の溶液に、 $BzCl$ (9.0 g、64.7 mmol) を $0^\circ C$ で添加した。次いで、反応混合物を室温で 2 時間撹拌した。LC-MS は、6 個を完全に消費し、次いで混合物を $0^\circ C$ まで冷却し、 $MeOH$ 及び H_2O (2 N、50.0 mL) 中の $NaOH$ の溶液を反応混合物に添加し、混合物を $0^\circ C$ で 1 時間撹拌し、次いで混合物を NH_4Cl の溶液に注いだ。生成物を EA (300.0 mL) で抽出し、有機層をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させた。次いで、有機層を濃縮して残渣を得て、これを PE:EA (8:1、900.0 mL) でスラリーによって精製し、15 (20.0 g、収率 95.0%) を得た。ESI-LCMS: $m/z=426.2 [M+H]^+$; ^1H NMR (400 MHz, $DMSO-d_6$) δ 11.21 (s, 1H), 8.77-8.69 (m, 2H), 8.06 (d, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.65 (t, $J=7.4$ Hz, 1H), 7.56 (t, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.34-7.23 (m, 4H), 7.23-7.12 (m, 5H), 6.89-6.80 (m, 4H), 5.90 (d, $J=7.9$ Hz, 1H), 4.36-4.29 (m, 1H), 4.06 (t, $J=8.8$ Hz, 1H), 3.92 (dd, $J=25.0, 6.9$ Hz, 0H), 3.72 (d, $J=1.0$ Hz, 7H), 3.59 (dt, $J=10.4, 6.6$ Hz, 1H), 3.24 (s, 3H), 2.97 (d, $J=7.7$ Hz, 1H), 2.76 (q, $J=5.5$ Hz, 2H), 1.14 (dd

40

50

, $J = 9.2, 5.7 \text{ Hz}$, 12 H)。

【0327】

16の調製：HCOOH (180.0 mL) 及びH₂O (20.0 mL) の混合物溶液に、15 (19.0 g、44.7 mmol) を添加した。反応混合物を室温で4時間攪拌した。LC-MSは、15が完全に消費されたことを示した。次いで、反応混合物を濃縮して、残渣を得て、これをMeOH (100.0 mL) でスラリーによって精製して、16 (16.0 g、収率92.7%) を白色固体として得た。ESI-LCMS： $m/z = 385.9 [M+H]^+$ ；¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ 11.21 (s, 1H), 8.77 (d, $J = 1.2 \text{ Hz}$, 2H), 8.09–8.02 (m, 2H), 7.70–7.61 (m, 1H), 7.56 (t, $J = 7.6 \text{ Hz}$, 2H), 5.56 (d, $J = 9.2 \text{ Hz}$, 1H), 5.21 (d, $J = 6.1 \text{ Hz}$, 1H), 4.94 (d, $J = 4.5 \text{ Hz}$, 1H), 4.18 (t, $J = 9.1 \text{ Hz}$, 1H), 4.09 (q, $J = 5.2 \text{ Hz}$, 1H), 3.88–3.71 (m, 4H), 3.21–3.14 (m, 6H)。

10

【0328】

17の調製：ジオキサン (200.0 mL) 中の16 (16.0 g、41.4 mmol) の溶液に、H₂O (32.0 mL)、及びNaIO₄ (9.7 g、45.5 mmol) を添加し、次いで反応混合物を室温で1時間攪拌し、LC-MS及びTLCは、原料が消失し、次いで反応混合物を0℃まで冷却し、NaBH₄ (1.7 g、45.5 mmol) を混合物に添加し、0℃で0.5時間攪拌し、LC-MS及びTLCは、中間状態が消失したことを示し、次いでNH₄Clを混合物に添加してpHをわずかにアルカリ性に調節し、室温で濃縮し、粗生成物を得て、シリカゲルカラム (DCM：MeOH = 20：1～8：1) によって精製し、17 (16.0 g、収率99.5%) を得た。ESI-LCMS： $m/z = 388.0 [M+H]^+$ ；¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ 11.18 (s, 1H), 8.75 (s, 1H), 8.67 (s, 1H), 8.09–7.99 (m, 2H), 7.65 (t, $J = 7.4 \text{ Hz}$, 1H), 7.56 (t, $J = 7.6 \text{ Hz}$, 2H), 5.90 (d, $J = 7.6 \text{ Hz}$, 1H), 4.88 (t, $J = 5.7 \text{ Hz}$, 1H), 4.67 (t, $J = 5.5 \text{ Hz}$, 1H), 4.08–3.98 (m, 2H), 3.78 (ddd, $J = 12.1, 5.2, 3.1 \text{ Hz}$, 1H), 3.68–3.39 (m, 4H), 3.36 (s, 0H), 3.20 (s, 3H), 1.99 (s, 1H), 1.17 (t, $J = 7.1 \text{ Hz}$, 1H)。

20

30

【0329】

18の調製：ピリジン (50.0 mL) 中の17 (12.0 g、31.0 mmol) の溶液に、DMTrCl (11.5 g、34.1 mmol) を添加し、次いで反応混合物を室温で2時間攪拌し、LC-MSは、原料が15.0%残っており、生成物対副生成物の比が3.5：1であることを示した。次いで、反応溶液を氷水に注ぎ、EAで抽出し、ブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、濾過し、濃縮して、残渣を得て、これをシリカゲルカラムによって精製して、精製生成物及び副生成物を合計13.0 g得て、次いで、4.0 gの粗物質をSFCによって精製して、18 (3.3 g、収率15.4%) を得た。ESI-LCMS： $m/z = 690.3 [M+H]^+$ ；¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ 11.21 (s, 1H), 8.75 (s, 1H), 8.69 (s, 1H), 8.10–8.03 (m, 2H), 7.70–7.61 (m, 1H), 7.56 (t, $J = 7.6 \text{ Hz}$, 2H), 7.35–7.12 (m, 9H), 6.90–6.80 (m, 4H), 5.94 (d, $J = 7.5 \text{ Hz}$, 1H), 4.88 (t, $J = 5.6 \text{ Hz}$, 1H), 4.36 (t, $J = 5.1 \text{ Hz}$, 1H), 4.11 (dt, $J = 7.4, 3.6 \text{ Hz}$, 1H), 3.82 (ddd, $J = 11.9, 5.1, 3.1 \text{ Hz}$, 1H), 3.72 (d, $J = 1.3 \text{ Hz}$, 7H), 3.64 (ddd, $J = 11.9, 6.2, 4.2 \text{ Hz}$, 1H), 3.45 (qd, $J = 7.0, 4.9 \text{ Hz}$, 2H), 3.24 (s, 3H), 3.09 (ddd, $J = 9.9, 6.4, 3.2 \text{ Hz}$, 1H), 2.97 (ddd, $J = 9.9, 5.7, 3.2 \text{ Hz}$, 1H), 1.23 (s, 0H), 1.06 (t,

40

50

$J = 7.0 \text{ Hz}$, 1 H)。

【0330】

19の調製：DCM (40.0 mL) 中の18 (3.3 g、4.8 mmol) の懸濁液に、DCI (0.5 g、4.0 mmol) 及びCEP [N(iPr)₂]₂ (1.6 g、5.3 mmol) を添加した。混合物を室温で0.5時間攪拌した。LC-MSは、10が完全に消費されたことを示した。溶液をNaHCO₃溶液で2回洗浄し、ブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させた。次いで濃縮して残渣を得て、これを以下の条件 (IntelFlash-1) : カラム、C₁₈シリカゲル、移動相、CH₃CN/H₂O (0.5% NH₄HCO₃) = 1/1を20分以内でCH₃CN/H₂O (0.5% NH₄HCO₃) = 1/0まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLCによって精製し、溶出した生成物をCH₃CN/H₂O (0.5% NH₄HCO₃) = 1/0、検出器、UV 254 nmで集めた。これにより、19 (3.0 g、3.9 mmol、収率81.2%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: $m/z = 765.3$ [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.22 (s, 1H), 8.80–8.71 (m, 2H), 8.11–8.04 (m, 2H), 7.65 (t, $J = 7.3 \text{ Hz}$, 1H), 7.56 (t, $J = 7.5 \text{ Hz}$, 2H), 7.36–7.24 (m, 4H), 7.24–7.15 (m, 5H), 6.89–6.82 (m, 4H), 5.92 (d, $J = 7.7 \text{ Hz}$, 1H), 4.34 (dt, $J = 7.5, 3.5 \text{ Hz}$, 1H), 4.08 (ddd, $J = 10.7, 7.3, 2.7 \text{ Hz}$, 1H), 4.03–3.89 (m, 1H), 3.80–3.72 (m, 10H), 3.67–3.53 (m, 2H), 3.47 (dp, $J = 10.5, 3.4 \text{ Hz}$, 1H), 3.26 (s, 3H) 3.11 (ddd, $J = 10.3, 6.2, 3.5 \text{ Hz}$, 1H), 3.00 (q, $J = 6.6, 5.2 \text{ Hz}$, 1H), 2.77 (q, $J = 5.6 \text{ Hz}$, 2H), 2.08 (s, 1H), 1.15 (t, $J = 7.0 \text{ Hz}$, 12H)。; ³¹P NMR (162 MHz, DMSO-d₆) δ 148.30, 147.99.


10

20

【0331】

実施例 8

【化97】



30

40

【0332】

19の調製：EtOH (50.0 mL) 中の8 (8.0 g、22.0 mmol) の溶液に、CH₃NH₂ (50.0 mL) 溶液を添加し、次いで反応混合物を室温で4時間攪拌

50

し、反応後、溶媒を濃縮して粗物質を得、これをEA (20.0 mL) 及びPE (10.0 mL) の混合溶媒に添加し、次いで混合物を30分間攪拌し、濾過して19 (5.5 g、収率96.5%) を得、これを次のステップに直接使用した。

【0333】

20の調製：(J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1992, 1943-1952) H₂O (50.0 mL) 及びAcOH (50.0 mL) 中の19 (5.0 g、19.3 mmol) の溶液に、NaNO₂ (65.0 g、772.0 mmol) を添加し、次いで反応混合物を室温で2時間攪拌し、反応後、反応混合物を濃縮して粗生成物を得、これをシリカゲルカラム (DCM: MeOH = 20:1 ~ 6:1) 及びMP LC (ACN: H₂O = 0:100 ~ 10:90) によって精製し、20 (3.0 g、収率59.6%) を得た。ESI-LCMS: m/z = 261.2 (M+H)⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.29 (s, 1H), 7.66 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 5.67 (dd, J = 17.5, 7.6 Hz, 2H), 4.74 (d, J = 36.0 Hz, 2H), 3.86-3.63 (m, 1H), 3.58-3.40 (m, 6H)。

10

【0334】

21の調製：ピリジン (30.0 mL) 中の20 (3.0 g、11.5 mmol) の溶液に、DMTrCl (3.9 g、11.5 mmol) を添加し、次いで、反応混合物を室温で2時間攪拌し、LC-MSは、原料が20.0%であり、生成物対副生成物の比が3:1であることを示し、次いで、混合物をNaHCO₃ (100.0 mL) の溶液に注ぎ、EA (100.0 mL) で抽出し、ブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、濾過し、濃縮して、残渣を得、これをシリカゲルカラムによって精製し、精製生成物及び副生成物を合計5.0 gとし、次いで、生成物をSFCによって精製して、21 (1.8 g、) を得た。ESI-LCMS: m/z = 561.2 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.31 (s, 1H), 7.69 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.45-7.15 (m, 8H), 6.88 (d, J = 8.5 Hz, 4H), 5.71 (d, J = 6.8 Hz, 1H), 5.64 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 4.79 (t, J = 5.5 Hz, 1H), 3.74 (s, 6H), 3.60 (s, 1H), 3.51 (d, J = 5.5 Hz, 3H), 3.11 (d, J = 6.7 Hz, 1H), 3.02 (d, J = 7.0 Hz, 1H)。

20

30

【0335】

22の調製：DCM (20.0 mL) 中の21 (1.8 g、3.2 mmol) の溶液に、CEP [N(iPr)₂]₂ (1.0 g、3.4 mmol) 及びDCI (321.0 mg、2.7 mmol) を添加した。混合物を室温で1時間攪拌した。LC-MSは、21が完全に消費されたことを示した。溶液をNaHCO₃溶液で2回洗浄し、ブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させた。次いで濃縮して残渣を得て、これを以下の条件 (IntelFlash-1): カラム、C₁₈シリカゲル、移動相、CH₃CN/H₂O (0.5% NH₄HCO₃) = 1/1を20分以内でCH₃CN/H₂O (0.5% NH₄HCO₃) = 1/0まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLCによって精製し、溶出した生成物をCH₃CN/H₂O (0.5% NH₄HCO₃) = 90/10、検出器、UV 254 nmで集めた。これにより、22 (2.0 g、収率82%) を得た。ESI-LCMS: m/z = 761.2 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.35 (s, 1H), 7.73 (dd, J = 8.0, 2.0 Hz, 1H), 7.39 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 7.35-7.18 (m, 7H), 6.94-6.82 (m, 4H), 5.81-5.74 (m, 1H), 5.67 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 4.11-3.85 (m, 1H), 3.82-3.67 (m, 11H), 3.67-3.50 (m, 5H), 3.17-3.09 (m, 1H), 3.09-3.01 (m, 1H), 2.74 (td, J = 5.8, 2.9 Hz, 2H), 1.13 (dd, J = 9.2, 6.7 Hz, 13H); ³¹P NMR (DMSO-d₆) δ 148.09 (d, J = 41.8 Hz)。


40

50

【 0 3 3 6 】

実施例 9

【化 9 8 】



10

20

30

40

50

スキームー 8

【 0 3 3 7 】

2 の調製 (J . Chem . Soc . , Perkin Trans . 1 , 1992 , 1943-1952) : DMF (1000 . 0 mL) 中の 1 (150 . 0 g 、 999 . 1 mmol) の溶液に、P-TsOH (1 . 7 g 、 10 . 0 mmol) を添加し、次いで、2, 2-ジメトキシプロパン (312 . 2 g 、 3 . 0 mol) を反応混合物に添加した。反応混合物を、室温で 5 時間攪拌した。90 . 0 % の 1 を、TLC によって消費した。次いで、NaHCO₃ (8 . 4 g 、 99 . 9 mmol) を反応混合物に添加し、30 分後に固

体を濾過し、有機相を真空によって濃縮して粗物質を得て、これをc. c. (PE : EA = 1 : 1 ~ 0 : 1) によって精製し、化合物2 (115.0 g、収率60.5%) を白色固体として得た。

【0338】

22の調製 (Rajkamal; Pathak, Navendu P.; Halder, Tanmoy; Dhara, Shubhajit; Yadav, Somnath [Chemistry – A European Journal, 2017, vol. 23, # 47, p. 11323–11329]) : ピリジン (600.0 mL) 中の2 (115.0 g、604.6 mmol) の溶液を0℃に冷却し、次いでAc₂O (185.2 g、1.81 mol) を反応混合物に滴下した。反応物を、室温で2時間攪拌し、原料を、TLCによって消費した。反応溶液を水に添加し、EAで生成物を抽出した。有機相をブラインで洗浄し、有機相をNa₂SO₄で乾燥させ、濃縮して22 (150.0 g、収率90.4%) を得て、これを次のステップに直接使用した。¹H NMR (400 MHz, クロロホルム-d) δ 6.20 (d, J = 3.4 Hz, 1H), 5.66 (d, J = 6.8 Hz, 1H), 5.17 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 5.10 (dd, J = 7.0, 3.4 Hz, 1H), 4.40–4.25 (m, 3H), 4.21 (dd, J = 7.0, 6.1 Hz, 1H), 4.16–4.02 (m, 3H), 3.95 (dd, J = 12.9, 4.4 Hz, 1H), 2.17 (s, 1H), 2.15–2.03 (m, 12H), 1.56 (d, J = 4.0 Hz, 6H), 1.37 (d, J = 3.1 Hz, 6H)。

10

【0339】

23の調製 : ACN (2200.0 mL) 中の22 (150.0 g、546.9 mmol) の溶液に、6-クロログアニン (139.1 g、820.4 mmol) 及びBSA (333.7 g、1.6 mol) を室温で添加し、次いで反応混合物を3回にわたってN₂に置き換えた。反応物を50℃で30分間攪拌した。その後、反応混合物をN₂下で0℃まで冷却した。次いで、TMSOTf (182.1 g、820.4 mmol) を混合物に添加した。添加後、反応物を70℃で1.5時間攪拌した。TLC及びLC-MSは、原料が消費されたことを示した。最も有機溶媒を真空によって濃縮し、次いで残渣を氷水中のNaHCO₃の水溶液に添加し、EA (4.0 L) で生成物を抽出し、Na₂SO₄上で有機相を乾燥させ、濾過及び濃縮して粗物質を得、これをc. c. (DCMからDCM : EA = 5 : 1) によって精製し、化合物23 (82.0 g、収率35.0%) を白色固体として得た。ESI-LCMS : m/z = 384.8 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.23 (s, 1H), 7.04 (d, J = 22.3 Hz, 2H), 5.57 (d, J = 9.6 Hz, 1H), 5.40 (dd, J = 9.6, 7.3 Hz, 1H), 4.48 (dd, J = 7.4, 5.4 Hz, 1H), 4.40–4.30 (m, 2H), 4.11 (dd, J = 13.6, 2.4 Hz, 1H), 1.81 (s, 3H), 1.55 (s, 3H), 1.34 (s, 3H)。

20

30

【0340】

24の調製 : DCM (1000.0 mL) 中の23 (82.0 g、192.3 mmol) の溶液に、Et₃N (59.4 g、576.9 mmol) 及びDMAP (2.4 g、19.2 mmol) を室温で添加した。反応混合物をN₂で3回置き換え、次いでMMTrCl (90.9 g、288.4 mmol) を混合物に添加した。この反応混合物を室温で一晩攪拌した。TLC及びLC-MSは、原料の92.0%を消費し、反応混合物を氷水中のNaHCO₃の水溶液に添加し、次いでEAで生成物を抽出したことを示した。有機相をブラインで洗浄し、有機相をNa₂SO₄で乾燥させた後、濃縮して粗物質を得て、これをc. c. (DCM) によって精製して、化合物24 (110.0 g、収率86.4%) を白色固体として得た。ESI-LCMS : m/z = 657.1 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.21 (s, 1H), 7.37–7.31 (m, 4H), 7.29–7.23 (m, 6H), 7.20–7.15 (m, 2H), 6.86–6.80 (m, 2H), 5.75 (s, 1H), 5.23 (dd, J = 9.6, 7.2 Hz, 1H), 4.85 (s, 1H), 4.44–4.16 (m, 3H), 3.

40

50

7.1 (s, 4H), 1.70 (s, 3H), 1.49 (s, 3H), 1.31 (s, 3H)。

【0341】

25の調製：THF (500.0 mL) 及び MeOH (160.0 mL) の混合溶媒中の24 (110.0 g、164.3 mmol) の溶液に、NH₄OH (330.0 mL) を添加した。反応混合物を、室温で一晩攪拌し、原料を、TLC及びLC-MSによって消費した。反応液を水に加え、生成物をEAで抽出した。有機相をブラインで洗浄し、次いで有機相をNa₂SO₄で乾燥させ、次いで濃縮して粗生成物を得て、これをc.c.

(PE:EA=10:1~1:2) によって精製し、化合物25 (98.0 g、収率94.2%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: m/z = 615.1 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.32 (s, 1H), 7.36 (dt, J=8.2, 1.4 Hz, 4H), 7.31-7.21 (m, 6H), 7.15 (t, J=7.2 Hz, 2H), 6.85-6.76 (m, 2H), 5.57 (d, J=4.6 Hz, 1H), 4.69 (s, 1H), 4.25 (dt, J=5.1, 2.4 Hz, 1H), 4.03 (q, J=7.1 Hz, 4H), 3.70 (s, 3H), 3.62-3.44 (m, 1H), 1.51 (s, 3H), 1.31 (s, 3H)。

10

【0342】

26の調製 (参照番号 WO2011/95576、2011、A1) : 25 (70.0 g、114.0 mmol) のCH₃I (350.0 mL) 溶液に、Ag₂O (79.2 g、342.0 mmol) を室温で添加した。次いで、反応混合物を、室温で4時間攪拌した。TLC及びLC-MSは、原料が消費されたことを示した。残渣を珪藻土で濾過し、濾液を真空濃縮して粗物質を得て、これをc.c. (PE:EA=10:1-1:1) によって精製し、化合物26 (28.0 g、収率31.3%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: m/z = 629.1 [M+H]⁺。

20

【0343】

27の調製：THF (200.0 mL) 中の3-ヒドロキシープロピオニトリル (15.6 g、219.7 mmol) の溶液を0℃まで冷却した。反応混合物を3回にわたってN₂に置き換えた。次いで、NaH (12.4 g、310.0 mmol、60.0%) を反応混合物に順番に添加した。反応物を室温で30分間攪拌した後、反応物を再び0℃まで冷却した。THF (150.0 mL) 中の26 (26.0 g、33.0 mmol) の溶液を、反応混合物に滴下した。次いで、反応混合物を、室温で一晩攪拌した。TLC及びLC-MSは、原料が消費されたことを示した。反応液を水に加え、生成物をEAで抽出した。有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、次いで濃縮して粗物質を得て、これをc.c. (DCM:MeOH=50:1-30:1) によって精製し、化合物27 (18.0 g、収率88.0%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: m/z = 610.7 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 10.68 (s, 1H), 7.90 (s, 1H), 7.69 (s, 1H), 7.34-7.15 (m, 12H), 6.92-6.81 (m, 2H), 4.46 (d, J=9.5 Hz, 1H), 4.22 (dt, J=5.5, 2.5 Hz, 1H), 4.07 (t, J=6.4 Hz, 1H), 3.84 (dd, J=13.5, 2.1 Hz, 1H), 3.64-3.54 (m, 1H), 3.36 (dd, J=13.3, 2.8 Hz, 1H), 3.08 (s, 3H), 2.59 (t, J=6.0 Hz, 3H), 1.49 (s, 3H), 1.30 (s, 3H)。

30

40

【0344】

28の調製 (. ; Beigelman, Leonid ; Deval, Jerome ; Jin, Zinan WO2014/201979, 2014, A1,) : DCM (300.0 mL) 中の27 (18.0 g、29.5 mmol) の溶液に、トリエチルシラン (70.0 mL) 及びDCA (10.0 mL) を室温で添加した。次いで、反応混合物を室温で6時間攪拌し、TLC及びLC-MSは、原料が消費されたことを示した。ほぼ有機溶媒を真空濃縮し、次いでPE (600.0 mL) を反応混合物に添加した。有機相を濾過

50

して固体を得て、これをMPLC (MeCN:H₂O=40:60~50:50) によって精製し、化合物28 (7.5 g、収率75.0%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: m/z=338.3 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 10.70 (s, 1H), 8.03 (s, 1H), 6.49 (s, 2H), 5.15 (d, J=9.6 Hz, 1H), 4.28 (d, J=5.1 Hz, 2H), 4.20 (d, J=13.6 Hz, 1H), 3.93 (ddd, J=13.3, 10.6, 3.7 Hz, 2H), 3.26 (s, 3H), 1.59 (s, 3H), 1.33 (s, 3H); [0345]

29の調製: Pyr (150.0 mL) 中の28 (7.0 g、20.6 mmol) の溶液を0℃に冷却した。次いで、反応混合物を、i-BuCl (6.6 g、61.8 mmol) を滴下した。反応混合物を30分間攪拌し、TLC及びLC-MSは、原料が消費されたことを示した。反応液を氷水に添加し、生成物をEAで抽出した。有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、濾過し、濃縮して粗物質を得て、これをc.c. (DCM: MeOH=100:1~30:1) によって精製し、化合物29 (5.8 g、収率68.6%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: m/z=409.4 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.13 (s, 1H), 11.66 (s, 1H), 8.39 (s, 1H), 5.24 (d, J=9.6 Hz, 1H), 4.36-4.23 (m, 3H), 3.99-3.88 (m, 2H), 3.27 (s, 4H), 2.78 (hept, J=6.8 Hz, 1H), 1.61 (s, 3H), 1.35 (s, 3H), 1.12 (d, J=6.8 Hz, 6H)。

10

20

[0346]

30の調製: 29 (5.8 g、14.1 mmol) の溶液を、HCOOH (54.0 mL) 及びH₂O (6.0 mL) の混合溶媒に室温で添加した。次いで、反応混合物を、室温で1時間攪拌した。TLC及びLC-MSは、原料が消費されたことを示した。反応溶液を室温で真空濃縮して、化合物30 (5.2 g、14.0 mmol、収率98.0%) を得て、これを次のステップに直接使用した。ESI-LCMS: m/z=368.4 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.13 (s, 1H), 11.72 (s, 1H), 8.30 (s, 1H), 8.14 (s, 2H), 5.19 (d, J=9.2 Hz, 1H), 3.93 (t, J=9.2 Hz, 1H), 3.85 (dd, J=12.4, 1.9 Hz, 1H), 3.77 (d, J=3.7 Hz, 1H), 3.69-3.62 (m, 2H), 3.20 (s, 3H), 2.79 (h, J=6.8 Hz, 1H), 1.13 (dd, J=6.9, 1.2 Hz, 6H)。

30

[0347]

31の調製: ジオキサン (90.0 mL) 及びH₂O (30.0 mL) 中の30 (5.2 g、14.0 mmol) の溶液に、NaIO₄ (3.7 g、15.4 mmol) を室温で添加した。反応混合物を、室温で3時間攪拌した。LC-MSは、原料が消費され、反応溶液が0℃まで冷却されたことを示した。次いでNaBH₄ (970.0 mg、25.2 mmol) を反応混合物に添加し、原料を3時間後にLC-MSによって消費した。反応液を塩化アンモニウムでクエンチし、pHを1N HClで6~7に調節し、混合物溶液を濃縮して粗物質を得て、これをc.c. (DCM: MeOH=100:1~30:1) によって精製し、化合物31 (4.0 g、収率68.6%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: m/z=370.4 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 11.91 (d, J=151.0 Hz, 2H), 8.62-8.51 (m, 1H), 8.18 (s, 1H), 7.44-7.33 (m, 1H), 5.62 (d, J=7.9 Hz, 1H), 4.84 (t, J=5.7 Hz, 1H), 4.65 (d, J=5.2 Hz, 1H), 3.84 (dd, J=7.7, 3.5 Hz, 1H), 3.76 (ddd, J=12.1, 4.7, 2.7 Hz, 1H), 3.60 (ddd, J=12.0, 5.8, 3.6 Hz, 1H), 3.46 (d, J=8.8 Hz, 2H), 3.16 (s, 3H), 2.77 (h, J=6.8 Hz, 1H), 1.12 (dd, J=6.8, 2.4 Hz, 6H);

40

50

【0348】

32の調製：31（4.0g、6.4mmol）の溶液をピリジン（100.0mL）に溶解し、反応混合物を3回にわたってN₂に置き換え、次いでDMTrCl（5.1g、8.9mmol）を反応混合物に室温で添加した。次いで、反応物を30分間攪拌し、TLC及びLC-MSは、原料を消費したことを示した。反応液を氷水に加え、EAで生成物を抽出した。有機相をブラインで洗浄し、有機相をNa₂SO₄で乾燥させ、濃縮して粗物質を得て、これをc.c.（DCM：MeOH＝100：1～30：1）及びSFCによって精製し、化合物32（2.7g、収率37.1%）を白色固体として得た。ESI-LCMS：m/z＝672.7 [M+H]⁺；¹H NMR（400MHz，DMSO-d₆）δ 11.50（s，2H），8.22（s，1H），7.32－7.24（m，4H），7.22－7.12（m，5H），6.84（dd，J＝9.0，2.4Hz，4H），5.63（d，J＝7.9Hz，1H），4.85（t，J＝5.6Hz，1H），3.95（dt，J＝7.4，3.3Hz，1H），3.85－3.77（m，1H），3.73（s，7H），3.65－3.57（m，1H），3.43（ddt，J＝9.9，6.9，3.4Hz，1H），3.05（ddd，J＝10.0，6.2，3.3Hz，1H），2.96（ddd，J＝10.0，5.6，3.4Hz，1H），2.78（p，J＝6.8Hz，1H），1.11（d，J＝6.7Hz，6H）。

10

【0349】

33の調製：DCM（35.0mL）中の32（2.7g、2.4mmol）の溶液に、DCI（390.0mg、2.0mmol）を室温で添加した。次いで、CEP [N(iPr)₂]₂（1.2g、2.5mmol）を反応混合物に添加し、次いで、反応混合物を室温で30分間攪拌した。LC-MSは、原材料が消費されたことを示した。反応液をNaHCO₃の氷水水溶液に添加し、生成物をDCMで抽出し、有機相をブラインで洗浄し、有機相をNa₂SO₄で乾燥させ、次いで濾過し、濃縮して残渣を得て、これを以下の条件（IntelFlash-1）：カラム、C18シリカゲル、移動相、CH₃CN/H₂O（0.5%NH₄HCO₃）＝1/1を20.0分以内にCH₃CN/H₂O（0.5%NH₄HCO₃）＝100/0まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLCによって精製し、溶出した生成物をCH₃CN/H₂O（0.5%NH₄HCO₃）＝100/0、検出器、UV254nmで集めた。これにより、化合物33（2.0g、収率56.4%）を白色固体として得た。ESI-LCMS：m/z＝872.3 [M+H]⁺；¹H NMR（400MHz，DMSO-d₆）δ 11.79（s，2H），8.23（d，J＝1.7Hz，1H），7.35－7.07（m，9H），6.92－6.75（m，4H），5.52（d，J＝8.0Hz，1H），4.21（s，1H），4.10－3.99（m，1H），3.84－3.65（m，10H），3.63－3.52（m，2H），3.45（ddd，J＝10.2，6.7，3.6Hz，1H），3.34（s，1H），3.22（s，3H），3.07（ddd，J＝10.2，6.4，3.4Hz，1H），2.97（ddd，J＝10.0，5.6，3.5Hz，1H），2.78（dt，J＝12.2，6.4Hz，3H），1.20－1.05（m，18H），³¹P NMR（162MHz，DMSO-d₆）δ 148.20，147.13。

20


30

40

【0350】

実施例10：

【化 9 9】



スキーム 9

【0351】

実施例 11

10


20

30

40

50

【化 1 0 0】



スキームー 1 0

【 0 3 5 2】

2 の調製：乾燥 THF (100.0 mL) 中の 1-ブロモナフタレン (5.2 g、25.0 mmol) の溶液に、 $n\text{-BuLi}$ (13.5 mL、21.7 mmol、1.6 M) を -78°C で滴下し、次いで混合物を -78°C で 0.5 時間攪拌し、その後、THF (20.0 mL) 中の 1 (5.5 g、16.7 mmol) の溶液を、内部温度を -70°C 未満に維持しながら滴下した混合物に添加し、次いで反応混合物を -70°C で 1 時間攪拌した。LC-MS は、1 を完全に消費し、反応物を飽和塩化アンモニウム溶液 (80.0 mL) でクエンチし、EA で抽出し、有機層をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、減圧下で濃縮して残渣を得て、これを以下の条件 (IntelFlash-1)：カラム、 C_{18} シリカゲル、移動相、 $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}$ (0.5% NH_4HCO_3) = 2/3 を 25 分以内に $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}$ (0.5% NH_4HCO_3) = 4/1 まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLC によって精製し、溶出した生成物を $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}$ (0.5% NH_4HCO_3) = 3/2、検出器、UV 254 nm で集めた。これにより、2 (5.8 g、収率 76.3%) を白色固体として得た。ESI-LCMS： m/z 441 [M-OH] $^-$ 。

【 0 3 5 3】

3 の調製：DCM (100.0 mL) 中の 2 (5.8 g、12.6 mmol) の溶液に、TES (1.7 g、14.7 mmol) を -78°C 、 BF_3 で添加した。 Et_2O (2.7 g、18.9 mmol) を -78°C で混合物に添加した。混合物を -40°C で 1 時間攪拌した。LC-MS は、2 が完全に消費され、溶液を飽和炭酸水素ナトリウム溶液 (50.0 mL) に添加し、DCM で抽出したことを示した。有機層をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、減圧下で濃縮して残渣を得て、これを以下の条件 (IntelFlash-1)：カラム、 C_{18} シリカゲル、移動相、 $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}$ (0.5% NH_4HCO_3) = 2/3 を 25 分以内に $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}$ (0.5% NH_4HCO_3) = 4/1 まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLC によって精製し、溶出した生成物を $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}$ (0.5% NH_4HCO_3) = 7/3、検出器、UV 254

nmで集めた。これにより、3 (2.7 g、48.2%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: m/z 460 $[M+H_2O]^+$; ^1H -NMR (600 MHz, $CDCl_3$): δ 8.01–8.00 (d, $J=6.5$ Hz, 1H), 7.88–7.87 (d, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.77–7.76 (d, $J=8.2$ Hz, 1H), 7.56–7.49 (m, 2H), 7.38–7.23 (m, 11H), 6.98–5.94 (d, $J=26.9$ Hz, 1H), 5.09–4.99 (dd, $J=61.1$ Hz, 1H), 4.71–4.69 (d, $J=11.6$ Hz, 1H), 4.66–4.59 (m, 2H), 4.43–4.41 (d, $J=11.6$ Hz, 2H), 4.14–4.08 (m, 1H), 4.02–4.00 (dd, $J=13.4$ Hz, 1H), 3.81–3.78 (dd, $J=14.8$ Hz, 1H); ^{19}F -NMR ($CDCl_3$): δ -193.24.
【0354】

4の調製: 乾燥DCM (40.0 mL) 中の3 (2.7 g、6.0 mmol) の溶液に、-78℃で BCl_3 (36.0 mL、36.0 mmol、1M) を滴下し、反応混合物を-78℃で0.5時間攪拌した。LC-MSは、3が完全に消費されたことを示した。反応完了後、得られた混合物を、MeOH (20.0 mL) でクエンチし、次いで、水酸化ナトリウム溶液 (40.0 mL、2M) で中和した。混合物をDCMで抽出し、濃縮して粗物質を得、粗物質をMeOH (30.0 mL) 中に溶解させ、水酸化ナトリウム溶液 (30.0 mL、4M) を添加し、混合物を室温で30分間攪拌した。混合物をEAで抽出し、有機層をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、減圧下で濃縮して残渣を得、これをシリカゲルカラムクロマトグラフィー (DCM: MeOH=40:1~15:1) によって精製し、4 (1.3 g、81.2%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: m/z 261 $[M-H]^-$; ^1H -NMR ($DMSO-d_6$): δ 7.98–7.97 (d, $J=10.2$ Hz, 2H), 7.89–7.87 (m, 2H), 7.63–7.49 (m, 3H), 5.80–5.76 (d, $J=26.3$ Hz, 1H), 5.43 (s, 1H), 5.00 (s, 1H), 4.85–4.76 (d, $J=58.4$ Hz, 1H), 4.03–3.85 (m, 3H), 3.68–3.66 (m, 1H), 3.65–3.53 (m, 1H); ^{19}F -NMR ($DMSO-d_6$): δ -192.76.

【0355】

5の調製: ピリジン (20.0 mL) 中の4 (1.3 g、5.0 mmol) の溶液に、DMTrCl (6.1 g、16.0 mmol) を室温で添加した。反応混合物を室温で1時間攪拌した。LC-MSは、4を消費したことを示し、水 (100.0 mL) を添加した。生成物をEAで抽出し、有機層をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、濃縮して粗物質を得、これをシリカゲル (EA: PE=1:30~1:10) によって更に精製し、5 (2.2 g、78.5%) を黄色固体として得た。ESI-LCMS: m/z 563 $[M-H]^-$; ^1H -NMR (600 MHz, $DMSO-d_6$): δ 8.03–7.99 (m, 2H), 7.91–7.86 (m, 2H), 7.64–7.57 (m, 2H), 7.49–7.48 (d, $J=6.8$ Hz, 2H), 7.40–7.24 (m, 8H), 6.89–6.88 (m, 4H), 5.92–5.88 (d, $J=26.6$ Hz, 1H), 5.50–5.49 (d, $J=4.5$ Hz, 1H), 4.96–4.87 (d, $J=56.2$ Hz, 1H), 4.18–4.14 (m, 2H), 3.74 (s, 6H), 3.42–3.40 (d, $J=9.9$ Hz, 1H), 3.33 (m, 2H); ^{19}F -NMR ($DMSO-d_6$): δ -192.18.

【0356】

6の調製: DCM (20.0 mL) 中の5 (2.2 g、3.9 mmol) の懸濁液に、DCI (391.0 mg、3.3 mmol) 及びCEP $[N(iPr)_2]_2$ (1.4 g、4.7 mmol) を添加した。混合物を室温で1時間攪拌した。LC-MSは、5が完全に消費されたことを示した。溶液を飽和重炭酸ナトリウム溶液及びブラインで連続して洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、濃縮して粗物質を得、これを以下の条件 (Intel Flash-1): カラム、 C_{18} シリカゲル、移動相、 CH_3CN/H_2O (0.5% NH_4HCO_3) = 1/1 を20分以内で CH_3CN/H_2O (0.5% NH_4HCO_3)


3) = 1 / 0 まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLCによって精製し、溶出した生成物を $\text{CH}_3\text{CN} / \text{H}_2\text{O}$ (0.5% NH_4HCO_3) = 1 / 0、検出器、UV 254 nm で集めた。これにより、6 (2.5 g、83.8%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: m/z 765 $[\text{M}+\text{H}]^+$; $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, DMSO-d_6): δ 8.07–7.86 (m, 4H), 7.64–7.56 (m, 2H), 7.49–7.45 (m, 2H), 7.41–7.21 (m, 8H), 6.89–6.84 (m, 4H), 6.02–5.93 (m, 1H), 5.19–4.98 (m, 1H), 4.61–4.34 (m, 1H), 4.26–4.24 (m, 1H), 3.74–3.73 (m, 6H), 3.70–3.61 (m, 1H), 3.57–3.42 (m, 4H), 3.29–3.24 (m, 1H), 2.67–2.64 (m, 1H), 2.56–2.52 (m, 1H), 1.09–1.04 (m, 1H), 0.98–0.97 (d, $J=6.7\text{ Hz}$, 3H), 0.89–0.87 (d, $J=6.7\text{ Hz}$, 3H); $^{19}\text{F-NMR}$ (DMSO-d_6): δ -191.75, -191.76, -191.84, -191.85; $^{31}\text{P-NMR}$ (DMSO-d_6): δ 149.51, 149.47, 149.16, 149.14.

10


【0357】

実施例 12


【化101】



20



30



40

スキーム-11

【0358】

ALG-14-5-008Bの調製

50

DMF (70 mL) 中の PH-ALIG-14-4-8 (実施例 5 由来) (6.6 g、10.86 mmol、純度 85%、1 当量) 及び DBU (3.31 g、21.72 mmol、3.27 mL、2 当量) の溶液に、BOMCl (2.55 g、16.29 mmol、2.26 mL、1.5 当量) を 0℃ で添加した。混合物を 20℃ で 12 時間攪拌した。混合物を EtOAc (180 mL) で希釈し、H₂O (80 mL × 3)、及びブライン (80 mL) で洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濾過し、減圧濃縮して、残渣を得た。残渣をフラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ISCO (登録商標)、80 g SepaFlash (登録商標) シリカフラッシュカラム、10~60% の溶離液、EtOAc/PE 勾配、60 mL/分) によって精製して、ALG-14-5-008B (5.2 g、収率 70%) を白色発泡体として得た。LCMS (ESI): m/z 659.1; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ = 7.63 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 7.40-7.15 (m, 14H), 6.85 (t, J = 8.0 Hz, 4H), 5.97 (s, 1H), 5.75 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 5.39-5.26 (m, 2H), 5.24 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 4.61 (s, 2H), 3.97 (s, 1H), 3.94-3.83 (m, 2H), 3.68 (d, J = 10.0 Hz, 6H), 3.38 (s, 1H)

10

【0359】

ALG-14-5-009A の調製

THF (50 mL) 中の ALG-14-5-008B (5.2 g、8.17 mmol、1 当量) 及びジメトキシホスホリルメチルトリフルオロメタンスルホネート (6.67 g、24.50 mmol、3 当量) の溶液に、NaH (816.65 mg、20.42 mmol、60% 純度、2.5 当量) を -5℃ で添加した。混合物を 0℃ で 0.5 時間攪拌した。反応混合物を、添加 H₂O (50 mL) によってクエンチし、EtOAc (100 mL) で希釈し、次いで H₂O (50 mL)、ブライン (50 mL) で洗浄し、有機層を Na₂SO₄ で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮した。残渣をフラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ISCO (登録商標)、80 g SepaFlash (登録商標) シリカフラッシュカラム、0~50% の EtOAc/DCM 勾配の溶離液、60 mL/分) によって精製して、ALG-14-5-009A (4.2 g、収率 66.42%) を白色発泡体として得た。LCMS (ESI): m/z 781.1 [M+Na]⁺, ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ = 7.49-7.25 (m, 14H), 7.21-7.15 (m, 1H), 6.82 (d, J = 8.8 Hz, 4H), 6.46 (s, 1H), 5.65 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 5.57-5.39 (m, 2H), 4.72 (s, 2H), 4.16-4.07 (m, 2H), 3.93 (dd, J = 2.6, 10.8 Hz, 1H), 3.81-3.59 (m, 11H), 3.81-3.59 (m, 1H), 3.24 (dd, J = 10.6, 13.5 Hz, 1H), 3.10 (dd, J = 9.8, 13.3 Hz, 1H), 2.79 (d, J = 2.2 Hz, 1H); ³¹P NMR (CD₃CN) δ = 22.37 (s)

20

30

【0360】

ALG-14-5-010A の調製

MeCN (15 mL) 中の ALG-14-5-009A (4.6 g、6.06 mmol、1 当量) 及び NaI (2.73 g、18.19 mmol、3 当量) の溶液に、クロロメチル 2, 2-ジメチルプロパノエート (3.65 g、24.25 mmol、3.51 mL、4 当量) を添加した。混合物を 85℃ で 24 時間攪拌した。反応混合物を減圧下で濃縮して、残渣を得た。残渣をフラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ISCO (登録商標)、40 g SepaFlash (登録商標) シリカフラッシュカラム、0~50% の EtOAc/PE 勾配の溶離液、40 mL/分) によって精製して、ALG-14-5-010A (2.7 g、収率 44.6%) を淡黄色固体として得た。LCMS (m/z): 981.1 [M+Na]⁺.

40

【0361】

ALG-14-5-010C の調製

50

DCM (20 mL) 中の ALG-14-5-010A (2.7 g、2.82 mmol、1 当量) の溶液に、Et₃SiH (645.45 mg、2.82 mmol、5 mL、1 当量) を添加し、続いて TFA (1.54 g、13.51 mmol、1 mL、4.80 当量) を添加した。混合物を 20℃ で 0.5 時間攪拌した。反応混合物を減圧下で濃縮して、残渣を得た。残渣をフラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ISCO (登録商標)、24 g SepaFlash (登録商標) シリカフラッシュカラム、0~50% の EtOAc / DCM 勾配の溶離液、30 mL / 分) によって精製して、ALG-14-5-010C (1.6 g、収率 84.82%) を淡黄色固体として得た。LCMS (ESI): m/z 679.1 [M+Na]⁺; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ = 7.44 (d, J=8.2 Hz, 1H), 7.38-7.26 (m, 5H), 5.76 (d, J=8.2 Hz, 1H), 5.69-5.62 (m, 4H), 5.51-5.43 (m, 1H), 5.51-5.43 (m, 1H), 4.70 (s, 2H), 4.30 (s, 1H), 4.26-4.06 (m, 4H), 3.90 (dd, J=4.9, 8.4 Hz, 2H), 3.22-3.06 (m, 1H), 1.22 (s, 18H); ³¹P NMR (162 MHz, CD₃CN) δ = 20.25 (s, 1P)。

10

【0362】

ALG-14-5-011A の調製

イソプロパノール (20 mL) 及び H₂O (2 mL) 中の ALG-14-5-010C (1.4 g、2.13 mmol、1 当量) の混合物に、Pd/C (1.4 g、) 及び HCOOH (51.22 mg、1.07 mmol、2 mL) を N₂ 下で添加した。懸濁液を、真空下で脱気し、H₂ で数回パージした。混合物を、H₂ (15 psi) 下で、15℃ で 5 時間攪拌した。反応混合物を濾過し、濾液を濃縮して残渣を得た。残渣をフラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ISCO (登録商標)、24 g SepaFlash (登録商標) シリカフラッシュカラム、0~50% の EtOAc / DCM 勾配の溶離液、30 mL / 分) によって精製して、ALG-14-5-011A (848 mg、収率 74.14%) を白色発泡体として得た。LCMS (ESI): m/z 537.0 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ = 10.01 (s, 1H), 7.53 (d, J=8.0 Hz, 1H), 5.78-5.63 (m, 6H), 4.40 (s, 1H), 4.35-4.22 (m, 3H), 4.11 (d, J=1.5 Hz, 1H), 3.88 (d, J=8.5 Hz, 2H), 1.22 (s, 18H); ³¹P NMR (162 MHz, CD₃CN) δ = 20.17 (s, 1P.)

20

30

【0363】

ALG-14-5 の調製

DCM (10 mL) 中の ALG-14-5-011A (848 mg、1.58 mmol、1 当量) の溶液に、3-ビス (ジイソプロピルアミノ) ホスファニルオキシプロパンニトリル (571.73 mg、1.90 mmol、602.45 µL、1.2 当量) を 0℃ で添加し、続いて 1H-イミダゾール-4, 5-ジカルボニトリル (186.7 mg、1.58 mmol、1 当量) を添加した。混合物を 15℃ で 1 時間攪拌した。反応混合物を、飽和 NaHCO₃ 水溶液 (10 mL) の添加によってクエンチし、DCM (20 mL) で希釈した。次いで、有機層を、飽和 NaHCO₃ 水溶液 (10 mL * 2) で洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮した。残渣をフラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ISCO (登録商標); 12 g SepaFlash (登録商標) シリカフラッシュカラム、0~50% の溶離液、相 A: 0.5% TEA を含む PE; 相 B: 10% EtOH、30 mL / 分の EA) によって精製し、ALG-14-5 (720 mg、収率 61.21%) を無色油として得た。LCMS (ESI): m/z 737.1 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, CD₃CN) δ = 9.17 (s, 1H), 7.49 (d, J=8.0 Hz, 1H), 5.91-5.77 (m, 1H), 5.65-5.54 (m, 5H), 4.49-4.26 (m, 2H), 4.23-4.07 (m, 2H), 3.92-3.55 (m, 6H), 2.71-2.61 (m, 2H), 1.24-1.16 (m, 30H); ³¹P NMR (162 MHz, CD₃CN) δ = 151.59。


40

50

【 0 3 6 4 】

実施例 13 : 102 の合成

【化 102】




スキームー 12

【 0 3 6 5 】

実施例 14 : 103 の合成

【化 103】




スキームー 13

【 0 3 6 6 】

実施例 15 : 104 の合成

【 化 1 0 4 】



スキーム - 1 4

【 0 3 6 7 】

実施例 16 : 105 の合成

10


20

30


40

50

【化 1 0 5】



10



20

スキーム－15

【0368】


実施例17

30

40

50

【化 106】



10

20

30

スキームー 16

【0369】

2の調製：磁気攪拌器及び温度計を備えた2Lの3つ口丸底フラスコに、室温で乾燥DMF(600.0mL)中の1(60.0g、228.8mmol)を充填し、イミダゾール(95.2g、1.3mol)を混合物反応に添加し、次いで反応混合物を5℃になるまで冷却し、TBSCl(76.8g、499.3mmol)を混合物反応に添加し、反応混合物を室温で12時間攪拌した。1をLCMSによって消費し、次いで反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム溶液(1.0L)中に添加し、反応をクエンチした後、水層をEA(400.0mL×2)で抽出し、合わせた有機層を飽和ブラインで洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、有機層を濃縮して、粗物質2(110.2g、212.8mmol、収率93.1%)を白色固体として得、粗生成物を精製することなく次のステップに直接的に使用した。ESI-LCMS： $m/z = 487.3 [M+H]^+$ 。

40

【0370】

3の調製：磁気攪拌器及び温度計を備えた3Lの3つ口丸底フラスコに、THF(550.0mL)中の2(117.0g、225.9mmol)を室温で充填し、水(275.0mL)を混合物反応物に添加し、次いで反応混合物を冷却して0℃に回し、4時間後に定圧漏斗によってTFA(275.0mL)を添加し、反応混合物を0℃で2時間攪拌

50

した。2をTLCによって消費した。次いで、反応混合物を水酸化アンモニウム（250.0 mL）及び水（800.0 mL）の混合溶媒中に0℃で添加し、反応をクエンチした後、水層をEA（500.0 mL×2）で抽出し、合わせた有機層を飽和ブラインで洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、有機層を濃縮して粗物質を得て、これをシリカゲルカラムクロマトグラフィー（PE：EA=10：1～0：1）によって精製し、化合物3（51.1 g、収率59.3%）を白色固体として得た。¹H-NMR（600 MHz，DMSO-d₆）：δ = 11.35（s，1H），7.919（d，J=6 Hz，1H），5.82（s，1H），5.65（d，J=6 Hz，1H），5.18（s，1H），4.29（s，1H），3.83（s，2H），3.65（d，J=12 Hz，1H），3.53（d，J=6 Hz，1H），3.32（d，J=6 Hz，1H），0.87（s，9H），0.08（s，6H）。ESI-LCMS：m/z = 373.1 [M+H]⁺。 10

【0371】

4の調製：磁気攪拌器及び温度計を備えた3 Lの3つ口丸底フラスコに、DCM（250.0 mL）及びDMF（70.0 mL）の混合溶媒中の3（50.0 g、131.5 mmol）を室温で充填し、混合溶液を冷却して5℃にし、PDC（63.1 g、164.4 mmol）及びt-BuOH（200.0 mL）を混合反応物に添加し、反応を5℃に維持し、0.5時間後に定圧漏斗によってAc₂O（130.0 mL）を添加し、反応混合物を室温で4時間攪拌した。3をlc-msによって消費し、次いで反応混合物を飽和重炭酸ナトリウム（400.0 mL）中に添加し、反応をクエンチした後、水層をDCM（500.0 mL×2）で抽出し、合わせた有機層を飽和ブラインで洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、有機層を濃縮して粗物質を得て、これをシリカゲルカラムクロマトグラフィー（PE：EA=10：1～2：1）によって精製し、化合物4（29.8 g、収率50.6%）を白色固体として得た。¹H-NMR（DMSO-d₆）：δ = 11.42（s，1H），8.04（d，J=6 Hz，1H），5.82（s，1H），5.78（d，J=6 Hz，1H），4.44（s，1H），4.25（s，1H），3.84（s，1H），3.32（s，3H），1.46（s，9H），0.89（s，9H），0.12（s，6H）。ESI-LCMS：m/z = 443.1 [M+H]⁺。 20

【0372】

5の調製：乾燥THF（330.0 mL）中の4（33.0 g、74.7 mmol）の溶液に、CH₃OD（66.0 mL）及びD₂O（33.0 mL）を室温で添加した。次いで、反応混合物に、NaBD₄（9.4 g、224.0 mmol）を50℃で1時間に3回添加した。溶液を、50℃で3時間攪拌した。LCMSは、4が消費されたことを示した。水（300.0 mL）を添加した。生成物をEA（2×300.0 mL）で抽出した。有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄によって乾燥させた。次いで、溶液を減圧下で濃縮し、粗物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（PE：EA=10：1～3：1）によって精製して、5（19.1 g、68.5%収率）を白色固体として得た。¹H-NMR（600 MHz，DMSO-d₆）：δ = 11.35（s，1H），7.92-7.91（d，J=6 Hz，1H），5.83-5.82（d，J=6 Hz，1H），5.66-5.65（d，J=6 Hz，1H），5.14（s，1H），4.30-4.28（m，1H），3.84-3.82（m，2H），3.34（s，3H），0.88（s，9H），0.09（s，6H）。ESI-LCMS：m/z 375 [M+H]⁺。 30

6の調製：乾燥ACN（190.0 mL）中の5（19.1 g、51.1 mmol）の溶液に、Et₃N（20.7 g、204.6 mmol）を室温で、及びTMSCl（11.1 g、102.1 mmol）を0℃で添加した。次いで、反応混合物を室温で40分間攪拌した。LCMSは、5が消費され、中間体が形成されたことを示した。次いで、溶液をDMAP（12.5 g、102.3 mmol）、Et₃N（10.3 g、102.1 mmol）及びTPSCl（23.2 g、76.6 mmol）を添加した。反応混合物を室温で15時間攪拌した。LCMSは、中間体が消費され、別の中間体に適合したことを示した。次いで、NH₄OH（200.0 mL）を添加し、室温で24時間攪拌して、生成物 40 50

の混合物を得た。生成物をEA (2*200.0 mL) で抽出した。有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄によって乾燥させた。次いで、溶液を減圧下で濃縮し、粗物質を、以下の条件 (IntelFlash-1) : カラム、C18シリカゲル、移動相、CH₃CN/H₂O = 1/2 を20分以内でCH₃CN/H₂O = 1/0まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLCによって精製し、溶出した生成物をCH₃CN/H₂O = 1/0、検出器、UV 254 nmで集めた。これにより、6 (14.0 g、収率73.7%) を得た。¹H-NMR (DMSO-d₆) : δ = 7.89-7.88 (d, J = 6 Hz, 1H), 7.20-7.18 (d, J = 12 Hz, 2H), 5.85-5.84 (d, J = 6 Hz, 1H), 5.73-5.72 (d, J = 6 Hz, 1H), 5.09 (s, 1H), 4.24-4.23 (m, 1H), 3.81-3.80 (d, J = 6 Hz, 1H), 3.69-3.68 (m, 1H), 3.36 (s, 3H), 0.87 (s, 9H), 0.07 (s, 6H). ESI-LCMS: m/z 374 [M+H]⁺.

【0373】

7の調製: ピリジン (140.0 mL) 中の6 (14.0 g、37.5 mmol) の溶液に、TMSCl (6.3 g、58.0 mmol) を0℃で添加し、混合物を室温で1.5時間攪拌した。LCMSは、6が消費され、中間体(a)が形成されたことを示した。次いで、BzCl (10.8 g、76.8 mmol) を0℃で添加し、混合物を、室温で1.5時間攪拌した。LCMSは、中間体が消費され、別の中間体が形成されたことを示した。次いで、混合物を、NH₄OH (30.0 mL) に添加し、室温で15時間攪拌した。LCMSは、中間体が消費されたことを示した。水 (300.0 mL) を添加し、溶液をEA (2*200.0 mL) で抽出した。有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄によって乾燥させた。次いで、溶液を減圧下で濃縮し、粗物質を、以下の条件 (IntelFlash-1) : カラム、C18シリカゲル、移動相、CH₃CN/H₂O = 1/1 を20分以内でCH₃CN/H₂O = 1/0まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLCによって精製し、溶出した生成物をCH₃CN/H₂O = 1/0、検出器、UV 254 nmで集めた。これにより、7 (10.5 g、収率58.6%) を得た。¹H-NMR (600 MHz, DMSO-d₆) : δ = 11.29 (s, 1H), 8.53-8.52 (d, J = 6 Hz, 1H), 8.01-8.00 (d, J = 6 Hz, 2H), 7.63-7.61 (m, 1H), 7.52-7.50 (m, 2H), 7.36 (s, 1H), 5.88 (s, 1H), 5.24 (s, 1H), 4.28-4.26 (m, 1H), 3.91 (s, 1H), 3.81-3.79 (m, 1H), 3.46 (s, 3H), 0.87 (s, 9H), 0.08 (s, 6H). ESI-LCMS: m/z 478 [M+H]⁺.

【0374】

8の調製: DMSO (105.0 mL) 中の7 (10.5 g、22.0 mmol) の溶液に、EDCI (12.7 g、66.0 mmol)、乾燥ピリジン (1.7 g、22.0 mmol) (室温)、及びTFA (1.3 g、11.0 mmol) (0℃) を添加した。次いで、反応混合物を1時間攪拌した。LCMSは、7が消費されたことを示した。水 (100.0 mL) を添加した。溶液をEA (2*200.0 mL) で抽出した。有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄によって乾燥させた。次いで、溶液を減圧下で濃縮して、粗生成物8を得て、これを次のステップに直接的に使用した。ESI-LCMS: m/z 475 [M+H]⁺.

【0375】

9の調製: 乾燥THF (120.0 mL) 及びD₂O (40.0 mL) 中の8の溶液に、K₂CO₃ (12.2 g、88.1 mmol) 及び7a (16.8 g、26.5 mmol) を添加し、次いで、反応混合物をN₂雰囲気下、35℃で15時間攪拌した。LCMSは、95% 7が消費されたことを示した。水 (60.0 mL) を添加し、溶液をEA (2*150.0 mL) で抽出した。有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄によって乾燥させた。次いで、溶液を減圧下で濃縮し、粗物質を、以下の条件 (IntelFlash-1) : カラム、C18シリカゲル、移動相、CH₃CN/H₂O = 1/1 を20分以内でCH₃CN/H₂O = 4/1まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLC

によって精製し、溶出した生成物を $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}=1/0$ 、検出器、UV 254 nm で集めた。これにより、9 (9.3 g、収率 54.1%) を得た。 $^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) $\delta = 11.33$ (s, 1H), 8.17–8.15 (d, $J=12$, 1H), 8.02–8.00 (d, $J=12$, 1H), 7.64–7.62 (m, 1H), 7.53–7.50 (m, 2H), 7.44–7.42 (d, $J=12$, 1H), 4.46–4.44 (d, $J=12$, 1H), 4.24–4.23 (d, $J=6$, 1H), 3.93–3.91 (d, $J=12$, 1H), 1.16 (s, 18H), 0.86 (s, 9H), 0.08–0.06 (d, $J=12$, 6H). ESI-LCMS : m/z 782 $[\text{M}+\text{H}]^+$. $^{31}\text{P-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) $\delta = 16.77, 16.00$.

【0376】

10の調製: HOAc (140.0 mL) 及び H_2O (140.0 mL) の混合溶液中の 9 (9.3 g、11.9 mmol) を 30°C で 15 時間攪拌した。 LCMS は、9 が消費されたことを示した。溶液を氷水中に添加し、 EA (2×300.0 mL) で抽出した。有機層を $\text{pH}=6\sim7$ にクエンチし、次いでブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させた。次いで、溶液を還元下で濃縮し、粗物質を、以下の条件 (IntelFlash-1): カラム、C18 シリカゲル、移動相、 $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}=1/2$ を 20 分以内に $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}=2.5/1$ まで増加させつつ、圧力 Flash-Prep-HPLC によって精製し、溶出した生成物を $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}=1/0$ 、検出器、UV 254 nm で集めた。これにより、10 (5.1 g、収率 64.6%) を得た。 $^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) $\delta = 9.09$ (s, 1H), 7.92–7.85 (m, 3H), 7.60–7.48 (m, 4H), 6.02 (s, 1H), 5.71–5.64 (m, 4H), 4.53–4.51 (m, 1H), 3.94–3.70 (m, 5H), 3.31 (s, 1H), 1.21 (s, 18H). $^{31}\text{P-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) $\delta = 16.45$. ESI-LCMS : m/z 668 $[\text{M}+\text{H}]^+$.

【0377】

11の調製: DCM (45.0 mL) 中の 10 (4.6 g、6.9 mmol) の懸濁液に、 $\text{CEOP}[\text{N}(\text{ipr})_2]_2$ (2.5 g、8.3 mmol)、 DCI (730.4 mg、6.2 mmol) を添加した。混合物を室温で 1 時間攪拌した。 LCMS は、10 が完全に消費されたことを示した。溶液を水 (40.0 mL) でクエンチし、ブライン (2×20.0 mL) で洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させた。次いで、溶液を減圧下で濃縮し、残渣を以下の条件 (IntelFlash-1): カラム、C18 シリカゲル、移動相、 $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}=1/1$ を 20 分以内に $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}=4/1$ まで増加させつつ、 Flash-Prep-HPLC によって精製し、溶出した生成物を $\text{CH}_3\text{CN}/\text{H}_2\text{O}=1/0$ 、検出器、UV 254 nm で集めた。これにより、11 (4.7 g、5.4 mmol、収率 78.3%) を白色固体として得た。 $^1\text{H-NMR}$ (600 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) $\delta = 11.34$ (s, 1H), 8.18–8.16 (m, 1H), 8.02–8.01 (d, $J=6$, 2H), 7.65–7.42 (m, 4H), 5.95–5.93 (m, 1H), 5.66–5.61 (m, 4H), 4.64–4.57 (m, 1H), 4.32–4.31 (d, $J=6$, 1H), 4.12–4.10 (m, 1H), 3.81–3.45 (m, 7H), 2.81–2.79 (m, 2H), 1.16–1.13 (m, 30H). $^{31}\text{P-NMR}$ (CDCl_3-d_6) $\delta = 150.65, 150.20, 16.64, 15.41$. ESI-LCMS : m/z 868 $[\text{M}+\text{H}]^+$;

【0378】

実施例 18

10


20

30

40

50

【化 1 0 7】



10

20

30

スキームー 1 7

【 0 3 7 9】

2 の調製：1 (94.5 g、317.9 mmol) を N_2 雰囲気下で乾燥 DMF (1000 mL) に溶解した。TBSCl (119.3 g、794.7 mmol) 及びイミダゾール (75.8 g、1.1 mol) 溶液に、25℃で添加し、17時間攪拌した。LCMSは、1の全てが消費されたことを示した。反応混合物を H_2O (3000 * 2 mL)、EA (2000 * 2 mL) 及びブライン (1500 mL) で洗浄した。 Na_2SO_4 で乾燥させ、濃縮して粗物質を得て、これを次のステップに進める。反応混合物を濃縮して粗物質 2 (200 g、粗物質) を得た。ESI-LCMS: m/z 526 [M+H]⁺.

40

【 0 3 8 0】

3 の調製：2 (175.1 g、333.0 mmol) をピリジンで蒸発させ、真空中で2回乾燥させた。残渣を N_2 下でピリジン (1500 mL) に溶解した。i-BuCl (88.7 g、832.6 mmol) を、 N_2 雰囲気下で5℃で添加し、3時間攪拌した。LCMSは、2の全てが消費されたことを示した。反応混合物を H_2O (3000 * 2 mL)、EA (2000 * 2 mL) 及びブライン (1500 mL) で洗浄した。 Na_2SO_4 で乾燥させ、濃縮して粗物質を得て、これを次のステップに進める。反応混合物を濃縮

50

して粗物質 3 (228 g、粗物質) を得た。ESI-LCMS: m/z 596 [M+H]⁺。

【0381】

4 の調製: THF (2000 mL) 中の 3 (225 g、377.6 mmol) の溶液に、H₂O (500 mL) を添加し、TFA (500 mL) を 5℃ で添加した。次いで、反応混合物を、5℃ で 1 時間攪拌した。LCMS は、3 の全てが消費されたことを示した。濃縮 NH₄OH (水溶液) を混合物に添加し、pH = 7 ~ 8 になるまで反応物をクエンチし、次いで H₂O (2000 * 2 mL)、EA (2000 * 2 mL) 及びブライン (1500 mL) で洗浄した。Na₂SO₄ で乾燥させ、濃縮して粗物質を得て、これを cc によって精製した。反応混合物を濃縮して 4 (155.6 g、収率 83.9%) を得た。ESI-LCMS: m/z 482 [M+H]⁺。

10

【0382】

5 の調製: 4 (100 g、207.6 mmol) を、N₂ 下で乾燥 DMF (1000 mL) 中に溶解させた。t-BuOH (307.8 g、4.2 mol)、PDC (156.1 g、0.4 mol) 及び Ac₂O (212.0 g、2.1 mol) を、N₂ 雰囲気下で 25℃ で添加し、25℃ で 2 時間攪拌した。LCMS 及び TLC は、4 つ全てが消費されたことを示した。NaHCO₃ (水溶液) を混合物に添加して、pH = 7 ~ 8 になるまで反応物をクエンチし、次いで、H₂O (500 * 2 mL)、EA (500 * 2 mL) 及びブライン (500 mL) で洗浄した。Na₂SO₄ で乾燥させ、濃縮して粗物質を得て、これを cc、及び MPLC によって精製した。反応混合物を濃縮して 5 (77.3 g、収率 61.6%) を得た。ESI-LCMS: m/z 552 [M-H]⁺。

20

【0383】

6 の調製: 5 (40.0 g、72.6 mmol) を N₂ 下で乾燥 THF (400 mL) に溶解した。溶液に、MeOD (80 mL) 及び D₂O (40 mL) を、N₂ 雰囲気下、25℃ で添加し、次いで、NaBD₄ (9.1 g、217.4 mmol) を 3 回添加し、15 時間攪拌した。LCMS 及び TLC は、5 つ全てが消費されたことを示した。混合物を濃縮して粗物質を得て、これを次のステップに進める。反応混合物を濃縮して粗物質 6 (30 g、粗物質) を得た。ESI-LCMS: m/z 414 [M+H]⁺。

【0384】

7 の調製: 6 (30 g、粗製) をピリジンで蒸発させ、真空中で 2 回乾燥させた。残渣を N₂ 下で乾燥ピリジン (300 mL) に溶解した。次いで、iBuCl (15.5 g、145.3 mmol) を反応混合物に、N₂ 雰囲気下、0℃ でゆっくりと添加し、25℃ で 1 時間攪拌した。LCMS 及び TLC は、6 つ全てが消費されたことを示した。NaHCO₃ (水溶液) を混合物に添加し、pH = 7.5 になるまで反応物をクエンチし、次いで H₂O (1500 mL)、EA (1000 * 2 mL) 及びブライン (1500 mL) で洗浄した。Na₂SO₄ で乾燥させ、濃縮して粗残渣 R1 を得た。NaOH (8 g、0.2 mol)、MeOH (80 mL)、及び H₂O (20 mL) は、NaOH (水) を作製した。残渣 R1 (40 g、3.63 mmol) をピリジン (20 mL) に溶解した。溶液に 2N NaOH (水溶液) (100 mL) を添加し、5℃ で 15 分間反応物を攪拌した。TLC は、R1 の全てが消費されたことを示した。混合物を NH₄Cl を 5℃ で pH = 7 ~ 8 に添加し、濃縮して粗物質を得て、これを cc によって精製した。生成物を濃縮して、7 (15.5 g、2 ステップにわたる収率 33.00%) を得た。ESI-LCMS: m/z 484 [M+H]⁺。

30

40

【0385】

8 の調製: 攪拌 DMSO (150 mL) 中の 7 (15.5 g、32.1 mmol) の溶液に、EDCI (18.5 g、96.3 mmol)、ピリジン (2.5 g、32.1 mmol)、TFA (1.8 g、16.0 mmol) を N₂ 雰囲気下、室温で添加した。反応混合物を、室温で 1 時間攪拌した。反応物を水でクエンチし、EA (300.0 mL) で抽出し、ブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、減圧下で蒸発させて、粗物質 8 (17.3 g、粗物質) を得、これを次のステップに直接使用した。ESI-LCMS: m

50

／ $z = 481$ $[M+H]^+$ 。

【0386】

10の調製：乾燥THF（204 mL）及びD₂O（34 mL）中の8（17.3 g、粗物質）、9（21.4 g、33.7 mmol）及びK₂CO₃（13.3 g、96.3 mmol）の溶液を40℃で5時間攪拌した。混合物を水でクエンチし、EA（600.0 mL）で抽出し、ブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、減圧下で蒸発させた。残渣をシリカゲル（PE：EA=5：1～1：1）によって精製し、10（9.3 g、2ステップで収率36.6%）を白色固体として得た。ESI-LCMS $m/z = 787$ $[M+H]^+$ 。

¹H-NMR（DMSO-d₆）：δ 11.24（s, 1H, D₂Oで交換）, 8.74（d, J=2.7 Hz, 2H）, 8.05–8.04（d, J=7.4 Hz, 2H）, 7.65（t, 1H）, 7.57–7.54（t, 2H）, 6.20（d, J=5.0 Hz, 1H）, 5.64–5.58（m, 4H）, 4.77（t, 1H）, 4.70（t, 1H）, 4.57–4.56（t, 1H）, 3.35（s, 3H）, 1.09（d, J=6.5 Hz, 18H）, 0.93（s, 9H）, 0.15（d, J=1.8 Hz, 6H）；³¹P NMR（DMSO-d₆）：δ 17.05；

10

【0387】

11の調製：丸底フラスコに、H₂O（93 mL）及びHCOOH（93 mL）の混合物中の10（9.3 g、11.5 mmol）を添加した。反応混合物を、50℃で5時間、及び35℃で15時間攪拌した。混合物をEA（500.0 mL）で抽出し、水、NaHCO₃溶液、及びブラインで連続して洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、減圧下で蒸発させた。残渣を、以下の条件（IntelFlash-1）：カラム、C18シリカゲル、移動相、CH₃CN／H₂O（0.5% NH₄HCO₃）=1／2を20分以内でCH₃CN／H₂O（0.5% NH₄HCO₃）=1／0まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLCによって精製し、溶出した生成物をCH₃CN／H₂O（0.5% NH₄HCO₃）=3／2、検出器、UV 254 nmで集めた。生成物11（6.3 g、78%収率）を得た。¹H-NMR（600 MHz, DMSO-d₆）：δ 12.17（s, 1H, D₂Oで交換）, 11.51（s, 1H）, 8.28（s, 1H）, 6.02–6.03（d, J=4.2 Hz, 1H）, 5.63–5.72（m, 5H）, 4.60（s, 1H）, 4.43–4.45（m, 2H）, 3.40（s, 1H）, 3.38（s, 1H）, 2.83–2.88（m, 1H）, 1.15–1.23（m, 24H）；³¹P NMR（DMSO-d₆）δ=17.69。ESI-LCMS $m/z = 674$ $[M+H]^+$ 。

20

30

【0388】

12の調製：DCM（55.0 mL）中の11（5.6 g、8.3 mmol）の溶液に、DCI（835 mg、7.1 mmol）を添加し、次いで、CEP[N(ipr)₂]₂（3.3 g、10.8 mmol）を添加した。混合物を室温で1時間攪拌した。反応混合物をH₂O（50.0 mL）及びブライン（50.0 mL）で洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、圧力下で蒸発させた。残渣を、以下の条件（IntelFlash-1）：カラム、C18シリカゲル、移動相、CH₃CN／H₂O（0.5% NH₄HCO₃）=1／1を20分以内でCH₃CN／H₂O（0.5% NH₄HCO₃）=1／0まで増加させつつ、Flash-Prep-HPLCによって精製し、溶出した生成物をCH₃CN／H₂O（0.5% NH₄HCO₃）=9／1、検出器、UV 254 nmで集めた。生成物を濃縮して、12（6.3 g、収率87%）を白色固体として得た。¹H-NMR（DMSO-d₆）：δ 12.14（s, 1H, D₂Oで交換）, 11.38（s, 1H）, 8.27–8.28（d, J=6 Hz, 1H）, 5.92–5.98（m, 1H）, 5.59–5.65（m, 4H）, 4.57–4.68（m, 3H）, 3.61–3.85（m, 4H）, 3.37（s, 1H）, 3.32（s, 1H）, 2.81–2.85（m, 3H）, 1.09–1.20（m, 36H）；³¹P NMR（DMSO-d₆）：δ 150.60, 149.97, 17.59, 17.16；ESI-LCMS $m/z = 874$

40

50

[M + H]⁺.

【0389】

実施例19：ds-siNA活性

この実施例は、実施例1で合成されたds-siNAの活性を調査する。

【0390】

Homo sapiens HepG2.2.15細胞を、10%胎児仔牛血清（FCS）も含有するように補充したダルベッコ改変イーグル培地（DMEM）（ATCC 30-2002）中で培養した。細胞を、加湿したインキュベーター中、5%CO₂を含む雰囲気において、37℃でインキュベートした。siRNAを標的とするHBVによるHepG2.2.15細胞のトランスフェクションのために、細胞を、15000細胞／ウェルの密度で、96ウェルの通常の組織培養プレートに播種した。製造業者の指示に従って、RNAiMAX（Invitrogen／Life Technologies）を使用して細胞のトランスフェクションを行った。用量応答実験を、40、20、10、5、2.5、1.25、0.625、0.3125、0.15625、及び0.07813 nMのオリゴ濃度で行った。siRNA（例えば、表6のds-siNA IDによって特定されるds-siRNA）処理を標的とする各HBVについて、4つのウェルを並行してトランスフェクトし、個々のデータポイントを各ウェルから収集した。siRNAで24時間インキュベーションした後、培地を除去し、細胞を、細胞株HepG2.2.15中に存在するHBV遺伝子型D（B型肝炎ウイルスサブタイプaywとも呼ばれる、3182塩基対の完全ゲノム）に特異的なQuantigene 2.0分岐DNA（bDNA）プローブセットで溶解し、分析した。

10

20

【0391】

各ウェルについて、HBVオンターゲットmRNAレベルを、GAPDH mRNAレベルに対して正規化した。表6～10に示されるように、ds-siRNAを標的とするHBVの活性は、EC50（薬物なしの対照からの正規化されたHBV RNAレベルの50%低減）として表された。表6～10に示されるように、ds-siRNAを標的とするHBVの細胞毒性は、薬物なしの対照からのGAPDH mRNAの50%低減のCC50によって表された。

【0392】

実施例20：B型肝炎ウイルス感染を治療するためのds-siNAの使用

この実施例では、実施例1で合成されたds-siNAを使用して、対象におけるB型肝炎ウイルス感染を治療する。概して、表1～5からのds-siNA（ds-siNA IDによって特定されるような）と、薬学的に許容される担体と、を含む組成物が、B型肝炎ウイルスに罹患している対象に投与される。表1～5からのds-siNAは、N-アセチルガラクトサミンにコンジュゲートされる。ds-siNAは、3週間ごとに、皮下注射又は静脈内注入によって、0.3～5 mg／kgの用量で投与される。

30

【0393】

実施例21：siNA活性アッセイ

この実施例は、本明細書に開示されるsiNAの活性を試験するための例示的な方法を提供する。

40

【0394】

インビトロアッセイ：

HepG2.2.15細胞を、10%胎児仔牛血清（FCS）も含有するように補充したダルベッコ改変イーグル培地（DMEM）（ATCC 30-2002）中で培養した。細胞を、加湿したインキュベーター中、5%CO₂を含む雰囲気において、37℃でインキュベートした。siRNAを標的とするHBVによるHepG2.2.15細胞のトランスフェクションのために、細胞を、15000細胞／ウェルの密度で、96ウェルの通常の組織培養プレートに播種した。製造業者の指示に従って、RNAiMAX（Invitrogen／Life Technologies）を使用して細胞のトランスフェクションを行った。用量応答実験を、40、20、10、5、2.5、1.25、0.6

50

25、0.3125、0.15625、及び0.07813 nMのオリゴ濃度で行った。siRNA（例えば、表6～10のds-siRNA IDによって特定されるds-siRNA）処理を標的とする各HBVについて、4つのウェルを並行してトランスフェクトし、個々のデータポイントを各ウェルから収集した。siRNAで24時間インキュベーションした後、培地を除去し、細胞を、細胞株HepG2.2.15中に存在するHBV遺伝子型D（B型肝炎ウイルスサブタイプaywとも呼ばれる、3182塩基対の完全ゲノム）に特異的なQuant i Gene 2.0分岐DNA（bDNA）プローブセットで溶解し、分析した。

【0395】

各ウェルについて、HBVオンターゲットmRNAレベルを、GAPDH mRNAレベルに対して正規化した。表6～10に示されるように、ds-siRNAを標的とするHBVの活性は、EC₅₀（薬物なしの対照からの正規化されたHBV RNAレベルの50%低減）として表された。表6及び10に示されるように、ds-siRNAを標的とするHBVの細胞毒性は、薬物なしの対照からのGAPDH mRNAの50%低減のCC₅₀によって表された。

10

20

30

40

50

【表 9 - 1】

表 6 - 2' - フルオロヌクレオチドを含む s i N A

名称	SS/AS 5' から 3'	EC ₅₀	E _{max} (%)	CC ₅₀ (nM)
ds-siNA-001	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 1)	A	71	>45
	mAps f2P psmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmCfCmAfCmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 2)			
ds-siNA-002	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 3)	B	59	>45
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmC f4P mAfCmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 4)			
ds-siNA-003	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 5)	A	68	>45
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmCfCmA f2P mCmAmCpsmGpsmA (配列番号 6)			
ds-siNA-004	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 7)	B	61	>45
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmC f2P mAf f2P mCmAmCpsmGpsmA (配列番号 8)			
ds-siNA-005	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 9)	B	71	>45
	mAps fB psmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmCfCmAfCmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 10)			
ds-siNA-006	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 11)	B	70	>45
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmC fB mAfCmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 12)			
ds-siNA-007	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 13)	D	-	>45
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmC fB mAf B mCmAmCpsmGpsmA (配列番号 14)			

10

20

30

40


50


【表 9 - 2】


ds-siNA-008	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 15)	A	67	>45
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmCf 2Pm AfCmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 16)			
対照 1	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmAmAmU (配列番号 41)	A	61	>45
	mApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmCfCmAf CmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 42)			

EC₅₀ の場合、A=EC₅₀ ≤ 0.1nM、B=0.1nM、<EC₅₀ ≤ 1nM、C=1nM、<EC₅₀ < 10、D=EC₅₀ ≥ 10nM。

mX=2'-O-メチルヌクレオチド、fX=2' -フルオロヌクレオチド、5dcd3X=式 17 のヌクレオチド、5dfX=式 16 のヌクレオチド、vX=5' ビニルホスホネートヌクレオチド、d2vX=重水素化 5' ビニルホスホネートヌクレオチド、vmX=5' ビニルホスホネート、2'-O-メチルヌクレオチド、







、f4P=、f2P=、fB=、ps=ホスホロチオ
エート連結、X は、核酸塩基(例えば、A、G、C、U、又は T)である。

10

20

30

40

50

【表 10-1】

表7-ヌクレオチドホスフェート模倣体を含む s i N A

名称	SS/AS 5' から 3'	EC ₅₀
対照 2	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA- p-ps2-GalNAc4 (配列番号 43)	A
	mUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfC mGmGpsmUpsmC (配列番号 44)	
ds-siNA-009	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA p-ps2-GalNAc4 (配列番号 17)	A
	omeco- d3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfC mGmGpsmUpsmC (配列番号 18)	
ds-siNA-010	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA p-ps2-GalNAc4 (配列番号 19)	A
	4h UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfC mGmGpsmUpsmC (配列番号 20)	
ds-siNA-011	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA p-ps2-GalNAc4 (配列番号 21)	A
	d2vd3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCm AfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 22)	
ds-siNA-012	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA- p-ps2-GalNAc4 (配列番号 23)	A
	v- mun UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGmGpsmUpsmC (配列番号 24)	
ds-siNA-013	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA- p-ps2-GalNAc4 (配列番号 25)	A
	c2o- 4h UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfC mGmGpsmUpsmC (配列番号 26)	
ds-siNA-014	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA- p-ps2-GalNAc4 (配列番号 27)	B

10

20

30

40

50

【表 10 - 2】

	omeco- munUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGmGpsmUpsmC (配列番号 28)	
ds-siNA-015	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 29)	A
	omeco- munUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGmGpsmUpsmC (配列番号 30)	
ds-siNA-016	mGpsmUpsmGmGfUmGfGfAfCmUmUmCmUmCmUmCmA mAmU-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 33)	A
	d2vmApsfUpsmUmGmAfGmAmGmAmAmGmUmCfCmAf2 PmCmAmCpsmGpsmA (配列番号 34)	
ds-siNA-023	5'- mCpsmCpsmGmUfGmUfGf(4nh)QfAmCmUmUmCmGmCm UmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 63)	A
	3'- mCpsmUpsmGmGfCmAmCfAmCmGmUmGmAfAmGmCfG mAmApsfGpsd2vd3U-5' (配列番号 64)	
ds-siNA-024	5'- mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 65)	A
	3'- mCpsmUpsmGmGfCmAmCfAmCmGmUmGmAfAmGf(4nh) QfGmAmApsfGpsd2vd3U-5' (配列番号 66)	
ds-siNA-025	5'- mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA-p-(ps)2GalNAc4 (配列番号 67)	A
	3'- mCpsmUpsmGmGf(4nh)QmAmCfAmCmGmUmGmAfAmG mCfGmAmApsfGpsd2vd3U-5' (配列番号 68)	
ds-siNA-050*	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 93)	C

10








20

30

40

50

【表 10-3】

	coc- 4hUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfC mGmGpsm UpsmC (配列番号 94)	
EC50 の場合、A=EC50 ≤0.1nM、B=0.1nM、<EC50 ≤1nM、C=1nM、<EC50 <10、D=EC50 ≥10nM。		
*ds-siNA-050 についても CC50 について評価し、ds-siNA-050 についての CC50 は、>1nm である。		
mX=2'-O-メチルヌクレオチド、fX=2'-フルオロヌクレオチド、5dcd3X=式 17 のヌクレオチド、5dfX=式 16 のヌクレオチド、vX=5' ビニルホスホネートヌクレオチド、d2vX=重水素化 5' ビニルホスホネートヌクレオチド、vmX=5' ビニルホスホネート、2'-O-メチルヌクレオチド、   omeco-d3U=、4hU=、d2vd3U=   、v-munU=、c2o-4hU=   、coc-4hU=、omeco-munU=  、ps=ホスホロチオエート連結、X は、核酸塩基(例えば、A、G、C、U 又は T)である。		

10

20

30

40

50

【表 1 1 - 1】

表 8 - 修飾されたアンロックドヌクレオチドを含む s i N A

名称	SS/AS(5' から 3')	mod の位置	EC ₅₀
対照 3	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUm UmCmA (配列番号 45)	6	A
	mUpsfGpsmAmAfG un CmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGmGpsmUpsmC (配列番号 46)		
対照 4	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUm UmCmA (配列番号 47)	7	A
	mUpsfGpsmAmAfGm un GfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGmGpsmUpsmC (配列番号 48)		
対照 5	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUm UmCmA (配列番号 49)	-	A
	mUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGmGpsmUpsmC (配列番号 50)		
ds-siNA-017	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUm UmCmA (配列番号 35)	6	B
	mUpsfGpsmAmAfG mun 34 CmGfAmAmGmUmGmCfAmC mAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 36)		
ds-siNA-018	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUm UmCmA (配列番号 37)	7	A
	mUpsfGpsmAmAfGm mun 34 GfAmAmGmUmGmCfAmC mAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 38)		
ds-siNA-019	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUm UmCmA- p-ps2-GalNAc4 (配列番号 39)	7	A
	d2vd3 UpsfGpsmAmAfGm mun 34 GfAmAmGmUmGmCf AmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 40)		
ds-siNA-034	mCpsmCps mun 34 GmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmC mUmUmCmA (配列番号 93)	3	A
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		

10

20

30

40

50

【表 1 1 - 2】

ds-siNA-035	mCpsmCpsmGmun 34U fGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmC mUmUmCmA (配列番号 95)	4	A
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		
ds-siNA-036	mCpsmCpsmGmUfGmun 34U fGfCfAmCmUmUmCmGmC mUmUmCmA (配列番号 96)	6	A
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		
ds-siNA-037	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmun 34C mUmUmCmGmC mUmUmCmA (配列番号 97)	10	B
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		
ds-siNA-038	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmun 34U mUmUmCmGmC mUmUmCmA (配列番号 98)	11	A
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		
ds-siNA-039	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmun 34U mCmGmC mUmUmCmA (配列番号 99)	12	A
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		
ds-siNA-040	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmun 34C mGmC mUmUmCmA (配列番号 100)	13	A
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		
ds-siNA-041	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmun 34G mC mUmUmCmA (配列番号 101)	14	A
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		
ds-siNA-042	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmun 34C mUmUmCmA (配列番号 102)	15	A

10

20

30

40


50


【表 1 1 - 3】


	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		
ds-siNA-043	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmun3 4UmUmCmA (配列番号 103)	16	A
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		
ds-siNA-044	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUm un34UmCmA (配列番号 104)	17	A
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		
ds-siNA-045	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUm Umun34CmA (配列番号 105)	18	A
	psmUpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAf CmGpsmGpsmUmC (配列番号 94)		


EC₅₀ の場合、A=EC₅₀ ≤ 0.1nM、B=0.1nM、<EC₅₀ ≤ 1nM、C=1nM、<EC₅₀ < 10、D=EC₅₀ ≥ 10nM。


mX=2'-O-メチルヌクレオチド、fX=2'-フルオロヌクレオチド、5dcd3X=式 17 のヌクレオチド、
5dfX=式 16 のヌクレオチド、vX=5' ビニルホスホネートヌクレオチド、d2vX=重水素化 5' ビニ
ルホスホネートヌクレオチド、vmX=5' ビニルホスホネート、2'-O-メチルヌクレオチド、











、ps=ホスホロチオエート連結、X は、核酸塩基(例えば、A、G、
C、U、又は T)である。

10

20

30

40

50

【表 1 3 - 1】

表 1 0 - 修飾された a p Uヌクレオチドを含む s i N A

名称	SS/AS(5' から 3')	EC ₅₀	CC ₅₀
ds-siNA-026	mCpsmCpsmGaUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUm CmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 77)	A	>1
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmA fCmGmGpsmUpsmC (配列番号 78)		
ds-siNA-027	mCpsmCpsmGmUfGaUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUm CmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 79)	A	>1
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmA fCmGmGpsmUpsmC (配列番号 80)		
ds-siNA-028	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUaUmCmGmCmUmUm CmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 81)	A	>1
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmA fCmGmGpsmUpsmC (配列番号 82)		
ds-siNA-029	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCaUmUm CmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 83)	A	>1
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmA fCmGmGpsmUpsmC (配列番号 84)		
ds-siNA-030	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUaUm CmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 85)	A	>1
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmA fCmGmGpsmUpsmC (配列番号 86)		
ds-siNA-031	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 87)	A	>1
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGaUmGmCfAmCmA fCmGmGpsmUpsmC (配列番号 88)		
ds-siNA-032	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 89)	A	>1
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmA fCmGmGpsaUpsmC (配列番号 90)		

10



20

30

40

50

【表 1 3 - 2】

ds-siNA-033	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmU mCmA-p-(ps)2-GalNAc4 (配列番号 91)	A	>1
	aUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCm GmGpsmUpsmC (配列番号 92)		
EC ₅₀ の場合、A=EC ₅₀ ≤ 0.1nM、B=0.1nM、<EC ₅₀ ≤ 1nM、C=1nM、<EC ₅₀ < 10、D=EC ₅₀ ≥ 10nM。			
mX=2'-O-メチルヌクレオチド、fX=2'-フルオロヌクレオチド、5dcd3X=式 17 のヌクレオチド、 5dfX=式 16 のヌクレオチド、vX=5' ビニルホスホネートヌクレオチド、d2vX=重水素化 5' ビニル ホスホネートヌクレオチド、vmX=5' ビニルホスホネート、2'-O-メチルヌクレオチド、  d2vd3U=  ,aU= ,ps=ホスホロチオエート連結、X は、核酸塩基(例えば、A、G、C、U、又は T)である。			

10

20

【0396】

インビボアッセイ：

AAV/HBV は、複製可能な HBV ゲノムを保有する組換え AAV である。遺伝子型 8 AAV の高度な肝臓向性特徴を利用して、HBV ゲノムをマウス肝臓細胞に効率的に送達することができる。免疫能のあるマウスに AAV/HBV を感染させると、患者の慢性 HBV 感染を模倣する長期 HBV ウイルス血症をもたらす可能性がある。AAV/HBV モデルを使用して、様々なタイプの抗 HBV 剤のインビボ活性を評価することができる。マウスを、試験の 28 日目に AAV-HBV に感染させた。試験物品又は陰性対照 (PBS) を、5 mg/kg で、0 日目に単回用量として皮下投与した (特に明記しない限り)。連続採血は、通常、試験終了まで、0、5、10、及び 15 日目などに 5 日ごとに行われた。血清 HBV S 抗原 (HBsAg) を ELISA によってアッセイした。

30

【0397】

表 11 は、例示的なヌクレオチドホスフェート模倣体のいくつかの影響を決定するために評価された siNA を示す。この評価の結果を図 4 に示し、これは、ビヒクル (G01)、対照 2、ds-siNA-009、又は ds-siNA-010 で治療された AAV-HBV マウス由来の血清 HBsAg の変化のグラフを提供する。

40

50

【表 1 4】

表 1 1

名称	SS/AS 5' から 3'
対照 2	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmAp- ps2-GalNAc4 (配列番号 43)
	mUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 44)
ds-siNA-009	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmAp- ps2-GalNAc4 (配列番号 17)
	omeco- d3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 18)
ds-siNA-010	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmAp- ps2-GalNAc4 (配列番号 19)
	4h UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 20)

10

【0398】

表 1 2 は、例示的なヌクレオチドホスフェート模倣体のいくつかの影響を決定するために評価された s i N A を示す。この評価の結果を図 5 A に示し、これは、ビヒクル (G O 1)、対照 2、d s - s i N A - 0 1 7 (G a l N A c の添加を伴う)、又は d s - s i N A - 0 1 8 (G a l N A c の添加を伴う) で治療された A A V - H B V マウス由来の血清 H B s A g の変化のグラフを提供する。

20

【表 1 5】

表 1 2

名称	SS/AS 5' から 3'
ds-siNA-0017	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA- p-ps2-GalNac4 (配列番号 35)
	mUpsfGpsmAmAfG mun34 CmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 36)
ds-siNA-0018	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA- p-ps2-GalNac4 (配列番号 37)
	mUpsfGpsmAmAfGmC mun34G fAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 38)
対照 2	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA- ps2-GalNAc4 (配列番号 43)
	mUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 44)

30

40

【0399】

表 1 3 は、また評価された従来の U N A を含む s i A N を示す。これらの s i N A は、本明細書に開示される新規の 3' , 4' セコ修飾ヌクレオチドの対照とみなすことができる。図 5 B は、ビヒクル (G O 1)、対照 2、対照 7、又は対照 8 で治療された A A V - H

50

B V マウス由来の血清 H B s A g の変化のグラフを提供する。

【表 1 6】

表 1 3

名称	SS/AS
対照 7	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 51)
	mUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 52)
対照 8	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 53)
	mUpsfGpsmAmAfGmCmGmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 54)

10

【0 4 0 0】

表 1 4 は、例示的なヌクレオチドホスフェート模倣体のいくつかの影響を決定するために評価された s i N A を示す。この評価の結果を図 6 に示し、これは、ビヒクル (G 0 1)、対照 2、ds-s i N A - 0 1 1、ds-s i N A - 0 1 2、又は ds-s i N A - 0 1 3 で治療された A A V - H B V マウス由来の血清 H B s A g の変化のグラフを提供する。

20

【表 1 7】

表 1 4

名称	SS/AS 5' から 3'
対照 2	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 43)
	mUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 44)
ds-siNA-011	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 21)
	d2vd3UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 22)
ds-siNA-012	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 23)
	v-munUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 24)
ds-siNA-013	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 25)
	c2o-4hUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 26)

30

40

【0 4 0 1】

表 1 5 は、a p U ヌクレオチドの組み込みの影響を決定するために評価した s i N A を示す。この評価の結果を図 7 に示し、これは、ビヒクル (G 0 1)、対照 2、ds-s i N A - 0 2 6、ds-s i N A - 0 2 7、ds-s i N A - 0 2 8、ds-s i N A - 0 2 9、ds-s i N A - 0 3 0、ds-s i N A - 0 3 1、又は ds-s i N A - 0 3 2 で治療された A A V - H B V マウス由来の血清 H B s A g の変化のグラフを提供する。

50

【表 1 8】

表 1 5

名称	SS/AS 5' から 3'
対照 2	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p- ps2-GalNAc4 (配列番号 43)
	mUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 44)
ds-siNA-026	mCpsmCpsmGaUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p- (ps)2-GalNAc4 (配列番号 77)
	d2vd3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 78)
ds-siNA-027	mCpsmCpsmGmUfGaUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p- (ps)2-GalNAc4 (配列番号 79)
	d2vd3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 80)
ds-siNA-028	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUaUmCmGmCmUmUmCmA-p- (ps)2-GalNAc4 (配列番号 81)
	d2vd3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 82)
ds-siNA-029	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCaUmUmCmA-p- (ps)2-GalNAc4 (配列番号 83)
	d2vd3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 84)
ds-siNA-030	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUaUmCmA-p- (ps)2-GalNAc4 (配列番号 85)
	d2vd3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 86)
ds-siNA-031	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p- (ps)2-GalNAc4 (配列番号 87)
	d2vd3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGaUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 88)
ds-siNA-032	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p- (ps)2-GalNAc4 (配列番号 89)
	d2vd3 UpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsaUpsmC (配列番号 90)

10

20

30

40

50

【0 4 0 2】

追加的に、ds-siNA-034のインビトロスクリーニングからds-siNA-045までの最も活性な化合物を、センス鎖の3'末端にGalNAcを接続するように更に修飾し、重水素化ビニルホスホネートをアンチセンス鎖に組み込んだ。ds-siNA-034～ds-siNA-045の中で最も活性の高い化合物は、ds-siNA-034（センス鎖の3位置にmun34）、ds-siNA-043（センス鎖の16位置にmun34）、ds-siNA-044（センス鎖の17位置にmun34）、及びds-siNA-045（センス鎖の18位置にmun34）であった。これらの化合物のGalNAc共役／重水素化バージョンをds-siNA-046をds-siNA-049に割り当て（表16に示される）、図8は、ビヒクル（G01）、対照2、ds-siNA-046、ds-siNA-047、ds-siNA-048、又はds-si

NA-049で治療されたAAV-HBVマウス由来の血清HBsAgの変化のグラフを提供する。

【表19】

表16

名称	SS/AS 5' から 3'
対照 2	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-ps2-GalNAc4 (配列番号 43)
	mUpsfGpsmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGmGpsmUpsmC (配列番号 44)
ds-si-NA-046	mCpsmCpsmun34GmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc (配列番号 106)
	psd2vd3UpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC (配列番号 107)
ds-si-NA-047	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmun34UmUmCmA-p-(ps)2-GalNAc (配列番号 108)
	psd2vd3UpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC (配列番号 107)
ds-si-NA-048	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmun34UmCmA-p-(ps)2-GalNAc (配列番号 109)
	psd2vd3UpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC (配列番号 107)
ds-si-NA-049	mCpsmCpsmGmUfGmUfGfCfAmCmUmUmCmGmCmUmUmun34CmA-p-(ps)2-GalNAc (配列番号 110)
	psd2vd3UpsfGmAmAfGmCmGfAmAmGmUmGmCfAmCmAfCmGpsmGpsmUmC (配列番号 107)

10

20

30

【0403】


実施例22：化合物40-9（GalNAc4アミダイト）の調製

化合物40-9は、標的部分として本明細書に開示される任意のsiNAにコンジュゲートすることができる。以下に示すこの化合物は、以下の簡単な説明に従って調製することができる。

40

50

【化 108】



10

20

【0404】

ビルディングブロック化合物 40-9 は、修飾されたホスホロチオ化オリゴヌクレオチドの実施形態を作製するのに有用である。化合物 40-9 を以下のように調製した。

【0405】

化合物 40-2 の調製：市販のグルコサミン塩酸塩 40-1 (60 g、278.25 mmol、1 当量) の DCM 溶液 (300 mL) に、0℃で Ac₂O (323.83 g、3.17 mmol、297.09 mL、11.4 当量) を滴下し、続いてピリジン (300 mL) 及び DMAP (3.40 g、27.83 mmol、0.1 当量) を添加した。混合物を徐々に 20℃ に加温し、20℃ で 24 時間攪拌した。LCMS によってモニタリングされる場合の完了時に、混合物を減圧下で濃縮し、DCM (900 mL) で希釈し、NaHCO₃ (飽和、300 mL × 3 水溶液) で抽出した。合わせた有機層をブライン (300 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮して、化合物 40-2 (89.5 g、粗物質) を黄色固体として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ = 6.16 (d, J = 3.8 Hz, 1H), 5.62 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 5.27–5.16 (m, 2H), 4.54–4.43 (m, 1H), 4.24 (dd, J = 4.0, 12.5 Hz, 1H), 4.10–3.94 (m, 2H), 2.18 (s, 3H), 2.08 (s, 3H), 2.04 (d, J = 4.0 Hz, 6H), 1.93 (s, 3H; LCMS (ESI): C₁₆H₂₃NaNO₁₀ についての m/z 計算値 412.34 [M+Na]⁺, 実測値 412.0)。

30

40

【0406】

化合物 40-3 の調製：25℃での DCE (320 mL) 中の化合物 40-2 (40 g、102.73 mmol、1 当量) の溶液に、TMSOTf (23.98 g、107.87 mmol、19.49 mL、1.05 当量) を滴下し、混合物を 60℃ で 4 時間攪拌した。LCMS によってモニタリングされる場合の完了時に、混合物を、TEA (60 mL) を 20℃ で添加することによってクエンチし、15 分間攪拌し、DCM (500 mL) で希釈し、NaHCO₃ (飽和、300 mL × 2 水溶液) で洗浄した。有機層をブライン

50

(300 mL) で洗浄し、無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮して、化合物 40-3 (32.5 g、粗物質) を黄色の油として得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ = 5.96 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 5.25 (t, J = 2.4 Hz, 1H), 4.95-4.88 (m, 1H), 4.19-4.08 (m, 3H), 3.59 (m, 1H), 2.13-2.05 (m, 12H)。

【0407】

化合物 40-4 の調製：DCM (250 mL) 中の化合物 40-3 (32.5 g、98.69 mmol、1 当量) の混合物に、ヘキサ-5-エン-1-オール (11.86 g、118.43 mmol、13.96 mL、1.2 当量) 及び 4A MS (32.5 g) を添加した。混合物を 30℃ で 0.5 時間攪拌した後、TMSOTf (13.16 g、59.22 mmol、10.70 mL、0.6 当量) を滴下した。混合物を 30℃ で 16 時間攪拌した。LCMS によってモニタリングされる場合の完了時に、反応混合物を濾過し、濾液を DCM (300 mL) で希釈し、 NaHCO_3 (飽和、150 mL * 2 水溶液) で洗浄した。有機層を、ブライン (150 mL) で洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮した。残渣をフラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ISCO (登録商標)、220 g SepaFlash (登録商標) シリカフラッシュカラム、0~70% の PE/EA 勾配の溶離液、100 mL/分) によって精製して、化合物 40-4 (12.3 g、28.64 mmol、収率 29.02%) を白色固体として得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ = 5.78 (m, 1H), 5.45 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 5.31 (dd, J = 9.4, 10.7 Hz, 1H), 5.06 (t, J = 9.5 Hz, 1H), 5.02-4.92 (m, 2H), 4.68 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 4.30-4.23 (m, 1H), 4.16-4.10 (m, 1H), 3.91-3.76 (m, 2H), 3.73-3.66 (m, 1H), 3.48 (td, J = 6.7, 9.5 Hz, 1H), 2.09-2.01 (m, 11H), 1.94 (s, 3H), 1.60-1.36 (m, 4H); LCMS (ESI): $\text{C}_{20}\text{H}_{32}\text{NO}_9$ についての m/z 計算値、430.47 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 実測値 430.1。

【0408】

化合物 40-5 の調製：DCM (60 mL) 及び MeCN (60 mL) の混合溶媒中の化合物 40-4 (12.3 g、28.64 mmol、1 当量) の溶液に、 NaIO_4 (2.5 M、57.28 mL、5 当量) を添加し、混合物を 20℃ で 0.5 時間攪拌した。RuCl₃ (123.00 mg、592.97 μmol 、0.02 当量) を添加し、混合物を 20℃ で 2 時間攪拌した。LCMS によってモニタリングされる場合の完了時に、飽和 NaHCO_3 水溶液を混合物に添加して pH > 7 を調節した。混合物を DCM (300 mL) で希釈し、抽出する。水性層をクエン酸により pH < 7 に調整し、水性層を DCM (300 mL * 3) で抽出した。合わせた有機層をブライン (300 mL) で洗浄し、無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮して、化合物 40-5 (8.9 g、収率 69.31%、褐色固体) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ = 6.14 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 5.34-5.20 (m, 1H), 5.08-5.01 (m, 1H), 4.67 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 4.24 (dd, J = 4.8, 12.3 Hz, 1H), 4.17-4.05 (m, 1H), 3.90-3.83 (m, 2H), 3.75-3.62 (m, 2H), 3.50 (d, J = 5.9, 9.9 Hz, 1H), 2.44-2.27 (m, 2H), 2.09-1.93 (m, 12H), 1.75-1.53 (m, 4H); LCMS (ESI): $\text{C}_{19}\text{H}_{30}\text{NO}_{11}$ についての m/z 計算値 448.44 $[\text{M}+\text{H}]^+$, 実測値 448.1。

【0409】

化合物 40-6 の調製：DCM (100 mL) 中の化合物 40-5 (10 g、22.35 mmol、1 当量) 及び 1-ヒドロキシピロリジン-2,5-ジオン (2.83 g、24.58 mmol、1.1 当量) の溶液に、EDCI·HCl (5.57 g、29.05 mmol、1.3 当量) を添加し、混合物を 20℃ で 2 時間攪拌した。LCMS によってモニタリングされる場合の完了時に、反応混合物を DCM (200 mL) で希釈し、 H_2

O (100 mL) で洗浄した。有機層を、NaHCO₃ (飽和水溶液) (100 mL * 2) 及びブライン (100 mL) で洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濾過し、減圧下で濃縮して、化合物 40-6 (10.1 g、82.66%) を白色固体として得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ = 5.85 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 5.31-5.26 (m, 1H), 5.06 (t, J = 9.7 Hz, 1H), 4.69 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 4.25 (dd, J = 4.7, 12.2 Hz, 1H), 4.12 (dd, J = 2.3, 12.2 Hz, 1H), 3.94-3.79 (m, 2H), 3.75-3.65 (m, 1H), 3.63-3.53 (m, 1H), 2.87 (br d, J = 4.3 Hz, 4H), 2.76-2.56 (m, 2H), 2.08 (s, 3H), 2.02 (d, J = 1.8 Hz, 6H), 1.92 (s, 3H), 1.86-1.66 (m, 4H); LCMS (ESI): C₂₃H₃₃N₂O₁₃ についての m/z 計算値 545.51 [M+H]⁺, 実測値 545.1.

10

【0410】

化合物 40-8 の調製: DCM (100 mL) 中の WO2018/013999A1) に記載の一般的な手順に従って調製した化合物 40-7 (40-7) (9.8 g、13.92 mmol、1 当量) の溶液に、DIEA (3.60 g、27.84 mmol、4.85 mL、2 当量) を添加し、続いて (2, 5-ジオキソピロリジン-1-イル) 5-[3-アセトアミド-4, 5-ジアセトキシ-6-(アセトキシメチル) テトラヒドロピラン-2-イル] オキシペンタン酸塩 (化合物 40-6) (9.86 g、18.10 mmol、1.3 当量) を添加し、混合物を 20℃ で 2 時間攪拌した。LCMS によってモニタリングされる場合の完了時に、反応混合物を水 (100 mL) で希釈し、次いで DCM (100 mL * 2) で抽出した。合わせた有機層を、ブライン (100 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、濾過し、濾液を減圧下で濃縮して、残渣を得た。残渣をフラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ISCO (登録商標)、120 g SepaFlash (登録商標) シリカフラッシュカラム、0~6% の MeOH/DCM 勾配の溶離液、80 mL/分) によって精製して、化合物 40-8 (13.1 g、収率 80.95%) を白色固体として得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ = 8.06 (d, J = 9.3 Hz, 1H), 7.81 (q, J = 5.4 Hz, 2H), 7.21 (d, J = 8.8 Hz, 6H), 6.84 (d, J = 9.0 Hz, 6H), 5.04 (t, J = 10.0 Hz, 1H), 4.78 (t, J = 9.7 Hz, 1H), 4.55 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 4.17 (dd, J = 4.5, 12.3 Hz, 1H), 3.97 (d, J = 10.0 Hz, 1H), 3.77 (dd, J = 2.6, 9.9 Hz, 1H), 3.72-3.64 (m, 11H), 3.46-3.25 (m, 5H), 3.05-2.84 (m, 8H), 2.18 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 2.05-1.95 (m, 7H), 1.93 (s, 3H), 1.88 (s, 3H), 1.74 (s, 3H), 1.47-1.13 (m, 20H); LCMS (ESI): 保持時間 = 2.017 分、C₆₀H₈₄N₄O₁₇、1156.32 [M+Na]⁺、1155.5 について m/z 計算値。

20

30

【0411】

化合物 40-9 の調製: DCM (50 mL) 中の化合物 40-8 (5 g、4.41 mmol、1 当量) 及び 4A MS (5 g) の混合物に、3-ビス (ジイソプロピルアミノ) ホスファニルオキシプロパンニトリル (1.73 g、5.74 mmol、1.82 mL、1.3 当量) を -10℃ で添加し、続いて 1H-イミダゾール-4, 5-ジカルボニトリル (573.12 mg、4.85 mmol、1.1 当量) を添加し、混合物を 0℃ で 2 時間攪拌した。LCMS によってモニタリングされる場合の完了時に、反応混合物を DCM (100 mL) で希釈し、NaHCO₃ (飽和、水溶液、50 mL * 2) で洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、減圧下で濃縮して淡黄色の泡を得た。残渣をフラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ISCO (登録商標)、40 g SepaFlash (登録商標) シリカフラッシュカラム、DCM 中 0%~10% の i-PrOH は 2% の TEA を含有) によって精製して、化合物 40-9 (3.35 g、収率 56.60%) を白色固体として得た。¹H NMR (400 MHz, CD₃CN) δ = 7.35-7.25 (m, 6H

40

50


), 6.88–6.82 (m, 6H), 6.79 (d, $J=9.3$ Hz, 1H), 6.63–6.46 (m, 2H), 5.17–5.08 (m, 1H), 4.93 (t, $J=9.7$ Hz, 1H), 4.59 (d, $J=8.6$ Hz, 1H), 4.22 (dd, $J=4.9$, 12.2 Hz, 1H), 4.04 (dd, $J=2.4$, 12.2 Hz, 1H), 3.85–3.32 (m, 22H), 3.15–3.00 (m, 8H), 2.59 (t, $J=5.8$ Hz, 2H), 2.23 (br t, $J=6.6$ Hz, 3H), 2.12–2.04 (m, 4H), 2.00 (s, 3H), 1.96 (s, 3H), 1.93 (s, 3H), 1.82 (s, 3H), 1.66–1.45 (m, 12H), 1.42–1.21 (m, 6H), 1.19–1.07 (m, 12H); LCMS (ESI) $C_{69}H_{101}NaN_6O_{18}P$ についての m/z 計算値 1355.68 $[M+Na]^+$, 実測値 1355.7; ^{31}P NMR (CD_3CN) $\delta = 147.00$.

10

【0412】

実施例23: GalNAc4 CPGの調製

【化109】



20

DCM (160 mL) 中の 40–8 (21 g、18.53 mmol、1 当量) 及びコハク酸無水物 (9.27 g、92.65 mmol、5 当量) の溶液に、TEA (18.75 g、185.30 mmol、25.79 mL、10 当量) 及び DMAP (2.26 g、18.53 mmol、1 当量) を 15 °C で添加した。混合物を 15 °C で 16 時間攪拌した。TLC (DCM: MeOH = 10:1) は反応が完了したことを示した。反応混合物を水 (200 mL) で希釈し、次いで DCM (300 mL * 2) で抽出した。合わせた有機層を、ブライン (300 mL * 3) で洗浄し、無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、減圧下で濃縮した。残渣をフラッシュシリカゲルクロマトグラフィー (ISCO (登録商標)、220 g SepaFlash (登録商標) シリカフラッシュカラム、0~10% の MeOH / DCM / TEA DCM の溶離液を 100 mL / 分で添加した) によって精製して、AGS-6-5 を得た (12.8 g、収率 56%)。LCMS: (ESI): m/z 1233.6 $[M+H]^+$ 。更なるコハク酸塩 AGS-6-5 を、GalNAc4 CPG を得るための一般的な手順に従うことによって、LCAA (CNA) 500 Å CPG にロードした。

30


【0413】

実施例24: モノマーの合成

40

50

【化 1 1 0】



10

20

【0 4 1 4】

(2) の調製：1000 mL の丸底フラスコに、PDC (8.48 g、22.53 mmol、1.2 当量) 及び 4A-MS (18 g)、並びに DCM (300 mL) 及び PH-ALG-14-4-8 (実施例 5 から) (9.7 g、18.8 mmol) を室温で添加した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で 5 時間攪拌した。得られた混合物を、酢酸エチル (30 mL) で希釈した。得られた混合物を濾過し、濾過ケーキを酢酸エチル (4 × 30 mL) で洗浄した。濾液を減圧下で濃縮した。これにより、2 (9 g、粗物質) が黄色固体として得られた。LC-MS: m/z 513.2 [M-H]⁻

30

【0 4 1 5】

(3) の調製：1000 mL の 3 つ口丸底フラスコに、メチルトリフェニルホスホニウムブロミド (15.62 g、43.73 mmol) 及び THF (180 mL) 及び *t*-BuOK (43.7 mL、THF 中に 2 M) を 0 °C で添加した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、0 °C で 30 分間攪拌した。攪拌混合物に、THF 中の 3'-ケトン 2 (9 g、17.49 mmol) を、アルゴン雰囲気下、0 °C で滴下添加した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で 2 時間攪拌した。反応物を室温で水 (1 mL) を添加してクエンチした。得られた混合物を濾過し、濾過ケーキを酢酸エチル (4 × 20 mL) で洗浄した。濾液を水 (3 × 20 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、以下の条件：カラム、C18 移動相、水中の ACN、30 分間で 45% ~ 70% の勾配、検出器、UV 254 を用いた逆フラッシュクロマトグラフィーによって精製し、3 (5.6 g、2 ステップで 56% 収率) を白色固体として得た。LC-MS: m/z 511.15 [M-H]⁻; ¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ 11.26 (s, 1H), 7.38 (d, *J* = 7.3 Hz, 2H), 7.33-7.18 (m, 8H), 6.90-6.78 (m, 4H), 5.71 (d, *J* = 3.7 Hz, 1H), 5.42 (dd, *J* = 8.1, 1.9 Hz, 1H), 4.96 (d, *J* = 2.1 Hz, 1H), 4.88 (d, *J* = 3.6 Hz, 1H), 4.47 (d, *J* = 15.1 Hz, 3H), 3.72 (d, *J* = 3.8 Hz, 6H)。

40

【0 4 1 6】

50

(4) の調製：500 mL の丸底フラスコに、中間体 3 (5.5 g、10.73 mmol) 及び THF (140 mL)、並びに $\text{BH}_3\text{-Me}_2\text{S}$ (24.14 mL、48.28 mmol) を 0℃ で添加した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、0℃ で 5 日間撹拌した。撹拌混合物に、 MeOH (56 mL) を、アルゴン雰囲気下、0℃ で滴下した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下で、0℃ で 20 分間撹拌した。撹拌混合物に、 H_2O (84 mL) を 0℃ でアルゴン雰囲気下で滴下した。更なる $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (29.7 g、193.14 mmol) を、アルゴン雰囲気下、0℃ で数バッチに分けて添加した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で 1 日間撹拌した。得られた混合物を酢酸エチル (200 mL) で希釈した。得られた混合物を EtOAc (3×200 mL) で抽出した。合わせた有機層をブライン (2×100 mL) で洗浄し、無水 Na_2SO_4 で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、以下の条件：カラム、C18 移動相、水中の ACN 、30 分間で 35%～70% の勾配、検出器、UV 254 nm を用いた逆フラッシュクロマトグラフィーによって精製し、化合物 4 (1.4 g、収率 24%) を白色固体として得た。LC-MS: m/z 529.15 $[\text{M-H}]^-$; $^1\text{H-NMR}$: (400 MHz, DMSO-d_6) δ 11.19 (s, 1H), 7.41 (d, $J=7.3$ Hz, 2H), 7.35–7.16 (m, 8H), 6.92–6.77 (m, 4H), 5.61 (d, $J=3.6$ Hz, 1H), 5.41 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 4.79 (s, 1H), 4.29 (t, $J=3.7$ Hz, 1H), 4.02 (dd, $J=9.0$, 7.4 Hz, 1H), 3.84 (m, 1H), 3.71 (d, $J=5.6$ Hz, 6H), 3.17 (m, 2H), 2.85–2.67 (m, 1H), 2.45 (m, 1H)。

10

20

【0417】

(5) の調製：2, 2-ジクロロ酢酸 (20 mL、DCM 中 3%) 中の化合物 4 (980 mg、1.85 mmol) の溶液を、アルゴン雰囲気下、0℃ で 30 分間撹拌した。得られた混合物を、ピリジン (2 mL) で希釈した。得られた混合物を減圧下で濃縮し、粗物質 5 を得て、これを精製することなく使用した。

【0418】

(6) の調製：ピリジン (20 mL) 中の溶液化合物 5 及び DMTrCl (1.47 g、4.34 mmol) を、アルゴン雰囲気下、室温で 2 時間撹拌した。反応物を、室温で水でクエンチした。得られた混合物を EtOAc (3×20 mL) で抽出した。合わせた有機層を、ブライン (2×30 mL) で洗浄し、無水 Na_2SO_4 で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、以下の条件：カラム、C18、移動相、水中の ACN 、30 分間で 10%～90% の勾配、検出器、UV 254 nm で逆フラッシュクロマトグラフィーによって精製し、6 (780 mg) を白色固体として得た。

30

【0419】

(7) の調製：DCM (8 mL) 中の 1H-イミダゾール-4, 5-ジカルボニトリル (257.53 mg、2.18 mmol) 及び $\text{CEP}[\text{N}(\text{iPr})_2]_2$ (606.7 mg、2.01 mmol) の混合物を室温で 10 分間撹拌し、続いて化合物 6 (890 mg、1.68 mmol) を室温で部分的に添加した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で 1 時間撹拌した。 NaHCO_3 (水溶液) で反応物をクエンチした。得られた混合物を、 CH_2Cl_2 (3×10 mL) で抽出した。合わせた有機層を、ブライン (2×5 mL) で洗浄し、無水 Na_2SO_4 で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、0.5% TEA (1:1) を用いた PE/EA で溶出した、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによって精製して、7 (実施例 24 のモノマー) (950 mg、75.56%) を白色固体として得た。ESI-LCMS: m/z 731 $[\text{M+H}]^+$; $^1\text{H-NMR}$: (300 MHz, DMSO-d_6) δ 11.34 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.63 (t, $J=7.9$ Hz, 1H), 7.40–7.26 (m, 4H), 7.29–7.15 (m, 5H), 6.92–6.82 (m, 4H), 5.70 (d, $J=5.0$ Hz, 1H), 5.53 (d, $J=8.1$ Hz, 1H), 4.42 (s, 1H), 4.26 (q, $J=8.2$ Hz, 1H), 4.10–3.92 (m, 1H), 3.72 (d,

40


50

$J = 1.6 \text{ Hz}$, 6 H), $3.69 - 3.56 \text{ (m, 1 H)}$, $3.54 - 3.35 \text{ (m, 3 H)}$, $3.20 - 3.02 \text{ (m, 2 H)}$, $2.67 \text{ (q, } J = 7.3, 6.0 \text{ Hz, 2 H)}$, $1.04 \text{ (dd, } J = 6.7, 3.8 \text{ Hz, 6 H)}$, $0.92 \text{ (dd, } J = 18.1, 6.7 \text{ Hz, 6 H)}$; ^{31}P NMR: (DMSO- d_6) δ 149.57 , 149.07

【0420】


実施例 25：モノマーの合成

【化 111】



10

実施例 24 からの中問体 4 (1)



20

実施例 25 のモノマー

【0421】

(2) の調製：100 mL の丸底フラスコに、化合物 1 (中問体 4、実施例 24) (1 g、1.83 mmol)、分子ふるい (1.7 g) 及び PDC (0.83 g、2.2 mmol) を室温で添加した。上記混合物に DCM (30.00 mL) を添加した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で 2 時間攪拌した。沈殿した固体を濾過によって収集し、EtOAc (3 × 20 mL) で洗浄した。得られた混合物を減圧下で濃縮した。これにより、化合物 2 (1.2 g、124.10%) が褐色固体として得られた。粗生成物 2

30

【0422】

(3) の調製：18 mL の THF 中のジメチル (ジメトキシホスホリル) メチルホスホネート (0.79 g、3.4 mmol) の溶液に、水素化ナトリウム (60%、0.27 g) を -50°C で添加した。混合物を 30 分間攪拌した。18 mL の THF 中の化合物 2 (1.2 g、2.27 mmol) を添加し、混合物を室温まで温め、1 時間攪拌した。反応物を飽和 NH_4Cl (水溶液) で室温でクエンチした。得られた残渣を EtOAc (3 × 30 mL) で抽出した。合わせた有機層を、ブライン (3 × 10 mL) で洗浄し、無水 Na_2SO_4 で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を、次の条件：カラム、C18 シリカゲル；移動相、水中 MeCN、30 分間で 5% から 95% の勾配；検出器、UV 254 nm で逆フラッシュクロマトグラフィーによって精製した。これにより、3 (680 mg、47.20%) を白色固体として得た。ESI-MS: m/z 633 $[\text{M} + \text{H}]^+$; ^1H -NMR (400 MHz, アセトニトリル- d_3) δ 8.80 (s, 1 H), 7.45–7.30 (m, 2 H), 7.26–7.07 (m, 7 H), 6.81–6.67 (m, 4 H), 6.57 (d, $J = 8.0 \text{ Hz}$, 1 H), 6.45 (dd, $J = 21.7, 17.2, 8.5 \text{ Hz}$, 1 H), 5.70 (dd, $J = 20.1, 17.3 \text{ Hz}$, 1 H), 5.23 (d, $J = 8.0 \text{ Hz}$, 1 H), 5.10 (d, $J = 3.1 \text{ Hz}$, 1 H), 4.65 (dd, $J = 4.6, 3.1 \text{ Hz}$, 1 H), 4.05 (t, $J = 8.4 \text{ Hz}$, 1 H), 3.65 (d, $J = 5.4 \text{ Hz}$, 6 H), 3.51 (dd, $J = 11.0, 6.1 \text{ Hz}$, 6 H), 3.40–3.26 (m, 1 H)。

40

50

【0423】

(4)の調製：DCM(20 mL)中の化合物3(680 mg、1.07 mmol)の攪拌溶液に、ジクロロ酢酸(0.6 mL)を0℃で空気雰囲気下で滴下した。得られた混合物を、大気雰囲気下で、0℃で30分間攪拌した。反応物を飽和NaHCO₃(水溶液)で0℃でクエンチし、混合物を水(2×20 mL)で抽出した。得られた混合物を、減圧下で25 mLに濃縮した。残渣を、次の条件：カラム、C18シリカゲル；移動相、水中MeCN、115分間で5%から95%の勾配；検出器、UV254 nmで逆フラッシュクロマトグラフィーによって精製した。これにより、化合物4(299 mg、84%)を白色固体として得た。ESI-LCMS： m/z 333 [M-H]⁻；¹H NMR(400 MHz, 酸化重水素) δ 7.60(d, J=8.1 Hz, 1H), 6.64(dd, J=22.6, 17.4, 7.2 Hz, 1H), 5.98-5.87(m, 1H), 5.77(d, J=8.1 Hz, 1H), 5.66(d, J=4.7 Hz, 1H), 4.45(dd, J=6.8, 4.7 Hz, 1H), 4.27(dd, J=9.1, 7.8 Hz, 1H), 4.15(dd, J=9.1, 8.0 Hz, 1H), 3.63(d, J=11.2 Hz, 6H), 3.22(qdd, J=7.0, 2.6, 1.3 Hz, 1H)。

10

【0424】

(5)の調製：DCM(12 mL)中のCEP[N(iPr)₂]₂(272.16 mg、0.9 mmol)の溶液を、アルゴン雰囲気下で分子ふるいで処理し、次いで1H-イミダゾール-4,5-ジカルボニトリル(106.6 mg、0.9 mmol)を添加した。得られた溶液に、10 mLのDCM中の化合物4(200 mg、0.6 mmol)を室温でゆっくりと滴下した。得られた混合物を、アルゴン雰囲気下、室温で1時間攪拌した。得られた混合物を、DCM(20 mL)中の0.5%TEAで希釈した。反応物を、室温で水でクエンチした。得られた混合物を、CH₂Cl₂(3×15 mL)中の0.5%TEAで抽出した。合わせた有機層をブライン(2×10 mL)で洗浄し、無水MgSO₄で乾燥させた。濾過後、濾液を減圧下で濃縮した。残渣を分取TLC(CH₂Cl₂/MeOH 12:1中0.5%のTEA)によって精製し、最終モノマー5(実施例25)(170 mg、50.60%)をオフホワイトの半固体として得た。ESI-LCMS： m/z 533 [M+H]⁺；¹H NMR(400 MHz, アセトニトリル-d₃) δ 8.95(s, 1H), 7.38(dd, J=8.1, 6.1 Hz, 1H), 6.61(dddd, J=21.5, 17.1, 11.1, 8.0 Hz, 1H), 5.92-5.64(m, 2H), 5.56(d, J=8.1 Hz, 1H), 4.64-4.44(m, 1H), 4.11(td, J=8.5, 4.5 Hz, 1H), 4.02(td, J=8.9, 6.4 Hz, 1H), 3.82-3.36(m, 10H), 3.24(tq, J=16.6, 8.0 Hz, 1H), 2.59(t, J=6.0 Hz, 1H), 2.54-2.45(m, 1H), 1.09-0.97(m, 12H)；³¹P NMR: δ 149.67, 149.32, 19.25, 19.13。

20

30

追加の表

40

50

【表 20 - 1】

表 1 7

配列番号	説明	配列 ⁺
55	B型肝炎ウイルス (Genbank 受託番号 U95551.1)	aattccacaacctttaccaaactctgcaagatcccagagtggaggcctgtattccctgctggtggctcc agttcaggagcagtaaacctctgtccgactactgacctctccctatctgcaatcttctcaggattggggac cctggcgtgaacatggagaacatcacatcaggattcctaggaccttctcgtgttacaggcggggttttc ttgttgacaagaatcctcacaataccgacaggtctagactcgtggtggacttctcctaattttctagggggaa ctaccgtgtgtcttggccaaaatcgcagtccecaactccaactcaccacacctctgctcctcaacttg tctggttatcgtcgtgatgtgtctcggcgcttttateatcttctcttcatcctgctgtatgacctatcttctgtt ggttctctggactatcaaggatgttgcctgttgccttaattccaggatcctcaaccaccagcacgggga ccatgccgaacctgcatgactactgctcaaggaaacctctatgtatccctcctgttgcgtgtaccaaaccttcg gacggaaattgcacctgtattccatcccatcctctgggcttccggaaattctatgggagtggggcctca ggcgtttctcctggcctcagttfactagtgcatttgtcagtggtctgtagggcttccccactgttggcttt cagttatatggatgatgtgtattggggccaagtctgtacagcatctgtagtcctttttaccgctgttacca attttctttgtcttgggtatataatfaaacctaaacaaaagagatggggttactctgtgaatttatggg ttatgtcattggaagtattgggtcctggccaaagaacacatcacaaaaaatcaagaatgttttagaaaa cttctattaacaggcctattgattggaagtgtcaaacgaattgtgggtcttttgggtttgtgctgccattta cacaatgtggttatcctgcgttaatgccctgtatgcatgtattcaatcaagcaggctttcactttctgccaa cttacaaggcctttctgtgtaacaatacctgaacctttacccgttgcctggcaacggcgaggtctgtgcc aagtgtttgctgacgcaacccccactggctggggcttggatgggcatcagcgcgtgctgtggaacctt ttcggctcctctgccgatccatactcgggaactcctagccgttgtttgtctcgcagcaggtctggagcaaa cattatcgggactgataactctgtgtcctctcccgaatatatactgtatccatggctgtaggtgtgtgtg ccaactggatcctgcgcgggacgtcctttgtttacgtcccgctggcgtgaatctgcggagacaccttct cggggtcgttgggactctctgctcccttctccgtctgccttccgaccgaccacggggcgacctctct ttacgggactccccgtctgtgccttctcatctgccggaccgtgtgcacttgccttccctctgcacgtcgc atggagaccaccgtgaacgccaccgaatgttggcaaggctttacataaggagactcttgactctctg caatgtcaacgaccgaccttgaggcatacttcaaaagactgtttgttaagactgggaggagtgggggag gagattagattaaaggtctttagtaggaggtgtaggcataaattgtgtcgcgaccagcaccatgcaa cttttccactctgcctaatcatctctgttcatgtcctactgttcaagcctccaagctgtgcttgggtggctt ggggcatggacatcgacctataaagaatttggagctactgtggagtactctggttttgccttctgacttc ttccttcagtagagatcttctagataccgctcagctctgtatcgggaagccttagagtctcctgagcattg ttcactcaccatactgcaactcaggcaagcaattcttctgctggggggaactaatgactctagctacctgggt gggtgttaatttgaagatccagcatctagagacctagtagtcagttatgtcaacactaatatgggctaaa gttcaggcaactcttgggtttcatttctgtctcacttttgaagagaaaccgttatagagtatttgggtct ttcggagtgtgattcgcactcctcagcttatagaccaccaaatgccctatctatcaacacttccggaa actactgtttagacgacgagggcaggtccctagaagaagaactccctgcctcgcagacgaaggctc aatcgccgcgtcgagaagatcgaatctcgggaacctcaatgttagtattcttggactcataaggtggg gaacttactgtctttattcttactgtacctgtcttaatctcattggaaaacaccatctttcctaataataca tttacacaagacattatcaaaaaatgtgaacagttttagggccacttacagttaatgagaaaaagagatt gcaattgattatgcctgtaggtttatccaaaggttaccaaatattaccattggataagggtattaaacctta ttatccagaacatctagttaacttacttccaaactagacactatttacaactctatggaaaggcgggtatatt atataagagagaaacaacacatagcgcctcatttgggtcaccatattcttgggaacaagatctacagca tggggcagaatcttccaccagcaatcctctgggattcttccgaccaccagttggatccagccttcagag caaacacagcaaatccagattgggacttcaatcccaacaggacacctggccagacgccaacaaggtta ggagctggagcattcgggctgggtttaccccaccgcagggagccttttggggtggagcctcagggt cagggcatactacaactttgcagcaaatccgctctgctccaccaatgcgagacaggaaggcag cctaccccgctgtctccactttgagaacactcactcaggccatgcagtgg

10

20

30

40

50

【表 20 - 2】

56	MCJ mRNA(GenBank 受託番号 NM_013238.3)	agtcactgccgcggcgcccttgagctccggccgccccttgccatggctgccgtggtgtcatcgtccagtt ggcggagagtttgcgtacgctgagtagtgcagccctcgccaaacggccagacgccgacgtcgacca gcagagactggtaaggaagttgtagctgtaggactgggtgtgagccttgcatttgcaggtcgctacg catttcggatctggaaccctctagaacaagtatcacagaaactgcaaagaagtccaactctagcttttc atcctactataaaggaggattgaacagaaaatgagtaggcgagaagctgggtcttattttaggttaagccc atctgctggcaaggcctaagattagaacagctcataggagagtcattttgaatcaccagataaagggtg gatcctctacgtagcagccaaaataaataagcaaaagacttgctagaacaaccaccaaacattgatg cttaaggaccacactgaaggaaaaaaaagaggggacttcgaaaaaaaagccctgcaaaatattc taaaacattgggtcttcttaattttctatattggaattgaccacagcttcttccaccattagctgataacaataa aatgttaatagtcttctttttattatctttaaagatctcttaattctataactgatctttttctattttgtgga cattcacaatttttaagattttgtatgtctgaattcccccctacacacacacacacacacacacacaca cacgtgcaaaaaatgatcaagaatgcaattgggattttgagcaatgagtagacctcttattgtttatatt gtaccctcattgtcaatttttttagggaaattgggactctgctatataagggttttaaatgtcttgagaaca gcactggctgatacctctggagatatgatctgaaatgtaattggaatttataaatggtgttagtaagtagg ggtaagagactgttaagaaccccactatctctgagaccctatagccaaagcatgaggacttgagagact actaaaatgattcagggttaaaaaatgagccctgtgaggaaagggtgagagaagctgaggagttgtattt aattatagcttccagctactgtatattcattactcattctacaaatatttattgaccccttttgatgtgcaagg cactatcgtgcgccccctgagagttgcaagtatgaagcagtcattgcatgaaccaagggaacttatattgt agaggaaaggataaatacacaataatgaatactgttagatagatgatatatttaaaagttcaaaaggaga aaagaatgtgttaaacactgcatgagaggaggaataatggcagtaggctttgaaaaagaaaaat attccgataccatatgattggtgaggaattgtattctgagatgagaattagcagaataatagatatcaatc ggagtgattagagtgcaagggtttctgaaagcaagggtttggacagagtggtcatcaaaaggccagccctgt gacttacactgcattaaattaattcttagaacatagtcctgacattatcactttatccaaaagggtgaga gaacagattcagatagagtgccagcattgttccagatcttcttaacaactctgggttcattccaggtaaac tgaactactgcattgtttctatcttaaaatacttttagatattcttagatgcattcttaacttcaacttctgtagt ttaggagttctcaaccttgccattattgacatgttaggc caaataattttttgtgggaggtctcttctgctgttt agatgattagcaataatccctgacctgtatctactaaagactagtcgtttctcatcagttgtgacaacaaaa tggttcagataattgccaaatgcccttttagaggacagtaatcgcceccagttgagaaccatttcagtaaaac tttaattactattttttcttgggttataaaataatgatcctgaattaaattgatggaacctggaagtcgataaaat atatttctgtttaaagtcceccatacgtgtcctactaattttctcatgcttttagtgttttctcttctgttacct tgtacctaaagaatgccatcccaatcccgatgtccacctgcccaggtctagcagatagctgaaggccaa gctaaaatgtatccctctttttctgtacatgcagcaaaagtaatatgaattatcagctttctgagagcaggca ttgtatctgtctgtttgtgttaccattggcaccataaataattttgtgagtgaaatgaataaattcccatagcac tttattctcacatgggtacataactataggggctatagctgtgtacctgtgaaagcaactctgtgttaacatac cttattctcatactaaaatgcaagaaccttttagagcaaggatcttgcattcatcttgaacctctttactctg gagcactgtcatttagcagcagcatataaagttttacgtaccaagaaaatgttgcgttttctgaatactatgcat caaaaaatgttaccactaatttttaaagctctgctaagggaatattggggcaccctcagatgcaccttttaattg atgtcatattttctaatccatactttatcatgagaatttgagtcacccagcattagcttgggaatttcttatttc ccatttgccttgaggtgcttggagtcagatctggtttgaatactatcttctgttatgtgacttgggcaggt acttaattttctagtcaataacccgtatctataaaatagagaaaaataatcctacacaccggggcctgttgtgg ggcggggagaggggggagggatgcatttggagatatactaatgtaaatgacaagtttaattgggtgcagc acaccaacatggctcatgtctacatatgtaacaacctgcacgttgtgcacatgtgccctagaacttaagt ataataaaaagaaatttaaaaaatcctgtcaaaataagggttatagtagagaataaggatgtgtaaaagcattta gtcacgtaaatgcttaaaaaatgtaatttttacttcttctactgectcatttaattagttttatctttaaataaacctt ggattcagggtaaagtttcagttatgtccagtaatactttttacccctgaatctgcaatttggatagaaca tggtggggacagctcgtctctattcttgcagcattaacaggctggaggcaccacttctctggccagcaag ttgggctgtgttggctgagagcctcagttcttctgcacagggttctctttacataggtcttctcaacagg gctactagagcatcgtacccatagcagctgtcttataacagagagtggtcgggtctgagagacaaaaatg gaagctgccaaattgtctgggtctggaaactgtcagggtcacttgcctattcagttggcctaagaa
----	--	--

10

20

30

40

【表 20 - 3】

	ttacagagcctgcctcgattcaaaaggagaggatagagaggactgaaggaaacagtgctcatctttaatat gcagcagacaggtttgggattttttcccttgagctgtgaaggcattacttaagaacaaagtcaggc atgtataattgaactacagttacttgaataataagccagaaagtccagataataatacaactattttctgct gttaccctgtacataaagatgccatectaatcccgatctccacaactatactacatagtagaagggttaa aatgtatccctcttttctggtcatccagcaaaagtaataatcatgaattatgagctctctgagagcaaggatc atatcagctctgtttattgttcagtgacaagtacagttgcagatattcaggagtaattatctaaatggcagta ggcttataaaactgaatttcaccagccacacctcccccaactcttatctgtaaaaagcttatttgatgg ttacctgtcttcagtaaaagattgccttgcatatttgctgtcattgcatattctgcttaattaaagctctgtgataatt gcagttctgtgcatacttacatcttagatgcaatctgagggcctaggaaggccttttaaaaaataaacaatt ccgattgcagagaaagtgaagtcaggacagtaattcaagggaacatagaagctatttagattttagt tgatgggtgccagcttcagcgtaaagtcaaaagtgaggaggaggttagtaaggaaaaatgtgggcttgg aatacatgttttagtcttcaaaagcacittactttttatgaatafataatttagacattcagcaaatattgaatacttac tatatcaggcagtaaaagataaaattcattcttaaaatgtcaacatgtcaaaactgaaaaaaatacattcttaa acaggaacttttctctcatactttttaatacaagacatataagagttgcattaatgggcgtgcttatgattg atcaccagcagcatcattagaataataatattttattcatgtgcagaaacttttgggtgctctggggaacctt gaaacagaaaaagagctttattgataaggtaattgaacacactgacaattagcttaatatggtttaataacca tttggggagaaagatgaatcagccaggctctttacgtcaagaatatgaagttctcttgagtcaaccaactta agatgagctacggagactgcagtgaaaagttaaatatccaaagtacaccagccaatttcacacagtggaac catgctgtctctgggcacctcgcacctcgcacacagtcataactagatggaggtcctggctgcaagg aggatttgatgggaatgagtaaatgtgtcagcatagtcctgctccttaagtgaaggcaacccaaagagc aaactctattaatggctggatcagtatcatctacttgcataaaacattccatgaattatgagtcataaaattttatt atgggtgcattacacattaagagatgaggactctctgttagcataatttattagctggaagggtgagaag gttctctggactcattttataggtggaacctaaagtcatctggataattgccaccagcaaaattgctggga tggtggacaaaagaaaattccttctaattgatttttatgagctgagtagctattgtccagctgagtgctcttt tcctcttttattgttctgagcaaaaagatttataaaaaagctcttctttttattaaaaacccctgcaattgaa atgcaagttcattaaagtaattcttcttcttctgcccataataaccccttccctctctgttcgattcaacagtat ctagcagcactgctccaaattttagtctgaacagactatattacatagatgtagagaaatactcaacttca gcataaagaggagcttaatttcacacgggtggaatatgatcactcaggctagatgttggccataaattca aattagtatctcaacttagcagggggatcaacagtggaacttcaattatgacaggataaaaaacacata gagatattggtcaatatggacatctaaactataatgctaaaagccaataatagaataagttcattttaagaa aagcattaataatattagctaacgttttagtacctgtgccaaactctacctatgttacctgttttcatagcca gcctaagaggtactattatgtatccccattttacaggttaagaacaggctcagaggagtttaggatctttcc aagattacatagccagtaagtgtggcactaggaaacaaattcagactggaatgcagctgtttatattat attgactcattctaaatattgtgggaatcagaatgaagggtctgtatgacttttggctcatttttgatgcatgt gacctgggattataaatgtgaaattaggtttacgaaaggatccagtgtcattgtgcatcatgggcaaggagt acctaatctcttaattctcctggaagcttacagatgtccatccaagtgcacatagcaaaagtctgttga gttagcagagtgactttcttgactcagatgatgacggaggaaagcttgataagattttatctgaaatgttc atggacaagagctttcaaggagaacatccaagcagggttctgaagacagctcatgaagggtgaagcagc agacctggcacaagaaatgaagagagagctcagtgatttaagatgaaacaagaaaaccgaatatatt gaaaggagcagagaggcaatgaaaacaagacaactgaaatgaggttaactgcagcaattgaaaggga atttcagtaattttatagaattcttaaaaattgttctctgtgttattttcaatttgaacagggttattgtccatgc catacttttttgcataattccaaaattgtgtatagttctatagttgtctgggtggaatggaacttttagttacc agtcataagaatgtgtctttgagattgtccagtttaattctctatttccagtagctgtaataaatgtgaaaaaggtt ctgactcctggagaaaagtttcaactcttatgactaataattcataacagactgtgagttcctgaacatggat acacctatagcaagagtgatttccaaaagcctaactcagtgatcttccatttattctatttggattagtgtgc ctttgctcttctctgttaaatgtgaatagtttaagagttgactgcagaaggtttacactttggctccatgcct ctggaaatgtttgtctttgggtgagatgtgagactatattgtatagctgcatctcaggtgccccaga atgtgtacagtgagtgctgaagaaagcagcaggtacacacagaaatgcagccttctctgtttaaaccctg cttgatctgagttacatttttctgacttctgggacttaggtaacagtttgccttactctatctcatttt
--	---

10

20

30

40

50

配列番号	説明	配列 ⁺
		gtactcgttacatactacattctgtttgggctttcgtttctcttctaagcagagatttttaaaatccaatatgt gaaaatacggatgcactacaattaataaataaaatgctgtgtgtgtgtgtgtgttgccttaaaattgtaaaaggataa acaataagatagttttatctatgtggttttcccgatgcagttaaaaataaacctaatactgctaaaaattgaa
57	TAZ(GenBank 受託番号 NM_000116.5)	gctttccggcgggtgcaccggggcggggtgccagcgccegccttcccgtttctcccgttccgcagcgc gcccacggcctgtgacccgggcaccgctccccagtgacgagagagcggggccgggcgtgctccg gcctgacctgcgaagggaacctcggtccagtcctctgttgcgcgcgccccgtccgtccgtgcgcggg ccagtcagggggcagtgctcgcagcgggtcgaggtcgcagacctagaggcgccccacaggccggccc ggggcgctgggagcgcgcggccgcgggcccgggtggggatgcctctgcacgtgaagtggccttccc gggtgccgcgcctcacctggacctggccagcagcgtcgtcatgggcttgggtgggcacctacagctg cttctggaccaagtacatgaaccacctgacctgcacaacaggaggtgctgtacgagctatcgagaa gcgaggccccggccacgccccctacaccgtgtccaatcaccagtcctgcatggacgacctcatctctg ggggatcctgaaactccgccacatctggaacctgaagttgatgcgttggacccctgcagctgcagacatc tgtttaccaaggagctacactcccacttctcagcttgggcaagtgtgtgcctgtgtgccgaggagcaga atttttcaagcagagaatgaggggaaagggtttctagacacaggcaggcacatgccaggtgctggaaa aagaagagagaaaggagatggcgtctaccagaaggggatggacttcattttggagaagctcaacctgg ggactgggtgcatacttcccagaagggaaaagtgaacatgagttccgaattcctgcgtttcaagtggggaa tcggggcgctgattgctgagtgcatctcaacccatcctctgccctgtggcatgctcgaatgaatgac gtccttctaacagtcgcacctacttccccgcttggacagaaaatcactgtgctgacgggaagcccttc agtccctgcctgtactcgagcggctccgggcggagaacaagtcggctgtggagatgcggaaagccct gacggacttattcaagaggaattccagcatctgaagactcaggcagagcagctccacaaccacctcca gcctgggagataggccttgcctgtgccttctgattcttggccgcacagagctggggctgagggatgg actgatgcttttagctcaaacgtggcttttagacagattgttcatagacctctcaagtgcctctccgagct ggtaggcattccagctcctcgtgcttctcagttacacaaaggacctcagctgcttctcccacttggccaa gcagggaggaagaagccttaggcagggtctcttcttcttgccttcagatgttctctccaggggctggct tcaggagggagcatagaaggcaggtgagcaaccagttggctaggggagcagggggccaccagagc tgtggagaggggaccctaagactcctcgccctggctcctaccaccgcccctgccgaaccaggagctgc tactacctctcagggatggccgttggccacgtcttcttctgctgagcttccccccaccacaggccct ttctcaggcaaggtctggcctcaggtggccgcaggcgggaaaagcagcccttggccagaagtcaag cccagccacgtggagcctagagtgagggcctgaggtctggctgcttggccccatgctggcgccaa cttctccatcttctgcctctcaacatcacttgaatcctagggcctgggtttcatgttttgaacagaacct aaagcatatgtgttggcttgttga

50

【表 20 - 5】

配列番号	説明	配列 ⁺
58	ANGPTL3 (GenBank 受託番号 NM_014495.4)	agaagaaaacaggtccaggtgcttgaaattgaaaatcaagataaaaatgttcacaattaagctcctcttttt attgttctcttagttatttctccagaattgatcaagacaattcatcatttgattctctatctccagagccaaaat caagatttgctatgtagacgatgtaaaatttagccaatggcctcctcagttgggacatgggtcttaagac ttgtccataagacgaaggccaaattaatgacatattcaaaaactcaacataatttgatcagctttttatgat ctatcgtgcaaacagtgaaatcaagaagaagaaaaggaaactgagaagaactacataataactacaa gtcaaaaatgaagaggtaagaatatgtcacttgaactcaactcaaaacttgaaagcctcctagaagaaaa aattctactcaaaaaagtgaatatftagaaggaactaactaacttaattcaaaaatcaactgaaact ccagaacaccagaagtaacttcaacttaaaactttgtagaaaaacaagataatagcatcaagacctctc cagaccgtggaagaccaataataacaattaaaccaacagcatagtcataaaagaataagaaatcag ctcagaaggactagtattcaagaaccacagaaatttctctatcttcaagccaagagcaccagaactac tccctttctcagttgaatgaaataagaaatgtaaaacatgatggcattctctgctgaatgtaccaccattataa cagaggtgaacatacaagtggcatgtatgccatcagaccagcaactctcaagttttcatgtctactgtgat gttatatcaggtatgcatggacattaattcaacatcgaatagatggatcacaacttcaatgaaacgtgg gagaactacaaatatggtttgggaggcttgatggagaattttggttgggcctagagaagataactccata gtgaagcaatctaattatgtttacgaattgagttggaagactggaaagacaacaacattatftgaatttc ttttacttgggaatcacgaaccaactatacgtacatctagtgcgattactggcaatgtcccaatgca atcccgaaaacaagatttggttttctacttggatcacaagcaaaaggacactcaactgtccaga gggttattcaggaggctggtggtggcatgatgagtgaggagaaaaaacctaaatggtaaatataacaaa ccaagagcaaaatctaagccagagaggagaagaggattatcttggaaagtctcaaaatggaaaggttact ctataaaatcaacaaaatgttgatccatcaacagattcagaagctttgaatgaactgagggcaaatftaa aaggcaataatttaaacattaacctcattccaaagttaattgtgtctataatctggtattaaatcttaagaga agcttgagaaatagattttttatctaaagtactgtctatttaagattaaacatacaatcacataaccttaaa gaataccgtttacatttctcaatcaaaattctataataactattgttttaaaatttggatgtgggaatcaatttag atggtcacaatctagattataatcaataggtagaacttattaaataactttctaaataaaaaatttagagacttt attttaaaaggcatcatatgagctaatatcacactttccagtttaaaaaactagtactcttgtaaaactcta aacttgactaaatacagaggactggaattgtacagttcttaaatgttgtagtatttaattcaaaaactaaaaatc gtcagcacagagatgtgtaaaaatctgtaatacaaaattttaaactgatgcttcttttctcaaaaaatattg gagtaaatgttgatagattattattatgaaacctaatgaagcagaattaaatctgtattaaataagttcgct gtctttaaacaatggagatgactactaagtcacattgactttaacatgaggtatcactataaccttattgttaa aatatatactgtatacattttatataatttaacacttaatactatgaaaacaataattgtaaaggaatcttgtag attacagtaagaatgaacataatttggtgcacgagttaaagtttatatttccctaaatatgctgtgattctaata cattcgtgtaggttttcaagtagaataaacctcgtacaagttactgaacgtttaaacagcctgacaagcat gtatataatgttaaaattcaataaacaagaccagtcctaaattatagaatttaaaattattcttgcatgtttat cgacatcacacagatccctaaatccctaaatccctaaagattagatacaaaatttttaccacagatcacttg tcagaatttttttaaatatgattttttaaaactgccagtaagaaatttttaattaaacccatttgttaaggatat agtgtcccaagttatatggtgacctaccttgtcaatacttagcattatgtatttcaaatatccaatatacatgct atatataattttatgtcacatatataaaagatatgtatgatctatgtgaatcctaagtaaatattttgttcagaa aagtacaaaataataaaggtaaaaaataatctataatttccaggaccacagactaagctgtcgaaattaacgc tgatttttttagggccagaatacaaaaatggctcctctcttcccccaaaattggacaatttcaaatgcaaaata attcattatttaatatatgagttgcttctctatttgggttcc

10

20

30

40

【表 20 - 6】

配列番号	説明	配列 ⁺
59	DGAT2 (GenBank 受託番号 NM_001253891.1)	tgccccgtgtgaggtgataaagtgttgcgtccgggacgccagegccgggctgccgcctctgctggg gtctaggctgtttctctcgcgccaccactggccgccggccgcagctccaggtgtcttagccgccagcct cgacgccgtcccgggaccctgtgtctctgcgcgaagccctggccccggggcggggcatgggcca ggggcgcggggtgaagcggttcccgcggggccgtgactgggcgggcttcagccatgaagacctca tagccgcctactccgggtcctgcgcggcgagcgtcaggccaggctgaccggagccagcgtctca cggaggacctgcgtgtcgcgcgaggggtctgggagatggggagtggcctgcagtccatcctcatgt acatattctgcaactgattgtggtcctcgtgtgtctacttacttggctggtgttactggaacacacc aagaaagtgccagggaggtcacagtgggtccgaaactgggctgtgtggcgctacttgcagactacttc ccatccagctggtgaagacacacaacctgtgaccaccaggaaactatatctttggataccacccccatggt atcatgggctggtgtccttctgcaacttcagcacagaggccacagaagtgaagaagtgtccaggc atacggccttacctggctacactggcaggcaacttccgaatgctgtgttgaggagtagctgatgtctgg aggtagctgacctgtcagccgggacaccatagactatttgccttcaaagaatgggagtgccaatgctatcat catcgtggtcgggggtgcggctgagtcctgagctccatgcctggcaagaatgcagtcacctgcggaa ccgcaagggtcttgtgaaactggcctgcgtcatggagctgacctgggtcccatctactcctttggagaga atgaagtgtacaagcaggtgatcttcgaggaggctcctggggccgatgggtccagaagaagtccaga aatacattggttgcgccatgcatttccatggtcgaggcctcttctcctccgacacctgggggtgtgtgc cctactccaagccatcaccactgttgtgggagagccatcaccatcccaagctggagcacccaacc agcaagacatcgacctgtaccacaccatgtacatggaggccctgggtgaagctcttcgacaagcacaaga ccaagttcgccctcccgagactgaggctctggaggtgaactgagccagccttcggggccaattccctg gaggaaaccagctgcaaatcactttttgctctgtaaattggaaagtgcattgggtgtgtgtgtttttaaa gaaattataacaattttgctaaaccattacaatgttaggtcttttttaagaagaaaaagtcagtattcaagtc tttcactccagcttggcctgttctaggtggtggctaaatctgggcctaatctgggtggctcagctaacctctc tttctccctctgaagtgacaaaaggaaactcagcttcttggggaagaaggattgccattagtgaattggac cagttagatgattcaacttttgccttagggatgagaggcgaaagccacttctcatacaagcccccttattgc cactacccacgctcgtctagtctgaaactgcaggaccagtttcttgcgaaggggaggagttggagag cacagttgccccgtgtgtgagggcagtagtaggcacatctggaatgctccagtttgatctcccttctgccacc cctacctcaccctagtcactcatatcgagcctggactggcctccaggatgaggatgggggtggcaatg acacctgcaggggaaaggactgcccccatgcaccattgcaggaggatgccgccaccatgagcta ggtggagtaactggttttcttgggtggtgatgacatggatgcagcacagactcagccttggcctggagc acatgcttactggtggcctcagtttaccttccccagatccttagattctggatgtgaggaagagatccctcttc agaaggggcctggccttctgagcagcagattagttccaaagcaggtggccccgaaccaagcctcact tttctgtgccttctgaggggttggccggggaggaaaccaacctctctgtgttctgttatctcttg atgagatcattgcaccatgtcagacttttgtatatgccttgaataaatgaaagtgaatacctctaaaaaa aaaaaa

10

20

30

40

50

【表 20 - 7】

配列番号	説明	配列+
60	HBV Genbank 受託番号 KC315400.1	ctccaccactttccacaaactcttcaagatcccagagtcagggccctgtactttctgctgggtggctcaag ttccggacagtaaacctgtctccgactactgctctcccatactgtaactttctcaggactggggaccc tgtaccgaatatggagagcaccacatcaggatctcaggaccctgtctgtgtacaggcggggttttctt gttgacaagaatccctcacaataccacagagtcagactcgtgtggacttctcgaattttctagggggagc acccacgtgtcttgccaaaatttgcagtccecaacctccaactcaccacacaccttctcctcaattgt cctgttatcgtcgtgatgtgtctgcgcgtttatcatcttctcttctcctgtctgtctatgacctatcttgtt ggttctctggactaccaagggtatgttgcctgttctctctacttccaggaaacatcaactaccagcaccgga ccatgcaaaacctgcacaactactgtcgaaggacacctatgtttccctcatgttgcgtacaaaacctacg gacggaaaactgcacctgtattccatcccatcttgggcttgcgaataacctatgggagtgggcctca gtccgtttcttggctcagtttactagtgcattgttgcagtggttcgtaggccttcccactgtctggtt cagttatatggatgatgtgttttggggccaaagtctgtacaactcttgagtcctttataccgctgttacca attttctttatcttgggtatacattaaacctcacaacaaaaaatggggatattcccttaacttcatggg atatgtaattgggagttggggcactttgcctcaggaaacatattgtacaaaaaatcaagcaatgttttagaaa cttctgttaaaccagcctattgttgaaagtatgtcaacraattgtgggtcttttggggttgcgcccttctc acgcaatgtggatatcctgtttaatgcctttatagcatgtataagctaagcaggcctttacttctcgcga acttacaaggccttctgtgtaaacaatactgaaccttaccctgtgtcgcgcaacgggcaggcttggc aagtgttgcgtgacgaacccccactgggtgggcttggccataggccatcagcgcgtggtgaaccttt gtggctcctctgcgcgatecactgtcgaactcctagcagcttgtttgtcgcgcgcggtctggagcaaa acttatcggcaccgacaactctgttgcctctcctcggaaatacacctccttccatggctgctaggatgtct gccaactggatctgcgcgggacgtcttctgtcagtcctcgtcgcgcgtgaatcccgcggacgacctat ctcggggcccttgggactctaccgtcccctctcgtctgcgcgttccgcgcgcgaccaggggcgcacctc tctttacggcgtctcccgtctgtgcttctcctctgcgcgacctgtgcacttgcctcactctgcacgtcg catggagaccacgtgaacgccacgggaacctgccaaggcttgcataagaggactcttggactttca gcaatgtcaacgaccgaccttgaggcacttcaaaagactgtgttactgagtgaggaggttggggg aggaggttaggttaaggcttcttactaggagctgtagcataaattggtgtgttcaccagcaccatgca acttttaccctctgectaatctctatgttcatgtctactgttcaagcctccaagctgtgccttgggtgctt tggggcatggacattgacccgtataaagaatttggagcttctgtggagtactctcttttgccttctgactct ttccttctatcagatctctcgcacccgctctgtctgtatcgggagccttagagtcctcggacattgt tcacctaccatacggcactcaggcaagcaattctgtgttgggtgagttaatgaatcagccacctgggt gggaagtaatttggagatccagcatcagggaattagtagtcagctatgtcaacgttaatatgggcctaa aaatcagacaactattgtgtttacatttctgttacttttgggagagaaactgttcttgaatatttgggtct tttggagtgtggattcgcactcctctgcatatagaccacaaaatgcccctatcttatcaacacttccgaaa ctactgtttagacgaagaggcaggtccctagaagaagaactccctcgcctcgcagacgaaggctca atcgcgcgtcgcagaagatctcaatctcgggaatctcaatgttagttattcttggacacataagggtggga aactttacgggcttattctctacggtaccttgccttatactcctaaatggcaaacctccttcttctgacattca tttgaggaggacattgttagatagatgaagcaatttggggcccttacagtaaatgaaaacaggagact taaatattatgctgtcgtgtttatcccaatgttactaaatatttgccttagataaaggatcaaacgtat tatccagagtatgtatgaatcattactccagacgcgacattttacacactcttggaaaggcgggactct atataaaagagagtcacacgtagcgcctcatttgggggtcaccatattcttgggaacaagatctacagc atgggaggtgtgtcttccaaacctcgaaggcatggggacaaaatttctgtcccaatccctgggatt ctccccgatcatcagttggacctgcattcaagccaactcagaaaatccagattgggaactcaaccac acaaggacaactggccggacgccaacaagggtgggagtgaggcattcgggccagggttaccacctcc tcattgggggactgttgggtggagccctcaggctcagggcataattcacaacagtgcagcagctcctct cctgcctccaccaatcggcagtcagggaaggcagcctactcctctctcactccttaagagacactatcc tcaggccatgcagtggaa
61	ASO 1	GalNAc4-ps-GalNAc4-ps-GalNAc4-po-mA-po- lnGpslnApslnTpslnApslnApsAps(5OH)CpsGps(5m)Cps(5m)CpsGps(5m)CpslnApslnGpslnApscp(5m)C

【表 20 - 8】

配列番号	説明	配列+
62	ASO 2	mA-po- lnGpslnApslnTpslnApslnApsAps(5OH)CpsGps(5m)Cps(5m)CpsGps(5m)CpslnApslnGpslnApscp(5m)C

10

20

30

40

50

【表 20 - 9】

74	SARS-CoV-2 ゲノム (Genbank 受 託番号 NC_045512.2)	attaaagggtttatacctccaggttaacaaaccaactttcgatctctgtagatctgttcttaacgaa ctttaaaatctgtgtgctgctactcggtcgatcttagtgcactcacgagtataaataactaactgt tegttagacaggacacgagtaactcgtctatcttctgcaggctgcttacggttcgctggttgacggc atcagcacatctaggttctgcccgggtgtgaccgaaaggtaagatggagagccttgcctcgtttcaacg agaaaaacacacgtccaactcagtttgcctgttttacagggttcgcgacgtgctcgtacgttggttgagact ccgtggaggagggtcttatcagaggcagctaacatcttaagatggcacttggcttagtagaaggtgaa aaaggcgttttgcctcaactgaacagccctatgtgttcatcaaacgttcggatgctcgaactgcacctcatg gtcattgttattggtgagctggttagcagaactcgaaggcattcagtagcgtcgtggtgagacacttgggt gtccctgtccctcattgtggcggaataccagtggtgctaccgcaagggttcttcttctgtaagaacggtataaa ggagctggtggccatagttagcgccgatctaaagtcattgacttagcgacgagcttggcactgatcc ttatgaagattttcaagaaaactggaaactaacataacatagcagtggtgttaccgtgaactatgctgtagct taacggaggggcatcactgctatgtcgataacaacttctgtggccctgatggctaccctcttgatgcat taaagacctctagcacgtgctggttaaagcttcatgcactttgtccgaacaactggactttattgacactaag aggggtgtatactgctgccgtgaacatgagcatgaaattgcttggtagcggaaactgttctgaaaagagcta tgaattgcagacacctttgaaattaaattggcaaaagaaattgacacctcaatggggaatgtcctaaatttg tatttccctaaattccataatcaagactattcaacaaagggttgaagaaagaaagcttgatggcttattgggt agaattcgatctgtctatccagttgctgcacaaatgaatgcaacaaatgtgctttcaactctcatgaagt gtgatcattgtgtgaaacttcatggcagacggcggtttgttaagccacttgcgaattttgtggcactgga gaatttgactaaagaagggtgccactactgtgtgttacttaccctaaatgctgtgtttaaatttattgtccagc atgtcacaattcagaagtaggacctgagcatagcttgcggaataccataatgaatctggcttgaagaccat tcttcgaagggtggtgcactattgcttggaggctgtgtgttcttattgtgttggccataacaaggtgctc ctattgggtccacgtgctagcgttaacataggtgttaaccatacagggtgtgttggagaagggttccgaagg tcttaatagacaaccttcttgaatactccaaaagagaaggaacatcaataattgttggtagctttaaactta atgaagagatcgccattatttggcatcttttctgctccacaagtgttttgggaaactgtgaaagggttgg attataagcattcaacaaattgtgaactcgtgtgaattttaaagttacaaaaggaaagcctaaaaagggt tgcctgggaattgtgtgaacagaaatcaatactgagtcctcttattgcatctcagagggcgtgctgtgttg tacgaatcaatttctccgcactcttgaactgctcaaaattctgtgctgttttacagaaggccgctataaca atactagatggaatttcacagatttactgagactcattgatgtatgattgtcacatctgatttggctactaac aatctagttgtaattggcctacattacaggtgtgtgttgcagttgacttcgcaatggcctaactaacatcttgg cactgtttatgaaaaactcaaacccgctctgattggcttgaagagaagtttaagggaagggtgtagagttctt agagacgggtgggaattgttaaatttatcacaactgtgcttgtgaaattgtcgttgacaaaattgtcacctg tgcaaaaggaaattaggaaggtgttcagacattcttaagcttgaataaaattttggcttgtgtgctgactc tatcattattgttgagctaaacttaaaagccttgaatttaggtgaaacattgtcacgcactcaaaaggattgt acagaaagggtgtttaaaccagagaagaaactggcctactcatgctctaaaagcccaaaagaaattatc ttcttagaggaggaaacacttccacagaaggtttaacagagggaaggttcttgaaaactgggtatttaca ccattagaacaacctactagtgaagctgtgaagctcattgtgtgtacaccagttgtattaacgggcttat gttgctcgaatcaagacacagaaaagtactgtgccccttgacctaataatgatgttaacaacaataacct cacactcaaaggcgtgcaccaacaaagggttacttttgggtgatgacactgtgatagaagtgaagggttaca agagtgtgaatatcacttttgaacttgatgaaaggattgataaagtacttaatgagaagtgtcctgcctataca gttgaactcgttacagaagtaaatgagttcgctgtgtgttggcagatgctgtcataaaaacttgaacca gtatctgaattacttacaccactgggcattgatttagatgagtgagtagtggctacatactacttattgtatgag tctgttgaggtttaaattggcttcacatattgttcttctaccctccagatgaggatgaagaaagggtga ttgtgaagaaagaggtttgagccatcaactcaatagagtagtactgaagatgattaccaagggttaaac ttggaatttgggtccacttctgctgcttcaacctgaagaaagcaagaaagaggttgaatgatgatgat agtcaacaaactgttggcaacaagacggcagtgaggacaatcagacaactactattcaacaattgttga ggttcaacctcaattagagatggaacttacaccagttgttcagactattgaagtgaatagttttagtgttattt aaaacttactgacaatgtatacttaaaaatgcagacattgtggaagagctaaaaagggttaaaaccaacag tgggttgaatgcagccaatgtttaccttaaacatggaggaggtgttcaggagccctaaataaggctacta caaatgccatgcaagttgaatctgatgattacatagctactaatggaccacttaagtggtgtgtgtgtgtgt
----	--	---

10

20

30

40

50

【表 20 - 10】

	ttaaagcggacacaactctgtcctaactgtcttcatgtgtcggcccaaatgttaacaaagggtgaagacatt caactcttaagagtgcttatgaaattttaacagcacggaagttctacttgcaaccattattatcagctgggtattt ttggtgctgacctatatactttaaagagttgtgtagatactgttcacacaaatgtctactgtctgttggat aaaaatctctatgacaaactgtttcaagcttttggaaatgaagagtgaaagcaaagtgaaacaaagatc gctgagattcctaaagaggaagttaagccattataactgaaagttaacacctcagttgaacagagaaaaa agatgataagaaaataaagcttgggttgaaaggttacaacactctggaagaaactaagttcctcacag aaaacttggttattatgacattaatggcaatctcatcagattctgccactctgttagtgacattgacatc actttcttaagaaagatgctccatataatagtggtgtgtgttcaagagggtgttttaactgctgtgtgtata cctactaaaaaggctgtggtgactactgaaatgctagcgaagcttggagaaaagtgcacacagacaatt atataaccacttaccgggtcagggtttaaaggttactgttagaggaggcaagacagtgcttaaaaaag tgtaaaagtgccttttacttctacatctattatctctaatgagaagcaagaaattcttggaaactgttcttga atgtgcgagaaatgctgcacatgcagaagaaacacgcaattaatgcctgtctgtgtggaactaaagcc atagtttcaactatacagcgtaaatataagggtatataacaaagagggtgtgtgtgattatggtgctagatt ttacttttacaccagtaaaacactgtagcgtcacttatcaacacacttaacgatctaaatgaactctgttac aatgccactgtgctatgtaacatggcttaatttggaaagagctgctcgggtatagagatctcctcctaaagtg ccagctacagtttctgttcttctacgtgctgtttagcgtataatggttatcttcttcttcttaaaacacc tgaagaacattttatgaaaccatctcactgtggttcttataaagattggtcctattctggacaatctacaca actaggtatagaatttcttaagagaggtgataaaagtgtatattacactagtaacctaccacattccacctag atggttgaaagtatcaccttggacaatcttaagacacttcttcttgagagaaagtggagactattaaaggtgtta caacagtagacaacattaacctccacacgcaagttgtggacatgtcaatgacatatggacaacagtttgggt ccaacttatttgatggagctgtgttactaaaaaaacctcataattcacatgaaggtaaacttttatgtt ttacctaatgatgacactctacgtgttgaggcttttgagtactaccacacaactgatcctagtgttctgggtag gtacatgtcagcattaaatcacactaaaaagtggaataccacaagttaatggtttaaactctattaaatgg gcagataacaactgttatcttggcactgctgttgaacactccacaataagagttgaagttaacacactg ctctcaagagtgcttattacagagcaagggctgggtgaagctgctaaactttgtgacattatcttagcctactgt aataagacagtagtggtgaggtgtgttgtagaagaacaatgagttactgtttcaacatggcaatttagatt cttgcaaaagagtgcttgaacgtggtgtgtaaaactgtggacaacagcagacaaccttaaggggtgtagaa gctgttatgtacatgggcacacttcttatgaacaatttaagaaagggtgttcagataacctgtacgtgtgtgaa acaagctacaaaatatctagtacaacaggagtcacctttgttatgtatgacagaccacctgctcagtgatgaa cttaagcatggtacatttctgtgtgtgtagtactggttaattaccagtggtgctactataaacatataact tctaaagaaacttgtattgcatagacgggtgttacttacaagctcctcagaatacaaggtcctattacgga tgttttctacaaaagaaacagttacacaacacataaaacagttactataaattggatgggtgtgtgtgttac agaattgacctaaagtggacaattattataagaaagacaattcttattcacagagcaaccaattgatcttg taccaaaccaacatatccaaacgcaagcttcgataatttaagttgtgtatgtgataatatacaatttgcgtatg atttaaacagtgtaactggttataagaacctgcttcaagagagcttaaaagtacattttccctgacttaaatg gtgtatgtgtgctattgattataaacactacacacctcttttaagaaaggagctaaattgttacataaacct attgtttggcatgttaacaatgcaactaataaagccacgtataaaccaaatacctggtgtatagctgtctttg gagcacaacaaacagttgaacatcaaatctgttgatgtactgaagtcagaggacgagcagggaatggat aatcttgcctgcgaagatcaaaaccaggtctctgaagaagtgtggaataatctaccatacagaagacgt tcttgagtgtaagtgtgaaactaccgaaagttgtaggagacattataacttaaacagcaataatagtttaaaa attacagaagagggtggccacacagatctaattggctgcttatgtagacaattctagtcttactattagaac ctaattgaattatctagagtattaggttgaacacctgtctactcatgtgttagctgtgttaatagtgtccctg ggatactatagctaattatgctaagcctttcttaacaaagttgttagtaactactaacatagttacacgggtg tttaaacctgtgttgtactaattatagccttatttcttattgtctacaattgtgtacttttactagaagtacaa attctagaattaaagcatctatgccactactatagcaagaatactgttaagaggtgctggtaattttgtcta gaggtctcatttaattttgaagtcacctaatttttcaactgataaattataaatttgggttttactattaaagt ttgcctagggttcttaactctacacacgctgtttaggtgttttaagtctaaatttaggcacgtcttctactgtac tggttacagagaaggctatttgaactctactaatgtcactattgcaacctactgtactgttctatacctgttag tggttctttagtggttagattctttagacacctatccttcttgaactatacaaaattaccatttctctttaa
--	--

10

20

30

40

50

【表 20 - 11】

		tgggatttaactgcttttggcttagtgcagagtggttttggcatatattctttactaggttttctatgacttg gattggctgcaatcatgcaattgttttcagctatttgcagfacatttattagtaattcttggcttatgtggtta aattaatctgtacaatggccccgatttcagctatggtgaatgtacatctctttgcatctttattatgtat ggaaaaagttagtgatgttgtagacggttgtaattcatcaactgtatgatgttacaacgtaatagagca acaagatgcgaatgtacaactattgtaattggtgtgaaggctctttatgtctatgtaatggaggtaagg cttttgcacaaactacacaattggaattgtgtaattgtgatacttctgtgctgtagtacatttattagtgatgaa gttgcgagagactgtcactacagtttaaaagaccaataatccactgaccagctcttctacatcgttgatag tgttacagtgaagaatggttccatccatcttactttgataaagctggtaaaagacttatgaaagacattctct ctctcattttgttaacttagacaacctgagagctaaataacactaaagggttcattgcttataatgttatagttttg atgtgtaaaacaaaatgtgaagaatcatctgcaaaatcagcgtctgttactacagtcagcttatgtgtcaacct atactgttactagatcaggcattagtgtctgtatgttgggtgatgtgcggaagttgcagttaaaaatgttgatgc ttacgttaatacgttttcaactttaaactgaccaatggaaaaactcaaacactagttgcaactgcagaag ctgaacttgcaaaagatgtgtccttagacaatgtcttactcttttatttcagcagctcggcaagggtttgtg attcagatgtgaaactaaagatgttggatgtcttaattgtcacatcaatcgtacatagaagtactggc gatagttgtaataactatgtctaccataacaaagtgaacacatgacaccccgaccttgggtgctgtat tgactgttagtgctgctcatattatgctgagtagcaaaagtcacaacattgctttgataaggacgttaa agattcatgtcattgtctgaacaactacgaaacaaatcgtagtgtgctgctaaaaagataaacttaccttta agttgacatgtgcaactactagacaagttgtaattgttgaacaacaaagatagcacctaaagggtggtgaaaa ttgttaataattggttgaagcagtttaataagttacactgtgttcttttgtgctgctatttctatttaataaca cctgttcatgtcatgtctaaacatactgactttcaagtgaatcataggatacaaggctattgatgtggtgtg cactcgtgacatagcatctacagatactgttttgcatacaaacatgctgatttgacacatggtttagccagc gtgtgtgtagttataactaatgacaaagcttgcctcattgctgctgacatacaagagaaggtggtttgtg cgtgctggtttgcttgccagatattacgcacaactaatggtgacttttgcatttcttactagagttttagt gcagttggttaacatctgttacacacatcaaaacttataagtagtactgactttgcaacatcagcttgtgttt agggttctgtgtcttatgaaagtttacgccctgacacacgttatgtgtcctatggatggctctatttactaatcc taacacctaccttgaagggttctgttagagtggttaacaactttgattctgagtactgtagcagcagcactgtg aaagatcagaagctggtttgtgtatctactagtgttagatgggtacttaacaatgattattacagatctttac caggagtttctgtgtgtgatgtgttaaattacttactaataatttacaccactaattcaacctattgtgtgc tttgacatatacgcactatagtagctggtgtgtattgtagctatcgtatgaacatgacctgacctattttatg aggtttagaagacttttgggaatacagtcagtgatgtcccttaatactttactattcttattgtcattcactgt actctgtttaacaccagtttactcatttacttgcgtgtttattctgttatttactgtacttgacattttactta tgatgtttcttttttagcacatattcagtggtgtgttattgttcacaccttttagtacctttctggataacaattgctta tactattgtatttccacaaagcatttctatttgggttctttagtaattacctaagagacgtgtatgtctttaatggtgt ttccttttagtacttttgaagaagctgctgctgtgcaccttttgttaataaagaaatgtatctaaagtgtcgtagt gatgtgtctattacctcttacgcaatataatagatactttagctctttataataagtacaagtatttagtgagcaa tggatacaactagctacagagaagctgctgtgtgtcctcgcgaagggtctcaatgacttcagtaactcag gttctgatgttctttaccaaccacacaaacctctacacctcagctgttttgcagagtggttttagaaaaatg gcattcccatctgtgaaagtgagggtgtgtatgtgtacaagtaactgtgtgtacaactacacttaacggctttg gcttgatgacgtatttactgtccaagacatgtgtatgtcacctctgaagacatgttaaccctaattatgaa gatttactcattcgttaagtctaatcataatttctgtgtacaggctgtgaatgttcaactcagggttattggacatt ctatgcaaaattgtgtacttaagcttaaggttgatacagccaatcctaagacacctaagtataagtttctgc attcaaccaggacagactttttagtgttagctgtttacaatggttcaccatctggtgtttaccaatgtgtatg aggcccaatttactattaaagggttcttctaatggttcatgtgtgtgtgtgttttaacatagattatgact gtgtctcttttgttcatgacatattggaattaccaactggagttcatgctggcacagacttagaaggtaac ttttatggaccttttgttgacaggcaaacagcacaagcagctgtgtacggacacaactattacagttaatgttt agcttgggtgtacgtgctgtttataatggagacaggtgtttctcaatcatttaccacaactcttaagtact taacctgtgtgctatgaagtacaattatgaaccttaacacaagacctgttgacatactaggacctcttctg ctcaaacctgggaattgccgttttagatgtgtgtcttataaaagaattactgcaaaatggtatgaatggacgt
--	--	---

10

20

30

40

50

【表 20 - 12】

	accatattgggtagtgctttatagaagatgaattacacctttgatgtgttagacaatgctcagggttacttt ccaaagtgcagtgaagaacaatcaagggtacacaccactggtgttactcacaattttgacttcactttta gttttagtccagagtactcaatggctttgtctttttgtatgaaaatgaccttttactttgctatgggtattat gctatgtctgcttttgaatgatgtttgcaacataagcatgatttctctgtttgtttgttaccttcttgc ctgtagcttattttaatatggtctatatgctgtagttgggtgatgcgtattatgacatggttgatgatgtga tactagtgttctgggtttaagc taaaagactgtgttatgtatgcatcagctgtagtgttactaatccttatgaca gcaagaactgtgtatgatgtgtgtaggaaggtgtggacacttatgaatgtcttgacactcgtttataaag tttattatggtaaatgctttatgacaaagccatttccatgtgggctcttataatctctgttacttcttaactcagggt gtagtgtacaactgtcatgtttttggccagagggtattttatgtgtgtgagtattgcccatttttctcataact ggtaatacacttcagtgataatgctagtattgtttcttaggctattttgttactgttactttggccctttgttta ctcaaccgctacttttagactgactcttgggtttatgattacttagttctacacaggagttagataatgaattc acaggggactactcccccagaatagcatagatgacctcaaacacattaaattgttgggtgttgggtgg caaacctgtatcaaatgtagccactgtacagctcaaatgtcagatgtaagtgcacatcagtagtcttactc tcagttttgcaaacactcagagtagaatatcatctaaattgtgggctcaatgtgtccagttacacaatgacat tctcttagctaaaatactactgaagcctttgaaaaatgttttactacttctgttttgccttccatgcagggt gctgttagacataaacaagcctttgtgaagaaatgtggaacaagggaacacttacaagctatagccctag agtttagtccctccatcatatgcagcctttgtactgtcctcaagaagccttatgagcagcgtgtgtcctaatggtg attctgaagttgtcttaaaaagtgaagaagctttgaatgtggtctaaatctgaatttgaccgtgatgcagcc atgcaacgtaagttggaagatggctgatcaagctatgaccacaaatgtataaacaggctagatctgagg acaaaggggcaaaagttagtgctatgcagacaatgcttttactatgcttagaaaagtggataatgatg cactcaacaacattatcaacaatgcaagagatggtgtgttccctgaacataatacctcttacaacagcag ccaaactaatgtgttcataccagactataacacataaaaaatcgtgtgatgtgacaacatttacttatgca tcagcattgtgggaaatccaacagggtgtgatgcagatagtaaaattgttcaacttagtgaattatgtatgg acaattcacctaatttagcatggcctcttattgaacagctttaaggcccaattctgtctcaaatcagataa atgagcttagtctgtgactacgacagatgtctgtgtgctccggtactacacaactcgttgactgatga caatgcgttagcttactacacaacaacaaggagggttaggtttgtactgtcactgttatccgatttacagat ttgaaatgggctagattccctaagagtgatggaaactggtactatctatacagaactggaaccacctgttagg ttgttacagacacacctaaaggctcctaaagtgaagtatttatacttttataaaggattaaacaacctaaatag agggtatggtactgtgtgttttagctgccacagtacgtctacaagctggtaatgcaacagaagtgctgcc attcaactgtattatctttgtgttttgcgtgtgatgctgctaaagcttacaagattatctagctagtggggg acaaccaactactaatgtgttaagatgtgtgtacacacactgggtactggtcaggcaataacagttacacc ggaaagccaataggaatcaagaatcctttgggtgcatcgtgtgtgtgtactgcccgttgccacatagatcat ccaaatcctaaaaggattttgtgacttaaaaaggtatgtacaaatcctacaactgtgtcaatgacctgt gggttttacacttaaaaacacagctgtgtaccgtctgcgtatgtggaaagggttatggctgtatgtgtgatcaa ctccgcgaaccatgcttcagtcagctgatgcacaatcgtttttaaagggtttgcccgtgtgaagtgcagccc gtcttacaccgtgcggcacaggcactagtactgatgtctgtatagggcttttgacatctacaatgataaag tagctggttttgcataatctcaaaaactaattgtgtcgttccaagaaaaggacgaagatgacaatttaatt gattcttactttgtagttaagagacacacttcttaactaccaacatgaagaacaatttataatttacttaagg attgtccagctgtgtgtaaacatgacttcttaagttaagaatgacgggtgacatggtaccacatatcacgt caacgtcttactaaatacaaatggcagaccctcgtctatgctttaaaggcattttgatgaaggtaattgtgaca cattaaaaagaaactgttcacatacaaatgtgtgatgatgattatttcaataaaaaaggactgggtatgtttgt agaaaacccagatattacgcgtatagccaaacttaggtgaacgtgtacgccaagcctttgtaaaaacagat acaattctgtgatgccatgcgaaatgctggtattgtgtgtactgacattagataatcaagatctcaatgta actgggtatgattcgggtgatttcatacaaaaccacgccaggtagtggagttcctgtgtgatttcttatttcaatt gttaatgcctatattaaccttgaccagggtttaaactgcagagtcacatgttgacactgacttaacaaagcctt acattaagtgggattgttaaaatgacttcacggaagagagggtaaaactcttgaccgttattttaaatt gggtagcagacatacccccattgtgttaactgtttggatgacagatgcattctgcattgtgcaaacctttaa gttttattctctacagtggttcccactacaagtttggaccactagtgaagaaaatattgttgatggtgttccat tttagtttcaactggataccactcagagagctaggtgtgtacataatcaggatgtaaaccttatactgctct
--	--

10

20

30

40

50

【表 20 - 13】

	agacttagtttaaggaattacttctgtatgctgctgacctgctatgcacgctgcttctgtaacttacta gataaacgcactacgtgctttcagtagctgcacttactaacaatgttctttcaaacgtcaaacccggtaa tttaacaaagacttctatgacttctgctgcttaagggtttcttaaggaaaggttctgtgaattaaacac ttcttcttctcaggaatggaatgctgctatcagcgattatgactactatcttataatctaccaacaatgtgtg atatcagacaactactattttagtgaagtgttgataagtactttgattgtacgatggggtgtattaatgc taaccaagtcacgtcaacaacctagacaaatcagctggtttccattataaatgggtaaggctgactt tattatgattcaatgagttatgaggatcaagatgcacttttcgcatatacaaacgtatgtcatccctactata actcaaatgaatcttaagtatgccattagtgcaagaatagagctcgcaccgtagctgggtctctatctgta gtactatgaccaatagacagtttcatcaaaaattattgaaatcaatagccgccactagaggagctactgtag taattggaacaagcaaatctatggtggttgccacaacatgttaaaaactgtttatagtgatgagaaaccc tcacccttgggtggggttaaccctaaatgtgataggccatgcctaacatgcttaagaattatggccctcactg ttctgtctgcacaacatacaacgtgtgttagctgtcacaccgtttctatagattagtaaatgagtgctcaa gtattgagtgaaatggtcatgtgtggcggttactatatttaaacagggtggaacctcatcaggagatgcc acaactgcttatgctaatagtgttttaacattgtcaagctgtcacggccaatgttaatgcacttttactctg atggttaacaaaattgccgataagtatgccgaattacaacacagactttatgagtgctctatagaaatag agatgttgacacagactttgtgaatgagttttacgcataattgcgtaaacatttcaatgatgatactctga cgatgctgtgtgtgttcaatagcactttatgcactcaaggcttagtggttagcataaaagaactttagtcag ttctttattcaaaaactgtttttatgtctgaagcaaaatgttgactgagactgaccttactaaaggacctc atgaattttgctctcaacatacaatgctagttaaacaagggtgatgattatgtgtaccttcttaccagatccat caagaatcctaggggccggctgtttgtatgataatcgtaaaacagatggtacacttatgattgaacgggt tcgtgtcttagctatagatgcttaccacttactaaacatcctaatacaggagatgctgtgtcttcttattgta cttaacatacaagaagctacatgatgagttacaggacacatgtagacatgtattctgttactgcttacta atgataacacttcaagggtattgggaacctgagttttatgaggctatgtacacaccgcatacagcttaccagg ctgttggggtgtgttcttggcaattcacagacttcaatagatgtgtgctgtgacacgtagaccattctatg ttgtaaatgctgttacgacctgtcatatcaacatcacataaattagcttctgttgaatccgtatgttgaat gtccagggtgtgtgtcacagatgtgactcaacttacttaggaggtatgagctattattgtaaacacataa accaccattagtttccattgtgtcctaattggacaagttttgtttatataaaaatacatgtgttgtagcgtat aatgttactgactttaaagcaattgcaaatgtgactggacaatgctggtgattacatttttagtcaaacctgt actgaaagactcaagctttttgcagcagaaaagcctcaaaactgtaggagacatttaactgtcttattggt attgctactgtacgtgaagtgtgtgtgacagagaattacatcttcatgggaagtgtgtaaaccttagaccac cacttaaccgaaattatgtcttactggttatcgtgtaactaaaaacagtaaaatagaaggagatcac ctttgaaaaagggtgactatggtgatgctgtgtttaccgaggtacaacaacttacaataaattgttgggtgatt atgttgtgtgacatcacatacagtaattgccattaggtgcacctacactagtccacaagagcactatgttag aattactggcttatacccaactcaatctcagatgagtttctagcaatgttgcaaatatcaaaagggtg gtatgcaaaagtattctacactccaggaccacctggtactggtgaagagtcattttgctattggcctagctct ctactacccttctgctgcatagtgtatagcttgcctcatgccgtgttgatgactatgtgagaaggcat taaaatatttgcctatagataaattgtagaattatacctgcacgtgctcgtgtagatgttttgataaattca aagtgaattcaacattagaacagatgtctttgtactgtaaatgcattgccctgagacgacagcagatagatt gtctttgatgaaattcaatggccacaattatgattgagtggttcaatgccagattacgtgtaagcactat gtgtacattggcgacctgctcaattacctgcaccacgcacattgctaactaagggcacactagaaccag aatattcaattcagtggtgtagacttatgaaaactataggtccagacatgttctcggaaactgtcggcggtgt cctgctgaaattgttgacactgtgagtgctttgtttatgataaagcttaaaagcacaataagacaaatcag ctcaatgctttaaattgtttataagggtgttatcacgcatagtgtttcatctgcaattaacaggccacaatatg gcgtggtgaagaattcccttacacgtaacctgcttgggaaaaagctgtctttatttacccttataattcacag aatgctgtagccctcaaaatgttgggactaccaactcaactgttgattcattcacagggtcagaattatgact atgtcatattcactcaaacactgaaacagctcactcttgaatgtaaacagatttaattgttactattaccaga gcaaaagtaggcactattgcataatgtctgtagagacctttatgacaagttgcaatttacaagcttgaat tccacgtagggaatgtggcaactttacaagctgaaaatgtaacaggactctttaaagattgtagtaaggtaat cactgggttacatcctacacaggccactacacacctcagttgacactaaattcaaaactgaagggtttatgt	10
		20
		30
		40

10

20

30

40

50

0

20

30

40

【表 20 - 15】

	gataaccctgctctaccatttaattgatgggtgtttttgcttccactgagaagttaacataataagggtctg gatttttggtactacttttagattcgaagaccagtcctactattgttaataacgtactaatgtgttattaaag tctgtgaattcaattttgtaattgatccattttgggtgtttattaccacaaaaacaagaattggatggaaa gtgaggtcagagtttattctagtgcgaataattgcacttttgaatatgtctctcagcctttcttatggacctgaa ggaaaacagggtaatcctcaaaaatcttaggggaattgtgtttaagaataattgatgggttttaaaatatttcta agcacacgcctatttaatttagtgcgtgatctccctcagggttttcggctttagaacattggtagattgccca atagggtattacatcactagggttcaacttactgtcttcatagaaagtattgactcctgggtattcttctca gggtggacagctgggtgctgcagcttattatgtgggttatcttcaacctaggaactttctattaaataataatgaa aatggaaccattacagatgctgtgactgtgcacttgaccctctctcagaacaaagtgtacgttgaatcc ttcactgtgaaaaagggaatctataaacttcaacttttagagtcacacaaagaatctatttttagatttct aatattacaaactgtgcccttttgggtgaagttttaacgccaccagatttgcactgtttatgcttggaaacagg aagagaatcagcaactgtgtgtgtgatttctgtcttatataatccgcactatcttccacttttaagtgttattgg agtgctctctactaaataaataatgatctgtcttactaatgtctatgcagattcatttgaattagaggtgatgaa gtcagacaaatcgctccagggaactgggaagattgtgtattataataataatcagagattttacag gctgcgttatagcttggaaattcaaatctgtattctaagggtgggtgaattataatcctgtatagattgtt agggaagtctaactcaaaccttttgagagagataattcaactgaaatctatcaggccggtgacacacctgtga atgtgtgtgaagggttttaattgttacttcttcaaatcatatgtttccaacccactaatgggtgtgttaccaa ccatacagagtagtagtactttcttgaacttctacatgcaccagcaactgttgggtgacctaaaaagtctac taatttgggttaaaaacaaatgtgtcaattcaactcaatgtgttaacaggcacaggtgttcttactgagtctaa caaaaagtcttgcctttcaacaatttggcagagacattgctgacactactgactgtctccgtgatccacag acacttgagattcttgacattacacatttcttgggtgtgtcagtggtataacaccagggaacaaacttct aaccagggttgcgttcttatcaggatgttaactgcacagaagtcctgttgcattcatgcagatcaacttact cctacttggcgtgtttattctacaggttcaatgttttcaaacacgtgcaggctgttaataagggtgctgaacat gtcaacaactcatatgaggtgtgacataccattgggtgcaggtatgtcgtgtatcagactcagactaatt ctcctcggcgggcacgtagtgtagtcatatccatcattgctacactatgtcacttgggtgcagaaaatt cagttgcttacttaatactctattgccataccacaaaatttactattagtgttaccacagaattctaccagt gtctatgaccaagacatcagtagattgtacaatgtacatttgggtgattcaactgaatgcaacaaactttgtt gcaatatggcaggtttttgacacaaatcaaacctgtcttaactggaatagctgttgacaagacaaaaacac ccaagaagtgtttgcacaagtcaaaaacaaattcaaaaacaccaccaatgaagatttgggtgttttaattttc acaaaattaccagatccatcaaaaacaaagcaagaggtcatttattgaagatcactttcaacaaagtgcaca cttgacagatgctggcttcatcaaaaatattggtgattgcttgggtgatattgctgtagagacctatttggc acaaaagttaacggccttactgttttggcacttggctcacagatgaaatgattgctcaatacacttctgcact gttagcgggtacaatcacttctggttgaccttgggtgcaggtgctgcattacaataccatttgcctatgcaa atggccttataggttattggtattggaattacacagaatgttctctatgagaacccaaaattgattgccaacca atttaatagtgctattgcaaaattcaagactcacttttccacagcaagtgacttggaaaacttcaagatg tggtaaccacaaaatgcacaagctttaaaccacgcttgttaaacacttagctccaaatttgggtgcaattcaagt gttttaaatgatacctttcagctcttgacaaagttagggtgaagtgcgaattgataggttgatcacaggca gacttcaaaagttagacatatgtgactcaacaattaattagagctgcagaaatcagagcttctgctaattct gctgctactaaaatgtcagaggtgtgacttgacaataaaaagagtgatttgggtgaagggtgctatcact ttatgtctctccctcagtcagcacctcatggtgtagtcttctgcatgtgacttatgtccctgcacaaagaaaag aacttcacaactgctcctgccatttgcctatgaggaagacacacttctcgtgaaggtgtctttttcaaat ggcacacactggtttgaacacaaagggaattttatgaaccacaaatcattactacagacacacatttgtgt ctggtaactgtgtgtgtatagggaattgtcaacaacacagtttatgtatcttgcacactgaatttagactcat tcaaggaggaggttagataaatttttaagaatcatacatcaccagatgttgaattaggtgacatctctggcatt aatgcttcagttgtaaacattcaaaaagaaattgaccgctcaatgaggttgccaaagatttaaatgaatctc tcacgatctcaagaacttggaaagttagcagcatatataaaaatggccatggtacatttggctaggtttata gctggcttgattgccatagtaattggtgacaattatgcttggctgtatgaccagttgctgtatgtctcaagggt ctgttgttcttggatcctgctgcaaaattgatgaagacgactctgagccagtgctcaaggagtcgaattta cattacacataaacgaactttaggatttgtttatgagaatctcacaattggaactgtaacttgaagcaaggt	10
		20
		30
		40

【表 20 - 16】

	gaaatcaaggatgctactcctcagattttgttcgcgctactgcaacgataccgatacaagcctcactccctt tcggatggcttattgttggcgttgcaactcttgcgtgttttcagagcgcttccaaaataaccccaaaaaa agatggcaactagcactctccaagggtgttactttgttgaacttgcgtgtttgttgaacagtttactca cacttttgcctgtgtgctgctgcccgtgaagcccctttctctatctttatgcttttagtctacttcttcagagtagata aactttgtaagaataataatgagccttggccttggctggaaatgccgttccaaaaaccattctttatgatgc caacttttcttctgctgcatataaattgttacgactattgtataccttacaatagtgaacttctcaattgtcatt acttcagggtgatggcacaacaagtcctatttctgaacatgactaccagattgggtgttatactgaaaaatgg gaatctggagtaaaagactgtgtgtattacacagttacttacttcagactattaccagctgtactcaactca attgagtagacagactgtgtgtgaacatgttaccttctcatctacaataaaattgtgtgagcctgaagaac atgtccaaatcacacaatcgacgggtcatccggagtgttaatccagtaattggaaccaatttatgatgaacc gacgacgactactagcgtgctttgtaagcacaagctgatgagtagcgaacttatgtactattcgtttcggga agagacaggtacgttaatagttaatagcgtactcttttctgttctgtgtattctgtctagttaacactagcc atccttactgcgttcgattgtgtgcgtactgctgcaatattgttaacgtgagcttctgtaaaacctcttttactgt ttactctgtgttaaaaaatcgaattctcttagagtctctgatctctgtgtctaaacgaactaaatattatattagt ttctgtttggaaactttaatttttagccatggcagattccaacgggtactattaccgttgaagagcttaaaaaagctc cttgacaatggaactctagtaataatgtttcttcttcttctacatggattgttcttctacaatttgcctatgccaaca ggaaataggtttgtatataaataagtaatttctctgtgtgtatggccagtaactttatgctgtttgtgtgtgtg ctgctgtttacagaataaattggatcaccgggtggaattgtctatcgcaatggcctgtctgttaggctgtgagtg ctcagctacttcttcttctcagactgtttgcgcgtacgcgttccatgtgtcattcaatccagaaactaac attcttctcaacgtgccactccatggcactattctgaccagaccgtcttagaaagtgaactcgtaatcgga gctgtgatccttctgtgacatcttctgtattgttgacaccatctaggacgctgtgacatcaaggacctgct aaagaatcactgtgtgacatcagcaacgcttcttattacaaattggagcttctgcagcgtgtgacaggt gactcaggttttgcctgcatagcgtctacaggattggcaactataaattaaacacagaccattccagtagc agtgacaatattgttctgtgtacagtaagtgaacaagatgtttcatctcgttgaactttcaggttactatagc agagatattactaattattatgaggacttttaaggtttccatttggaaatcttgattacatcaaaacctcataatta aaaatttctaaagtcactaactgagaataaataattctcaattagatgaagagcaaccaatggagattgatta aacgaacatgaaaattattcttcttctgactgataaacctcgtactgtgagctttatcactaccaagagt gtgttagaggtacaacagtagttttaaagaacctgtcttcttggaaacatagagggaactcaccatttca tctctagctgataacaatttgcactgactgttttagcactcaattgtttgttctgtctgacggcgtaaa acacgtctatcagttacgtgccagatcagtttcaactaaactgttcatcagacaaggaaggttcaagaact ttacttccaaatttcttattgttgcggcaatagtgtttataacactttgttctacactcaaaagaagacagaa tgattgaactttcattaattgacttctattgtgtcttttagccttctgtctattccttgttttaattatgcttattatctt tggttctcacttgaaatgcaagatcataatgaaactgtcacgcctaaacgaacatgaaattctgttttctta ggaaatcacaactgtagctgcaatttccaaagaatgtagttacagtcagtagtcaacatcaaccatag tagttgatgacccgtgtcttattcacttctatttcaaatgggtatattagagtaggagctagaaaatcagcacctt taattgaattgtcgtgtgatgagcgtgttctaaatcaccattcagtagatcgatcggtaattatacagttt cctgtttaccttttacaataattgcccaggaacctaaattgggtagtctgttagtgcgtgttctgtatgaaga cttttagagtagatcagcttctgtgtgttttagatttcatctaaacgaacaactaaaatgtctgataatggac cccaaatcagcgaatgaccccgcaattacgtttgttggtgacctcagattcaactggcagtaaccagaa tgagagaacgcagtggtggcgcgatcaaaacaacgtcgccccaaggtttaccaataatactgcgtcttg gttaccgctctcactcaacatggcgaaggaagacctaaattcctcagagacaagcgttccaaattaaca ccaatagcagtcagatgaccaatgtgctactaccgaagagctaccagacgaattcgtgtgtgtgacg gtaaaatgaaagatctcagtcgaagatgttatttctactactaggaactgggcccagaagctggacttccct atggtgctaacaaaagacggcatcatatgggttgcaactgaggagccttgaatacaccaaaagatcacat tggcaccggcaatcctgctaacaatgtgcaatcgtgctacaacttctcaagggaacaaacttgcctaaag gcttctacgagaaggagcagagcgcgagtcgaagccttctctgttctctatcacgtagtcgcaacag ttcaagaaatcaactccagcagcagtaggggaacttctctgtgataatggctggcaatggcgggtgat gtgctcttctgttctgtctgtgacagattgaaccagcttgagagcaaaatgtctgtgtaaggccaacaa caacaaggccaactgtcactaagaatctgtctgtgaggcttctagaagcctcgccaaaacgtactg	10
		20
		30
		40

10



20

30

40


50

【表 20 - 17】


配列番号	説明	配列 ⁺
		ccactaaagcatacaatgtaacacaagctttcggcagacgtggtccagaacaaaccaaggaaattttgg ggaccagggaactaatcagacaagggaactgattacaaacattggccgcaaattgcacaattgccccagc gcttcagcgttttcggaatgtcgcgcattggcatggaagtcacaccttcgggaacgtggttgacctacac aggtgccatcaaattggatgacaaagatccaaatttcaaagatcaagtcattttgctgaataagcatattgac gcatacaaaacattccaccaacagagcctaaaaaggacaaaaagaagaaggctgatgaaactcaagc cttaccgcagagacagaagaacagcaaaactgtgactcttctctctgctgcagatttggatgatttctcaa acaattgcaacaatccatgagcagtgctgactcaactcaggcctaaactcatgcagaccacacaaggca gatgggctatataaacgttttcgttttcggtttacgatatagtctactcttgtgcagaatgaattctcgtaac tacatagcacaagtagatgtagttaactttaatctcacatagcaatcttaatacagtggtgaacattagggagg acttgaaagagccaccacattttcaccgagggccacgcggagtacgatcagtggtacagtgaacaatgcta gggagagctgcctatatggaagagccctaatgtgtaaaattaatttttagtagtgcatacccatgtgattttaa tagcttcttaggagaatgacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
	 ⁺ln=ロックド核酸(LNA)= (LNA)A、ln(5m)C=ln(5m)C=ロックド核酸(LNA)-5 メチル C、lnG=ロックド核酸(LNA)G、lnT=ロ ックド核酸(LNA)T、(5m)C=5 メチル C、scp==シクロプロピル、scp(5m)C=シクロプロピル-5 メチ ル C、(5OH)C= 	、式中、R_y は核酸塩基であり、lnA=ロックド核酸 20 、po=ホスホジエステル連結、ps=ホスホロチオエート連結 30

【図面】

【図 1】



【図 2】



10

20

30

40

50

【図 3 A - 3 D】

図 3 A



図 3 B



図 3 C



図 3 D



● 2'-OMe
● 2'-F
〰 PS

【図 3 E - 3 H】

図 3 E



図 3 F



図 3 G




図 3 H




● 2'-OMe
● 2'-F
〰 PS

【図 4】



【図 5 A】



10


20

30


40

50


【図 5 B】




【図 6】



【図 7】



【図 8】



【配列表】

2024533371000001.xml

10

20

30

40

50

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2022/042808

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER					
INV.	C07H21/02	C07H19/10	C07H19/20	C07H19/23	A61P31/20
	A61K31/7115	A61K31/712	A61K31/7125	A61K31/713	A61P35/00
ADD.					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)					
A61P A61K C07H					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
EPO-Internal, WPI Data, CHEM ABS Data					
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages				Relevant to claim No.
A	HU BO ET AL: "Therapeutic siRNA: state of the art", SIGNAL TRANSDUCTION AND TARGETED THERAPY, vol. 5, no. 1, 1 December 2020 (2020-12-01), XP055801687, DOI: 10.1038/s41392-020-0207-x Retrieved from the Internet: URL:https://www.nature.com/articles/s41392-020-0207-x.pdf> -----				1, 2, 9, 11, 13-29, 31-75
A	CHERNIKOV IVAN V. ET AL: "Current Development of siRNA Bioconjugates: From Research to the Clinic", FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, vol. 10, 26 April 2019 (2019-04-26), XP055916231, DOI: 10.3389/fphar.2019.00444 cited in the application ----- -/--				1, 2, 9, 11, 13-29, 31-75
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.					
* Special categories of cited documents :					
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance			"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention		
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date			"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone		
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)			"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means			"&" document member of the same patent family		
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed					
Date of the actual completion of the international search			Date of mailing of the international search report		
31 March 2023			09/06/2023		
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016			Authorized officer Klein, Didier		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2022/042808

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2018/045317 A1 (DICERNA PHARMACEUTICALS INC [US]) 8 March 2018 (2018-03-08) cited in the application -----	1, 2, 9, 11, 13-29, 31-75
A	WO 2011/139699 A2 (ISIS PHARMACEUTICALS INC [US]; PRAKASH THAZHA P [US] ET AL.) 10 November 2011 (2011-11-10) -----	1, 2, 9, 11, 13-29, 31-75
A	ELAD ELKAYAM ET AL: "Current Development of siRNA Bioconjugates: From Research to the Clinic", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, vol. 45, no. 6, 28 November 2016 (2016-11-28), pages 3528-3536, XP055448298, GB ISSN: 0305-1048, DOI: 10.1093/nar/gkw1171 -----	1, 2, 9, 11, 13-29, 31-75
A	WO 2019/217397 A2 (ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC [US]; PARMAR RUBINA G [US] ET AL.) 14 November 2019 (2019-11-14) -----	1, 2, 9, 11, 13-29, 31-75

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/US2022/042808

Box No. I Nucleotide and/or amino acid sequence(s) (Continuation of item 1.c of the first sheet)

1. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international search was carried out on the basis of a sequence listing:
- a. ☐ forming part of the international application as filed.
- b. ☒ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search (Rule 13ter.1(a)).
- ☒ accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed.
2. ☐ With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this report has been established to the extent that a meaningful search could be carried out without a WIPO Standard ST.26 compliant sequence listing.
3. Additional comments:

10

20

30

40

50

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US2022/042808**Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

10

20

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see additional sheet

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims;; it is covered by claims Nos.:
1, 2 (completely); 9, 11, 13-29, 31-75 (partially)

30

40

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

International Application No. PCT/US2022/042808

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

This International Searching Authority found multiple (groups of) inventions in this international application, as follows:

1. claims: 1, 2(completely); 9, 11, 13-29, 31-75(partially)

a compound of formula of claim 1 and oligonucleotides comprising said compound and dependent claims, composition and uses thereof

2. claims: 3(completely); 9, 11, 13-29, 31-75(partially)

a compound of formula of claim 3 and oligonucleotides comprising said compound and dependent claims, composition and uses thereof

3. claims: 4, 5, 7, 8(completely); 9-29, 31-75(partially)

a compound of claim 4 and 7, oligonucleotides comprising said compound and dependent claims, composition and uses thereof

4. claims: 6, 10, 12-29, 31-75(all partially)

a compound of claim 6 (compounds bearing a 3' O-alkyl phosphonate group), oligonucleotides comprising said compound and dependent claims, composition and uses thereof

5. claims: 6, 10, 12-29, 31-75(all partially)

a compound of claim 6 (compounds bearing a 2' O-CD₃ moiety), oligonucleotides comprising said compound and dependent claims, composition and uses thereof

6. claims: 6, 10, 12-29, 31-75(all partially)

a compound of claim 6 (compounds with no 2'-3' covalent bond) and a 4'-phosphonate-vinyl moiety, oligonucleotides comprising said compound and dependent claims, composition and uses thereof

7. claims: 6, 10, 12-29, 31-75(all partially)

a compound of claim 6 (compounds with no 2'-3' covalent bond) and a 4'-phosphonate-methyloxy moiety, oligonucleotides comprising said compound and dependent claims, composition and uses thereof

8. claims: 30(completely); 31-75(partially)

10

20

30

40

50

International Application No. PCT/US2022 /042808

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

A compound of claim 30 bearing a mesylphosphoramidate
internucleoside linkage and dependent claims, composition
and uses thereof

10

20

30

40

50

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/US2022/042808

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2018045317 A1	08-03-2018	AU 2017321892 A1	28-02-2019
		CA 3033756 A1	08-03-2018
		CN 110072530 A	30-07-2019
		DK 3506909 T3	22-08-2022
		EP 3506909 A1	10-07-2019
		EP 4101859 A1	14-12-2022
		ES 2924806 T3	11-10-2022
		HU E059718 T2	28-12-2022
		IL 288418 A	01-01-2022
		JP 6978099 B2	08-12-2021
		JP 2019530656 A	24-10-2019
		JP 2022017481 A	25-01-2022
		KR 20190044653 A	30-04-2019
		KR 20220010579 A	25-01-2022
		PL 3506909 T3	12-09-2022
		PT 3506909 T	16-08-2022
		US 2019177729 A1	13-06-2019
		US 2023064031 A1	02-03-2023
		WO 2018045317 A1	08-03-2018
WO 2011139699 A2	10-11-2011	EP 2625186 A2	14-08-2013
		EP 3091027 A1	09-11-2016
		US 2013116420 A1	09-05-2013
		US 2016046939 A1	18-02-2016
		US 2020385722 A1	10-12-2020
		WO 2011139699 A2	10-11-2011
WO 2019217397 A2	14-11-2019	EP 3790557 A2	17-03-2021
		US 2021238594 A1	05-08-2021
		WO 2019217397 A2	14-11-2019

フロントページの続き

MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,N
E,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,
CV,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IQ,IR,IS,IT,J
M,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY
,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,ST,SV,SY,T
H,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,WS,ZA,ZM,ZW

アメリカ合衆国 9 5 0 1 4 カリフォルニア州, クパチーノ, アルダーブルック レーン 8 6 9

(72)発明者 ホスバッハ, マルクス

ドイツ連邦共和国 9 5 3 2 6 クルムバッハ, ドクターマルティンールターシュトラッセ 1 5

(72)発明者 パンディ, ラジェンドラ ケー.

アメリカ合衆国 9 4 4 0 3 カリフォルニア州, フォスター シティー, クタマラン 3 4 5

(72)発明者 ホン, ジン

アメリカ合衆国 9 4 0 4 4 カリフォルニア州, パシフィカ, スプルース コート 6

(72)発明者 エルテプ, ラクスマン

アメリカ合衆国 9 4 5 8 3 カリフォルニア州, サン ラモン, カントリーブルック ループ 4 1 2

(72)発明者 モンテロ, サウル マルティネス

アメリカ合衆国 9 4 0 6 6 カリフォルニア州, サン ブルーノ, チェストナット アベニュー 7 0 3

(72)発明者 デ コスタ, エヌ. ティラニ エス.

アメリカ合衆国 9 4 0 8 0 カリフォルニア州, サウスサンフランシスコ, ジョージタウン コー
ト 3 6 1 2