

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 25.04.08.

③① Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la demande : 30.10.09 Bulletin 09/44.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule*

⑥① Références à d'autres documents nationaux apparentés :

⑦① Demandeur(s) : *L'OREAL Société anonyme* — FR.

⑦② Inventeur(s) : WOODLAND FREDERIC et LAZZERI PASCALE.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : CASALONGA ET JOSSE.

⑤④ COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT AU MOINS UN COMPOSE ORGANIQUE DU SILICIUM, AU MOINS UN TENSIOACTIF CATIONIQUE ET AU MOINS UN ACIDE ORGANIQUE, ET UN PROCEDE DE TRAITEMENT COSMETIQUE METTANT EN OEUVRE LADITE COMPOSITION.

⑤⑦ La présente invention concerne une composition cosmétique pour le traitement des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable:

- un ou plusieurs composés organiques du silicium choisis parmi les silanes comprenant un atome de silicium et les siloxanes comprenant deux ou trois atomes de silicium, lesdits composés organiques du silicium comportant en outre une ou plusieurs fonctions chimiques basiques et un ou plusieurs groupes hydroxyles ou hydrolysables par molécule;
- un ou plusieurs tensioactifs cationiques; et
- un ou plusieurs acides organiques.

La présente invention concerne également un procédé de traitement cosmétique la mettant en oeuvre et son utilisation comme après-shampooing.



DEMANDE DE BREVET

B08-0396FR GD/GL

OA08121

Société Anonyme dite : L'OREAL

Composition cosmétique comprenant au moins un composé organique du silicium, au moins un tensioactif cationique et au moins un acide organique, et un procédé de traitement cosmétique mettant en œuvre ladite composition

Invention de : Frédéric WOODLAND
Patrice LAZZERI

**Composition cosmétique comprenant au moins un composé
organique du silicium, au moins un tensioactif cationique et au
moins un acide organique, et un procédé de traitement cosmétique
mettant en œuvre ladite composition**

La présente invention concerne une composition cosmétique pour le traitement des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable, un ou plusieurs composés organiques du silicium, un ou plusieurs tensioactifs cationiques et un ou plusieurs acides organiques. La présente invention concerne également un procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques ainsi qu'une utilisation mettant en œuvre ladite composition cosmétique.

Les cheveux sont généralement abîmés et fragilisés par l'action des agents atmosphériques extérieurs tels que la lumière et les intempéries, et par des traitements mécaniques ou chimiques tels que le brossage, le peignage, les teintures, les décolorations, les permanentes et/ou les défrisages.

Ainsi, pour remédier à ces inconvénients, il est maintenant usuel d'avoir recours à des soins capillaires impliquant la mise en œuvre de compositions de soins qui permettent de conditionner les cheveux à la suite de ces traitements afin de leur conférer notamment de la brillance, de la douceur, de la souplesse, de la légèreté, un toucher naturel ainsi que des propriétés de démêlage.

Ces compositions de soins capillaires peuvent être par exemple des shampooings conditionneurs ou des après-shampooings pouvant se présenter sous la forme de gels, de lotions capillaires ou de crèmes plus ou moins épaisses.

Par ailleurs, on a constaté que les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de compositions de soins qui permettent non

seulement de conditionner les cheveux de manière convenable mais également de procurer des effets coiffants satisfaisants.

5 En particulier, les personnes ayant des cheveux fins ou bouclés sont généralement à la recherche de produits de soins qui procurent des effets coiffants apportant de la masse, du corps et du volume aux cheveux fins et du dessin aux boucles des cheveux frisés.

Toutefois, les compositions de soins usuelles procurent des effets coiffants qui sont relativement faibles et irréguliers, notamment en termes de dessins de boucle et de volume.

10 En effet, il est connu que l'introduction de composés organiques cosmétiquement actifs tels que des polymères cationiques et des silicones dans des compositions de soins telles que des après-shampooings, permet de conférer aux cheveux des propriétés de démêlage, de souplesse et de légèreté. Cependant, les propriétés
15 coiffantes qui sont apportées aux cheveux restent encore nettement insuffisantes.

Il existe donc un réel besoin de mettre au point des compositions cosmétiques qui permettent de conditionner les cheveux de manière satisfaisante tout en apportant des effets coiffants
20 puissants, notamment en termes de masse, de corps, de volume et de dessin aux boucles des cheveux.

La demanderesse a découvert, de façon surprenante, qu'il était possible de formuler des compositions pour le traitement cosmétique des fibres kératiniques, ayant les propriétés recherchées, comprenant
25 un ou plusieurs composés organiques du silicium tels que définis ci-après, un ou plusieurs tensioactifs cationiques et un ou plusieurs acides organiques.

En effet, il a été constaté que l'ajout de composés organiques du silicium dans des compositions comprenant un ou plusieurs
30 tensioactifs cationiques et un ou plusieurs acides organiques permettait de conduire à un gainage satisfaisant des cheveux permettant de conférer aux cheveux un toucher doux satisfaisant.

De plus, les compositions selon l'invention confèrent des effets coiffants puissants, notamment en apportant de la masse, du corps et du volume aux cheveux.

5 Par ailleurs, les compositions selon l'invention permettent de faciliter la mise en forme des cheveux, en particulier des cheveux fins.

Enfin, les compositions selon l'invention permettent également de conférer des effets coiffants aux cheveux bouclés, notamment en terme de dessin et de contrôle des boucles.

10 La présente invention concerne notamment une composition cosmétique pour le traitement des fibres kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, comprenant dans un milieu cosmétiquement acceptable :

- un ou plusieurs composés organiques du silicium choisis parmi les silanes comprenant un atome de silicium et les siloxanes
15 comprenant deux ou trois atomes de silicium, lesdits composés organiques du silicium comportant en outre une ou plusieurs fonctions chimiques basiques et un ou plusieurs groupes hydroxyles ou hydrolysables par molécule ;

- un ou plusieurs tensioactifs cationiques ; et

20 - un ou plusieurs acides organiques.

La présente invention concerne également un procédé de traitement cosmétique des cheveux, comprenant l'application sur lesdites fibres de la composition selon l'invention.

25 Elle concerne aussi l'utilisation de la composition selon l'invention comme shampoing ou conditionneur.


D'autres objets et caractéristiques, aspects et avantages de l'invention apparaîtront encore plus clairement à la lecture de la description et des exemples qui suivent.

30 Les composés organiques du silicium utilisés dans la composition selon l'invention sont choisis parmi les organosilanes comprenant un atome de silicium et les organosiloxanes comportant deux ou trois atomes de silicium, de préférence deux atomes de silicium. Ils doivent en outre comporter une ou plusieurs fonctions chimiques basiques, et de préférence une seule fonction chimique

basique. La fonction chimique basique peut correspondre à toute fonction conférant un caractère basique au composé de silicium et est de préférence une fonction amine telle qu'une fonction amine primaire, secondaire ou tertiaire. La fonction chimique basique des composés du silicium selon l'invention, peut comporter éventuellement d'autres fonctions, telles que, par exemple, une autre fonction amine, une fonction acide ou une fonction halogène.

Le ou les composés organiques du silicium utilisés dans la composition selon invention, comportent en outre deux ou plusieurs groupes hydrolysables ou hydroxyles par molécule. Les groupes hydrolysables sont de préférence des groupes alcoxy, aryloxy ou halogène. Ils peuvent également, éventuellement, comporter d'autres fonctions chimiques telles que des fonctions acides.

Selon un mode de réalisation particulier, le ou les organosilanes utilisées dans la composition selon l'invention sont choisis parmi les composés de formule (I) :



dans laquelle :

R₄ représente un halogène, un groupe OR' ou R'₁ ;

R₅ représente un halogène, un groupe OR'' ou R'₂ ;


R₆ représente un halogène, un groupe OR''' ou R'₃ ;

R₁, R₂, R₃, R', R'', R''', R'₁, R'₂, R'₃ représentent, indépendamment les uns des autres, un groupe hydrocarboné saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié, portant éventuellement des groupes chimiques supplémentaires, R₁, R₂, R', R'' et R''' pouvant en outre désigner l'hydrogène, et deux au moins des groupes R₄, R₅ et R₆ désignant respectivement OR', OR'' et OR''', deux au moins des groupes R', R'' et R''' étant différents de l'hydrogène.

5 Selon un autre mode de réalisation particulier, le ou les organosiloxanes utilisées dans la composition selon l'invention sont choisis parmi les composés de formule (II) :



25 Le ou les composés organiques du silicium utilisés dans la composition selon invention sont de préférence des organosilanes choisis parmi les composés de formule (III) :



dans laquelle les radicaux R, identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux alkyle en C₁-C₆, de préférence en C₁-C₂, et n est un nombre entier de 1 à 6, de préférence de 2 à 4.

De préférence, les silanes ou les siloxanes sont solubles dans l'eau et encore plus préférentiellement solubles à la concentration de 2%, mieux à la concentration de 5% et encore mieux à la concentration de 10% en poids dans l'eau à la température de 25°C±5°C et à la pression atmosphérique. Par soluble, on entend la formation d'une phase macroscopique unique.

De façon particulièrement préférée, le composé organique du silicium présent dans la composition selon l'invention est le 3-aminopropyl triéthoxysilane.

Le ou les composés organiques du silicium peuvent être présents dans la composition selon l'invention dans une teneur allant de 0,1 à 20 % en poids, de préférence dans une teneur en poids allant de 1 à 15 % en poids, et plus préférentiellement dans une teneur en poids allant de 2,5 à 12% en poids, par rapport au poids total de la composition.


La composition selon la présente invention contient un ou plusieurs tensioactifs cationiques, de préférence monomériques.

A titre d'exemples de tensioactif cationique, on peut notamment citer les sels d'amines grasses primaires, secondaires ou tertiaires, éventuellement polyoxyalkylénées et les sels d'ammonium quaternaire éventuellement polyoxyalkylénés.

De préférence, les tensioactifs cationiques sont choisis parmi les sels d'ammonium quaternaire éventuellement polyoxyalkylénés.

A titre de sels d'ammonium quaternaires, on peut notamment citer, par exemple :

- ceux qui présentent la formule générale (IV) suivante :



dans laquelle les radicaux R_{12} à R_{15} , qui peuvent être identiques ou différents, représentent un radical aliphatique, linéaire ou ramifié, comportant de 1 à 30 atomes de carbone, ou un radical aromatique tel que aryle ou alkylaryle. Les radicaux aliphatiques

5


peuvent comporter des hétéroatomes tels que notamment l'oxygène, l'azote, le soufre et les halogènes.

Les radicaux aliphatiques sont par exemple choisis parmi les radicaux alkyle, alcoxy, polyoxyalkylène (C_2-C_6), alkylamide, alkyl($C_{12}-C_{22}$)amidoalkyle(C_2-C_6), alkyl($C_{12}-C_{22}$)acétate, hydroxyalkyle, comportant environ de 1 à 30 atomes de carbone ; X est un anion choisi dans le groupe des halogénures, phosphates, acétates, lactates, alkyl(C_2-C_6)sulfates, alkyl- ou alkylaryl-sulfonates ;

10

- les sels d'ammonium quaternaire de l'imidazoline, comme par exemple ceux de formule (V) suivante :

15




dans laquelle R_{12} représente un radical alcényle ou alkyle comportant de 8 à 30 atomes de carbone, par exemple dérivés des acides gras du suif, R_{13} représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1-C_4 ou un radical alcényle ou alkyle comportant de 8 à 30 atomes de carbone, R_{14} représente un radical alkyle en C_1-C_4 , R_{15} représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1-C_4 , X^- est un anion choisi dans le groupe des halogénures, phosphates, acétates, lactates, alkylsulfates, alkyl- ou alkylaryl-sulfonates. De préférence, R_{12} et R_{13} désignent un mélange de radicaux alcényle ou alkyle comportant de 12 à 21 atomes de carbone, par exemple dérivés des acides gras du suif, R_{14} désigne un radical méthyle, R_{15} désigne un

20

25


atome d'hydrogène. Un tel produit est par exemple commercialisé sous la dénomination REWOQUAT® W 75 par la société REWO ;

- les sels de diammonium quaternaire de formule (VI) :



dans laquelle R_{16} désigne un radical aliphatique comportant environ de 16 à 30 atomes de carbone, R_{17} , R_{18} , R_{19} , R_{20} et R_{21} , identiques ou différents sont choisis parmi l'hydrogène ou un radical alkyle comportant de 1 à 4 atomes de carbone, et X est un anion choisi dans le groupe des halogénures, acétates, phosphates, nitrates et méthylsulfates. De tels sels de diammonium quaternaire comprennent notamment le dichlorure de propane suif diammonium ;


- les sels d'ammonium quaternaire contenant au moins une fonction ester, tels que ceux de formule (VII) suivante :



dans laquelle :

R_{22} est choisi parmi les radicaux alkyles en C_1 - C_6 et les radicaux hydroxyalkyles ou dihydroxyalkyles en C_1 - C_6 ;


R_{23} est choisi parmi :



- les radicaux R_{27} hydrocarbonés en C_1 - C_{22} , linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés,

- l'atome d'hydrogène,

R_{25} est choisi parmi :



- les radicaux R_{29} hydrocarbonés en C_1-C_6 , linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés,

5 - l'atome d'hydrogène,

R_{24} , R_{26} et R_{28} , identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux hydrocarbonés en C_7-C_{21} , linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés ;

10 r , s et t , identiques ou différents, sont des entiers valant de 2 à 6 ;

y est un entier valant de 1 à 10 ;

x et z , identiques ou différents, sont des entiers valant de 0 à 10 ;

15 X^- est un anion simple ou complexe, organique ou inorganique; sous réserve que la somme $x + y + z$ vaut de 1 à 15, que lorsque x vaut 0 alors R_{23} désigne R_{27} et que lorsque z vaut 0 alors R_{25} désigne R_{29} .

Les radicaux alkyles R_{22} peuvent être linéaires ou ramifiés et plus particulièrement linéaires.

20 De préférence R_{22} désigne un radical méthyle, éthyle, hydroxyéthyle ou dihydroxypropyle, et plus particulièrement un radical méthyle ou éthyle.

Avantageusement, la somme $x + y + z$ vaut de 1 à 10.

25 Lorsque R_{23} est un radical R_{27} hydrocarboné, il peut être long et avoir de 12 à 22 atomes de carbone, ou court et avoir de 1 à 3 atomes de carbone.

Lorsque R_{25} est un radical R_{29} hydrocarboné, il a de préférence 1 à 3 atomes de carbone.

30 Avantageusement, R_{24} , R_{26} et R_{28} , identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux hydrocarbonés en $C_{11}-C_{21}$, linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés, et plus particulièrement parmi les

radicaux alkyle et alcényle en C₁₁-C₂₁, linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés.

De préférence, x et z, identiques ou différents, valent 0 ou 1.

Avantageusement, y est égal à 1.

- 5 De préférence, r, s et t, identiques ou différents, valent 2 ou 3, et encore plus particulièrement sont égaux à 2.

L'anion est de préférence un halogénure (chlorure, bromure ou iodure) ou un alkylsulfate plus particulièrement méthylsulfate. On peut cependant utiliser le méthanesulfonate, le phosphate, le nitrate, le
10 tosylate, un anion dérivé d'acide organique tel que l'acétate ou le lactate ou tout autre anion compatible avec l'ammonium à fonction ester.

L'anion X⁻ est encore plus particulièrement le chlorure ou le méthylsulfate.

- 15 On utilise plus particulièrement dans la composition selon l'invention, les sels d'ammonium de formule (VII) dans laquelle :

- R₂₂ désigne un radical méthyle ou éthyle,

- x et y sont égaux à 1 ;

- z est égal à 0 ou 1 ;

- 20 - r, s et t sont égaux à 2 ;

- R₂₃ est choisi parmi :

- le radical $\text{R}_{26}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$

- les radicaux méthyle, éthyle ou hydrocarbonés en C₁₄-C₂₂,

- l'atome d'hydrogène ;

- 25 - R₂₅ est choisi parmi :

- le radical $\text{R}_{28}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$

- l'atome d'hydrogène ;

- R₂₄, R₂₆ et R₂₈, identiques ou différents, sont choisis parmi
les radicaux hydrocarbonés en C₁₃-C₁₇, linéaires ou ramifiés, saturés
30 ou insaturés, et de préférence parmi les radicaux alkyles et alcényles en C₁₃-C₁₇, linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés.

Avantageusement, les radicaux hydrocarbonés sont linéaires.

On peut citer par exemple les composés de formule (VII) tels que les sels (chlorure ou méthylsulfate notamment) de diacyloxyéthyl-diméthylammonium, de diacyloxyéthyl-hydroxyéthyl-méthylammonium, de monoacyloxyéthyl-dihydroxyéthyl-méthylammonium, de triacyloxy éthyl-méthylammonium, de monoacyloxyéthyl-hydroxyéthyl-diméthyl ammonium et leurs mélanges. Les radicaux acyles ont de préférence 14 à 18 atomes de carbone et proviennent plus particulièrement d'une huile végétale comme l'huile de palme ou de tournesol. Lorsque le composé contient plusieurs radicaux acyles, ces derniers peuvent être identiques ou différents.

Ces produits sont obtenus, par exemple, par estérification directe de la triéthanolamine, de la triisopropanolamine, d'alkyldiéthanolamine ou d'alkyldiisopropanolamine éventuellement oxyalkylénées sur des acides gras ou sur des mélanges d'acides gras d'origine végétale ou animale, ou par transestérification de leurs esters méthyliques. Cette estérification est suivie d'une quaternisation à l'aide d'un agent d'alkylation tel qu'un halogénure d'alkyle (méthyle ou éthyle de préférence), un sulfate de dialkyle (méthyle ou éthyle de préférence), le méthane sulfonate de méthyle, le paratoluènesulfonate de méthyle, la chlorhydrine du glycol ou du glycérol.

De tels composés sont par exemple commercialisés sous les dénominations DEHYQUART[®] par la société HENKEL, STEPANQUAT[®] par la société STEPAN, NOXAMIUM[®] par la société CECA, REWOQUAT[®] WE 18 par la société REWO-WITCO.

La composition selon l'invention contient de préférence un mélange de sels de mono-, di- et triester d'ammonium quaternaire avec une majorité en poids de sels de diester.

Comme mélange de sels d'ammonium, on peut utiliser par exemple le mélange contenant 15 à 30 % en poids de méthylsulfate d'acyloxyéthyl-dihydroxyéthyl-méthylammonium, 45 à 60% de méthyl sulfate de diacyloxyéthyl-hydroxyéthyl-méthylammonium et 15 à 30% de méthylsulfate de triacyloxyéthyl-méthylammonium, les radicaux

acyles ayant de 14 à 18 atomes de carbone et provenant d'huile de palme éventuellement partiellement hydrogénée.

On peut aussi utiliser les sels d'ammonium contenant au moins une fonction ester décrits dans les brevets US-A-4874554 et US-A-4137180.

Parmi les sels d'ammonium quaternaire de formule (IV), on préfère d'une part, les chlorures de tétraalkylammonium comme, par exemple, les chlorures de dialkyldiméthylammonium ou d'alkyltriméthylammonium ou alkylaralkyldiméthylammonium dans lesquels le radical alkyle comporte environ de 12 à 22 atomes de carbone, en particulier les chlorures de béhényltriméthyl ammonium, de distéaryldiméthylammonium, de cétyltriméthylammonium, de benzyldiméthylstéarylammonium ou encore, d'autre part, le chlorure de palmitamidopropyltriméthylammonium ou le chlorure de stéaramidopropyldiméthyl-(myristylacétate)-ammonium commercialisé sous la dénomination CERAPHYL[®] 70 par la société VAN DYK.

De préférence, le tensioactif cationique utilisé dans la composition selon l'invention est choisi parmi les chlorures de béhényltriméthyl ammonium et de cétyltriméthyl ammonium et leurs mélanges.

Le ou les tensioactifs cationiques utilisés dans la composition selon la présente invention peuvent être présents dans la composition dans une quantité variant de 0,1 à 6% en poids, de préférence en une quantité variant de 0,5 à 3% en poids.

Par acide organique, on entend tout composé organique non polymérique comportant une ou plusieurs fonctions acides choisies parmi les fonctions acide carboxylique, acide sulfonique, acide phosphorique.

Préférentiellement, l'acide organique n'est pas un tensioactif.

Encore plus préférentiellement, le poids moléculaire de l'acide organique est inférieur à 250, mieux inférieur à 200.

Les acides organiques peuvent être des acides aminés.

Le ou les acides organiques sont choisis de préférence parmi l'acide acétique, l'acide propanoïque, l'acide butanoïque, l'acide

lactique, l'acide malique, l'acide glycolique, l'acide ascorbique, l'acide maléïque, l'acide phtalique, l'acide succinique, la taurine, l'acide tartrique, l'arginine, la glycine, l'acide glucuronique, l'acide gluconique et l'acide citrique.

5 Encore plus préférentiellement, les acides organiques selon l'invention sont les acides carboxyliques.

 Encore plus préférentiellement encore, l'acide organique utilisé dans la composition selon l'invention est l'acide acétique, l'acide citrique et de préférence l'acide lactique.

10 Dans la composition, l'acide organique peut être sous forme libre ou salifiée.

 Le ou les acides organiques utilisés dans la composition selon la présente invention peuvent être présents en une teneur exprimée en acides libres allant de 0,1 à 10% en poids, de préférence en une teneur
15 allant de 0,5 à 8% en poids, et encore plus préférentiellement en une teneur allant de 1 à 5% en poids, par rapport au poids total de la composition.

 La composition selon la présente invention peut comprendre également un ou plusieurs tensioactifs additionnels choisis parmi les
20 tensioactifs anioniques, amphotères et non ioniques.

 Les tensioactifs anioniques pouvant être utilisés dans les compositions de l'invention sont notamment choisis parmi les sels, en particulier les sels de métaux alcalins tels que les sels de sodium, les sels d'ammonium, les sels d'amines, les sels d'aminoalcools ou les sels
25 de métaux alcalino-terreux, par exemple, de magnésium, des types suivants : les alkylsulfates, les alkyléthersulfates, les alkylamidoéthersulfates, les alkylarylpolyéthersulfates, les monoglycéride-sulfates, les alkylsulfonates, les alkylamidesulfonates, les alkylarylsulfonates, les α -oléfine-sulfonates, les paraffine-sulfonates, les alkylsulfosuccinates, les alkyléthersulfosuccinates, les
30 alkylamide-sulfosuccinates, les alkylsulfo-acétates, les acylsarcosinates et les acylglutamates, les groupes alkyle et acyle de tous ces composés comportant de 6 à 24 atomes de carbone et le groupe aryle désignant de préférence un groupe phényle ou benzyle.

On peut également utiliser les monoesters d'alkyle en C₆₋₂₄ et d'acides polyglycoside-dicarboxyliques tels que les glucoside-citrates d'alkyle, les polyglycoside-tartrates d'alkyle et les polyglycoside-sulfosuccinates d'alkyle, les alkylsulfosuccinamates, les acyliséthionates et les N-acyltaurates, le groupe alkyle ou acyle de tous ces composés comportant de 12 à 20 atomes de carbone.

Un autre groupe d'agents tensioactifs anioniques utilisables dans les compositions de la présente invention est celui des acyl-lactylates dont le groupe acyle comporte de 8 à 20 atomes de carbone.

En outre, on peut encore citer les acides alkyl-D-galactoside-uroniques et leurs sels ainsi que les acides (alkyl en C₆₋₂₄)éther-carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides (alkyl en C₆₋₂₄)(aryl en C₆₋₂₄)éther-carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides (alkyl en C₆₋₂₄)amidoéther-carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs sels, en particulier ceux comportant de 2 à 50 motifs oxyde d'éthylène, et leurs mélanges.

On utilise de préférence les alkylsulfates, les alkyléthersulfates et leurs mélanges, en particulier sous forme de sels de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'ammonium, d'amine ou d'aminoalcool.

Lorsqu'ils sont présents, la quantité du ou des tensioactifs anioniques est de préférence comprise dans l'intervalle allant de 0,1 à 4 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

Encore plus préférentiellement, la composition ne contient pas de tensioactifs anioniques.


Des exemples de tensioactifs non-ioniques additionnels utilisables dans les compositions de la présente invention sont décrits par exemple dans "Handbook of Surfactants" par M.R. PORTER, éditions Blackie & Son (Glasgow and London), 1991, pp 116-178. Ils sont choisis notamment parmi les alcools, les alpha-diols, les alkyl(C₁₋₂₀)phénols ou les acides gras polyéthoxylés, polypropoxylés ou polyglycérolés, ayant une chaîne grasse comportant, par exemple, de 8 à 18 atomes de carbone, le nombre de groupements oxyde d'éthylène ou oxyde de propylène pouvant aller notamment de 2 à 50 et le nombre de groupements glycérol pouvant aller notamment de 2 à 30.

On peut également citer les condensats d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène sur des alcools gras ; les amides gras polyéthoxylés ayant de préférence de 2 à 30 motifs d'oxyde d'éthylène, les amides gras polyglycérolés comportant en moyenne de 1 à 5 groupements glycérol et en particulier de 1,5 à 4, les esters d'acides gras du sorbitan éthoxylés ayant de 2 à 30 motifs d'oxyde d'éthylène, les esters d'acides gras du saccharose, les esters d'acides gras du polyéthylèneglycol, les (alkyl en C₆₋₂₄)polyglycosides, les dérivés de N-(alkyl en C₆₋₂₄)glucamine, les oxydes d'amines tels que les oxydes d'(alkyl en C₁₀₋₁₄)amines ou les oxydes de N-(acyl en C₁₀₋₁₄)-aminopropylmorpholine.

Lorsqu'ils sont présents, la quantité du ou des tensioactifs non ioniques additionnels est de préférence comprise dans l'intervalle allant de 0,01 à 20% en poids, mieux encore de 0,1 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

Les agents tensioactifs amphotères ou zwitterioniques, utilisables dans la présente invention, peuvent être notamment des dérivés d'amines aliphatiques secondaires ou tertiaires, dans lesquels le groupe aliphatique est une chaîne linéaire ou ramifiée comportant de 8 à 22 atomes de carbone et contenant au moins un groupe anionique tel que, par exemple, un groupe carboxylate, sulfonate, sulfate, phosphate ou phosphonate. On peut citer en particulier les alkyl(C₈₋₂₀)bétaïnes, les sulfobétaïnes, les (alkyl en C₈₋₂₀)amido(alkyl en C₆₋₈)bétaïnes ou les (alkyl en C₈₋₂₀)amido(alkyl en C₆₋₈)sulfobétaïnes.

Parmi les dérivés d'amines, on peut citer les produits commercialisés sous la dénomination MIRANOL[®], tels que décrits dans les brevets US 2 528 378 et US 2 781 354 et classés dans le dictionnaire CTFA, 3^{ème} édition, 1982, sous les dénominations Amphocarboxy-glycinate et Amphocarboxypropionate de structures respectives (A) et (B) :




dans laquelle :

R_a représente un groupe alkyle dérivé d'un acide R_a -COOH présent dans l'huile de coprah hydrolysée, un groupe heptyle, nonyle ou undécyle,

R_b représente un groupe bêta-hydroxyéthyle, et

5 R_c représente un groupe carboxyméthyle ;
et



dans laquelle :

B représente $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OX}'$,

10 B' représente $-(\text{CH}_2)_z-\text{Y}'$, avec $z = 1$ ou 2 ,

X' représente le groupe $-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{COOH}$ ou un atome d'hydrogène,

Y' représente $-\text{COOH}$ ou le groupe $-\text{CH}_2-\text{CHOH}-\text{SO}_3\text{H}$,

15 R_a' représente un groupe alkyle d'un acide R_a' -COOH présent dans l'huile de coprah ou dans l'huile de lin hydrolysée, un groupe alkyle, notamment en C_{17} et sa forme iso, un groupe en C_{17} insaturé.

Ces composés sont classés dans le dictionnaire CTFA, 5^{ème} édition, 1993, sous les dénominations cocoamphodiacétate de disodium, lauroamphodiacétate de disodium, caprylamphodiacétate de disodium, capryloamphodiacétate de disodium, cocoamphodipropionate de disodium, lauroamphodipropionate de disodium, caprylamphodipropionate de disodium, capryloamphodipropionate de disodium, acide lauroamphodipropionique, acide cocoamphodipropionique.

25 A titre d'exemple, on peut citer le cocoamphodiacétate commercialisé par la société RHODIA sous la dénomination commerciale MIRANOL[®] C2M concentré.

Parmi les tensioactifs amphotères ou zwitterioniques cités ci-dessus, on utilise de préférence les (alkyl en C_{8-20})-bétaïnes, les (alkyl en C_{8-20})-amido(alkyl en C_{6-8})-bétaïnes et leurs mélanges.

30 Lorsqu'ils sont présents, la quantité du ou des tensioactifs amphotères ou zwitterioniques est de préférence comprise dans l'intervalle allant de 0,01 à 20 %, mieux encore de 0,1 à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

Par milieu cosmétiquement acceptable, on entend un milieu compatible avec les fibres kératiniques, telles que les cheveux.

Le milieu cosmétiquement acceptable est constitué d'eau ou d'un mélange d'eau et d'un ou plusieurs solvants cosmétiquement acceptables choisis parmi les alcools inférieurs en C_1 - C_4 , tels que l'éthanol, l'isopropanol, le tertio-butanol ou le n-butanol ; les polyols tels que le glycérol, le propylèneglycol et les polyéthylèneglycols ; et leurs mélanges.

Le pH des compositions selon l'invention varie généralement de 3 à 11 et de préférence de 7 à 10.

La composition selon l'invention peut comprendre en outre un ou plusieurs additifs classiques bien connus dans la technique, tels que; des épaississants ou régulateurs de viscosité, naturels ou synthétiques ; des alcools gras en C_{12} - C_{30} ; des céramides ; des esters gras huileux tels que le myristate d'isopropyle, le myristate de myristyle, le palmitate de cétyle et le stéarate de stéaryle ; des huiles minérales, végétales ou synthétiques telles que les α -oléfines ou l'huile de palme ; des vitamines ou provitamines ; des polymères cationiques ou amphotères ; des agents de stabilisation du pH, des conservateurs ; et des colorants.

Le ou les agents épaississants peuvent être choisis parmi les agents épaississants cellulosiques, par exemple l'hydroxyéthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose et le carboxyméthylcellulose, la gomme de guar et ses dérivés, par exemple l'hydroxypropyl guar, commercialisé par la société RHODIA sous la référence JAGUAR HP 105, les gommes d'origine microbienne, telle que la gomme de xanthane et la gomme de scléroglycane, les agents épaississants synthétiques tels que les homopolymères réticulés d'acide acrylique ou d'acide acrylamidopropanesulfonique, par exemple le Carbomer, les polymères associatifs non ioniques, anioniques, cationiques ou amphotères, tels que les polymères commercialisés sous les appellations PEMULEN TR1 ou TR2 par la société GOODRICH, SALCARE SC90 par la société CIBA, ACULYN

22, 28, 33, 44 ou 46 par la société ROHM & HAAS et ELFACOS T210 et T212 par la société AKZO.

5 L'homme de métier veillera à choisir les éventuels additifs et leur quantité de manière à ce qu'ils ne nuisent pas aux propriétés des compositions de la présente invention.

Ces additifs sont généralement présents dans la composition selon l'invention en une quantité allant de 0 à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition.

10 Les compositions conformes à l'invention peuvent être utilisées pour le conditionnement des fibres kératiniques, en particulier des cheveux, par exemple comme après-shampooings.

De préférence, les compositions de l'invention sont des après-shampooings à rincer ou non.

15 Un autre objet de l'invention est un procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques, telles que les cheveux, qui consiste à appliquer une quantité efficace d'une composition telle que décrite ci-dessus, sur lesdites fibres, éventuellement à rincer après un éventuel temps de pose.

20 L'exemple suivant illustre la présente invention.

Exemple:

- 5 On prépare les compositions (A), (B), (C) et (D) à partir des ingrédients indiqués dans le tableau ci-dessous dont les quantités sont exprimées en pour cent en poids en matières actives, par rapport au poids total de la composition.

Compositions	A (invention)	B (invention)	C (invention)	D (comparatif)
3-aminopropyltriéthoxysilane	10	10	10	-
Alcool cétylstéarylique (C16/C18 50/50)	2,5	3	5	5
Mélange de myristate de myristyle, de palmitate de cétyle et de stéarate de stéaryle	0,5	-	-	-
Huile de palme	-	2	-	-
Chlorure de bécényltriméthyl ammonium	1,2	-	2,4	2,4
Chlorure de cétyltriméthyl ammonium	-	0,8	-	-
Acide lactique	4	4	0,5	0,5
Eau	qsp 100%	qsp 100%	qsp 100%	qsp 100%

- 10 Appliquées en tant qu'après shampooings, les compositions (A) et (B) confèrent aux cheveux de la masse, du volume ainsi qu'un toucher doux satisfaisant.

- 15 De plus, ces compositions permettent de faciliter la mise en forme des cheveux fins et d'apporter une meilleure définition de boucle aux cheveux bouclés.

Un essai comparatif entre les compositions (C) et (D) montre que la composition (C) apporte plus de corps à la chevelure que la composition (D).

REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique pour le traitement des fibres
kératiniques, en particulier des fibres kératiniques humaines telles que
les cheveux, caractérisé en ce qu'elle comprend, dans un milieu
cosmétiquement acceptable :

- un ou plusieurs composés organiques du silicium choisis
parmi les silanes comprenant un atome de silicium et les siloxanes
comprenant deux ou trois atomes de silicium, lesdits composés
organiques du silicium comportant en outre une ou plusieurs fonctions
chimiques basiques et un ou plusieurs groupes hydroxyles ou
hydrolysables par molécule ;


- un ou plusieurs tensioactifs cationiques ; et

- un ou plusieurs acides organiques.

2. Composition cosmétique selon la revendication 1,
caractérisée en ce que les fonctions chimiques basiques du composé
organique du silicium sont choisies parmi les amines primaires,
secondaires ou tertiaires.

3. Composition cosmétique selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que les groupes hydrolysables sont choisis parmi les
groupes alcoxy, aryloxy et halogène.

4. Composition cosmétique selon l'une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le ou les composés
organiques du silicium sont choisis parmi les composés de
formule (I) :




dans laquelle :

R₄ représente un halogène, un groupe OR' ou R'₁ ;

R₅ représente un halogène, un groupe OR'' ou R'₂ ;

R_6 représente un halogène, un groupe OR''' ou R'_3 ;

$R_1, R_2, R_3, R', R'', R''', R'_1, R'_2, R'_3$ représentent, indépendamment les uns des autres, un groupe hydrocarboné saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié, portant éventuellement des groupes chimiques supplémentaires, R_1, R_2, R', R'' et R''' pouvant en outre désigner l'hydrogène, et deux au moins des groupes R_4, R_5 et R_6 désignant respectivement OR', OR'' et OR''' , deux au moins des groupes R', R'' et R''' étant différents de l'hydrogène ; et



(II)

dans laquelle :

R_1, R_2, R_3, R_5 et R_6 sont définis comme précédemment ;


R'_4 représente un atome d'halogène ou un groupe OR_{11} ;

R_7 représente un atome d'halogène, un groupe OR_{10} ou R''_1 ;

R_9 représente un atome d'halogène, un groupe OR_8, R''_2 ou $R_3NR_1R_2$;
 $R''_1, R''_2, R_8, R_{10}$ et R_{11} représente un groupe hydrocarboné, saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié, portant éventuellement des groupes chimiques supplémentaires, les groupes R_{11}, R_{10} et R_8 pouvant en outre représenter un atome d'hydrogène ; l'un au moins des groupes R_6, R_7 et R_9 désignant un atome d'halogène, un groupe OR''' , OR_{10} ou OR_8 .

5. Composition cosmétique selon la revendication 4, caractérisée en ce que les groupes $R_1, R_2, R', R'_1, R'_2, R'_3, R'', R'''$, $R''_1, R''_2, R_8, R_{10}$ et R_{11} sont choisis parmi les radicaux alkyle de C_1 - C_{12} , aryle de C_6 à C_{14} , alkyle de C_1 à C_8 -aryle de C_6 à C_{14} , et aryle de C_6 à C_{14} -alkyle de C_1 à C_8 .

6. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le ou les composés organiques du silicium sont choisis parmi les composés de formule (III) :



dans laquelle les radicaux R, identiques ou différents, sont choisis parmi les radicaux alkyle en C₁-C₆ et n est un nombre entier de 1 à 6, de préférence de 2 à 4.


5 7. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le composé organique du silicium est le 3-aminopropyl triéthoxysilane.

8. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le ou les composés organiques du silicium sont présents dans une teneur allant de 0,1 à 20
10 % en poids, de préférence dans une teneur en poids allant de 1 à 15 % en poids, et plus préférentiellement dans une teneur en poids allant de 2,5 à 12 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

9. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le ou les tensioactifs cationiques sont choisis parmi les sels d'amines grasses primaires, secondaires ou tertiaires, éventuellement polyoxyalkylénées, les sels d'ammonium quaternaire éventuellement polyoxyalkylénés et leurs mélanges.

20 10. Composition cosmétique selon la revendication 9, caractérisée en ce que les sels d'ammonium quaternaire sont choisis parmi:

- ceux qui présentent la formule générale (IV) suivante :




25

dans laquelle les radicaux R₁₂ à R₁₅, qui peuvent être identiques ou différents, représentent un radical aliphatique, linéaire ou ramifié, comportant de 1 à 30 atomes de carbone, ou un radical aromatique tel
30 que aryle ou alkylaryle ; X est un anion choisi dans le groupe des

halogénures, phosphates, acétates, lactates, alkyl(C₂-C₆)sulfates, alkyl- ou alkylaryl-sulfonates ;

- les sels d'ammonium quaternaire de l'imidazoline ;
- les sels de diammonium quaternaire de formule (VI) :

5



dans laquelle R₁₆ désigne un radical aliphatique comportant environ de 16 à 30 atomes de carbone, R₁₇, R₁₈, R₁₉, R₂₀ et R₂₁, identiques ou différents sont choisis parmi l'hydrogène ou un radical alkyle comportant de 1 à 4 atomes de carbone, et X est un anion choisi dans le groupe des halogénures, acétates, phosphates, nitrates et méthylsulfates ;

- les sels d'ammonium quaternaire contenant au moins une fonction ester.

11. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le ou les tensioactifs cationiques sont présents en une teneur allant de 0,1 à 6 % en poids, de préférence en une teneur allant de 0,5 à 3 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

12. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le ou les acides organiques sont choisis parmi l'acide acétique, l'acide propanoïque, l'acide butanoïque, l'acide lactique, l'acide glycolique, l'acide ascorbique, l'acide maléïque, l'acide phtalique, l'acide succinique, la taurine, l'acide tartrique, l'arginine, la glycine, l'acide gluconique l'acide glucuronique et l'acide citrique.

13. Composition cosmétique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le ou les acides organiques sont présents en une teneur allant de 0,1 à 10% en poids, de préférence en une teneur allant de 0,5 à 8% en poids, et encore plus

préférentiellement en une teneur allant de 1 à 5% en poids, par rapport au poids total de la composition.

5 14. Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques, caractérisé en ce que l'on applique la composition cosmétique telle que définie selon l'une quelconque des revendications précédentes, sur lesdites fibres, et en ce que l'on rince après un éventuel temps de pose.

10 15. Utilisation d'une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, comme après-shampoing.

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 710030
FR 0852794

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 2007/190007 A1 (SAVAIDES ANDREW [US] ET AL) 16 août 2007 (2007-08-16) * tableaux 7,10 * * alinéa [0025] *	1,2,8-15	A61K8/58 A61K8/49 A61K8/41 A61Q5/12
X	WO 01/22925 A (OREAL [FR]; SAMAIN HENRI [FR]; ROLLAT ISABELLE [FR]; JEANNE ROSE VALER) 5 avril 2001 (2001-04-05) * page 3, ligne 33 - page 4, ligne 10 * * page 6, ligne 16 - ligne 30 * * page 7, ligne 14 - ligne 22 *	1-15	
A	KAZUYUKI YAHAGI, NAKO HOSHINO, HAJIME HIROTA: "Solution behaviour of new cationic surfactants derived from Guerbet alcohols and their use in hair conditioners" INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, no. 13, 1991, pages 221-234, XP002514907	1-15	
A	ANONYME: "Auswahl pflegender Wirkstoffe für einen Haarschaum" SÖFW-JOURNAL, vol. 131, no. 3, 2005, pages 38-43, XP002514908	1-15	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) A61Q A61K
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
12 février 2009		Simon, Frédéric	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0852794 FA 710030**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **12-02-2009**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2007190007 A1	16-08-2007	AUCUN	

WO 0122925 A	05-04-2001	AU 5867899 A	30-04-2001
		CA 2385912 A1	05-04-2001
		DE 69932459 T2	12-07-2007
		EP 1216018 A1	26-06-2002
		ES 2264269 T3	16-12-2006
		JP 3966726 B2	29-08-2007
		JP 2003535031 T	25-11-2003
		US 6953572 B1	11-10-2005
