



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104189327 A

(43) 申请公布日 2014. 12. 10

(21) 申请号 201410358365. 1

(22) 申请日 2014. 07. 26

(71) 申请人 杨建平

地址 036900 山西省朔州市山阴县旧城广场
闫家巷卫生所

(72) 发明人 杨建平

(74) 专利代理机构 太原晋科知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 14110

代理人 郑晋周

(51) Int. Cl.

A61K 36/889 (2006. 01)

A61P 1/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种用于治疗慢性肠炎的中药

(57) 摘要

一种用于治疗慢性肠炎的中药,是由下列药物制备而成的:党参、茯苓、白术、元胡、车前子、乌梅、甘草、生白芍、木香、炒槟榔、白槿花、当归、黄连、败酱草,将上述药物第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升,第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升,每日两次,早晚空腹。

1. 一种用于治疗慢性肠炎的中药，是由以下重量的药物制成的：

党参 15 克、茯苓 15 克、白术 12 克、元胡 10 克、车前子 15 克、乌梅 15 克、甘草 6 克、生白芍 15 克、木香 10 克、炒槟榔 10 克、白槿花 10 克、当归 15 克、黄连 3 克、败酱草 15 克。

2. 根据权利要求 1 所述一种用于治疗慢性肠炎的中药，其特征是将所述药物混合后煎成汤剂口服。

一种用于治疗慢性肠炎的中药

[0001] 技术领域：

本发明涉及一种中药，特别是涉及一种用于治疗慢性肠炎的中药。

[0002] 背景技术：

慢性肠炎泛指肠道的慢性炎症性疾病，其病因可为细菌、霉菌、病毒、原虫等微生物感染，亦可为过敏、变态反应等原因所致。临床表现为长期慢性、或反复发作的腹痛、腹泻及消化不良等症，重者可有粘液便或水样便。

[0003] 临床上治疗慢性肠炎极为棘手，一般的治疗口服止泻消炎类药物或中成药，有时并不对症，使用起来没有明显效果。

[0004] 发明内容：

本发明是一种见效快、疗效好、服用方便、无副作用的中药制剂。

[0005] 本发明的药物是由以下重量的药物制成的：

党参 15 克、茯苓 15 克、白术 12 克、元胡 10 克、车前子 15 克、乌梅 15 克、甘草 6 克、生白芍 15 克、

木香 10 克、炒槟榔 10 克、白槿花 10 克、当归 15 克、黄连 3 克、败酱草 15 克。

可以将上述药物制成药剂学上的任何一种内服剂型，本发明优选的剂型是汤剂。

[0006] 本发明的药物的具体制备方法是：将上述药物第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升。

[0007] 使用方法是：将煎好的汤剂口服，每日两次，早晚空腹。

[0008] 中医认为：慢性肠炎应以健脾敛阴、调气行血、清化湿热为治疗原则。本发明方中党参、白术、茯苓、乌梅、甘草、生白芍健脾敛阴；木香、元胡、炒槟榔、当归调气敛阴；车前子、白槿花、黄连、败酱草清化湿热；上述药物配伍使用，协同作用，从而达到治疗的目的。

[0009] 本发明的药物疗效好，无副作用，对慢性肠炎有很好的疗效。

[0010] 为进一步证明本发明药物的临床疗效和安全性，选择 50 例患者进行观察。50 例患者中，5 天为一个疗程，一个疗程痊愈者 25 例，二个疗程痊愈者 15 例，二个疗程以上痊愈者 9 例，无效 1 例；全部使用本发明药物进行治疗，每日两次，早晚空腹。一剂煎两次。

[0011] 疗效标准：显效：反复发作的腹痛、腹泻及消化不良症状消失；有效：反复发作的腹痛、腹泻及消化不良症状减轻或消失；无效：治疗前后没有变化。

[0012] 表 1 治疗后统计结果

患者	例数	显效(%)	有效(%)	无效(%)	总有效率(%)
7-14 日痊愈者	25	20 (80)	5 (20)	0 (0)	25 (100)
15-21 日痊愈者	15	13 (86.6)	2 (13.4)	0 (0)	15 (100)
22 日以上痊愈者	10	4 (40)	5 (50)	1 (10)	9 (90)
总计	50	37 (74)	12 (24)	1 (2)	49 (98)

具体实施方式：

本发明的药物是由以下重量的药物制成的：

党参 15 克、茯苓 15 克、白术 12 克、元胡 10 克、车前子 15 克、乌梅 15 克、甘草 6 克、生

白芍 15 克、

木香 10 克、炒槟榔 10 克、白槿花 10 克、当归 15 克、黄连 3 克、败酱草 15 克。

将上述药物混合后煎成汤剂，第一剂加水 700 毫升煎至 200 毫升，第二剂加水 500 毫升煎至 200 毫升，口服每日两次，早晚空服。