

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. April 2011 (14.04.2011)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2011/042389 A2

(51) Internationale Patentklassifikation:

C07D 401/04 (2006.01) **C07D 471/04** (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01) **C07D 487/04** (2006.01)
C07D 403/04 (2006.01) **A01N 43/56** (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2010/064742

(22) Internationales Anmeldedatum:
4. Oktober 2010 (04.10.2010)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
09172677.8 9. Oktober 2009 (09.10.2009) EP
61/250,149 9. Oktober 2009 (09.10.2009) US

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **BAYER CROPSCIENCE AG** [DE/DE]; Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SUDAU, Alexander** [DE/DE]; Brucher Weg 5a, 42799 Leichlingen (DE). **ES-SAYED, Mazen** [DE/FR]; 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69011 Lyon (FR). **BRAUN, Christoph Andreas** [DE/DE]; Benderstrasse 18, 40625 Düsseldorf (DE). **MEISSNER, Ruth** [DE/DE]; Kuhlmannweg 35, 51375 Leverkusen (DE). **SIRVEN, Catherine** [FR/DE]; Hermann-Koehl-Str. 12, 40764 Langenfeld (DE). **BENTING, Jürgen** [DE/DE]; Amselstraße 7, 42799 Leichlingen (DE). **DAHMEN, Peter** [DE/DE]; Altebrücker Str.61, 41470 Neuss (DE). **PORTZ, Daniela** [DE/DE]; Talstr. 11, 52391 Vettweiß (DE). **WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike** [DE/DE]; Oberer Markeweg 85, 56566 Neuwied (DE). **DESBORDES, Philippe** [FR/FR]; Rue du Docteur Mouisset, F-69006 Lyon (FR). **BENNABI, Samir** [FR/FR]; Bis de la Gare de Cuire, F-69300 Caluire (FR).

CATHERIN, Christophe [FR/FR]; La Petite Grange, F-69460 Le Perreon (FR). **REBSTOCK, Anne-Sophie** [FR/FR]; Avenue de Birmingham, F-69004 Lyon (FR). **GROSJEAN-COURNOYER, Marie-Claire** [FR/FR]; Route d'Albigny, F-69250 Curis au Mont d'Or (FR). **HADANO, Hiroyuki** [JP/JP]; 3-2-18 Gion, Shimotsuke-shi, Tochigi, Tochigi 329-0434 (JP). **KNOBLOCH, Thomas** [FR/FR]; Dom des Vignes, F-69380 Chatillon (FR). **RINOLFI, Philippe** [FR/FR]; Résidence le Coteau, lieu dit La Colletière, F-69380 Chatillon d'Azergues (FR).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **BAYER CROPSCIENCE AG**; Business Planning and Administration, Law and Patents, Patents and Licensing, Alfred-Nobel-Str. 50, Building 6100, 40789 Monheim (DE).



(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PHENYLPYRI(MI)DINYLAZOLES

(54) Bezeichnung : PHENYLPYRI(MI)DINYLAZOLE



(57) Abstract: The invention relates to phenylpyri(mi)dinylazoles of the formula [I-a] and [I-b], where the symbols have the meaning indicated in the description, and agrochemically active salts thereof and the use thereof for treating undesired microorganisms in pest management and material protection, and for reducing mycotoxins in plants and parts of plants, and a method for producing compounds of the formula [I-a] and [I-b].

(57) Zusammenfassung: Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel [I-a] und [I-b], in welcher die Symbole die in der Beschreibung angegebenen Bedeutungen haben, sowie agrochemisch wirksame Salze davon und deren Verwendung zur Bekämpfung unerwünschter Mikroorganismen im Pflanzenschutz und Materialschutz sowie zur Reduktion von Mykotoxinen in Pflanzen und Pflanzenteilen sowie Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel [I-a] und [I-b].



Veröffentlicht:

- *ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe g)*

Phenylpyri(mi)dinylazole

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Phenylpyri(mi)dinylazole, mehrere Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung zur Bekämpfung unerwünschter Mikroorganismen im Pflanzenschutz und Materialschutz sowie zur Reduktion von Mykotoxinen in Pflanzen und Pflanzenteilen. Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Bekämpfung phytopathogener Pilze sowie zur Reduktion von Mykotoxinen in Pflanzen und Pflanzenteilen im Pflanzenschutz sowie Pflanzenschutzmittel enthaltend Phenylpyri(mi)dinylazole.

Es ist bereits bekannt, dass bestimmte Arylpyrazole fungizide Eigenschaften besitzen (vgl. z.B. WO 03/049542, WO 01/030154 und *Pharmazie* **1999**, 54(2),106-11). Die Wirksamkeit der dort beschriebenen Stoffe ist gut, lässt aber in manchen Fällen zu wünschen übrig.


In WO 98/052937 werden bestimmte Heteroaryl-substituierte Pyrazole beschrieben, die medizinisch genutzt werden können, hier zur Inhibierung der Produktion inflammatorischer Cytokine und zur Behandlung humaner p38 Kinase vermittelter Krankheiten. Ähnliche Verbindungen sind auch beschrieben in EP-A-1 553 096, WO 04/029043, WO 98/052940, WO 00/031063, WO 95/031451, WO 02/057265 und WO 00/039116. Eine Wirkung auf pilzliche Pathogene wird jedoch nicht beschrieben.

In WO 07/105058 werden bestimmte Heteroaryl-substituierte Pyrazole beschrieben, die als Modulatoren oder Inhibitoren des humanen Raf Enzyms verwendet werden können. Die Wirkung auf pilzliche Pathogene wird jedoch nicht beschrieben.

Da sich die ökologischen und ökonomischen Anforderungen an moderne Pflanzenschutzmittel laufend erhöhen, beispielsweise was Wirkspektrum, Toxizität, Selektivität, Aufwandmenge, Rückstandsbildung und günstige Herstellbarkeit angeht, und außerdem z.B. Probleme mit Resistenzen auftreten können, besteht die ständige Aufgabe, neue Pflanzenschutzmittel, insbesondere Fungizide zu entwickeln, die zumindest in Teilbereichen Vorteile gegenüber den bekannten aufweisen.

Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass die vorliegenden Phenylpyri(mi)dinylazole die genannten Aufgaben zumindest in Teilaspekten lösen und sich als Pflanzenschutzmittel, insbesondere als Fungizide eignen.

Gegenstand der Erfindung sind Verbindungen der Formel **[I-a]**,



in welcher die Symbole folgende Bedeutungen haben:

- | | | |
|----|-------|--|
| | X^1 | steht für C-H oder N, |
| 5 | R^1 | steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^7 substituiertes Phenyl, Naphthalenyl, Chinolin-5-yl, Chinolin-8-yl, Isochinolin-5-yl, Isochinolin-8-yl, 1-Benzothiophen-4-yl, 1-Benzothiophen-7-yl, 1-Benzofuran-4-yl, 1-Benzofuran-7-yl, 1,3-Benzodioxol-4-yl oder 1,3-Benzodioxol-5-yl, |
| 10 | R^2 | steht für Cyano, Nitro, Halogen, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Halogenalkyl, C_1 - C_6 -Halogenalkoxy, C_1 - C_6 -Alkylthio, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_3 - C_6 -Halogenocycloalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder Wasserstoff, |
| 15 | R^3 | steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Hydroxy, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, Halogenalkoxy (vorzugsweise C_1 - C_6 -Halogenalkoxy), Phenyl, Phenoxy substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl- C_1 - C_6 -alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl-oxy, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Alkoxy- C_1 - C_6 -alkyl, Acyloxy- C_1 - C_6 -alkyl, Heteroaryl- C_1 - C_6 -alkyl (vorzugsweise C_2 - C_9 -Heteroaryl- C_1 - C_6 -alkyl), Aryl- C_1 - C_6 -alkyl (vorzugsweise C_6 - C_{14} -Aryl- C_1 - C_6 -alkyl), C_1 - C_6 -Alkylthio- C_1 - C_6 -alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl-C(O)- C_1 - C_4 -alkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl-C(O)- C_1 - C_4 -alkyl, C_1 - C_4 -Alkyl-C(O)- C_3 - C_6 -cycloalkyl, C_1 - C_4 -Alkyl-C(O)-heterocyclyl (vorzugsweise C_1 - C_4 -Alkyl-C(O)- C_2 - C_9 -heterocyclyl), C_1 - C_4 -Alkyl-C(O)O- C_1 - C_6 -alkyl, Acyloxy- C_3 - C_6 -cycloalkyl, Acyloxy-heterocyclyl, Heterocyclyl- C_1 - C_6 -alkyl (vorzugsweise C_2 - C_9 -Heterocyclyl- C_1 - C_6 -alkyl), Heterocyclyl (vorzugsweise C_2 - C_9 -Heterocyclyl), C_2 - C_9 -OxoHeterocyclyl oder Heteroaryl (vorzugsweise C_2 - C_9 -Heteroaryl), |
| 20 | | |
| 25 | R^4 | steht für Wasserstoff, Halogen, Cyano, -C(O)OR ¹² , -SR ¹² , -NR ¹² R ¹³ , -C(O)NR ¹² R ¹³ oder -NR ¹² R ¹⁴ , -N=C=NR ²² , -N=C(H)OR ²² , -N=C(OR ²²)R ²³ , -N=C(SR ²²)R ²³ , -C(=NR ²²)NR ²² R ²³ , -SO(=NR ²²)R ²³ , -SO ₂ R ²⁰ , |

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_6 - C_{14} -Aryl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -Heteroaryl,

wobei R^4 bevorzugt für Wasserstoff oder $-NHR^{13}$ steht, in dem R^{13} für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, $-O-C(O)R^{11}$, $-O-P(O)(OR^{11})_2$, $-O-B(OR^{11})_2$ oder $-O-(C_1-C_4$ -Alkyl) substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_6 - C_{14} -Aryl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl steht,

R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, -OH, -SH,

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_6 - C_{14} -Aryl, $-O-(C_1-C_4$ -Alkyl), $-O-(C_6-C_{14}$ -Aryl), $-S-(C_1-C_4$ -Alkyl), $-S(O)-(C_1-C_6$ -Alkyl) oder $-C(O)-(C_1-C_6$ -Alkyl),

oder bilden außerdem gemeinsam mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Sauerstoff, Cyano oder C_1 - C_4 -Alkyl substituierten Cyclus (vorzugsweise einen gesättigten, ungesättigten oder partiell ungesättigten Monocyclus) mit 3, vorzugsweise 5 bis 8 Ringatomen, wobei der Cyclus 1 bis 4 Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel oder $-NR^{19}$ enthalten kann,

R^7 steht unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, -OH, -SH,

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl oder $-O-(C_1-C_4$ -Alkyl) substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, Tri(C_1 - C_4 -alkyl)silyl, C_6 - C_{14} -Aryl, $-O-(C_1-C_4$ -Alkyl), $-O-(C_6-C_{14}$ -Aryl), $-S-(C_1-C_4$ -Alkyl), $-S(O)-(C_1-C_6$ -Alkyl), oder $-S(O)_2-(C_1-C_6$ -Alkyl),

R^{11} steht für -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, $-NH-C(O)R^{20}$, $-NR^{20}R^{21}$, $-C(O)R^{20}$, $-C(O)OR^{20}$, $-C(O)NR^{20}R^{21}$, $-SO_2R^{20}$,

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Carbonyl, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl oder $-O-(C_1-C_4$ -Alkyl) substituiertes C_1 -

C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₁-C₁₁-Heteroalkyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -S-(C₁-C₄-Alkyl), -O-(C₃-C₈-Cycloalkyl), -S-(C₃-C₈-Cycloalkyl), C₆-C₁₄-Aryl, -O-(C₆-C₁₄-Aryl), -S-(C₆-C₁₄-Aryl), C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl,

5 R¹² und R¹³ stehen unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen:
H, -C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OR¹⁵ oder -C(O)NR¹⁵R¹⁶

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, -O-C(O)R¹¹, -O-P(O)(OR¹¹)₂, -O-B(OR¹¹)₂ oder -O-(C₁-C₄-Alkyl) substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl,

10 R¹⁴ steht für -CH₂-NR²²R²³, Piperidin-1-ylmethyl oder Morpholin-4-ylmethyl

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl oder -O-(C₁-C₄-Alkyl),

R¹⁵ und R¹⁶ stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff oder -OH

15 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl

oder bilden (wenn R¹² und/oder R¹³ für -C(O)NR¹⁵R¹⁶ steht) gemeinsam mit dem Stickstoffatom an das sie gebunden sind einen 3 bis 7-gliedrigen Ring, der ein weiteres dem Stickstoff nicht (direkt) benachbartes Heteroatom aus der Reihe N, O enthalten kann,

20 R¹⁷ und R¹⁸ stehen unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: H, -C(O)OR¹¹

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, und -O-(C₁-C₄-Alkyl) substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl,

25

R¹⁹ steht für H, C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, -C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵,

R²⁰ und R²¹ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl oder Wasserstoff,

30

R^{22} und R^{23} stehen unabhängig voneinander für C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl oder Wasserstoff,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

Ausgenommen von den oben aufgeführten allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten
5 Restdefinitionen bzw. Erläuterungen sind Kombinationen in denen die Symbole der Formel **[I-a]** die folgenden Bedeutungen haben:

Verbindungen in denen,

X^1 für N steht, und

R^1 für ein gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht,

10 R^3 für Butyl oder Propyn-2-yl steht,

R^4 für NHR_{12} steht und

R^{12} für gegebenenfalls substituiertes C_6 - C_{14} -Aryl steht,

sowie

Verbindungen in denen,

15 X^1 für N steht

R^2 , R^4 , R^5 , R^6 für H stehen,

R^3 für Methyl, Ethyl, Allyl, 2-Methoxyethyl oder Benzyl steht, wenn R^1 für 4-Chlorphenyl steht, oder

R^3 für Methyl steht, wenn R^1 für Phenyl, 4-Methoxyphenyl oder 4-Fluorphenyl steht.

20 Schließlich wurde gefunden, dass die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel **[I-a]** sehr gute mikrobizide Eigenschaften besitzen und zur Bekämpfung unerwünschter Mikroorganismen im Pflanzenschutz und Materialschutz sowie zur Reduktion von Mykotoxinen in Pflanzen und Pflanzenteilen verwendbar sind.

Die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole sind durch die Formel **[I-a]** allgemein definiert. Bevor-
25 zugte Restdefinitionen der vorstehenden und nachfolgend genannten Formeln sind im Folgenden

angegeben. Diese Definitionen gelten für die Endprodukte der Formel **[I-a]** wie für alle Zwischenprodukte gleichermaßen.

Bevorzugte Verbindungen der Formel **[I-a]** der vorliegenden Erfindung sind solche, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

- 5 X^1 steht für C-H oder N,
- R^1 steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^7 substituiertes Phenyl, Naphthalenyl, Chinolin-5-yl, Chinolin-8-yl, Isochinolin-5-yl, Isochinolin-8-yl, 1,3-Benzodioxol-4-yl oder 1,3-Benzodioxol-5-yl,
- 10 R^2 steht für Cyano, Nitro, Halogen, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Halogenalkyl, C_1 - C_6 -Halogenalkoxy, C_1 - C_6 -Alkylthio, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_3 - C_6 -Halogenycycloalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder Wasserstoff,
- 15 R^3 steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Hydroxy, Halogenalkoxy substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl- C_1 - C_6 -alkyl, C_6 - C_{14} -Aryl- C_1 - C_6 -alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy- C_1 - C_6 -alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_2 - C_9 -Heterocyclyl- C_1 - C_6 -alkyl und C_2 - C_9 -Heteroaryl oder für Pyridin-2-ylmethyl, Pyridin-3-ylmethyl, Pyridin-4-ylmethyl, 2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl, 5-(Trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl, 2-(Methylsulfanyl)ethyl, 2-Cyclohexyl-2-oxoethyl, 2-Cyclopentyl-2-oxoethyl, 1-Acetylpiperidin-4-yl, Tetrahydrofuran-3-yl, 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl, 2-Acetoxyethyl, 2-tert-Butoxy-2-oxoethyl, 1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl, 1-Methoxy-1-oxopropan-2-yl, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl, Biphenyl-4-ylmethyl, Biphenyl-3-ylmethyl, Biphenyl-2-ylmethyl, 3-Phenoxybenzyl, 4-Fluor-3-phenoxybenzyl, Cyclopentyloxy, 2-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-oxoethyl oder 3-Ethoxy-3-oxopropyl,
- 20 R^4 steht für Wasserstoff, $-NR^{12}R^{13}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$,
- 25 wobei R^4 bevorzugt für Wasserstoff oder NHR^{13} steht, wobei dann R^{13} für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH oder Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl steht,
- 30 R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, -OH, -SH,

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -S-(C₁-C₄-Alkyl) oder -S(O)-(C₁-C₆-Alkyl),

5 oder bilden außerdem gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Sauerstoff, Cyano oder C₁-C₄-Alkyl substituierten, gesättigten, ungesättigten oder partiell ungesättigten Monocyclus mit 3 bis 8 Ringatomen, wobei der Monocyclus Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel oder -N-R¹⁹ enthalten kann,

10 R⁷ steht unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, Isopropyl, -CF₃, -CHF₂, -C₂F₅, -CCl₃, -OCH₃, -OC₂H₅, -O-CH(CH₃)₂, -OCF₃, -OCHF₂, -OC₂F₅, -SCH₃, -SO₂CH₃ oder -SCF₃,

R¹¹ steht für -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, -NH-C(O)R²⁰, -C(O)R²⁰, -C(O)OR²⁰, -C(O)NR²⁰R²¹, -SO₂R²⁰

15 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C₁-C₆-Alkyl oder O-(C₁-C₄-Alkyl) substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₁-C₁₁-Heteroalkyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -S-(C₁-C₄-Alkyl), -O-(C₃-C₈-Cycloalkyl), -S-(C₃-C₈-Cycloalkyl), C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl,

20 R¹² und R¹³ stehen unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: H, -C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OR¹⁵, -C(O)NR¹⁵R¹⁶

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH oder Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl,

R¹⁵ und R¹⁶ stehen unabhängig voneinander für H oder -OH

25 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl

30 oder bilden, wenn R¹² und/oder R¹³ für -C(O)NR¹⁵R¹⁶ steht, gemeinsam mit dem Stickstoffatom an das sie gebunden sind einen 3 bis 7-gliedrigen Ring, der ein weiteres dem Stickstoff nicht direkt benachbartes Heteroatom aus der Reihe N, O enthalten kann,

R¹⁹ steht für H, C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, -C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵ oder -C(O)OR¹⁵,

R²⁰ und R²¹ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH oder Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl oder für Wasserstoff,

R²² und R²³ stehen unabhängig voneinander für C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl oder Wasserstoff,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

In einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind Verbindungen der Formel **[I-a]**

besonders bevorzugt, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

X¹ steht für C-H,

R¹ steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R⁷ substituiertes Phenyl oder Naphthalenyl,

R² steht für Halogen, C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl oder Wasserstoff,

R³ steht für Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, 2,2-Dimethylpropyl, 3-Methylbut-2-en-1-yl, But-2-en-1-yl, But-3-en-2-yl, Propadienyl, 4-Methylpent-3-en-2-yl, Prop-2-in-1-yl, But-2-in-1-yl, But-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, Cyanmethyl, 2-Cyanethyl, 1-Cyanpropan-2-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclopentyloxy, Cyclohexyl, (2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, Trichlormethyl, Trifluormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, 2-Chlorethyl, 2-Bromethyl, 2-Fluorpropyl, 3-Fluorpropyl, 2-Chlorpropyl, 3-Chlorpropyl, 1,1,1-Trifluorpropan-2-yl, 1,1-Difluorpropan-2-yl, 1,1,1-Trifluor-2-methylpropan-2-yl, 1,3-Difluorpropan-2-yl, 3,3,3-Trifluor-2-hydroxypropyl, Pyridin-2-ylmethyl, Pyridin-3-ylmethyl, Pyridin-4-ylmethyl, 2-Chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl, Benzyl, 2-Fluorbenzyl, 3-Fluorbenzyl, 4-Fluorbenzyl, 1-(2-Chlorphenyl)ethyl, 2,3-Difluorbenzyl, 2-Chlor-6-fluorbenzyl, 1-(3-Chlorphenyl)ethyl, 1-(4-Chlorphenyl)ethyl, 2-Cyanobenzyl, 3-Cyanobenzyl, 4-Cyanobenzyl, 4-(Difluormethoxy)benzyl, Biphenyl-3-ylmethyl, Biphenyl-4-ylmethyl, Biphenyl-2-ylmethyl, 3-Phenoxybenzyl, 4-Fluoro-3-phenoxybenzyl, 2-(3-Chlorphenyl)ethyl, 2-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-Naphthylmethyl, Methoxymethyl, 2-Methoxyethyl, 2-Methoxypropyl, 2-(Methylsulfanyl)ethyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, 1-Methoxypropan-2-yl, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl, 2-(2-

- 5 Methoxyethoxy)ethyl, 1,3-Dimethoxypropan-2-yl, 2-(Cyclopropyloxy)ethyl, Propoxy, (2-Methylprop-2-en-1-yl)oxy, (3-Methylbutanoyl)oxy, 1-Cyanethoxy, 2-Chlorethoxy, But-2-in-1-yloxy, Cyanmethoxy, Prop-2-in-1-yloxy, 2-Cyclohexyl-2-oxoethyl, 2-Cyclopentyl-2-oxoethyl, Tetrahydrofuran-2-ylmethyl, (3-Methyloxetan-3-yl)methyl, 1H-Imidazol-2-ylmethyl, 2-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-oxoethyl, 1-Acetylpiperidin-4-yl, Tetrahydrofuran-3-yl, 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl, 5-(Trifluormethyl)pyridin-2-yl, 5-(Trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl, 6-(Trifluormethyl)pyrimidin-4-yl, 2-Hydroxypropyl, 2-Hydroxy-2-methylpropyl, 2,3-Dihydroxypropyl, 2-Acetoxyethyl, Cyano, 2-tert-Butoxy-2-oxoethyl, 1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl, 1-Methoxy-1-oxopropan-2-yl oder 3-Ethoxy-3-oxopropyl, , Propan-2-yloxy, Methyl, Ethyl, 2-Ethoxyethyl, oder 2-Chlorethyl,
- 10 R^4 steht für Wasserstoff, $-C(O)NR^{12}R^{13}$ oder $-NR^{12}R^{13}$,
- wobei R^4 bevorzugt für Wasserstoff steht,
- R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro,
- 15 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, $-O-(C_1-C_4$ -Alkyl), $-S-(C_1-C_4$ -Alkyl) oder $-S(O)-(C_1-C_6$ -Alkyl),
- oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen Monocyclus, wobei sie gemeinsam für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes $-(CH=CH-CH=CH)-$, $-(CH=CH-N(R^{19}))$, $-(CH=CH-CH=N)-$, $-(NH-CH=N)-$ oder $-(CH_2-C(O)-N(R^{19}))$ stehen,
- 20 R^7 steht unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: Fluor, Chlor, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, Isopropyl, $-CF_3$, $-CHF_2$, $-C_2F_5$, $-CCl_3$,
- R^{11} steht für $-OH$, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, $-NHC(O)R^{20}$, $-C(O)R^{20}$, $-C(O)OR^{20}$, $-C(O)NR^{20}R^{21}$, $-SO_2R^{20}$
- 25 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, $-OH$, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl oder $-O-(C_1-C_4$ -Alkyl) substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, $-O-(C_1-C_4$ -Alkyl), $-S-(C_1-C_4$ -Alkyl), $-O-(C_3-C_8$ -Cycloalkyl) oder $-S-(C_3-C_8$ -Cycloalkyl),
- R^{12} und R^{13} stehen unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: H, $-C(S)R^{15}$, $-C(O)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OR^{15}$ oder $-C(O)NR^{15}R^{16}$
- 30

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl,

5 R¹⁵ und R¹⁶ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₂-C₉-Heterocyclyl, C₂-C₉-Heteroaryl

oder für Wasserstoff

10 oder bilden gemeinsam mit dem Stickstoffatom an das sie gebunden sind einen 3 bis 7-gliedrigen Ring, der ein weiteres dem Stickstoff nicht benachbartes Heteroatom aus der Reihe N, O enthalten kann,

R¹⁹ steht für H, C₂-C₆-Alkynyl, C(O)R¹⁵, SO₂R¹⁵, C(O)OR¹⁵,

R²⁰ und R²¹ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl

15 oder für Wasserstoff,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

In dieser ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind Verbindungen der Formel **[I-a]** **ganz besonders bevorzugt**, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

X¹ steht für C-H

20 R¹ steht für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R⁷ substituiertes Phenyl,

R² steht für Methyl, Ethyl, Isopropyl, Cyclopropyl oder Wasserstoff,

25 R³ steht für Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, 2,2-Dimethylpropyl, 3-Methylbut-2-en-1-yl, But-2-en-1-yl, But-3-en-2-yl, Propadienyl, Prop-2-in-1-yl, But-2-in-1-yl, But-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, Cyanmethyl, 2-Cyanethyl, 1-Cyanpropan-2-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, (2,2-Dichloreycyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, Trichlormethyl, Trifluormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, 2-Chlorethyl, 2-Bromethyl, 2-Fluorpropyl, 3-Fluorpropyl, 2-Chlorpropyl, 3-Chlorpropyl, 1,3-

5 Difluorpropan-2-yl, 2-Fluorbenzyl, 3-Fluorbenzyl, 4-Fluorbenzyl, 2,3-Difluorbenzyl, 2-Chlor-6-fluorbenzyl, 1-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-(3-Chlorphenyl)ethyl, 1-(4-Chlorphenyl)ethyl, 3-Cyanobenzyl, 4-Cyanobenzyl, 4-(Difluormethoxy)benzyl, 2-Cyanobenzyl, 2-(3-Chlorphenyl)ethyl, 2-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-Naphthylmethyl, (Pyridin-3-yl)methyl, 2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl, Methoxymethyl, 2-Methoxyethyl, 2-(Methylsulfanyl)ethyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, 1-Methoxypropan-2-yl, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl, Tetrahydrofuran-2-ylmethyl, (3-Methyloxetan-3-yl)methyl, 1H-Imidazol-2-ylmethyl, Tetrahydrofuran-3-yl, 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl, 2-tert-Butoxy-2-oxoethyl, 1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl, 1-Methoxy-1-oxopropan-2-yl oder 3-Ethoxy-3-oxopropyl, Propan-2-yloxy, 2-Ethoxyethyl, 10 Methyl, Ethyl, 1-Propyl oder 2-Chlorethyl,

in einer bevorzugten Variante ist R^3 wie oben definiert umfasst jedoch nicht Methyl oder Ethyl.

R^4 steht für Wasserstoff, $-NR^{12}R^{13}$ oder $-NHR^{13}$,

15 wobei R^4 bevorzugt für Wasserstoff steht,

R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor oder Cyano

oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen Cyclus, wobei sie gemeinsam für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes $-(CH=CH-CH=CH)-$, $-(CH=CH-N(R^{19}))$, $-(CH=CH-CH=N)-$, $-(NH-CH=N)-$ oder $-(CH_2-C(O)-N(R^{19}))$ - stehen, 20

R^7 steht unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: Fluor, Chlor, Cyano oder Methyl,

R^{11} steht für $-OH$, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, $-NH-C(O)R^{20}$, $-C(O)R^{20}$, $-C(O)OR^{20}$, $-C(O)NR^{20}R^{21}$, $-SO_2R^{20}$

25 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, OH, Cyano, C_1-C_6 -Alkyl oder $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$ substituiertes C_1-C_6 -Alkyl, C_3-C_8 -Cycloalkyl, C_2-C_6 -Alkenyl, C_2-C_6 -Alkynyl, $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-S-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-O-(C_3-C_8\text{-Cycloalkyl})$ oder $-S-(C_3-C_8\text{-Cycloalkyl})$,

R^{12} steht für $-C(S)R^{15}$, $-C(O)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OR^{15}$ oder $-C(O)NR^{15}R^{16}$,

R¹³ steht für C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl oder Wasserstoff,

R¹⁵ steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, -OH, Cyano oder C₁-C₄-alkyl substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₂-C₉-Heterocyclyl, C₂-C₉-Heteroaryl
5 oder für Wasserstoff

R¹⁶ steht für Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Propyl,

R¹⁹ steht für H, C₂-C₆-Alkynyl, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵,

R²⁰ und R²¹ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich
10 oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, OH, Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, iso-Propyl, Cyclopropyl, Cyclobutyl
oder für Wasserstoff,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

In dieser ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind Verbindungen der Formel **[I-a]**

insbesondere bevorzugt, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

X¹ steht für C-H

R¹ steht für Phenyl, 3-Methylphenyl, 2-Fluorphenyl, 3-Fluorphenyl, 4-Fluorphenyl, 3-Trifluormethylphenyl, 4-Chlorphenyl, 2,5-Difluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl, 2,6-Difluorphenyl, 3-Methyl-4-fluorphenyl, 3-Cyan-4-fluorphenyl oder 2,4,6-Trifluorphenyl,

R² steht für Methyl, Ethyl, Isopropyl, Cyclopropyl, oder Wasserstoff,

R³ steht für Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, 2,2-Dimethylpropyl, Prop-2-in-1-yl, But-3-in-2-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, (2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, Trifluormethyl, Trichlormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, 2-Chlorethyl, 2-Fluorpropyl, 3-Fluorpropyl, 1,3-Difluorpropan-2-yl, 2-Fluorbenzyl, 2,3-Difluorbenzyl, 2-Chlor-6-fluorbenzyl, 1-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-(3-Chlorphenyl)ethyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, oder 1-Methoxypropan-2-yl, 2,2-Difluorethyl, 2-Cyanethyl, Cyanmethyl, 1-Cyanpropan-2-yl, 1-Propyl, 2-Ethoxyethyl, 2-Chlorethyl oder 2-Methoxyethyl,

- R⁴ steht für Wasserstoff
- R⁵ und R⁶ stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor oder Cyano
- oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen
- Cyclus, wobei sie gemeinsam für gegebenfalls einfach oder mehrfach gleich oder
- 5 verschieden durch R¹¹ substituiertes -(CH=CH-CH=CH)-, -(CH=CH-N(R¹⁹))- , -(CH=CH-CH=N)-, -(NH-CH=N)- oder -(CH₂-C(O)-N(R¹⁹))- stehen,
- R¹¹ steht für -OH, Fluor, Chlor, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl oder C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₆-Cycloalkyl,
- oder für Wasserstoff ,
- 10 R¹⁹ steht für H, Acetyl, Ethoxycarbonyl, Methoxycarbonyl, Prop-2-in-1-yl oder But-2-in-1-yl, sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

In dieser ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind Verbindungen der Formel **[I-a]** weiterhin insbesondere bevorzugt, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

- 15 X¹ steht für C-H,
- R⁴ steht für H,
- R³ steht für Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, Prop-2-in-1-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, (2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2-Fluorbenzyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, 1-Methoxypropan-2-yl, 2,2-Difluorethyl, 2-Cyanethyl, Cyanmethyl, 1-Cyanpropan-2-yl, 1-Propyl, 2-Ethoxyethyl, 2-Chlorethyl oder 2-Methoxyethyl,
- 20

wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben,

sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

- Weiterhin insbesondere bevorzugt werden Verbindungen der ersten Ausführungsform der Erfindung der
- 25 Formel **[I-a]**, in denen

R³ für Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, Prop-2-in-1-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, (2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2-Fluorbenzyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, 1-Methoxypropan-2-yl steht,

wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben,

sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

In einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindungen sind Verbindungen der Formel **[I-a]**

5 **besonders bevorzugt**, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

X^1 steht für N,

R^1 steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^7 substituiertes Phenyl oder Naphthalenyl,

R^2 steht für Halogen, C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl oder Wasserstoff,

10 R^3 steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Hydroxy, Halogenalkoxy substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl- C_1 - C_6 -alkyl, C_6 - C_{14} -Aryl- C_1 - C_6 -alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy- C_1 - C_6 -alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_2 - C_9 -Heterocyclyl- C_1 - C_6 -alkyl und C_2 - C_9 -Heteroaryl

15 R^4 steht für Wasserstoff, $-C(O)NR^{12}R^{13}$ oder $-NR^{12}R^{13}$,

wobei R^4 bevorzugt für $-NHR^{13}$ steht, und R^{13} für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl steht,

20 R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro,

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, $-O-(C_1-C_4$ -Alkyl), $-S-(C_1-C_4$ -Alkyl) oder $-S(O)-(C_1-C_6$ -Alkyl),

25 oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen Monocyclus, wobei sie gemeinsam für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes $-(CH=CH-CH=CH)-$, $-(CH=CH-N(R^{19}))$, $-(CH=CH-CH=N)-$, $-(NH-CH=N)-$ oder $-(CH_2-C(O)-N(R^{19}))$ stehen,

R^7 steht unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: Fluor, Chlor, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, Isopropyl, $-CF_3$, $-CHF_2$, $-C_2F_5$, $-CCl_3$,

R^{11} steht für -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, $-NHC(O)R^{20}$, $-C(O)R^{20}$, $-C(O)OR^{20}$, $-C(O)NR^{20}R^{21}$, $-SO_2R^{20}$

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl oder -O-(C_1 - C_4 -Alkyl) substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, -O-(C_1 - C_4 -Alkyl), -S-(C_1 - C_4 -Alkyl), -O-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl) oder -S-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl),

R^{12} und R^{13} stehen unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: H, $-C(S)R^{15}$, $-C(O)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OR^{15}$ oder $-C(O)NR^{15}R^{16}$

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl,

R^{15} und R^{16} stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -Heteroaryl

oder für Wasserstoff

oder bilden gemeinsam mit dem Stickstoffatom an das sie gebunden sind einen 3- bis 7-gliedrigen Ring, der ein weiteres dem Stickstoff nicht benachbartes Heteroatom aus der Reihe N, O enthalten kann,

R^{19} steht für H, C_2 - C_6 -Alkynyl, $-C(O)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$,

R^{20} und R^{21} stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl

oder für Wasserstoff,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

In dieser zweiten Ausführungsform der Erfindung sind Verbindungen der Formel [I-a] ganz besonders bevorzugt, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

X^1 steht für N,

- R¹ steht für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R⁷ substituiertes Phenyl,
- R² steht für Methyl, Ethyl, Isopropyl, Cyclopropyl oder Wasserstoff,
- R³ steht für Methyl, Ethyl, 1-Propyl, Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, 2,2-Dimethylpropyl, 3-Methylbut-2-en-1-yl, But-2-en-1-yl, But-3-en-2-yl, Propadienyl, Prop-2-in-1-yl, But-2-in-1-yl, But-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, Cyanmethyl, 2-Cyanethyl, 1-Cyanpropan-2-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, (2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, Trichlormethyl, Trifluormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, 2-Chlorethyl, 2-Bromethyl, 2-Fluorpropyl, 3-Fluorpropyl, 2-Chlorpropyl, 3-Chlorpropyl, 1,3-Difluorpropan-2-yl, 2-Fluorbenzyl, 3-Fluorbenzyl, 4-Fluorbenzyl, 2,3-Difluorbenzyl, 2-Chlor-6-fluorbenzyl, 1-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-(3-Chlorphenyl)ethyl, 1-(4-Chlorphenyl)ethyl, 3-Cyanobenzyl, 4-Cyanobenzyl, 4-(Difluormethoxy)benzyl, 2-Cyanobenzyl, 2-(3-Chlorphenyl)ethyl, 2-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-Naphthylmethyl, (Pyridin-3-yl)methyl, 2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl, Methoxymethyl, 2-Methoxyethyl, 2-(Methylsulfanyl)ethyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, 1-Methoxypropan-2-yl, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl, Tetrahydrofuran-2-ylmethyl, (3-Methyloxetan-3-yl)methyl, 1H-Imidazol-2-ylmethyl, Tetrahydrofuran-3-yl, 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl, 2-tert-Butoxy-2-oxoethyl, 1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl, 1-Methoxy-1-oxopropan-2-yl oder 3-Ethoxy-3-oxopropyl, Propan-2-yloxy, 2-Ethoxyethyl, oder 2-Chlorethyl,
- R⁴ steht für Wasserstoff, -NR¹²R¹³ oder -NHR¹³,
- wobei R⁴ bevorzugt für -NHR¹³ steht, und R¹³ für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, OH, Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl steht,
- R⁵ und R⁶ stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor oder Cyano
- oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen Cyclus, wobei sie gemeinsam für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes -(CH=CH-CH=CH)-, -(CH=CH-N(R¹⁹)-, -(CH=CH-CH=N)-, -(NH-CH=N)- oder -(CH₂-C(O)-N(R¹⁹)- stehen,

- R⁷ steht unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: Fluor, Chlor, Cyano oder Methyl,
- R¹¹ steht für -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, -NH-C(O)R²⁰, -C(O)R²⁰, -C(O)OR²⁰, -C(O)NR²⁰R²¹, -SO₂R²⁰
- 5 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, OH, Cyano, C₁-C₆-Alkyl oder -O-(C₁-C₄-Alkyl) substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -S-(C₁-C₄-Alkyl), -O-(C₃-C₈-Cycloalkyl) oder -S-(C₃-C₈-Cycloalkyl),
- R¹² steht für -C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OR¹⁵ oder -C(O)NR¹⁵R¹⁶,
- 10 R¹³ steht für C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl, oder Wasserstoff,
- R¹⁵ steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, OH, Cyano oder C₁-C₄-alkyl substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₂-C₉-Heterocyclyl, C₂-C₉-Heteroaryl
- 15 oder für Wasserstoff,
- R¹⁶ steht für Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Propyl,
- R¹⁹ steht für H, C₂-C₆-Alkynyl, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵,
- R²⁰ und R²¹ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes Methyl, Ethyl,
- 20 Propyl, iso-Propyl, Cyclopropyl, Cyclobutyl
- oder für Wasserstoff,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

In dieser zweiten Ausführungsform der Erfindung sind Verbindungen der Formel [I-a] insbesondere bevorzugt, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

- 25 X¹ steht für N,
- R¹ steht für Phenyl, 4-Fluorphenyl,
- R² steht für Methyl, Ethyl, Isopropyl, Cyclopropyl, oder Wasserstoff,

- R^3 steht für Methyl, Ethyl, 1-Propyl, Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, 2,2-Dimethylpropyl, Prop-2-in-1-yl, But-3-in-2-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, (2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, Trifluormethyl, Trichlormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, 2-Chlorethyl, 2-Fluorpropyl, 3-Fluorpropyl, 1,3-Difluorpropan-2-yl, 2-Fluorbenzyl, 2,3-Difluorbenzyl, 2-Chlor-6-fluorbenzyl, 1-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-(3-Chlorphenyl)ethyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, oder 1-Methoxypropan-2-yl, 2,2-Difluorethyl, 2-Cyanethyl, Cyanmethyl, 1-Cyanpropan-2-yl, 1-Propyl, 2-Ethoxyethyl, 2-Chlorethyl oder 2-Methoxyethyl,
- 10 R^4 steht für Wasserstoff, $-NHR^{12}$ oder für $-NHR^{13}$, bevorzugt für $-NHR^{13}$
- R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor oder Cyano
- oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen Cyclus, wobei sie gemeinsam für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes $-(CH=CH-CH=CH)-$, $-(CH=CH-N(R^{19})-)$, $-(CH=CH-CH=N)-$ oder $-(CH_2-C(O)-N(R^{19})-)$ stehen,
- 15 R^{11} steht für -OH, Fluor, Chlor, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl oder C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl,
- R^{12} steht für $-C(S)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$ oder $-C(O)R^{15}$,
- 20 R^{13} steht für Allyl, Benzyl, Cyclobutyl, Cyclopent-3-en-1-yl, Cyclopentyl, Cyclopropyl, (1-Cyclopropylethyl), (1-Cyclopropylethyl), (Cyclopropylmethyl), (Cyclopropylmethyl), (Dicyclopropylmethyl), (2,2-Difluoroethyl), (2,2-Dimethoxyethyl), [2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl], [(2,2-Dimethylcyclopropyl)methyl], (2-Ethoxyethyl), Ethyl, (3-Fluorobenzyl), (4-Fluorobenzyl), (2-Fluorobenzyl), [1-(2-Fluorophenyl)ethyl], (2-Hydroxy-2-methylpropyl), (2-Hydroxyethyl), (2-Hydroxypropyl), (2-Hydroxypropyl), Isopropyl, (2-Methoxyethyl), (1-Methoxypropan-2-yl), (1-Methoxypropan-2-yl), Methyl, [2-(Morpholin-4-yl)ethyl], Oxetan-3-yl, (1-Phenylethyl), Prop-2-yn-1-yl, Propyl, [1-(Pyridin-2-yl)ethyl], (Pyrimidin-2-ylmethyl), sec-Butyl, Tetrahydro-2H-pyran-3-yl, tetrahydro-2H-pyran-4-yl, Tetrahydro-2H-pyran-4-yl,
- 25
- 30 R^{15} steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, -OH, Cyano oder C_1 - C_4 -alkyl substituiertes Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, sec-Butyl, Isobutyl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, 2-Methoxyethyl, (2-Methoxyethoxy)methyl, Cyclopentenyl, Cyclohexenyl, Oxetanyl, Tetrahydrofuran-2-yl,

Ethynyl, Prop-1-in-1-yl, Prop-1-en-1-yl, Aminomethyl, Aminoethyl, Aminopropyl, Aminobutyl, Aminoisopropyl, Aminocyclopropyl, Aminocyclobutyl, Aminocyclopentyl, Dimethylamino, Ethyl(methyl)amino, Pyrrolidinyl, Diethylamino, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl, Ethoxycarbonyl, Benzyl, Phenyl

5 oder für Wasserstoff,

R^{19} steht für H, Acetyl, Ethoxycarbonyl, Methoxycarbonyl, Prop-2-in-1-yl oder But-2-in-1-yl, sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

Weiterhin insbesondere bevorzugt werden Verbindungen zweiten Ausführungsform der Erfindung der Formel **[I-a]**, in denen

10 R^4 für $-NHR^{13}$ oder für H steht,

wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben,

sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

Ganz besonders bevorzugte Verbindungen der Formel **[I-a]** der ersten und zweiten Ausführungsform der oben vorliegenden Erfindung sind solche, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden

15 Bedeutungen haben:

R^1 steht **ganz besonders bevorzugt** für 4-Fluorphenyl, 3-Chlorphenyl, 2,6-Difluorphenyl, oder 3-Methylphenyl und insbesondere für 4-Fluorphenyl,

R^2 steht **ganz besonders bevorzugt** für Cyclopropyl, Ethyl, Methyl oder Wasserstoff und insbesondere für Wasserstoff,

20 R^5 und R^6 stehen **ganz besonders bevorzugt** beide für Wasserstoff.

Die oben aufgeführten allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restdefinitionen bzw. Erläuterungen können jedoch auch untereinander, also zwischen den jeweiligen Bereichen und Vorzugsbereichen beliebig kombiniert werden. Sie gelten für die Endprodukte sowie für die Vor- und Zwischenprodukte entsprechend. Außerdem können einzelne Definitionen entfallen.


25 *Bevorzugt* sind solche Verbindungen der Formel **[I-a]**, in welcher alle Reste jeweils die oben genannten bevorzugten Bedeutungen haben.

Besonders bevorzugt sind solche Verbindungen der Formel **[I-a]**, in welcher alle Reste jeweils die oben genannten besonders bevorzugten Bedeutungen haben.

Ganz besonders bevorzugt sind solche Verbindungen der Formel [I-a], in welcher alle Reste jeweils die oben genannten ganz besonders bevorzugten Bedeutungen haben.

Insbesondere bevorzugt sind solche Verbindungen der Formel [I-a], in welcher alle Reste jeweils die oben genannten insbesondere bevorzugten Bedeutungen haben.

- 5 Außerdem wurden nun neue Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel [I-b] gefunden,



in welcher die Symbole folgende Bedeutungen haben:

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 10 | X ¹ | steht für C-H oder N, |
| 15 | R ¹ | steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R ⁷ substituiertes Phenyl, Naphthalenyl, Chinolin-5-yl, Chinolin-8-yl, Isochinolin-5-yl, Isochinolin-8-yl, 1-Benzothiophen-4-yl, 1-Benzothiophen-7-yl, 1-Benzofuran-4-yl, 1-Benzofuran-7-yl, 1,3-Benzodioxol-4-yl oder 1,3-Benzodioxol-5-yl, |
| 20 | R ² | steht für Cyano, Nitro, Halogen, C ₁ -C ₆ -Alkyl, C ₁ -C ₆ -Alkoxy, C ₁ -C ₆ -Halogenalkyl, C ₁ -C ₆ -Halogenalkoxy, C ₁ -C ₆ -Alkylthio, C ₃ -C ₆ -Cycloalkyl, C ₃ -C ₆ -Halogenocycloalkyl, C ₂ -C ₉ -Heterocyclyl oder Wasserstoff, |
| | R ³⁰¹ | steht für -C(O)N(R ⁹ R ¹⁰), -C(O)R ⁹ , -C(O)OR ⁹ , -S(O) ₂ R ⁹ oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R ⁸ substituiertes C ₁ -C ₆ -Alkyl, C ₂ -C ₆ -Alkenyl, C ₃ -C ₆ -Allenyl, C ₂ -C ₆ -Alkynyl, C ₃ -C ₈ -Cycloalkyl, C ₁ -C ₆ -Alkoxy, C ₂ -C ₉ -Heterocyclyl, C ₂ -C ₉ -OxoHeterocyclyl, oder Heteroaryl, (vorzugsweise C ₂ -C ₉ -Heteroaryl), |
| | R ⁴⁰¹ | steht für -NR ¹² R ¹³ , -C(O)NR ¹² R ¹³ oder für -N(R ¹²) ₂ |
| | R ⁵ und R ⁶ | stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, -OH, -SH,

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R ¹¹ substituiertes C ₁ -C ₆ -Alkyl, C ₃ -C ₆ -Cycloalkyl, C ₂ -C ₆ -Alkenyl, C ₂ -C ₆ -Alkynyl, C ₆ -C ₁₄ -Aryl, - |

O-(C₁-C₄-Alkyl), -O-(C₆-C₁₄-Aryl), -S-(C₁-C₄-Alkyl), -S(O)-(C₁-C₆-Alkyl) oder -C(O)-(C₁-C₆-Alkyl),

5 oder bilden außerdem gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Sauerstoff, Cyano oder C₁-C₄-Alkyl substituierten Cyclus (vorzugsweise gesättigten, ungesättigten oder partiell ungesättigten Monocyclus) mit 3, vorzugsweise 5 bis 8 Ringatomen, wobei der Cyclus 1 bis 4 Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel oder -N-R¹⁹ enthalten kann,

10 R⁷ steht unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, -OH, -SH,

oder für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, OH, Cyano, C₁-C₆-Alkyl oder -O-(C₁-C₄-Alkyl) substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, Tri(C₁-C₄-alkyl)silyl, C₆-C₁₄-Aryl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -O-(C₆-C₁₄-Aryl), -S-(C₁-C₄-Alkyl), -S(O)-(C₁-C₆-Alkyl), -S(O)₂-(C₁-C₆-Alkyl),

15 R⁸ steht für -OH, Halogen (vorzugsweise Fluor, Chlor oder Brom), -NO₂, Cyano, -NR⁹R¹⁰, -C(O)N(R⁹R¹⁰), -C(O)R⁹, -C(O)OR⁹, -O-C(O)R⁹, -(CH₂)_nC(O)R⁹, wobei n = eine ganze Zahl zwischen 1 und 6 ist,

20 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl, C₂-C₈-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl, C₂-C₉-Heteroaryl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -S-(C₁-C₄-Alkyl), -O-(C₃-C₈-Cycloalkyl), -S-(C₃-C₈-Cycloalkyl),

R⁹ und R¹⁰ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl, C₂-C₈-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl, C₂-C₉-Heteroaryl,

25 oder für Wasserstoff,

R¹¹ steht für -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, -NH-C(O)R²⁰, -NR²⁰R²¹, -C(O)R²⁰, -C(O)OR²⁰, -C(O)NR²⁰R²¹, -SO₂R²⁰

oder für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, OH, Carbonyl, Cyano, C₁-C₆-Alkyl oder -O-(C₁-C₄-Alkyl) substituiertes

C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₁-C₁₁-Heteroalkyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -S-(C₁-C₄-Alkyl), -O-(C₃-C₈-Cycloalkyl), -S-(C₃-C₈-Cycloalkyl), C₆-C₁₄-Aryl, -O-(C₆-C₁₄-Aryl), -S-(C₆-C₁₄-Aryl), C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl,

R¹² steht für -C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OR¹⁵ oder -C(O)NR¹⁵R¹⁶,

5 R¹³ steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, -O-C(O)-C₁-C₄-Alkyl, -O-P(O)(O-C₁-C₄-Alkyl)₂, -O-B(O-C₁-C₄-Alkyl)₂ oder -O-(C₁-C₄-Alkyl) substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₂-C₉-Heterocyclyl, C₂-C₉-Heteroaryl
oder für Wasserstoff,

10 R¹⁵ und R¹⁶ stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff oder -OH,
oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl

15 oder bilden (wenn R¹² für -C(O)NR¹⁵R¹⁶ steht) gemeinsam mit dem Stickstoffatom an das sie gebunden sind einen 3- bis 7-gliedrigen Ring, der ein weiteres dem Stickstoff nicht direkt benachbartes Heteroatom aus der Reihe N, O enthalten kann,

R¹⁹ steht für H, C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, -C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵,

20 R²⁰ und R²¹ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl oder Wasserstoff,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

25 Ausgenommen von den oben aufgeführten allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restdefinitionen bzw. Erläuterungen sind Kombinationen in denen die Symbole der Formel **[I-b]** die folgenden Bedeutungen haben:

a) Verbindungen in denen,

R³⁰¹ für gegebenenfalls substituiertes [1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl, 7,8-Dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin 6-yl, 6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl, 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl oder 6-Chlorpyridazin-3-yl steht und

R^5, R^6 für H stehen.

b) Verbindungen: 4-{1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}-N,N-dimethylpyridin-2-amin und 1-(4-{4-[1-Ethyl-3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-yl}phenyl)-N,N-dimethylmethanamin.

- 5 Schließlich wurde gefunden, dass die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel **[I-b]** sehr gute mikrobizide Eigenschaften besitzen und zum Materialschutz sowie zur Reduktion von Mykotoxinen in Pflanzen und Pflanzenteilen verwendbar sind.

Die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole sind durch die Formel **[I-b]** allgemein definiert. Bevorzugte Restdefinitionen der vorstehenden und nachfolgend genannten Formeln sind im Folgenden angegeben. Diese Definitionen gelten für die Endprodukte der Formel **[I-b]** wie für alle Zwischenprodukte gleichermaßen.

Bevorzugt werden Verbindungen der Formel **[I-b]**, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

X^1 steht für C-H oder N,

- 15 R^1 steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^7 substituiertes Phenyl, Naphthalenyl, Chinolin-5-yl, Chinolin-8-yl, Isochinolin-5-yl, Isochinolin-8-yl, 1,3-Benzodioxol-4-yl oder 1,3-Benzodioxol-5-yl,

R^2 steht für Cyano, Halogen, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Halogenalkyl, C_1 - C_6 -Halogenalkoxy, C_1 - C_6 -Alkylthio, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_3 - C_6 -Halogenycycloalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder Wasserstoff,

R^{301} steht für $-C(O)R^9$, $-C(O)OR^9$, $-S(O)_2R^9$
oder für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^8 substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_{3-6} -Allenyl, C_{2-6} -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -Oxoheterocyclyl, oder Heteroaryl,

- 25 R^{401} steht für $-NR^{12}R^{13}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$,

R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, -OH, -SH,

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, -O-(C_1 - C_4 -Alkyl), -S-(C_1 - C_4 -Alkyl) oder -S(O)-(C_1 - C_6 -Alkyl),

5 oder bilden außerdem gemeinsam mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Sauerstoff, Cyano oder C_1 - C_4 -Alkyl substituierten Cyclus (vorzugsweise einen gesättigten, ungesättigten oder partiell ungesättigten Monocyclus) mit 3, vorzugsweise 5 bis 8 Ringatomen, wobei der Cyclus 1 bis 4 Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel oder -NR¹⁹ enthalten kann,

10 R^7 steht für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, Isopropyl, -CF₃, -CHF₂, -C₂F₅, -CCl₃, -OMe, -OEt, -O-iPr, -OCF₃, -OCHF₂, -OC₂F₅, -SMe oder -SCF₃,

R^8 steht für -OH, Fluor, Chlor, Cyano, -NR⁹R¹⁰, -C(O)N(R⁹R¹⁰), -C(O)R⁹, -C(O)OR⁹, -O-C(O)R⁹, -(CH₂)_nC(O)R⁹, wobei n = eine ganze Zahl zwischen 1 und 6 ist, oder für jeweils
15 gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_8 -Alkenyl, C_2 - C_8 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_1 - C_6 -Halogenalkyl, C_6 - C_{14} -Aryl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -Heteroaryl, -O-(C_1 - C_4 -Alkyl), -S-(C_1 - C_4 -Alkyl), -O-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl), -S-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl),

R^9 und R^{10} stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich
20 oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_8 -Alkenyl, C_2 - C_8 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, oder C_2 - C_9 -Heteroaryl,

oder für Wasserstoff,

R^{11} steht für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, -NH-C(O)R²⁰, -C(O)R²⁰, -C(O)OR²⁰, -C(O)NR²⁰R²¹, -SO₂R²⁰

25 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl oder -O-(C_1 - C_4 -Alkyl) substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_1 - C_{11} -Heteroalkyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, -O-(C_1 - C_4 -Alkyl), -S-(C_1 - C_4 -Alkyl), -O-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl), -S-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl), C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl,

30 R^{12} steht für -C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OR¹⁵ oder -C(O)NR¹⁵R¹⁶,

- R^{13} steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -Heteroaryl oder für Wasserstoff,
- R^{15} und R^{16} stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff oder -OH
- 5 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_6 - C_{14} -Aryl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl
- oder bilden gemeinsam mit dem Stickstoffatom an das sie gebunden sind einen 3- bis 7-gliedrigen Ring, der ein weiteres dem Stickstoff nicht (direkt) benachbartes Heteroatom aus der Reihe N, O enthalten kann,
- 10 R^{19} steht für H, C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, $-C(S)R^{15}$, $-C(O)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$,
- R^{20} und R^{21} stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH oder Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl oder für Wasserstoff,
- 15

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

Besonders bevorzugt werden Verbindungen der Formel [I-b], in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

- X^1 steht für C-H oder N,
- 20 R^1 steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^7 substituiertes Phenyl oder Naphthalenyl,
- R^2 steht für Halogen, C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl oder Wasserstoff,
- R^{301} für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^8 substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Allenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -OxoHeterocyclyl, oder Heteroaryl,
- 25 R^{401} steht für $-NR^{12}R^{13}$,
- R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro,

oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, -O-(C_1 - C_4 -Alkyl), S-(C_1 - C_4 -Alkyl) oder -S(O)-(C_1 - C_6 -Alkyl),

5 oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Sauerstoff, Cyano oder C_1 - C_4 -Alkyl substituierten Cyclus mit 5 bis 8 Ringatomen, wobei der Cyclus 1 bis 4 weitere Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel oder -N- R^{19} enthalten kann,

R^7 steht für Fluor, Chlor, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, Isopropyl, -CF₃, -CHF₂, C₂F₅, CCl₃,

10 R^8 steht für -OH, Fluor, Chlor, Cyano, -C(O) R^9 , -C(O)OR⁹, -O-C(O) R^9 , -(CH₂)_nC(O) R^9 , wobei n = eine ganze Zahl zwischen 1 und 6 ist, oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_8 -Alkenyl, C_2 - C_8 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_1 - C_6 -Halogenalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -Heteroaryl, -O-(C_1 - C_4 -Alkyl), -S-(C_1 - C_4 -Alkyl), -O-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl), -S-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl),

15 R^9 und R^{10} stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_8 -Alkenyl, C_2 - C_8 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl

oder für Wasserstoff,

20 R^{11} steht für -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, -NH-C(O) R^{20} , -C(O) R^{20} , -C(O)OR²⁰, -C(O)NR²⁰ R^{21} , -SO₂ R^{20}

oder für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl oder -O-(C_1 - C_4 -Alkyl) substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, -O-(C_1 - C_4 -Alkyl), -S-(C_1 - C_4 -Alkyl), -O-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl), -S-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl),

25 R^{12} steht für -C(S) R^{15} , -C(O) R^{15} , -SO₂ R^{15} , -C(O)OR¹⁵ oder -C(O)NR¹⁵ R^{16} ,

R^{13} steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, oder Chlor substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -Heteroaryl

oder für Wasserstoff,

R^{15} und R^{16} stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_6 - C_{14} -Aryl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -Heteroaryl, oder für Wasserstoff

5 oder bilden gemeinsam mit dem Stickstoffatom an das sie gebunden sind einen 3- bis 7-gliedrigen Ring, der ein weiteres dem Stickstoff nicht (direkt) benachbartes Heteroatom aus der Reihe N,O enthalten kann,

R^{19} steht für H, C_2 - C_6 -Alkynyl, $-C(O)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$,

10 R^{20} und R^{21} stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, $-OH$, Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl oder für Wasserstoff,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

15 **Ganz besonders bevorzugt** werden Verbindungen der Formel [I-b], in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

X^1 steht für C-H oder N,

R^1 steht für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^7 substituiertes Phenyl,

R^2 steht für Methyl, Ethyl, Isopropyl, Cyclopropyl, oder Wasserstoff,

20 R^{301} steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^8 substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Allenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl oder C_1 - C_6 -Alkoxy,

R^{401} steht für $-NR^{12}R^{13}$,

R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor oder Cyano

25 oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen Cyclus, wobei sie gemeinsam für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes $-(CH=CH-CH=CH)-$, $-(CH=CH-N(R^{19})-)$, $-(CH=CH-CH=N)-$ oder $-(CH_2-C(O)-N(R^{19})-)$ stehen,

- R⁷ steht für Fluor, Chlor, Cyano oder Methyl,
- R⁸ steht für Fluor, Chlor, Cyano oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl, C₂-C₈-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, Heterocyclyl, Heteroaryl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -S-(C₁-C₄-Alkyl),
 5 -O-(C₃-C₈-Cycloalkyl), -S-(C₃-C₈-Cycloalkyl),
- R¹¹ steht für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, -NH-C(O)R²⁰, -C(O)R²⁰, -C(O)OR²⁰, -C(O)NR²⁰R²¹, -SO₂R²⁰
- oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, OH, Cyano, C₁-C₆-Alkyl oder O-(C₁-C₄-Alkyl) substituiertes C₁-C₆-Alkyl,
 10 C₃-C₈-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -S-(C₁-C₄-Alkyl), -O-(C₃-C₈-Cycloalkyl) oder S-(C₃-C₈-Cycloalkyl),
- R¹² steht für: -C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OR¹⁵ oder -C(O)NR¹⁵R¹⁶,
- R¹³ steht für C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl oder Wasserstoff,
- R¹⁵ steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch
 15 Halogen, -OH, Cyano oder C₁-C₄-Alkyl substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl, C₂-C₉-Heteroaryl,
- oder für Wasserstoff,
- R¹⁶ steht für Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Propyl,
- 20 R¹⁹ steht für H, C₂-C₆-Alkynyl, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵,
- R²⁰ und R²¹ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, iso-Propyl, Cyclopropyl, Cyclobutyl
- oder für Wasserstoff,
- 25 sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind insbesondere auch Verbindungen der Formel **[I-b]** bevorzugt, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

X¹ steht für N,

- R^1 steht für Phenyl, 3-Methylphenyl, 2-Fluorphenyl, 3-Fluorphenyl, 4-Fluorphenyl, 3-Trifluormethylphenyl, 4-Chlorphenyl, 2,5-Difluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl, 2,6-Difluorphenyl, 3-Methyl-4-fluorphenyl, 3-Cyan-4-fluorphenyl oder 2,4,6-Trifluorphenyl,
- R^2 steht für Methyl, Ethyl, Isopropyl, Cyclopropyl, oder Wasserstoff,
- 5 R^{301} steht für Methyl, Ethyl, 1-Propyl, Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, 2,2-Dimethylpropyl, 2-(Morpholin-4-yl)ethyl, 2-Cyanethyl, Cyanmethyl, 2-Cyan-2-methylpropyl, 3-Methylbut-2-en-1-yl, But-2-en-1-yl, But-3-en-2-yl, Propadienyl, Prop-2-en-1-yl, Prop-2-in-1-yl, But-2-in-1-yl, But-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, (2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, Trichlormethyl, 10 Trifluormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, 2-Chlorethyl, 2-Bromethyl, 2-Fluorpropyl, 3-Fluorpropyl, 2-Chlorpropyl, 3-Chlorpropyl, 1,3-Difluorpropan-2-yl, 1,1,1-Trifluorpropan-2-yl, 1,1,1-Trifluor-2-methylpropan-2-yl, 3,3,3-Trifluor-2-hydroxypropyl, 2-Fluorbenzyl, 3-Fluorbenzyl, 4-Fluorbenzyl, 2,3-Difluorbenzyl, 15 2-Chlor-6-fluorbenzyl, 1-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-(3-Chlorphenyl)ethyl, 1-(4-Chlorphenyl)ethyl, 3-Cyanobenzyl, 4-Cyanobenzyl, 4-(Difluormethoxy)benzyl, 2-Cyanobenzyl, 2-(3-Chlorphenyl)ethyl, 2-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-Naphthylmethyl, (Pyridin-3-yl)methyl, 2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl, Methoxymethyl, 2-Methoxyethyl, 2-Methoxypropyl, 2-(Methylsulfanyl)ethyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, 1-Methoxypropan-2-yl, 20 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl, 1,3-Dimethoxypropan-2-yl, 2-(Cyclopropyloxy)ethyl, Tetrahydrofuran-2-ylmethyl, (3-Methyloxetan-3-yl)methyl, 1H-Imidazol-2-ylmethyl, Tetrahydrofuran-3-yl, 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl, 2-tert-Butoxy-2-oxoethyl, 1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl, 1-Methoxy-1-oxopropan-2-yl oder 3-Ethoxy-3-oxopropyl, 1-Cyanpropan-2-yl, 1-Propyl, Propan-2-yloxy, 2-Ethoxyethyl,
- 25 R^{401} steht für $-NHR^{12}$,
- R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor oder Cyano
- oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen Cyclus, wobei sie gemeinsam für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes $-(CH=CH-CH=CH)-$, $-(CH=CH-N(R^{19})-)$, $-(CH=CH-CH=N)-$ oder $-(CH_2-C(O)-N(R^{19})-)$ stehen,
- 30 R^{11} steht für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: $-OH$, Fluor, Chlor, Cyano, Methyl, Ethyl, Cyclopropyl,

R¹² steht für -C(S)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵ oder -C(O)R¹⁵,

R¹⁵ steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, -OH, Cyano oder C₁-C₄-Alkyl substituiertes Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, sec-Butyl, Isobutyl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, 2-Methoxyethyl, (2-Methoxyethoxy)methyl, Cyclopentenyl, Cyclohexenyl, Oxetanyl, Tetrahydrofuran-2-yl, Ethinyl, Prop-1-in-1-yl, Prop-1-en-1-yl, Aminomethyl, Aminoethyl, Aminopropyl, Aminobutyl, Aminoisopropyl, Aminocyclopropyl, Aminocyclobutyl, Aminocyclopentyl, Dimethylamino, Ethyl(methyl)amino, Pyrrolidinyl, Diethylamino, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl, Ethoxycarbonyl, Benzyl, Phenyl, 2-Thienyl, 3-Thienyl

10 oder für Wasserstoff,

R¹⁹ steht für H, Acetyl, Ethoxycarbonyl, Methoxycarbonyl, Prop-2-in-1-yl, But-2-in-1-yl,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind insbesondere Verbindungen der Formel **[I-b]** bevorzugt, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

15 X¹ steht für C-H,

R¹ steht für 4-Fluorphenyl, 3-Chlorphenyl, 2,6-Difluorphenyl, 3-Methylphenyl

R² steht für Cyclopropyl, Methyl, H, Difluormethoxy,

20 R⁴⁰¹ steht für Acetylamino, n-Propionylamino, Isobutyrylamino, (Cyclopropylcarbonyl)amino, (Methoxyacetyl)amino, 2-Methoxypropanoyl, (2-Methylbutanoyl)amino, But-2-enoylamino, Prop-2-inoylamino, 3-(Dimethylamino)prop-2-enoylamino, 3,3,3-Trifluorpropanoylamino, 3,3-Difluorpropanoylamino, (Cyclopropylacetyl)amino, Lactoylamino, (Cyclobutylcarbonyl)amino, (Cyclopentylacetyl)amino, 2-Methylcyclopropylcarbonylamino, (3-Methylbutanoyl)amino, (Phenylacetyl)amino, Benzoylamino, (3-Thienylcarbonyl)amino, (2-Thienylcarbonyl)amino (2-Hydroxy-2-methylpropanoyl)amino, [(2-Methoxyethoxy)acetyl]amino, 2,3-Dihydroxypropanoylamino,

25

wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben,

sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

Weiterhin insbesondere bevorzugt werden Verbindungen der Formel **[I-b]**, in denen ein oder mehrere der Symbole eine der folgenden Bedeutungen haben:

- X¹ steht für C-H,
- R¹ steht für 4-Fluorphenyl, 3-Chlorphenyl, 2,6-Difluorphenyl, 3-Methylphenyl,
- R² steht für Cyclopropyl, Methyl, H, Difluormethoxy,
- R³⁰¹ steht für Methyl, Ethyl, 1-Propyl, Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, 2,2-Dimethylpropyl, 2-(Morpholin-4-yl)ethyl, 2-Cyanethyl, Cyanmethyl, 2-Cyan-2-methylpropyl, 3-Methylbut-2-en-1-yl, But-2-en-1-yl, But-3-en-2-yl, Propadienyl, Prop-2-en-1-yl, Prop-2-in-1-yl, But-2-in-1-yl, But-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, (2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, Trichlormethyl, Trifluormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, 2-Chlorethyl, 2-Bromethyl, 2-Fluorpropyl, 3-Fluorpropyl, 2-Chlorpropyl, 3-Chlorpropyl, 1,3-Difluorpropan-2-yl, 1,1,1-Trifluorpropan-2-yl, 1,1,1-Trifluor-2-methylpropan-2-yl, 3,3,3-Trifluor-2-hydroxypropyl, 2-Fluorbenzyl, 3-Fluorbenzyl, 4-Fluorbenzyl, 2,3-Difluorbenzyl, 2-Chlor-6-fluorbenzyl, 1-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-(3-Chlorphenyl)ethyl, 1-(4-Chlorphenyl)ethyl, 3-Cyanobenzyl, 4-Cyanobenzyl, 4-(Difluormethoxy)benzyl, 2-Cyanobenzyl, 2-(3-Chlorphenyl)ethyl, 2-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-Naphthylmethyl, (Pyridin-3-yl)methyl, 2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl, Methoxymethyl, 2-Methoxyethyl, 2-Methoxypropyl, 2-(Methylsulfanyl)ethyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, 1-Methoxypropan-2-yl, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl, 1,3-Dimethoxypropan-2-yl, 2-(Cyclopropyloxy)ethyl, Tetrahydrofuran-2-ylmethyl, (3-Methyloxetan-3-yl)methyl, 1H-Imidazol-2-ylmethyl, Tetrahydrofuran-3-yl, 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl, 2-tert-Butoxy-2-oxoethyl, 1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl, 1-Methoxy-1-oxopropan-2-yl, 3-Ethoxy-3-oxopropyl, 1-Cyanpropan-2-yl, Propan-2-yloxy, 2-Ethoxyethyl, 3-methoxypropyl, 2-(trifluormethoxy)ethyl, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl,
- R⁴⁰¹ steht für -NHR¹²,

wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben,

sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

Weiterhin insbesondere bevorzugt werden Verbindungen der Formel **[I-b]**, in denen

X¹ für C-H steht,

wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben,

sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

Weiterhin insbesondere bevorzugt werden Verbindungen der Formel **[I-b]**, in denen

R^1 die gleiche Bedeutung hat wie die allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restdefinition von R^1 bei den Verbindungen der Formel **[I-a]**,

- 5 wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben, sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

Weiterhin insbesondere bevorzugt werden Verbindungen der Formel **[I-b]**, in denen

R^2 die gleiche Bedeutung hat wie die allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restdefinition von R^2 bei den Verbindungen der Formel **[I-a]**,

- 10 wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben, sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

Weiterhin insbesondere bevorzugt werden Verbindungen der Formel **[I-b]**, in denen

- R^{301} für Methyl, Ethyl, 1-Propyl, Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, Prop-2-in-1-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, (2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl, 2-Cyanethyl, 15 2-Chlorethyl, Cyclopropylmethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2-Fluorbenzyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, 1-Methoxypropan-2-yl, 1-Cyclopropylethyl, 1-Cyanpropan-2-yl, Propan-2-yloxy, 2-Ethoxyethyl, 3-methoxypropyl, 2-(trifluormethoxy)ethyl, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl steht,

wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben,

- 20 sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

Weiterhin insbesondere bevorzugt werden Verbindungen der Formel **[I-b]**, in denen

R^{401} für -NH-COR¹⁵ steht,

wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben,

sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

- 25 Weiterhin insbesondere bevorzugt werden Verbindungen der Formel **[I-b]**, in denen

R^{15} für C₁-C₆-Alkyl oder C₃-C₆-Cycloalkyl steht,

wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben, sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

Weiterhin insbesondere bevorzugt werden Verbindungen der Formel **[I-b]**, in denen

- 5 R^1 die gleiche Bedeutung hat wie die allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restedefinitionen von R^1 bei den Verbindungen der Formel **[I-a]**,
- R^2 die gleiche Bedeutung hat wie die allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restedefinitionen von R^2 bei den Verbindungen der Formel **[I-a]**,
- R^5 und R^6 die gleiche Bedeutung haben wie die allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restedefinitionen von R^5 und R^6 bei den Verbindungen der Formel **[I-a]**,
- 10 R^7 die gleiche Bedeutung hat wie die allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restedefinitionen von R^7 bei den Verbindungen der Formel **[I-a]**,
- R^{19} die gleiche Bedeutung hat wie die allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restedefinitionen von R^{19} bei den Verbindungen der Formel **[I-a]**,
- 15 R^{20} und R^{21} die gleiche Bedeutung haben wie die allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restedefinitionen von R^{20} und R^{21} bei den Verbindungen der Formel **[I-a]**,

wobei die übrigen Substituenten eine oder mehrere der oben genannten Bedeutungen haben, sowie die agrochemisch wirksamen Salzen davon.

Die zuvor genannten Reste-Definitionen können untereinander in beliebiger Weise kombiniert werden. Außerdem können einzelne Definitionen entfallen.

- 20 Die oben aufgeführten allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgeführten Restedefinitionen bzw. Erläuterungen können jedoch auch untereinander, also zwischen den jeweiligen Bereichen und Vorzugsbereichen beliebig kombiniert werden. Sie gelten für die Endprodukte sowie für die Vor- und Zwischenprodukte entsprechend. Außerdem können einzelne Definitionen entfallen.

- 25 *Bevorzugt* sind solche Verbindungen der Formel **[I-b]**, in welcher alle Reste jeweils die oben genannten bevorzugten Bedeutungen haben.

Besonders bevorzugt sind solche Verbindungen der Formel **[I-b]**, in welcher alle Reste jeweils die oben genannten besonders bevorzugten Bedeutungen haben.

Ganz besonders bevorzugt sind solche Verbindungen der Formel **[I-b]**, in welcher alle Reste jeweils die oben genannten ganz besonders bevorzugten Bedeutungen haben.

Insbesondere bevorzugt sind solche Verbindungen der Formel **[I-b]**, in welcher alle Reste jeweils die oben genannten insbesondere bevorzugten Bedeutungen haben.

- 5 Die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formeln **[I-a]** und **[I-b]** können gegebenenfalls als Mischungen verschiedener möglicher isomerer Formen, insbesondere von Stereoisomeren, wie z. B. E- und Z-, threo- und erythro-, sowie optischen Isomeren, gegebenenfalls aber auch von Tautomeren vorliegen. Es werden sowohl die E- als auch die Z-Isomeren, wie auch die threo- und erythro-, sowie die optischen Isomeren, beliebige Mischungen dieser Isomeren, sowie die möglichen tautomeren Formen beansprucht.
- 10 Gegebenenfalls substituierte Gruppen können einfach oder mehrfach substituiert sein, wobei bei Mehrfachsubstitutionen die Substituenten gleich oder verschieden sein können.

- Je nach Art der oben definierten Substituenten weisen die Verbindungen der Formel **(I)** saure oder basische Eigenschaften auf und können mit anorganischen oder organischen Säuren oder mit Basen oder mit Metallionen Salze, gegebenenfalls auch innere Salze oder Addukte bilden. Tragen die Verbindungen der
- 15 Formel **(I)** Amino, Alkylamino oder andere, basische Eigenschaften induzierende Gruppen, so können diese Verbindungen mit Säuren zu Salzen umgesetzt werden oder fallen durch die Synthese direkt als Salze an. Tragen die Verbindungen der Formel **(I)** Hydroxy, Carboxy oder andere, saure Eigenschaften induzierende Gruppen, so können diese Verbindungen mit Basen zu Salzen umgesetzt werden. Geeignete Basen sind beispielsweise Hydroxide, Carbonate, Hydrogencarbonate der Alkali- und Erdalkalimetalle, insbesondere
- 20 die von Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium, weiterhin Ammoniak, primäre, sekundäre und tertiäre Amine mit C₁-C₄-Alkyl-Gruppen, Mono-, Di- und Trialkanolamine von C₁-C₄-Alkanolen, Cholin sowie Chlorcholin.

- Beispiele für anorganische Säuren sind Halogenwasserstoffsäuren wie Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Bromwasserstoff und Iodwasserstoff, Schwefelsäure, Phosphorsäure und Salpetersäure und saure Salze wie
- 25 NaHSO₄ und KHSO₄. Als organische Säuren kommen beispielsweise Ameisensäure, Kohlensäure und Alkansäuren wie Essigsäure, Trifluoressigsäure, Trichloressigsäure und Propionsäure sowie Glycolsäure, Thiocycansäure, Milchsäure, Bernsteinsäure, Zitronensäure, Benzoesäure, Zimtsäure, Oxal-säure, gesättigte oder einfach oder doppelt ungesättigte C₆-C₂₀-Fettsäuren, gesättigte oder einfach oder doppelt ungesättigte C₆-C₂₀-Alkylendicarbonsäuren, Alkylschwefelsäuremonoester, Alkylsulfonsäuren (Sulfonsäuren mit
- 30 geradkettigen oder verzweigten Alkylresten mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen), Arylsulfonsäuren oder Aryldisulfonsäuren (aromatische Reste wie Phenyl und Naphthyl welche ein oder zwei Sulfonsäuregruppen tragen), Alkylphosphon-säuren (Phosphonsäuren mit geradkettigen oder verzweigten Alkylresten mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen), Arylphosphonsäuren oder Aryldiphosphonsäuren (aromatische Reste wie Phenyl

und Naphthyl welche ein oder zwei Phosphonsäurereste tragen), wobei die Alkyl- bzw. Arylreste weitere Substituenten tragen können, z.B. p-Toluolsulfonsäure, Salicylsäure, p-Aminosalicylsäure, 2-Phenoxybenzoesäure, 2-Acetoxybenzoesäure etc..

Als Metallionen kommen insbesondere die Ionen der Elemente der zweiten Hauptgruppe, insbesondere Calcium und Magnesium, der dritten und vierten Hauptgruppe, insbesondere Aluminium, Zinn und Blei, sowie der ersten bis achten Nebengruppe, insbesondere Chrom, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink und andere in Betracht. Besonders bevorzugt sind die Metallionen der Elemente der vierten Periode. Die Metalle können dabei in den verschiedenen ihnen zukommenden Wertigkeiten vorliegen.

Die so erhältlichen Salze weisen ebenfalls fungizide und mykotoxinreduzierende Eigenschaften auf.

10 Bei den in den vorstehenden Formeln angegebenen Definitionen der Symbole wurden Sammelbegriffe verwendet, die allgemein repräsentativ für die folgenden Substituenten stehen:

Alkyl: gesättigte, geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, z.B. (aber nicht beschränkt auf) C₁-C₆-Alkyl wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methyl-propyl, 2-Methylpropyl, 1,1-Dimethylethyl, Pentyl, 1-Methylbutyl, 2-Methylbutyl, 3-Methylbutyl, 2,2-Dimethylpropyl, 1-Ethylpropyl, Hexyl, 1,1-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethylpropyl, 1-Methylpentyl, 2-Methylpentyl, 3-Methylpentyl, 4-Methylpentyl, 1,1-Dimethylbutyl, 1,2-Dimethylbutyl, 1,3-Dimethylbutyl, 2,2-Dimethylbutyl, 2,3-Dimethylbutyl, 3,3-Dimethylbutyl, 1-Ethylbutyl, 2-Ethylbutyl, 1,1,2-Trimethylpropyl, 1,2,2-Trimethylpropyl, 1-Ethyl-1-methylpropyl und 1-Ethyl-2-methylpropyl. Vorzugsweise steht Alkyl für gesättigte, geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 6 und bevorzugt 1 bis 4 Kohlenstoffatomen.

Halogenalkyl: geradkettige oder verzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 8 (bevorzugt 1 bis 6 und noch bevorzugter 1 bis 4) Kohlenstoffatomen (wie vorstehend genannt), wobei in diesen Gruppen teilweise oder vollständig die Wasserstoffatome durch

Halogenatome wie vorstehend genannt ersetzt sein können, z.B. (aber nicht beschränkt auf) C₁-C₃-Halogenalkyl wie Chlormethyl, Brommethyl, Dichlormethyl, Trichlormethyl, Fluormethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Chlorfluormethyl, Dichlorfluormethyl, Chlordifluormethyl, 1-Chlorethyl, 1-Bromethyl, 1-Fluorethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2-Chlor-2-fluorethyl, 2-Chlor-2-difluorethyl, 2,2-Dichlor-2-fluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, Pentafluorethyl und 1,1,1-Trifluorprop-2-yl;

Cycloalkyl: monocyclische, gesättigte Kohlenwasserstoffgruppen mit 3 bis 8 (bevorzugt 3 bis 6) Kohlenstoffringgliedern, z.B. (aber nicht beschränkt auf) Cyclopropyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl;

Halogencycloalkyl: monocyclische, gesättigte Kohlenwasserstoffgruppen mit 3 bis 8 (bevorzugt 3 bis 6) Kohlenstoffringgliedern (wie vorstehend genannt), wobei in diesen Gruppen teilweise oder vollständig die Wasserstoffatome durch Halogenatome wie vorstehend genannt ersetzt sein können, z.B. (aber nicht beschränkt auf) 2-Fluorocyclopropyl, 2,2-Difluorocyclopropyl, 3,3-Difluorocyclobutyl, 2-Fluorocyclopentyl, 3-Fluorocyclopentyl;

Heterocyclyl: drei- bis fünfzehngliedriger vorzugsweise drei- bis neungliedriger gesättigter oder partiell ungesättigter Heterocyclus, enthaltend ein bis vier Heteroatome aus der Gruppe Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel: mono-, bi- oder tricyclische Heterocyclen enthaltend neben Kohlenstoffringgliedern ein bis drei Stickstoffatome und/oder ein Sauerstoff- oder Schwefelatom oder ein oder zwei Sauerstoff- und/oder Schwefelatom; enthält der Ring mehrere Sauerstoffatome, so stehen diese nicht direkt benachbart; wie z.B. (aber nicht beschränkt auf) Oxiranyl, Aziridiny, 2-Tetrahydrofuranyl, 3-Tetrahydrofuranyl, 2-Tetrahydrothienyl, 3-Tetrahydrothienyl, 2-Pyrrolidiny, 3-Pyrrolidiny, 3-Isioxazolidiny, 4-Isioxazolidiny, 5-Isioxazolidiny, 3-Isiothiazolidiny, 4-Isiothiazolidiny, 5-Isiothiazolidiny, 3-Pyrazolidiny, 4-Pyrazolidiny, 5-Pyrazolidiny, 2-Oxazolidiny, 4-Oxazolidiny, 5-Oxazolidiny, 2-Thiazolidiny, 4-thiazolidiny, 5-Thiazolidiny, 2-Imidazolidiny, 4-Imidazolidiny, 1,2,4-Oxadiazolidin-3-yl, 1,2,4-Oxadiazolidin-5-yl, 1,2,4-Thiadiazolidin-3-yl, 1,2,4-Thiadiazolidin-5-yl, 1,2,4-Triazolidin-3-yl, 1,3,4-Oxadiazolidin-2-yl, 1,3,4-Thiadiazolidin-2-yl, 1,3,4-Triazolidin-2-yl, 2,3-Dihydrofur-2-yl, 2,3-Dihydrofur-3-yl, 2,4-Dihydrofur-2-yl, 2,4-Dihydrofur-3-yl, 2,3-Dihydrothien-2-yl, 2,3-Dihydrothien-3-yl, 2,4-Dihydrothien-2-yl, 2,4-Dihydrothien-3-yl, 2-Pyrrolin-2-yl, 2-Pyrrolin-3-yl, 3-Pyrrolin-2-yl, 3-Pyrrolin-3-yl, 2-Isioxazolin-3-yl, 3-Isioxazolin-3-yl, 4-Isioxazolin-3-yl, 2-Isioxazolin-4-yl, 3-Isioxazolin-4-yl, 4-Isioxazolin-4-yl, 2-Isioxazolin-5-yl, 3-Isioxazolin-5-yl, 4-Isioxazolin-5-yl, 2-Isiothiazolin-3-yl, 3-Isiothiazolin-3-yl, 4-Isiothiazolin-3-yl, 2-Isiothiazolin-4-yl, 3-Isiothiazolin-4-yl, 4-Isiothiazolin-4-yl, 2-Isiothiazolin-5-yl, 3-Isiothiazolin-5-yl, 4-Isiothiazolin-5-yl, 2,3-Dihydropyrazol-1-yl, 2,3-Dihydropyrazol-2-yl, 2,3-Dihydropyrazol-3-yl, 2,3-Dihydropyrazol-4-yl, 2,3-Dihydropyrazol-5-yl, 3,4-Dihydropyrazol-1-yl, 3,4-Dihydropyrazol-3-yl, 3,4-Dihydropyrazol-4-yl, 3,4-Dihydropyrazol-5-yl, 4,5-Dihydropyrazol-1-yl, 4,5-Dihydropyrazol-3-yl, 4,5-Dihydropyrazol-4-yl, 4,5-Dihydropyrazol-5-yl, 2,3-Dihydrooxazol-2-yl, 2,3-Dihydrooxazol-3-yl, 2,3-Dihydrooxazol-4-yl, 2,3-Dihydrooxazol-5-yl, 3,4-Dihydrooxazol-2-yl, 3,4-Dihydrooxazol-3-yl, 3,4-Dihydrooxazol-4-yl, 3,4-Dihydrooxazol-5-yl, 3,4-Dihydrooxazol-2-yl, 3,4-Dihydrooxazol-3-yl, 3,4-Dihydrooxazol-4-yl, 2-Piperidiny, 3-Piperidiny, 4-Piperidiny, 1,3-Dioxan-5-yl, 2-Tetrahydropyranyl, 4-Tetrahydropyranyl, 2-Tetrahydrothienyl, 3-Hexahydro-pyridaziny, 4-Hexahydropyridaziny, 2-Hexahydropyrimidiny, 4-Hexahydropyrimidiny, 5-Hexahydropyrimidiny, 2-Piperaziny, 1,3,5-Hexahydro-triazin-2-yl und 1,2,4-Hexahydrotriazin-3-yl;

OxoHeterocyclyl: drei- bis fünfzehngliedriger vorzugsweise drei- bis neungliedriger gesättigter oder partiell ungesättigter Heterocyclus, (wie vorstehend genannt), wobei in diesen Gruppen die Wasserstoffatome einer oder mehrerer CH₂ Gruppen durch eine oder mehrere Carbonylgruppen ersetzt sein können, z.B. (aber nicht

beschränkt auf) 2-Oxooxetan-3-yl, 5-Oxotetrahydrofuran-3-yl, 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl, 2,5-Dioxotetrahydrofuran-3-yl, 5-Oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl, 2-Oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl, 5-Oxopyrrolidin-3-yl, 2-Oxopyrrolidin-3-yl, 5-Oxopyrrolidin-2-yl), 3-Oxopyrrolidin-2-yl und 4-Oxo-3,4-dihydro-2H-pyran-5-yl;

- 5 Alkenyl: ungesättigte, geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffreste mit 2 bis 8 (vorzugsweise 2 bis 6) Kohlenstoffatomen und einer Doppelbindung in einer beliebigen Position, z.B. (aber nicht beschränkt auf) C₂-C₆-Alkenyl wie Ethenyl, 1-Propenyl, 2-Propenyl, 1-Methylethenyl, 1-Butenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-1-propenyl, 2-Methyl-1-propenyl, 1-Methyl-2-propenyl, 2-Methyl-2-propenyl, 1-Pentenyl, 2-Pentenyl, 3-Pentenyl, 4-Pentenyl, 1-Methyl-1-butenyl, 2-Methyl-1-butenyl, 3-Methyl-1-butenyl, 10 1-Methyl-2-butenyl, 2-Methyl-2-butenyl, 3-Methyl-2-butenyl, 1-Methyl-3-butenyl, 2-Methyl-3-butenyl, 3-Methyl-3-butenyl, 1,1-Dimethyl-2-propenyl, 1,2-Dimethyl-1-propenyl, 1,2-Dimethyl-2-propenyl, 1-Ethyl-1-propenyl, 1-Ethyl-2-propenyl, 1-Hexenyl, 2-Hexenyl, 3-Hexenyl, 4-Hexenyl, 5-Hexenyl, 1-Methyl-1-pentenyl, 2-Methyl-1-pentenyl, 3-Methyl-1-pentenyl, 4-Methyl-1-pentenyl, 1-Methyl-2-pentenyl, 2-Methyl-2-pentenyl, 3-Methyl-2-pentenyl, 4-Methyl-2-pentenyl, 1-Methyl-3-pentenyl, 2-Methyl-3-pentenyl, 3-Methyl-3-pentenyl, 4-Methyl-3-pentenyl, 1-Methyl-4-pentenyl, 2-Methyl-4-pentenyl, 3-Methyl-4-pentenyl, 15 4-Methyl-4-pentenyl, 1,1-Dimethyl-2-butenyl, 1,1-Dimethyl-3-butenyl, 1,2-Dimethyl-1-butenyl, 1,2-Dimethyl-2-butenyl, 1,2-Dimethyl-3-butenyl, 1,3-Dimethyl-1-butenyl, 1,3-Dimethyl-2-butenyl, 1,3-Dimethyl-3-butenyl, 2,2-Dimethyl-3-butenyl, 2,3-Dimethyl-1-butenyl, 2,3-Dimethyl-2-butenyl, 2,3-Dimethyl-3-butenyl, 3,3-Dimethyl-1-butenyl, 3,3-Dimethyl-2-butenyl, 1-Ethyl-1-butenyl, 1-Ethyl-2-butenyl, 20 1-Ethyl-3-butenyl, 2-Ethyl-1-butenyl, 2-Ethyl-2-butenyl, 2-Ethyl-3-butenyl, 1,1,2-Trimethyl-2-propenyl, 1-Ethyl-1-methyl-2-propenyl, 1-Ethyl-2-methyl-1-propenyl und 1-Ethyl-2-methyl-2-propenyl;

- Alkynyl: geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffgruppen mit 2 bis 8 (vorzugsweise 2 bis 6) Kohlenstoffatomen und einer Dreifachbindung in einer beliebigen Position, z.B. (aber nicht beschränkt auf) C₂-C₆-Alkynyl wie Ethinyl, 1-Propinyl, 2-Propinyl, 1-Butinyl, 2-Butinyl, 3-Butinyl, 1-Methyl-2-propinyl, 1-Pentinyl, 2-Pentinyl, 3-Pentinyl, 4-Pentinyl, 1-Methyl-2-butinyl, 1-Methyl-3-butinyl, 2-Methyl-3-butinyl, 3-Methyl-1-butinyl, 1,1-Dimethyl-2-propinyl, 1-Ethyl-2-propinyl, 1-Hexinyl, 2-Hexinyl, 3-Hexinyl, 4-Hexinyl, 5-Hexinyl, 1-Methyl-2-pentinyl, 1-Methyl-3-pentinyl, 1-Methyl-4-pentinyl, 2-Methyl-3-pentinyl, 2-Methyl-4-pentinyl, 3-Methyl-1-pentinyl, 3-Methyl-4-pentinyl, 4-Methyl-1-pentinyl, 4-Methyl-2-pentinyl, 1,1-Dimethyl-2-butinyl, 1,1-Dimethyl-3-butinyl, 1,2-Dimethyl-3-butinyl, 2,2-Dimethyl-3-butinyl, 3,3-Dimethyl-1-butinyl, 1-Ethyl-2-butinyl, 1-Ethyl-3-butinyl, 2-Ethyl-3-butinyl und 1-Ethyl-1-methyl-2-propinyl;

Aryl: 6- bis 14-gliedriges, vollständig ungesättigtes carbocyclisches Ringsystem, z.B. (aber nicht beschränkt auf) Phenyl, 1-Naphthyl, 2-Naphthyl, 2-Anthryl, 1-Anthryl;

Heteroaryl: 5 oder 6-gliedriges, vollständig ungesättigtes monocyclisches Ringsystem, enthaltend ein bis vier Heteroatome aus der Gruppe Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel, enthält der Ring mehrere Sauerstoffatome, so stehen diese nicht direkt benachbart;

5 Alkoxy: einen geradkettigen oder verzweigten Alkoxyrest, bevorzugt C₁-C₆ Alkoxyrest und besonders bevorzugt einen C₁-C₃ Alkoxyrest, wie z.B. (aber nicht beschränkt auf) Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, 1-Methylethoxy, n-Butoxy, 1-Methylpropoxy, 2-Methylpropoxy oder 1,1-Dimethylethoxy, insbesondere Methoxy oder Ethoxy;

10 Alkylthio: steht für geradkettiges oder verzweigtes Alkylthio z.B. (aber nicht beschränkt auf) Methylthio, Ethylthio, n- und i-Propylthio, n-, i-, sek.- und tert.-Butylthio, n-Pentylthio und seine Isomeren wie 1-, 2- und 3-Methyl-butylthio. Die Alkylthiogruppen können durch 1 bis 3 Halogenatome (vorzugsweise Chlor und/oder Fluor) substituiert sein, z.B. (aber nicht beschränkt auf) Di- und Trifluormethylthio sowie Difluorchlormethylthio.

15 Halogenalkoxy: steht für einen geradkettigen oder verzweigten Alkoxyrest in dem ein oder mehrere Wasserstoffatome durch Fluor, Chlor oder Brom ersetzt wurden, z.B. (aber nicht beschränkt auf) -OCF₃, -OCHF₂. Bevorzugt wird eine ein bis dreifach Substitution durch Fluor oder Chlor.

Acyloxy: steht für einen über das Sauerstoffatom verbundenen geradkettigen, verzweigten, cyclischen, gesättigten oder ungesättigten Acyloxy rest, z.B. (aber nicht beschränkt auf) Acetyloxy, Propionyloxy, Isobutyryloxy.

20 Heteroalkyl: gesättigte oder ungesättigte, geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffreste mit 2 bis 10 (vorzugsweise 2 bis 8) Kohlenstoffatomen und mindestens einem Heteroatom, wobei nicht zwei Heteroatome direkt benachbart sein dürfen.

Nicht umfasst sind solche Kombinationen, die den Naturgesetzen widersprechen und die der Fachmann daher aufgrund seines Fachwissens ausgeschlossen hätte. Beispielsweise sind Ringstrukturen mit drei oder mehreren benachbarten O-Atomen ausgeschlossen.


25 Erläuterung der Verfahren und Zwischenprodukte

Die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole der Formeln **[I-a]** und **[I-b]** lassen sich auf unterschiedliche Weise herstellen. Zum Zwecke der Verfahrensbeschreibung werden die Verbindungen der Formeln **[I-a]** und **[I-b]** unter der Formel **[I]** zusammengefasst, weil die erfindungsgemäßen Verfahren auf beide Formeln angewendet werden können. Im Folgenden sind die möglichen Verfahren zunächst schematisch dargestellt. Wenn nicht anders angegeben, haben die angegebenen Reste die oben angegebenen Bedeutungen.

30

Die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel [II] lassen sich nach Verfahren A gemäß folgendem Schema herstellen.

Schema 1



$\text{Met}^1 = \text{z.B. } -\text{Sn}(\text{Bu})_3, -\text{B}(\text{OR}^*)_2$

$\text{Met}^3 = \text{z.B. } -\text{Sn}(\text{Bu})_3, 4,4,5,5\text{-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl}$

$\text{B}(\text{OR}^*)_2 = \text{z.B. } -\text{B}(\text{OiPr})_2, -\text{B}(\text{OH})_2$

$\text{Z}^1 = \text{z.B. } \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}, -\text{OTos}, -\text{OMs}, -\text{OH}$

5 $\text{Z}^2 = \text{z.B. } \text{Cl}, \text{Br}$

$\text{Z}^3 = \text{z.B. } \text{Cl}, -\text{OH}$

$\text{Z}^4 = \text{z.B. } \text{I}, \text{Cl}, \text{Br}, -\text{OMs}, -\text{OTos}$

$\text{A}^7 = \text{R}^{15}, -\text{OR}^{15}$


$\text{R}^{4a/401a} = \text{z.B. } -\text{NH-C}(\text{S})\text{R}^{15}, -\text{NH-C}(\text{O})\text{R}^{15}, -\text{NH-C}(\text{O})\text{OR}^{15}, -\text{NH-C}(\text{O})\text{NR}^{15}\text{R}^{16},$

10 $\text{R}^{4b/401b} = \text{z.B. } \text{Wasserstoff}, \text{Alkyl}, \text{Cycloalkyl}, \text{Aryl}, -\text{NH-C}(\text{O})\text{-Alkyl} \text{ oder } -\text{NH-C}(\text{O})\text{O-Alkyl}$

$\text{PG} = \text{z.B. } \text{Tetrahydro-2H-pyran-2-yl}, 2\text{-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}$


Außerdem lassen sich die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel **[I-d]** auch durch Verfahren B herstellen (Schema 2)

Schema 2




Alternativ lassen sich die erfindungsgemäßen Arylpyrazole der Formel **[I-e]** und Intermediate der Formel **[IX-b]** auch durch Verfahren C herstellen (Schema 3).

5 Schema 3



Alternativ lassen sich die Intermediate der Formel [VI-a] auch durch Verfahren D herstellen (Schema 4).


Schema 4



5

Alternativ lassen sich die Intermediate der Formel [VI-b] sowie Intermediate der Formel [VI-c] auch durch Verfahren E herstellen (Schema 5).

Schema 5





$\text{R}^{3b/301b} = \text{Alkyl, Cycloalkyl}$

[VI-b] $\text{R}^1 = (4\text{-Fluorphenyl}, 4\text{-Fluor-2-methoxyphenyl})$

[VI-c] $\text{R}^1 = (4\text{-Fluor-2-hydroxyphenyl})$

Alternativ lassen sich die Intermediate der Formel [III] auch durch Verfahren F herstellen (Schema 6).



Schema 6



5


Intermediate des Typs [XV-a] lassen sich durch Verfahren G herstellen (Schema 7).

Schema 7



10 Außerdem lassen sich die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel [I-f] und [I-g] auch durch Verfahren H herstellen (Schema 8)

Schema 8



$\text{Z}^1 = \text{z.B. Cl, Br, I, -OTos, OMs, -OH}$

5 $\text{Z}^3 = \text{z.B. Cl}$

$\text{Z}^5 = \text{-OMe, -OEt}$

$\text{Z}^6 = \text{Me}_2\text{N}$

$\text{R}^{4a/401a} = \text{z.B. -NH-C(S)R}^{15}, \text{-NH-C(O)R}^{15}, \text{-NH-C(O)OR}^{15}, \text{-NH-C(O)NR}^{15}\text{R}^{16},$


$\text{R}^{x1} = \text{z.B. Wasserstoff, Alkyl, Cycloalkyl, Benzyl}$

10 $\text{R}^{x2} = \text{z.B. Alkyl, Cycloalkyl, Benzyl}$

$\text{A}^7 = \text{-R}^{15}, \text{-OR}^{15}$

Außerdem lassen sich die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel [I-h] durch Verfahren I herstellen (Schema 9)

Schema 9



5

Z^1 = z.B. Cl, Br, I, -OTos, OMs, -OH

Z^5 = -OMe, -OEt


Z^6 = Me_2N

$R^{4c/401c}$ = z.B. $-\text{NR}^{12a}\text{R}^{13a}$, $-\text{NHR}^{13a}$, $-\text{NHR}^{14a}$

10 R^{x1} = z.B. Wasserstoff, Alkyl, Cycloalkyl, Benzyl, Heterocyclyl

R^{x2} = z.B. Alkyl, Cycloalkyl, Benzyl, Heterocyclyl

Neu sind Verbindungen der Formel **[III]**



in denen die Symbole R^1 , R^2 , $R^{3/301}$, R^5 , R^6 und X^1 die oben angegebenen allgemeinen, bevorzugten, besonders bevorzugten, ganz besonders bevorzugten, am meisten bevorzugten oder insbesondere
5 bevorzugten Bedeutungen, sowie Salze davon, haben,

Neu sind zum Beispiel die in der folgenden Tabelle aufgeführten Verbindungen des Typs **[III]** :

Nr.	Name	R^1	R^2	$R^{3/301}$	LogP (pH 2,3) ¹	$[M+H]^+$ Peak ²
[III-1]	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	4-fluorphenyl	H	Isopropyl	1.22	297.13
[III-2]	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	4-fluorphenyl	H	2-Methoxyethyl	0.98	313.15
[III-3]	4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	4-fluorphenyl	H	Ethyl	0.97	283.20
[III-4]	4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	4-fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	1.03	319.48
[III-5]	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	4-fluorphenyl	H	Methyl	0.71	269.2

in denen


X^1 für = C-H und

10 R^5 , R^6 für H steht.

Ausgenommen sind die Verbindungen 4-[3-(4-fluorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amine; 4-[3-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amine, 4-[3-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amine, 4-[3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amine;

4-(5-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidin-2-amine und [4-(2-aminopyrimidin-4-yl)-3-(3-chloro-5-hydroxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetonitrile.

Neu sind auch Verbindungen der Formel [V]



5

$B(OR^*)_2 = \text{z.B. } B(OiPr)_2, B(OH)_2$

in denen die Symbole R^2 , $R^{3/301}$ die oben angegebenen allgemeinen, bevorzugten, besonders bevorzugten, ganz besonders bevorzugten oder insbesondere bevorzugten Bedeutungen haben,

R^1 hat die oben angegebenen bevorzugten, besonders bevorzugten, ganz besonders bevorzugten, am meisten bevorzugten oder insbesondere bevorzugten Bedeutungen, sowie Salze davon,


10 Neu sind zum Beispiel die in der folgenden Tabelle aufgeführten Verbindungen des Typs [V]:

Nr.	Name	R^1	R^2	$R^{3/301}$	LogP (pH 2,3) ¹	$[M+H]^+$ Peak ²
[V-1]	3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	Isopropyl	4.46	331.2
[V-2]	3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	2-methoxyethyl	3.58	347.2
[V-3]	3-(4-Fluorphenyl)-1-isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	Isobutyl	4.89	345.2
[V-4]	1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	3.84	353.2
[V-5]	3-(4-Fluorphenyl)-1-	4-	H	Isopropoxy	4.81	347.2

Nr.	Name	R ¹	R ²	R ^{3/301}	LogP (pH 2,3) ¹	[M+H] ⁺ Peak ²
	isopropoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol	fluorphenyl				
[V-6]	1-(Cyclopentyloxy)-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	Cyclopentyloxy	5.51	373.2
[V-7]	1-Cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	Cyclopropyl	3.47	329.2
[V-8]	1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	Cyclopropylmethyl	4.42	343.2
[V-9]	3-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	Methyl	3.47	303.2
[V-10]	1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	2-Chlorethyl	4.06	351.1

Ausgenommen ist die Verbindung 1-methyl-3-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole.

Neu sind Verbindungen der Formel [VI]



in denen R¹ die oben angegebenen besonders bevorzugten, ganz besonders bevorzugten, am meisten bevorzugten oder insbesondere bevorzugten Bedeutungen hat,

R² und R^{3/301} haben die oben angegebenen bevorzugten, besonders bevorzugten, ganz besonders bevorzugten, am meisten bevorzugten oder insbesondere bevorzugten Bedeutungen hat,

sowie Salze davon.


Neu sind zum Beispiel die in der folgenden Tabelle aufgeführten Verbindungen des Typs [VI]:

Nr.	Name	R ¹	R ²	R ^{3/301}	LogP (pH 2,3) ¹	[M+H] ⁺ Peak ²
[VI-2]	4-Brom-1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	C2H5	3.32	269.0
[VI-4]	4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	isobutyl	4.34	297.0
[VI-6]	4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	2-Methoxyethyl	3.08	299.0
[VI-9]	4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-[1-(2-fluorphenyl)ethyl]-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	1-(2-Fluorphenyl)ethyl	4.77	363.0
[VI-10]	4-Brom-1-[(2,2-dichlorcyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	(2,2-dichlorcyclopropyl)methyl	4.43	364.9
[VI-11]	5-(4-Brom-1-isobutyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-fluorbenzonitril	3-Cyan-4-fluorphenyl	H	Isobutyl	4.15	324.1
[VI-12]	3-{[4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}benzonitril	4-fluorphenyl	H	3-Cyanbenzyl	3.93	358.0
[VI-13]	4-Brom-1-(2-fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	2-Fluorbenzyl	4.39	349.0
[VI-14]	4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-propyl-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	1-Propyl	3.89	283.0
[VI-15]	4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	2-(methylsulfanyl)ethyl	3.63	315.0
[VI-16]	Methyl-2-[4-brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-methylbutanoat	4-fluorphenyl	H	1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl	4.27	357.1
[VI-17]	4-Brom-1-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	1,3-Dioxolan-2-ylmethyl	3.01	329.0
[VI-18]	4-Brom-1-(cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	Cyclopropylmethyl	3.90	297.0
[VI-19]	4-Brom-1-sec-butyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	sec-Butyl	4.39	299.0
[VI-20]	4-Brom-1-(2-ethoxyethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-	4-fluorphenyl	H	2-Ethoxyethyl	3.51	313.0

Nr.	Name	R ¹	R ²	R ^{3/301}	LogP (pH 2,3) ¹	[M+H] ⁺ Peak ²
	pyrazol					
[VI-21]	3-[4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanonitril	4-fluorphenyl	H	1-Cyanpropan-2-yl	3.08	310.1
[VI-22]	4-Brom-1-(1-cyclopropylethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	1-cyclopropylethyl	4.43	309.0
[VI-23]	3-[4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanonitril	4-fluorphenyl	H	2-Cyanethyl	2.69	296.0
[VI-24]	4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	CF ₃	Isopropyl	5.51	353.1
[VI-25]	4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropoxy-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	Isopropoxy	4.11	301.1
[VI-26]	4-Brom-1-cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	H	Cyclopropyl	3.59	281.0
[VI-27]	tert-Butyl-4-[4-brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidin-1-carboxylat	4-fluorphenyl	H	1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl	4.77	368 [M+ C4H9] ⁺
[VI-b-1]	4-Brom-5-(difluormethoxy)-3-(4-fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	CHF ₂	Methyl	3.52	321.1
[VI-b-2]	4-Brom-5-(difluormethoxy)-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	CHF ₂	Isopropyl	4.61	351.0
[VI-b-3]	4-Brom-5-(difluormethoxy)-3-(4-fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol	4-fluorphenyl	CHF ₂	Isobutyl	4.91	365.0
[VI-c-1]	2-[4-Brom-5-(difluormethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-5-fluorphenol	4-fluorphenyl	CHF ₂	Methyl	3.48	336.9

Ausgenommen sind Verbindungen bei denen R^{3/301} = H, CH₃ oder C(CH₃)₃ ist.

Neu sind Verbindungen der Formel [X]



in denen R^2 , $R^{4/401}$, R^5 , R^6 und X^1 die oben angegebenen allgemeinen, bevorzugten, besonders bevorzugten, ganz besonders bevorzugten, am meisten bevorzugten oder insbesondere bevorzugten Bedeutungen hat.

Neu sind zum Beispiel Verbindungen:

in denen

R^2 , $R^{4/401}$, R^5 , R^6 für H,

X^1 für = C-H und

10 PG für Tetrahydro-2H-pyran-2-yl steht

Nr.	Name	R^1	LogP (pH 2,3) ¹	[M+H] ⁺ Peak ²
[X-1]	4-[5-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.23	324.18
[X-2]	4-[5-(4-Methoxy-1-naphthyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.61	386.04
[X-3]	4-[5-(4-Fluor-1-naphthyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.72	374.01
[X-4]	4-[5-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.64	386.10
[X-5]	4-[5-(4-Fluor-2-methylphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.40	338.05


Nr.	Name	R ¹	LogP (pH 2,3) ¹	[M+H] ⁺ Peak ²
[X-6]	4-[5-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.57	357.95
[X-7]	4-[5-(4-Fluor-3-methylphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.47	338.05
[X-8]	4-[5-(2,4-Difluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.35	342.04
[X-9]	4-[5-(4-tert-Butylphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		2.02	362.17
[X-10]	4-[5-(4-Phenoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.88	398.13
[X-11]	3-[4-(Pyridin-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitril		1.23	331.06
[X-12]	2-Fluor-5-[4-(pyridin-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitril		1.45	349.01
[X-13]	N-{4-[4-(Pyridin-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}acetamid		0.97	363.11
[X-14]	4-[5-(4-Fluor-2-methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.26	354.05
[X-15]	4-{4-[4-(Pyridin-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}morpholin		1.26	391.14
[X-16]	4-[5-(3-Phenoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.88	398.13
[X-17]	4-{5-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin		0.96	384.02
[X-18]	4-[5-(4-Chlorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.52	340.15
[X-19]	4-{1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-[4-(trifluormethoxy)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin		1.78	390.07
[X-20]	4-[5-(2,3-Dichlorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin		1.66	374.07
[X-21]	N,N-Dimethyl-3-[4-(pyridin-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]anilin		1.33	349.20

Nr.	Name	R ¹	LogP (pH 2,3) ¹	[M+H] ⁺ Peak ²
[X-22]	4-{5-[2-(Benzyloxy)phenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin		1.64	412.17
[X-23]	4-[4-(Pyridin-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]benzolsulfonamid		0.92	385.03
[X-24]	8-[4-(Pyridin-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]chinolin		1.09	357.13

¹ Bei der Bestimmung der logP Werte wurden die unten beschriebenen Methoden angewendet.


² Bei der angegebenen Masse handelt es sich um den Peak des Isotopenmusters des [M+H]⁺ Ions mit der höchsten Intensität; falls das [M-H]⁻ Ion detektiert wurde, ist die Massenangabe mit 2 gekennzeichnet.

Neu sind Verbindungen der Formel [XI]



in denen die Symbole R², R^{4/401}, R⁵, R⁶ und X¹ die oben angegebenen allgemeinen, bevorzugten, besonders bevorzugten, ganz besonders bevorzugten, am meisten bevorzugten, oder insbesondere bevorzugten Bedeutungen haben, PG steht für eine Schutzgruppe, wie z.B. Tetrahydro-2H-pyran-2-yl oder 2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl, Met³ steht für ein substituiertes Metallatom, wie z.B. Tributylstannyl, 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, sowie Salze davon,

zum Beispiel [XI-1]:



[XI-1]

Ausgenommen ist die Verbindung 1-(4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(trimethylstannyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl)amino)propan-2-ol.

- 5 Die Herstellung der Verbindungen mit der allgemeinen Formel [I] nach Verfahren A kann wie folgt durchgeführt werden:

Eine Verbindung mit der allgemeinen Formel [XIV] wird bromiert und anschließend mit einer Schutzgruppe versehen, um eine Verbindung mit der Formel [XIII] zu erhalten. Diese Verbindung kann in einer C-C-Kupplungsreaktion mit einem Substrat der Formel [XV-a] umgesetzt werden, wobei eine Verbindung mit der Formel [XII] entsteht. Diese Verbindung kann durch Umsetzung mit einer starken Base und anschließender Umsetzung mit einer Bor- oder Zinnverbindung zu einer Verbindung der Formel [XI] umgewandelt werden. Diese Verbindung wird in einer C-C-Kupplungsreaktion mit Substraten der allgemeinen Formel [XVII] zu Verbindungen der Formel [X] umgesetzt. Anschließend wird diese Verbindung entschützt, wobei eine Verbindung der allgemeinen Formel [IX] erhalten wird. Das erhaltene Pyrazol der Formel [IX] wird nun mit Substraten des Typs [XVI] umgesetzt, wobei die erfindungsgemäßen Arylpyrazole der Formel [I] erhalten werden (Schema 1).

Alternativ kann auch ein anderer Verfahrensweg gewählt werden. Eine Verbindung mit der allgemeinen Formel [VIII] wird bromiert und eine Verbindung der Formel [VII] wird erhalten. Diese wird durch Umsetzung mit Substraten des Typs [XVI] zu einer Verbindung des Typs [VI] umgewandelt, wobei Gemische von Pyrazol-Regioisomeren entstehen können. Diese können durch gängige Verfahren z.B. chromatografische Verfahren in die einzelnen Regioisomere aufgetrennt werden. Die Verbindungen der allgemeinen Formel [VI] können in einer C-C-Kupplung mit Substraten der Formel [XV-a] umgesetzt werden, wobei Verbindungen der Formel [I] erhalten werden (Schema 1).

Alternativ können die Pyrazolverbindungen der allgemeinen Formel [VI] durch Umsetzung mit einem Boronsäureester in Verbindungen des Typs [V] umgewandelt werden. Diese können durch Umsetzung mit einem Substrat der Formel [IV-c] in einer C-C-Kupplungsreaktion zu Verbindungen der Formel [I-c] umgewandelt werden (Schema 1).

- 5 Alternativ können Verbindungen des Typs [V] durch Umsetzung mit einem Substrat der Formel [IV-a] in einer C-C-Kupplungsreaktion zu Verbindungen der Formel [III] umgewandelt werden. Diese Verbindungen werden durch Umsetzung mit Substraten der Formel [II] ebenfalls in die Verbindungen des Typs [I-c] überführt.

- 10 Darüberhinaus können Verbindungen des Typs [V] durch Umsetzung mit einem Substrat der Formel [IV-b] in einer C-C-Kupplungsreaktion zu den erfindungsgemäßen Arylpyrazolen der Formel [II] umgesetzt werden (Schema 1).

Die Herstellung der Verbindungen mit der allgemeinen Formel [I-d] wobei $R^{4b/401b}$ für Wasserstoff, Alkyl, Cycloalkyl, Aryl, -NH-C(O)-Alkyl oder -NH-C(O)O-Alkyl steht, kann wie folgt nach Verfahren B durchgeführt werden:

- 15 Verbindungen der allgemeinen Formel [XXIV] sind entweder kommerziell verfügbar oder können nach literaturbekannten Methoden dargestellt werden.

- Verbindungen der allgemeinen Formel [XXIV] werden mit einem Carbonsäureester, -nitril, -dialkylamid oder -N,O-dialkylamid der generellen Formel $R^1\text{-COZ}^5$ umgesetzt, wobei Verbindungen der allgemeinen Formel [XXV] erhalten werden. Diese Verbindungen [XXV] werden durch Reaktion mit DMF-Dialkylacetal zu Verbindungen der allgemeinen Formel [XXVI] umgesetzt. Aus Verbindungen der allgemeinen Formel [XXVI] werden dann durch Reaktion mit Hydrazin oder Hydrazinhydrat Verbindungen der Formel [XXVII] erhalten. Die erhaltenen Pyrazole der Formel [XXVII] werden nun mit Substraten des Typs [XVI] umgesetzt, wobei die erfindungsgemäßen Arylpyrazole der Formel [I-d] erhalten werden.
- 20

- 25 Im Falle $R^{3/301}$ =Cyclopropyl kann eine Verbindung der Formel [I-d] auch durch C-C-Kupplungsreaktion eines Substrats der Formel [XXVII] mit einer Cyclopropylboronsäure erhalten werden

Verbindungen der allgemeinen Formel [I-d] können auch durch direkte Umsetzung eines Hydrazinderivates mit Substraten der Formel [XXVI] erhalten werden.

- 30 Die Herstellung der Verbindungen mit der allgemeinen Formel [I-e] kann wie folgt nach Verfahren C durchgeführt werden:

Verbindungen der allgemeinen Formel **[IX-a]** sind entweder kommerziell verfügbar oder können nach Verfahren A dargestellt werden. Die Verbindungen der Formel **[IX-a]** werden durch Halogenierungsreaktion zu Verbindungen der Formel **[XXVIII]** umgesetzt. Die erhaltenen Pyrazole der Formel **[XXVIII]** werden nun mit Substraten des Typs **[XVI]** umgesetzt, wobei Verbindungen der Formel **[XXIX]** erhalten werden. Diese Verbindungen können durch C-C-Kupplungsreaktion mit einem Boronsäurederivat der Formel **[XXX]** und anschließender Entschützungsreaktion durch Abspaltung des R^{3/301}-Rests (z.B. bei Verwendung des p-Methoxybenzylrests) in Intermediate der Formel **[IX-b]** überführt werden. Diese können durch die in Verfahren A und B beschriebenen Methoden am Stickstoffatom des Pyrazols funktionalisiert werden, wobei die erfindungsgemäßen Pyrazole der Formel **[I-e]** erhalten werden.

Alternativ können die Intermediate der Formel **[XXIX]** auch ohne Entschützungs-schritt direkt durch C-C-Kupplungsreaktion mit einem Boronsäurederivat der Formel **[XXX]** zu den erfindungsgemäßen Pyrazolen der Formel **[I-e]** umgesetzt werden.

Die Herstellung der Intermediate mit der allgemeinen Formel **[VI-a]** kann wie folgt nach Verfahren D durchgeführt werden:

Pyrazolverbindungen der allgemeinen Formel **[VIII]** können durch Umsetzung mit einem Boronsäureester in Verbindungen des Typs **[XX]** umgewandelt werden. Diese Verbindungen werden durch Bromierung in Intermediate der allgemeinen Formel **[VI-a]** umgewandelt.

Die Herstellung der Intermediate mit der allgemeinen Formel **[VI-b]** und **[VI-c]** kann wie folgt nach Verfahren E durchgeführt werden:

Gemäß literaturbekannten Methoden (WO1996/015115, US5928999) werden Pyrazolinone **[XXXII]** ausgehend von den entsprechenden β -Ketoestern **[XXXI]** durch Umsetzung mit Hydrazinen hergestellt. Diese Pyrazolone werden durch Difluormethylierung gemäß literaturbekannten Methoden (*Org. Lett.* **2006**, 8, 17, 3805-3808) in Verbindungen des Typs **[XXXIII]** überführt. Die Verbindungen der Formel **[XXXIII]** werden anschliessend durch Halogenierungsreaktion zu Verbindungen der Formel **[VI-b]** umgesetzt. Verbindungen des Typs **[VI-b]** in denen R¹ für 4-Fluor-2-methoxyphenyl steht, können durch Umsetzung mit BBr₃ in Verbindungen des Typs **[VI-c]** umgewandelt werden, wobei R^{1a} für 4-Fluor-2-hydroxyphenyl steht.

Die Herstellung der Intermediate mit der allgemeinen Formel **[III]** kann alternativ auch wie folgt nach Verfahren F durchgeführt werden:

In einer C-C-Kupplungsreaktion werden Intermediate des Typs **[VI]** mit Substraten der allgemeinen Formel **[XV-aa]** umgesetzt, wobei Met² für einen Boronsäureester steht. Im Verlauf der Reaktion wird durch Abspaltung der Aminoschutzgruppe das freie Amin gebildet, wobei die Intermediate der allgemeinen Formel **[III]** erhalten werden.

5

Die Herstellung der Intermediate mit der allgemeinen Formel **[XV-a]** kann wie folgt nach Verfahren G durchgeführt werden:

Verbindungen der allgemeinen Formel **[XXXIV]** werden durch Acylierungsreaktion zu Verbindungen der Formel **[XXXV]** umgesetzt. Anschliessend werden diese Verbindungen in einer Kupplungsreaktion zu Boronsäureestern der Formel **[XV-a1]** überführt.

10

Die Herstellung der Verbindungen mit der allgemeinen Formel **[I-f]** und **[I-g]** kann wie folgt nach Verfahren H durchgeführt werden:

Verbindungen der allgemeinen Formel **[XXXVI]** werden gemäß literaturbekannten Methoden (*J. Med. Chem.* **1999**, 42, 12, 2180 - 2190) mit einem Carbonsäureester, -nitril, -dialkylamid oder -N,O-dialkylamid der generellen Formel R¹-COZ⁵ umgesetzt, wobei Verbindungen der allgemeinen Formel **[XXXVII]** erhalten werden. Dabei dürfen die Verbindungen der generellen Formel R¹-COZ⁵ keine Gruppen mit aciden Protonen, wie z.B. NH oder OH Gruppen enthalten. Diese Verbindungen **[XXXVII]** werden durch Reaktion mit DMF-Dialkylacetal zu Verbindungen der allgemeinen Formel **[XXXVIII]** umgesetzt. Aus Verbindungen der allgemeinen Formel **[XXXVIII]** werden dann durch Reaktion mit Hydrazin oder Hydrazinhydrat Verbindungen der Formel **[XXIX]** erhalten. Die erhaltenen Pyrazole der Formel **[XXIX]** werden nun mit Substraten des Typs **[XVI]** umgesetzt, wobei Verbindungen der allgemeinen Formel **[XL]** erhalten werden. Diese werden durch Umsetzung mit Oxidationsmitteln, z.B. m-Chlorperbenzoesäure in Verbindungen der Formel **[XLI]** überführt. Durch Substitutionsreaktion in Gegenwart von primären oder sekundären Aminen werden daraus die erfindungsgemäßen Arylpyrazole der Formel **[I-f]** erhalten. Gegebenenfalls können diese Verbindungen durch Entfernung der Aminsubstituenten (z.B. bei Benzylaminen durch Hydrierungsreaktion) in Verbindungen der allgemeinen Formel **[III-a]** überführt werden. Diese Verbindungen **[III-a]** werden durch Umsetzung mit Substraten der Formel **[II]** in die erfindungsgemäßen Arylpyrazole der Formel **[I-g]** überführt.

20

25

30

Die Herstellung der Verbindungen mit der allgemeinen Formel **[I-h]** kann wie folgt nach Verfahren I durchgeführt werden:

Verbindungen der allgemeinen Formel **[XLII]** werden gemäß literaturbekannten Methoden (*Tetrahedron Lett.* **2009**, 50, 21, 2552 - 2554) mit einem Carbonsäureester der generellen Formel R¹-

35

COZ⁵ umgesetzt, wobei Verbindungen der allgemeinen Formel [XLIII] erhalten werden. Dabei dürfen die Verbindungen der generellen Formel R¹-COZ⁵ keine Gruppen mit aciden Protonen, wie z.B. NH oder OH Gruppen enthalten. Durch Substitutionsreaktion in Gegenwart von primären oder sekundären Aminen werden daraus Verbindungen der Formel [XLIV] erhalten. Diese Verbindungen [XLIV] werden durch Reaktion mit DMF-Dialkylacetal zu Verbindungen der allgemeinen Formel [XLV] umgesetzt. Aus Verbindungen der allgemeinen Formel [XLV] werden dann durch Reaktion mit Hydrazin oder Hydrazinhydrat Verbindungen der Formel [XLVI] erhalten. Die erhaltenen Pyrazole der Formel [XLVI] werden nun mit Substraten des Typs [XVI] umgesetzt, wobei die erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel [I-h] erhalten werden.

10 Schritt (V1)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [VI] ist in Schema 1 gezeigt.

Verbindungen der Formel [VI], in denen R^{3/301} nicht für Wasserstoff steht, können synthetisiert werden, analog zu in der Literatur beschriebenen Vorschriften (*Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2000**, 10, 1351-1356 oder *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, 129, 26, 8064-8065), durch Umsetzung von Verbindungen des Typs [VII] mit einem Substrat der allgemeinen Formel [XVI] (wobei Z¹ eine Fluchtgruppe, wie z.B. Cl, Br, I, -OTos, -OMs oder andere darstellt), gegebenenfalls in der Gegenwart eines Lösungsmittels und eines Säurefängers / Base.

Verbindungen der Formel [VI], in denen R^{3/301} nicht für Wasserstoff steht, können darüberhinaus analog zu in der Literatur beschriebenen Vorschriften (Mitsunobu, O. *Synthesis* **1981**, 1-28) synthetisiert werden, z.B. durch Umsetzung von Verbindungen des Typs [VII] mit einem Substrat der allgemeinen Formel [XVI] (wobei Z¹ für -OH steht) in der Gegenwart eines Phosphanes (z.B. Triphenylphosphan) und eines Azodicarboxylates (z.B. Diethylazodicarboxylat) sowie eines Lösungsmittels (z.B. THF).

Die Brom-substituierten Pyrazole der Formel [VII] sind entweder kommerziell verfügbar oder lassen sich nach Literaturvorschriften herstellen. Eine Methode zur Herstellung geeigneter Brompyrazole ist beispielsweise die Bromierung entsprechender Pyrazole [VIII] (z.B. beschrieben in EP-A 1382 603) durch Umsetzung mit N-Bromsuccinimid in Essigsäure.

Verbindungen des Typs [VIII], wie z.B. 3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol, 3-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrazol oder 3-(3-Chlorphenyl)-1H-pyrazol sind kommerziell verfügbar oder lassen sich z.B. nach literaturbekannten Methoden (*Tetrahedron*, **2003**, 59, 555-560) aus kommerziellen Acetophenonen durch Umsetzung mit Dimethylformamid-Dimethylacetal und Hydrazin herstellen.

Die für die Umsetzung benötigten Verbindungen der Formel [XVI] sind kommerziell verfügbar oder lassen sich nach Literaturvorschriften herstellen (R. C. Larock, *Comprehensive Organic Transformations*, 2. Ausgabe, **1999**, Wiley-VCH, S. 690 ff. und S. 1929 ff. sowie darin zitierte Literatur)

- 5 Eine Methode zur Herstellung geeigneter Verbindungen der Formel [XVI] (wobei $R^{3/301}$ im Falle einer Alkylierungsreaktion z.B. für einen substituierten oder unsubstituierten Alkyl oder Cycloalkylrest steht), ist beispielsweise die Umsetzung von Alkoholen mit Methansulfonylchlorid und Triethylamin (*Org. Lett.* **2008**, 10, 4425-4428) oder durch Appel-Reaktion mit Triphenylphosphin und CCl_4 (z.B. beschrieben in *Tetrahedron* **2008**, 64, 7247-7251).
- 10 Die Herstellung geeigneter Verbindungen der Formel [XVI] (wobei in $R^{3/301}$ im Falle einer Acylierungsreaktion eine Carbonylgruppe direkt an Z^1 gebunden ist), erfolgt nach literaturbekannten Verfahren (z.B. Jerry March, *Advanced Organic Chemistry*, 4. Auflage, John Wiley & Sons, S. 437 ff. und der darin zitierten Literatur).

- Aus der chemischen Struktur der Substrate der allgemeinen Formel [XVI] können sich bestimmte
- 15 bevorzugte Kombinationen bei der Wahl eines geeigneten Lösungsmittel und einer geeigneten Base ergeben.

- Im Falle einer Alkylierungsreaktion mit Substraten der Formel [XVI] (wobei $R^{3/301}$ im Falle einer Alkylierungsreaktion z.B. für einen substituierten oder unsubstituierten Alkyl oder Cycloalkylrest steht) können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B.
- 20 zyklische und azyklische Ether (z.B. Diethylether, Tetrahydrofuran, Dioxane), aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol, Toluol, Xylol), halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff), halogenierte aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol), Nitrile (z.B. Acetonitril), Carbonsäureester (z.B. Essigsäureethylester), Amide (z.B. N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid),
- 25 Dimethylsulfoxid, 1,3-Dimethyl-2-imidazolinon, verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die bevorzugten Lösungsmittel sind Dimethylformamid und Acetonitril.

- Im Falle einer Alkylierungsreaktion mit Substraten der Formel [XVI] (wobei $R^{3/301}$ im Falle einer Alkylierungsreaktion z.B. für einen substituierten oder unsubstituierten Alkyl oder Cycloalkylrest steht) sind Basen, die für diese Reaktion, verwendet werden können, z.B.
- 30 Lithiumhexamethyldisilazide (LiHMDS), Kaliumcarbonat, Cesiumcarbonat und Natriumhydrid. Die bevorzugte Base ist Natriumhydrid. Man setzt in der Regel wenigstens 1 Äquivalent Base ein.

- Im Falle einer Acylierungsreaktion mit Substraten der Formel [XVI] (wobei in $R^{3/301}$ eine Carbonylgruppe direkt an Z^1 gebunden ist) können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. zyklische und azyklische Ether (z.B. Diethylether, Tetrahydrofuran, Dioxane), aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol, Toluol, Xylol), halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff), halogenierte aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol), Nitrile (z.B. Acetonitril) und aromatische heterocyclische Amine (Pyridin) verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die bevorzugten Lösungsmittel sind Tetrahydrofuran und Dichlormethan.
- 10 Im Falle einer Acylierungsreaktion mit Substraten der Formel [XVI] (wobei in $R^{3/301}$ eine Carbonylgruppe direkt an Z^1 gebunden ist) kann z.B. ein Äquivalent eines Säurefängers / einer Base (z.B. Pyridin, Diisopropylethylamin, Triethylamin oder kommerziell erhältliche polymere Säurefänger) im Verhältnis zum Startmaterial der allgemeinen Formel [VII] verwendet werden. Ist das Startmaterial ein Salz, werden wenigstens zwei Äquivalente des Säurefängers benötigt. Im Falle
- 15 der Verwendung von Pyridin als Lösungsmittel kann analog zur beschriebenen Literatur gegebenenfalls auf den Zusatz einer weiteren Base verzichtet werden (EP-A-1 000 062).

- Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C – 100 °C durchgeführt und vorzugsweise bei 20 °C – 30 °C, aber sie kann auch bei Rückflusstemperatur der Reaktionsmischung durchgeführt werden. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der
- 20 Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einigen Minuten und 48 Stunden.

- Nach Beendigung der Reaktion, werden die Verbindungen [VI], von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Je nach der Art der verwendeten Substrate der Formel [XVI] und der Reaktionsbedingungen können die Verbindungen der Formel [VI], in denen $R^{3/301}$ nicht für Wasserstoff steht, als reine Regioisomere oder als Mischung beider möglicher
- 25 Regioisomerer (wobei die Gruppe $R^{3/301}$ beide Positionen am N-Atom des Pyrazols einnehmen kann) erhalten werden. In dem Falle, daß Mischungen an Regioisomeren erhalten werden, können diese durch physikalische Methoden (wie z.B. Kristallisations- oder Chromatographie-Methoden) gereinigt oder können gegebenenfalls auch im nächsten Schritt ohne vorhergehende Reinigung eingesetzt werden.

30 Schritt (V2)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [V] ist in Schema 1 gezeigt.

Verbindungen der Formel [V] lassen sich nach beschriebenen Verfahren z.B. über Umsetzung der Brompyrazole [VI] mit Boronsäureestern wie z.B. Bispinacolatodiboron (4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolan) in Gegenwart eines Katalysators wie z.B. 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen-palladium(II)dichlorid in Gegenwart einer Base und eines geeigneten Lösungsmittels herstellen (vgl. US 0,018,156 A, WO 07/024843 oder EP-A-1 382 603).

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. Sulfoxide (z.B. Dimethylsulfoxid), zyklische Ether (z.B. Dioxane) und Amide (z.B. N,N-Dimethylformamid) verwendet werden und die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die bevorzugten Lösungsmittel sind Dimethylsulfoxid und Dioxan.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 80 °C – 120 °C durchgeführt werden, die bevorzugte Reaktionstemperatur liegt bei 85 °C – 90 °C. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer Stunde und 16 Stunden.

Andere literaturbeschriebene Synthesemethoden können ebenfalls zur Herstellung der Verbindungen der Formel [V] verwendet werden. Beispielsweise können Verbindungen der Formel [V] durch Metallierung der Brompyrazole [VI] mit Basen wie z.B. n-Butyllithium und Umsetzung mit Boronsäureestern wie z.B. Trimethylborat und anschließende Reaktion der erhaltenen Pyrazolboronsäure mit Pinacol hergestellt werden (siehe z.B. *J. Het. Chem.* **2004**, 41, 931-940 oder EP-A-1 382 603 sowie WO2007/16392).

Schritt (V3)


Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [III] ist in Schema 1 gezeigt.

Verbindungen der Formel [III] lassen sich z.B. durch Kupplung der Pyrazolboronsäuren [V] mit Heterocyclen der Formel [IV-a] (wobei Z^2 eine Fluchtgruppe wie z.B. Cl oder Br darstellt) in Gegenwart eines Katalysators, einer Base und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen nach bekannten Literaturvorschriften herstellen (*Top. Curr. Chem.* **2002**, 219, 11; *Organomet. Chem.* **1999**, 28, 147 und darin zitierte Literatur).

Verbindungen der Formel [IV-a] (in denen X^1 für C-H steht) sind kommerziell verfügbar oder lassen sich nach Literaturvorschriften herstellen (Schema 10). Eine Methode zur Herstellung geeigneter N-Boc-Halogenheterocyclen [IV-a-1] ist die Reaktion geeigneter Säuren (z.B. 4-Brom-picolinsäure) [L]

mit Diphenylphosphorylazid und tert-Butanol (*Aust. J. Chem.* **1982**, 35, 2025-2034, *J. Med. Chem.* **1992**, 35, 15, 2761-2768 oder US 5,112,837 A).


Schema 10



- 5 Die Carbonsäuren [L] sind bekannt oder können aus kommerziell erhältlichen Vorstufen nach literaturbeschriebenen Vorschriften hergestellt werden (siehe z.B. EP-A-1 650 194), zum Beispiel aus der kommerziell verfügbaren Pyridin-2-carbonsäure durch Umsetzung mit Thionylchlorid in Dimethylformamid. Alternativ können Verbindungen der allgemeinen Formel [L] auch durch Oxidation von kommerziell verfügbaren 4-Halo-2-Methyl-pyridinderivaten nach literaturbekannten
- 10 Vorschriften hergestellt werden (*Aust. J. Chem.* **1982**, 35, 2025-2034).

Verbindungen der Formel [IV-a] (in denen X¹ für N steht) sind kommerziell verfügbar oder lassen sich nach Literaturvorschriften herstellen (Schema 11). Eine Methode zur Herstellung geeigneter N-Boc-Halogenheterocyclen [IV-a-2] ist die Chlorierung der Hydroxyverbindungen (z.B. (4-Hydroxypyrimidin-2-yl)carbamate) mit Phosphorylchlorid (*Chem. Pharm. Bull.* **2003**, 51, 8, 975-977).

15 Schema 11



Die Hydroxyverbindungen [LI] sind bekannt oder können aus kommerziell erhältlichen Vorstufen nach literaturbeschriebenen Vorschriften hergestellt werden (*Chem. Pharm. Bull.* **2003**, 51, 8, 975-977).

- 20 Als Lösungsmittel für die Synthese von Verbindungen der Formel [III] können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. Alkohole (z.B. Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol, Ethylenglykol, 1-Butanol, 2-Butanol, tert.-Butanol), zyklische und azyklische Ether (Diethylether, Dimethoxymethan, Diethylenglykoldimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Diisopropylether, tert.-Butylmethylether), aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol, Toluol,

Xylol), Kohlenwasserstoffe (z.B. Hexan, iso-Hexan, Heptan, Cyclohexan), Ketone (z.B. Aceton, Ethylmethylketon, iso-Butylmethylketon), Nitrile (z.B. Acetonitril, Propionitril, Butyronitril) und Amide (z.B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon) und Wasser verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel
5 ausgeführt werden. Das bevorzugte Lösungsmittel ist Dioxan.

Basen, die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise Verwendung finden, sind Alkali- und Erdalkalimetallhydroxide, Alkali- und Erdalkalimetallcarbonate, Alkalimetallhydrogencarbonate, Alkali- und Erdalkalimetallacetate, Alkali- und Erdalkalimetallalkoholate, sowie primäre, sekundäre und tertiäre Amine. Bevorzugte Basen sind Alkalimetallcarbonate wie z.B. Cäsiumcarbonat,
10 Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat.

Die Base wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren bevorzugt mit einem Anteil von 100 bis 1000 Mol %, bezogen auf die aromatische Boronsäure, eingesetzt. Der bevorzugte Anteil ist 600 bis 800 Mol %.

Als Katalysatoren können z.B. Palladiummetall, Palladiumverbindungen und/oder
15 Nickelverbindungen eingesetzt werden. Die Katalysatoren können auch auf einem festen Träger, wie Aktivkohle oder Aluminiumoxid, aufgebracht sein. Bevorzugt sind Palladiumkatalysatoren, in denen das Palladium in der Oxidationsstufe (0) oder (II) vorliegt, wie Tetrakis(triphenylphosphin)-palladium, Bis(triphenylphosphin)palladiumdichlorid, Bis(diphenylphosphino)ferrocenpalladiumdichlorid, Palladiumketonate, Palladiumacetylacetonate (wie z.B. Palladiumbisacetyl-
20 acetonat), Nitrilpalladiumhalogenide (wie z.B. Bis(benzonitril)palladiumdichlorid, Bis(acetonitril)-palladiumdichlorid), Palladiumhalogenide (PdCl_2 , Na_2PdCl_4 , Na_2PdCl_6), Allylpalladium-halogenide, Palladiumbiscarboxylate (wie z.B. Palladium-II-acetat) und Tetrachlorpalladiumsäure. Besonders bevorzugte Katalysatoren sind Tetrakis(triphenylphosphin)-palladium, Bis(triphenylphosphin)-palladiumdichlorid und Bis(diphenylphosphino)ferrocenpalladium-dichlorid. Die Palladium-
25 verbindung kann auch in situ erzeugt werden, wie beispielsweise Palladium(II)acetat aus Palladium(II)chlorid und Natriumacetat.

Die Menge an Katalysator beträgt, bezogen auf den die Abgangsgruppe Z^2 tragenden Heteroaromaten [IV-a], bevorzugt 0,001 bis 0,5 Mol-% und besonders bevorzugt 0,01 bis 0,2 Mol-%.

Der Katalysator kann phosphorhaltige Liganden enthalten oder es können dem Reaktionsgemisch
30 phosphorhaltige Liganden separat zugesetzt werden. Als phosphorhaltige Liganden eignen sich bevorzugt Tri-n-alkylphosphane, Triarylphosphane, Dialkylarylphosphane, Alkyldiarylphosphane und/oder Heteroarylphosphane, wie Tripyridylphosphan und Trifurylphosphan, wobei die drei Substituenten am Phosphor gleich oder verschieden sein können und wobei einer oder mehrere

Substituenten die Phosphorgruppen mehrerer Phosphane verknüpfen können, wobei ein Teil dieser Verknüpfung auch ein Metallatom sein kann. Besonders bevorzugt sind Phosphane wie Triphenylphosphan, Tri-tert-butylphosphan, Tricyclohexylphosphan.

Die Gesamtkonzentration an phosphorhaltigen Liganden beträgt, bezogen auf den die Abgangsgruppe
5 Z^2 tragenden Heteroaromaten [IV-a], bevorzugt bis 1 Mol-%, besonders bevorzugt 0,01 bis 0,5 Mol-%.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden zweckmässigerweise die Edukte, das Lösemittel, die Base, der Katalysator und gegebenenfalls der Ligand durchmischt und bevorzugt bei einer Temperatur von 0 °C – 200 °C, besonders bevorzugt bei 100-170 °C umgesetzt. Die
10 Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einigen Minuten und 48 Stunden. Ausser als Eintopfreaktion kann die Reaktion auch so geführt werden, dass die verschiedenen Reaktanden im Laufe der Reaktion kontrolliert zudosiert werden, wobei unterschiedliche Dosiervarianten möglich sind.

Das molare Reaktandenverhältnis vom Heteroaromat [IV-a] zur Organoborverbindung [V] beträgt
15 bevorzugt 0.9 bis 1.5.

Die erfindungsgemäßen Verfahren werden im allgemeinen unter Normaldruck durchgeführt. Es ist jedoch auch möglich, unter erhöhtem oder vermindertem Druck zu arbeiten. Die Reaktion wird im allgemeinen unter Verwendung eines Schutzgases wie z.B. Argon oder Stickstoff durchgeführt. Nach beendeter Umsetzung wird der als Feststoff anfallende Katalysator durch Filtration abgetrennt, das
20 Rohprodukt vom Lösungsmittel bzw. den Lösungsmitteln befreit und anschließend nach dem Fachmann bekannten und dem jeweiligen Produkt angemessenen Methoden, z. B. durch Umkristallisation, Destillation, Sublimation, Zonenschmelzen, Schmelzkristallisation oder Chromatographie, gereinigt.

Schritt (V4)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel **[I-c]** ist in Schema 1 gezeigt.

- Eine Verbindung mit der allgemeinen Formel **[I-c]**, kann synthetisiert werden, analog zu in der Literatur beschriebenen Vorschriften (siehe z.B. WO 04/052880 sowie z.B. T.W. Greene, P. G. M. Wuts, *Protective Groups in Organic Synthesis*, **1999**, John Wiley & Sons, Inc.), durch eine Kupplungsreaktion einer Verbindung mit der entsprechenden allgemeinen Formel **[III]** mit einem Substrat der allgemeinen Formel **[II]** (mit Z^3 z.B. = Cl, Br, F, -OH) gegebenenfalls in der Gegenwart eines Säurefängers / Base wobei die Definitionen der Reste R^1 , R^2 , $R^{3/301}$, $R^{4a/401a}$, R^5 , R^6 und X^1 in den obigen Schemata den oben angegebenen Definitionen entsprechen.
- 10 Säurehalogenide **[II]** ($Z^3 = \text{Cl}$) oder die entsprechenden Carbonsäuren **[II]** ($Z^3 = \text{OH}$) sind kommerziell erhältlich oder durch in der Literatur beschriebene Prozesse darstellbar. Außerdem kann ein Substrat mit der allgemeinen Formel **[II]**, mit $Z^3 = \text{Cl}$, aus der entsprechenden Säure ($Z^3 = \text{OH}$) durch Chlorierung unter Verwendung literaturbekannter Prozesse dargestellt werden. (R. C. Larock, *Comprehensive Organic Transformations*, 2. Ausgabe, **1999**, Wiley-VCH, Seite 1929 ff. und darin
- 15 zitierte Literatur).

- Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. zyklische und azyklische Ether (z.B. Diethylether, Tetrahydrofuran, Dioxane), aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol, Toluol, Xylol), halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff), halogenierte aromatische Kohlenwasserstoffe
- 20 (z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol) und Nitrile (z.B. Acetonitril) verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die bevorzugten Lösungsmittel sind Tetrahydrofuran und Dichlormethan.

- Wenigstens ein Äquivalent eines Säurefängers / einer Base (z.B. Hünig Base, Triethylamin oder kommerziell erhältliche polymere Säurefänger) im Verhältnis zum Startmaterial der allgemeinen
- 25 Formel **[III]** wird verwendet. Ist das Startmaterial ein Salz, werden wenigstens zwei Äquivalente des Säurefängers benötigt.

- Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C – 100 °C durchgeführt und vorzugsweise bei 20 °C – 30 °C, aber sie kann auch bei Rückflusstemperatur der Reaktionsmischung durchgeführt werden. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der
- 30 Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einigen Minuten und 48 Stunden.

Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens (**V4**) zur Herstellung der Verbindungen der Formel **[I-c]** setzt man pro Mol des Carbonsäurehalogenids der Formel **[II]** im Allgemeinen 0.2 bis 2

Mol, vorzugsweise 0.5 bis 0.9 Mol an Aminoderivat der Formel [III] ein. Die Aufarbeitung erfolgt durch Verdampfen der flüchtigen Bestandteile im Vakuum und Versetzen des Rohmaterial mit ammoniakalischer Methanol-Lösung (7 molar).

5 Nach Beendigung der Reaktion, werden die Verbindungen [I-c], von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Falls notwendig werden die Verbindungen durch Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt.

Alternativ kann eine Verbindung der Formel [I-c], auch aus der entsprechenden Verbindung der Formel [III] mit einem Substrat der Formel [II] mit $Z^3 = -OH$ in Gegenwart eines Kupplungsreagenzes synthetisiert werden analog zu in der Literatur beschriebenen Vorschriften (z.B. 10 *Tetrahedron* **2005**, 61, 10827-10852, und darin zitierte Referenzen).

Geeignete Kupplungsreagenzien sind beispielsweise Peptidkupplungsreagenzien (zum Beispiel, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethyl-carbodiimid gemischt mit 4-Dimethylamino-pyridin, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethyl-carbodiimid gemischt mit 1-Hydroxy-benzotriazol, Brom-triptyrrolidino-phosphonium-hexafluorophosphat, O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl-uroniumhexa- 15 fluorophosphat, etc.).

Gegebenenfalls kann eine Base, wie z.B. Triethylamin oder Hünig-Base in der Reaktion verwendet werden.

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. Alkohole (z.B. Methanol, Ethanol, Propanol), zyklische und azyklische Ether (z.B. Diethylether, 20 Tetrahydrofuran, Dioxane), aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol, Toluol, Xylol), halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff), halogenierte aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol), Nitrile (z.B. Acetonitril) und Amide (z.B. N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid) verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt 25 werden. Das bevorzugte Lösungsmittel ist Dichlormethan.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C – 100 °C durchgeführt und vorzugsweise bei 0 °C – 30 °C, aber sie kann auch bei Rückflusstemperatur der Reaktionsmischung durchgeführt werden. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einigen Minuten und 48 Stunden.

30 Nach Beendigung der Reaktion, werden die Verbindungen [I-c] von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Falls notwendig werden die Verbindungen durch Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt.

Verbindungen der allgemeinen Formel **[I-c]** bei denen $R^{4a/401a}$ für $-NR^{12}R^{12'}$ steht (symmetrisch oder unsymmetrisch bisacylierte Aminopyridine) lassen sich durch die oben beschriebene Methode direkt aus Verbindungen der allgemeinen Formel **[I-c]**, bei denen $R^{4a/401a}$ für $-NHR^{12}$ steht (monoacylierte Aminopyridine), durch Umsetzung mit Säurehalogeniden der Formel **[II]** herstellen ($Z^3 = \text{z.B. Cl, F}$).


5 Schritt (V5)

Eine weitere Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel **[I-c]** ist in Schema 1 gezeigt.

Verbindungen der Formel **[I-c]** lassen sich z.B. durch Kupplung der Pyrazolboronsäuren **[V]** mit Heterocyclen der Formel **[IV-c]** (wobei Z^2 eine Fluchtgruppe ist, wie z.B. Cl oder Br) in Gegenwart eines Katalysators, einer Base und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen nach bekannten Literaturvorschriften herstellen (*Top. Curr. Chem.* **2002**, 219, 11; *Organomet. Chem.* **1999**, 28, 147 und darin zitierte Literatur).

Verbindungen der Formel **[IV-c]** (in denen X^1 für C-H steht) sind kommerziell verfügbar oder lassen sich nach Literaturvorschriften herstellen (Schema 12). Eine Methode zur Herstellung geeigneter Halogenheterocyclen **[IV-c-1]** ist die Umsetzung von Aminoheterocyclen der Formel **[XX]** mit Säurechloriden in Gegenwart einer Base und eines Lösungsmittels (*Synth. Commun.* **1997**, 27, 5, 861-870). Die Auswahl von Lösungsmittel, Base und Temperatur kann je nach eingesetzten Substrat **[XX]** variieren und umfasst die unter Schritt (V4) beschriebenen Variationsmöglichkeiten für Umsetzung der Aminoheterocyclen der Formel **[III]** mit Substraten der Formel **[II]** zu Herstellung von Verbindungen der Formel **[I-c]**.

20 Schema 12



Die Aminoheterocyclen **[XX]** (in denen X^1 für C-H steht) sind bekannt oder können durch Abspaltung der N-BOC Schutzgruppe aus Verbindungen der Formel **[IV-a]** nach literaturbeschriebenen Vorschriften hergestellt werden (*Aust. J. Chem.* **1982**, 35, 10, 2025-2034 und darin enthaltene Referenzen).

Die Aminoheterocyclen [XX] (in denen X^1 für N steht) sind bekannt oder können durch Halogenierung der Hydroxyverbindungen ($Z^2 = -OH$) nach literaturbeschriebenen Vorschriften hergestellt werden (z.B. nach *J. Med. Chem.* **2006**, 49, 14, 4409-4424).

- Die Auswahl von Lösungsmittel, Base, Temperatur, Katalysators und gegebenenfalls zugesetztem
- 5 Liganden kann je nach eingesetzten Substrat [IV-c] variieren und umfasst die unter Schritt (V3) beschriebenen Variationsmöglichkeiten für die C-C-Kupplung von Verbindungen der Formel [V].

Nach beendeter Umsetzung wird der als Feststoff anfallende Katalysator durch Filtration abgetrennt, das Rohprodukt vom Lösungsmittel bzw. den Lösungsmitteln befreit und anschließend nach dem Fachmann bekannten und dem jeweiligen Produkt angemessenen Methoden, z. B. durch

10 Umkristallisation, Destillation, Sublimation, Zonenschmelzen, Schmelzkristallisation oder Chromatographie, gereinigt.

Schritt (V6)


Eine weitere Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [I] ist in Schema 1 gezeigt.

- Verbindungen der Formel [I] lassen sich z.B. durch Kupplung der Halopyrazole [VI] mit metallierten
- 15 Heterocyclen der Formel [XV-a] (wobei Met^1 für einen Boronester oder Boronsäure wie z.B. $B(OiPr)_3$, $B(OH)_2$ steht) in Gegenwart eines Katalysators, einer Base, gegebenenfalls eines Liganden und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen nach bekannten Literaturvorschriften herstellen (*Top. Curr. Chem.* **2002**, 219, 11; *Organomet. Chem.* **1999**, 28, 147 und darin zitierte Literatur, **2005**, 7, 21, 4753-4756). (Schema 13)

- 20 Verbindungen der Formel [I] lassen sich außerdem z.B. durch Kupplung der Halopyrazole [VI] mit metallierten Heterocyclen der Formel [XV-a] in Gegenwart eines Katalysators, gegebenenfalls eines anorganischen oder organischen Halogenid-Salzes, gegebenenfalls eines Liganden und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen nach bekannten Literaturvorschriften herstellen (vgl. *Synthesis* **1992**, 803-815).


- 25 Verbindungen der Formel [XV-a1] (in denen X^1 für C-H steht) sind kommerziell verfügbar oder lassen sich nach Literaturvorschriften herstellen. Eine Methode zur Herstellung geeigneter Halogenheterocyclen [XV-a1] ist die Umsetzung von Haloheterocyclen der Formel [XXI] mit Bispinacolatodiboron in Gegenwart eines Katalysators (wie z.B. $Pd(OAc)_2$, $PdCl_2(dppf)$), gegebenenfalls eines Liganden (wie z.B. 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydroimidazoliumchlorid), einer Base (wie z.B. Kaliumacetat, Natriumacetat) und eines Lösungsmittels (wie z.B.
- 30 Tetrahydrofuran, Dimethylsulfoxid) nach literaturbeschriebenen Methoden (*Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2006**, 16, 5, 1277-1281 und WO 04/014913) (Schema 13).

Schema 13




- Alternativ können Verbindungen der Formel **[XV-a1]** (in denen X^1 für C-H steht) auch durch andere literaturbekannte Methoden dargestellt werden. Eine Methode zur Herstellung geeigneter Heterocyclen **[XV-a1]** ist die Metallierung des Halogenpyridins **[XXI]** mit einer Base (wie z.B. n-Butyllithium) in einem Lösungsmittel (wie z.B. Diethylether oder Tetrahydrofuran) und nachfolgende Umsetzung mit einem Boronsäureester (wie z.B. B(i-PrO)₃ oder B(OMe)₃) und Pinakol nach literaturbekannten Methoden (*Synthesis* **2004**, 4, 469-483 und darin beschriebene Literatur) (Schema 14).

10 Schema 14




- Verbindungen der Formel **[XV-a2]** (in denen X^1 für N steht) sind kommerziell verfügbar oder lassen sich nach Literaturvorschriften herstellen. Eine Methode zur Herstellung geeigneter Haloheterocyclen **[XV-a2]** ist die Umsetzung von Haloheterocyclen der Formel **[XXII]** mit Hexaalkyldizinnverbindungen (wie z.B. 1,1,1,2,2,2-Hexabutyldizinn) in Gegenwart eines Katalysators (wie z.B. bis(Triphenylphosphin)palladium(II)acetat), gegebenenfalls einer Fluoridionenquelle (wie z.B. Tetrabutylammoniumfluorid) und eines Lösungsmittels (wie z.B. Tetrahydrofuran, Diethylether) nach literaturbeschriebenen Methoden (WO 03/095455 oder WO 07/104538) (Schema 15).

Schema 15



Alternativ können Verbindungen der Formel [XV-a2] (in denen X¹ für N steht) auch durch andere literaturbekannte Methoden dargestellt werden. Eine Methode zur Herstellung geeigneter Halogenheterocyclen [XV-a2] ist die Metallierung des Halogenpyridins [XXII] unter Verwendung eines Metallierungsreagenzes (einer Alkylolithiumverbindung wie z.B. n-Butyllithium oder eines Grignard-Reagenzes wie z.B. Isopropylmagnesiumchlorid) in einem Lösungsmittel (wie z.B. Diethylether oder Tetrahydrofuran) und nachfolgende Umsetzung mit einer Trialkylzinnhalogenverbindung (wie z.B. Bu₃SnCl) nach literaturbekannten Methoden (WO 08/008747 oder *Tetrahedron* **1994**, 275-284 und darin beschriebene Literatur) (Schema 16).

Schema 16



Verbindungen der Formel [XXI] und [XXII] sind kommerziell verfügbar oder können z.B. durch Acylierung entsprechender Amine (im Falle R^{4/401} = -NH₂) nach literaturbekannten Methoden (z.B. *J. Org. Chem.* **2004**, 69, 543-548) dargestellt werden. Eine andere Methode zur Darstellung der Verbindungen des Typs [XXI] und [XXII] besteht in der Halogenierung der entsprechenden Hydroxyheterocyclen analog zu den für die Synthese der Verbindungen [XX] sowie [IV-b] angegebenen Halogenierungsmethoden.

Bei der Kupplung der Halopyrazole [VI] mit metallierten Heterocyclen der Formel [XV-a] (wobei Met für einen Boronester oder Boronsäure wie z.B. B(OiPr)₃, B(OH)₂ steht) kann die Auswahl von Lösungsmittel, Base, Temperatur, Katalysators und gegebenenfalls zugesetztem Liganden je nach eingesetzten Boronester-Substrat variieren und umfasst die unter Schritt (V3) beschriebenen

Variationsmöglichkeiten für die C-C-Kupplung von Verbindung der Formel [V] mit Substraten der Formel [IV-a].

Bei der Kupplung der Halopyrazole [VI] mit metallierten Heterocyclen der Formel [XV-a] (wobei Met für eine Zinnalkyl tragende Gruppe wie z.B. Sn(Bu)₃ steht) kann die Auswahl eines Katalysators, gegebenenfalls eines anorganischen oder organischen Halogenid-Salzes, gegebenenfalls eines
5 Liganden und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen je nach eingesetzten Zinnalkyl-Substrat variieren.

Als Lösungsmittel für die Umsetzung von Verbindungen der Formel [XV-a] können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. zyklische und azyklische Ether
10 (Diethylether, Dimethoxymethan, Diethylenglykoldimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Diisopropylether, tert.-Butylmethylether), aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol, Toluol, Xylol), Amide (z.B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon) und Sulfoxide (z.B. Dimethylsulfoxid) verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Das bevorzugte Lösungsmittel ist Dimethylformamid.

15 Halogenidsalze für die Umsetzung von Verbindungen der Formel [XV-a], die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise Verwendung finden, sind z.B. Kupferhalogenide (z.B. CuBr oder CuI), Cäsiumhalogenide (CsF) und Tetraalkylammoniumhalogenide (TBAF).

Die Halogenidsalze werden bei dem erfindungsgemäßen Verfahren bevorzugt mit einem Anteil von 1 bis 400 Mol %, bezogen auf die organische Zinnverbindung, eingesetzt. Es können aber auch
20 Mischungen der Halogenidsalze in Anteilen von 1- 400 Mol % eingesetzt werden. Besonders bevorzugt ist die Zugabe einer Mischung aus Kupferiodid und Cäsiumfluorid in Anteilen von 1- 200 Mol %.

Als Katalysatoren für die Umsetzung von Verbindungen der Formel [XV-a] können die gleichen Katalysatoren eingesetzt werden, die oben für die Herstellung der Verbindungen der Formel [III]
25 durch Reaktion der Verbindungen der Formel [V] und [IV-a] beschrieben worden sind.

Die Menge an Katalysator beträgt bezogen auf den die Abgangsgruppe Met¹ tragenden Heteroaromaten [XV-a], bevorzugt 0,001 bis 0,5 Mol-% und besonders bevorzugt 0,01 bis 0,2 Mol-%.

Der Katalysator kann phosphorhaltige oder arsenhaltige Liganden enthalten oder es können dem
30 Reaktionsgemisch phosphorhaltige oder arsenhaltige Liganden separat zugesetzt werden. Als phosphorhaltige Liganden eignen sich bevorzugt Tri-n-alkylphosphane, Triarylphosphane, Dialkylarylphosphane, Alkyldiarylphosphane und/oder Heteroarylphosphane, wie

Tripyridylphosphan und Trifurylphosphan, wobei die drei Substituenten am Phosphor gleich oder verschieden sein können, chiral oder achiral sein können und wobei einer oder mehrere Substituenten die Phosphorgruppen mehrerer Phosphane verknüpfen können, wobei ein Teil dieser Verknüpfung auch ein Metallatom sein kann. Besonders bevorzugt sind Phosphane wie Triphenylphosphan, Tri-
5 tert-butylphosphan, Tricyclohexylphosphan. Als arsenhaltige Liganden eignen sich z.B. Tri-n-alkylarsane und Triarylarsane, wobei die drei Substituenten am Arsen gleich oder verschieden sein können.

Die Gesamtkonzentration an Liganden beträgt, bezogen auf den die Abgangsgruppe Met¹ tragenden Heteroaromaten [XV-a], bevorzugt bis 1 Mol-%, besonders bevorzugt 0,01 bis 0,5 Mol-%.

- 10 Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden zweckmässigerweise die Edukte, das Lösemittel, das Halogenidsalz, der Katalysator und gegebenenfalls der Ligand durchmischt und bevorzugt bei einer Temperatur von 0 °C – 200 °C, besonders bevorzugt bei 60-150 °C umgesetzt. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einigen Minuten und 48 Stunden. Ausser als Eintopfreaktion
15 kann die Reaktion auch so geführt werden, dass die verschiedenen Reaktanden im Laufe der Reaktion kontrolliert zudosiert werden, wobei unterschiedliche Dosiervarianten möglich sind.

Die erfindungsgemäßen Verfahren werden im Allgemeinen unter Normaldruck durchgeführt. Es ist jedoch auch möglich, unter erhöhtem oder vermindertem Druck zu arbeiten. Die Reaktion wird im Allgemeinen unter Verwendung eines Schutzgases wie z.B. Argon oder Stickstoff durchgeführt.

- 20 Das molare Reaktandenverhältnis vom Halopyrazol [VI] zur Organozinnverbindung [XV-a2] beträgt bevorzugt 0.9 bis 2.

- Nach beendeter Umsetzung wird der als Feststoff anfallende Katalysator durch Filtration abgetrennt, das Rohprodukt vom Lösungsmittel bzw. den Lösungsmitteln befreit und anschließend nach dem Fachmann bekannten und dem jeweiligen Produkt angemessenen Methoden, z. B. durch
25 Umkristallisation, Destillation, Sublimation, Zonenschmelzen, Schmelzkristallisation oder Chromatographie, gereinigt.

Schritt (V7)


Eine weitere Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [I] ist in Schema 1 gezeigt.

- Verbindungen der Formel [I] lassen sich durch z.B. durch Kupplung der Pyrazolboronsäuren [V] mit
30 Heterocyclen der Formel [IV-b] (wobei Z² eine Fluchtgruppe wie z.B. Cl oder Br darstellt) in Gegenwart eines Katalysators, einer Base und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten

Temperaturen nach bekannten Literaturvorschriften herstellen (*Top. Curr. Chem.* **2002**, 219, 11; b - A. Suzuki, *Organomet. Chem.* **1999**, 28, 147 und darin zitierte Literatur).

Verbindungen der Formel **[IV-b1]** (in denen X¹ für C-H steht) sind kommerziell verfügbar oder lassen sich nach Literaturvorschriften herstellen (Schema 17). Eine Methode zur Herstellung geeigneter Halogenheterocyclen **[IV-b1]** ist die Umsetzung der Pyridin-N-oxide mit Halogenierungsmitteln (z.B. PCl₃, POCl₃, SOCl₂ oder Methansulfonylchlorid) (vgl. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2007**, 17, 7, 1934-1937).


Schema 17



Die Pyridin-N-oxide **[XVIII]** sind bekannt oder können durch Oxidation der entsprechenden Pyridine (z.B. mit H₂O₂, H₂O₂ + Methyltrioxorhenium, m-Chlorperoxybenzoesäure, Dimethyldioxiran oder H₂O₂ + Mangan tetrakis(2,6-dichlorphenyl)porphyrin) nach literaturbeschriebenen Vorschriften hergestellt werden (*ARKIVOC* **2001** (i) 242-268 und darin enthaltene Referenzen).

Eine weitere Methode zur Herstellung geeigneter Halogenheterocyclen **[IV-b1]** ist die Umsetzung der 4-Hydroxy-Pyridin Verbindungen **[XIX]** mit Halogenierungsmitteln (z.B. PCl₃, POCl₃) nach literaturbekannten Vorschriften (*Pol. J. Chem.* **1981**, 55, 4, 925 - 929) (Schema 18).

Schema 18




Die Hydroxypyridine **[XIX]** sind bekannt.

Verbindungen der Formel **[IV-b2]** (in denen X¹ für C-H steht) lassen sich nach Literaturvorschriften herstellen (Schema 19). Eine Methode zur Herstellung geeigneter Halogenheterocyclen **[IV-b2]** ist die Umsetzung von Aminoheterocyclen der Formel **[XX]** mit Trifluormethylketonen in Gegenwart von Titan-IV-chlorid, einer Base und eines Lösungsmittels (*J. Am. Chem. Soc.* **1996**, 118, 7134-7138).

Das im Verlauf dieser Umsetzung entstehende Imin kann durch Reduktion nach Literaturvorschriften (*Tetrahedron* **2009**, 65, 9807–9813) in das Amin **[IV-b2]** überführt werden.

Schema 19



- 5 Die Aminoheterocyclus **[XX]** (in denen X¹ für C-H steht) sind bekannt (US2006/189617).

Die Auswahl von Lösungsmittel, Base, Temperatur, Katalysators und gegebenenfalls zugesetztem Liganden kann je nach eingesetzten Substrat **[IV-b]** variieren und umfasst die unter Schritt **(V3)** beschriebenen Variationsmöglichkeiten für die C-C-Kupplung von Verbindung der Formel **[V]**.


- 10 Nach beendeter Umsetzung wird der als Feststoff anfallende Katalysator durch Filtration abgetrennt, das Rohprodukt vom Lösungsmittel bzw. den Lösungsmitteln befreit und anschließend nach dem Fachmann bekannten und dem jeweiligen Produkt angemessenen Methoden, z. B. durch Umkristallisation, Destillation, Sublimation, Zonenschmelzen, Schmelzkristallisation oder Chromatographie, gereinigt.

Schritt V8

- 15 Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel **[XIII]** ist in Schema 1 gezeigt.


- Verbindungen mit der allgemeinen Formel **[XIII]** sind bekannt (R² = H) oder können analog zu in der Literatur beschriebenen Vorschriften (siehe z.B. *Acta Chem. Scand., Series B: Organic Chemistry and Biochemistry* **1982**, 36, 2, 101-108 und EP-A-1 382 603) synthetisiert werden. Eine Möglichkeit zur Herstellung der Verbindungen **[XIII]** ist eine Halogenierung der Pyrazole **[XIV]** mit einem Halogenierungsmittel in einem geeigneten Lösungsmittel zum Pyrazol **[XXIV]** gefolgt von einer Umsetzung des erhaltenen Halogenpyrazols mit einer geeigneten Schutzgruppe PG (z.B. 3,4-Dihydro-2H-pyran) zu Verbindungen der Formel **[XIII]** (Schema 20).
- 20

Schema 20




Pyrazole der Formel [XIV] ($R^2 = H, CH_3$) sind kommerziell erhältlich oder durch in der Literatur beschriebene Prozesse darstellbar. Methoden zur Herstellung geeigneter Pyrazole [XIV] sind z.B. die Umsetzung von Alkinen mit TMS-Diazomethan (Schema 21) oder die Reaktion von Methylketonen mit Dimethylformamid-dimethylacetal und Hydrazin (Schema 22) nach beschriebenen Methoden (US 0,063,744 A).

Schema 21



10 Schema 22



Als Halogenierungsmittel können z.B. N-Bromsuccinimid und Brom verwendet werden.

Als Lösungsmittel für die Halogenierungsreaktion können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. Amide (z.B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon), halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff), und Essigsäure verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die Wahl der Lösungsmittel kann je nach verwendetem Halogenierungsreagenz variieren. Die bevorzugten Lösungsmittel sind Essigsäure und Dimethylformamid.

Die Halogenierungsreaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C – 100 °C durchgeführt und vorzugsweise bei 20 °C – 30 °C. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einigen Minuten und 48 Stunden.

- 5 Nach Beendigung der Halogenierungsreaktion, werden die Rohprodukte von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Falls notwendig werden die Verbindungen durch Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt oder können gegebenenfalls auch direkt zur weiteren Umsetzung ohne vorhergehende Reinigung eingesetzt werden.

- 10 Die erhaltenen Brompyrazole [XXIV] werden durch Erhitzen in 3,4-Dihydro-2H-pyran in Gegenwart einer katalytischen Menge Lewissäure (z.B. p-Toluolsulfonsäure) am Stickstoffatom geschützt. Die erhaltenen Produkte können als Regioisomere auftreten. Falls notwendig werden die Verbindungen durch Destillation oder Chromatographie gereinigt oder können gegebenenfalls auch direkt zur weiteren Umsetzung ohne vorhergehende Reinigung eingesetzt werden.

Schritt V9

- 15 Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [XII] ist in Schema 1 gezeigt.

- Verbindungen der Formel [XII] lassen sich z.B. durch Kupplung der Halopyrazole [XIII] mit metallierten Heterocyclen der Formel [XV-a] (wobei Met für einen Boronester oder Boronsäure wie z.B. B(OiPr)₃, B(OH)₂ steht) in Gegenwart eines Katalysators, einer Base, gegebenenfalls eines Liganden und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen nach bekannten
20 Literaturvorschriften herstellen (*Top. Curr. Chem.* **2002**, 219, 11; *Organomet. Chem.* **1999**, 28, 147 und darin zitierte Literatur, *Org. Lett.* **2005**, 7, 21, 4753-4756).

- Verbindungen der Formel [XII] lassen sich außerdem z.B. durch Kupplung der Halopyrazole [XIII] mit metallierten Heterocyclen der Formel [XV-a], in Gegenwart eines Katalysators, gegebenenfalls eines anorganischen oder organischen Halogenid-Salzes, gegebenenfalls eines Liganden und eines
25 geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen nach bekannten Literaturvorschriften herstellen (vgl. *Synthesis* **1992**, 803-815).

Die Herstellung der Verbindungen des Typs [XV-a] ist unter Schritt (V6) für die analoge Umsetzung der Halogenpyrazole [VI] beschrieben.

- Die Auswahl von Lösungsmittel, gegebenenfalls zugesetzter Base oder Halogenidsalz, Temperatur,
30 Katalysators und gegebenenfalls zugesetztem Liganden kann je nach eingesetzten Substrat [XV-a] variieren und umfasst die unter Schritt (V6) beschriebenen Variationsmöglichkeiten für die C-C-

Kupplung von Verbindungen der Formel [VI]. Dabei wird üblicherweise bei der Umsetzung von Verbindungen der Formel [XV-a], in denen Met¹ für eine Zinnalkyl tragende Gruppe (wie z.B. Sn(Bu)₃) steht, auf den Zusatz einer Base verzichtet und stattdessen ein Halogenidsalz hinzugefügt, wie unter Schritt (V6) beschrieben.

5 Schritt V10

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [XI] ist in Schema 1 gezeigt.

Eine Methode zur Herstellung der Verbindungen der Formel [XI] ist die Metallierung des geschützten Pyrazoles [XII] mit einer Base (wie z.B. n-Butyllithium) in einem Lösungsmittel (wie z.B. Diethylether oder Tetrahydrofuran) und nachfolgende Umsetzung mit einem Boronsäureester (wie z.B. B(i-PrO)₃ oder B(OMe)₃) und Pinakol nach literaturbekannten Methoden (vgl. *Tetrahedron Letters* **2006**, 47; 27; 2006; 4665-4669 und darin beschriebene Literatur) oder mit einem Trialkylzinnhalogenverbindung (wie z.B. Bu₃SnCl) analog zu literaturbekannten Methoden (WO 06/108591)

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. zyklische und azyklische Ether (z.B. Diethylether, Tetrahydrofuran, Dioxane) verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Das bevorzugte Lösungsmittel ist Tetrahydrofuran.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von -80°C bis 0 °C durchgeführt und vorzugsweise bei -78 °C bis -20 °C. Im Verlauf der Reaktionsführung kann eine Änderung der Reaktionstemperatur (z.B. nach dem Metallierungsschritt) günstig oder notwendig sein, um die Reaktion mit dem zweiten Reaktionspartner (z.B. dem Alkylzinnhalogenid oder dem Borsäureester) zu gewährleisten. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einigen Minuten und 48 Stunden.

Die Aufarbeitung erfolgt üblicherweise durch Zugabe einer Protonenquelle (z.B. einer gesättigten wässrigen Ammoniumchlorid-Lösung) und nachfolgende Phasentrennung. Anschließend werden die Verbindungen [XI] von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt.

Alternativ kann die Reaktionsmischung aber auch ohne wässrige Aufarbeitung eingeeengt und die Rohprodukte [XI] direkt aus der Reaktionsmischung herausdestilliert werden.

Falls notwendig, werden die so erhaltenen Verbindungen durch Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt.

Schritt V11

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [X] ist in Schema 1 gezeigt.

Verbindungen der Formel [X] lassen sich z.B. durch Kupplung der Pyrazole der Formel [XI] (wobei Met für einen Boronester oder Boronsäure wie z.B. B(OiPr)₃, B(OH)₂ steht) mit Verbindungen der Formel [XVII] (wobei Z⁴ eine Fluchtgruppe wie z.B. Cl, Br, I, Mesylat oder Triflat darstellt) in Gegenwart eines Katalysators, einer Base, gegebenenfalls eines Liganden und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen nach bekannten Literaturvorschriften herstellen (*Top. Curr. Chem.* **2002**, 219, 11; *Organomet. Chem.* **1999**, 28, 147 und darin zitierte Literatur, *Org. Lett.* **2005**, 7, 21, 4753-4756).

Verbindungen der Formel [X] lassen sich außerdem z.B. durch Kupplung der Pyrazole der Formel [XI] (wobei Met³ für eine Zinnalkyl tragende Gruppe wie z.B. -Sn(Bu)₃ steht) mit Verbindungen der Formel [XVII] (wobei Z⁴ eine Fluchtgruppe wie z.B. Cl, Br, I, Mesylat oder Triflat darstellt) in Gegenwart eines Katalysators, gegebenenfalls eines anorganischen oder organischen Halogenid-Salzes, gegebenenfalls eines Liganden und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen nach bekannten Literaturvorschriften herstellen (vgl. *Synthesis* **1992**, 803-815).

Verbindungen der Formel [XVII] wie z.B. 4-Brom-1-fluorbenzol sind bekannt und kommerziell verfügbar.

Bei der Kupplung der Pyrazole [XI] mit Verbindungen der Formel [XVII] kann die Auswahl von Lösungsmittel, Base, Temperatur, Katalysators und gegebenenfalls zugesetztem Liganden je nach eingesetzten Pyrazol [XI] variieren und umfasst die unter Schritt (V6) beschriebenen Variationsmöglichkeiten.

Bei der Kupplung der Pyrazole [XI] mit Verbindungen der Formel [XVII] kann die Auswahl eines Katalysators, gegebenenfalls eines anorganischen oder organischen Halogenid-Salzes, gegebenenfalls eines Liganden und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen je nach eingesetzten Pyrazol [XI] variieren und umfasst die unter Schritt (V3) beschriebenen Variationsmöglichkeiten.

Die erfindungsgemäßen Verfahren werden im Allgemeinen unter Normaldruck durchgeführt. Es ist jedoch auch möglich, unter erhöhtem oder vermindertem Druck zu arbeiten.

Die Reaktion wird im Allgemeinen unter Verwendung eines Schutzgases wie z.B. Argon oder Stickstoff durchgeführt.

Das molare Reaktandenverhältnis vom Pyrazol [XI] zur Verbindung der Formel [XVII] beträgt bevorzugt 0.9 bis 2.

Nach beendeter Umsetzung wird der als Feststoff anfallende Katalysator durch Filtration abgetrennt, das Rohprodukt vom Lösungsmittel bzw. den Lösungsmitteln befreit und anschließend nach dem
5 Fachmann bekannten und dem jeweiligen Produkt angemessenen Methoden, z. B. durch Umkristallisation, Destillation, Sublimation, Zonenschmelzen, Schmelzkristallisation oder Chromatographie, gereinigt.

Schritt (V12)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [IX] ist in Schema 1 gezeigt.

10 Eine Verbindung der Formel [X] wird in eine Verbindung der Formel [IX] durch geeignete Methoden zur Entfernung von Schutzgruppen, die in der Literatur beschrieben sind (*“Protective Groups in Organic Synthesis”*; Third Edition; Theodora W. Greene, Peter G. M. Wuts; **1999**, Wiley-VCH, S. 494-653, und dort zitierte Literatur), überführt.

2-(Trimethylsilyl-ethoxy)methyl und Tetrahydropyran-2-yl Schutzgruppen können z.B. im sauren
15 Medium (z.B. mit methanolischer HCl oder Trifluoressigsäure) nach literaturbekannten Vorschriften entfernt werden (WO 03/099822 und *J. Org. Chem.* **2008**, 73, 4309–4312 und darin enthaltene Literatur). Benzylische Schutzgruppen können hydrogenolytisch mit einer Wasserstoffquelle (z.B. Wasserstoff, Ammoniumformiat, Ameisensäure oder Cyclohexen) in Gegenwart eines Katalysators (z.B. Palladium auf Aktivkohle oder Palladiumhydroxid auf Aktivkohle) nach literaturbekannten
20 Vorschriften entfernt werden (EP-A-1 228 067).

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. Alkohole (z.B. Methanol, Ethanol, Propanol), zyklische und azyklische Ether (z.B. Diethylether, Tetrahydrofuran, Dioxane), aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol, Toluol, Xylol),
halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff),
25 halogenierte aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Chlorbenzol, Dichlorbenzol), Nitrile (z.B. Acetonitril), Carbonsäureester (z.B. Essigsäureethylester), Amide (z.B. N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid), Dimethylsulfoxid, 1,3-Dimethyl-2-imidazolinon, Wasser und Essigsäure verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden.

30 Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C – 150 °C durchgeführt und vorzugsweise bei Raumtemperatur, aber sie kann auch bei Rückflusstemperatur der Reaktionsmischung durchgeführt werden. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab

der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer halben Stunde und 72 Stunden.

Nach Beendigung der Reaktion, werden die Verbindungen [IX] von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Falls notwendig werden die Verbindungen durch
5 Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt oder können, wenn gewünscht, auch im nächsten Schritt ohne vorhergehende Reinigung eingesetzt werden. Es ist außerdem möglich, die Verbindung der allgemeinen Formel [IX] als Salz zu isolieren, z.B. als Salz der Salzsäure oder der Trifluoressigsäure.

Schritt (V13)

10 Eine weitere Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [II] ist in Schema 1 gezeigt.

Verbindungen der Formel [IX] lassen sich analog den in Schritt (V1) beschriebenen Methoden in Verbindungen der Formel [II] überführen (Schema 1) wobei in der Verbindung der Formel [IX] in $R^{4/401}$ keine Funktionalität mit reaktiven aciden H-Atomen enthalten sein sollte.

Die Auswahl von Lösungsmittel, Base und Temperatur kann je nach eingesetzten Substrat [IX]
15 variiieren und umfasst die unter Schritt (V1) beschriebenen Variationsmöglichkeiten.

Nach Beendigung der Reaktion, werden die Verbindungen [II], von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Je nach der Art der verwendeten Substrate der Formel [XVI] und der Reaktionsbedingungen können die Verbindungen des Formel [II], in denen R^3 nicht für Wasserstoff steht, als reine Regioisomere oder als Mischung beider möglicher Regioisomerer (wobei
20 die Gruppe $R^{3/301}$ beide Positionen am N-Atom des Pyrazols einnehmen kann) erhalten werden. In dem Falle, daß Mischungen an Regioisomeren erhalten werden, können diese durch physikalische Methoden (wie z.B. Kristallisations- oder Chromatographie-Methoden) gereinigt werden.

In Analogie kann die im Schema 2 beschriebene Synthese der Pyrazole [I-d], sowie die im Schema 3 beschriebene Synthese der Pyrazole [I-e] und [XXIX] erfolgen, wobei in den Verbindungen der
25 Formel [IX-b], [XXVII] und [XXVIII] in R^4 keine Funktionalität mit reaktiven aciden H-Atomen enthalten sein sollte.

Schritt (V14)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [XXV] ist in Schema 2 gezeigt.

Nach literaturbekannten Methoden (*J. Med. Chem.* **2007**, 50, 2732-2736, WO 05/040155, WO
30 01/74811, US 6,342,608 A) wird ein Carbonsäureester, -nitril, -dialkylamid oder -N,O-dialkylamid in

Gegenwart einer starken Base mit einem Alkylpyridin oder Alkylpyrimidin der Formel [XXIV] umgesetzt.

Basen, die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorzugsweise Verwendung finden, sind Alkalimetallalkoxide (wie z.B. KOtBu oder NaOtBu), Lithiumamide (wie z.B. LDA oder LiHMDS) oder Metallhydride (wie z.B. KH oder NaH).

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. zyklische und azyklische Ether (z.B. Diethylether, Tetrahydrofuran, Dioxane, Dimethoxyethan), Amide (z.B. N,N-Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid), Dimethylsulfoxid oder HMPT verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die Verwendung polarer Lösungsmittel wie N,N-Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid oder HMPT ist bevorzugt.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von -78 °C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels durchgeführt, vorzugsweise im Bereich von -20 °C bis 40 °C. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer halben Stunde und 72 Stunden.

Nach Beendigung der Reaktion, werden die Verbindungen [XXV] von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Falls notwendig werden die Verbindungen durch Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt oder können, wenn gewünscht, auch im nächsten Schritt ohne vorhergehende Reinigung eingesetzt werden.

Die Alkylpyridine oder Alkylpyrimidine der Formel [XXIV] sind kommerziell erhältlich oder können nach literaturbekannten Methoden (z.B. WO 04/058776 oder WO 04/035545) hergestellt werden.

In Analogie kann die im Schema 8 beschriebene Synthese der Verbindungen der Formel [XXXVII], sowie die im Schema 9 beschriebene Synthese der Verbindungen der Formel [XLIII] erfolgen, wobei in den Verbindungen der Formel [XXXVI] und [XLII] in R⁵ und R⁶ keine Funktionalität mit reaktiven aciden H-Atomen enthalten sein sollte.

Schritt (V15)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [XXVI] ist in Schema 2 gezeigt.

Verbindungen der generellen Formel [XXVI] werden nach literaturbekannten Methoden (*J. Med. Chem.* **2007**, 50, 2732-2736 und WO 05/040155, für R^{4b/401b} = NHC(O)OAlkyl z.B. EP-A-1 553

096) durch Umsetzung einer Verbindung der Formel [XXV] mit DMF-Dialkylacetal erhalten. Die Reaktion kann in Gegenwart eines Lösungsmittels durchgeführt werden, geeignete Lösungsmittel sind Alkohole (wie z.B. Ethanol), Ester (wie z. B. Essigsäureethylester), Cyclische Ether (wie z.B. Tetrahydrofuran) oder Amide (z.B. N,N-Dimethylformamid, N-Methylpyrrolidon). Die Reaktion
5 kann in Gegenwart einer Base (z.B. Triethylamin) durchgeführt werden.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von -78 °C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels durchgeführt.

In Analogie kann die im Schema 8 beschriebene Synthese der Verbindungen der Formel [XXXVIII], sowie die im Schema 9 beschriebene Synthese der Verbindungen der Formel [XLV] erfolgen.

10 Schritt (V16)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [XXVII] ist in Schema 2 gezeigt.

Verbindungen der generellen Formel [XXVII] werden durch Reaktion von Verbindungen der generellen Formel [XXVI] mit Hydrazin oder Hydrazinhydrat nach literaturbekannten Methoden (z.B. EP-A-1 553 096, EP-A-1 188 754) erhalten. Dabei steht die im Schema 2 genannte Gruppe Z⁶
15 für eine Fluchtgruppe wie z.B. NMe₂.

Die Reaktion kann in Gegenwart einer Base wie z.B. Triethylamin durchgeführt werden.

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. zyklische und azyklische Ether (z.B. Tetrahydrofuran, Dioxane, Dimethoxyethan) oder Alkohole (z.B. Ethanol, Methanol) verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder
20 mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die Verwendung polarer Lösungsmittel wie z.B. Ethanol ist bevorzugt.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels durchgeführt, vorzugsweise im Bereich von 25 °C. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer halben
25 Stunde und 72 Stunden. Die Reaktion kann in einer Mikrowellenapparatur (z.B. CEM Explorer) bei erhöhter Temperatur durchgeführt werden, wobei sich die benötigte Reaktionszeit verkürzen kann.

In Analogie kann die im Schema 8 beschriebene Synthese der Verbindungen der Formel [XXXIX], sowie die im Schema 9 beschriebene Synthese der Verbindungen der Formel [XLVI] erfolgen.

Schritt (V17)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel **[I-d]** ist in Schema 2 gezeigt.

Verbindungen der generellen Formel **[I-d]** werden durch Reaktion von Verbindungen der generellen Formel **[XXVI]** mit Alkylhydrazinen der Formel $R^{3/301}-NH-NH_2$ nach literaturbekannten Methoden (z.B. US 6,335,336 A) erhalten. Dabei steht die im Schema 2 genannte Gruppe Z^6 für eine Fluchtgruppe wie z.B. NMe_2 .

Die Reaktion kann in Gegenwart einer Base wie z.B. Triethylamin durchgeführt werden.

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. zyklische und azyklische Ether (z.B. Tetrahydrofuran, Dioxane, Dimethoxyethan) oder Alkohole (z.B. Ethanol, Methanol) verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die Verwendung polarer Lösungsmittel wie z.B. Ethanol ist bevorzugt.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels durchgeführt, vorzugsweise im Bereich von 25 °C. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer halben Stunde und 72 Stunden. Die Reaktion kann in einer Mikrowellenapparatur (z.B. CEM Explorer) bei erhöhter Temperatur durchgeführt werden, wobei sich die benötigte Reaktionszeit verkürzen kann.

Schritt (V18)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel **[I-d]** bei denen $R^{3/301}$ für Cyclopropyl steht, ist die Umsetzung von Pyrazolen der Formel **[XXVII]** mit einer Cyclopropylboronsäure nach literaturbekannten Vorschriften (*J. Org. Chem.* **2008**, 73, 6441-6444 oder WO 08/088692).

Die Reaktion wird in Gegenwart einer Base (wie z.B. Triethylamin, Pyridin, Natriumcarbonat, Kaliumphosphat, Cäsiumcarbonat) und eines Cu(II)-Salzes (wie z.B. $Cu(OAc)_2$ oder $CuCl_2$) durchgeführt.

Außerdem kann die Reaktion unter Zusatz eines geeigneten Liganden (wie z.B. Pyridin oder 2,2-Bipyridin, N,N,N',N' -Tetramethylethylenediamin oder 1,10-Phenanthridin) erfolgen.

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. zyklische und azyklische Ether (z.B. Tetrahydrofuran, Dioxane, Dimethoxyethan), Halogenalkane (z.B. Dichlorethan) oder aromatische Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol, Toluol)

verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die Verwendung von Halogenalkanen wie z.B. Dichlorethan ist bevorzugt.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 50 °C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels durchgeführt, vorzugsweise im Bereich von 70 °C. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer halben Stunde und 72 Stunden. Die Reaktion kann in einer Mikrowellenapparatur (z.B. CEM Explorer) bei erhöhter Temperatur durchgeführt werden, wobei sich die benötigte Reaktionszeit verkürzen kann.

10 Analog zur im Schema 2 beschriebenen Synthese der Pyrazole [I-d], kann mit diesem Verfahren die im Schema 3 beschriebene Synthese der Pyrazole [I-e] sowie die im Schema 4 beschriebene Synthese der Pyrazole [XX] erfolgen.

Schritt (V19)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [XXVIII] ist in Schema 3 gezeigt.

15 Verbindungen der generellen Formel [XXVIII] werden durch Halogenierung von Pyrazolen der Formel [XXVII] nach literaturbekannten Vorschriften (z.B. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2008, 18, 509-512) erhalten.

Als Halogenierungsmittel können z.B. N-Bromsuccinimid und Brom verwendet werden.

Als Lösungsmittel für die Halogenierungsreaktion können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. Amide (z.B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon), halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff), und Essigsäure verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die Wahl der Lösungsmittel kann je nach verwendetem Halogenierungsreagenz variieren. Die bevorzugten Lösungsmittel sind Essigsäure und Dimethylformamid.

Die Halogenierungsreaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C bis 100 °C durchgeführt und vorzugsweise bei 20 °C bis 80 °C. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einigen Minuten und 48 Stunden.

Nach Beendigung der Halogenierungsreaktion, werden die Rohprodukte von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Falls notwendig werden die Verbindungen durch Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt oder können gegebenenfalls auch direkt zur weiteren Umsetzung ohne vorhergehende Reinigung eingesetzt werden.

5 Schritt (V20)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel **[IX-b]** ist in Schema 3 gezeigt.

Verbindungen der Formel **[IX-b]** bei denen R^{2a} für Alkyl oder Cycloalkyl steht, können durch C-C-Kupplung von Pyrazolen der Formel **[XXIX]** mit Boronsäuren oder Boronsäureestern (z.B. Trimethylboroxin, Cyclopropylboronsäureester) nach literaturbekannten Vorschriften (US 0,018,132) hergestellt werden.

Die Reaktion wird in Gegenwart einer Base (wie z.B. Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat oder Cäsiumcarbonat) und eines Palladium-Katalysators (wie z.B. Dichlor[1,1'-ferrocenylbis(diphenylphosphan)]palladium(II)*CH₂Cl₂) durchgeführt.

15 Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. zyklische und azyklische Ether (z.B. Tetrahydrofuran, Dioxane, Dimethoxyethan) verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 50 °C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels durchgeführt, vorzugsweise im Bereich von 90 °C. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer halben Stunde und 72 Stunden. Die Reaktion kann in einer Mikrowellenapparatur (z.B. CEM Explorer) bei erhöhter Temperatur durchgeführt werden, wobei sich die benötigte Reaktionszeit verkürzen kann.

25 Bei der C-C-Kupplung der Pyrazolen der Formel **[XXIX]** mit Verbindungen **[XXX]** (wobei Met² für einen Boronester oder Boronsäure wie z.B. B(OiPr)₃, B(OH)₂ steht) kann die Auswahl eines Katalysators, einer Base, eines Liganden und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen je nach eingesetzten Pyrazol **[XXIX]** variieren und umfasst ebenfalls die unter Schritt **(V3)** beschriebenen Variationsmöglichkeiten.

Zur Aufarbeitung wird die Reaktionsmischung mit Wasser versetzt und mit Essigsäureethylester extrahiert. Die organische Phase wird abgetrennt und das Lösungsmittel wird im Vakuum entfernt.

Das erhaltene Rohprodukt wird nach literaturbekannten Methoden (z.B. "*Protective Groups in Organic Synthesis*"; Third Edition; Theodora W. Greene, Peter G. M. Wuts; 1999, Wiley-VCH, S. 639-640, und dort zitierte Literatur) mit Trifluoressigsäure umgesetzt, um die am Pyrazol befindliche Gruppe R^3 abzuspalten (z.B. im Falle $R^3 = p$ -Methoxybenzyl) wobei die Verbindungen der Formel [IX-b] erhalten werden.

Nach Beendigung der Reaktion, werden die Verbindungen [IX-b] von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Falls notwendig, werden die Verbindungen durch Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt.

Schritt (V21)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [I-e] ist in Schema 3 gezeigt.

Verbindungen der Formel [I-e] bei denen R^{2a} für Alkyl oder Cycloalkyl steht, können durch C-C-Kupplung von Pyrazolen der Formel [XXIX] mit Boronsäuren oder Boronsäureestern (z.B. Trimethylboroxin, Cyclopropylboronsäureester) nach literaturbekannten Vorschriften (US 0,018,132 A) hergestellt werden.

Die Bedingungen für die Kupplung entsprechen den unter obigem Verfahren (V20) angegebenen Bedingungen ohne die Entfernung der Gruppe $R^{3/301}$ durch Entschützungsreaktion.

Nach Beendigung der Reaktion, werden die Verbindungen [I-e] von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Falls notwendig, werden die Verbindungen durch Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt.

Schritt (V22)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [XXXII] ist in Schema 4 gezeigt.

Verbindungen der generellen Formel [XXXII] werden durch Reaktion von Verbindungen der generellen Formel [XXXI] mit Alkylhydrazinen der Formel $R^{3/301}$ -NH-NH₂ nach literaturbekannten Methoden (z.B. US5744426) erhalten.

Die Reaktion kann in Gegenwart einer Säure wie z.B. Essigsäure durchgeführt werden.

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel verwendet werden, wie z.B. zyklische und azyklische Ether (z.B. Tetrahydrofuran, Dioxane,

Dimethoxyethan), Alkohole (z.B. Ethanol, Methanol) oder Ester (Essigester) verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die Verwendung polarer Lösungsmittel wie z.B. Ethanol ist bevorzugt.

- 5 Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels durchgeführt, vorzugsweise unter Rückfluss. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer halben Stunde und 72 Stunden. Die Reaktion kann in einer Mikrowellenapparatur (z.B. CEM Explorer) bei erhöhter Temperatur durchgeführt werden, wobei sich die benötigte Reaktionszeit verkürzen kann.

Schritt (V23)

- 10 Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [XXXIII] ist in Schema 4 gezeigt.

Verbindungen der generellen Formel [XXXIII] werden durch Reaktion von Verbindungen der generellen Formel [XXXII] mit Halogendifluormethanverbindungen (wie z.B. Chlordifluormethan, Natrium chlordifluoracetat) nach literaturbekannten Methoden (z.B. US5861359, *Org. Lett.* **2006**, 8, 17, 3805-3808) erhalten.

- 15 Die Reaktion wird in Gegenwart einer Base wie z.B. Kaliumcarbonat durchgeführt.

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. Amide (z.B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon), zyklische und azyklische Ether (z.B. Tetrahydrofuran, Dioxane, Dimethoxyethan) oder Nitrile (z.B. Acetonitril) verwendet werden.

- 20 Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 25°C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels durchgeführt. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer halben Stunde und 72 Stunden.

Schritt (V24)

- 25 Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [VI-b] ist in Schema 4 gezeigt.

Verbindungen der generellen Formel [VI-b] werden durch Halogenierung von Pyrazolen der Formel [XXXIII] nach literaturbekannten Vorschriften (z.B. US6482774) erhalten.

Als Halogenierungsmittel können z.B. N-Bromsuccinimid oder Brom verwendet werden.

Als Lösungsmittel für die Halogenierungsreaktion können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. Amide (z.B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon), halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff) oder Essigsäure verwendet werden oder die Reaktion kann in
5 Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die Wahl der Lösungsmittel kann je nach verwendetem Halogenierungsreagenz variieren. Die bevorzugten Lösungsmittel sind Dichlormethan und Tetrachlormethan.

Die Halogenierungsreaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C – 100 °C durchgeführt und vorzugsweise bei 20 °C – 80 °C. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der
10 Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einigen Minuten und 48 Stunden.

Nach Beendigung der Halogenierungsreaktion, werden die Rohprodukte von der Reaktionsmischung durch eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Falls notwendig werden die Verbindungen durch Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt oder können gegebenenfalls auch
15 direkt zur weiteren Umsetzung ohne vorhergehende Reinigung eingesetzt werden.

Schritt (V25)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel **[VI-c]** ist in Schema 4 gezeigt.

Verbindungen der generellen Formel **[VI-c]** werden durch Etherspaltung von Pyrazolen der Formel **[VI-b]**, wobei R² für 4-Fluor-2-methoxyphenyl steht, nach literaturbekannten Vorschriften (z.B.
20 WO2007/105058) erhalten.

Die Reaktion wird in Gegenwart einer Lewissäure z.B. Bortribromid und eines unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittels (z.B. Dichlormethan) durchgeführt. Die Reaktion wird üblicherweise bei Temperaturen von -20°C +20°C durchgeführt, vorzugsweise bei -5 °C bis 0 °C.

Schritt (V26)

25 Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel **[III]** ist in Schema 6 gezeigt.

Verbindungen der Formel **[III]** lassen sich z.B. durch Kupplung der Halopyrazole **[VI]** mit metallierten Heterocyclen der Formel **[XV-a]** (wobei Met für einen Boronester oder Boronsäure wie z.B. B(OiPr)₃, B(OH)₂ steht) in Gegenwart eines Katalysators, einer Base, gegebenenfalls eines Liganden und eines geeigneten Lösungsmittels bei geeigneten Temperaturen nach bekannten

Literaturvorschriften herstellen (*Top. Curr. Chem.* **2002**, 219, 11; *Organomet. Chem.* **1999**, 28, 147 und darin zitierte Literatur, *Org. Lett.* **2005**, 7, 21, 4753-4756).

Die Herstellung der Verbindungen des Typs [VI] ist unter Schritt (V6) beschrieben.

- Die Auswahl von Lösungsmittel, zugesetzter Base, Temperatur, Katalysators und gegebenenfalls
- 5 zugesetztem Liganden kann je nach eingesetzten Substrat [VI] variieren und umfasst die unter Schritt (V6) beschriebenen Variationsmöglichkeiten für die C-C-Kupplung von Verbindung der Formel [VI].

Schritt (V27)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel [XLI] ist in Schema 8 gezeigt.

- 10 Verbindungen der generellen Formel [XLI] werden durch Oxidation von Thioalkylpyrimidinen der Formel [XL] nach literaturbekannten Vorschriften (z.B. WO2009/16460 oder WO2007/24843) erhalten.

Als Oxidationsmittel können z.B. m-Chlorperbenzoesäure (m-CPBA) oder Oxone (Kaliumperoxomonosulfat) verwendet werden.

- 15 Als Lösungsmittel für die Oxidationsreaktion können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. halogenierte Kohlenwasserstoffe (z.B. Dichlormethan), Ether (z.B. Tetrahydrofuran), Alkohole (z.B. Methanol) oder Wasser verwendet werden oder die Reaktion kann in Mischungen von zwei oder mehreren dieser Lösungsmittel ausgeführt werden. Die Wahl der Lösungsmittel kann je nach verwendetem Oxidationsreagenz variieren. Die bevorzugten
- 20 Lösungsmittel sind Dichlormethan (m-CPBA) und Wasser/THF Mischungen (Oxon).

Die Oxidationsreaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0 °C bis 20 °C durchgeführt. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einigen Stunden und 48 Stunden.

- Nach Beendigung der Oxidationsreaktion werden die Rohprodukte von der Reaktionsmischung durch
- 25 eine der üblichen Trenntechniken getrennt. Falls notwendig, werden die Verbindungen durch Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie gereinigt oder können gegebenenfalls auch direkt zur weiteren Umsetzung ohne vorhergehende Reinigung eingesetzt werden.

Schritt (V28)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel **[I-f]** ist in Schema 8 gezeigt.

Verbindungen der generellen Formel **[I-f]** werden durch Reaktion von Verbindungen der generellen Formel **[XLI]** mit primären oder sekundären Aminen nach literaturbekannten Methoden (z.B. WO2007/105058 oder US6423713) erhalten.

- 5 Die Reaktion wird gegebenenfalls in Gegenwart eines Salzes wie z.B. Cäsiumfluorid durchgeführt.

Als Lösungsmittel können alle üblichen, unter den Reaktionsbedingungen inerten Lösungsmittel, wie z.B. Amide (z.B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon), zyklische und azyklische Ether (z.B. Tetrahydrofuran, Dioxane, Dimethoxyethan), Nitrile (z.B. Acetonitril), Sulfoxide (z.B. Dimethylsulfoxid) oder Alkohole (z.B. Ethanol, n-Butanol) verwendet werden.

- 10 Alternativ kann die Reaktion ohne Lösungsmittel durchgeführt werden, z.B. bei Verwendung eines Überschusses an Amin.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 50°C bis zum Siedepunkt des Lösungsmittels durchgeführt. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer halben Stunde und 72

15 Stunden. Die Reaktion kann in einer Mikrowellenapparatur (z.B. CEM Explorer) bei erhöhter Temperatur durchgeführt werden, wobei sich die benötigte Reaktionszeit verkürzen kann.

Analog zur im Schema 8 beschriebenen Synthese der Pyrazole **[I-f]**, kann mit diesem Verfahren die im Schema 9 beschriebene Synthese der Pyrazole **[XLIV]** aus den Verbindungen des Typs **[XLIII]** erfolgen.

- 20 Schritt (V29)

Eine Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel **[III-a]** ist in Schema 8 gezeigt.

Verbindungen der generellen Formel **[III-a]** werden durch Dealkylierung von Verbindungen der generellen Formel **[I-f]** in denen

R^{x1} für H und

- 25 R^{x2} für Benzyl, 4-Methoxybenzyl, oder 3,4-Dimethoxybenzyl steht,

nach literaturbekannten Methoden (z.B. *J. Med. Chem.* **1999**, 42, 12, 2180-2190 oder *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2008**, 18, 14, 4006-4010) erhalten.

Die Reaktion wird üblicherweise in Gegenwart einer starken Säure z.B. Schwefelsäure, Salzsäure oder Trifluoressigsäure durchgeführt.

Die Reaktion wird normalerweise bei Temperaturen von 0°C bis zu 120°C durchgeführt. Die Reaktionszeit variiert in Abhängigkeit vom Maßstab der Reaktion und der Reaktionstemperatur, aber liegt im Allgemeinen zwischen einer halben Stunde und 72 Stunden. Die Reaktion kann in einer Mikrowellenapparatur (z.B. CEM Explorer) bei erhöhter Temperatur durchgeführt werden, wobei
5 sich die benötigte Reaktionszeit verkürzen kann.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft die nichtmedizinische Verwendung der erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole oder Mischungen dieser zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen sowie zur Reduktion von Mykotoxinen in Pflanzen und Pflanzenteilen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein Mittel zum Bekämpfen unerwünschter
10 Mikroorganismen sowie zur Reduktion von Mykotoxinen in Pflanzen und Pflanzenteilen., umfassend wenigstens ein Phenylpyri(mi)dinylazol gemäß der vorliegenden Erfindung.

Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen sowie zur Reduktion von Mykotoxinen in Pflanzen und Pflanzenteilen, dadurch gekennzeichnet, dass die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole auf die Mikroorganismen und/oder in deren
15 Lebensraum ausgebracht werden.

Die erfindungsgemäßen Stoffe weisen eine starke mikrobizide Wirkung auf und können zur Bekämpfung von unerwünschten Mikroorganismen, wie Fungi und Bakterien, im Pflanzenschutz und im Materialschutz eingesetzt werden.

Die erfindungsgemäßen Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel **(Ia)** und **(Ib)** besitzen sehr gute
20 fungizide Eigenschaften und lassen sich im Pflanzenschutz beispielsweise zur Bekämpfung von Plasmodiophoromyceten, Oomyceten, Chytridiomyceten, Zygomyceten, Ascomyceten, Basidiomyceten und Deuteromyceten einsetzen.

Bakterizide lassen sich im Pflanzenschutz beispielsweise zur Bekämpfung von Pseudomonadaceae, Rhizobiaceae, Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae und Streptomycetaceae einsetzen.

25 Die erfindungsgemäßen fungiziden Mittel können zur Bekämpfung von phytopathogenen Pilzen kurativ oder protektiv eingesetzt werden. Die Erfindung betrifft daher auch kurative und protektive Verfahren zum Bekämpfen von phytopathogenen Pilzen durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe oder Mittel, welche auf das Saatgut, die Pflanze oder Pflanzenteile, die Früchten oder den Boden, in welcher die Pflanzen wachsen, ausgebracht.

30 Die erfindungsgemäßen Mittel zum Bekämpfen von phytopathogenen Pilzen im Pflanzenschutz umfassen eine wirksame, aber nicht-phytotoxische Menge der erfindungsgemäßen Wirkstoffe.

„Wirksame, aber nicht-phytotoxische Menge“ bedeutet eine Menge des erfindungsgemäßen Mittels, die ausreichend ist, um die Pilzerkrankung der Pflanze ausreichend zu kontrollieren oder ganz abzutöten und die gleichzeitig keine nennenswerten Symptome von Phytotoxizität mit sich bringt. Diese Aufwandmenge kann im Allgemeinen in einem größeren Bereich variieren. Sie hängt von
5 mehreren Faktoren ab, z.B. vom zu bekämpfenden Pilz, der Pflanze, den klimatischen Verhältnissen und den Inhaltsstoffen der erfindungsgemäßen Mittel.

Erfindungsgemäß können alle Pflanzen und Pflanzenteile behandelt werden. Unter Pflanzen werden hierbei alle Pflanzen und Pflanzenpopulationen verstanden, wie erwünschte und unerwünschte Wildpflanzen oder Kulturpflanzen (einschließlich natürlich vorkommender Kulturpflanzen). Kulturpflanzen
10 können Pflanzen sein, die durch konventionelle Züchtungs- und Optimierungsmethoden oder durch biotechnologische und gentechnologische Methoden oder Kombinationen dieser Methoden erhalten werden können, einschließlich der transgenen Pflanzen und einschließlich der durch Sortenschutzrechte schütz-
baren oder nicht schütz-
baren Pflanzensorten. Unter Pflanzenteilen sollen alle oberirdischen und unterirdischen Teile und Organe der Pflanzen, wie Spross, Blatt, Blüte und Wurzel
15 verstanden werden, wobei beispielhaft Blätter, Nadeln, Stängel, Stämme, Blüten, Fruchtkörper, Früchte und Samen sowie Wurzeln, Knollen und Rhizome aufgeführt werden. Zu den Pflanzenteilen gehört auch Erntegut sowie vegetatives und generatives Vermehrungsmaterial, beispielsweise Stecklinge, Knollen, Rhizome, Ableger und Samen.

Als Pflanzen, welche erfindungsgemäß behandelt werden können, seien folgende erwähnt: Baumwolle,
20 Flachs, Weinrebe, Obst, Gemüse, wie *Rosaceae sp.* (beispielsweise Kernfrüchte wie Apfel und Birne, aber auch Steinfrüchte wie Aprikosen, Kirschen, Mandeln und Pfirsiche und Beerenfrüchte wie Erdbeeren), *Ribesioideae sp.*, *Juglandaceae sp.*, *Betulaceae sp.*, *Anacardiaceae sp.*, *Fagaceae sp.*, *Moraceae sp.*, *Oleaceae sp.*, *Actinidaceae sp.*, *Lauraceae sp.*, *Musaceae sp.* (beispielsweise Bananenbäume und -plantagen), *Rubiaceae sp.* (beispielsweise Kaffee), *Theaceae sp.*, *Sterculiaceae sp.*,
25 *Rutaceae sp.* (beispielsweise Zitronen, Orangen und Grapefruit); *Solanaceae sp.* (beispielsweise Tomaten), *Liliaceae sp.*, *Asteraceae sp.* (beispielsweise Salat), *Umbelliferae sp.*, *Cruciferae sp.*, *Chenopodiaceae sp.*, *Cucurbitaceae sp.* (beispielsweise Gurke), *Alliaceae sp.* (beispielsweise Lauch, Zwiebel), *Papilionaceae sp.* (beispielsweise Erbsen); Hauptnutzpflanzen, wie *Gramineae sp.* (beispielsweise Mais, Rasen, Getreide wie Weizen, Roggen, Reis, Gerste, Hafer, Hirse und Triticale),
30 *Asteraceae sp.* (beispielsweise Sonnenblume), *Brassicaceae sp.* (beispielsweise Weißkohl, Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Pak Choi, Kohlrabi, Radieschen sowie Raps, Senf, Meerrettich und Kresse), *Fabaceae sp.* (beispielsweise Bohne, Erdnüsse), *Papilionaceae sp.* (beispielsweise Sojabohne), *Solanaceae sp.* (beispielsweise Kartoffeln), *Chenopodiaceae sp.* (beispielsweise Zuckerrübe, Futterrübe, Mangold, Rote Rübe); Nutzpflanzen und Zierpflanzen in Garten und Wald; sowie jeweils genetisch
35 modifizierte Arten dieser Pflanzen. Bevorzugt werden Getreidepflanzen erfindungsgemäß behandelt.

Beispielhaft, aber nicht begrenzend, seien einige Erreger von pilzlichen Erkrankungen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, genannt:

Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger des Echten Mehltaus wie z.B. *Blumeria*-Arten, wie beispielsweise *Blumeria graminis*; *Podosphaera*-Arten, wie beispielsweise *Podosphaera leucotricha*;
 5 *Sphaerotheca*-Arten, wie beispielsweise *Sphaerotheca fuliginea*; *Uncinula*-Arten, wie beispielsweise *Uncinula necator*;

Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger von Rostkrankheiten wie z.B. *Gymnosporangium*-Arten, wie beispielsweise *Gymnosporangium sabinae*; *Hemileia*-Arten, wie beispielsweise *Hemileia vastatrix*; *Phakopsora*-Arten, wie beispielsweise *Phakopsora pachyrhizi* und *Phakopsora meibomia*;
 10 *Puccinia*-Arten, wie beispielsweise *Puccinia recondita* oder *Puccinia triticea*; *Uromyces*-Arten, wie beispielsweise *Uromyces appendiculatus*;

Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger der Gruppe der Oomyceten wie z.B. *Bremia*-Arten, wie beispielsweise *Bremia lactucae*; *Peronospora*-Arten, wie beispielsweise *Peronospora pisi* oder *P. brassicae*; *Phytophthora*-Arten, wie beispielsweise *Phytophthora infestans*; *Plasmopara*-Arten, wie
 15 beispielsweise *Plasmopara viticola*; *Pseudoperonospora*-Arten, wie beispielsweise *Pseudoperonospora humuli* oder *Pseudoperonospora cubensis*; *Pythium*-Arten, wie beispielsweise *Pythium ultimum*;

Blattfleckenkrankheiten und Blattwelken, hervorgerufen durch z.B. *Alternaria*-Arten, wie beispielsweise *Alternaria solani*; *Cercospora*-Arten, wie beispielsweise *Cercospora beticola*; *Cladosporium*-Arten, wie beispielsweise *Cladosporium cucumerinum*; *Cochliobolus*-Arten, wie
 20 beispielsweise *Cochliobolus sativus* (Konidienform: *Drechslera*, Syn: *Helminthosporium*); *Colletotrichum*-Arten, wie beispielsweise *Colletotrichum lindemuthianum*; *Cycloconium*-Arten, wie beispielsweise *Cycloconium oleaginum*; *Diaporthe*-Arten, wie beispielsweise *Diaporthe citri*; *Elsinoe*-Arten, wie beispielsweise *Elsinoe fawcettii*; *Gloeosporium*-Arten, wie beispielsweise *Gloeosporium laeticolor*; *Glomerella*-Arten, wie beispielsweise *Glomerella cingulata*; *Guignardia*-Arten, wie
 25 beispielsweise *Guignardia bidwelli*; *Leptosphaeria*-Arten, wie beispielsweise *Leptosphaeria maculans*; *Magnaporthe*-Arten, wie beispielsweise *Magnaporthe grisea*; *Microdochium*-Arten, wie beispielsweise *Microdochium nivale*; *Mycosphaerella*-Arten, wie beispielsweise *Mycosphaerella graminicola* und *M. fijiensis*; *Phaeosphaeria*-Arten, wie beispielsweise *Phaeosphaeria nodorum*; *Pyrenophora*-Arten, wie beispielsweise *Pyrenophora teres*; *Ramularia*-Arten, wie beispielsweise *Ramularia collo-cygni*;
 30 *Rhynchosporium*-Arten, wie beispielsweise *Rhynchosporium secalis*; *Septoria*-Arten, wie beispielsweise *Septoria apii*; *Typhula*-Arten, wie beispielsweise *Typhula incarnata*; *Venturia*-Arten, wie beispielsweise *Venturia inaequalis*;

Wurzel- und Stängelkrankheiten, hervorgerufen durch z.B. Corticium-Arten, wie beispielsweise Corticium graminearum; Fusarium-Arten, wie beispielsweise Fusarium oxysporum; Gaeumannomyces-Arten, wie beispielsweise Gaeumannomyces graminis; Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise Rhizoctonia solani; Tapesia-Arten, wie beispielsweise Tapesia acuformis;
5 Thielaviopsis-Arten, wie beispielsweise Thielaviopsis basicola;

Ähren- und Rispenkrankheiten (inklusive Maiskolben), hervorgerufen durch z.B. Alternaria-Arten, wie beispielsweise Alternaria spp.; Aspergillus-Arten, wie beispielsweise Aspergillus flavus; Cladosporium-Arten, wie beispielsweise Cladosporium cladosporioides; Claviceps-Arten, wie beispielsweise Claviceps purpurea; Fusarium-Arten, wie beispielsweise Fusarium culmorum;
10 Gibberella-Arten, wie beispielsweise Gibberella zeae; Monographella-Arten, wie beispielsweise Monographella nivalis; Septoria-Arten, wie beispielsweise Septoria nodorum;

Erkrankungen, hervorgerufen durch Brandpilze wie z.B. Sphacelotheca-Arten, wie beispielsweise Sphacelotheca reiliana; Tilletia-Arten, wie beispielsweise Tilletia caries, T. controversa; Urocystis-Arten, wie beispielsweise Urocystis occulta; Ustilago-Arten, wie beispielsweise Ustilago nuda, U.
15 nuda tritici;

Fruchtfäule hervorgerufen durch z.B. Aspergillus-Arten, wie beispielsweise Aspergillus flavus; Botrytis-Arten, wie beispielsweise Botrytis cinerea; Penicillium-Arten, wie beispielsweise Penicillium expansum und P. purpurogenum; Sclerotinia-Arten, wie beispielsweise Sclerotinia sclerotiorum;

20 Verticillium-Arten, wie beispielsweise Verticillium alboatrum;

Samen- und bodenbürtige Fäulen und Welken, sowie Sämlingserkrankungen, hervorgerufen durch z.B. Fusarium-Arten, wie beispielsweise Fusarium culmorum; Phytophthora Arten, wie beispielsweise Phytophthora cactorum; Pythium-Arten, wie beispielsweise Pythium ultimum; Rhizoctonia-Arten, wie beispielsweise Rhizoctonia solani; Sclerotium-Arten, wie beispielsweise Sclerotium rolfsii;

25 Krebserkrankungen, Gallen und Hexenbesen, hervorgerufen durch z.B. Nectria-Arten, wie beispielsweise Nectria galligena;

Welkekrankheiten hervorgerufen durch z.B. Monilinia-Arten, wie beispielsweise Monilinia laxa;

Deformationen von Blättern, Blüten und Früchten, hervorgerufen durch z.B. Taphrina-Arten, wie beispielsweise Taphrina deformans;

Degenerationserkrankungen holziger Pflanzen, hervorgerufen durch z.B. Esca-Arten, wie beispielsweise *Phaemoniella clamydospora* und *Phaeoacremonium aleophilum* und *Fomitiporia mediterranea*;

Blüten- und Samenerkrankungen, hervorgerufen durch z.B. *Botrytis*-Arten, wie beispielsweise
5 *Botrytis cinerea*;

Erkrankungen von Pflanzenknollen, hervorgerufen durch z.B. *Rhizoctonia*-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*; *Helminthosporium*-Arten, wie beispielsweise *Helminthosporium solani*;

Erkrankungen, hervorgerufen durch bakterielle Erreger wie z.B. *Xanthomonas*-Arten, wie beispielsweise *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae*; *Pseudomonas*-Arten, wie beispielsweise
10 *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*; *Erwinia*-Arten, wie beispielsweise *Erwinia amylovora*;

Bevorzugt können die folgenden Krankheiten von Soja-Bohnen bekämpft werden:

Pilzkrankheiten an Blättern, Stängeln, Schoten und Samen verursacht durch z.B. *Alternaria* leaf spot (*Alternaria spec. atrans tenuissima*), Anthracnose (*Colletotrichum gloeosporoides dematium* var. *truncatum*), Brown spot (*Septoria glycines*), *Cercospora* leaf spot and blight (*Cercospora kikuchii*),
15 *Choanephora* leaf blight (*Choanephora infundibulifera trisporea* (Syn.)), *Dactuliophora* leaf spot (*Dactuliophora glycines*), Downy Mildew (*Peronospora manshurica*), Drechslera blight (*Drechslera glycini*), Frogeye Leaf spot (*Cercospora sojae*), *Leptosphaerulina* Leaf Spot (*Leptosphaerulina trifolii*), *Phyllosticta* Leaf Spot (*Phyllosticta sojaecola*), Pod and Stem Blight (*Phomopsis sojae*), Powdery Mildew (*Microsphaera diffusa*), *Pyrenochaeta* Leaf Spot (*Pyrenochaeta glycines*), *Rhizoctonia* Aerial,
20 Foliage, and Web Blight (*Rhizoctonia solani*), Rust (*Phakopsora pachyrhizi*, *Phakopsora meibomia*), Scab (*Sphaceloma glycines*), *Stemphylium* Leaf Blight (*Stemphylium botryosum*), Target Spot (*Corynespora cassiicola*).

Pilzkrankheiten an Wurzeln und der Stängelbasis verursacht durch z.B. Black Root Rot (*Calonectria crotalariae*), Charcoal Rot (*Macrophomina phaseolina*), *Fusarium* Blight or Wilt, Root Rot, and Pod and
25 Collar Rot (*Fusarium oxysporum*, *Fusarium orthoceras*, *Fusarium semitectum*, *Fusarium equiseti*), *Mycoleptodiscus* Root Rot (*Mycoleptodiscus terrestris*), *Neocosmospora* (*Neocosmospora vasinfecta*), Pod and Stem Blight (*Diaporthe phaseolorum*), Stem Canker (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*), *Phytophthora* Rot (*Phytophthora megasperma*), Brown Stem Rot (*Phialophora gregata*), *Pythium* Rot (*Pythium aphanidermatum*, *Pythium irregulare*, *Pythium debaryanum*, *Pythium myriotylum*, *Pythium*
30 *ultimum*), *Rhizoctonia* Root Rot, Stem Decay, and Damping-Off (*Rhizoctonia solani*), *Sclerotinia* Stem Decay (*Sclerotinia sclerotiorum*), *Sclerotinia* Southern Blight (*Sclerotinia rolfsii*), *Thielaviopsis* Root Rot (*Thielaviopsis basicola*).

Unter unerwünschten Mikroorganismen sind im vorliegenden Fall phytopathogene Pilze und Bakterien zu verstehen. Die erfindungsgemäßen Stoffe können also eingesetzt werden, um Pflanzen innerhalb eines gewissen Zeitraumes nach der Behandlung gegen den Befall durch die genannten Schaderreger zu schützen. Der Zeitraum, innerhalb dessen Schutz herbeigeführt wird, erstreckt sich
5 im allgemeinen von 1 bis 10 Tage, vorzugsweise 1 bis 7 Tage nach der Behandlung der Pflanzen mit den Wirkstoffen.

Die gute Pflanzenverträglichkeit der Wirkstoffe in den zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten notwendigen Konzentrationen erlaubt eine Behandlung von oberirdischen Pflanzenteilen, von Pflanz- und Saatgut, und des Bodens.

10 Dabei lassen sich die erfindungsgemäßen Wirkstoffe mit besonders gutem Erfolg zur Bekämpfung von Getreidekrankheiten, wie beispielsweise gegen Erysiphe-Arten, gegen Puccinia und gegen Fusarien-Arten, von Reiskrankheiten, wie beispielsweise gegen Pyricularia und Rhizoctonia und von Krankheiten im Wein-, Obst- und Gemüseanbau, wie beispielsweise gegen Botrytis-, Venturia-, Sphaerotheca- und Podosphaera-Arten, einsetzen.

15 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe eignen sich auch zur Steigerung des Ernteertrages. Sie sind außerdem mindertoxisch und weisen eine gute Pflanzenverträglichkeit auf.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können gegebenenfalls in bestimmten Konzentrationen bzw. Aufwandmengen auch als Herbizide, Safener, Wachstumsregulatoren oder Mittel zur Verbesserung der Pflanzeigenschaften, oder als Mikrobizide, beispielsweise als Fungizide, Antimykotika, Bakterizide,
20 Virizide (einschließlich Mittel gegen Viroide) oder als Mittel gegen MLO (Mycoplasma-like-organism) und RLO (Rickettsia-like-organism) verwendet werden. Sie lassen sich gegebenenfalls auch als Insektizide verwenden. Sie lassen sich gegebenenfalls auch als Zwischen- oder Vorprodukte für die Synthese weiterer Wirkstoffe einsetzen.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können gegebenenfalls in bestimmten Konzentrationen und
25 Aufwandmengen auch als Herbizide, zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums, sowie zur Bekämpfung von tierischen Schädlingen verwendet werden. Sie lassen sich gegebenenfalls auch als Zwischen- und Vorprodukte für die Synthese weiterer Wirkstoffe einsetzen.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe eignen sich bei guter Pflanzenverträglichkeit, günstiger Warmblütertoxizität und guter Umweltverträglichkeit zum Schutz von Pflanzen und Pflanzenorganen, zur
30 Steigerung der Ernteerträge, Verbesserung der Qualität des Erntegutes. Sie können vorzugsweise als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Sie sind gegen normal sensible und resistente Arten sowie gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien wirksam.

Die erfindungsgemäße Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteile mit den Wirkstoffen bzw. Mitteln erfolgt direkt oder durch Einwirkung auf deren Umgebung, Lebensraum oder Lagerraum nach den üblichen Behandlungsmethoden, z.B. durch Tauchen, (Ver-)Spritzen, (Ver-)Sprühen, Berieseln, Verdampfen, Zerstäuben, Vernebeln, (Ver-)Streuen, Verschäumen, Bestreichen, Verstreichen, Gießen
5 (drenchen), Tröpfchenbewässerung und bei Vermehrungsmaterial, insbesondere bei Samen, weiterhin durch Trockenbeizen, Nassbeizen, Schlämmbeizen, Inkrustieren, ein- oder mehrschichtiges Umhüllen usw. Es ist ferner möglich, die Wirkstoffe nach dem Ultra-Low-Volume-Verfahren auszubringen oder die Wirkstoffzubereitung oder den Wirkstoff selbst in den Boden zu injizieren.

Die angewandte Wirkstoffmenge kann in einem größeren Bereich schwanken. Sie hängt im wesentlichen von der Art des gewünschten Effektes ab. Im Allgemeinen liegen die Aufwandmengen
10 zwischen 1 g und 10 kg Wirkstoff pro Hektar Bodenfläche, vorzugsweise zwischen 5 g und 5 kg pro ha.

Der vorteilhafte Effekt der Kulturpflanzen-Verträglichkeit der erfindungsgemäßen Wirkstoffe ist bei bestimmten Konzentrationsverhältnissen besonders stark ausgeprägt. Jedoch können die
15 Gewichtsverhältnisse der Wirkstoffe in den Wirkstoffkombinationen in relativ großen Bereichen variiert werden. Im allgemeinen entfallen auf 1 Gewichtsteil Wirkstoff der Formel (I) 0,001 bis 1000 Gewichtsteile, vorzugsweise 0,01 bis 100 Gewichtsteile, besonders bevorzugt 0,05 bis 20 Gewichtsteile einer der oben unter (b') genannten, die Kulturpflanzen Verträglichkeit verbessernden Verbindungen (Antidots/Safener).

20 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe werden im allgemeinen in Form von Fertigformulierungen zur Anwendung gebracht. Die in den Wirkstoffkombinationen enthaltenen Wirkstoffe können aber auch in Einzelformulierungen bei der Anwendung gemischt, d.h. in Form von Tankmischungen zur Anwendung gebracht werden.

Darüber hinaus kann durch die erfindungsgemäße Behandlung der Mykotoxingehalt im Erntegut und
25 den daraus hergestellten Nahrungs- und Futtermitteln verringert werden. Besonders, aber nicht ausschließlich sind hierbei folgende Mykotoxine zu nennen: Deoxynivalenol (DON), Nivalenol, 15-Ac-DON, 3-Ac-DON, T2- und HT2- Toxin, Fumonisine, Zearalenon, Moniliformin, Fusarin, Diacetoxyscirpenol (DAS), Beauvericin, Enniatin, Fusaroproliferin, Fusarenol, Ochratoxine, Patulin, Mutterkornalkaloide und Aflatoxine, die beispielsweise von den folgenden Pilzen verursacht werden
30 können: *Fusarium spec.*, wie *Fusarium acuminatum*, *F. avenaceum*, *F. crookwellense*, *F. culmorum*, *F. graminearum* (*Gibberella zeae*), *F. equiseti*, *F. fujikoroii*, *F. musarum*, *F. oxysporum*, *F. proliferatum*, *F. poae*, *F. pseudograminearum*, *F. sambucinum*, *F. scirpi*, *F. semitectum*, *F. solani*, *F. sporotrichoides*, *F. langsethiae*, *F. subglutinans*, *F. tricinctum*, *F. verticillioides* u.a. sowie auch von *Aspergillus spec.*, *Penicillium spec.*, *Claviceps purpurea*, *Stachybotrys spec.* u.a.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können außerdem im Materialschutz zum Schutz von technischen Materialien gegen Befall und Zerstörung durch unerwünschten Mikroorganismen, wie z.B. Pilzen, eingesetzt werden.

Unter technischen Materialien sind im vorliegenden Zusammenhang nichtlebende Materialien zu verstehen, die für die Verwendung in der Technik zubereitet worden sind. Beispielsweise können technische Materialien, die durch erfindungsgemäße Wirkstoffe vor mikrobieller Veränderung oder Zerstörung geschützt werden sollen, Klebstoffe, Leime, Papier und Karton, Textilien, Leder, Holz, Anstrichmittel und Kunststoffartikel, Kühlschmierstoffe und andere Materialien sein, die von Mikroorganismen befallen oder zersetzt werden können. Im Rahmen der zu schützenden Materialien seien auch Teile von Produktionsanlagen, beispielsweise Kühlwasserkreisläufe, genannt, die durch Vermehrung von Mikroorganismen beeinträchtigt werden können. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung seien als technische Materialien vorzugsweise Klebstoffe, Leime, Papiere und Kartone, Leder, Holz, Anstrichmittel, Kühlschmiermittel und Wärmeübertragungsflüssigkeiten genannt, besonders bevorzugt Holz. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können nachteilige Effekte wie Vermodern, Verfall, Ver-, Entfärbung oder Verschimmeln verhindern.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Bekämpfen von unerwünschten Pilzen kann auch zum Schutz von so genannte Storage Goods verwendet werden. Unter „Storage Goods“ werden dabei natürliche Substanzen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs oder deren Verarbeitungsprodukte, welche der Natur entnommen wurden und für die Langzeitschutz gewünscht ist, verstanden. Storage Goods pflanzlichen Ursprungs, wie z.B. Pflanzen oder Pflanzenteile, wie Stiele, Blätter, Knollen, Samen, Früchte, Körner, können in frisch geerntetem Zustand oder nach Verarbeitung durch (Vor-)Trocknen, Befeuchten, Zerkleinern, Mahlen, Pressen oder Rösten, geschützt werden. Storage Goods umfasst auch Nutzholz, sei es unverarbeitet, wie Bauholz, Stromleitungsmasten und Schranken, oder in Form fertiger Produkte, wie Möbel. Storage Goods tierischen Ursprungs sind beispielsweise Felle, Leder, Pelze und Haare. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können nachteilige Effekte wie Vermodern, Verfall, Ver-, Entfärbung oder Verschimmeln verhindern.

Als Mikroorganismen, die einen Abbau oder eine Veränderung der technischen Materialien bewirken können, seien beispielsweise Bakterien, Pilze, Hefen, Algen und Schleimorganismen genannt. Vorzugsweise wirken die erfindungsgemäßen Wirkstoffe gegen Pilze, insbesondere Schimmelpilze, Holz verfärbende und Holz zerstörende Pilze (Basidiomyceten) sowie gegen Schleimorganismen und Algen. Es seien beispielsweise Mikroorganismen der folgenden Gattungen genannt: *Alternaria*, wie *Alternaria tenuis*; *Aspergillus*, wie *Aspergillus niger*; *Chaetomium*, wie *Chaetomium globosum*; *Coniophora*, wie *Coniophora puetana*; *Lentinus*, wie *Lentinus tigrinus*; *Penicillium*, wie *Penicillium glaucum*; *Polyporus*, wie *Polyporus versicolor*; *Aureobasidium*, wie *Aureobasidium pullulans*; *Sclerophoma*, wie

Sclerophoma pityophila; *Trichoderma*, wie *Trichoderma viride*; *Escherichia*, wie *Escherichia coli*; *Pseudomonas*, wie *Pseudomonas aeruginosa*; *Staphylococcus*, wie *Staphylococcus aureus*.

Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Mittel zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen, umfassend wenigstens eines der erfindungsgemäßen Thienylaminopyrimidine.

- 5 Vorzugsweise handelt es sich um fungizide Mittel, welche landwirtschaftlich verwendbare Hilfsmittel, Solventien, Trägerstoffe, oberflächenaktive Stoffe oder Streckmittel enthalten.

- Erfindungsgemäß bedeutet Trägerstoff eine natürliche oder synthetische, organische oder anorganische Substanz, mit welchen die Wirkstoffe zur besseren Anwendbarkeit, v.a. zum Aufbringen auf Pflanzen oder Pflanzenteile oder Saatgut, gemischt oder verbunden sind. Der
- 10 Trägerstoff, welcher fest oder flüssig sein kann, ist im Allgemeinen inert und sollte in der Landwirtschaft verwendbar sein.

- Als feste Trägerstoffe kommen infrage: z.B. Ammoniumsalze und natürliche Gesteinsmehle, wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und Silikate, als feste
- 15 Trägerstoffe für Granulate kommen in Frage: z.B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material wie Papier, Sägemehl, Kokosnußschalen, Maiskolben und Tabakstengeln; als Emulgier- und/oder schaum erzeugende Mittel kommen in Frage: z.B. nichtionogene und anionische Emulgatoren, wie Polyoxyethylen-Fettsäure-Ester,
- 20 Polyoxyethylen-Fettalkohol-Ether, z.B. Alkylaryl-polyglykolether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate sowie Eiweißhydrolysate; als Dispergiermittel kommen in Frage nicht-ionische und/oder ionische Stoffe, z.B. aus den Klassen der Alkohol-POE- und/oder POP-Ether, Säure- und/oder POP-POE-Ester, Alkyl-Aryl- und/oder POP-POE-Ether, Fett- und/oder POP-POE-Addukte, POE- und/oder POP-Polyol Derivate, POE- und/oder POP-Sorbitan- oder-Zucker-Addukte, Alky- oder Aryl-Sulfate,
- 25 Sulfonate und Phosphate oder die entsprechenden PO-Ether-Addukte. Ferner geeignet sind Oligo- oder Polymere, z.B. ausgehend von vinylischen Monomeren, von Acrylsäure, aus EO und/oder PO allein oder in Verbindung mit z.B. (poly-) Alkoholen oder (poly-) Aminen. Ferner können Einsatz finden Lignin und seine Sulfonsäure-Derivate, einfache und modifizierte Cellulosen, aromatische und/oder aliphatische Sulfonsäuren sowie deren Addukte mit Formaldehyd.
- 30 Die Wirkstoffe können in die üblichen Formulierungen überführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Spritzpulver, wasser- und ölbasierte Suspensionen, Pulver, Stäubemittel, Pasten, lösliche Pulver, lösliche Granulate, Streugranulate, Suspensions-Emulsions-Konzentrate, Wirkstoff-imprägnierte Naturstoffe, Wirkstoff-imprägnierte synthetische Stoffe, Düngemittel sowie Feinstverkapselungen in polymeren Stoffen.

Die Wirkstoffe können als solche, in Form ihrer Formulierungen oder den daraus bereiteten Anwendungsformen, wie gebrauchsfertige Lösungen, Emulsionen, wasser- oder ölbasierte Suspensionen, Pulver, Spritzpulver, Pasten, lösliche Pulver, Stäubemittel, lösliche Granulate, Streugranulate, Suspensions-Emulsions-Konzentrate, Wirkstoff-imprägnierte Naturstoffe, Wirkstoff-imprägnierte synthetische Stoffe, Düngemittel sowie Feinstverkapselungen in polymeren Stoffen angewendet werden. Die Anwendung geschieht in üblicher Weise, z.B. durch Gießen, Verspritzen, Versprühen, Verstreuen, Verstäuben, Verschäumen, Bestreichen usw. Es ist ferner möglich, die Wirkstoffe nach dem Ultra-Low-Volume-Verfahren auszubringen oder die Wirkstoffzubereitung oder den Wirkstoff selbst in den Boden zu injizieren. Es kann auch das Saatgut der Pflanzen behandelt werden.

- 10 Die genannten Formulierungen können in an sich bekannter Weise hergestellt werden, z.B. durch Vermischen der Wirkstoffe mit mindestens einem üblichen Streckmittel, Lösungs- bzw. Verdünnungsmittel, Emulgator, Dispergier- und/oder Binde- oder Fixiermittels, Netzmittel, Wasser-Repellent, gegebenenfalls Sikkative und UV-Stabilisatoren und gegebenenfalls Farbstoffen und Pigmenten, Entschäumer, Konservierungsmittel, sekundäre Verdickungsmittel, Kleber, Gibberelline
- 15 sowie weiteren Verarbeitungshilfsmitteln.

Die erfindungsgemäßen Mittel umfassen nicht nur Formulierungen, welche bereits anwendungsfertig sind und mit einer geeigneten Apparatur auf die Pflanze oder das Saatgut ausgebracht werden können, sondern auch kommerzielle Konzentrate, welche vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden müssen.

- Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können als solche oder in ihren (handelsüblichen) Formulierungen
- 20 sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit anderen (bekannten) Wirkstoffen, wie Insektiziden, Lockstoffen, Sterilantien, Bakteriziden, Akariziden, Nematiziden, Fungiziden, Wachstumsregulatoren, Herbiziden, Düngemitteln, Safener bzw. Semiochemicals vorliegen.

- Als Hilfsstoffe können solche Stoffe Verwendung finden, die geeignet sind, dem Mittel selbst oder
- 25 und/oder davon abgeleitete Zubereitungen (z.B. Spritzbrühen, Saatgutbeizen) besondere Eigenschaften zu verleihen, wie bestimmte technische Eigenschaften und/oder auch besondere biologische Eigenschaften. Als typische Hilfsmittel kommen in Frage: Streckmittel, Lösemittel und Trägerstoffe.

- Als Streckmittel eignen sich z.B. Wasser, polare und unpolare organische chemische Flüssigkeiten z.B. aus den Klassen der aromatischen und nicht-aromatischen Kohlenwasserstoffe (wie Paraffine,
- 30 Alkylbenzole, Alkyl-naphthaline, Chlorbenzole), der Alkohole und Polyole (die ggf. auch substituiert, verethert und/oder verestert sein können), der Ketone (wie Aceton, Cyclohexanon), Ester (auch Fette und Öle) und (poly-)Ether, der einfachen und substituierten Amine, Amide, Lactame (wie N-Alkylpyrrolidone) und Lactone, der Sulfone und Sulfoxide (wie Dimethylsulfoxid).

Mit verflüssigten gasförmigen Streckmitteln oder Trägerstoffen sind solche Flüssigkeiten gemeint, welche bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasförmig sind, z.B. Aerosol-Treibgase, wie Halogenkohlenwasserstoffe sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid.

- 5 Es können in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulverige, körnige oder latexförmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabicum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, sowie natürliche Phospholipide, wie Kepheline und Lecithine, und synthetische Phospholipide. Weitere Additive können mineralische und vegetabile Öle sein.

- 10 Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z.B. auch organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden. Als flüssige Lösungsmittel kommen im Wesentlichen infrage: Aromaten, wie Xylol, Toluol oder Alkyl-naphthaline, chlorierte Aromaten oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Methylenchlorid, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z.B. Erdölfraktionen, Alkohole, wie Butanol oder Glycol sowie deren Ether und Ester, Ketone, wie Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel, wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid, sowie Wasser.

- 15 Die erfindungsgemäßen Mittel können zusätzlich weitere Bestandteile enthalten, wie z.B. oberflächenaktive Stoffe. Als oberflächenaktive Stoffe kommen Emulgier- und/oder Schaum erzeugende Mittel, Dispergiermittel oder Benetzungsmittel mit ionischen oder nicht-ionischen Eigenschaften oder Mischungen dieser oberflächenaktiven Stoffe infrage. Beispiele hierfür sind Salze von Polyacrylsäure, Salze von Lignosulphonsäure, Salze von Phenolsulphonsäure oder 20 Naphthalinsulphonsäure, Polykondensate von Ethylenoxid mit Fettalkoholen oder mit Fettsäuren oder mit Fettaminen, substituierten Phenolen (vorzugsweise Alkylphenole oder Arylphenole), Salze von Sulphobbernsteinsäureestern, Taurinderivate (vorzugsweise Alkyltaurate), Phosphorsäureester von polyethoxylierten Alkoholen oder Phenole, Fettsäureester von Polyolen, und Derivate der Verbindungen enthaltend Sulphate, Sulphonate und Phosphate, z.B. Alkylaryl-polyglycolether, Alkyl- 25 sulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate, Eiweißhydrolysate, Lignin-Sulfitablaugen und Methylcellulose. Die Anwesenheit einer oberflächenaktiven Substanz ist notwendig, wenn einer der Wirkstoffe und/oder einer der inerten Trägerstoffe nicht in Wasser löslich ist und wenn die Anwendung in Wasser erfolgt. Der Anteil an oberflächenaktiven Stoffen liegt zwischen 5 und 40 Gewichtsprozent des erfindungsgemäßen Mittels.

- 30 Es können Farbmittel wie anorganische Pigmente, z.B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyanblau und organische Farbstoffe, wie Alizarin-, Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Spurennährstoffe, wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink verwendet werden.

Weitere Additive können Duftstoffe, mineralische oder vegetabile gegebenenfalls modifizierte Öle, Wachse und Nährstoffe (auch Spurennährstoffe), wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink sein.

Weiterhin enthalten sein können Stabilisatoren wie Kältestabilisatoren, Konservierungsmittel, 5 Oxidationsschutzmittel, Lichtschutzmittel oder andere die chemische und / oder physikalische Stabilität verbessernde Mittel.

Gegebenenfalls können auch andere zusätzliche Komponenten enthalten sein, z.B. schützende Kolloide, Bindemittel, Klebstoffe, Verdicker, thixotrope Stoffe, Penetrationsförderer, Stabilisatoren, Sequestermittel, Komplexbildner. Im Allgemeinen können die Wirkstoffe mit jedem festen oder 10 flüssigen Additiv, welches für Formulierungszwecke gewöhnlich verwendet wird, kombiniert werden.

Die Formulierungen enthalten im Allgemeinen zwischen 0,05 und 99 Gew.-%, 0,01 und 98 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0,1 und 95 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 90 % Wirkstoff, ganz besonders bevorzugt zwischen 10 und 70 Gewichtsprozent.

Die zuvor beschriebenen Formulierungen können in einem erfindungsgemäßen Verfahren zum 15 Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen verwendet werden, bei dem die erfindungsgemäßen Thienylaminopyrimidine auf die Mikroorganismen und/oder in deren Lebensraum ausgebracht werden.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können als solche oder in ihren Formulierungen auch in Mischung mit bekannten Fungiziden, Bakteriziden, Akariziden, Nematiziden oder Insektiziden 20 verwendet werden, um so z.B. das Wirkungsspektrum zu verbreitern oder Resistenzentwicklungen vorzubeugen.

Als Mischpartner kommen zum Beispiel bekannte Fungizide, Insektizide, Akarizide, Nematizide oder auch Bakterizide (siehe auch Pesticide Manual, 13th ed.) infrage.

Auch eine Mischung mit anderen bekannten Wirkstoffen, wie Herbiziden, oder mit Düngemitteln und 25 Wachstumsregulatoren, Safenern bzw. Semiochemicals ist möglich.

Die Anwendung geschieht in einer den Anwendungsformen angepaßten üblichen Weise.

Die Bekämpfung von pflanzenpathogenen Schadpilzen erfolgt in erster Linie durch die Behandlung des Bodens und der oberirdischen Pflanzenteile mit Pflanzenschutzmitteln. Aufgrund der Bedenken hinsichtlich eines möglichen Einflusses der Pflanzenschutzmittel auf die Umwelt und die Gesundheit

von Menschen und Tieren gibt es Anstrengungen, die Menge der ausgebrachten Wirkstoffe zu vermindern.

Die Wirkstoffe können als solche, in Form ihrer Formulierungen oder den daraus bereiteten Anwendungsformen, wie gebrauchsfertige Lösungen, Suspensionen, Spritzpulver, Pasten, lösliche
5 Pulver, Stäubemittel und Granulate angewendet werden. Die Anwendung geschieht in üblicher Weise, z.B. durch Gießen, Verspritzen, Versprühen, Verstreuen, Verstäuben, Verschäumen, Bestreichen usw. Es ist ferner möglich, die Wirkstoffe nach dem Ultra-Low-Volume-Verfahren auszubringen oder die Wirkstoffzubereitung oder den Wirkstoff selbst in den Boden zu injizieren. Es kann auch das Saatgut der Pflanzen behandelt werden.

10 Beim Einsatz der erfindungsgemäßen Wirkstoffe als Fungizide können die Aufwandmengen je nach Applikationsart innerhalb eines größeren Bereiches variiert werden. Die Aufwandmenge der erfindungsgemäßen Wirkstoffe beträgt

- bei der Behandlung von Pflanzenteilen, z.B. Blättern: von 0,1 bis 10 000 g/ha, bevorzugt von 10 bis 1 000 g/ha, besonders bevorzugt von 50 bis 300g/ha (bei Anwendung durch Gießen
15 oder Tropfen kann die Aufwandmenge sogar verringert werden, vor allem wenn inerte Substrate wie Steinwolle oder Perlit verwendet werden);
- bei der Saatgutbehandlung: von 2 bis 200 g pro 100 kg Saatgut, bevorzugt von 3 bis 150 g pro 100 kg Saatgut, besonders bevorzugt von 2,5 bis 25 g pro 100 kg Saatgut, ganz besonders bevorzugt von 2,5 bis 12,5 g pro 100 kg Saatgut;
- 20 • bei der Bodenbehandlung: von 0,1 bis 10 000 g/ha, bevorzugt von 1 bis 5 000 g/ha.

Diese Aufwandmengen seien nur beispielhaft und nicht limitierend im Sinne der Erfindung genannt.

Zugleich können die erfindungsgemäßen Verbindungen zum Schutz vor Bewuchs von Gegenständen, insbesondere von Schiffskörpern, Sieben, Netzen, Bauwerken, Kaianlagen und Signalanlagen, welche mit See- oder Brackwasser in Verbindung kommen, eingesetzt werden.

25 Weiter können die erfindungsgemäßen Verbindungen allein oder in Kombinationen mit anderen Wirkstoffen als Antifouling-Mittel eingesetzt werden.

Das erfindungsgemäße Behandlungsverfahren kann für die Behandlung von genetisch modifizierten Organismen (GMOs), z. B. Pflanzen oder Samen, verwendet werden. Genetisch modifizierte Pflanzen (oder transgene Pflanzen) sind Pflanzen, bei denen ein heterologes Gen stabil in das Genom
30 integriert worden ist. Der Begriff "heterologes Gen" bedeutet im wesentlichen ein Gen, das außerhalb

der Pflanze bereitgestellt oder assembliert wird und das bei Einführung in das Zellkerngenom, das Chloroplastengenom oder das Hypochondriengenom der transformierten Pflanze dadurch neue oder verbesserte agronomische oder sonstige Eigenschaften verleiht, daß es ein interessierendes Protein oder Polypeptid exprimiert oder daß es ein anderes Gen, das in der Pflanze vorliegt bzw. andere Gene, die in der Pflanze vorliegen, herunterreguliert oder abschaltet (zum Beispiel mittels Antisense-Technologie, Cosuppressionstechnologie oder RNAi-Technologie [RNA Interference]). Ein heterologes Gen, das im Genom vorliegt, wird ebenfalls als Transgen bezeichnet. Ein Transgen, das durch sein spezifisches Vorliegen im Pflanzengenom definiert ist, wird als Transformations- bzw. transgenes Event bezeichnet.

- 10 In Abhängigkeit von den Pflanzenarten oder Pflanzensorten, ihrem Standort und ihren Wachstumsbedingungen (Böden, Klima, Vegetationsperiode, Ernährung) kann die erfindungsgemäße Behandlung auch zu überadditiven ("synergistischen") Effekten führen. So sind zum Beispiel die folgenden Effekte möglich, die über die eigentlich zu erwartenden Effekte hinausgehen: verringerte Aufwandmengen und/oder erweitertes Wirkungsspektrum und/oder erhöhte Wirksamkeit der
- 15 Wirkstoffe und Zusammensetzungen, die erfindungsgemäß eingesetzt werden können, besseres Pflanzenwachstum, erhöhte Toleranz gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen, erhöhte Toleranz gegenüber Trockenheit oder Wasser- oder Bodensalzgehalt, erhöhte Blühleistung, Ernteerleichterung, Reifebeschleunigung, höhere Erträge, größere Früchte, größere Pflanzenhöhe, intensiver grüne Farbe des Blatts, frühere Blüte, höhere Qualität und/oder höherer Nährwert der
- 20 Ernteprodukte, höhere Zuckerkonzentration in den Früchten, bessere Lagerfähigkeit und/oder Verarbeitbarkeit der Ernteprodukte.

Im vorliegenden Fall versteht man unter unerwünschten phytopathogenen Pilzen und/oder Mikroorganismen und/oder Viren phytopathogene Pilze, Bakterien und Viren. Die erfindungsgemäßen Substanzen lassen sich daher zum Schutz von Pflanzen gegen Angriff durch die

25 erwähnten Pathogene innerhalb eines gewissen Zeitraums nach der Behandlung einsetzen. Der Zeitraum, über den eine Schutzwirkung erzielt wird, erstreckt sich im allgemeinen von 1 bis 10 Tagen, vorzugsweise 1 bis 7 Tagen, nach der Behandlung der Pflanzen mit den Wirkstoffen.

Zu Pflanzen und Pflanzensorten, die vorzugsweise erfindungsgemäß behandelt werden, zählen alle Pflanzen, die über Erbgut verfügen, das diesen Pflanzen besonders vorteilhafte, nützliche Merkmale

30 verleiht (egal, ob dies durch Züchtung und/oder Biotechnologie erzielt wurde).

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls vorzugsweise erfindungsgemäß behandelt werden, sind gegen einen oder mehrere biotische Streßfaktoren resistent, d. h. diese Pflanzen weisen eine verbesserte Abwehr gegen tierische und mikrobielle Schädlinge wie Nematoden, Insekten, Milben, phytopathogene Pilze, Bakterien, Viren und/oder Viroide auf.

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind solche Pflanzen, die gegen einen oder mehrere abiotische Streßfaktoren resistent sind. Zu den abiotischen Streßbedingungen können zum Beispiel Dürre, Kälte- und Hitzebedingungen, osmotischer Streß, Staunässe, erhöhter Bodensalzgehalt, erhöhtes Ausgesetztsein an Mineralien, Ozonbedingungen, Starklichtbedingungen, beschränkte Verfügbarkeit von Stickstoffnährstoffen, beschränkte Verfügbarkeit von Phosphornährstoffen oder Vermeidung von Schatten zählen.

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind solche Pflanzen, die durch erhöhte Ertrageigenschaften gekennzeichnet sind. Ein erhöhter Ertrag kann bei diesen Pflanzen z. B. auf verbesserter Pflanzenphysiologie, verbessertem Pflanzenwuchs und verbesserter Pflanzenentwicklung, wie Wasserverwertungseffizienz, Wasserhalteeffizienz, verbesserter Stickstoffverwertung, erhöhter Kohlenstoffassimilation, verbesserter Photosynthese, verstärkter Keimkraft und beschleunigter Abreife beruhen. Der Ertrag kann weiterhin durch eine verbesserte Pflanzenarchitektur (unter Streß- und nicht-Streß-Bedingungen) beeinflusst werden, darunter frühe Blüte, Kontrolle der Blüte für die Produktion von Hybridsaatgut, Keimpflanzenwüchsigkeit, Pflanzengröße, Internodienzahl und -abstand, Wurzelwachstum, Samengröße, Fruchtgröße, Schotengröße, Schoten- oder Ährenzahl, Anzahl der Samen pro Schote oder Ähre, Samenmasse, verstärkte Samenfüllung, verringerter Samenausfall, verringertes Schotenplatzen sowie Standfestigkeit. Zu weiteren Ertragsmerkmalen zählen Samenzusammensetzung wie Kohlenhydratgehalt, Proteingehalt, Ölgehalt und Ölzusammensetzung, Nährwert, Verringerung der nährwidrigen Verbindungen, verbesserte Verarbeitbarkeit und verbesserte Lagerfähigkeit.

Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Hybridpflanzen, die bereits die Eigenschaften der Heterosis bzw. des Hybrideffekts exprimieren, was im allgemeinen zu höherem Ertrag, höherer Wüchsigkeit, besserer Gesundheit und besserer Resistenz gegen biotische und abiotische Streßfaktoren führt. Solche Pflanzen werden typischerweise dadurch erzeugt, daß man eine ingezüchtete pollensterile Elternlinie (den weiblichen Kreuzungspartner) mit einer anderen ingezüchteten pollenfertilen Elternlinie (dem männlichen Kreuzungspartner) kreuzt. Das Hybridsaatgut wird typischerweise von den pollensterilen Pflanzen geerntet und an Vermehrer verkauft. Pollensterile Pflanzen können manchmal (z. B. beim Mais) durch Entfahnen (d. h. mechanischem Entfernen der männlichen Geschlechtsorgane bzw. der männlichen Blüten), produziert werden; es ist jedoch üblicher, daß die Pollensterilität auf genetischen Determinanten im Pflanzengenom beruht. In diesem Fall, insbesondere dann, wenn es sich bei dem gewünschten Produkt, da man von den Hybridpflanzen ernten will, um die Samen handelt, ist es üblicherweise günstig, sicherzustellen, daß die Pollenfertilität in Hybridpflanzen, die die für die Pollensterilität verantwortlichen genetischen Determinanten enthalten, völlig restoriert wird. Dies kann erreicht

werden, indem sichergestellt wird, daß die männlichen Kreuzungspartner entsprechende Fertilitätsrestorergene besitzen, die in der Lage sind, die Pollenfertilität in Hybridpflanzen, die die genetischen Determinanten, die für die Pollensterilität verantwortlich sind, enthalten, zu restorieren. Genetische Determinanten für Pollensterilität können im Cytoplasma lokalisiert sein. Beispiele für
5 cytoplasmatische Pollensterilität (CMS) wurden zum Beispiel für Brassica-Arten beschrieben. Genetische Determinanten für Pollensterilität können jedoch auch im Zellkerngenom lokalisiert sein. Pollensterile Pflanzen können auch mit Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie Gentechnik, erhalten werden. Ein besonders günstiges Mittel zur Erzeugung von pollensterilen Pflanzen ist in WO 89/10396 beschrieben, wobei zum Beispiel eine Ribonuklease wie eine Barnase selektiv in den
10 Tapetumzellen in den Staubblättern exprimiert wird. Die Fertilität kann dann durch Expression eines Ribonukleasehemmers wie Barstar in den Tapetumzellen restoriert werden.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die mit Methoden der Pflanzenbiotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten werden), die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind herbizidtolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen, die gegenüber einem oder mehreren vorgegebenen Herbiziden tolerant gemacht worden
15 sind. Solche Pflanzen können entweder durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Herbizidtoleranz verleiht, erhalten werden.

Herbizidtolerante Pflanzen sind zum Beispiel glyphosatetolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen, die gegenüber dem Herbizid Glyphosate oder dessen Salzen tolerant gemacht worden sind. So können zum Beispiel glyphosatetolerante Pflanzen durch Transformation der Pflanze mit einem Gen, das für
20 das Enzym 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphatsynthase (EPSPS) kodiert, erhalten werden. Beispiele für solche EPSPS-Gene sind das AroA-Gen (Mutante CT7) des Bakterium *Salmonella typhimurium*, das CP4-Gen des Bakteriums *Agrobacterium sp.*, die Gene, die für eine EPSPS aus der Petunie, für eine EPSPS aus der Tomate oder für eine EPSPS aus Eleusine kodieren. Es kann sich auch um eine mutierte EPSPS handeln. Glyphosatetolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, daß
25 man ein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-Oxidoreduktase-Enzym kodiert. Glyphosatetolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, daß man ein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-acetyltransferase-Enzym kodiert. Glyphosatetolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, daß man Pflanzen, die natürlich vorkommende Mutationen der oben erwähnten Gene selektiert.

Sonstige herbizidresistente Pflanzen sind zum Beispiel Pflanzen, die gegenüber Herbiziden, die das
30 Enzym Glutaminsynthase hemmen, wie Bialaphos, Phosphinotricin oder Glufosinate, tolerant gemacht worden sind. Solche Pflanzen können dadurch erhalten werden, daß man ein Enzym exprimiert, das das Herbizid oder eine Mutante des Enzyms Glutaminsynthase, das gegenüber Hemmung resistent ist, entgiftet. Solch ein wirksames entgiftendes Enzym ist zum Beispiel ein Enzym, das für ein Phosphinotricin-acetyltransferase kodiert (wie zum Beispiel das bar- oder pat-

Protein aus Streptomyces-Arten). Pflanzen, die eine exogene Phosphinotricin-acetyltransferase exprimieren, sind beschrieben.

Weitere herbizidtolerante Pflanzen sind auch Pflanzen, die gegenüber den Herbiziden, die das Enzym Hydroxyphenylpyruvatdioxygenase (HPPD) hemmen, tolerant gemacht worden sind. Bei den Hydroxyphenylpyruvatdioxygenasen handelt es sich um Enzyme, die die Reaktion, in der para-Hydroxyphenylpyruvat (HPP) zu Homogentisat umgesetzt wird, katalysieren. Pflanzen, die gegenüber HPPD-Hemmern tolerant sind, können mit einem Gen, das für ein natürlich vorkommendes resistentes HPPD-Enzym kodiert, oder einem Gen, das für ein mutiertes HPPD-Enzym kodiert, transformiert werden. Eine Toleranz gegenüber HPPD-Hemmern kann auch dadurch erzielt werden, daß man Pflanzen mit Genen transformiert, die für gewisse Enzyme kodieren, die die Bildung von Homogentisat trotz Hemmung des nativen HPPD-Enzyms durch den HPPD-Hemmer ermöglichen. Die Toleranz von Pflanzen gegenüber HPPD-Hemmern kann auch dadurch verbessert werden, daß man Pflanzen zusätzlich zu einem Gen, das für ein HPPD-tolerantes Enzym kodiert, mit einem Gen transformiert, das für ein Prephenatdehydrogenase-Enzym kodiert.

Weitere herbizidresistente Pflanzen sind Pflanzen, die gegenüber Acetolactatsynthase (ALS)-Hemmern tolerant gemacht worden sind. Zu bekannten ALS-Hemmern zählen zum Beispiel Sulfonylharnstoff, Imidazolinon, Triazolopyrimidine, Pyrimidinyloxy(thio)benzoate und/oder Sulfonylaminocarbonyltriazolinon-Herbizide. Es ist bekannt, daß verschiedene Mutationen im Enzym ALS (auch als Acetohydroxysäure-Synthase, AHAS, bekannt) eine Toleranz gegenüber unterschiedlichen Herbiziden bzw. Gruppen von Herbiziden verleihen. Die Herstellung von sulfonylharnstofftoleranten Pflanzen und imidazolinontoleranten Pflanzen ist in der internationalen Veröffentlichung WO 96/033270 beschrieben. Weitere sulfonylharnstoff- und imidazolinontolerante Pflanzen sind auch in z.B. WO 07/024782 beschrieben.

Weitere Pflanzen, die gegenüber Imidazolinon und/oder Sulfonylharnstoff tolerant sind, können durch induzierte Mutagenese, Selektion in Zellkulturen in Gegenwart des Herbizids oder durch Mutationszüchtung erhalten werden.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind insektenresistente transgene Pflanzen, d.h. Pflanzen, die gegen Befall mit gewissen Zielinsekten resistent gemacht wurden. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Insektenresistenz verleiht, erhalten werden.

Der Begriff "insektenresistente transgene Pflanze" umfaßt im vorliegenden Zusammenhang jegliche Pflanze, die mindestens ein Transgen enthält, das eine Kodiersequenz umfaßt, die für folgendes kodiert:

- 1) ein insektizides Kristallprotein aus *Bacillus thuringiensis* oder einen insektiziden Teil davon,
5 wie die insektiziden Kristallproteine, die online bei:
http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/ beschrieben sind,
zusammengestellt wurden, oder insektizide Teile davon, z.B. Proteine der Cry-Proteinklassen
Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1F, Cry2Ab, Cry3Ae oder Cry3Bb oder insektizide Teile davon; oder
- 2) ein Kristallprotein aus *Bacillus thuringiensis* oder einen Teil davon, der in Gegenwart eines
10 zweiten, anderen Kristallproteins als *Bacillus thuringiensis* oder eines Teils davon insektizid
wirkt, wie das binäre Toxin, das aus den Kristallproteinen Cy34 und Cy35 besteht; oder
- 3) ein insektizides Hybridprotein, das Teile von zwei unterschiedlichen insektiziden
Kristallproteinen aus *Bacillus thuringiensis* umfaßt, wie zum Beispiel ein Hybrid aus den
Proteinen von 1) oben oder ein Hybrid aus den Proteinen von 2) oben, z. B. das Protein
15 Cry1A.105, das von dem Mais-Event MON98034 produziert wird (WO 07/027777); oder
- 4) ein Protein gemäß einem der Punkte 1) bis 3) oben, in dem einige, insbesondere 1 bis 10,
Aminosäuren durch eine andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhere insektizide
Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenart zu erzielen und/oder um das Spektrum der
entsprechenden Zielinsektenarten zu erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die
20 Kodier- DNA während der Klonierung oder Transformation induziert wurden, wie das
Protein Cry3Bb1 in Mais-Events MON863 oder MON88017 oder das Protein Cry3A im
Mais-Event MIR 604;
- 5) ein insektizides sezerniertes Protein aus *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus*
oder einen insektiziden Teil davon, wie die vegetativ wirkenden insektentoxischen
25 Proteine (vegetative insecticidal proteins, VIP), die unter
http://www.lifesci.sussex.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/vip.html angeführt sind, z. B.
Proteine der Proteinklasse VIP3Aa; oder
- 6) ein sezerniertes Protein aus *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus*, das in Gegenwart
eines zweiten sezernierten Proteins aus *Bacillus thuringiensis* oder *B. cereus* insektizid wirkt,
30 wie das binäre Toxin, das aus den Proteinen VIP1A und VIP2A besteht.

- 7) ein insektizides Hybridprotein, das Teile von verschiedenen sezernierten Proteinen von *Bacillus thuringiensis* oder *Bacillus cereus* umfaßt, wie ein Hybrid der Proteine von 1) oder ein Hybrid der Proteine von 2) oben; oder
- 8) ein Protein gemäß einem der Punkte 1) bis 3) oben, in dem einige, insbesondere 1 bis 10, Aminosäuren durch eine andere Aminosäure ersetzt wurden, um eine höhere insektizide Wirksamkeit gegenüber einer Zielinsektenart zu erzielen und/oder um das Spektrum der entsprechenden Zielinsektenarten zu erweitern und/oder wegen Veränderungen, die in die Kodier- DNA während der Klonierung oder Transformation induziert wurden (wobei die Kodierung für ein insektizides Protein erhalten bleibt), wie das Protein VIP3Aa im Baumwoll-Event COT 102.

Natürlich zählt zu den insektenresistenten transgenen Pflanzen im vorliegenden Zusammenhang auch jegliche Pflanze, die eine Kombination von Genen umfaßt, die für die Proteine von einer der oben genannten Klassen 1 bis 8 kodieren. In einer Ausführungsform enthält eine insektenresistente Pflanze mehr als ein Transgen, das für ein Protein nach einer der oben genannten 1 bis 8 kodiert, um das Spektrum der entsprechenden Zielinsektenarten zu erweitern oder um die Entwicklung einer Resistenz der Insekten gegen die Pflanzen dadurch hinauszuzögern, daß man verschiedene Proteine einsetzt, die für dieselbe Zielinsektenart insektizid sind, jedoch eine unterschiedliche Wirkungsweise, wie Bindung an unterschiedliche Rezeptorbindungsstellen im Insekt, aufweisen.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind gegenüber abiotischen Streßfaktoren tolerant. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Streßresistenz verleiht, erhalten werden. Zu besonders nützlichen Pflanzen mit Streßtoleranz zählen folgende:

- a. Pflanzen, die ein Transgen enthalten, das die Expression und/oder Aktivität des Gens für die Poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) in den Pflanzenzellen oder Pflanzen zu reduzieren vermag.
- b. Pflanzen, die ein streßtoleranzförderndes Transgen enthalten, das die Expression und/oder Aktivität der für PARP kodierenden Gene der Pflanzen oder Pflanzenzellen zu reduzieren vermag;
- c. Pflanzen, die ein streßtoleranzförderndes Transgen enthalten, das für ein in Pflanzen funktionelles Enzym des Nicotinamidadenindinukleotid-Salvage-Biosynthesewegs

kodiert, darunter Nicotinamidase, Nicotinatphosphoribosyltransferase, Nicotinsäuremononukleotidadenyltransferase, Nicotinamidadenindinukleotidsynthetase oder Nicotinamidphosphoribosyltransferase.

5 Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, weisen eine veränderte Menge, Qualität und/oder Lagerfähigkeit des Ernteprodukts und/oder veränderte Eigenschaften von bestimmten Bestandteilen des Ernteprodukts auf, wie zum Beispiel:

- 1) Transgene Pflanzen, die eine modifizierte Stärke synthetisieren, die bezüglich ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften, insbesondere des Amylosegehalts oder des
10 Amylose/Amylopektin-Verhältnisses, des Verzweigungsgrads, der durchschnittlichen Kettenlänge, der Verteilung der Seitenketten, des Viskositätsverhaltens, der Gelfestigkeit, der Stärkekorngröße und/oder Stärkekornmorphologie im Vergleich mit der synthetisierten Stärke in Wildtyppflanzenzellen oder -pflanzen verändert ist, so daß sich diese modifizierte Stärke besser für bestimmte Anwendungen eignet.
- 15 2) Transgene Pflanzen, die Nichtstärkekohlenhydratpolymere synthetisieren, oder Nichtstärkekohlenhydratpolymere, deren Eigenschaften im Vergleich zu Wildtyppflanzen ohne genetische Modifikation verändert sind. Beispiele sind Pflanzen, die Polyfructose, insbesondere des Inulin- und Levantyps, produzieren, Pflanzen, die alpha-1,4-Glucane produzieren, Pflanzen, die alpha-1,6-verzweigte alpha-1,4-Glucane produzieren und Pflanzen,
20 die Alternan produzieren.
- 3) Transgene Pflanzen, die Hyaluronan produzieren.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit veränderten Fasereigenschaften. Solche Pflanzen können durch
25 genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Fasereigenschaften verleiht, erhalten werden; dazu zählen:

- a) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderte Form von Cellulosesynthasegenen enthalten,
- b) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderte Form von rsw2- oder rsw3-homologen
30 Nukleinsäuren enthalten;

- c) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhten Expression der Saccharosephosphatsynthase;
 - d) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhten Expression der Saccharosesynthase;
 - e) Pflanzen wie Baumwollpflanzen bei denen der Zeitpunkt der Durchlaßsteuerung der Plasmodesmen an der Basis der Faserzelle verändert ist, z. B. durch Herunterregulieren der faserselektiven β -1,3-Glucanase;
 - f) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit Fasern mit veränderter Reaktivität, z. B. durch Expression des N-Acetylglucosamintransferasegens, darunter auch nodC, und von Chitinsynthasegenen.
- 10 Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Raps oder verwandte Brassica-Pflanzen mit veränderten Eigenschaften der Ölzusammensetzung. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Öleigenschaften verleiht, erhalten werden; dazu zählen:
- a) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem hohen Ölsäuregehalt produziere;
 - b) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigen Linolensäuregehalt produzieren.
 - c) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigen gesättigten Fettsäuregehalt produzieren.
- 20 Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen mit einem oder mehreren Genen, die für ein oder mehrere Toxine kodieren, und sind die transgenen Pflanzen, die unter den folgenden Handelsbezeichnungen angeboten werden: YIELD GARD® (zum Beispiel Mais, Baumwolle, Sojabohnen), KnockOut® (zum Beispiel Mais), BiteGard® (zum Beispiel Mais), BT-Xtra® (zum Beispiel Mais), StarLink® (zum Beispiel Mais), Bollgard® (Baumwolle), Nucotn® (Baumwolle), Nucotn 33B® (Baumwolle), NatureGard® (zum Beispiel Mais), Protecta® und NewLeaf® (Kartoffel). Herbizidtolerante Pflanzen, die zu erwähnen sind, sind zum Beispiel Maissorten, Baumwollsorten und Sojabohnensorten, die unter den folgenden Handelsbezeichnungen angeboten werden: Roundup Ready® (Glyphosatetoleranz, zum Beispiel Mais, Baumwolle, Sojabohne), Liberty Link® (Phosphinotricintoleranz, zum Beispiel Raps), IMI® (Imidazolinontoleranz) und SCS® (Sulfonylharnstofftoleranz), zum Beispiel Mais. Zu den
- 25
- 30

herbizidresistenten Pflanzen (traditionell auf Herbizidtoleranz gezüchtete Pflanzen), die zu erwähnen sind, zählen die unter der Bezeichnung Clearfield® angebotenen Sorten (zum Beispiel Mais).

Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen, die Transformations-Events, oder eine Kombination von Transformations-Events, enthalten
5 und die zum Beispiel in den Dateien von verschiedenen nationalen oder regionalen Behörden angeführt sind (siehe zum Beispiel http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx und <http://www.agbios.com/dbase.php>).

Die aufgeführten Pflanzen können besonders vorteilhaft erfindungsgemäß mit den Verbindungen der allgemeinen Formel (I) behandelt werden. Die bei den Wirkstoffen bzw. Mischungen oben ange-
10 gebenen Vorzugsbereiche gelten auch für die Behandlung dieser Pflanzen. Besonders hervorgehoben sei die Pflanzenbehandlung mit den im vorliegenden Text speziell aufgeführten Verbindungen bzw. Mischungen.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können also eingesetzt werden, um Pflanzen inner-
halb eines gewissen Zeitraumes nach der Behandlung gegen den Befall durch die genannten Schader-
15 reger zu schützen. Der Zeitraum, innerhalb dessen Schutz herbeigeführt wird, erstreckt sich im Allgemeinen auf 1 bis 28 Tage, bevorzugt auf 1 bis 14 Tage, besonders bevorzugt auf 1 bis 10 Tage, ganz besonders bevorzugt auf 1 bis 7 Tage nach der Behandlung der Pflanzen mit den Wirkstoffen bzw. auf bis zu 200 Tage nach einer Saatgutbehandlung.

Die Herstellung und die Verwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe der Formeln [I] und [I-c]
20 geht aus den folgenden Beispielen hervor. Die Erfindung ist jedoch nicht auf diese Beispiele beschränkt.

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [VII]:**4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VII-1]**

14.9 g (92 mmol) 3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol (Synthese beschrieben in EP-A-1 382 603) werden in 45 mL Essigsäure gelöst. Dazu wird bei 3-5 °C eine Lösung von 5.7 mL Brom (110 mmol) in 9
5 mL Essigsäure zugegeben. Es bildet sich ein Niederschlag zu dem weitere 130 mL Essigsäure gegeben werden. Danach wird die Reaktionsmischung noch 4 h bei Raumtemperatur nachgerührt. Anschließend werden alle flüchtigen Komponenten im Hochvakuum entfernt. Der Rückstand wird in 1 molarer Natriumcarbonatlösung gelöst und mehrmals mit Essigsäureethylester extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na₂SO₄) und eingeeengt. Man erhält 21.8 g 4-
10 Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol (Ausbeute 98%) als farblosen Feststoff. Das Produkt wird ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt.

logP (pH2.7): 2.29

MS (ESI): 241.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 13.3 (s, 1H, br), 7.82 (m, 3H), 7.30 (m, 2H) ppm

15 Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [VI]:**M i s c h u n g v o n 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol und 4-Brom-5-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol [VI-1]**

3.6 g (14.9 mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol werden in 6 mL N-N-Dimethylformamid gelöst. Dazu werden 0.43 g Natriumhydrid (17.9 mmol) als 60 %ige Suspension in Öl gegeben und
20 die Mischung wird 20 min bei 25 °C gerührt. Anschließend werden 3.8 g Isopropyljodid (22.4mmol) zugegeben und die Reaktionsmischung über Nacht bei 25 °C gerührt. Zur Aufarbeitung wird Essigsäure (konzentriert) langsam zugegeben (0.2 eq) und anschließend alle flüchtigen Komponenten im Hochvakuum entfernt. Der Rückstand wird in Wasser gelöst und mehrmals mit Essigsäureethylester extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na₂SO₄) und
25 eingeeengt. Die Reinigung erfolgt mittels Kieselgelchromatographie mit dem Eluent Cyclohexan (A) / Essigsäureethylester (B) (0% B auf 40% B). Man erhält 3.54 g eines (84:16) Gemisches aus 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol und 4-Brom-5-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol (minor) als farblosen Feststoff.. Das Produkt wird ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt.

logP (pH2.7): 3.96 und 3.68^{minor}

30 MS (ESI): 285.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.04 (s, 1H), 7.85 (dd, 2H), 7.64 (s, 1H^{minor}), 7.43 (dd, 2H^{minor}), 7.36 (t, 2H^{minor}), 7.25 (t, 2H), 4.51 (m, 1H), 4.36 (m, 1H^{minor}), 1.45 (d, 6H), 1.33 (d, 6H^{minor}) ppm

4-Brom-1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-2]

4-Brom-1-ethyl-5-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-3]

- 5 3.0 g (12.3 mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol werden in 6 mL N-N-Dimethylformamid gelöst. Dazu werden 0.59 g Natriumhydrid (14.7 mmol) als 60%ige Suspension in Öl gegeben und die Mischung wird 20 min bei 25 °C gerührt. Anschließend werden 2.9 g Iodethan (18.4 mmol) zugegeben und die Reaktionsmischung über Nacht bei 25 °C gerührt. Zur Aufarbeitung wird Essigsäure (konzentriert) langsam zugegeben (0.2 eq) und anschließend alle flüchtigen
- 10 Komponenten im Hochvakuum entfernt. Der Rückstand wird in Wasser gelöst und mehrmals mit Essigsäureethylester extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na₂SO₄) und eingeengt. Die Reinigung erfolgt mittels Kieselgelchromatographie mit dem Eluent Cyclohexan (A) / Essigsäureethylester (B) (0% B auf 40% B). Man erhält 2.52 g eines (75:25) Gemisches der Pyrazol-Isomeren als farblosen Feststoff. Die Mischung wird durch preparative HPLC (Kromasil 100 C18
- 15 16µm 250*100 mm, 60/40 Methanol/H₂O isokratisch, Fluß 800 ml/min) getrennt und es werden 1.58 g (48% Ausbeute) 4-Brom-1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol und 0.41 g (12% Ausbeute) 4-Brom-1-ethyl-5-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol erhalten.

Hauptisomer: 4-Brom-1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-2]

logP (pH2.7): 3.37

- 20 MS (ESI): 269.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.02 (s, 1H), 7.85 (dd, 2H), 7.25 (t, 2H), 4.16 (q, 2H), 1.41 (t, 3H) ppm

Minderisomer: 4-Brom-1-ethyl-5-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-3]

logP (pH2.7): 3.15

- 25 MS (ESI): 269.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 7.62 (s, 1H), 7.48 (dd, 2H), 7.36 (t, 2H), 4.02 (q, 2H), 1.24 (t, 3H) ppm

4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol [VI-4]**4-Brom-5-(4-fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol [VI-5]**

3.62 g (14.9 mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol werden in 6 mL N-N-Dimethylformamid gelöst. Dazu werden 0.43 g Natriumhydrid (17.9 mmol) als 60%ige Suspension in Öl gegeben und
5 die Mischung wird 20 min bei 25 °C gerührt. Anschließend werden 4.1 g 1-Iod-2-methylpropan (22.4 mmol) zugegeben und die Reaktionsmischung über Nacht bei 25 °C gerührt. Zur Aufarbeitung wird Essigsäure (konzentriert) langsam zugegeben (0.2 eq) und anschließend alle flüchtigen Komponenten im Hochvakuum entfernt. Der Rückstand wird in Wasser gelöst und mehrmals mit Essigsäureethylester extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na₂SO₄) und
10 eingeengt. Die Reinigung erfolgt mittels Kieselgelchromatographie mit dem Eluent Cyclohexan (A) / Essigsäureethylester (B) (0% B auf 40% B). Man erhält 3.74 g eines (71:29) Gemisches der Pyrazol-Isomeren als farblosen Feststoff. Die Mischung wird durch preparative HPLC (Kromasil 100 C18 16 µm 250*100 mm, 70/30 Methanol/H₂O isokratisch, Fluß 800ml/min) getrennt und es werden 2.51 g (56%) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol und 0.59 g (13% Ausbeute) 4-Brom-5-(4-
15 fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol erhalten.

Hauptisomer: 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol [VI-4]

logP (pH2.7): 4.34

MS (ESI): 299.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 7.99 (s, 1H), 7.85 (dd, 2H), 7.25 (t, 2H), 3.94 (d, 2H), 2.18 (m,
20 1H), 0.88 (d, 6H) ppm

Minderisomer: 4-Brom-5-(4-fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol [VI-5]

logP (pH2.7): 4.04

MS (ESI): 299.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 7.64 (s, 1H), 7.48 (dd, 2H), 7.36 (t, 2H), 3.84 (d, 2H), 1.98 (m,
25 1H), 0.69 (d, 6H) ppm

4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol [VI-6]**4-Brom-5-(4-fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol [VI-7]**

3.62 g (14.9 mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol werden in 6 mL N-N-Dimethylformamid gelöst. Dazu werden 0.43 g Natriumhydrid (17.9 mmol) als 60%ige Suspension in Öl gegeben und die Mischung wird 20min bei 25 °C gerührt. Anschließend werden 3.1 g 1-Brom-2-methoxyethan (22.4 mmol) zugegeben und die Reaktionsmischung über Nacht bei 25 °C gerührt. Zur Aufarbeitung wird Essigsäure (konzentriert) langsam zugegeben (0.2 eq) und anschließend alle flüchtigen Komponenten im Hochvakuum entfernt. Der Rückstand wird in Wasser gelöst und mehrmals mit Essigsäureethylester extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na₂SO₄) und eingengt. Die Reinigung erfolgt mittels Kieselgelchromatographie mit dem Eluent Cyclohexan (A) / Essigsäureethylester (B) (0% B auf 40% B). Man erhält 2.91 g eines (76:23) Gemisches der Pyrazol-Isomeren als farblosen Feststoff. Die Mischung wird durch preparative HPLC (Kromasil 100 C18 16 µm 250*100 mm, 62/38 Methanol/H₂O isokratisch, Fluß 800ml/min) getrennt und es werden 2.92 g (61% Ausbeute) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol und 0.43 g (9% Ausbeute) 4-Brom-5-(4-fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol erhalten.

Hauptisomer: 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol [VI-6]

logP (pH2.7): 3.08

MS (ESI): 299.0 ([M+H]⁺)¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 7.98 (s, 1H), 7.85 (dd, 2H), 7.23 (t, 2H), 4.29 (t, 2H), 3.73 (t, 2H), 3.26 (s, 3H) ppm

Minderisomer: 4-Brom-5-(4-fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol [VI-7]

logP (pH2.7): 2.90

MS (ESI): 299.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 7.65 (s, 1H), 7.48 (dd, 2H), 7.36 (t, 2H), 4.13 (t, 2H), 3.63 (t, 2H), 3.10 (s, 3H) ppm

Nach demselben Verfahren lassen sich herstellen

4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol [VI-8]

logP (pH2.7): 2.86

MS (ESI): 257.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.88-7.84 (m, 2H), 7.65 (s, 1H), 7.21-7.16 (m, 2H), 3.87(s, 3H) ppm

4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-[1-(2-fluorphenyl)ethyl]-1H-pyrazol [VI-9]

logP (pH2.7): 3.63

MS (ESI): 477.0 ($[M+H]^+$)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 8.15 (s, 1H), 7.88-7.78 (m, 2H), 7.38-7.28 (m, 2H), 4.37 (dd, 1H),
5 4,31 (dd, 1H), 2.33 (m, 1H), 1.87 (dd, 1H), 1.65 (t, 1H) ppm

4-Brom-1-[(2,2-dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-10]

logP (pH2.7): 4.43

MS (ESI): 364.9 ($[M+H]^+$)

10 ¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.88-7,83 (m, 2H), 7.82 (s, 1H), 7.31-7.29 (m, 2H), 7.27-7.10 (m,
4H), 5.86 (q, 1H), 1.88 (d, 3H) ppm

5-(4-Brom-1-isobutyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-fluorbenzonitril [VI-11]

logP (pH2.7): 4.15

15 MS (ESI): 324.1 ($[M+H]^+$)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.23-8.22 (m, 1H), 8.20-8.17 (m, 1H), 8.16 (s, 1H), 7.65 (t, 1H),
3.97 (d, 2H), 2.15 (q, 1H) ppm

3-{[4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}benzonitril [VI-12]

20 logP (pH2.7): 3.93

MS (ESI): 358.0 ($[M+H]^+$)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.88-7,81 (m, 2H), 7.78 (s, 1H), 7.70-7.65 (m, 2H), 7.60-7.51 (m,
2 H), 7.22-7.16 (m, 2H), 5.35 (s, 2H) ppm

25 **4-Brom-1-(2-fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-13]**

logP (pH2.7): 4.39

MS (ESI): 349.0 ($[M+H]^+$)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.18 (s, 1H), 7.83-7.43 (m, 2H), 7.42-7.33 (m, 1H), 7.31-7.19
(m, 5H), 5.43 (s, 2H) ppm

30

4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-propyl-1H-pyrazol [VI-14]

logP (pH2.7): 3.89

MS (ESI): 283.0 ($[M+H]^+$)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.89-7,84 (m, 2H), 7.69 (s, 1H), 7.21-7.15 (m, 2H), 4.08 (t, 2 H),
35 1.90-1.81 (m, 2H), 0.89 (t, 3 H) ppm

4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1H-pyrazol [VI-15]

logP (pH2.7): 3.63

MS (ESI): 315.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.89-7.84 (m, 2H), 7.75 (s, 1H), 7.22-7.16 (m, 2H), 4.31 (t, 2 H),
5 2.95 (t, 2H), 2.04 (s, 3H) ppm

Methyl-2-[4-brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-methylbutanoat [VI-16]

logP (pH2.7): 4.27

MS (ESI): 357.0 ([M+H]⁺)

10 ¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.88 (s, 1H), 7.87-7.84 (m, 2H), 7.22-7.17 (m, 2H), 4.70 (d, 1 H),
3.73 (s, 1H), 2.53 (m, 1H), 1.01 (d, 3H), 0.86 (d, 3.03) ppm

4-Brom-1-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-17]

logP (pH2.7): 3.01

15 MS (ESI): 329.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.89-7.84 (m, 2H), 7.73 (s, 1H), 7.22-7.16 (m, 2H), 5.20 (t, 1H),
4.26 (d, 2H), 3.87 (m, 4H) ppm

4-Brom-1-(cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-18]

20 logP (pH2.7): 3.90

MS (ESI): 297.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.90-7.85 (m, 2H), 7.78 (s, 1H), 7.28-7.16 (m, 2H), 3.98 (d, 2H),
1.27 (m, 1H), 0.62 (m, 2H), 0.40 (m, 2H) ppm

25 **4-Brom-1-sec-butyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-19]**

logP (pH2.7): 4.39

MS (ESI): 299.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.90-7.85 (m, 2H), 7.71 (s, 1H), 7.21-7.15 (m, 2H), 4.2 (m, 1 H),
1.94-1.86 (m, 1H), 1.84-1.74 (m, 1H), 1.45 (d, 3H), 0.70 (t, 3H) ppm

30

4-Brom-1-(2-ethoxyethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-20]

logP (pH2.7): 3.51

MS (ESI): 313.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d6-DMSO): δ = 8.04 (s, 1H), 7.87-7.82 (m, 2H), 7.32-7.26 (m, 2H), 4.28 (t, 2H),
35 3.78 (t, 2H), 3.44 (q, 2H), 1.08 (t, 3H) ppm

3-[4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanonitril [VI-21]

logP (pH2.7): 3.08

MS (ESI): 310.1 ($[M+H]^+$)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.91-7.88 (m, 2H), 7.83 (s, 1H), 7.23-7.19 (m, 2H), 4.72-4.69 (m, 1H), 3.03-2.95 (m, 2H), 1.60-1.59 (d, 3H) ppm

tert-Butyl-4-[4-brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidin-1-carboxylat [VI-27]

logP (pH2.7): 4.77

MS (ESI): 368.0 ($[M-C_4H_9]^+$)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.88-7.86 (m, 2H), 7.75 (s, 1H), 7.20-7.17 (m, 2H), 4.35-4.30 (m, 1H), 4.20-4.10 (m, 2H), 3.00-2.85 (m, 2H, br), 2.08-2.05 (m, 2H), 1.88-1.83 (m, 2H), 1.44 (s, 9H) ppm

Weitere Methoden zur Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [VI]:**15 4-Brom-1-(1-cyclopropylethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-22]**

21.7g (0.082mol, 3eq) Triphenylphosphin werden in 70mL Tetrahydrofuran gelöst und mittels Eiskühlung auf 0°C gekühlt. Unter Argon werden langsam 25mL einer Lösung von 23.8g (2eq, 0.055mol) Diethyl azodicarboxylat (DEAD) in Toluol zugegeben, wobei die Innentemperatur 20°C nicht übersteigt. Nach 10min Rühren werden 6.9g (1eq, 0.027 mol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol und 4.9g (2eq, 0.055mol) Cyclopropylmethyl carbinol, gelöst in 20mL Tetrahydrofuran, langsam bei 0°C zugegeben. Die Reaktionsmischung wird über Nacht bei RT gerührt, anschliessend eingedampft und über Säulenchromatografie gereinigt. Es werden 1.92g (22.7%) 4-Brom-1-(1-cyclopropylethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol erhalten.

logP (pH2.7): 4.43

25 MS (ESI): 309.0 ($[M+H]^+$)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.91-7.85 (m, 2H), 7.80 (s, 1H), 7.22-7.16 (m, 2H), 3.64 (m, 1H), 1.57 (d, 3H), 1.25 (m, 1H), 0.67 (m, 1H), 0.50 (m, 1H), 0.44 (m, 2H) ppm

3-[4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanonitril [VI-23]

30 Zu einer Lösung von 2.5g 4-Brom-5-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol (10.4mmol) in 25mL DMF werden 5.07g Cs₂CO₃ (15.6 mmol) und 3-Brompropanonitril (2.08 g, 15.6 mmol) zugegeben und die Reaktionsmischung wird über Nacht bei 70°C gerührt. Danach wird die Mischung auf Raumtemperatur abgekühlt, in Wasser gegeben und mit Essigester extrahiert. Die organische Phase

wird getrocknet, eingedampft und über preparative HPLC gereinigt. Es werden 2.60 g (85%) 3-[4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanonitril erhalten.

logP (pH2.7): 2.69

MS (ESI): 296.0 ($[M+H]^+$)

- 5 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CD_3CN): δ = 7.91-7.86 (m, 2H), 7.79 (s, 1H), 7.23-7.17 (m, 2H), 4.38 (t, 2H), 3.73 (t, 2H) ppm

4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol [VI-24]

- 10 Zu einer Lösung von 1.4g (4.5mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol in 5mL DMF werden 0.63g (4.5 mmol) K_2CO_3 und 0.66g (5.4 mmol) 3-Brompropanonitril zugegeben und die Reaktionsmischung wird über Nacht bei 80°C gerührt. Danach wird die Mischung auf Raumtemperatur abgekühlt, in Wasser gegeben und mit Diethylether extrahiert. Die organische Phase wird getrocknet, eingedampft und über Chromatografie an Kieselgel (Eluent Petrolether) gereinigt. Es werden 0.5 g (32%) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol erhalten.
logP (pH2.7): 5.51

- 15 MS (ESI): 353.1 ($[M+H]^+$)

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CD_3CN): δ = 7.84-7.82 (m, 2H), 7.25-7.22 (m, 2H), 4.78 (q, 1H), 1.51 (d, 6H) ppm

4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropoxy-1H-pyrazol [VI-25]

- 20 Zu einer Suspension von 1.26g (52.7mmol) Natriumhydrid in DMF werden 7.5g (29.3 mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-1-ol gelöst in 30mL DMF bei 0°C zugegeben. Nach der Zugabe wird die Reaktionsmischung 20min bei Raumtemperatur gerührt. Dann wird die Mischung auf 0°C gekühlt und 4.1mL (43.9mmol) 2-Brompropan werden zugegeben. Danach wird die Reaktionsmischung 15h bei Raumtemperatur gerührt, anschliessend in 500mL Eiswasser gegeben und 3x mit 150mL Essigester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser gewaschen, über Na_2SO_4 getrocknet und im Vacuum eingeeengt. Das Rohmaterial wird über Säulenchromatografie an Kieselgel (Eluent 2% Essigester / Petrolether) und anschliessend über präparative HPLC gereinigt. Es werden 1.2g 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropoxy-1H-pyrazol (13.7%) erhalten.

logP (pH2.7): 4.11

- 30 MS (ESI): 301.1 ($[M+H]^+$)

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{d}_6\text{-DMSO}$): δ = 8.23 (s, 1H), 7.84-7.80 (m, 2H), 7.32-7.28 (m, 2H), 4.68 (q, 1H), 1.27 (d, 6H) ppm

4-Brom-1-cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [VI-26]

Zu einer Suspension von 4.8g (27.2mmol) N-Bromsuccinimid in 250mL Dichlormethan werden 5g (20.2 mmol) 1-Cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol 10°C zugegeben. Nach der Zugabe wird die Reaktionsmischung 1h bei Raumtemperatur gerührt. Danach wird die Reaktionsmischung mit
5 Wasser versetzt und mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser gewaschen, über Na₂SO₄ getrocknet und im Vacuum eingengt. Das Rohmaterial wird über Säulenchromatografie an Kieselgel gereinigt. Es werden 5g 4-Brom-1-cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol (73%) erhalten.

logP (pH2.7): 3.59

10 MS (ESI): 281.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.88-7.84 (m, 2H), 7.75 (s, 1H), 7.20-7.16 (m, 2H), 3.68-3.65 (m, 1H), 1.12-1.09 (m, 2H), 1.04-1.01 (m, 2H) ppm

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [V] nach Verfahren V2:

15 **3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol [V-1]**

3.0 g (10.5 mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol und 5.38 g (21.1 mmol) Bis-(pinacolato)-diborane werden in 30 mL Dimethylsulfoxid gelöst. Dazu werden 3.1 g Kaliumacetat (31.8 mmol) und 0.86 g (1.06 mmol) 1,1'-Bis(Diphenylphosphino)ferrocene]Dichlorpalladium(II) *CH₂Cl₂ gegeben und die Reaktionsmischung unter Argonfluss 5 h bei 85 °C erhitzt. Nach
20 nochmaligem Erhitzen für 2 h bei 80 °C wird die Reaktionsmischung abgekühlt und das Dimethylsulfoxid am Hochvakuum entfernt. Der Rückstand wird in Wasser gelöst und mehrmals mit Essigsäureethylester extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na₂SO₄) und eingengt. Die Reinigung erfolgt mittels Kieselgelchromatographie mit dem Eluent Cyclohexan (A) / 20%Essigsäureethylester in Cyclohexan (B) (0% B auf 70% B). Man erhält 3.85 g 3-(4-Fluorphenyl)-
25 1-isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol als farblosen Feststoff (40% Reinheit nach NMR). Die Verbindung wird ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt.

logP (pH2.7): 4.51

MS (ESI): 331.20 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 7.90 (dd, 2H), 7.78 (s, 1H), 7.10 (dd, 1H), 4.52 (m, 1H), 1.49 (d,
30 6H), 1.25 (s, 12H) ppm

3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol [V-2]

1.0 g (3.3 mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol und 1.69 g (2eq, 6.7 mmol) Bis-(pinacolato)-diborane werden in 15m L Dimethylsulfoxid gelöst. Dazu werden 0.98 g Kaliumacetat (10 mmol) und 0.27 g (0.3 mmol) 1,1'-Bis(Diphenylphosphino)ferrocene]Dichlorpalladium(II)*CH₂Cl₂ gegeben und die Reaktionsmischung unter Argonfluß 7 h bei 85 °C erhitzt.

5 Danach wird die Reaktionsmischung abgekühlt und das Dimethylsulfoxid am Hochvakuum entfernt. Der Rückstand wird in Wasser gelöst und mehrmals mit Essigsäureethylester extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na₂SO₄) und eingengt. Die Reinigung erfolgt mittels Kieselgelchromatographie mit dem Eluent Cyclohexan (A) / 20%Essigsäureethylester in Cyclohexan (B) (0% B auf 70% B). Man erhält 0.39 g 3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-4-

10 (4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol als farblosen Feststoff (60% Reinheit nach NMR). Die Verbindung wird ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt.

logP (pH2.7): 3.58

MS (ESI): 347.21 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 7.80 (dd, 2H), 7.58 (s, 1H), 7.15 (dd, 1H), 4.30 (m, 2H), 3.75

15 (m, 2H), 3.30 (s, 3H), 1.28 (s, 12H) ppm

3-(4-Fluorphenyl)-1-isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol [V-3]

2.0 g (6.7 mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol und 3.4 g (13.4 mmol) Bis-(pinacolato)-diborane werden in 30 mL Dimethylsulfoxid gelöst. Dazu werden 1.98 g Kaliumacetat (20 mmol) und 0.55 g (0.67 mmol) 1,1'-Bis(Diphenylphosphino)ferrocene]Dichlorpalladium(II)*CH₂Cl₂ gegeben und die Reaktionsmischung unter Argonfluß 7 h bei 85 °C erhitzt.

20 Danach wird die Reaktionsmischung abgekühlt und das Dimethylsulfoxid am Hochvakuum entfernt. Der Rückstand wird in Wasser gelöst und mehrmals mit Essigsäureethylester extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na₂SO₄) und eingengt. Die Reinigung erfolgt in mittels Kieselgelchromatographie mit dem Eluent Cyclohexan (A) / 20%Essigsäureethylester in

25 Cyclohexan (B) (0% B auf 70% B). Man erhält 1.1 g 3-(4-Fluorphenyl)-1-isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol als farblosen Feststoff (23% Reinheit nach NMR). Die Verbindung wird ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt.

logP (pH2.7): 4.76

MS (ESI): 345.17 ([M+H]⁺)

30 ¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 7.90 (dd, 2H), 7.72 (s, 1H), 7.10 (dd, 1H), 3.95 (d, 2H), 2.20 (m, 1H), 1.30 (s, 12H), 0.90 (d, 6H) ppm

Analog zu dem oben beschriebenen Verfahren lassen sich auch folgende Verbindungen des Typs [III] darstellen:

1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol [V-4]

5 logP (pH2.7): 3.84

MS (ESI): 353.2 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.06 (s, 1H), 7.90-7.87 (m, 2H), 7.21 (m, 2H), 6.41 (m, 1H), 4.68 (m, 2H), 1.27 (s, 12H) ppm

10 **3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol [V-5]**

logP (pH2.7): 4.81

MS (ESI): 347.2 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.89-7.85 (m, 2H), 7.68 (s, 1H), 7.15-7.10 (m, 2H), 4.71 (m, 1H), 1.29 (m, 18H) ppm

15 **1-(Cyclopentyloxy)-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol [V-6]**

logP (pH2.7): 5.51

MS (ESI): 373.2 ([M+H]⁺)

20 ¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.89-7.85 (m, 2H), 7.67 (s, 1H), 7.15-7.10 (m, 2H), 1.95-1.93 (m, 7H), 1.80-1.79 (m, 2H) ppm

1-Cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol [V-7]

Zu einer Lösung von 2g (7.11 mmol) 4-Brom-1-cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol und 1.98g (10.67mmol) 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan in trockenem Tetrahydrofuran (40 mL) wird unter Argon eine Lösung von n-Butyllithium in n-Hexan (1eq) bei -78°C langsam zugegeben. Die Reaktionsmischung wird 5min bei -78°C gerührt und dann mit wässriger NH₄Cl Lösung versetzt. Nach Erwärmen des Reaktionsgemisches auf Raumtemperatur wird die Reaktionsmischung mit Essigester extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden getrocknet und im Vacuum eingengt. Das erhaltene Rohmaterial wird durch Chromatografie an Kieselgel (Eluent n-hexan/Dichlormethan 2:1) gereinigt. Es werden 900mg (39%) 1-Cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol erhalten.

logP (pH2.7): 3.47

MS (ESI): 329.2 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, CD₃CN): δ = 7.89-7.86 (m, 2H), 7.81 (s, 1H), 7.13-7.09 (m, 2H), 3.65 (m, 1H), 1.28 (s, 12H), 1.10 (m, 2H), 1.00 (m, 2H) ppm

5

Analog zu dem oben beschriebenen Verfahren über Metallierung des Pyrazoles lassen sich auch folgende Verbindungen des Typs [III] darstellen:

1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol [V-8]

10 logP (pH2.7): 4.42

MS (ESI): 343.2 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.01 (s, 1H), 7.90-7.87 (m, 2H), 7.19 (m, 2H), 4.00 (d, 2H), 0.39-0.55 (m, 5H) ppm

15 **3-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol [V-9]**

logP (pH2.7): 3.47

MS (ESI): 303.2 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 7.95 (s, 1H), 7.90-7.86 (m, 2H), 7.19 (m, 2H), 3.87 (s, 3H), 1.26 (s, 12H) ppm

20

1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol [V-10]

logP (pH2.7): 4.06

MS (ESI): 351.1 ([M+H]⁺)

25 ¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.06 (s, 1H), 7.91-7.87 (m, 2H), 7.22-7.18 (m, 2H), 4.49 (t, 2H), 4.03 (t, 2H), 1.27 (s, 12H) ppm

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [IV-c]:

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin [IV-c-1]

30 500 mg (2.9 mmol) 4-Brompyridin-2-amin und 450 µL (3.2 mmol) Triethylamin in 25 mL Tetrahydrofuran gelöst. Dazu werden 338 µL 2-Methylpropanoylchlorid (2.9 mmol) gegeben und die Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur 16 h gerührt. Anschließend werden die flüchtigen Bestandteile im Vakuum entfernt und das Rohmaterial mit 3 mL NH₃ in Methanol (7 molar) versetzt. Die Mischung wird 16 h bei Raumtemperatur gerührt und anschließend eingedampft. Das
35 Rohprodukt wird über Kieselgelchromatographie (Eluent Cyclohexan / Essigsäureethylester)

gereinigt. Man erhält 382 mg (47% Ausbeute) N-(4-Brompyridin-2-yl)-2-methylpropanamid als farblosen Feststoff.

logP (pH2.7): 2.09

MS (ESI): 244.9 ($[M+H]^+$)

- 5 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{d}_3\text{-CD}_3\text{CN}$): δ = 8.70 (s, 1H, br), 8.40 (d, 1H), 8.12 (d, 1H), 7.25 (dd, 1H), 2.65 (m, 1H), 1.15 (d, 6H) ppm

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [III] nach Verfahren (V3):

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin [III-1]

- 200 mg (0.6 mmol) 3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-
10 1H-pyrazol und 166 mg (0.72mmol) tert-Butyl-(4-chlorpyridin-2-yl)carbamate werden in 3 mL 1,4-Dioxan gelöst. Dazu werden 44.7 mg Bis(tricyclohexylphosphin)palladium(II)-dichlorid (0.06 mmol) und 2 mL Natriumcarbonat-lösung (2 molar) gegeben. Die Reaktionsmischung wird 5 min mit Argon gespült und danach verschlossen. Anschließend wird die Mischung 12 min bei 150 °C in der Mikrowelle erhitzt (CEM Explorer). Nach dem Abkühlen wird von unlöslichen Bestandteilen
15 abfiltriert und der Salzzrückstand mit 1,4-Dioxan gewaschen. Die organische Phase wird eingedampft und das Rohprodukt über Kieselgelchromatographie (Eluent Cyclohexan / Essigsäureethylester) gereinigt. Man erhält 45.4 mg (25% Ausbeute) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin als farblosen Feststoff.

logP (pH2.7): 1.22

- 20 MS (ESI): 297.13 ($[M+H]^+$)

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{d}_3\text{-CD}_3\text{CN}$): δ = 7.80 (m, 2H), 7.50 (dd, 2H), 7.10 (dd, 1H), 6.47 (d, 1H), 6.39 (s, 1H), 5.10 (s, 2H, br), 4.53 (m, 1H), 1.20 (d, 6H) ppm

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [III] nach Verfahren (V26):

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin [III-2]

- 25 257 mg (0.86 mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol und 303 mg (0.94mmol) tert-Butyl-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]carbamate werden in 4 mL 1,4-Dioxan gelöst. Dazu werden 50.8 mg Bis(tricyclohexylphosphin)palladium(II)-dichlorid (0.04 mmol) und 2 mL Natriumcarbonat-lösung (2 M in H_2O) gegeben. Die Reaktionsmischung wird 5 min mit Argon gespült und danach verschlossen. Anschließend wird die Mischung 12 min bei

- 150 °C in der Mikrowelle erhitzt (CEM Explorer). Nach dem Abkühlen wird von unlöslichen Bestandteilen abfiltriert und der Salzzrückstand mit 1,4-Dioxan gewaschen. Die organische Phase wird eingedampft und das Rohprodukt über Kieselgelchromatographie (Eluent Dichlormethan / 10% Methanol - Dichlormethan) gereinigt. Man erhält 255 mg (86 % Ausbeute) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin als farblosen Feststoff.

logP (pH2.7): 0.98

MS (ESI): 313.15 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 7.85 (d, 1H), 7.77 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.44 (dd, 1H), 6.37 (s, 1H), 4.79 (s, 2H, br), 4.29 (t, 2H), 3.77 (t, 2H), 3.31 (s, 3H) ppm

- 10 Analog zu den beschriebenen Verfahren lassen sich auch folgende Verbindungen des Typs [III] darstellen:

4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin [III-3]

logP (pH2.7): 0.97

MS (ESI): 283.32 ([M+H]⁺)

- 15 ¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 7.85 (m, 1H), 7.77 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.45 (dd, 1H), 6.37 (s, 1H), 4.82 (s, 2H, br), 4.20 (q, 2H), 1.49 (t, 3H) ppm

4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin [III-4]

logP (pH2.7): 1.03

- 20 MS (ESI): 319.48 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 7.86 (d, 1H), 7.82 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.44 (dd, 1H), 6.37 (s, 1H), 6.26 (td, 1H), 4.87 (s, 1H, br), 4.57 (dt, 2H) ppm

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin [III-5]

- 25 logP (pH2.7): 0.71

MS (ESI): 269.2 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 7.95 (s, 1H), 7.81 (m, 1H), 7.45-7.42 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.31-6.29 (m, 2H), 5.80 (s, 2H, br), 3.90 (s, 3H) ppm

Herstellung von Zwischenverbindungen der Formel [XV-a] :

- 30 **2-Methoxy-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]acetamid [XV-a-1]**

2.0 g (8.5 mmol) N-(4-Brompyridin-2-yl)-2-methoxyacetamid und 2.4 g (9.3 mmol) Bis-(pinacolato)-diborane werden in 50 mL trockenem Dioxan gelöst. Dazu werden 2.50 g Kaliumacetat (25.5 mmol) und 0.31 g (0.38 mmol) 1,1'-Bis(Diphenylphosphino)ferrocene]Dichlorpalladium(II)*CH₂Cl₂ gegeben und die Reaktionsmischung wird unter Argonfluß 3 h bei 80 °C erhitzt. Danach wird die Reaktionsmischung abgekühlt, Wasser zugegeben und mehrmals mit Essigsäureethylester extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na₂SO₄) und eingeeengt. Die Reinigung erfolgt in mittels Kieselgelchromatographie mit dem Eluent Hexan / Ether (3:1). Man erhält 1.32 g (53% Ausbeute) 2-Methoxy-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]acetamid als farblosen Feststoff.

10 logP (pH2.7): -0.18

MS (ESI): 211.13 ([M(-pinakol)+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 8.75 (s, 1H, br), 8.38 (s, 1H), 8.33 (d, 1H), 7.33 (m, 1H), 4.00 (s, 2H), 3.46 (s, 3H), 1.34 (s, 12H) ppm

N-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanamid [XV-a-2]

15 1.80 g (7.9 mmol) N-(4-Brompyridin-2-yl)propanamid und 2.19 g (8.6 mmol) Bis-(pinacolato)-diborane werden in 50 mL trockenem Dioxan gelöst. Dazu werden 2.31 g Kaliumacetat (23.6mmol) und 0.35g (0.43 mmol) 1,1'-Bis(Diphenylphosphino)ferrocene]Dichlorpalladium(II)*CH₂Cl₂ gegeben und die Reaktionsmischung wird unter Argonfluß 3 h bei 80 °C erhitzt. Danach wird die Reaktionsmischung abgekühlt, Wasser zugegeben und mehrmals mit Essigsäureethylester extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na₂SO₄) und eingeeengt. Die Reinigung erfolgt in mittels Kieselgelchromatographie mit dem Eluent Hexan / Ether (3:1). Man erhält 0.870 g (36% Ausbeute) N-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanamid als farblosen Feststoff.

25 ¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 8.55 (s, 1H, br), 8.37 (s, 1H), 8.28 (d, 1H), 7.27 (m, 1H), 2.43 (q, 2H), 1.34 (s, 12H), 1.15 (t, 3H) ppm

2-Phenyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]acetamid [XV-a-3]

1.40 g (4.81mmol) N-(4-Brompyridin-2-yl)-2-phenylacetamid und 1.34 g (5.3mmol) Bis-(pinacolato)-diborane werden in 50 mL trockenem Dioxan gelöst. Dazu werden 1.42 g Kaliumacetat (14.3 mmol) und 0.18 g (0.22 mmol) 1,1'-Bis(Diphenylphosphino)ferrocene]Dichlorpalladium(II)*CH₂Cl₂ gegeben und die Reaktionsmischung wird unter Argonfluß 3 h bei 80 °C erhitzt. Danach wird die Reaktionsmischung abgekühlt, Wasser zugegeben und mehrmals mit Essigsäureethylester

extrahiert. Anschließend wird die organische Phase getrocknet (Na_2SO_4) und eingengt. Die Reinigung erfolgt durch Triturieren des Produkts mit Hexan / Ether (3:1). Man erhält 0.87 g (54% Ausbeute) 2-Phenyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]acetamid als farblosen Feststoff..

- 5 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{d}_3\text{-CD}_3\text{CN}$): δ = 8.68 (s, 1H, br), 8.33 (s, 1H), 8.28 (d, 1H), 7.36 (m, 5H), 7.27 (m, 1H), 3.72 (s, 2H), 1.32 (s, 12H) ppm

Auf analoge Weise lassen sich auch die folgenden Intermediate des Typs [XV-a] herstellen:

2-Methyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanamid [XV-a-4]

logP (pH2.7): 0.04

- 10 MS (ESI): 209.1 ($[\text{M-C}_6\text{H}_{12}]^+$)
 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CD_3CN): δ = 8.39 (s, 1H), 8.29(d, 1H), 7.28(d, 1H), 1.94(m, 1H), 1.34 (s, 12H), 1.17 (d, 6H) ppm

2-Cyclopropyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]acetamid [XV-a-5]

- 15 logP (pH2.7): 0.27
MS (ESI): 221.1 ($[\text{M-C}_6\text{H}_{12}]^+$)
 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CD_3CN): δ = 8.60 (s, 1H, br), 8.39 (s, 1H), 8.29(d, 1H), 7.28 (d, 1H) 2.29 (d, 2H), 1.34 (s, 12H), 1.10 (m, 1H), 0.57 (m, 2H), 0.25 (m, 2H) ppm

Ethyl-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]carbamate [XV-a-6]

- 20 logP (pH2.7): 0.00
MS (ESI): 211.1 ($[\text{M-C}_6\text{H}_{12}]^+$)
 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CD_3CN): δ = 8.28 (m, 2H), 8.18(s, 1H), 7.24(d, 1H), 1.94(m, 1H), 4.21 (q, 2H), 1.34 (s, 12H), 1.29 (t, 3H) ppm

- 25 **N-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]cyclopropanecarboxamid [XV-a-7]**

logP (pH2.7): 0.00

- MS (ESI): 207.1 ($[\text{M-C}_6\text{H}_{12}]^+$)
 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CD_3CN): δ = 8.36 (s, 1H), 8.29 (d, 1H), 7.27 (d, 1H), 1.80(m, 1H), 1.33 (s, 12H), 0.93 (m, 3H), 0.84 (m, 2H) ppm
- 30

Herstellung von Zwischenverbindungen der Formel [XIII] :**4-Brom-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol [XIII-1]**

Zu einer Lösung von Pyrazol (100 g, 1.47 mol) in auf 40 °C vorgewärmten H₂O (400 ml) werden 234.7 g Brom (75.26 ml, 1.473 mol) tropfenweise zugegeben. Die Reaktionslösung wird 30 min unter Rückfluß erhitzt und gerührt (TLC, Hexan:EtOAc 1:1, R_f = 0.6). Nach Abkühlung der Reaktionslösung (pH = 3) auf Raumtemperatur wird konz. NaOH_(aq) tropfenweise zugegeben und der pH auf 8 eingestellt (Ausfällung eines weißen Niederschlags). Die erhaltene Suspension wird abfiltriert, der Rückstand mit eiskaltem H₂O (150 ml) gewaschen und anschließend im Vacuum getrocknet. Man erhält 195.47 g des Intermediats 4-Brom-1H-pyrazol (91% Ausbeute, Reinheitsgrad von 99%) als weißen Feststoff der ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt wird.

Eine Suspension von 4-Brom-1H-pyrazol (181 g, 1.23 mol), 3,4-Dihydro-2H-pyran (155.5 g, 1.85 mol) und Trifluoressigsäure (0.84 g, 0.57 ml, 7.40 mmol) wird 5 h unter Rückfluß erhitzt und gerührt. Anschließend wird das erhaltene Rohprodukt nach Zugabe von NaH (1.18 g, 0.05 mol) fraktionierend destilliert. Man erhält 253 g 4-Brom-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol (89%) als farblose Flüssigkeit (Sdp. 88-90 °C bei einem Druck von 0.02 mmHg).

Die spektroskopischen Daten entsprechen den in der Literatur beschriebenen Daten (*Acta Chem. Scand. Series B: Organic Chemistry and Biochemistry* **1982**, 36, 2, 101-108)

¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 7.78 (s, 1H), 7.47 (s, 1H), 5.33 (dd, 1H), 3.95 (m, 1H), 3.65 (m, 1H), 2.10-2.00 (m, 2H), 1.70-1.50 (m, 4H) ppm

Herstellung von Zwischenverbindungen der Formel [XII] :**4-[1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [XII-1]**

Zu einer Suspension von 39.0 g 4-Brom-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol (0.17 mol), 675 mL wässriges Na₂CO₃ (2.0 molar in H₂O, 1.35 mol) und 25.1 g 4-Pyridinboronsäure (0.21 mol) in Dioxan (2000 mL) werden 4.88 g Pd(PPh₃)₄ (4.22 mmol, 2.5 Mol%) gegeben. Die Reaktionsmischung wird unter Schutzgasatmosphäre und unter Rückfluß bei 80 °C erhitzt und 41 h gerührt. Anschließend wird die Reaktion mit H₂O (50 mL) versetzt. Die Reaktionslösung wird auf ¼ des Volumens eingeeengt und mit Essigsäureethylester (3 x 300 mL) extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter NaCl-Lösung gewaschen und anschließend mit MgSO₄ getrocknet. Das erhaltene Rohprodukt wird über eine Kugelrohr-Destillation gereinigt (Sdp. 130-135 °C bei p = 0.02 mmHg). Man erhält 26.37 g (, bis ein Reinigungsgrad von 97.3 % erreicht

werden konnte. Man erhielt 26.37 g 4-[1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin (68%) als gelbes hochviskoses Öl.

logP (pH2.7): 0.38

MS (ESI): 230.1 ($[M+H]^+$)

- 5 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{d}_3\text{-CD}_3\text{CN}$): δ = 8.49 (d, 2H), 8.20 (s, 1H), 7.94 (s, 1H), 7.48 (d, 2H), 5.39 (dd, 1H), 4.00 (m, 1H), 3.69 (m, 1H), 2.10-2.00 (m, 2H), 1.70-1.50 (m, 4H) ppm

Herstellung von Zwischenverbindungen der Formel [XI] :

4-[1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(tributylstannyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [XI-1]

- 10 Zu einer Lösung von 7.0 g 4-[1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin (30.5 mmol) in trockenem THF (200 mL) werden bei -70 °C unter einer Schutzgasatmosphäre und Rühren 13.5 mL n-Butyllithium (2.5 molar in n-Hexan, 33.75 mmol) zugegeben. Nach beendeter Zugabe wird noch eine Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Danach werden 9.5 g Tri-n-Butylzinnchlorid (29.2 mmol) zugegeben. Anschließend lässt man die Reaktionsmischung auf Raumtemperatur erwärmen und rührt noch 15 min bei dieser Temperatur nach. Alle flüchtigen Komponenten werden im Vakuum
- 15 verdampft und der Rückstand wird im Hochvakuum (<0.1 mbar) destilliert. Die Fraktion mit einem Siedepunkt oberhalb 130 °C wird isoliert und mittels Chromatografie weiter gereinigt (n-Hexane/Diethyl Ether = 1:4 eluent). Es werden 7.5 g 4-[1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(tributylstannyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin (45%) erhalten

logP (pH2.7): 5.09

- 20 MS (ESI): 520.1 ($[M+H]^+$)

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{d}_3\text{-CD}_3\text{CN}$): δ = 8.50 (d, 2H), 8.20 (s, 1H), 7.94 (s, 1H), 7.48 (d, 2H), 5.40 (dd, 1H), 4.00 (m, 1H), 3.68 (m, 1H), 2.10-2.00 (m, 2H), 1.70-1.50 (m, 10H), 1.40-1.30 (m, 6H), 1.10-1.00 (m, 6H), 0.89 (t, 9H) ppm

Herstellung von Zwischenverbindungen der Formel [X] :

- 25 **4-[5-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [X-1]**

250 mg (0.48 mmol) 4-[1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(tributylstannyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin und 126 mg (0.72 mmol) 4-Bromfluorbenzol werden in 3mL Dimethylformamid verrührt. Dazu werden 146 mg Cäsiumfluorid (0.96 mmol), 84 mg Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) (0.07 mmol, 15 Mol%) und 9 mg Kupfer(I)iodid (0.05 mmol, 10 Mol %) gegeben und die Mischung wird

für 5 min mit Schutzgas entgast. Danach wird die Mischung bei 150 °C für 20 min in der Mikrowelle erhitzt (CEM Discover). Anschließend wird die Rohmischung über eine Kartusche mit Celite filtriert und die flüchtigen Komponenten im Vakuum entfernt. Das Rohprodukt wird über Chromatografie an Kieselgel (Cyclohexan /Essigsäureethylester) gereinigt und es werden 47.4 mg 4-[5-(4-Fluorphenyl)-
5 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin (30%) sowie 41 mg des abgespaltenen Produkts 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin **[IX-1]** (35%) als farbloses Öl erhalten.

4-[5-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [X-1]

logP (pH2.7): 1.23

MS (ESI): 324.18 ([M+H]⁺)

10 ¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 8.36 (dd, 2H), 7.90 (s, 1H), 7.42 (dd, 2H), 7.26 (dd, 2H), 7.09 (dd, 2H), 5.01 (dd, 1H), 3.96 (m, 1H), 2.40 (m, 1H), 1.82 (m, 1H), 1.70-1.45 (m, 3H), 1.35-1.25 (m, 1H) ppm

Herstellung von Zwischenverbindungen der Formel [IX] :

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [IX-1]

15 Die in der allgemeinen Vorschrift V11 hergestellten Zwischenprodukte können auch ohne weitere Reinigung in der Entschützungsreaktion eingesetzt werden.

Analog zu oben beschriebenem Verfahren (V11) werden 750 mg (1.45 mmol) 4-[1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(tributylstannyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin, 380 mg (2.17 mmol) 4-Bromfluorbenzol, 440 mg Cäsiumfluorid (2.89 mmol), 250 mg Tetrakis(triphenylphosphin)-palladium(0) (0.28 mmol,
20 15 Mol%) und 28 mg Kupfer(I)iodid (0.15 mmol, 10 Mol%) umgesetzt. Nach Abfiltrieren der unlöslichen Bestandteile über Celite und Entfernen der flüchtigen Komponenten im Vakuum werden 950 mg eines Rohprodukts erhalten.

Das Rohprodukt wird in 5 mL Methanol gelöst und mit 5.8 mL HCl in Dioxan (4 molar) versetzt. Die Lösung wird bei Raumtemperatur 1.5 h gerührt und anschließend eingengt. Der erhaltene
25 Feststoff wird mehrmals mit Diethylether trituriert und es werden 387 mg 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin hydrochlorid (75%) als weisser Feststoff erhalten. Aus diesem kann das freie 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin durch Auflösen des Hydrochlorids in Essigsäureester und waschen mit Natriumcarbonat in Form des salzfreien Pyrazols gewonnen werden.

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin hydrochlorid [IX-1]

logP (pH2.7): 0.65

MS (ESI): 240.11 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 11.3 (s, 0.5H), 8.44 (dd, 2H), 7.89 (s, 1H, br), 7.45 (dd, 2H), 7.40 (s, 0.5H, br), 7.23 (dd, 2H), 7.15 (m, 2H) ppm

5 Herstellung von Verbindungen der Formel [I] nach Verfahren (V7):

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]chinolin [I-1]

79 mg (0.24 mmol) 3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol und 59 mg (0.36mmol) 4-Chlorchinolin werden in 2.5 mL 1,4-Dioxan gelöst. Dazu werden 17.7 mg 1,1'-Bis(Diphenylphosphino)ferrocene]Dichlorpalladium(II)*CH₂Cl₂ (0.01 mmol) und 0.5 mL Natriumcarbonatlösung (2 molar) gegeben. Die Reaktionsmischung wird 5min mit Argon gespült und danach verschlossen. Anschließend wird die Mischung 12 min bei 150 °C in der Mikrowelle erhitzt (CEM Explorer). Nach dem Abkühlen wird von unlöslichen Bestandteilen über Celite abfiltriert und der Rückstand mit 1,4-Dioxan gewaschen. Die organische Phase wird eingedampft und das Rohprodukt über präparative HPLC (XTerra 125x19mm, 5µm, Gradient: 0-1.5 min 80% Wasser, 15% Methanol, 5% wässrige 10%-ige NH₄HCO₃-Lsg, 1.5-10.0 min linearer Gradient auf 0% Wasser, 95% Methanol, 5% wässrige 10%-ige NH₄HCO₃-Lsg, 10.0-15.0 min 0% Wasser, 95% Methanol, 5% wässrige 10%-ige NH₄HCO₃-Lsg) gereinigt. Man erhält 25 mg (22%) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]chinolin als farblosen Feststoff.

logP (pH2.7): 2.23

MS (ESI): 332.07 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.86 (d, 1H), 8.15 (s, 1H), 8.05 (d, 1H), 7.75-7.70 (m, 2H), 7.48 (m, 1H), 7.35 (d, 1H), 7.28 (dd, 2H), 7.03 (t, 2H), 4.65 (m, 1H), 1.56 (d, 6H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [I] nach Verfahren (V6):

N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid [I-2]

50 mg (0.18mmol) N-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanamid und 42 mg (0.13mmol) 4-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol werden in 2.5 mL 1,4-Dioxan gelöst. Dazu werden 11.3 mg 1,1'-Bis(Diphenylphosphino)ferrocene]Dichlorpalladium(II)*CH₂Cl₂ (0.01 mmol) und 1 mL Cäsiumcarbonatlösung (2 molar) gegeben. Die Reaktionsmischung wird 5 min mit Argon gespült und danach verschlossen. Anschließend wird die Mischung 25 min bei

90 °C in der Mikrowelle erhitzt (CEM Explorer). Nach dem Abkühlen wird von unlöslichen Bestandteilen über Celite abfiltriert und der Rückstand mit 1,4-Dioxan gewaschen. Die organische Phase wird eingedampft und das Rohprodukt über präparative HPLC (Macherey Nagel, Nucleodur C18 100-5 ec, VP50x21 mm, Gradient: 0-1.5 min 90% Wasser, 10% Methanol, 1.5-10.0 min linearer Gradient auf 5% Wasser, 95% Methanol, 10.0-15.0 min 0% Wasser, 95% Methanol, Modifier 20% HCOOH in H₂O, Zugabe des Modifiers mit 2.0 mL/min während der gesamten Trennung) gereinigt. Man erhält 46 mg (69%) N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid als farblosen Feststoff.

logP (pH2.7): 1.61

10 MS (ESI): 369.22 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 8.54 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.86 (s, 1H), 7.46 (dd, 2H), 7.09 (t, 2H), 6.87 (dd, 1H), 4.31 (t, 2H), 3.78 (t, 2H), 3.32 (s, 3H), 2.38 (q, 2H), 1.11 (t, 2H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [I] nach Verfahren (V13):

3-{[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}benzonitril [I-3]

15 3-{[5-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}benzonitril [I-4]

60 mg (0.25 mmol) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin wird in 2 mL Dimethylformamid gelöst. Dazu werden 12.7 mg Natriumhydrid (0.32 mol) als 60%-ige Suspension in Mineralöl gegeben und 10 min bei Raumtemperatur verrührt. Anschließend werden 74 mg (0.38 mmol) 3-(Brommethyl)benzonitril zugegeben und die Reaktionsmischung wird 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Zur Aufarbeitung werden ca 2 µL Essigsäure (0.03 mmol) zugegeben. Die erhaltene Suspension wird filtriert und das Rohprodukt wird über präparative HPLC (XTerra 125x19 mm, 5µm, Gradient: 0-1.5 min 80% Wasser, 15% Methanol, 5% wässrige 10%-ige NH₄HCO₃-Lsg, 1.5-10.0 min linearer Gradient auf 15% Wasser, 80% Methanol, 5% wässrige 10%-ige NH₄HCO₃-Lsg, 10.0-15.0 min 15% Wasser, 80% Methanol, 5% wässrige 10%-ige NH₄HCO₃-Lsg) gereinigt. Man erhält 27 mg (30%) des Hauptisomers 3-{[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}benzonitril [I-3] als Mischung (im Verhältnis 58:37) mit dem Minder-Regioisomeren 3-{[5-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}benzonitril [I-4] als farblosen Feststoff.

logP (pH2.7): 1.51 Hauptisomer

logP (pH2.7): 1.38 Minderisomer

30 MS (ESI): 355.2 ([M+H]⁺) für beide Isomere

¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 8.47 (dd), 8.37 (m), 8.16 (s), 7.86 (s), 7.81 (d), 7.70 (m), 7.50 (t), 7.45-7.30 (m), 7.25-7.10 (m), 7.12 (dd), 5.47 (s, 2H, CH₂-Hauptisomer), 5.27 (s, 2H, CH₂-Nebenisomer) ppm

Analog obigem Beispiel sowie entsprechend den allgemeinen Beschreibungen der erfindungsgemäßen Verfahren können die in der folgenden Tabelle 1 genannten Verbindungen der Formel [II] erhalten werden. Diese können in Form von Isomerenmischung gebildet werden, wobei sich der Anteil des Haupt und Nebenisomers je nach verwendetem Substrat unterscheiden kann.

Herstellung von Verbindungen der Formel [I-c] nach Verfahren (V4):

N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid [I-c-1]

22 mg (0.077 mmol) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin und 12 µL (0.084 mmol) Triethylamin werden in 2 mL Tetrahydrofuran gelöst. Dazu werden 8.8 mg Cyclopropancarbonylchlorid (0.084 mmol) gegeben und die Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur 2 Tage gerührt. Anschließend werden die flüchtigen Bestandteile im Vakuum entfernt und das Rohmaterial mit 3 mL NH₃ in Methanol (7 molar) versetzt. Die Mischung wird 2 h bei Raumtemperatur verrührt und anschließend eingedampft. Das Rohprodukt wird über Kieselgelchromatographie (Eluent Cyclohexan / Essigsäureethylester) gereinigt. Man erhält 11.2 mg (40 %) N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid als farblosen Feststoff.

logP (pH 2.7): 2.07

MS (ESI): 365.13 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 8.82 (s, 1H, br), 8.11 (d, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.44 (dd, 2H), 7.06 (t, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.54 (m, 1H), 1.78 (m, 1H), 1.51 (d, 6H), 0.90-0.80 (m, 4H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [I-c] nach Verfahren (V5):

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]chinolin [I-c-2]

80 mg (0.18 mmol) 3-(4-Fluorphenyl)-1-isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol und 68 mg (0.27 mmol) N-(4-Brompyridin-2-yl)-2-methylpropanamid werden in 2.5 mL 1,4-Dioxan gelöst. Dazu werden 15 mg 1,1'-Bis(Diphenylphosphino)ferrocene]Dichlorpalladium(II)*CH₂Cl₂ (0.01 mmol) und 0.5 mL Natriumcarbonatlösung (2 molar) gegeben. Die

Reaktionsmischung wird 5 min mit Argon gespült und danach verschlossen. Anschließend wird die Mischung 25 min bei 80 °C in der Mikrowelle erhitzt (CEM Explorer). Nach dem Abkühlen wird von unlöslichen Bestandteilen über Celite abfiltriert und der Rückstand mit 1,4-Dioxan gewaschen. Die organische Phase wird eingedampft und das Rohprodukt Kieselgelchromatographie (Eluent
5 Cyclohexan / Essigsäureethylester) gereinigt. Man erhält 29 mg (40% Ausbeute) N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid als farblosen Feststoff.

logP (pH2.7): 2.89

MS (ESI): 381.19 ([M+H]⁺)

1H-NMR (400 MHz, d₃-CD₃CN): δ = 8.59 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.83 (s, 1H), 7.46 (dd, 2H), 7.09
10 (dd, 2H), 6.86 (m, 1H), 3.96 (d, 2H), 2.62 (m, 1H), 2.25 (m, 1H), 1.13 (d, 6H), 0.93 (d, 6H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [I-d] nach Verfahren (V17):

4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [I-d-1] und

4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [I-d-2]

Eine Mischung aus 1-(2,6-Difluorphenyl)-3-(dimethylamino)-2-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-on (0.86
15 mmol), Isopropylhydrazin (1.3 mmol) und Triethylamin (1.3 mmol) in 5 ml Ethanol wird 15 min bei 120 °C in der Mikrowelle bestrahlt. Das Lösungsmittel wird im Vakuum evaporiert und der Rückstand über Kieselgel chromatographiert (Gradient Heptan/EE 20:1 bis 5:1). Man erhält 69 mg of 4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin (25% Ausbeute) und 34 mg (12% Ausbeute) 4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin.

20 4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridine

logP (pH2.7): 1.40

MS (ESI): 300.2 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.43 (d, 2H), 8.21 (s, 1H), 7.78 (m, 1H), 7.30 (t, 2H), 7.10 (d, 2H), 4.19 (m, 1H), 1.38 (d, 6H) ppm

25 4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridine

logP (pH2.7): 1.54

MS (ESI): 300.3 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.53 (s, 1H), 8.42 (d, 2H), 7.60 (m, 1H), 7.24 (t, 2H), 7.15 (d, 2H), 4.60 (m, 1H), 1.51 (d, 6H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [XX] nach Verfahren (V18):

1-Cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol [XX-1]

5

Eine Mischung aus 10g 3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol (62mmol), 10.59g Cyclopropylboronsäure (123mmol), 44mL Triethylamin (308mmol) und 40mL Pyridin (493mmol) in trockenem THF wird unter Rückfluss 18h erhitzt. Anschliessend wird die Reaktionsmischung abgekühlt, über Celite filtriert und eingengt. Der Rückstand wird in Essigester aufgenommen, mit Na₂CO₃ Lösung gewaschen, getrocknet und im Vacuum eingengt. Das Rohprodukt wird über Kieselgel chromatographiert und es werden 5g (40%) 1-Cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol erhalten.

10

MS (ESI): 203.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400MHz, CDCl₃) δ = 7.76-7.73 (m, 2H) 7.435 (d, J=2.04Hz, 1H), 7.05 (t, J=8.6Hz, 2H), 6.44 (s, 1H), 3.64-3.58 (m, 1H), 1.24-1.14 (m, 2H), 1.06-1.01 (m, 2H) ppm

15 **Herstellung von Verbindungen der Formel [XXVII] nach Verfahren (V16):**

4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [XXVII-1]

Eine Mischung aus 1-(2,6-Difluorphenyl)-3-(dimethylamino)-2-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-on (0.86 mmol), Hydrazinhydrat (1.3 mmol) und Triethylamin (1.3 mmol) in 5 ml Ethanol wird 15 min bei 120 °C in der Mikrowelle bestrahlt. Das Lösungsmittel wird im Vakuum evaporiert, der Rückstand in Dichlormethan (DCM) aufgenommen und die Suspension filtriert. Der Feststoff wird im Vacuumofen getrocknet bei 50 °C getrocknet. Man erhält 0.18 g (76% Ausbeute) 4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin.

20

logP (pH2.7): 1.54

MS (ESI): 258.1 ([M+H]⁺)

25 ¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 13.59 (bs, 1H), 8.46 (m, 3H), 7.60(m, 1H), 7.29 (m, 2H), 7.18 (m, 2H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [XXVI] nach Verfahren (V15):

1-(2,6-Difluorphenyl)-3-(dimethylamino)-2-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-on [XXVI-1]

Zu einer Suspension aus 4-(2,6-Difluorphenyl)-2-pyrid-4-ylethanon (17.7 mmol) in 20 ml N,N-Dimethylformamid (DMF) wird mit N,N-Dimethylformamid-dimethylacetal (60.3 mmol) versetzt und 3 h unter Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird das Lösungsmittel im Vakuum evaporiert, der Rückstand in Essigsäureethylester aufgenommen und die wässrige Phase dreimal mit EE extrahiert. Die gesammelten Extrakte werden über MgSO₄ getrocknet und im Vakuum eingengt. Der Rückstand wird über Kieselgel chromatographiert (Gradient Heptan/EE 2:1 bis 0:1). Man erhält 3.1 g (58%) 1-(2,6-Difluorphenyl)-3-(dimethylamino)-2-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-on.

logP (pH2.7): 0.60

10 MS (ESI): 289.2 ([M+H]⁺)

Herstellung von Verbindungen der Formel [XXV] nach Verfahren (V14):

1-(2,6-Difluorphenyl)-2-(pyridin-4-yl)ethanon [XXV-1]

Eine Lösung aus 4-Methylpyridin (24.6 mmol) und 2,6-Difluorbenzoesäureethylester (27.1 mmol) in 58 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran (THF) wird auf 0 °C gekühlt und tropfenweise mit 24.6 ml Lithiumbistrimethylsilylamid (LiHMDS, 1 molare Lösung in Hexan) versetzt. Nach 3 Stunden bei 5-10 °C wird Wasser zugegeben und mit Essigsäureethylester (Essigsäureethylester) extrahiert. Die organische Phase wird mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung (gesättigte NaCl) gewaschen, über Magnesiumsulfat (MgSO₄) getrocknet und im Vakuum eingengt. Der Rückstand wird über Kieselgel chromatographiert (Gradient Heptan/EE 3:1 bis 1:1). Man erhält 4.1 g (54% Ausbeute) 4-(2,6-difluorphenyl)-2-pyrid-4-ylethanon.

logP (pH2.7): 0.62

MS (ESI): 234.1 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.53 (d, 2H), 7.65 (m, 1H), 7.27 (m, 4H), 4.34 (s, 2H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [XXVIII] nach Verfahren (V19):

25 4-[5-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [XXVIII-1]

Eine Lösung aus 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin (0.58 mmol) in 2 ml of N,N-dimethylformamid und N-Bromsuccinimid (0.58 mmol) wird 2 h auf 80 °C erhitzt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Wasser und Essigsäureethylester versetzt. Die organische Phase wird mit Wasser gewaschen, über MgSO₄ getrocknet und nach dem Filtrieren im Vakuum

eingengt. Der Rückstand wird in Diisopropylether suspendiert, filtriert und im Vacuumofen bei 50 °C getrocknet. Man erhielt 0.13 g (64% Ausbeute) 4-[5-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin.

logP (pH2.7): 0.92

5 MS (ESI): 318.0 ($[M+H]^+$)

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, d_6 -DMSO): δ = 13.88 (bs, 1H), 8.60 (d, 2H), 7.38 (m, 2H), 7.29 (m, 4H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [IX-b] nach Verfahren (V20):

4-[3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [IX-b-1]

Unter Argon wird zu einer Lösung aus Natriumhydrogencarbonat (NaHCO_3 , 2.1 mmol) und
10 Dichlor[1.1'-ferrocenylbis(diphenylphosphan)]palladium(II)dichloromethan (0.03mmol) eine entgaste Lösung aus 4-[5-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin und 4-[3-Brom-5-(4-fluorphenyl)-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin (Mischung zweier Regioisomere, 1:1, 0.68 mmol) in 10.5 ml Dimethoxyethan und 3 ml Wasser gegeben. Es folgt die Zugabe einer 50%-igen Lösung von Trimethylboroxin (1,36 mmol) in THF. Das Gemisch wird 3 h
15 auf 90 °C erhitzt, auf Raumtemperatur abgekühlt und mit Wasser und Essigsäureethylester versetzt. Die wässrige Lösung wird mit Essigsäureethylester extrahiert, die organische Phase mit gesättigter wässriger NaCl-Lösung gewaschen, über MgSO_4 getrocknet und im Vakuum eingengt.

Abspaltung des N-Substituenten am Pyrazol: Der Rückstand wird in 3 ml Trifluoressigsäure (TFA) aufgenommen und 2 h bei 65 °C gerührt. Nach Zugabe von Wasser und Essigsäureethylester wird die
20 organische Phase mit Essigsäureethylester extrahiert, mit gesättigter wässriger NaCl-Lösung gewaschen, über MgSO_4 getrocknet und im Vakuum eingengt.

Der Rückstand wird an Kieselgel chromatographiert (Gradient DCM/Methanol (MeOH) 20:1 bis 10:1). Man erhält 88 mg (43%Ausbeute) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin.

logP (pH2.7): 0.60

25 MS (ESI): 254.1 ($[M+H]^+$)

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, d_6 -DMSO): δ = 13.03 (s, 1H), 8.52 (d, 2H), 7.35 (m, 2H), 7.16 (m, 4H), 2.29 (s, 3H) ppm

4-[3-(4-Fluorphenyl)-5-cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin [IX-b-2]

Unter Argon wird zu einer Lösung aus Natriumhydrogencarbonat (NaHCO_3 , 2.1 mmol), Dichlor[1.1'-ferrocenylbis(diphenylphosphan)]palladium(II)dichloromethan (0.03 mmol) und Cyclopropylboronsäure (1,63 mmol) eine entgaste Lösung aus 4-[5-Brom-3-(4-fluorphenyl)-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin und 4-[3-Brom-5-(4-fluorphenyl)-1-(4-methoxybenzyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin (Mischung zweier Regioisomere, 1:1, 0.68 mmol) in 10.5 ml Dimethoxyethan und 3 ml Wasser gegeben. Das Gemisch wird 3 h auf 90 °C und 16 h auf 65 °C erhitzt, auf Raumtemperatur abgekühlt und mit Wasser und Essigsäureethylester versetzt. Die wässrige Lösung wird mit Essigsäureethylester extrahiert, die organische Phase mit ges. NaCl gewaschen, über MgSO_4 getrocknet und im Vakuum eingeeengt.

- 10 Abspaltung des N-Substituenten am Pyrazol: Der Rückstand wird in 3 ml Trifluoressigsäure (TFA) aufgenommen und 2 h bei 65 °C gerührt. Nach Zugabe von Wasser und EE wird die organische Phase mit Essigsäureethylester extrahiert, mit ges. NaCl gewaschen, über MgSO_4 getrocknet und im Vakuum eingeeengt.

Der Rückstand wird an Kieselgel chromatographiert (Gradient DCM/Methanol (MeOH) 20:1 bis 10:1). Man erhielt 75.8 mg (38% Ausbeute) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-5-cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin.

$\log P$ ($\text{pH} 2.7$): 0.920

MS (ESI): 280 ($[\text{M}+\text{H}]^+$)

Herstellung von Verbindungen der Formel [XXXII] nach Verfahren (V22):

- 20 **5-(4-Fluorphenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on [XXXII-1]**

Zu einer Lösung von 8.00g Methyl-3-(4-fluorphenyl)-3-oxopropanoat (40.8mmol) in 45mL Ethylacetat werden langsam 2.43g (53.0mmol) Methylhydrazin zugegeben. Anschliessend wird die Reaktionsmischung unter Rückfluss bis zur kompletten Umsetzung des Startmaterials erhitzt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird die Reaktionsmischung mit Diethylether und Wasser versetzt.

25 Der gebildete Niederschlag wird abgesaugt, mit einer Petrolether/Diethylether Mischung (60mL, 1:1) gewaschen und getrocknet. Man erhält 5.33 g (68%) 5-(4-Fluorphenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on.

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3): δ = 7.69-7.63 (m, 2 H); 7.12 (t, 2 H); 3.59 (s, 2 H), 3.41 (s, 3H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [XXXIII] nach Verfahren (V23):

- 30 **5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol [XXXIII-1]**

Zu einer Lösung von 4.40g (22.9 mmol) 5-(4-Fluorphenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on in wasserfreiem Acetonitril (100 mL) werden 3.16g (22.9mmol) K_2CO_3 und 4.19g (27.5 mmol) Natriumchlordifluoracetat gegeben und die Mischung wird 5h in einer N_2 -Athmosphäre unter Rückfluss erhitzt. Nach Abkühlen der Reaktionsmischung wird wässrige NH_4Cl Lösung (85mL) zugegeben und die organische Phase mit Essigester extrahiert (3x50 mL). Die vereinigten organischen Extrakte werden mit NaCl Lösung gewaschen, getrocknet und im Vacuum eingengt. Das Rohprodukt wird durch Chromatografie an Kieselgel (Eluent Petrolether/Essigester 8/2) gereinigt. Es werden 1.26g (23%) 5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol erhalten.

1H -NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ = 7.74-7.68 (m, 2 H); 7.08 (t, 2 H); 6.56 (t, 2JHF = 72.2 Hz, 1 H, CHF₂); 6.14 (s, 1H); 3.78 (s, 3 H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [VI-b] nach Verfahren (V24):

4-Brom-5-(difluormethoxy)-3-(4-fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol [VI-b-1]

Zu einer Lösung von 1.16g (7.28mmol) 5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol in Dichlormethan (14mL) werden tropfenweise 0.914g (5.72mmol) Brom zugegeben. Die Reaktionsmischung wird 26h bei Raumtemperatur gerührt. Anschliessend wird das Reaktionsgemisch mit $Na_2S_2O_3$ -Lösung (3x 20mL) und mit $NaHCO_3$ -Lösung (3x30mL) gewaschen. Die organische Phase wird getrocknet und im Vacuum eingengt. Es werden 1.34g (80%) 4-Brom-5-(difluormethoxy)-3-(4-fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol erhalten.

logP (pH2.7): 3.52

MS (ESI): 321.1 ($[M+H]^+$)

1H -NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 7.86-7.81 (m, 2H), 7.50-7.15 (m, 3H), 3.80 (s, 3H) ppm

25

Analog obigem Beispiel können ebenfalls die folgenden Verbindungen der Formel [VI-b] erhalten werden:

4-Brom-5-(difluormethoxy)-3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol [VI-b-2]

30 logP (pH2.7): 4.61

MS (ESI): 351.0 ($[M+H]^+$)

1H -NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 7.87-7.82 (m, 2H), 7.52-7.16 (m, 3H), 4.64-4.57 (m, 1H), 1.42 (d, 6H) ppm

35 4-Brom-5-(difluormethoxy)-3-(4-fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol [VI-b-3]

logP (pH2.7): 4.91

MS (ESI): 365.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d6-DMSO): δ = 7.87-7.83 (m, 2H), 7.51-7.16 (m, 3H), 3.90 (d, 2H), 2.22-2.15 (m, 6H) ppm

5

4-Brom-5-(difluormethoxy)-3-(4-fluor-2-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol [VI-b-4]

logP (pH2.7): 3.15

MS (ESI): 353.0 ([M+H]⁺)

10 ¹H-NMR (400 MHz, d6-DMSO): δ = 7.50-7.13 (m, 3H), 7.05-7.02 (m, 1H), 6.86-6.81 (m, 1H) 3.80 (s, 3H), 3.78 (s, 3H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [VI-c] nach Verfahren (V25):

15 **2-[4-Brom-5-(difluormethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-5-fluorphenol [VI-c-1]**

Zu einer Lösung von 3.0g (8.6mmol) 4-Brom-5-(difluormethoxy)-3-(4-fluor-2-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol in Dichlormethan (68mL) werden tropfenweise 5.8mL BBr₃ (1M Lösung in Dichlormethan, 5.8mmol) bei 0°C zugegeben. Die Reaktionsmischung wird langsam auf
20 Raumtemperatur erwärmt und 23h gerührt. Anschliessend werden 150mL Diethylether zugegeben und die erhaltene Mischung wird zwischen gesättigter NaHCO₃-Lösung (100mL) und Essigester (200mL) verteilt. Der erhaltene Niederschlag wird durch Zugabe von 100mL Wasser gelöst und die Phasen getrennt. Die wässrige Phase wird mit Essigester extrahiert (3x 200mL). Die vereinigten organischen Extrakte werden mit Wasser, gesättigter NaCl Lösung gewaschen und getrocknet. Nach
25 Entfernen des Lösungsmittels im Vacuum wird das erhaltene Rohprodukt durch Chromatografie an Kieselgel (Eluent Petrolether/Essigester 95/5) gereinigt. Es werden 1.6g (55%) 2-[4-Brom-5-(difluormethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-5-fluorphenol erhalten.

logP (pH2.7): 3.48

30 MS (ESI): 336.9 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d6-DMSO): δ = 7.49-7.13 (m, 2H), 6.74-6.68 (m, 2H), 3.78 (s, 3H) ppm

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [XXXVII] nach Verfahren V14:

35 **1-(4-Fluorphenyl)-2-[2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-yl]ethanon [XXXVII-1]**

Eine Lösung aus 4-Methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin (1eq, 41mmol) und Ethyl-4-fluorbenzoat (1.1eq, 45mmol) in 50 mL wasserfreiem Tetrahydrofuran (THF) wird auf 0°C gekühlt und tropfenweise mit Lithiumbistrimethylsilylamid (2eq, 82mmol, 1 molare Lösung von LiHMDS in n-Hexan) versetzt. Nach 3 Stunden bei 5-10 °C wird Wasser zugegeben und mit Essigsäureethylester (Essigsäureethylester) extrahiert. Die organische Phase wird mit gesättigter Natriumchlorid- Lösung (NaCl) gewaschen, über Magnesiumsulfat (MgSO₄) getrocknet und im Vakuum eingengt. Der Rückstand wird durch Kristallisation aus 100mL Cyclohexan gereinigt und im Vacuum getrocknet. Man erhält 8.9 g (83% Ausbeute) 1-(4-Fluorphenyl)-2-[2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-yl]ethanon.

10 **Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [XXXVIII] nach Verfahren V15:**

3-(Dimethylamino)-1-(4-fluorphenyl)-2-[2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-yl]prop-2-en-1-on [XXXVIII-1]

15 Eine Lösung von 1-(4-Fluorphenyl)-2-[2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-yl]ethanon (1eq, 30mmol) in 40mL N,N-Dimethylformamid-dimethylacetal wird 1h bei 75-80°C erhitzt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird das Lösungsmittel im Vakuum entfernt und der Rückstand durch Chromatografie an Kieselgel (Gradient Heptan/Ethylacetat 1:1 auf 2:8) gereinigt. Man erhält 9.3 g (97%) (2Z)-3-(Dimethylamino)-1-(4-fluorphenyl)-2-[2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-yl]prop-2-en-1-on.

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [XXXIX] nach Verfahren V16:

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfanyl)pyrimidin [XXXIX-1]

25

Eine Mischung aus 3-(Dimethylamino)-1-(4-fluorphenyl)-2-[2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-yl]prop-2-en-1-on (1eq, 29 mmol), Hydrazinhydrat (1.5eq, 44 mmol) und Triethylamin (1.5eq, 44 mmol) in 186 mL Ethanol wird 3h unter Rückfluss erhitzt. Das Lösungsmittel wird im Vakuum evaporiert, Wasser wird hinzugegeben und mit Ethylacetat extrahiert. Die organische Phase wird abgetrennt, getrocknet (MgSO₄) und im Vacuum eingengt. Man erhält 7.9 g (94% Ausbeute) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfanyl)pyrimidin.

30

logP (pH2.7): 2.28

MS (ESI): 287.0 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 13.48 (bs, 1H), 8.44 (d, 1H), 8.38 (bs, 1H), 7.56 (m, 2H), 7.27 (t, 2H), 7.12 (d, 1H), 2.21 (s, 3H) ppm

35

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [XL] nach Verfahren V13:**4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfanyl)pyrimidin [XL-1]**

Zu einer Lösung von 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfanyl)pyrimidin (1 eq, 29.3 mmol) in 75 mL *N,N*-Dimethylformamid werden Cs₂CO₃ (2.5 eq, 73.3 mmol) und 2-Iodpropan (1.5 eq, 44 mmol) zugegeben und die Reaktionsmischung wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Danach wird die Mischung mit Wasser versetzt und mit Essigester extrahiert. Die organische Phase wird getrocknet, eingedampft und durch Chromatografie an Kieselgel (Gradient Dichlormethan/Ethylacetat 20:1 auf 5:1) gereinigt. Es werden 6.5 g (64%) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfanyl)pyrimidin erhalten.

10

logP (pH2.7): 3.62

MS (ESI): 329.0 ([M+H]⁺)¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): δ = 8.28 (d, 1H), 8.10 (s, 1H), 7.52 (m, 2H), 7.11 (t, 2H), 6.73 (d, 1H), 4.57 (m, 1H), 2.50 (s, 3H), 1.60 (d, 6H) ppm15 **Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [XLI] nach Verfahren V27:****4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfonyl)pyrimidin [XLI-1]**

Eine Lösung von 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfanyl)pyrimidin (1 eq, 19.7 mmol) und *m*-Chlorperbenzoesäure (2 eq, 40 mmol, 70%) in 520 mL Dichlormethan wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Danach wird die Reaktionsmischung mit Wasser und Natriumsulfit (2.1 eq, 41.5 mmol) versetzt und die Phasen getrennt. Die organische Phase wird 2x mit einer 2M K₂CO₃ Lösung gewaschen, getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Es werden 6.3 g (84%) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfonyl)pyrimidin erhalten.

20

logP (pH2.7): 2.90

MS (ESI): 375.1 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.87 (d, 1H), 8.70 (s, 1H), 7.62 (d, 1H), 7.61 (m, 2H), 7.25 (t, 2H), 4.05 (d, 2H), 3.17 (s, 3H), 2.22 (m, 1H), 0.92 (d, 6H) ppm

25

Herstellung von Verbindungen der Formel [I-f] nach Verfahren V28:30 **N-Benzyl-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin [I-f-1]**

Eine Mischung von 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfonyl)pyrimidin (1eq, 9.15 mmol) in 43 mL Benzylamin wird 4h bei Raumtemperatur gerührt. Anschliessend wird das Benzylamin im Vakuum entfernt und das Rohprodukt durch Chromatografie an Kieselgel (Gradient Dichlormethane / Ethylacetat 20:1 auf 5:1) gereinigt. Man erhält 1.77 g (47%) N-Benzyl-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin.

logP (pH2.7): 3.31

MS (ESI): 385.1 ([M+H]⁺)

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [III-a] nach Verfahren V29:

10 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin [III-a-1]

Eine Lösung von N-Benzyl-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin (1eq, 5.21 mmol) in Schwefelsäure (100 eq, 521 mmol) wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Anschliessend wird die Reaktionsmischung zunächst mit Eis, dann mit Wasser versetzt und vorsichtig mit 30% NaOH bis zum pH=9 neutralisiert. Die wässrige Phase wird mehrmals mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Es werden 1.1 g (67%) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin erhalten.

logP (pH2.7): 1.54

20 MS (ESI): 298.2 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 8.23 (s, 1H), 8.08 (d, 1H), 7.55 (m, 2H), 7.23 (t, 2H), 6.47 (s, 1H), 6.76 (d, 1H), 6.35 (d, 1H), 4.57 (m, 1H), 1.48 (d, 6H) ppm

Herstellung von Verbindungen der Formel [I-g] nach Verfahren V4:

25 N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}propanamid [I-g-1]

Zu einer Lösung von 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin (4eq, 1.34mmol) und Triethylamin (4eq, 1.34mmol) in 6 mL Tetrahydrofuran wird Propionylchlorid (2eq, 0.67 mmol) gegeben. Die Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur über Nacht gerührt. Anschließend werden die flüchtigen Bestandteile im Vakuum entfernt und das Rohmaterial mit 6 mL NH₃ in Methanol (7 molar) versetzt. Die Mischung wird 2 h bei Raumtemperatur verrührt und anschließend eingedampft. Das Rohprodukt wird mit Wasser versetzt und 2x mit Dichlormethan extrahiert. Die organischen Extrakte werden getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Das Rohprodukt wird über Chromatographie an Kieselgel (Eluent Heptan / Essigsäureethylester) gereinigt. Man erhält 70 mg (59%) N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}propanamid.

logP (pH2.7): 2.35

MS (ESI): 354.2 ([M+H]⁺)

¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 10.27 (bs, 1H), 8.46 (d, 1H), 8.38 (s, 1H), 7.60 (m, 2H), 7.23 (t, 2H), 6.94 (m, 1H), 4.61 (m, 1H), 2.40 (q, 2H), 1.50 (d, 6H), 0.98 (t, 3H) ppm

5

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [XLIII] nach Verfahren V14:

2-(2-Chlorpyrimidin-4-yl)-1-(4-fluorphenyl)ethanon [XLIII-1]

- 10 Eine Lösung aus 2-Chlor-4-methylpyrimidin (1eq, 15.5mmol) und Ethyl-4-fluorbenzoat (1.1eq, 17.1mmol) in 17 mL wasserfreiem Tetrahydrofuran (THF) wird auf 0°C gekühlt und tropfenweise mit Lithiumbistrimethylsilylamid (2eq, 31mmol, 1 molare Lösung von LiHMDS in n-Hexan) versetzt. Nach 3 Stunden bei 5-10 °C wird Wasser zugegeben und mit Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird mit gesättigter Natriumchlorid- Lösung (NaCl) gewaschen, über
- 15 Magnesiumsulfat (MgSO₄) getrocknet und im Vakuum eingengt. Man erhält 3.8 g (83% Ausbeute) 2-(2-Chlorpyrimidin-4-yl)-1-(4-fluorphenyl)ethanon (Mischung aus Keto- und Enolform 4/9).

logP (pH2.7): 2.27

MS (ESI): 251.0 ([M+H]⁺)

- ¹H-NMR (400 MHz, d₆-DMSO): δ = 13.58 (s, 1H, enol), 8.75 (d, 1H), 8.57 (bs, 1H, enol), 8.11 (m, 2H), 7.92 (m, 2H, enol), 7.60 (d, 1H), 7.41 (m, 2H), 7.34 (m, 3H, enol), 6.51 (bs, 1H, enol), 4.70 (s, 2H) ppm
- 20

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [XLIV] nach Verfahren V28:

- 25 **N-Benzyl-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin [XLIV-1]**

- Eine Mischung von 2-(2-Chlorpyrimidin-4-yl)-1-(4-fluorphenyl)ethanon (1eq, 16 mmol) in 27 mL Isopropylamin wird 10min bei 110°C im Mikrowellenofen erhitzt (CEM Explorer). Anschliessend wird das Amin im Vakuum entfernt und das Rohprodukt mit Dichlormethan (25mL) und 1M HCl
- 30 (7mL) versetzt. Die Lösung wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt und anschliessend mit 1M NaOH neutralisiert. Die Phasen werden getrennt und die wässrige Phase wird 2x mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden getrocknet (MgSO₄) und im Vakuum eingengt. Man erhält 4.0 g (77%) 1-(4-Fluorphenyl)-2-[2-(isopropylamino)pyrimidin-4-yl]ethanon.

- 35 logP (pH2.7): 2.05

MS (ESI): 274.2 ($[M+H]^+$)

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [XLV] nach Verfahren V15:

5 3-(Dimethylamino)-1-(4-fluorphenyl)-2-[2-(isopropylamino)pyrimidin-4-yl]prop-2-en-1-on [XLV-1]

Eine Lösung von 1-(4-Fluorphenyl)-2-[2-(isopropylamino)pyrimidin-4-yl]ethanon (1eq, 14.6mmol) in einer Mischung von 6.5mL N,N-Dimethylformamid und 6.5mL N,N-Dimethylformamid-dimethylacetal wird 2.5h bei 100°C erhitzt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird das Lösungsmittel im Vakuum entfernt. Man erhält 5.4 g (65%) 3-(Dimethylamino)-1-(4-fluorphenyl)-2-[2-(isopropylamino)pyrimidin-4-yl]prop-2-en-1-on.

logP (pH2.7): 1.45

MS (ESI): 329.2 ($[M+H]^+$)

15

Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel [XLVI] nach Verfahren V16:

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-isopropylpyrimidin-2-amin [XLVI-1]

20 Eine Mischung aus 3-(Dimethylamino)-1-(4-fluorphenyl)-2-[2-(isopropylamino)pyrimidin-4-yl]prop-2-en-1-on (1eq, 16.4 mmol), Hydrazinhydrat (1.1eq, 18 mmol) in 100 mL Ethanol wird 16h bei Raumtemperatur gerührt. Das Lösungsmittel wird im Vakuum evaporiert und der Rückstand durch Chromatografie an Kieselgel (Gradient Heptan/Ethylacetat 1:0 auf 6:4) gereinigt. Man erhält 3.5 g (65% Ausbeute) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-isopropylpyrimidin-2-amin.

25 logP (pH2.7): 1.37

MS (ESI): 298.2 ($[M+H]^+$)

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, d_6 -DMSO): δ = 13.28 (bs, 1H), 8.12 (d, 1H), 7.59(bs, 2H), 7.28 (bs, 2H), 6.77 (d, 1H), 6.52 (bs, 1H), 3.81 (bs, 1H), 1.09 (bs, 6H) ppm.

30 Herstellung von Verbindungen der Formel [I-h] nach Verfahren V13:

4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl]-N-isopropylpyrimidin-2-amin [I-h-1]

Zu einer Lösung von 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-isopropylpyrimidin-2-amin (1eq, 0.82 mmol) in 8mL N,N-Dimethylformamid werden Cs_2CO_3 (1.1eq, 0.9 mmol) und 2-Iodpropan (1.5 eq,

35

- 1.23 mmol) zugegeben und die Reaktionsmischung wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt und anschliessend 4h bei 80°C erhitzt. Danach wird das Lösungsmittel entfernt, das Rohprodukt mit Wasser versetzt und 3x mit Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird getrocknet, eingeeengt und durch Chromatografie an Kieselgel (Gradient Heptan/Ethylacetat 1:0 auf 1:1) gereinigt.
- 5 Es werden 124 mg (40%) 4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl]-N-isopropylpyrimidin-2-amin erhalten.

logP (pH2.7): 1.81

MS (ESI): 312.2 ([M+H]⁺)

- 10 ¹H-NMR (400 MHz, CDCl₃): δ = 8.01 (d, 1H), 7.89 (s, 1H), 7.45 (m, 2H), 7.02 (t, 2H), 6.36 (d, 1H), 4.94 (bs, 2H), 3.89 (d, 2H), 2.23 (m, 1H), 0.91 (d, 6H) ppm

Nach den zuvor angegebenen Methoden werden auch die in den nachstehenden Tabellen I-III genannten Verbindungen der Formel **[I-a]** und **[I-b]** erhalten.




Tabelle 1

Tabelle 1

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
1	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Methylpropyl	H	H	H
2	CH	2,6-Difluorphenyl	H	2-Methylpropyl	H	H	H
3	CH	2,6-Difluorphenyl	H	Butan-2-yl	H	H	H
4 ^[S]	CH	4-Fluorphenyl	H	H	H	H	H
5	N	3-Chlorphenyl	H	2-Methylpropyl	H	H	H
6	CH	2,6-Difluorphenyl	H	2,2-Dimethylpropyl	H	H	H
7	CH	2,6-Difluorphenyl	H	3-Methylbut-2-en-1-yl	H	H	H
8	CH	2,6-Difluorphenyl	H	Cyclobutyl	H	H	H
9	CH	4-Fluorphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
10	CH	2,6-Difluorphenyl	H	Propan-2-yl	H	H	H
11	CH	2,6-Difluorphenyl	H	2,2-Dimethylpropyl	H	H	H
12	CH	2,6-Difluorphenyl	H	2,2,2-Trifluorethyl	H	H	H
13	CH	2,6-Difluorphenyl	H	2-Methylpropyl	H	H	H
14	CH	2,6-Difluorphenyl	H	Propan-2-yl	H	H	H
15	CH	2,6-Difluorphenyl	H	Cyclobutyl	H	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/501}	R ^{4/501}	R ⁵	R ⁶
16	CH	2,6-Difluorophenyl	H	Cyclopentyl	H	H	H
17	CH	2,6-Difluorophenyl	H	Cyclopentyl	H	H	H
18 ^[s]	N	4-Fluorophenyl	H	H	CH ₃	H	H
19	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Propanoylamino	H	H
20	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	-NHCH=CH-	H
21	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
22	CH	2,6-Difluorophenyl	H	3-Methylbut-2-en-1-yl	H	H	H
23	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
24	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	H	H	H
25	CH	4-Fluorophenyl	H	3-Methylbut-2-en-1-yl	H	H	H
26	CH	2,6-Difluorophenyl	H	Tetrahydrofuran-2-ylmethyl	H	H	H
27	CH	2,6-Difluorophenyl	H	Tetrahydrofuran-2-ylmethyl	H	H	H
28	CH	3-Chlorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
29	N	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	CH ₃	H	H
30	CH	4-Fluorophenyl	H	3-Methylbut-2-en-1-yl	H	H	H
31	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	CH ₃	H	H
32	CH	3-Chlorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	-NHCH=CH-	H
33	CH	2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-yl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
34	N	3-Chlorophenyl	H	3-Methylbut-2-en-1-yl	H	H	H
35	CH	4-Fluorophenyl	Brom	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
36	N	3-(Trifluormethyl)phenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Morpholin-4-yl	H	H
37	CH	4-Fluor-2-methylphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
38	CH	2,6-Difluorophenyl	H	Butan-2-yl	H	H	H
39	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Amino	H	H
40	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	(Methoxyacetyl)amino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/401}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
41	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	(2,2-Dimethylpropanoyl)a	H	H
42	CH	3-(Trifluoromethyl)phenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
43	CH	4-Methoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
44	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	H	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl	
45	CH	4-Methoxynaphthalen-1-yl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
46	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	Amino	H	H
47	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	H	-(prop-2-yn-1-yl)N-CH=CH-	
48	CH	3-(Trifluoromethyl)phenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	(2,2-Dimethylpropanoyl)a	H	H
49	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	-(prop-2-yn-1-yl)N-CH=CH-	
50	CH	3-(Trifluoromethyl)phenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	-NHCH=CH-	
51	CH	3-Chlor-4-fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
52	N	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Morpholin-4-yl	H	H
53	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	Methylcarbamoyl	H	H
54	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	(1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl	
55	CH	4-Fluor-3-methylphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
56	CH	2,4-Difluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
57	CH	4-tert-Butylphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
58	CH	4-Fluorophenyl	H	tert-Butyl	H	H	H
59	CH	4-Phenoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
60	CH	3-Cyanophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
61	CH	3-Cyan-4-fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
62	N	4-Methoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	1H-Pyrazol-1-yl	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/40}	R ^{4/40}	R ⁵	R ⁶
63	N	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Ethylamino	H	H
64	CH	4-Fluor-2-methoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
65	N	4-Methoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	-NHCH=CH-	
66	N	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	-NHCH=CH-	
67	CH	3-Phenoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
68	CH	4-(Methylsulfonyl)phenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
69	CH	4-Methoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Amino	H	H
70	CH	4-Chlorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
71	CH	4-(Trifluormethoxy)phenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
72	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	(2,2-Dimethylpropanoyl)amino	H	H
73	CH	4-Methoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	CH ₃	H	H
74	N	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Methylsulfonyl	H	H
75	N	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	1H-Pyrazol-1-yl	H	H
76	CH	2,3-Dichlorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
77	N	4-Methoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	CH ₃	H	H
78	N	4-Methoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Ethylamino	H	H
79	CH	4-Fluorophenyl	H	5-(Trifluormethyl)pyridin-2-yl	H	H	H
80	CH	4-Methoxyphenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	-NHCH=CH-	
81	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	-N(COCH ₃)-CH=CH-	
82	CH	3-(Trifluormethyl)phenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	(2,2-Dimethylpropanoyl)amino	H	H
83	CH	3-Chlorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Methylcarbonyl	H	H
84	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
85	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	Propanoylamino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/501}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
86	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
87	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
88	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methoxyethyl	H	H	H
89	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	H	H	H
90	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Methylcarbonyl	H	H
91	CH	4-Fluorophenyl	H	Butan-2-yl	H	H	H
92	CH	4-Fluorophenyl	H	Cyclopentyl	H	H	H
93	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Carbamoyl	H	H
94	CH	4-Fluorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Phenylcarbonyl	H	H
95	CH	3-Chlorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Carbamoyl	H	H
96	CH	3-Chlorophenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	Phenylcarbonyl	H	H
97	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	Amino	H	H
98	CH	2-(Benzoyloxy)phenyl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
99	CH	Chinolin-8-yl	H	Tetrahydro-2H-pyran-2-yl	H	H	H
100	CH	4-Fluorophenyl	H	Pyridin-3-ylmethyl	H	H	H
101	CH	4-Fluorophenyl	H	1-(3-Chlorophenyl)ethyl	H	H	H
102	CH	4-Fluorophenyl	H	1-(2-Chlorophenyl)ethyl	H	H	H
103	CH	4-Fluorophenyl	H	2,2,2-Trifluorethyl	H	H	H
104	CH	4-Fluorophenyl	H	2,3-Difluorobenzyl	H	H	H
105	CH	4-Fluorophenyl	H	2-tert-Butoxy-2-oxoethyl	H	H	H
106	CH	4-Fluorophenyl	H	1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl	H	H	H
107	CH	4-Fluorophenyl	H	1-Methoxy-1-oxopropan-2-yl	H	H	H
108	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Chlor-6-fluorobenzyl	H	H	H
109	CH	4-Fluorophenyl	H	4-(Difluoromethoxy)benzyl	H	H	H
110	CH	4-Fluorophenyl	H	(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl	H	H	H
111	CH	4-Fluorophenyl	H	5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl	H	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/401}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
112	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
113	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
114	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
115	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
116	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
117	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
118	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
119	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
120	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
121	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
122	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
123	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
124	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
125	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
126	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
127	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
128	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
129	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
130	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
131	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
132	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
133	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
134	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
135	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
136	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
137	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
138	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
139	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H
140	CH	4-Fluorophenyl	H		H	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
141	CH	4-Fluorophenyl	H	4-Cyanbenzyl	H	H	H
142	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Oxotetrahydrofuran-3-yl	H	H	H
143	CH	4-Fluorophenyl	H	1H-Imidazol-2-ylmethyl	H	H	H
144	CH	4-Fluorophenyl	H	2-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-oxoethyl	H	H	H
145	CH	4-Fluorophenyl	H	2-(Acetyloxy)ethyl	H	H	H
146	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Cyanethyl	H	H	H
147	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	H	-NHCOCH ₂ -	
148	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	H	-N(CH ₃)COC(CH ₃) ₂ -	
149	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Prop-2-en-1-ylamino	H	H
150	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Prop-2-en-1-ylamino	H	H
151 ^[S]	CH	4-Methoxyphenyl	H	H	H	H	H
152 ^[S]	CH	3-(Trifluormethyl)phenyl	H	H	H	H	H
153	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methoxyethyl	Propanoylamino	H	H
154	CH	3-Cyan-4-fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	H	H	H
155	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Propanoylamino	H	H
156	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	(Cyclobutylcarbonyl)amino	H	H
157	CH	4-Fluorophenyl	H	Butan-2-yl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
158	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
159	CH	4-Fluorophenyl	H	Butan-2-yl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
160	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	(3-Methylbutanoyl)amino	H	H
161	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	Acetylamino	H	H
162	CH	4-Fluorophenyl	H	Butan-2-yl	(Methoxyacetyl)amino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/401}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
163	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methoxyethyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
164	CH	4-Fluorophenyl	H	Butan-2-yl	Propanoylamino	H	H
165	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
166	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
167	CH	4-Fluorophenyl	H	Butan-2-yl	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
168	CH	4-Fluorophenyl	H	Cyclohexyl	H	H	H
169	CH	4-Fluorophenyl	H	2,2-Difluoroethyl	H	H	H
170	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Ethoxy-2-oxoethyl	H	H	H
171	CH	4-Fluorophenyl	CH ₃	Prop-2-in-1-yl	H	H	H
172	N	4-Fluorophenyl	H	H	Propan-2-ylamino	H	H
173	N	4-Fluorophenyl	H	H	Prop-2-in-1-ylamino	H	H
174	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Propan-2-ylamino	H	H
175	CH	4-Fluorophenyl	Cyan	H	H	H	H
176	CH	4-Fluorophenyl	H	1-(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)ethyl	H	H	H
177	CH	4-Fluorophenyl	H	1,3-Difluoropropan-2-yl	H	H	H
178	CH	4-Fluorophenyl	H	3-Methyl-2-oxobutyl	H	H	H
179	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Ethoxyethyl	H	H	H
180	CH	4-Fluorophenyl	H	Cyanmethyl	H	H	H
181	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	[(Propan-2-yloxy)carbonyl]amino	H	H
182	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Benzylamino	H	H
183	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Prop-2-in-1-ylamino	H	H
184	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Amino	H	H
185	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(2-Methylpropanoyl)(propan-2-yl)amino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/401}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
186	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Propan-2-yl(2,2,4-trimethyl-3-oxopentanoyl)amino	H	H
187	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	2-Oxopyrrolidin-1-yl	H	H
188	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Bis(2-methylpropanoyl)amino	H	H
189	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
190	CH	4-Fluorophenyl	H	Ethyl	(Phenylacetyl)amino	H	H
191	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(Phenylacetyl)amino	H	H
192	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	[(2S)-2-Hydroxypropanoyl]amino	H	H
193	CH	4-Fluorophenyl	H	1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl	Propanoylamino	H	H
194	CH	4-Cyan-2,5-difluorophenyl	Difluoromethoxy	CH ₃	Propanoylamino	H	H
195	CH	4-Chlor-2-fluorophenyl	Methylsulfanyl	CH ₃	Propanoylamino	H	H
196	CH	4-Fluor-2-hydroxyphenyl	Difluoromethoxy	CH ₃	Propanoylamino	H	H
197	CH	4-Chlor-2-fluorophenyl	CF ₃	CH ₃	Propanoylamino	H	H
198	CH	4-Fluorophenyl	H	Ethyl	Propanoylamino	H	H
199	CH	4-Cyan-2,5-difluorophenyl	Difluoromethoxy	CH ₃	(Methoxyacetyl)amino	H	H
200	CH	4-Chlor-2-fluorophenyl	Methylsulfanyl	CH ₃	(Methoxyacetyl)amino	H	H
201	CH	4-Fluor-2-hydroxyphenyl	Difluoromethoxy	CH ₃	(Methoxyacetyl)amino	H	H
202	CH	4-Chlor-2-fluorophenyl	CF ₃	CH ₃	(Methoxyacetyl)amino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
203	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	(Methoxyacetyl)amin o	H	H
204	CH	4-Fluorphenyl	H	1-(tert- Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl	(Methoxyacetyl)amin o	H	H
205	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	Benzoylamino	H	H
206	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	(Thiophen-2- ylcarbonyl)amino	H	H
207	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	(Thiophen-3- ylcarbonyl)amino	H	H
208	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	[(2- Methoxyethoxy)acety l]amino	H	H
209	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	(2-Hydroxy-2- methylpropanoyl)ami no	H	H
210	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	(2,3- Dihydroxypropanoyl) amino	H	H
211	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	(Ethylcarbamoyl)ami no	H	H
212	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Methoxyethyl	(Phenylacetyl)amino	H	H
213	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Fluorbenzyl	Propanoylamino	H	H
214	CH	4-Fluorphenyl	H	Cyclopropylmethyl	Propanoylamino	H	H
215	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	Propanoylamino	H	H
216	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(Methoxyacetyl)amin o	H	H
217	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(Cyclopropylcarbonyl amino	H	H
218	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(2- Methylpropanoyl)ami no	H	H
219	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Chlorethyl	Propanoylamino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/401}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
220	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Chlorethyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
221	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Chlorethyl	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
222	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Chlorethyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
223	CH	4-Fluorophenyl	H	Cyclopropylmethyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
224	CH	4-Fluorophenyl	H	Cyclopropylmethyl	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
225	CH	4-Fluorophenyl	H	Cyclopropylmethyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
226	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yloxy	Propanoylamino	H	H
227	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yloxy	H	H	H
228	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	H	H	4-Fluorophenyl
229	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	H	H	3-Fluorophenyl
230	CH	3-Cyan-4-fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Propanoylamino	H	H
231	CH	4-Fluorophenyl	H	2,2-Difluoroethyl	(Ethylcarbonyl)amino	H	H
232	CH	4-Fluorophenyl	H	1-(2-Fluorophenyl)ethyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
233	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	(Dimethylcarbonyl)amino	H	H
234	CH	4-Fluorophenyl	H	2,2-Difluoroethyl	(Propan-2-ylsulfonyl)amino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
235	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(Thiophen-3-ylcarbonyl)amino	H	H
236	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(Thiophen-2-ylcarbonyl)amino	H	H
237	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(Phenylcarbonyl)amino	H	H
238	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(3-Methylbutanoyl)amino	H	H
239	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(2-Methylbutanoyl)amino	H	H
240	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(Cyclobutylcarbonyl)amino	H	H
241	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(Ethoxycarbonyl)amino	H	H
242	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	Acetylamino	H	H
243	CH	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	(2-Hydroxy-2-methylpropanoyl)amino	H	H
244	CH	4-Fluorphenyl	H	1-(2-Fluorphenyl)ethyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
245	CH	4-Fluorphenyl	H	(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
246	CH	3-Cyan-4-fluorphenyl	H	2-Methylpropyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
247	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Fluorbenzyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
248	CH	4-Fluorphenyl	H	1-(2-Fluorphenyl)ethyl	Propanoylamino	H	H
249	CH	4-Fluorphenyl	H	(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl	Propanoylamino	H	H
250	CH	4-Fluorphenyl	H	1-(2-Fluorphenyl)ethyl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
251	CH	4-Fluorophenyl	H	(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
252	CH	3-Cyan-4-fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
253	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Fluorbenzyl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
254	CH	4-Fluorophenyl	H	(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
255	CH	3-Cyan-4-fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
256	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Fluorbenzyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
257	CH	4-Fluor-2-hydroxyphenyl	Difluoromethoxy	CH ₃	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
258	CH	4-Fluor-2-hydroxyphenyl	Difluoromethoxy	CH ₃	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
259	CH	4-Fluorophenyl	H	1-(2-Fluorophenyl)ethyl	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
260	CH	4-Fluorophenyl	H	(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
261	CH	3-Cyan-4-fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
262	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Fluorbenzyl	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
263	CH	4-Fluorophenyl	H	1-(2-Fluorophenyl)ethyl	(Ethoxycarbonyl)amino	H	H
264	CH	4-Fluorophenyl	H	(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl	(Ethoxycarbonyl)amino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/401}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
265	CH	3-Cyan-4-fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(Ethoxycarbonyl)amino	H	H
266	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Fluorobenzyl	(Ethoxycarbonyl)amino	H	H
267	CH	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(Ethoxycarbonyl)amino	H	H
268	CH	4-Fluorophenyl	H	Butan-2-yl	(Ethoxycarbonyl)amino	H	H
269	CH	4-Fluorophenyl	H	Cyclopentyl	(Cyclopropyl)carbonyl	H	H
270	CH	4-Fluorophenyl	H	Cyclopentyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
271	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	(Cyclopropyl)carbonyl	H	H
272	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
273	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	(Cyclopropyl)carbonyl	H	H
274	CH	4-Fluorophenyl	H	1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl	Propanoylamino	H	H
275	CH	4-Fluorophenyl	H	1,3-Dioxolan-2-yl	H	H	H
276	CH	4-Fluorophenyl	H	1,3-Dioxolan-2-yl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
277	CH	4-Fluorophenyl	H	1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
278	CH	4-Fluorophenyl	H	1,3-Dioxolan-2-yl	Propanoylamino	H	H
279	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Oxetan-3-yl	H	H
280	CH	4-Fluorophenyl	H	Propan-2-yl	H	-NHCH=N-	
281	N	4-Fluorophenyl	H	2-Methylpropyl	Cyclopropyl	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
282	N	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	H	-NHCH=N-	
283	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	4-Methyl-1H-imidazol-1-yl	H	H
284	N	4-Fluorphenyl	H	2-Methylpropyl	tert-Butylamino	H	H
285	N	4-Fluorphenyl	H	2-Methylpropyl	(1-Methoxypropan-2-yl)amino	H	H
286	N	4-Fluorphenyl	H	2-Methylpropyl	Butan-2-ylamino	H	H
287	N	4-Fluorphenyl	H	2-Methylpropyl	Methylsulfonyl	H	H
288	N	4-Fluorphenyl	H	2-Methylpropyl	H	-C(CH ₃)=CHS-	
289	N	4-Fluorphenyl	H	Cyclopropylmethyl	H	-C(CH ₃)=CHS-	
290	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
291	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
292	CH	4-Fluorphenyl	H	Propyl	Propanoylamino	H	H
293	CH	4-Fluorphenyl	H	Propyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
294	CH	4-Fluorphenyl	H	Propyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
295	CH	4-Fluorphenyl	H	Propyl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
296	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	Propanoylamino	H	H
297	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	(Methoxyacetyl)amino	H	H
298	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
299	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
300	CH	4-Fluorphenyl	H	2-(Methylsulfonyl)ethyl	Propanoylamino	H	H
301	CH	4-Fluorphenyl	H	1-Cyclopropylethyl	Propanoylamino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
302	CH	4-Fluorphenyl	H	3-Cyanbenzyl	Propanoylamino	H	H
303	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Cyanethyl	Propanoylamino	H	H
304	CH	4-Fluorphenyl	CF ₃	Propan-2-yl	Propanoylamino	H	H
305	CH	4-Fluorphenyl	H	1-Cyclopropylethyl	H	H	H
306	CH	4-Fluorphenyl	H	2-(Methylsulfanyl)ethyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
307	CH	4-Fluorphenyl	H	1-Cyclopropylethyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
308	CH	4-Fluorphenyl	H	3-Cyanbenzyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
309	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Cyanethyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
310	N	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	H	-NHCH=CH-	
311	N	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	H	-NHCH ₂ CH ₂ CH ₂ -	
312	CH	4-Fluorphenyl	H	1-Cyanpropan-2-yl	Propanoylamino	H	H
313	CH	4-Fluorphenyl	H	1-Cyanpropan-2-yl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
314	CH	4-Fluorphenyl	H	1-Cyanpropan-2-yl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
315	CH	4-Fluorphenyl	H	1-Cyanpropan-2-yl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
316	CH	4-Fluorphenyl	Diffuormethoxy	CH ₃	Propanoylamino	H	H
317	CH	4-Fluorphenyl	H	Cyclopropylmethyl	(1,1,1-Trifluoropropan-2-yl)amino	H	H
318	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	(1,1,1-Trifluoropropan-2-yl)amino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
319	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	(1,1,1-Trifluoropropan-2-yl)amino	H	H
320	CH	4-Fluorphenyl	H	Cyclopropyl	Propanoylamino	H	H
321	CH	4-Fluorphenyl	H	Cyclopropyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
322	CH	4-Fluorphenyl	H	Cyclopropyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
323	CH	4-Fluorphenyl	H	Cyclopropyl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
324	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	[2,2,2-Trifluor-1-(4-fluorophenyl)ethyl]amino	H	H
325	CH	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	(2,2,2-Trifluor-1-phenylethyl)amino	H	H
326	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Ethoxyethyl	Propanoylamino	H	H
327	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Ethoxyethyl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
328	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Ethoxyethyl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
329	CH	4-Fluorphenyl	H	2-Ethoxyethyl	(Cyclopropylacetyl)amino	H	H
330	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	(6-Methoxy-6-oxohexanoyl)amino	H	H
331	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	(5-Methoxy-5-oxopentanoyl)amino	H	H
332	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	(5-Ethoxy-3-ethyl-5-oxopentanoyl)amino	H	H
333	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	{[3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]carbonyl}amino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
334	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	{[2-(Difluormethyl)thiophen-3-yl]carbonyl}amino	H	H
335	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	[(4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)carbonyl]amino	H	H
336	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	[3-(4-Chlorophenyl)propanoyl]amino	H	H
337	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	{[(1R,2R)-2-Phenylcyclopropyl]carbonyl}amino	H	H
338	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	(Cyclopentylacetyl)amino	H	H
339	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	(3-Methylbutanoyl)amino	H	H
340	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	(2-Methylbutanoyl)amino	H	H
341	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	[(2-Methylcyclopropyl)carbonyl]amino	H	H
342	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	Acetylamino	H	H
343	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	(3-Phenylpropanoyl)amino	H	H
344	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	(4-Fluorbenzoyl)amino	H	H
345	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	[(2-Methoxyethoxy)acetyl]amino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
346	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	(Phenylcarbonyl)amino	H	H
347	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	(3-Methylbutanoyl)amino	H	H
348	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	(2-Methylbutanoyl)amino	H	H
349	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	(Cyclobutylcarbonyl)amino	H	H
350	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	Acetylamino	H	H
351	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	[Amino(oxo)acetyl]amino	H	H
352	CH	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	[(2S)-2-Hydroxypropanoyl]amino	H	H
353	CH	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	[(2S)-2-Hydroxypropanoyl]amino	H	H
354	N	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	(Methoxyacetyl)amino	H	H
355	N	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	(2-Methylpropanoyl)amino	H	H
356	N	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	(Cyclopropylcarbonyl)amino	H	H
357	N	4-Fluorphenyl	H	2-Methylpropyl	Acetylamino	H	H
358	N	4-Fluorphenyl	H	2-Methoxyethyl	Propan-2-ylamino	H	H
359	N	4-Fluorphenyl	H	2-Chlorethyl	Propan-2-ylamino	H	H
360	N	4-Fluorphenyl	H	Butan-2-yl	Propan-2-ylamino	H	H
361	N	4-Fluorphenyl	H	CH ₃	Propan-2-ylamino	H	H
362	N	4-Fluorphenyl	H	2-Cyanethyl	Propan-2-ylamino	H	H
363	N	4-Fluorphenyl	H	Prop-2-in-1-yl	Propan-2-ylamino	H	H

Bsp	X ¹	R ¹	R ²	R ^{3/301}	R ^{4/401}	R ⁵	R ⁶
364	N	4-Fluorphenyl	H	2,2-Difluorethyl	Propan-2-ylamino	H	H
365	N	4-Fluorphenyl	H	2-Methylpropyl	Propanoylamino	H	H
366	N	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	Amino	H	H
367	CH	4-Fluorphenyl	CH ₃	2,2-Difluorethyl	H	H	H
368	CH	4-Fluorphenyl	CH ₃	2-Methylpropyl	H	H	H
369	N	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	Benzylamino	H	H
370	N	4-Fluorphenyl	H	Ethyl	Propan-2-ylamino	H	H
371	N	4-Fluorphenyl	H	Propan-2-yl	Propan-2-ylamino	H	H
372	N	4-Fluorphenyl	H	2-Methylpropyl	(1-Cyclopropylethyl)amino	H	H

[s] Folgende Beispiele liegen in Form von folgenden Salzen vor: Beispiel 4: Hydrochlorid; Beispiel 18: Trihydrochlorid; Beispiel 151: Hydrochlorid; Beispiel 152: Hydrochlorid.

Tabelle 2 NMR-Daten von Verbindungen des Typs [I-a] und [I-b]

Nr.	Name	NMR	Isomeren-verhältnis ^[1]
1	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.47 (d, 2H), 8.22 (s, 1H), 7.43 (m, 2H), 7.22 (m, 4H), 3.99 (d, 2H), 2.20 (m, 1H), 0.92 (d, 6H) ppm	-
2	4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.47 (s, 1H), 8.42 (d, 2H), 7.59 (m, 1H), 7.24 (m, 2H), 7.13 (m, 2H), 4.03 (d, 2H), 2.19 (m, 1H), 0.91 (d, 6H) ppm	-
3	4-[1-(Butan-2-yl)-3-(2,6-difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.53 (s, 1H), 8.42 (d, 2H), 7.59 (m, 1H), 7.25 (m, 2H), 7.14 (d, 2H), 4.36 (m, 1H), 1.84 (m, 2H), 1.50 (d, 3H), 0.79 (d, 3H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
5	4-[3-(3-Chlorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 9.12 (s, 1H), 8.48 (s, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.58 (s, 1H), 7.36 (m, 3H), 7.10 (d, 1H), 3.99 (d, 2H), 2.32 (m, 1H), 0.99 (d, 6H) ppm	-
6	4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-(2,2-dimethylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.43 (s, 1H), 8.42 (d, 2H), 7.58 (m, 1H), 7.23 (m, 2H), 7.13 (d, 2H), 4.02 (s, 2H), 0.96 (s, 9H) ppm	-
7	4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.42 (d, 2H), 8.17 (s, 1H), 7.75 (m, 1H), 7.38 (m, 2H), 7.13 (m, 2H), 5.14 (m, 1H), 4.59 (d, 2H), 1.59 (s, 3H), 1.36 (s, 3H) ppm	-
8	4-[1-Cyclobutyl-3-(2,6-difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.42 (d, 2H), 8.24 (s, 1H), 7.76 (m, 1H), 7.38 (m, 2H), 7.13 (d, 2H), 4.50 (m, 1H), 2.58 (m, 2H), 2.23 (m, 2H), 1.75 (m, 2H) ppm	-
9	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.45 (dd, 2H), 8.02 (s, 1H), 7.44 (dd, 2H), 7.20 (dd, 2H), 7.10 (t, 2H), 5.44 (dd, 1H), 4.05-4.00 (m, 1H), 3.75-3.70 (m, 1H), 2.20-2.10 (m, 1H), 2.05-1.95 (m, 2H), 1.70-1.50 (m, 3H) ppm	-
10	4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.53 (s, 1H), 8.42 (d, 2H), 7.59 (m, 1H), 7.24 (m, 2H), 7.15 (m, 2H), 4.60 (m, 1H), 1.51 (d, 6H) ppm	-
11	4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-(2,2-dimethylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.42 (d, 2H), 8.20 (s, 1H), 7.74 (m, 1H), 7.38 (m, 2H), 7.12 (d, 2H), 3.33 (s, 2H), 0.79 (s, 9H) ppm	-
13	4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.42 (d, 2H), 8.21 (s, 1H), 7.77 (m, 1H), 7.39 (m, 2H), 7.13 (d, 2H), 3.75 (d, 2H), 2.05 (m, 1H), 0.73 (d, 6H) ppm	-
15	4-[1-Cyclobutyl-5-(2,6-difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.59 (s, 1H), 8.42 (d, 2H), 7.60 (m, 1H), 7.24 (m, 2H), 7.14 (d, 2H), 4.94 (m, 1H), 2.60-2.45 (m, 4H), 1.83 (m, 2H) ppm	-
16	4-[1-Cyclopentyl-3-(2,6-difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.42 (d, 2H), 8.20 (s, 1H), 7.76 (m, 1H), 7.39 (m, 2H), 7.11 (d, 2H), 4.37 (m, 1H), 1.95 (m, 4H), 1.84 (m, 2H), 1.58 (m, 2H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
19	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.38 (s, 1H), 8.29 (s, 1H), 8.18 (d, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.44 (dd, 2H), 7.20 (t, 2H), 6.85 (dd, 1H), 5.49 (dd, 1H), 3.96 (m, 1H), 3.68 (m, 1H), 2.35 (q, 2H), 2.18 (m, 2H), 2.00-1.90 (m, 2H), 1.70 (m, 1H), 1.58 (m, 1H), 1.03 (t, 3H) ppm	-
20	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.70 (s, 1H, br), 8.16 (d, 1H), 8.02 (s, 1H), 7.42 (dd, 2H), 7.25 (m, 1H), 6.99 (t, 2H), 6.89 (d, 1H), 6.15 (d, 1H), 5.46 (dd, 1H), 4.04 (m, 1H), 3.76 (m, 1H), 2.25-2.15 (m, 1H), 2.10-2.00 (m, 2H), 1.80-1.60 (m, 3H) ppm	-
33	4-[5-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.39 (m, 2H), 7.97 (s, 1H), 7.70-7.60 (m, 1H), 7.53-7.50 (m, 1H), 7.35-7.30 (m, 2H), 7.12 (m, 2H), 5.10 (m, 1H), 3.90 (m, 1H), 3.40 (m, 1H), 2.50-2.40 (m, 1H), 2.00 (m, 1H), 1.90 (m, 1H), 1.60-1.40 (m, 3H) ppm	-
38	4-[1-(Butan-2-yl)-5-(2,6-difluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.42 (d, 2H), 8.23 (s, 1H), 7.77 (m, 1H), 7.41 (t, 2H), 7.13 (d, 2H), 3.85 (m, 1H), 1.89 (m, 1H), 1.68 (m, 1H), 1.38 (d, 3H), 0.59 (t, 3H) ppm	-
39	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 7.91 (s, 1H), 7.87 (d, 1H), 7.47 (dd, 2H), 7.10 (t, 2H), 6.45 (dd, 1H), 6.37 (s, 1H), 5.42 (dd, 1H), 4.79 (s, 2H, br), 4.05-4.00 (m, 1H), 3.75-3.65 (m, 1H), 2.20-2.10 (m, 1H), 2.05-1.95 (m, 2H), 1.70-1.50 (m, 3H) ppm	-
40	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 9.90 (s, 1H), 8.22 (s, 1H), 8.19 (d, 1H), 8.02 (s, 1H), 7.44 (dd, 2H), 7.20 (t, 2H), 6.93 (d, 1H), 4.58 (m, 1H), 4.02 (s, 3H), 3.30 (m, 2H), 1.50 (d, 6H) ppm	-
43	4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.44 (dd, 2H), 8.00 (s, 1H), 7.34 (d, 2H), 7.20 (dd, 2H), 6.92 (d, 2H), 5.43 (dd, 1H), 4.04 (m, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.60 (m, 1H), 2.15 (m, 1H), 2.05-2.00 (m, 2H), 1.70-1.50 (m, 3H) ppm	-
44	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]chinolin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.86 (d, 1H), 8.15 (s, 1H), 8.05 (d, 1H), 7.75-7.70 (m, 2H), 7.48 (m, 1H), 7.35 (d, 1H), 7.28 (dd, 2H), 7.03 (t, 2H), 4.65 (m, 1H), 1.56 (d, 6H) ppm	-
46	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 7.80 (m, 2H), 7.50 (dd, 2H), 7.10 (dd, 1H), 6.47 (d, 1H), 6.39 (s, 1H), 5.10 (s, 2H, br), 4.53 (m, 1H), 1.20 (d, 6H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
47	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-(prop-2-in-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin	1H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.18 (d, 1H), 8.05 (d, 1H, Isomer), 7.96 (s, 1H, Isomer), 7.93 (s, 1H), 7.43 (m, 3H), 7.38 (dd, 2H, Isomer), 7.19 (t, 2H, Isomer), 7.01 (t, 2H), 6.89 (d, 1H), 6.64 (d, 1H, Isomer), 6.48 (d, 1H, Isomer), 6.29 (d, 1H), 5.08 (d, 1H), 5.04 (d, 1H, Isomer), 4.60 (m, 1H), 4.48 (m, 1H, Isomer), 2.63 (t, 1H), 2.60 (t, 1H, Isomer), 1.56 (d, 6H), 1.42 (d, 6H, Isomer) ppm	80:20
53	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-methylpyridin-2-carboxamid	1H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.74 (d, 1H), 8.50 (d, 1H), 8.41 (s, 1H), 7.90 (s, 1H), 7.45-7.40 (dd, 2H), 7.37 (d, 1H), 7.25-7.20 (t, 2H), 4.57 (m, 1H), 2.79 (d, 3H), 1.51 (d, 6H) ppm	-
70	4-[5-(4-Chlorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.37 (m, 2H), 7.90 (s, 1H), 7.53 (d, 2H), 7.37 (d, 2H), 7.09 (m, 2H), 5.02 (dd, 1H), 3.96 (m, 1H), 3.46 (m, 1H), 2.50-2.35 (m, 1H), 2.00 (m, 1H), 1.80 (m, 1H), 1.60-1.40 (m, 3H) ppm	-
76	4-[5-(2,3-Dichlorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.37 (m, 2H), 8.01 (s, 1H), 7.75 (m, 1H), 7.50-7.45 (m, 1H), 7.43-7.38 (m, 1H), 7.05 (m, 2H), 5.08 (dd, 1H), 4.90 (dd, 1H, Isomer), 3.90-3.80 (m, 1H), 3.40-3.30 (m, 1H), 2.50-2.40 (m, 1H), 2.00 (m, 1H), 1.80 (m, 1H), 1.60-1.40 (m, 3H) ppm	40:60
81	1-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl}ethanon	1H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.29 (d, 1H), 8.03 (s, 1H), 7.85 (d, 1H), 7.40-7.35 (dd, 2H), 7.09 (d, 1H), 7.02 (t, 2H), 6.34 (d, 1H), 5.49 (dd, 1H), 4.05-4.00 (m, 1H), 3.75-3.70 (m, 1H), 3.00 (s, 3H), 2.30-2.00 (m, 3H), 1.80-1.60 (m, 3H) ppm	-
84	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	1H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.36 (s, 1H), 8.18 (s, 1H), 8.16 (d, 1H), 8.10 (s, 1H), 7.44 (dd, 2H), 7.19 (t, 2H), 6.80 (dd, 1H), 4.57 (m, 1H), 2.73 (m, 1H), 1.50 (d, 6H), 1.06 (d, 6H) ppm	-
85	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	1H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.55 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.88 (s, 1H), 7.46 (dd, 2H), 7.09 (t, 2H), 6.87 (dd, 1H), 4.55 (m, 1H), 2.38 (q, 2H), 1.51 (d, 6H), 1.10 (t, 2H) ppm	-
86	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropanecarboxamid	1H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.82 (s, 1H, br), 8.11 (d, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.44 (dd, 2H), 7.06 (t, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.54 (m, 1H), 1.78 (m, 1H), 1.51 (d, 6H), 0.90-0.80 (m, 4H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
87	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.59 (s, 1H, br), 8.12 (m, 2H), 7.83 (s, 1H), 7.45 (dd, 2H), 7.09 (t, 2H), 6.86 (dd, 1H), 3.96 (d, 2H), 2.62 (m, 1H), 2.21 (m, 1H), 1.14 (d, 6H), 0.93 (d, 6H) ppm	-
88	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.45 (d, 2H), 8.37 (d, 2H, Isomer), 8.20 (s, 1H), 8.08 (s, 1H, Isomer), 7.48-7.38 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.08 (d, 2H, Isomer), 4.33 (t, 2H), 4.06 (t, 2H, Isomer), 3.77 (t, 2H), 3.65 (t, 2H, Isomer), 3.27 (s, 3H), 3.11 (s, 3H, Isomer) ppm	70:30
92	4-[1-Cyclopentyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.45 (d, 2H), 8.36 (d, 2H, Isomer), 8.28 (s, 1H), 8.07 (s, 1H, Isomer), 7.48-7.38 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.07 (d, 2H, Isomer), 4.75 (m, 1H), 4.38 (m, 1H, Isomer), 2.15-2.10 (m, 2H), 2.05-2.00 (m, 2H), 2.00-1.90 (m, 2H, Isomer), 1.80 (m, 2H), 1.70-1.65 (m, 2H), 1.55 (m, 2H, Isomer) ppm	85:15
92	4-[1-Cyclopentyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.45 (d, 2H), 8.36 (d, 2H, Isomer), 8.28 (s, 1H), 8.07 (s, 1H, Isomer), 7.48-7.38 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.07 (d, 2H, Isomer), 4.75 (m, 1H), 4.38 (m, 1H, Isomer), 2.15-2.10 (m, 2H), 2.05-2.00 (m, 2H), 2.00-1.90 (m, 2H, Isomer), 1.80 (m, 2H), 1.70-1.65 (m, 2H), 1.55 (m, 2H, Isomer) ppm	80:20
100	3-{[3-(4-Fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.63 (s, 1H), 8.54 (d, 1H), 8.47 (d, 2H), 8.38 (s, 1H), 7.78 (d, 1H), 7.40 (m, 3H), 7.25-7.20 (m, 4H), 5.46 (s, 2H) ppm	-
101	4-{1-[1-(3-Chlorophenyl)ethyl]-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.47 (d, 2H), 8.38 (d, 2H, Isomer), 7.50-7.10 (m, 11H), 7.11 (m, 2H, Isomer), 5.72 (m, 1H), 5.30 (m, 1H, Isomer), 1.88 (d, 3H), 1.79 (d, 3H, Isomer) ppm	80:20
102	4-{1-[1-(2-Chlorophenyl)ethyl]-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.46 (m, 3H), 8.37 (d, 2H, Isomer), 7.50 (d, 1H), 7.40-7.20 (m, 10H), 7.11 (d, 2H, Isomer), 6.03 (q, 2H), 5.65 (q, 2H, Isomer), 1.88 (d, 3H), 1.79 (d, 3H, Isomer) ppm	91:9
103	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.50 (d, 2H), 8.40 (d, 2H, Isomer), 8.33 (s, 1H), 8.23 (s, 1H, Isomer), 7.48-7.38 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.11 (d, 2H, Isomer), 5.25 (q, 2H), 4.89 (q, 2H, Isomer) ppm	91:9
104	4-[1-(2,3-Difluorbenzyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.47 (d, 2H), 8.38 (d, 2H, Isomer), 8.35 (s, 1H), 8.14 (s, 1H, Isomer), 7.45-7.30 (m, 4H), 7.25-7.20 (m, 5H), 7.11 (d, 2H, Isomer), 5.52 (s, 2H), 5.29 (s, 1H, Isomer) ppm	75:25

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
105	tert-Butyl-[3-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.48 (d, 2H), 8.39 (d, 2H, Isomer), 8.21 (s, 1H), 8.10 (s, 1H, Isomer), 7.40 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.12 (d, 2H, Isomer), 5.04 (s, 2H), 4.79 (s, 2H, Isomer), 1.45 (s, 9H), 1.30 (s, 9H, Isomer) ppm	78:22
106	Methyl-2-[3-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-methylbutanoat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.48 (d, 2H), 8.37 (d, 2H, Isomer), 8.36 (s, 1H), 8.17 (s, 1H, Isomer), 7.43 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.09 (d, 2H, Isomer), 4.89 (d, 1H), 4.30 (d, 1H, Isomer), 3.72 (s, 3H), 3.64 (s, 3H, Isomer), 1.00 (d, 3H), 0.87 (d, 3H), 0.71 (d, 3H, Isomer) ppm	93:7
107	Methyl-2-[3-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.48 (d, 2H), 8.36 (s, 1H), 7.43 (dd, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 5.36 (q, 1H), 3.70 (s, 3H), 1.75 (d, 3H) ppm	-
108	4-[1-(2-Chlor-6-fluorbenzyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.46 (d, 2H), 8.37 (d, 2H, Isomer), 8.29 (s, 1H), 8.00 (s, 1H, Isomer), 7.55-7.45 (m, 1H), 7.40-7.30 (m, 3H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.09 (d, 2H, Isomer), 5.53 (s, 2H), 5.26 (s, 1H, Isomer) ppm	87:13
109	4-{1-[4-(Difluormethoxy)benzyl]-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.46 (d, 2H), 8.38 (d, 2H, Isomer), 8.35 (s, 1H), 8.14 (s, 1H, Isomer), 7.45-7.35 (m, 4H), 7.25-7.20 (m, 6H), 7.15 (m, 1H), 7.05 (d, 2H, Isomer), 5.39 (s, 2H), 5.18 (s, 1H, Isomer) ppm	74:26
110	4-{1-[(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.47 (d, 2H), 8.32 (s, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.45-7.40 (dd, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 5.66 (s, 2H) ppm	-
111	4-{3-(4-Fluorophenyl)-1-[5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 9.32 (s, 1H), 8.58 (d, 2H), 7.53 (dd, 2H), 7.37 (d, 2H), 7.34 (t, 2H) ppm	-
112	4-[3-(4-Fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-6-(trifluormethyl)pyrimidin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 9.39 (s, 1H), 9.26 (s, 1H), 8.57 (d, 2H), 8.35 (s, 1H), 7.59 (dd, 2H), 7.38 (d, 2H), 7.33 (t, 2H) ppm	-
113	1-Cyclohexyl-2-[3-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.47 (d, 2H), 8.38 (d, 2H, Isomer), 8.12 (s, 1H), 8.09 (s, 1H, Isomer), 7.43-7.35 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.11 (d, 2H, Isomer), 5.32 (s, 2H), 5.09 (s, 1H, Isomer), 2.60 (m, 1H), 1.90 (m, 2H), 1.70 (m, 2H), 1.65-1.60 (m, 2H), 1.30-1.10 (m, 4H) ppm	80:20

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
114	1-Cyclopentyl-2-[3-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.47 (d, 2H), 8.38 (d, 2H, Isomer), 8.15 (s, 1H), 8.10 (s, 1H, Isomer), 7.43-7.35 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.11 (d, 2H, Isomer), 5.30 (s, 2H), 5.08 (s, 1H, Isomer), 3.05 (m, 1H), 2.90 (m, 1H, Isomer), 1.90-1.20 (m, 8H) ppm	75:25
115	2-{[3-(4-Fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.56 (d, 1H), 8.47 (d, 2H), 8.22 (s, 1H), 7.88 (t, 1H), 7.58 (d, 2H), 7.52 (d, 1H), 7.46 (dd, 2H), 7.38 (m, 1H), 7.25-7.20 (m, 2H), 5.63 (s, 2H) ppm	-
115	2-{[3-(4-Fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.57 (d, 1H), 8.47 (d, 2H), 8.38 (m, 1H), 7.88 (m, 1H), 7.72 (m, 1H, Isomer), 7.45-7.40 (m, 3H), 7.30 (m, 1H), 7.25 (m, 1H), 7.20 (m, 2H), 7.11 (d, 2H, Isomer), 5.51 (s, 2H), 5.27 (s, 1H, Isomer) ppm	75:25
116	4-{1-[(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.48 (d, 2H), 8.39 (d, 2H, Isomer), 8.30 (s, 1H), 8.15 (s, 1H, Isomer), 7.50 (m, 2H, Isomer), 7.48-7.40 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.11 (d, 2H, Isomer), 4.44 (dd, 1H), 4.34 (dd, 1H), 4.13 (m, 2H, Isomer), 2.38 (m, 1H), 2.21 (m, 1H, Isomer), 1.89 (dd, 1H), 1.77 (dd, 1H, Isomer), 1.70 (dd, 1H), 1.37 (dd, 1H, Isomer) ppm	75:25
117	4-{3-(4-Fluorophenyl)-1-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.46 (d, 2H), 8.38 (d, 2H, Isomer), 8.28 (s, 1H), 8.10 (s, 1H, Isomer), 7.48-7.38 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.08 (d, 2H, Isomer), 4.37 (t, 2H), 4.10 (t, 2H, Isomer), 2.98 (t, 2H), 2.82 (t, 2H, Isomer), 2.07 (s, 3H), 1.81 (s, 3H, Isomer) ppm	80:20
120	4-{1-[1-(4-Chlorophenyl)ethyl]-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.46 (d, 2H), 8.42 (s, 1H), 8.37 (d, 2H, Isomer), 8.17 (s, 1H, Isomer), 7.45-7.35 (m, 6H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.08 (m, 2H, Isomer), 5.70 (q, 1H), 5.30 (q, 1H, Isomer), 1.86 (d, 3H), 1.78 (d, 3H, Isomer) ppm	80:20
121	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(pyridin-4-ylmethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.62 (d, 2H), 8.59 (d, 2H), 8.32 (s, 1H), 7.67 (d, 2H), 7.50 (m, 2H), 7.30 (d, 2H), 7.27 (t, 2H), 5.59 (s, 2H) ppm	-
122	4-{3-(4-Fluorophenyl)-1-[2-(trifluormethoxy)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.48 (d, 2H), 8.38 (d, 2H, Isomer), 8.29 (s, 1H), 8.16 (s, 1H, Isomer), 7.43 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.10 (d, 2H, Isomer), 4.51 (m, 4H), 4.40 (t, 2H, Isomer), 4.24 (t, 2H, Isomer) ppm	88:12

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
122	4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[2-(trifluormethoxy)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.48 (d, 2H), 8.38 (d, 2H, Isomer), 8.29 (s, 1H), 8.16 (s, 1H, Isomer), 7.43 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.10 (d, 2H, Isomer), 4.51 (m, 4H), 4.40 (t, 2H, Isomer), 4.24 (t, 2H, Isomer) ppm	66:33
123	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.45 (d, 2H), 8.37 (d, 2H, Isomer), 8.18 (s, 1H), 8.07 (s, 1H, Isomer), 7.40 (m, 2H), 7.25-7.20 (m, 4H), 7.08 (d, 2H, Isomer), 4.25 (m, 2H), 4.20 (m, 1H), 3.99 (dd, 1H, Isomer), 3.89 (dd, 1H, Isomer), 3.79 (m, 1H), 3.66 (m, 1H), 3.55 (m, 1H, Isomer), 2.00 (m, 1H), 1.83 (m, 2H), 1.56 (m, 1H) ppm	89:11
124	3-[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1,2-diol	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.65 (d, 2H), 8.51 (s, 1H), 8.47 (s, 1H), 7.78 (d, 2H), 7.53 (m, 2H), 7.30 (t, 2H), 5.70 (s, 1H, br), 5.15 (s, 1H, br), 4.57 (dd, 1H), 4.28 (dd, 1H), 3.80 (m, 1H), 3.48 (m, 2H) ppm	-
128	4-[1-(2-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.47 (d, 2H), 8.38 (d, 2H, Isomer), 8.32 (s, 1H), 8.13 (s, 1H, Isomer), 7.40-7.30 (m, 5H), 7.25-7.20 (m, 5H), 7.12 (m, 2H, Isomer), 5.47 (s, 2H), 5.24 (s, 2H, Isomer) ppm	80:20
134	4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.44 (d, 2H), 7.91 (s, 1H), 7.45 (m, 2H), 7.18 (d, 2H), 7.12 (t, 2H), 4.31 (t, 2H), 3.86 (t, 2H), 3.57 (t, 2H), 3.46 (t, 2H), 3.26 (s, 3H) ppm	-
140	3-{[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}benzonitril	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.47 (dd), 8.37 (m), 8.16 (s), 7.86 (s), 7.81 (d), 7.70 (m), 7.50 (t), 7.45-7.30 (m), 7.25-7.10 (m), 7.12 (dd), 5.47 (s, 2H), 5.27 (s, 2H, Isomer) ppm	60:40
141	4-{[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}benzonitril	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.48 (d, 2H), 8.39 (d, 2H, Isomer), 8.37 (s, 1H), 8.17 (s, 1H, Isomer), 7.84 (d, 2H), 7.74 (d, 2H, Isomer), 7.50 (d, 2H), 7.40 (m, 2H), 7.33 (m, 1H), 7.25-7.20 (m, 2H), 7.08 (m, 2H, Isomer), 5.52 (s, 2H), 5.30 (s, 2H, Isomer) ppm	70:30
142	3-[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]dihydrofuran-2(3H)-on	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.46 (m, 2H), 8.03 (s, 1H), 7.46 (dd, 2H), 7.24 (dd, 2H), 7.10 (t, 2H), 5.33 (t, 1H), 4.60 (m, 1H), 4.40 (m, 1H), 2.90-2.80 (m, 2H) ppm	-
143	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(1H-imidazol-2-ylmethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.43 (d, 2H), 7.94 (s, 1H), 7.44 (dd, 2H), 7.17 (d, 2H), 7.10 (t, 2H), 6.99 (s, 2H), 5.40 (s, 2H), 2.90 (s, 1H, br) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
144	1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-[3-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.45 (d, 2H), 8.35 (d, 2H, Isomer), 7.94 (s, 1H, Isomer), 7.91 (s, 1H), 7.44 (dd, 2H), 7.36 (dd, 2H, Isomer), 7.20 (m, 2H), 7.10 (m, 2H), 6.57 (s, 1H), 6.47 (s, 1H, Isomer), 5.62 (s, 2H), 5.40 (s, 2H, Isomer), 3.85 (s, 3H), 3.77 (s, 3H, Isomer), 2.31 (s, 3H), 2.26 (s, 3H, Isomer) ppm	62:38
144	1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-[3-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.45 (d, 2H), 7.91 (s, 1H), 7.44 (dd, 2H), 7.20 (d, 2H), 7.10 (t, 2H), 6.57 (s, 1H), 5.62 (s, 2H), 3.85 (s, 3H), 2.31 (s, 3H) ppm	-
145	2-[3-(4-Fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethylacetat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.50 (m, 2H, br), 7.89 (s, 1H), 7.45 (dd, 2H), 7.28 (m, 2H, br), 7.10 (t, 2H), 4.46 (m, 2H), 4.39 (m, 2H), 4.28 (t, 2H, Isomer), 3.90 (t, 2H), 2.00 (s, 3H), 1.90 (s, 3H, Isomer) ppm	91:9
146	3-[3-(4-Fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanonitril	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.50 (m, 2H, br), 7.94 (s, 1H), 7.46 (dd, 2H), 7.28 (m, 2H, br), 7.14 (t, 2H), 4.45 (t, 2H), 3.02 (t, 2H) ppm	-
147	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl]-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-on	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 11.02 (s, 1H), 8.21 (s, 1H), 7.91 (d, 1H), 7.42 (m, 2H), 7.21 (m, 2H), 6.60 (d, 1H), 4.00 (d, 2H), 3.42 (s, 2H), 2.20 (m, 1H), 0.92 (d, 6H) ppm	-
148	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl]-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-on	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.06 (d, 1H), 7.30 (m, 3H), 6.85 (t, 2H), 6.67 (d, 1H), 3.92 (d, 2H), 3.27 (s, 3H), 2.26 (m, 1H), 1.13 (s, 6H), 0.92(d, 6H) ppm	-
149	4-[5-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 8.11 (s, 1H), 8.03 (d, 1H), 7.32 (m, 2H), 7.19 (t, 2H), 6.18 (bs, 1H), 5.87 (m, 1H), 5.20 (d, 1H), 5.09 (d, 1H), 5.02 (m, 1H), 3.85 (bs, 2H), 3.74 (d, 2H), 2.18 (m, 1H), 0.79 (d, 6H) ppm	-
150	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 8.10 (d, 1H), 7.93 (s, 1H), 7.54 (m, 2H), 7.07 (t, 2H), 6.39 (d, 1H), 5.95 (m, 1H), 5.26 (d, 1H), 5.12 (d, 2H), 4.04 (bs 1H), 3.96 (d, 2H), 2.30 (m, 1H), 0.98 (d, 6H) ppm	-
153	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.54 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.86 (s, 1H), 7.46 (dd, 2H), 7.09 (t, 2H), 6.87 (dd, 1H), 4.31 (t, 2H), 3.78 (t, 2H), 3.32 (s, 3H), 2.38 (q, 2H), 1.11 (t, 2H) ppm	-
154	2-Fluor-5-[1-(2-methylpropyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-yl]benzonitril	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.47-8.46 (m, 2H), 7.86 (s, 1H), 7.81-7.79 (m, 1H), 7.73-7.71 (m, 1H), 7.33-7.30 (m, 1H), 7.19-7.18 (m, 2H), 3.99 (d, 2H), 2.23 (m, 1H), 0.94 (d, 6H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
155	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.40 (s, 1H), 8.16 (d, 1H), 8.14 (s, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.42-7.40 (m, 2H), 7.20-7.18 (m, 2H), 6.82 (dd, 1H), 3.98 (d, 2H), 2.38 (q, 2H), 2.20 (m, 1H), 1.05 (t, 3H), 0.92 (d, 6H) ppm	-
156	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclobutancarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.35 (s, 1H, br), 8.12 (s, 1H), 8.10 (m, 1H), 7.88 (s, 1H), 7.48-7.45 (m, 2H), 7.12-7.08 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.55 (m, 1H), 3.25 (m, 1H), 2.03-2.15 (m, 6H), 1.53 (d, 6H) ppm	-
157	N-{4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.39 (s, 1H), 8.19 (s, 1H), 8.15 (m, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.20-7.18 (m, 2H), 6.82-6.81 (dd, 1H), 4.35 (m, 1H), 2.74 (m, 1H), 1.90-1.80 (m, 1H), 1.48 (d, 2H), 1.06 (d, 6H), 0.80 (t, 3H) ppm	-
158	2-Cyclopropyl-N-{4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.32 (s, 1H), 8.16-8.14 (m, 2H), 8.09 (s, 1H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.20-7.18 (m, 2H), 6.83-6.82 (dd, 1H), 3.99 (d, 2H), 2.24 (d, 2H), 2.20 (m, 1H), 1.05 (m, 1H), 0.91 (d, 6H), 0.45 (m, 2H), 0.16 (m, 2H) ppm	-
159	N-{4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-cyclopropylacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.31 (s, 1H), 8.19 (s, 1H), 8.16 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.44-7.42 (dd, 2H), 7.20-7.18 (m, 2H), 6.84-6.83 (dd, 1H), 4.33 (m, 1H), 2.23 (d, 2H), 1.90 (m, 1H), 1.80 (m, 1H), 1.48 (d, 3H), 1.05 (m, 1H), 0.80 (t, 3H), 0.45 (m, 2H), 0.17 (m, 2H) ppm	-
160	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-methylbutanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.50 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.89 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.09-7.08 (m, 2H), 6.88 (dd, 1H), 4.55 (m, 1H), 2.21 (d, 2H), 2.10 (m, 1H), 1.53 (d, 6H), 0.95 (d, 6H) ppm	-
161	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.59 (s, 1H, br), 8.11 (m, 1H), 8.05 (s, 1H), 7.88 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.88 (dd, 1H), 4.55 (m, 1H), 2.08 (s, 3H), 1.52 (d, 6H) ppm	-
162	N-{4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 9.93 (s, 1H), 8.23 (s, 1H), 8.20 (d, 1H), 8.03 (s, 1H), 7.44-7.40 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.94 (d, 1H), 4.35 (m, 1H), 4.03 (s, 2H), 1.90 (m, 1H), 1.80 (m, 1H), 1.49 (d, 3H), 1.04 (t, 3H), 0.80 (t, 3H) ppm	-
163	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.70 (s, 1H, br), 8.15 (d, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.88 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.12-7.10 (m, 2H), 6.95 (dd, 1H), 4.32 (t, 2H), 3.96 (s, 2H), 3.78 (t, 2H), 3.45 (s, 3H), 3.32 (s, 3H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
164	N-{4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.39 (s, 1H), 8.19 (s, 1H), 8.17 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.84-6.83 (dd, 1H), 4.34 (m, 1H), 2.38 (q, 2H), 1.90 (m, 1H), 1.80 (m, 1H), 1.49 (d, 3H), 1.04 (t, 3H), 0.80 (t, 3H) ppm	-
165	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.76 (s, 1H), 8.17 (d, 1H), 8.13 (s, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.83-6.81 (dd, 1H), 3.99 (d, 2H), 2.20 (m, 1H), 1.98 (m, 1H), 0.91 (m, 6H), 0.78 (m, 4H) ppm	-
166	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 9.94 (s, 1H), 8.21-8.19 (m, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.45-7.43 (m, 2H), 7.22 (m, 2H), 6.83-6.81 (dd, 1H), 4.03 (s, 2H), 3.99 (d, 2H), 2.20 (m, 1H), 0.91 (m, 6H) ppm	-
167	N-{4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.76 (s, 1H), 8.17 (m, 2H), 8.07 (s, 1H), 7.44-7.42 (dd, 2H), 7.24-7.20 (m, 2H), 6.83-6.82 (dd, 1H), 4.35 (m, 1H), 2.00 (m, 1H), 1.90 (m, 1H), 1.80 (m, 1H), 1.40 (d, 3H), 0.80 (m, 7H) ppm	-
169	4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.46 (dd, 1H), 7.93 (s, 1H), 7.46-7.44 (m, 2H), 7.19 (m, 1H), 7.14-7.10 (m, 2H), 6.27 (tt, 2J(H,F)= 55Hz, 1H), 4.59 (dt, 3J(H,F)= 15Hz, 2H) ppm	-
170	Ethyl-[3-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.45 (d, 2H), 7.91 (s, 1H), 7.45 (m, 2H), 7.21 (d, 2H), 7.14-7.08 (m, 2H), 4.99 (s, 2H), 4.21 (q, 2H), 1.28 (t, 3H) ppm	-
171	4-[3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1-(prop-2-in-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.56 (d, 2H), 8.46 (d, 2H, isomer), 7.58 (t, 2H), 7.32 (m, 2H), 7.17 (m, 2H), 5.77 (d, 2H), 5.50 (d, 2H, isomer), 2.34 (s, 3H), 2.30 (s, 1H) ppm	62/19
172	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 13.28 (bs, 1H), 8.12 (d, 1H), 7.59 (bs, 2H), 7.28 (bs, 2H), 6.77 (d, 1H), 6.52 (bs, 1H), 3.81 (bs, 1H), 1.09 (bs, 6H) ppm	-
173	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(prop-2-in-1-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 8.15 (s, 1H), 8.06 (d, 1H), 7.46 (m, 2H), 7.09 (t, 2H), 6.49 (d, 1H), 4.05 (bs, 2H), 2.15 (s, 1H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
174	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.11 (s, 1H), 8.00 (d, 1H), 7.43 (m, 2H), 7.33 (t, 2H), 6.65 (d, 1H), 6.40 (bs, 1H), 3.70 (d, 2H), 2.02 (m, 1H), 0.98 (bs, 6H), 0.72 (d, 6H) ppm	-
175	3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-5-carbonitril	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.62 (d, 2H), 7.46 (m, 2H), 7.631 (m, 4H) ppm	-
176	4-{1-[1-(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)ethyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.45 (m, 2H), 7.98 (s, 1H), 7.57 (s, 1H), 7.48-7.43 (m, 2H), 7.18 (m, 2H), 7.14-7.08 (m, 2H), 5.88 (q, 1H), 2.15 (m, 3H) ppm	-
178	1-[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-methylbutan-2-on	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.45 (m, 2H), 8.10 (s, 1H), 7.45 (m, 2H), 7.25 (m, 2H), 7.15 (m, 2H), 1.75 (d, 6H) ppm	-
179	4-[1-(2-Ethoxyethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.45 (d, 2H), 7.89 (s, 1H), 7.45 (m, 2H), 7.18 (d, 2H), 7.14-7.08 (m, 2H), 4.30 (t, 2H), 3.82 (t, 2H), 3.49 (q, 2H), 1.12 (t, 3H) ppm	-
180	[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetonitril	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.46 (dd, 2H), 7.96 (s, 1H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.20 (d, 2H), 7.14-7.11 (m, 2H), 5.23 (s, 2H) ppm	-
181	Propan-2-yl-{4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}carbamat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₇ -DMF): δ = 8.16 (d, 1H), 8.02 (m, 2H), 7.93 (s, 1H), 7.57-7.53 (m, 2H), 7.25-7.21 (m, 2H), 6.92 (dd, 1H), 4.90 (m, 1H), 4.67 (m, 1H), 3.20 (m, 6H), 1.57 (d, 6H) ppm	-
182	N-Benzyl-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.30 (bs, 1H), 8.12 (d, 1H), 7.56 (m, 3H), 7.25 (t, 7H), 6.49 (bs, 1H), 4.37 (bs, 2H), 4.01 (d, 2H), 2.18 (m, 1H), 0.89 (d, 6H) ppm	-
184	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 8.01 (d, 1H), 7.89 (s, 1H), 7.45 (m, 2H), 7.02 (t, 2H), 6.36 (d, 1H), 4.94 (bs, 2H), 3.89 (d, 2H), 2.23 (m, 1H), 0.91 (d, 6H) ppm	-
185	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2-methyl-N-(propan-2-yl)propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 8.37 (d, 2H), 7.98 (s, 1H), 7.44 (m, 2H), 7.07 (d, 2H), 6.87 (d, 1H), 4.85 (m, 1H), 3.92 (d, 2H), 2.48 (m, 1H), 2.24 (m, 1H), 1.18 (d, 6H), 1.03 (d, 6H), 0.92 (d, 6H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
186	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2,2,4-trimethyl-3-oxo-N-(propan-2-yl)pentanamid	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 8.09 (bs, 1H), 7.93 (s, 1H), 7.41 (m, 2H), 7.05 (t, 2H), 6.8 (d, 1H), 4.85 (m, 1H), 3.92 (d, 2H), 3.05 (m, 1H), 2.25 (m, 1H), 1.23 (d, 6H), 1.1 (d, 6H), 1.04 (s, 6H), 0.93 (d, 6H) ppm	-
187	1-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}pyrrolidin-2-on	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.26 (d, 2H), 8.16 (s, 1H), 7.43 (m, 2H), 7.20 (t, 2H), 6.93 (m, 1H), 3.98 (m, 4H), 2.54 (m, 2H), 2.20 (m, 1H), 2.02 (m, 2H), 0.91 (d, 6H) ppm	-
188	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2-methyl-N-(2-methylpropanoyl)propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 8.44 (d, 1H), 7.98 (s, 1H), 7.44 (m, 2H), 7.06 (m, 2H), 6.95 (d, 1H), 3.90 (d, 2H), 2.87 (m, 2H), 2.23 (m, 1H), 1.14 (d, 12H), 0.91 (d, 6H) ppm	-
189	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 8.25 (d, 2H), 8.05 (s, 1H), 8.00 (s, 1H), 7.42 (m, 2H), 7.04 (d, 2H), 6.98 (d, 1H), 3.90 (d, 2H), 2.9 (m, 1H), 2.24 (m, 1H), 1.2 (d, 6H), 0.91 (d, 6H) ppm	-
191	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-phenylacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.61 (s, 1H, br), 8.10 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.82 (s, 1H), 7.45-7.43 (m, 2H), 7.35-7.28 (m, 5H), 7.09-7.06 (m, 2H), 6.88 (d, 1H), 3.96 (d, 2H), 3.69 (s, 2H), 2.20 (m, 1H), 0.93 (d, 6H) ppm	-
192	(2S)-N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-hydroxypropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.98 (s, 1H, br), 8.15-8.10 (m, 2H), 7.90 (s, 1H), 7.48-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.92 (dd, 1H), 4.56 (m, 1H), 4.22 (m, 1H), 4.05 (s, 1H), 1.53 (d, 6H) ppm	-
193	tert-Butyl-4-{3-(4-fluorophenyl)-4-[2-(propanoylamino)pyridin-4-yl]-1H-pyrazol-1-yl}piperidin-1-carboxylat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.50 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.89 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.92 (dd, 1H), 4.38 (m, 1H), 4.18 (m, 2H), 2.90 (m, 2H), 2.37 (q, 2H), 2.10 (m, 2H), 1.90 (m, 2H), 1.45 (s, 9H), 1.10 (t, 3H) ppm	-
195	N-{4-[3-(4-Chlor-2-fluorophenyl)-1-methyl-5-(methylsulfanyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.53 (s, 1H, br), 8.15-8.13 (m, 3H), 7.42-7.40 (m, 2H), 7.25 (d, 1H), 7.15 (d, 1H), 6.85 (dd, 1H), 4.05 (s, 3H), 2.38 (q, 2H), 2.30 (s, 3H), 1.10 (t, 3H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
196	N-{4-[5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluor-2-hydroxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 10.2 (s, 1H), 8.63 (s, 1H, br), 8.26 (d, 1H), 8.13 (s, 1H), 7.03 (dd, 1H), 6.95 (m, 1H), 6.70 (m, 1H), 6.55 (t, 1H), 6.45 (m, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.41 (q, 2H), 1.12 (t, 3H) ppm	-
197	N-{4-[3-(4-Chlor-2-fluorophenyl)-1-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.55 (s, 1H, br), 8.17 (d, 1H), 8.01 (s, 1H), 7.36 (dd, 1H), 7.21 (d, 1H), 7.18 (d, 1H), 6.82 (dd, 1H), 4.10 (s, 3H), 2.37 (q, 2H), 1.09 (t, 3H) ppm	-
198	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.50 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.86 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.21 (q, 2H), 2.38 (q, 2H), 1.49 (t, 3H), 1.10 (t, 3H) ppm	-
199	N-{4-[3-(4-Cyan-2,5-difluorophenyl)-5-(difluormethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.70 (s, 1H, br), 8.20 (d, 1H), 7.99 (s, 1H), 7.50-7.45 (m, 2H), 6.94 (dd, 1H), 6.65 (t, 2J(H,F), 1H), 3.96 (s, 2H), 3.86 (s, 3H), 3.44 (s, 3H) ppm	-
200	N-{4-[3-(4-Chlor-2-fluorophenyl)-1-methyl-5-(methylsulfanyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.73 (s, 1H, br), 8.18-8.15 (m, 2H), 7.40 (m, 1H), 7.25 (d, 1H), 7.15 (d, 1H), 6.90 (m, 1H), 4.03 (s, 3H), 3.97 (s, 2H), 3.45 (s, 3H), 2.30 (s, 3H) ppm	-
201	N-{4-[5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluor-2-hydroxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.80 (s, 1H, br), 8.30 (d, 1H), 8.12 (s, 1H), 7.03-7.00 (m, 2H), 6.70 (m, 1H), 6.58 (t, 2J(H,F), 1H), 6.48 (m, 1H), 3.99 (s, 2H), 3.84 (s, 3H), 3.46 (s, 3H) ppm	-
202	N-{4-[3-(4-Chlor-2-fluorophenyl)-1-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.78 (s, 1H, br), 8.21 (d, 1H), 8.01 (s, 1H), 7.36 (dd, 1H), 7.21 (d, 1H), 7.16 (d, 1H), 6.89 (dd, 1H), 4.10 (s, 3H), 3.96 (s, 2H), 3.45 (s, 3H) ppm	-
203	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.70 (s, 1H, br), 8.14 (d, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.88 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.12-7.10 (m, 2H), 6.94 (dd, 1H), 4.21 (q, 2H), 3.96 (s, 2H), 3.45 (s, 3H), 1.50 (t, 3H) ppm	-
204	tert-Butyl-4-[3-(4-fluorophenyl)-4-{2-[(methoxyacetyl)amino]pyridin-4-yl}-1H-pyrazol-1-yl]piperidin-1-carboxylat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.70 (s, 1H, br), 8.12 (d, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.92 (s, 1H), 7.45-7.41 (m, 2H), 7.08 (m, 2H), 6.95 (d, 1H), 4.38 (m, 1H), 4.15 (m, 2H), 3.96 (s, 2H), 3.45 (s, 3H), 2.1 (m, 2H), 1.90 (m, 2H), 1.45 (s, 9H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
205	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}benzamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.95 (s, 1H, br), 8.26 (s, 1H), 8.18 (d, 1H), 7.93 (m, 3H), 7.60 (m, 1H), 7.51-7.49 (m, 4H), 7.13-7.10 (m, 1H), 6.96-6.95 (dd, 1H), 4.57 (m, 1H), 1.54 (d, 6H) ppm	-
206	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}thiophen-2-carboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.93 (s, 1H, br), 8.18 (m, 2H), 7.93 (s, 1H), 7.84 (m, 1H), 7.70 (dd, 1H), 7.50-7.48 (m, 2H), 7.18-7.16 (dd, 1H), 7.12-7.10 (m, 2H), 6.95 (dd, 1H), 4.56 (m, 1H), 1.54 (d, 6H) ppm	-
207	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}thiophen-3-carboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.80 (s, 1H, br), 8.21 (s, 1H), 8.18 (m, 1H), 7.93 (s, 1H), 7.56 (m, 1H), 7.50-7.48 (m, 3H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.94 (dd, 1H), 4.55 (m, 1H), 1.53 (d, 6H) ppm	-
208	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-(2-methoxyethoxy)acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.18 (s, 1H, br), 8.16 (d, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.90 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.94 (dd, 1H), 4.55 (m, 1H), 4.04 (s, 2H), 3.71 (t, 2H), 3.56 (t, 2H), 3.38 (s, 3H), 1.53 (d, 6H) ppm	-
209	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-hydroxy-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.12 (s, 1H, br), 8.13 (m, 2H), 7.90 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.11-7.09 (m, 2H), 6.91 (dd, 1H), 4.55 (m, 1H), 3.90 (s, 1H, br), 1.53 (d, 6H), 1.40 (s, 6H) ppm	-
210	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2,3-dihydroxypropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.01 (s, 1H, br), 8.14 (m, 2H), 7.91 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.11-7.09 (m, 2H), 6.93 (dd, 1H), 4.56 (m, 1H), 4.15 (m, 1H), 4.10 (s, 1H, br), 3.74 (m, 2H), 3.10 (s, 1H, br), 1.53 (d, 6H) ppm	-
211	1-Ethyl-3-{4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}harnstoff	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.82 (s, 1H, br), 8.05 (d, 1H), 7.86 (s, 1H), 7.49-7.45 (m, 2H), 7.13-7.10 (m, 2H), 6.81 (s, 1H), 6.78 (m, 1H), 4.56 (m, 1H), 3.25 (q, 2H), 1.52 (d, 6H), 1.15 (t, 3H) ppm	-
212	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-phenylacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.60 (s, 1H, br), 8.10 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.84 (s, 1H), 7.45 (dd, 2H), 7.38-7.30 (m, 5H), 7.10 (t, 2H), 6.88 (d, 1H), 4.29 (t, 2H), 3.77 (t, 2H), 3.69 (s, 2H), 3.30 (s, 3H) ppm	-
213	N-{4-[1-(2-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.41 (s, 1H), 8.27 (s, 1H), 8.18 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.43-7.37 (m, 4H), 7.30-7.18 (m, 4H), 6.83 (dd, 1H), 5.48 (s, 2H), 2.38 (q, 2H), 1.05 (t, 3H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
214	N-{4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.57 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.93 (s, 1H), 7.48-7.45 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.87 (dd, 1H), 4.03 (d, 2H), 2.38 (q, 2H), 1.36 (m, 1H), 1.11 (t, 3H), 0.62 (m, 2H), 0.44 (m, 2H) ppm	-
215	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.60 (s, 1H, br), 8.12-8.10 (m, 2H), 7.93 (s, 1H), 7.48-7.45 (m, 2H), 7.13-7.10 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 6.28 (tt, 2J(F,H)=54 Hz, 1H), 4.59 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H), 2.39 (q, 2H), 1.11 (t, 3H) ppm	-
216	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.76 (s, 1H, br), 8.17 (d, 2H), 8.09 (s, 1H), 7.96 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.13-7.10 (m, 2H), 6.95 (dd, 1H), 6.28 (tt, 2J(F,H)=54 Hz, 1H), 4.59 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H), 3.97 (s, 2H), 3.45 (s, 3H) ppm	-
217	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.91 (s, 1H, br), 8.13 (dd, 2H), 8.09 (s, 1H), 7.91 (s, 1H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.85 (dd, 1H), 6.27 (tt, 2J(F,H)=59 Hz, 1H), 4.59 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H), 1.77 (m, 1H), 0.90-0.80 (m, 4H) ppm	-
218	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.58 (s, 1H, br), 8.12 (m, 2H), 7.93 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 6.27 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.58 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H), 2.62 (m, 1H), 1.14 (d, 6H) ppm	-
219	N-{4-[1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.58 (s, 1H, br), 8.11 (m, 2H), 7.93 (s, 1H), 7.49-7.45 (m, 2H), 7.15-7.08 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.48 (t, 2H), 4.02 (t, 2H), 2.38 (q, 2H), 1.11 (t, 3H) ppm	-
220	N-{4-[1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.74 (s, 1H, br), 8.16 (dd, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.95 (s, 1H), 7.49-7.46 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.95 (dd, 1H), 4.49 (t, 2H), 4.02 (t, 2H), 3.96 (s, 2H), 3.45 (s, 3H) ppm	-
221	N-{4-[1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.90 (s, 1H, br), 8.12 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.90 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.12-7.08 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.48 (t, 2H), 4.01 (t, 2H), 1.77 (m, 1H), 0.88-0.81 (m, 4H) ppm	-
222	N-{4-[1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.58 (s, 1H, br), 8.13-8.11 (m, 2H), 7.93 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.49 (t, 2H), 4.02 (t, 2H), 2.62 (m, 1H), 1.14 (d, 6H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
223	N-{4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.73 (s, 1H, br), 8.15 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.95 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.96 (dd, 1H), 4.03 (d, 2H), 3.97 (s, 2H), 3.45 (s, 3H), 1.36 (m, 1H), 0.63 (m, 2H), 0.43 (m, 2H) ppm	-
224	N-{4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.92 (s, 1H, br), 8.11 (d, 1H), 8.10 (s, 1H), 7.91 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.02 (d, 2H), 1.78 (m, 1H), 1.34 (m, 1H), 0.85-0.80 (m, 4H), 0.62 (m, 2H), 0.43 (m, 2H) ppm	-
225	N-{4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.60 (s, 1H, br), 8.12 (s, 1H), 8.10 (d, 1H), 7.93 (s, 1H), 7.48-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.03 (d, 2H), 2.63 (m, 1H), 1.38 (m, 1H), 1.14 (d, 6H), 0.62 (m, 2H), 0.43 (m, 2H) ppm	-
226	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yloxy)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.54 (s, 1H, br), 8.13 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.80 (s, 1H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.89 (dd, 1H), 4.74 (m, 1H), 2.38 (q, 2H), 1.33 (d, 6H), 1.10 (t, 3H) ppm	-
227	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yloxy)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.45 (dd, 2H), 7.82 (s, 1H), 7.45-7.43 (m, 2H), 7.20-7.19 (dd, 2H), 7.13-7.10 (m, 2H), 4.77 (m, 1H), 1.33 (d, 6H) ppm	-
228	3-(4-Fluorophenyl)-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.51 (d, 1H), 8.45 (s, 1H), 7.45 (s, 1H), 7.29 (d, 1H), 7.04-7.03 (dd, 2H), 6.94-6.91 (dd, 2H), 6.90-6.80 (m, 4H), 3.89 (d, 2H), 2.20 (m, 1H), 0.87 (d, 6H) ppm	-
229	3-(3-Fluorophenyl)-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.54-8.53 (d, 1H), 8.46 (s, 1H), 7.46 (s, 1H), 7.32 (d, 1H), 7.13 (m, 1H), 7.05 (m, 2H), 6.90-6.86 (m, 2H), 6.75 (m, 1H), 6.65 (m, 1H), 3.89 (d, 2H), 2.20 (m, 1H), 0.87 (d, 6H) ppm	-
230	N-{4-[3-(3-Cyan-4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.41 (s, 1H), 8.24 (s, 1H), 8.20 (m, 1H), 8.06 (s, 1H), 7.92 (m, 1H), 7.78 (m, 1H), 7.56 (t, 1H), 6.92 (m, 1H), 4.02 (d, 2H), 2.39 (q, 2H), 2.20 (m, 1H), 1.05 (t, 3H), 0.92 (d, 6H) ppm	-
231	1-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-ethylharnstoff	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.80 (s, 1H, br), 8.06 (m, 1H), 7.88 (s, 1H), 7.53-7.45 (m, 3H), 7.14-7.10 (m, 2H), 6.84 (s, 1H), 6.77 (m, 1H), 6.27 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.59 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H), 3.27 (q, 2H), 1.14 (t, 3H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
232	N-(4-{3-(4-Fluorophenyl)-1-[1-(2-fluorophenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.40 (s, 1H), 8.34 (s, 1H), 8.17 (d, 1H), 8.10 (s, 1H), 7.45-7.35 (m, 4H), 7.25-7.18 (m, 4H), 6.82 (dd, 1H), 5.96 (q, 1H), 2.72 (m, 1H), 1.06 (d, 6H) ppm	-
233	3-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-1,1-dimethylharnstoff	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.05 (m, 1H), 7.90 (m, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.36 (s, 1H, br), 7.11-7.09 (m, 2H), 6.77 (dd, 1H), 4.55 (m, 1H), 2.95 (s, 6H), 1.53 (d, 6H) ppm	-
234	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propan-2-sulfonamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.01 (s, 1H), 7.90 (d, 1H), 7.85 (m, 1H), 7.50-7.45 (m, 3H), 7.13-7.05 (m, 2H), 6.35 (m, 1H), 6.27 (tt, 1H), 4.60 (m, 2H), 3.05 (m, 1H), 1.34 (d, 6H) ppm	-
235	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}thiophen-3-carboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.91 (s, 1H, br), 8.23-8.17 (m, 3H), 7.97 (s, 1H), 7.57 (m, 1H), 7.49-7.48 (m, 2H), 7.13-7.11 (m, 2H), 6.94 (dd, 1H), 6.28 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.60 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H) ppm	-
236	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}thiophen-2-carboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.04 (s, 1H, br), 8.24 (d, 1H), 8.20 (s, 1H), 7.87 (dd, 1H), 7.74 (d, 1H), 7.53-7.51 (m, 2H), 7.21-7.20 (dd, 1H), 7.17-7.14 (m, 2H), 6.98 (dd, 1H), 6.31 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.63 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H) ppm	-
237	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}benzamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.08 (s, 1H, br), 8.30 (m, 1H), 8.24 (m, 1H), 8.01 (s, 1H), 7.97 (d, 2H), 7.64 (m, 1H), 7.56-7.50 (m, 4H), 7.17-7.14 (m, 2H), 6.98 (dd, 1H), 6.32 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.64 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H) ppm	-
238	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-methylbutanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.57 (s, 1H, br), 8.13-8.10 (m, 2H), 7.93 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.88 (dd, 1H), 6.27 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.58 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H), 2.22 (m, 2H), 2.10 (m, 1H), 0.95 (d, 6H) ppm	-
239	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylbutanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.57 (s, 1H, br), 8.13-8.10 (m, 2H), 7.93 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 6.27 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.59 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H), 2.42 (m, 1H), 1.65 (m, 1H), 1.45 (m, 1H), 1.12 (d, 3H), 0.89 (t, 3H) ppm	-
240	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclobutanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.44 (s, 1H, br), 8.16-8.14 (m, 2H), 7.96 (s, 1H), 7.51-7.49 (m, 2H), 7.16-7.13 (m, 2H), 6.89 (dd, 1H), 6.31 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.62 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H), 2.30-2.20 (m, 6H), 1.85 (m, 1H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
241	Ethyl-4-[1-(2,2-difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} carbamat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.16 (s, 1H, br), 8.12 (d, 1H), 7.92 (s, 1H), 7.85 (d, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.12-7.10 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 6.27 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.59 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H), 4.14 (q, 2H), 1.24 (t, 3H) ppm	-
242	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.63 (s, 1H, br), 8.13 (dd, 1H), 8.06 (s, 1H), 7.92 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.13-7.09 (m, 2H), 6.88 (dd, 1H), 6.27 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.59 (dt, 3J(F,H)=14Hz, 2H), 2.10 (s, 3H) ppm	-
243	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-hydroxy-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.20 (s, 1H, br), 8.12 (m, 2H), 7.97 (s, 1H), 7.51-7.49 (m, 2H), 7.15-7.13 (m, 2H), 6.94 (dd, 1H), 6.30 (tt, 2J(F,H)=55 Hz, 1H), 4.62 (dt, 2H), 1.43 (s, 6H) ppm	-
244	N-{4-{3-(4-Fluorophenyl)-1-[1-(2-fluorophenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 9.95 (s, 1H), 8.38 (s, 1H), 8.20 (dd, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.43-7.36 (m, 4H), 7.25-7.15 (m, 4H), 6.96 (dd, 1H), 4.03 (s, 2H), 3.40 (s, 3H), 1.90 (d, 3H) ppm	-
245	N-(4-{1-[(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 9.96 (s, 1H), 8.26 (s, 1H), 8.22 (d, 1H), 8.06 (s, 1H), 7.47 (m, 2H), 7.23 (m, 2H), 6.91 (dd, 1H), 4.45 (dd, 1H), 4.34 (dd, 1H), 4.03 (s, 2H), 3.40 (s, 3H), 2.40 (m, 1H), 1.90 (dd, 1H), 1.70 (dd, 1H) ppm	-
246	N-{4-[3-(3-Cyan-4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 9.97 (s, 1H), 8.27 (s, 1H), 8.24 (d, 1H), 7.98 (s, 1H), 7.92 (dd, 1H), 7.78 (m, 1H), 7.55 (t, 1H), 6.99 (d, 1H), 4.03 (m, 4H), 3.40 (s, 3H), 2.20 (m, 1H), 0.91 (d, 6H) ppm	-
247	N-{4-[1-(2-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 9.96 (s, 1H), 8.30 (s, 1H), 8.21 (d, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.45-7.38 (m, 4H), 7.30-7.18 (m, 4H), 6.92 (dd, 1H), 5.49 (s, 2H), 4.03 (s, 2H), 3.4 (s, 3H) ppm	-
248	N-(4-{3-(4-Fluorophenyl)-1-[1-(2-fluorophenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.40 (s, 1H), 8.34 (s, 1H), 8.18 (d, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.42-7.35 (m, 4H), 7.25-7.18 (m, 4H), 6.86 (dd, 1H), 5.96 (q, 1H), 2.38 (q, 2H), 1.90 (d, 3H), 1.05 (t, 3H) ppm	-
249	N-(4-{1-[(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.42 (s, 1H), 8.24 (s, 1H), 8.18 (d, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.47 (m, 2H), 7.23 (m, 2H), 6.84 (dd, 1H), 4.45 (dd, 1H), 4.33 (dd, 1H), 2.40-2.35 (m, 3H), 1.90 (dd, 1H), 1.70 (dd, 1H), 1.04 (q, 3H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
250	2-Cyclopropyl-N-(4-{3-(4-fluorophenyl)-1-[1-(2-fluorophenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.33 (s, 1H), 8.33 (s, 1H), 8.16 (d, 1H), 8.09 (s), 7.42-7.35 (m, 4H), 7.25-7.15 (m, 4H), 6.84 (dd, 1H), 5.95 (q, 1H), 2.23 (d, 2H), 1.90 (d, 3H), 1.00 (m, 1H), 0.45 (m, 2H), 0.16 (m, 2H) ppm	-
251	2-Cyclopropyl-N-(4-{1-[(2,2-dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.35 (s, 1H), 8.24 (s, 1H), 8.18 (dd, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.45 (m, 2H), 7.22 (m, 2H), 6.83 (dd, 1H), 4.45 (dd, 1H), 4.33 (dd, 1H), 2.40 (m, 1H), 2.23 (d, 2H), 1.90 (dd, 1H), 1.70 (dd, 1H), 1.00 (m, 1H), 0.45 (d, 2H), 0.17 (d, 2H) ppm	-
252	N-{4-[3-(3-Cyan-4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-cyclopropylacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.34 (s, 1H), 8.24 (s, 1H), 8.20 (d, 1H), 8.06 (s, 1H), 7.90 (dd, 1H), 7.78 (m, 1H), 7.56 (t, 1H), 6.92 (dd, 1H), 4.00 (d, 2H), 2.23 (d, 2H), 2.20 (m, 1H), 1.05 (m, 1H), 0.91 (d, 6H), 0.45 (d, 2H), 0.16 (d, 2H) ppm	-
253	2-Cyclopropyl-N-{4-[1-(2-fluorbenzyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.33 (s, 1H), 8.27 (s, 1H), 8.16 (dd, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.42-7.35 (m, 4H), 7.25-7.15 (m, 4H), 6.82-6.80 (dd, 1H), 5.47 (s, 2H), 2.24 (d, 2H), 1.00 (m, 1H), 0.44 (m, 2H), 0.18 (m, 2H) ppm	-
254	N-(4-{1-[(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.41 (s, 1H), 8.24 (s, 1H), 8.18 (d, 1H), 8.13 (s, 1H), 7.45 (dd, 2H), 7.22 (m, 2H), 6.81 (dd, 1H), 4.45 (dd, 1H), 4.35 (dd, 1H), 2.75 (m, 1H), 2.43 (m, 1H), 1.89 (dd, 1H), 1.70 (dd, 1H), 1.05 (d, 6H) ppm	-
255	N-{4-[3-(3-Cyan-4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.41 (s, 1H), 8.25 (s, 1H), 8.20 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.90 (dd, 1H), 7.78 (m, 1H), 7.55 (t, 1H), 6.90 (dd, 1H), 4.00 (d, 2H), 2.72 (m, 1H), 2.20 (m, 1H), 1.05 (d, 6H), 0.91 (d, 6H) ppm	-
256	N-{4-[1-(2-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.40 (s, 1H), 8.27 (s, 1H), 8.16 (dd, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.45-7.35 (m, 3H), 7.25-7.15 (m, 5H), 6.80-6.79 (dd, 1H), 5.47 (s, 2H), 2.61 (m, 1H), 1.05 (d, 6H) ppm	-
258	N-{4-[5-(Difluoromethoxy)-3-(4-fluor-2-hydroxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.69 (s, 1H), 9.92 (s, 1H), 8.15 (d, 1H), 8.03 (s, 1H), 7.20 (m, 1H), 7.13 (t, 2J(H,F)=71 Hz, 1H), 6.73 (dd, 1H), 6.67-6.64 (m, 1H), 6.58-6.55 (dd, 1H), 3.79 (s, 3H), 1.95 (m, 1H), 0.76 (m, 4H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
259	N-(4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[1-(2-fluorphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.76 (s, 1H), 8.32 (s, 1H), 8.18 (d, 1H), 8.07 (s), 7.44-7.42 (m, 4H), 7.25-7.15 (m, 4H), 6.83 (dd, 1H), 5.95 (q, 1H), 2.00 (m, 2H), 1.80 (d, 3H), 0.80 (m, 4H) ppm	-
260	N-(4-{1-[(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.78 (s, 1H), 8.22 (s, 1H), 8.19 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.44 (dd, 2H), 7.23 (m, 2H), 6.82 (dd, 1H), 4.45 (dd, 1H), 4.34 (dd, 1H), 2.40 (m, 1H), 1.98 (m, 1H), 1.70 (dd, 1H), 0.78 (m, 4H) ppm	-
261	N-{4-[3-(3-Cyan-4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.78 (s, 1H), 8.23 (s, 1H), 8.21 (d, 1H), 8.05 (s, 1H), 7.90 (dd, 1H), 7.77 (m, 1H), 7.55 (t, 1H), 6.90 (dd, 1H), 4.00 (d, 2H), 2.20 (m, 1H), 1.98 (m, 1H), 0.90 (d, 6H), 0.78 (m, 4H) ppm	-
262	N-{4-[1-(2-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.78 (s, 1H), 8.25 (s, 1H), 8.17 (d, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.45-7.30 (m, 3H), 7.30-7.15 (m, 5H), 6.81 (m, 1H), 5.47 (s, 2H), 1.98 (m, 1H), 0.78 (m, 4H) ppm	-
263	Ethyl-(4-{3-(4-fluorphenyl)-1-[1-(2-fluorphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)carbammat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.05 (s, 1H), 8.35 (s, 1H), 8.15 (d, 1H), 7.77 (s, 1H), 7.45-7.35 (m, 3H), 7.25-7.15 (m, 5H), 6.83 (dd, 1H), 5.94 (q, 1H), 1.90 (d, 3H), 1.22 (t, 3H) ppm	-
264	Ethyl-(4-{1-[(2,2-dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)carbammat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.07 (s, 1H), 8.24 (s, 1H), 8.15 (d, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.47-7.45 (dd, 2H), 7.22 (dd, 2H), 6.83 (dd, 1H), 4.47-4.44 (dd, 1H), 4.35-4.32 (dd, 1H), 4.09 (q, 2H), 2.40 (m, 1H), 1.90 (dd, 1H), 1.70 (dd, 1H), 1.22 (t, 3H) ppm	-
265	Ethyl-(4-{3-(3-cyan-4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)carbammat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.08 (s, 1H), 8.25 (s, 1H), 8.16 (m, 1H), 7.92 (m, 1H), 7.78-7.70 (m, 2H), 7.56-7.53 (m, 2H), 7.40 (m, 1H), 6.90 (dd, 1H), 4.09 (q, 2H), 4.00 (d, 2H), 2.20 (m, 1H), 1.22 (m, 6H), 0.80 (d, 3H) ppm	-
266	Ethyl-(4-[1-(2-fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)carbammat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.06 (s, 1H), 8.27 (s, 1H), 8.14-8.13 (d, 1H), 7.78 (d, 1H), 7.44-7.42 (m, 4H), 7.35 (m, 1H), 7.25-7.15 (m, 4H), 5.47 (s, 2H), 4.10 (q, 2H), 1.22 (t, 3H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
267	Ethyl-1-{4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} carbamat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.05 (s, 1H), 8.19 (s, 1H), 8.13 (d, 1H), 7.78 (d, 1H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.22-7.19 (dd, 2H), 6.83-6.82 (dd, 1H), 4.10 (q, 2H), 3.99 (d, 2H), 2.18 (m, 1H), 1.22 (m, 6H), 0.80 (d, 3H) ppm	-
268	Ethyl-1-{4-[1-(butan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} carbamat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.04 (s, 1H), 8.19 (s, 1H), 8.13 (d, 1H), 7.77 (s, 1H), 7.45-7.42 (m, 2H), 7.22 (dd, 2H), 6.84-6.83 (dd, 1H), 4.35 (m, 1H), 4.09 (q, 2H), 1.90 (m, 1H), 1.80 (m, 1H), 1.22 (m, 6H), 0.80 (t, 3H) ppm	-
269	N-{4-[1-(Cyclopentylloxy)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} cyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.86 (s, 1H, br), 8.14 (d, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.80 (s, 1H), 7.47-7.43 (m, 2H), 7.10-7.06 (m, 2H), 6.88 (dd, 1H), 5.09 (m, 1H), 1.85-1.78 (m, 5H), 1.70-1.63 (m, 2H), 0.85-0.75 (m, 4H) ppm	-
270	N-{4-[1-(Cyclopentylloxy)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.53 (s, 1H, br), 8.13-8.11 (m, 2H), 7.81 (s, 1H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.87 (dd, 1H), 5.11 (m, 1H), 2.63 (m, 1H), 1.85-1.78 (m, 4H), 1.70-1.63 (m, 2H), 1.13 (d, 6H) ppm	-
271	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yloxy)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} cyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.87 (s, 1H, br), 8.13-8.12 (d, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.46-7.44 (m, 2H), 7.10-7.08 (m, 2H), 6.87 (dd, 1H), 4.75 (m, 1H), 1.76 (m, 1H), 1.32 (d, 6H), 0.87-0.81 (m, 4H) ppm	-
272	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yloxy)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.53 (s, 1H, br), 8.13-8.11 (m, 2H), 7.80 (s, 1H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.10-7.08 (m, 2H), 6.87 (dd, 1H), 4.75 (m, 1H), 2.60 (m, 1H), 1.32 (d, 6H), 1.13 (d, 6H) ppm	-
273	N-(Cyclopropylmethyl)-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.30 (bs, 1H), 8.11 (d, 1H), 7.56 (m, 2H), 7.21 (t, 2H), 7.00 (m, 1H), 6.47 (bs, 1H), 3.99 (d, 2H), 2.94 (bs, 2H), 2.18 (m, 1H), 0.90 (d, 6H), 0.35 (m, 2H), 0.10 (m, 2H) ppm	-
274	Methyl-2-{3-(4-fluorophenyl)-4-[2-(propionylamino)pyridin-4-yl]-1H-pyrazol-1-yl}-3-methylbutanoat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.41 (s, 1H), 8.27 (s, 1H), 8.18 (dd, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.22-7.20 (m, 2H), 6.85 (dd, 1H), 4.92 (d, 1H), 3.72 (s, 3H), 2.60 (m, 1H), 2.37 (q, 2H), 1.03 (t, 3H), 1.00 (d, 3H), 0.86 (d, 3H) ppm	-
275	4-[1-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.47 (dd, 2H), 8.19 (s, 1H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.25-7.15 (m, 4H), 5.27 (t, 1H), 4.32 (d, 2H), 3.95-3.85 (m, 4H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
276	N-{4-[1-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.41 (s, 1H), 8.16 (dd, 1H), 8.12 (s, 2H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.78 (dd, 1H), 5.27 (t, 1H), 4.32 (d, 2H), 3.95-3.80 (m, 4H), 2.72 (m, 1H), 1.06 (d, 6H) ppm	-
277	Methyl-2-{3-(4-fluorophenyl)-4-[2-(isobutylamino)pyridin-4-yl]-1H-pyrazol-1-yl}-3-methylbutanoat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.42 (s, 1H), 8.27 (s, 1H), 8.18 (dd, 1H), 8.12 (s, 1H), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.22-7.20 (m, 2H), 6.83 (dd, 1H), 4.92 (d, 1H), 3.72 (s, 3H), 2.73 (m, 1H), 2.62 (m, 1H), 1.06 (d, 6H), 1.00 (d, 3H), 0.86 (d, 3H) ppm	-
278	N-{4-[1-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.41 (s, 1H), 8.16 (dd, 1H), 8.11-8.09 (m, 2H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.81 (dd, 1H), 5.27 (t, 1H), 4.32 (d, 2H), 3.95-3.80 (m, 4H), 2.37 (q, 2H), 1.04 (t, 3H) ppm	-
279	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(oxetan-3-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.31 (bs, 1H), 8.16 (d, 1H), 7.73 (d, 1H), 7.54 (m, 2H), 7.27 (t, 2H), 6.52 (bs, 1H), 4.54 (bs, 2H), 4.43 (bs, 2H), 3.99 (d, 2H), 3.75 (bs, 1H), 2.18 (m, 1H), 0.90 (d, 6H) ppm	-
280	7-[3-(4-fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridine	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 12.35 (bs, 1H), 8.78 (s, 1H), 8.69 (s, 1H), 8.12 (s, 1H), 7.65 (m, 2H), 7.00 (t, 2H), 4.58 (m, 1H), 1.57 (d, 6H) ppm	-
281	N-Cyclopropyl-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.26 (bs, 1H), 8.14 (d, 1H), 7.63 (m, 2H), 7.21 (t, 2H), 6.48 (d, 1H), 4.0 (d, 2H), 2.62 (m, 1H), 2.018 (m, 1H), 0.9 (d, 6H), 0.55 (m, 2H), 0.43 (m, 2H) ppm	-
282	6-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-9H-purin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 11.00 (s, 1H), 8.85 (s, 1H), 8.60 (s, 1H), 8.21 (s, 1H), 7.74-7.73 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 4.65 (m, 1H), 1.57 (d, 6H) ppm	-
283	4-[3-(4-fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-2-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyridine	¹ H-NMR (250 MHz, CDCl ₃): δ = 8.24 (d, 1H), 8.04 (s, 1H), 7.65 (s, 1H), 7.41 (m, 2H), 7.12 (d, 1H), 7.06-6.98 (m, 4H), 4.52 (m, 1H), 2.20 (s, 3H), 1.54 (d, 6H) ppm	-
284	N-tert-Butyl-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.18 (s, 1H), 8.10 (d, 1H), 7.5 (m, 2H), 7.22 (t, 2H), 6.45 (s, 1H), 6.33 (d, 1H), 4.0 (d, 2H), 2.17 (m, 1H), 1.3 (bs, 9H), 0.9 (d, 6H) ppm	-
285	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(1-methoxypropan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.04 (bs, 1H), 7.88 (d, 1H), 7.31 (m, 2H), 6.97 (t, 2H), 6.48 (d, 1H), 6.19 (bs, 1H), 3.76 (m, 3H), 3.10 (s, 3H), 2.96 (bs, 2H), 1.94 (m, 1H), 0.80 (bs, 3H), 0.66 (d, 6H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
286	N-(Butan-2-yl)-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.25 (bs, 1H), 8.10 (d, 1H), 7.55 (m, 2H), 7.20 (t, 2H), 6.72 (d, 1H), 3.99 (d, 2H), 2.18 (m, 1H), 1.00 (bs, 2H), 0.9 (d, 6H), 0.78 (bs, 2H) ppm	-
287	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfonyl)pyrimidin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.87 (d, 1H), 8.70 (s, 1H), 7.62 (d, 1H), 7.61 (m, 2H), 7.25 (t, 2H), 4.05 (d, 2H), 3.17 (s, 3H), 2.22 (m, 1H), 0.92 (d, 6H) ppm	-
288	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl]-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.02 (s, 1H), 8.17 (s, 1H), 7.77 (s, 1H), 7.52-7.50 (m, 2H), 7.05-7.02 (m, 2H), 4.06 (d, 2H), 2.46 (s, 3H), 2.27 (m, 1H), 0.96 (d, 6H) ppm	-
289	4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.02 (s, 1H), 8.26 (s, 1H), 7.77 (m, 1H), 7.53-7.50 (m, 2H), 7.06-7.02 (m, 2H), 4.10 (d, 2H), 2.46 (d, 3H), 1.42-1.37 (m, 1H), 0.66-0.64 (m, 2H), 0.48-0.43 (m, 2H) ppm	-
290	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.61 (s, 1H, br), 8.11-8.09 (m, 2H), 7.87 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.09 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.20 (q, 2H), 2.62 (m, 1H), 1.50 (t, 3H), 1.14 (d, 6H) ppm	-
291	2-Cyclopropyl-N-{4-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.60 (s, 1H, br), 8.11 (m, 2H), 7.88 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.88 (dd, 1H), 4.21 (q, 2H), 2.26 (d, 2H), 1.50 (t, 3H), 1.05 (m, 1H), 0.54 (m, 2H), 0.21 (m, 2H) ppm	-
292	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-propyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.61 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.86 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.87 (dd, 1H), 4.12 (t, 2H), 2.37 (q, 2H), 1.90 (m, 2H), 1.11 (t, 3H), 0.93 (t, 3H) ppm	-
293	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-propyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.72 (s, 1H, br), 8.14 (dd, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.88 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.09 (m, 2H), 6.93 (dd, 1H), 4.13 (t, 2H), 3.96 (s, 3H), 3.45 (s, 3H), 0.93 (t, 3H) ppm	-
294	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-propyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.60 (s, 1H, br), 8.12-8.10 (m, 2H), 7.86 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.12 (t, 2H), 2.62 (m, 1H), 1.90 (m, 2H), 1.14 (d, 6H), 0.93 (t, 3H) ppm	-
295	2-Cyclopropyl-N-{4-[3-(4-fluorophenyl)-1-propyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.60 (s, 1H, br), 8.11 (m, 2H), 7.87 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.87 (dd, 1H), 4.13 (t, 2H), 2.26 (d, 2H), 1.05 (m, 1H), 0.93 (t, 3H), 0.54 (m, 2H), 0.21 (m, 2H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
296	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.61 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.82 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.85 (dd, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.37 (q, 2H), 1.11 (t, 3H) ppm	-
297	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.72 (s, 1H, br), 8.14 (dd, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.84 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.09 (m, 2H), 6.93 (dd, 1H), 3.96 (s, 2H), 3.91 (s, 3H), 3.45 (s, 3H) ppm	-
298	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.60 (s, 1H, br), 8.10 (m, 2H), 7.82 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.09 (m, 2H), 6.95 (dd, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.62 (m, 1H), 1.14 (d, 6H) ppm	-
299	2-Cyclopropyl-N-{4-[3-(4-fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.60 (s, 1H, br), 8.11 (m, 2H), 7.83 (s, 1H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 3.91 (s, 3H), 2.33 (d, 2H), 1.05 (m, 1H), 0.54 (m, 2H), 0.21 (m, 2H) ppm	-
300	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.40 (s, 1H), 8.21 (s, 1H), 8.16 (dd, 1H), 8.10 (s, 1H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.81-6.80 (dd, 1H), 4.37 (t, 2H), 2.98 (t, 2H), 2.36 (q, 2H), 2.07 (s, 3H), 1.03 (t, 3H) ppm	-
301	N-{4-[1-(1-Cyclopropylethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.39 (s, 1H), 8.21 (s, 1H), 8.16 (dd, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.45-7.43 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.84-6.83 (dd, 1H), 3.71 (m, 1H), 2.36 (q, 2H), 1.58 (d, 3H), 1.32 (m, 1H), 1.03 (t, 3H), 0.63 (m, 1H), 0.50 (m, 1H), 0.42-0.38 (m, 2H) ppm	-
302	N-{4-[1-(3-Cyanbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.40 (s, 1H), 8.35 (s, 1H), 8.17 (dd, 1H), 8.10 (s, 1H), 7.88 (d, 1H), 7.80 (m, 1H), 7.70 (d, 1H), 7.62-7.58 (m, 1H), 7.43-7.41 (m, 2H), 7.21-7.19 (m, 2H), 6.83-6.82 (dd, 1H), 5.48 (s, 2H), 2.36 (q, 2H), 1.03 (t, 3H) ppm	-
303	N-{4-[1-(2-Cyanethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.42 (s, 1H), 8.25 (s, 1H), 8.18 (dd, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.46-7.43 (m, 2H), 7.25-7.21 (m, 2H), 6.82-6.81 (dd, 1H), 4.48 (t, 2H), 3.13 (t, 2H), 2.38 (q, 2H), 1.04 (t, 3H) ppm	-
304	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.58 (s, 1H), 8.32 (dd, 1H), 8.03 (s, 1H), 7.33-7.30 (m, 2H), 7.18-7.15 (m, 2H), 7.00 (dd, 1H), 4.75 (m, 1H), 2.38 (q, 2H), 1.56 (d, 6H), 1.02 (t, 3H) ppm	-
305	4-[1-(1-Cyclopropylethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.46 (dd, 2H), 8.31 (s, 1H), 7.45-7.43 (m, 2H), 7.24-7.21 (m, 4H), 3.71 (m, 1H), 1.57 (d, 3H), 1.32 (m, 1H), 0.63 (m, 1H), 0.50 (m, 1H), 0.42-0.38 (m, 2H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
306	N-(4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.41 (s, 1H), 8.22 (s, 1H), 8.16 (dd, 1H), 8.13 (s, 1H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.78 (dd, 1H), 4.37 (t, 2H), 2.98 (t, 2H), 2.73 (m, 1H), 2.07 (s, 3H), 1.06 (d, 6H) ppm	-
307	N-{4-[1-(1-Cyclopropylethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.40 (s, 1H), 8.22 (s, 1H), 8.16 (dd, 1H), 8.12 (s, 1H), 7.45-7.42 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.81 (dd, 1H), 3.71 (m, 1H), 2.73 (m, 1H), 1.58 (d, 3H), 1.32 (m, 1H), 1.05 (d, 6H), 0.63 (m, 1H), 0.50 (m, 1H), 0.42-0.38 (m, 2H) ppm	-
308	N-{4-[1-(3-Cyanbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.41 (s, 1H), 8.36 (s, 1H), 8.17 (dd, 1H), 8.13 (s, 1H), 7.88 (s, 1H), 7.82 (m, 1H), 7.69 (m, 1H), 7.62-7.58 (m, 1H), 7.43-7.41 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.81-6.79 (dd, 1H), 5.48 (s, 2H), 2.73 (m, 1H), 1.06 (d, 6H) ppm	-
309	N-{4-[1-(2-Cyanethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.42 (s, 1H), 8.26 (s, 1H), 8.18 (dd, 1H), 8.14 (s, 1H), 7.46-7.44 (m, 2H), 7.24-7.21 (m, 2H), 6.79 (dd, 1H), 4.48 (t, 2H), 3.17 (t, 2H), 2.73 (m, 1H), 1.07 (d, 6H) ppm	-
310	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.90 (s, 1H), 8.63 (s, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.55-7.53 (m, 2H), 7.28 (dd, 1H), 7.05-7.02 (m, 2H), 6.27 (dd, 1H), 4.62 (m, 1H), 1.57 (d, 6H) ppm	-
311	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.15 (s, 1H), 7.69 (s, 1H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.05-7.02 (m, 2H), 5.89 (s, 1H), 4.55 (m, 1H), 3.28 (m, 1H), 2.35 (m, 2H), 1.67 (m, 2H), 1.52 (d, 6H) ppm	-
312	N-{4-[1-(1-Cyanpropan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.54 (s, 1H, br), 8.12-8.10 (m, 2H), 7.50-7.47 (m, 2H), 7.13-7.10 (m, 2H), 7.13-7.7.10 (m, 1H), 6.87 (dd, 1H), 4.77-4.74 (m, 1H), 3.08-2.98 (m, 2H), 2.39 (q, 2H), 1.64 (d, 3H), 1.10 (t, 3H) ppm	-
313	N-{4-[1-(1-Cyanpropan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.71 (s, 1H, br), 8.17-8.10 (m, 1H), 7.99 (s, 1H), 7.50-7.48 (m, 2H), 7.13-7.7.10 (m, 1H), 6.96 (dd, 1H), 4.78-4.75 (m, 1H), 3.08-2.99 (m, 2H), (m, 1H), 2.27 (d, 2H), 1.64 (d, 3H), 1.14 (d, 2H) ppm	-
314	N-{4-[1-(1-Cyanpropan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.56 (s, 1H, br), 8.15-8.11 (m, 2H), 7.96 (s, 1H), 7.50-7.47 (m, 2H), 7.13-7.10 (m, 1H), 6.86 (dd, 1H), 4.76 (m, 2H), 3.08-2.99 (m, 2H), 2.65-2.60 (m, 1H), 2.27 (d, 2H), 1.64 (d, 3H), 1.19 (d, 1H), 0.56 (m, 6H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
315	N-{4-[1-(1-Cyanopropan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-cyclopropylacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.56 (s, 1H, br), 8.15-8.13 (m, 1H), 7.98 (s, 1H), 7.51-7.48 (m, 2H), 7.14-7.11 (m, 2H), 6.90 (dd, 1H), 5.29 (m, 1H), 4.78-4.75 (m, 1H), 3.09-3.00 (m, 2H), 2.27 (d, 2H), 1.65 (d, 3H), 1.12-1.05 (m, 1H), 0.56 (m, 2H), 0.22 (m, 2H) ppm	-
316	N-{4-[5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.58 (s, 1H, br), 8.09 (s, 1H), 7.42-7.40 (m, 2H), 7.08-7.05 (m, 2H), 6.89 (dd, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.50 (s, 1H), 2.39 (q, 2H), 1.11 (t, 2H) ppm	-
317	4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)pyridin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 7.92 (d, 1H), 7.86 (s, 1H), 7.49-7.44 (m, 2H), 7.10 (m, 2H), 6.53 (dd, 1H), 6.42 (m, 1H), 5.29 (m, 1H), 4.54 (d, 1H, br), 4.95-4.88 (m, 1H), 4.01 (d, 2H), 1.36-1.29 (m, 4H), 0.63 (m, 2H), 0.42 (m, 2H) ppm	-
318	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)pyridin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 7.92 (d, 1H), 7.48-7.46 (m, 1H), 7.13-7.10 (m, 2H), 6.52 (dd, 2H), 6.50 (dd, 1H), 6.41 (m, 1H), 5.28 (d, 1H, br), 4.90 (m, 1H), 4.54 (m, 1H), 1.50 (d, 6H), 1.31 (d, 3H) ppm	-
319	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)pyridin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 7.92 (d, 1H), 7.74 (s, 1H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.12-7.10 (m, 2H), 6.50 (dd, 1H), 6.40 (m, 1H), 5.30 (d, 1H, br), 4.91 (m, 1H), 3.89 (s, 3H), 1.30 (d, 2H) ppm	-
320	N-{4-[1-Cyclopropyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.52 (s, 1H, br), 8.11 (d, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.90 (s, 1H), 7.46-7.44 (m, 2H), 7.11-7.08 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 3.71 (m, 1H), 2.37 (q, 2H), 1.16-1.15 (m, 2H), 1.10 (t, 3H), 1.04-1.02 (m, 2H) ppm	-
321	N-{4-[1-Cyclopropyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.70 (s, 1H, br), 8.15 (d, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.92 (m, 2H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.12-7.08 (m, 2H), 6.94 (dd, 1H), 3.72 (m, 1H), 3.45 (s, 3H), 1.17-1.14 (m, 2H), 1.05-1.02 (m, 2H) ppm	-
322	N-{4-[1-Cyclopropyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.51 (s, 1H, br), 8.11 (d, 2H), 7.90 (s, 1H), 7.46-7.44 (m, 2H), 7.10-7.07 (m, 2H), 6.85 (dd, 1H), 3.71 (m, 1H), 2.61 (m, 1H), 1.17-1.13 (m, 8H), 1.05-1.02 (m, 2H) ppm	-
323	2-Cyclopropyl-N-{4-[1-cyclopropyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.53 (s, 1H, br), 8.12-8.10 (m, 2H), 7.90 (s, 1H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.11-7.07 (m, 2H), 6.88 (dd, 1H), 3.71 (m, 1H), 2.50 (d, 2H), 1.17-1.14 (m, 2H), 1.11-1.60 (m, 3H) 0.55 (m, 2H), 0.22 (m, 2H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
324	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl]-1H-pyrazol-4-yl]-N-[2,2,2-trifluor-1-(4-fluorophenyl)ethyl]pyridin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 7.90(d, 1H), 7.82 (s, 1H), 7.53-7.50 (m, 2H), 7.46-7.44 (m, 2H), 7.17-7.09 (m, 4H), 6.56-6.53 (m, 2H), 6.09-6.04 (m, 1H), 4.53(q, 1H), 1.51 (d, 6H) ppm	-
325	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl]-1H-pyrazol-4-yl]-N-(2,2,2-trifluor-1-phenylethyl)pyridin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 7.91(d, 1H), 7.82 (s, 1H), 7.50-7.38 (m, 7H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.54 (d, 2H), 6.09-6.01 (m, 2H), 4.53 (m, 1H), 1.51(d, 6H), ppm	-
326	N-{4-[1-(2-Ethoxyethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.52 (s, 1H, br), 8.11 (m, 2H), 7.87 (m, 1H), 7.90 (s, 1H), 7.48-7.43 (m, 2H), 7.12-7.08 (m, 2H), 6.74 (dd, 1H), 4.30 (t, 2H), 3.83 (t, 2H), 3.83 (t, 2H), 3.47 (q, 2H), 2.37 (q, 2H), 1.14-1.04 (t, 6H) ppm	-
327	N-{4-[1-(2-Ethoxyethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.70 (s, 1H, br), 8.15 (d, 1H), 8.09 (s, 1H), 7.90 (s, 1H), 7.48-7.46 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.94 (dd, 1H), 4.31 (t, 2H), 3.96 (s, 2H), 3.83 (t, 2H), 3.49 (q, 2H), 3.45 (s, 3H), 1.12 (t, 3H) ppm	-
328	N-{4-[1-(2-Ethoxyethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.51 (s, 1H, br), 8.11 (m, 2H), 7.88 (s, 1H), 7.48-7.45 (m, 2H), 7.11-7.09 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.30 (t, 2H), 3.83 (t, 2H), 3.49 (q, 2H), 1.14-1.10 (m, 10H) ppm	-
329	2-Cyclopropyl-N-{4-[1-(2-ethoxyethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.54 (s, 1H, br), 8.11 (m, 2H), 7.88 (s, 1H), 7.48-7.41 (m, 2H), 7.12-7.09 (m, 2H), 6.77 (dd, 1H), 4.30 (t, 2H), 4.07 (2H, isomer), 3.83 (t, 2H), 3.73 (2H, isomer), 3.49 (q, 2H), 3.32 (2H, isomer), 2.41 (d, 2H), 2.22 (2H, isomer), 1.13 (t, 3H), 1.07 (m, 1H), 0.54 (m, 2H), 0.21 (m, 2H) ppm	-
330	Methyl-6-(4-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)amino)-6-oxohexanoat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.18-8.16 (m, 2H), 8.08 (s, 1H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.77 (dd, 1H), 4.21 (q, 2H), 3.58 (s, 1H), 2.39-2.31 (m, 4H), 1.56-1.52 (m, 4H), 1.45 (t, 3H) ppm	-
331	Methyl-5-(4-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)amino)-5-oxopentanoat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.18-8.16 (m, 2H), 8.07 (s, 1H), 7.44-7.42 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.83 (dd, 1H), 4.21 (q, 2H), 3.59 (s, 1H), 2.41-2.39 (m, 2H), 2.33 (t, 2H), 1.82-1.77 (t, 3H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
332	Ethyl-3-ethyl-5-(4-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)amino)-5-oxopentanoat	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.18-8.16 (m, 2H), 8.07 (s, 1H), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.20-7.17 (m, 2H), 6.84 (dd, 1H), 4.21 (q, 2H), 4.03 (q, 2H), 2.33-2.19 (m, 4H), 1.45 (t, 3H), 1.34-1.29 (m, 2H), 1.16 (t, 3H), 0.84 (t, 3H) ppm	-
333	3-(Difluormethyl)-N-{4-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.67 (s, 1H, br), 8.23 (m, 2H), 8.14 (m, 1H), 7.46-7.43 (m, 2H), 7.23-7.20 (m, 2H), 6.89-6.88 (dd, 1H), 4.22 (q, 2H), 3.64 (s, 3H), 1.46 (t, 3H) ppm	-
334	2-(Difluormethyl)-N-{4-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}thiophen-3-carboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.28 (d, 1H), 8.24 (s, 1H), 8.22 (m, 1H), 8.13 (m, 1H), 7.55-7.54 (m, 1H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.24-7.21 (m, 2H), 6.94 (dd, 1H), 4.24 (q, 2H), 1.46 (t, 3H) ppm	-
335	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.27 (m, 2H), 8.08 (s, 1H), 7.47-7.44 (m, 2H), 7.24-7.21 (m, 2H), 7.00 (dd, 1H), 4.22 (q, 2H), 2.78 (s, 3H), 1.46 (t, 3H) ppm	-
336	3-(4-Chlorophenyl)-N-{4-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.17 (m, 2H), 8.06 (s, 1H, br), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.43-7.32 (m, 2H), 7.26 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.85 (dd, 1H), 4.21 (q, 2H), 2.87 (t, 2H), 2.64 (t, 2H), 1.45 (t, 3H) ppm	-
337	(1R,2R)-N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-phenylcyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.18-8.15 (m, 2H), 8.10 (s, 1H), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.32-7.28 (m, 2H), 7.23-7.15 (m, 5H), 6.82-6.81 (dd, 1H), 4.23-4.19 (q, 2H), 2.35 (m, 1H), 1.43 (t, 3H), 1.43 (m, 1H), 1.35 (m, 1H) ppm	-
338	2-Cyclopentyl-N-{4-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.18 (s, 1H), 8.16-8.15 (m, 1H), 8.07 (s, 1H), 7.43-7.41 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.83-6.82 (dd, 1H), 4.22-4.18 (m, 2H), 2.32 (d, 2H), 2.18 (m, 1H), 1.70 (m, 1H), 1.60 (m, 1H), 1.50 (m, 1H), 1.43 (t, 3H), 1.15 (m, 1H) ppm	-
339	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-methylbutanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.18-8.16 (m, 2H), 8.08 (s, 1H, br), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.84 (dd, 1H), 4.21 (m, 2H), 2.23 (d, 2H), 2.05-2.00 (m, 1H), 1.45 (t, 3H), 0.90 (d, 6H) ppm	-
340	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylbutanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.19-8.16 (m, 2H), 8.12 (s, 1H, br), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.22-7.18 (m, 2H), 6.82 (dd, 1H), 4.21 (m, 1H), 1.45 (t, 3H), 1.38-1.34 (m, 1H), 1.21 (m, 1H), 1.04 (d, 3H), 0.83 (t, 3H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
341	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylcyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.67 (m, 1H), 8.17-8.14 (m, 2H), 8.05 (s, 1H), 7.43-7.40 (m, 2H), 7.21-7.17 (m, 2H), 6.82-6.79 (dd, 1H), 4.22-4.18 (m, 2H), 1.72 (m, 1H), 1.45 (m, 2H), 1.20 (m, 1H), 1.07 (d, 3H), 0.90 (m, 1H), 0.60 (m, 1H) ppm	-
342	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.17 (m, 2H), 8.03(s, 1H, br), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.22-7.18 (m, 2H), 6.86 (dd, 1H), 4.21 (m, 1H), 4.21 (q, 2H), 2.05 (s, 3H), 1.45 (t, 3H) ppm	-
343	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-phenylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.16 (d, 1H), 8.13(s, 1H), 8.07 (s, 1H, br), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.29-7.26 (m, 2H), 7.23-7.17 (m, 5H), 6.82 (dd, 1H), 3.92 (s, 3H), 2.86 (t, 2H), 2.67 (t, 2H) ppm	-
344	4-Fluor-N-{4-[3-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}benzamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.27 (d, 1H), 8.19(s, 1H), 8.16 (s, 1H), 8.09-8.06 (m, 2H), 7.47-7.45 (m, 2H), 7.35-7.32 (m, 2H), 7.24-7.21 (m, 2H), 6.92 (dd, 1H), 3.94 (s, 3H) ppm	-
345	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-(2-methoxyethoxy)acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.20 (d, 1H), 8.19(s, 1H), 8.15 (s, 1H), 8.05 (s, 1H, br), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.22-7.20 (m, 2H), 6.90 (dd, 1H), 4.10 (s, 2H), 3.91 (s, 3H), 3.66-3.64 (m, 2H), 3.51-3.50 (m, 2H), 3.29 (s, 3H) ppm	-
346	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}benzamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.24 (m, 1H), 8.18(s, 2H), 8.00 (m, 2H), 7.60-7.58 (m, 1H), 7.52-7.45 (m, 4H), 7.23-7.21 (m, 2H), 6.92 (dd, 1H), 3.94 (s, 3H) ppm	-
347	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-methylbutanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.17 (m, 1H), 8.14 (s, 1H), 8.07 (s, 1H, br), 7.43-7.41 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.83 (dd, 1H), 3.92 (s, 3H), 2.23 (d, 2H), 2.05-2.00 (m, 1H) ppm	-
348	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylbutanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.16 (m, 1H), 8.14 (s, 1H), 8.11 (s, 1H), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.80 (dd, 1H), 3.92 (s, 3H), 1.59-1.55 (m, 1H), 1.38-1.35 (m, 1H), 1.23 (s, 1H, br), 1.04 (d, 3H), 0.84 (t, 3H) ppm	-
349	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclobutanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.27 (s, 1H), 8.15-8.11 (m, 3H), 7.43-7.41 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.80-6.78 (dd, 1H), 3.92 (s, 3H), 2.15 (m, 2H), 2.05 (m, 2H), 1.90 (m, 1H), 1.23 (m, 2H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
350	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.12 (d, 1H), 8.12 (s, 1H), 8.03 (s, 1H, br), 7.43-7.41 (m, 2H), 7.21-7.18 (m, 2H), 6.84 (dd, 1H), 3.92 (s, 3H), 2.05 (s, 3H) ppm	-
351	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}ethandiamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.42 (s, 1H, br), 8.28 (d, 1H), 8.24 (s, 1H), 8.12 (s, 1H, br), 7.99 (s, 1H, br), 7.47-7.43 (m, 2H), 7.23-7.20 (m, 2H), 7.05-7.04 (m, 1H), 4.22(q, 2H), 1.46 (t, 3H) ppm	-
352	(2S)-N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-hydroxypropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.56 (s, 1H), 8.21 (s, 1H), 8.19 (d, 1H), 8.07 (s, 1H, br), 7.45-7.42 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.90 (dd, 1H), 5.90 (d, 1H), 4.23-4.16(m, 3H), 1.45 (t, 3H), 1.28 (d, 3H) ppm	-
353	(2S)-N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-hydroxypropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 9.56 (s, 1H), 8.20 (d, 1H), 8.16 (s, 1H), 8.07 (s, 1H, br), 7.44-7.41 (m, 2H), 7.22-7.19 (m, 2H), 6.90 (dd, 1H), 4.18 (m, 1H), 3.92 (s, 1H), 1.45 (t, 3H), 1.28 (d, 3H) ppm	-
354	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2-methoxyacetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.15 (bs, 1H), 8.49 (d, 1H), 8.44 (s, 1H), 7.60 (m, 2H), 7.24 (t, 1H), 6.99 (d, 1H), 4.61 (m, 1H), 4.07 (s, 2H), 3.33 (s, 3H), 1.51 (d, 6H) ppm	-
355	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2-methylpropanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.33 (bs, 1H), 8.47 (d, 1H), 8.37 (s, 1H), 7.66 (m, 2H), 7.23 (t, 1H), 6.92 (d, 1H), 4.62 (m, 1H), 2.84 (m, 1H), 1.50 (d, 6H), 1.05 (d, 6H) ppm	-
356	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}cyclopropanecarboxamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.63 (s, 1H), 8.47 (d, 1H), 8.36 (s, 1H), 7.66 (m, 2H), 7.22 (t, 2H), 6.94 (d, 1H), 4.61 (m, 1H), 2.16 (m, 1H), 1.5 (d, 6H), 0.8 (m, 2H), 0.74 (m, 2H) ppm	-
357	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}acetamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.25 (d, 2H), 7.96 (s, 1H), 7.43 (m, 2H), 7.05 (t, 2H), 6.69 (d, 1H), 3.92 (d, 2H), 2.39 (s, 3H), 2.24 (m, 1H), 0.92 (d, 6H), ppm	-
358	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.26 (bs, 1H), 8.11 (d, 1H), 7.56 (m, 2H), 7.22 (t, 2H), 6.78 (d, 1H), 6.41 (bs, 1H), 4.34 (t, 2H), 4.01 (t, 2H, isomer), 3.76 (t, 2H), 3.65 (t, 2H, isomer), 3.28 (s, 3H), 3.12 (s, 3H, isomer), 1.06 (bs, 6H), 0.96 (bs, 6H, isomer) ppm	76/23
359	4-[1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.36 (bs, 1H), 8.12 (d, 1H), 7.56 (m, 2H), 7.23 (t, 2H), 6.80 (d, 1H), 6.40 (bs, 1H), 4.54 (t, 2H), 4.20 (t, 2H, isomer), 4.08 (t, 2H), 3.97 (t, 2H, isomer), 1.06 (bs, 6H), 0.95 (bs, 6H, isomer) ppm	70/30

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
360	4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, CDCl ₃): δ = 7.99 (d, 1H), 7.89 (s, 1H), 7.46 (m, 2H), 7.01 (t, 2H), 6.26 (d, 1H), 4.87 (bd, 1H), 4.19 (m, 1H), 4.03 (m, 1H), 1.79 (m, 2H), 1.49 (d, 3H), 1.15 (d, 6H), 0.83 (t, 3H) ppm	-
361	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.25 (bs, 1H), 7.55 (m, 2H), 7.21 (t, 2H), 6.76 (d, 1H), 6.38 (bs, 1H), 3.23 (s, 3H), 1.06 (bs, 6H) ppm	-
362	3-{3-(4-Fluorophenyl)-4-[2-(propan-2-ylamino)pyrimidin-4-yl]-1H-pyrazol-1-yl}propanonitril	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.38 (bs, 1H), 8.13 (d, 1H), 7.56 (m, 2H), 7.24 (t, 2H), 6.82 (d, 1H), 6.39 (bs, 1H), 4.48 (t, 2H), 3.75 (bs, 1H), 3.16 (t, 2H), 1.07 (bs, 6H) ppm	-
363	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(prop-2-in-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.34 (bs, 1H), 8.12 (d, 1H), 7.55 (m, 2H), 7.23 (t, 2H), 6.83 (d, 1H), 6.38 (bs, 1H), 5.14 (s, 2H), 3.59 (m, 1H), 1.07 (bs, 6H) ppm	-
364	4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.34 (bs, 1H), 8.12 (d, 1H), 7.55 (m, 2H), 7.24 (t, 2H), 6.84 (d, 1H), 6.46 (tt, 1H), 6.40 (bs, 1H), 4.73 (td, 2H), 3.85 (bs, 1H), 1.07 (bs, 6H) ppm	-
365	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}propanamid	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 10.30 (s, 1H), 8.45 (d, 1H), 8.34 (s, 1H), 7.62 (m, 2H), 7.24 (t, 2H), 6.91 (d, 1H), 4.03 (d, 2H), 2.41 (q, 2H), 2.28 (m, 1H), 0.99 (t, 3H), 0.91 (d, 6H) ppm	-
366	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.23 (s, 1H), 8.08 (d, 1H), 7.55 (m, 2H), 7.23 (t, 2H), 6.47 (s, 1H), 6.76 (d, 1H), 6.35 (d, 1H), 4.57 (m, 1H), 1.48 (d, 6H) ppm	-
367	4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.55 (d, 2H), 8.44 (d, 2H, isomer), 7.35 (m, 4H), 7.17 (m, 2H), 7.07 (dd, 2H, isomer), 6.47 (tt, 1H), 4.72 (td, 2H), 4.38 (td, 2H, isomer), 2.31 (s, 3H) ppm	66/23
368	4-[3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.53 (d, 2H), 8.41 (d, 2H, isomer), 7.33 (m, 4H), 7.15 (m, 4H), 7.03 (d, 2H, isomer), 3.96 (d, 2H), 3.74 (d, 2H, isomer), 2.28 (m, 4H), 0.94 (d, 6H), 0.72 (d, 6H, isomer) ppm	64/28
369	N-Benzyl-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.47 (bs, 1H), 8.18 (bs, 1H), 7.57 (m, 1H), 7.22 (m, 8H), 6.72 (bs, 1H), 4.58 (m, 1H), 4.32 (bs, 2H), 1.47 (d, 6H) ppm	-

Nr.	Name	NMR	Isomeren- verhältnis ^[1]
370	4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₆ -DMSO): δ = 8.29 (bs, 1H), 8.10 (d, 1H), 7.56 (m, 2H), 7.21 (t, 2H), 6.76 (d, 1H), 6.41 (bs, 1H), 4.21 (q, 2H), 3.90 (q, 2H, isomer), 3.68 (bs, 1H), 1.44 (t, 3H), 1.24 (t, 3H, isomer), 1.06 (bs, 6H), 0.95 (bs, 6H, isomer) ppm	-
371	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.06 (d, 1H), 7.97 (s, 1H), 7.54 (m, 2H), 7.08 (t, 2H), 6.33 (d, 1H), 4.95 (d, 1H), 4.55 (m, 1H), 4.11 (m, 1H), 1.58 (d, 6H), 1.22 (d, 6H), ppm	-
372	N-(1-Cyclopropylethyl)-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	¹ H-NMR (400 MHz, d ₃ -CD ₃ CN): δ = 8.08 (d, 1H), 7.95 (s, 1H), 7.54 (m, 2H), 7.11 (t, 2H), 6.36 (d, 1H), 5.25 (bs, 1H), 3.98 (d, 2H), 3.45 (m, 1H), 2.33 (m, 1H), 1.27 (d, 3H), 1.02 (d, 6H), 0.92 (m, 1H), 0.5 (m, 2H), 0.37 (m, 1H), 0.26 (m, 1H) ppm	-

¹ Das Isomerenverhältnis bezieht sich auf eine gegebenenfalls erhaltene Mischung verschiedener Pyrazolisomere (Das Hauptisomer ist das 1-substituierte-3-Aryl-1H-pyrazol, das Minderisomer ist das entsprechende 1-substituierte-5-Aryl-1H-pyrazol). Wenn kein Isomerenverhältnis angegeben wurde, liegt ausschliesslich das Hauptisomer vor.

Tabelle 3 - Massenspektroskopische / logP Daten der hergestellten Verbindungen des Typs [I-a] und [I-b]

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
1	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.63	296	-	-	-	C
2	4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.86	314	-	-	-	C
3	4-[1-(Butan-2-yl)-3-(2,6-difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.82	314	-	-	-	C
5	4-[3-(3-Chlorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin	3.27	313	-	-	-	C
6	4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-(2,2-dimethylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.79	328	-	-	-	C
7	4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.69	326	-	-	-	C
8	4-[1-Cyclobutyl-3-(2,6-difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.56	312	-	-	-	C
9	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.29	324	-	-	-	B
10	4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.54	300	-	-	-	C
11	4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-(2,2-dimethylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.84	328	-	-	-	C
12	4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.39	340	-	-	-	C
13	4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.62	314	-	-	-	C
14	4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.4	300	-	-	-	C
15	4-[1-Cyclobutyl-5-(2,6-difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.49	312	-	-	-	C

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
16	4-[1-Cyclopentyl-3-(2,6-difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.79	326	-	-	-	C
17	4-[1-Cyclopentyl-5-(2,6-difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.74	326	-	-	-	C
19	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.32	395	-	-	-	A
20	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyrrolol[2,3-b]pyridin	2.08	363	-	-	-	B
21	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.76	409	-	-	-	B
22	4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.72	326	-	-	-	C
23	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.64	411	-	-	-	B
24	4-[5-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.59	296	-	-	-	C
25	4-[5-(4-Fluorphenyl)-1-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.68	308	-	-	-	C
26	4-[3-(2,6-Difluorphenyl)-1-(tetrahydrofuran-2-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.16	342	-	-	-	C
27	4-[5-(2,6-Difluorphenyl)-1-(tetrahydrofuran-2-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.21	342	-	-	-	C
28	4-[3-(3-Chlorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.55	340	-	-	-	B
29	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-methylpyrimidin	2.53	339	-	-	-	B
30	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.11	308	-	-	-	C

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ⁺ 2	LogP _B ³	[M+H] _B ⁺ 2	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
31	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-methylpyridin	1.38	338	-	-	-	B
32	4-[3-(3-Chlorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin	2.46	379	-	-	-	B
33	4-[5-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.64	386	-	-	-	B
34	4-[3-(3-Chlorphenyl)-1-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin	3.5	325	-	-	-	C
36	4-(6-{1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyrimidin-4-yl)morpholin	2.1	460	-	-	-	B
37	4-[5-(4-Fluor-2-methylphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.40	338	-	-	-	B
38	4-[1-(Butan-2-yl)-5-(2,6-difluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.9	314	-	-	-	C
39	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	1.38	339	-	-	-	B
40	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.59	369	-	-	-	A
41	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2,2-dimethylpropanamid	3.19	423	-	-	-	B
42	4-{1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.84	374	-	-	-	B
43	4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.24	336	-	-	-	B
44	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]chinolin	2.24	332	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
45	4-[5-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.69	386	-	-	-	B
46	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	1.18	297	-	-	-	A
47	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-(prop-2-in-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin	3.63	359	-	-	80:20	B
48	2,2-Dimethyl-N-(4-{1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)propanamid	4.1	473	-	-	-	B
49	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-(prop-2-in-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin	3.47	401	-	-	-	B
50	4-{1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin	2.93	413	-	-	-	B
51	4-[5-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.57	359	-	-	-	B
52	4-{6-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-4-yl}morpholin	1.49	410	-	-	-	B
53	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-methylpyridin-2-carboxamid	2.74	339	-	-	-	A
54	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]chinolin	2.46	374	-	-	-	B
55	4-[5-(4-Fluor-3-methylphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.47	338	-	-	-	B
56	4-[5-(2,4-Difluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.35	342	-	-	-	B
57	4-[5-(4-tert-Butylphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.02	362	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
58	4-[1-tert-Butyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.62	296	-	-	-	C
59	4-[5-(4-Phenoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.88	398	-	-	-	B
60	3-[4-(Pyridin-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitril	1.23	331	-	-	-	B
61	2-Fluor-5-[4-(pyridin-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitril	1.45	349	-	-	-	B
62	4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidin	3.32	403	-	-	-	B
63	N-Ethyl-6-[3-(4-fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-4-amin	1.42	368	-	-	-	B
64	4-[5-(4-Fluor-2-methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.26	354	-	-	-	B
65	4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin	1.54	376	-	-	-	B
66	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin	1.69	364	-	-	-	B
67	4-[5-(3-Phenoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.88	398	-	-	-	B
68	4-{5-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	0.96	384	-	-	-	B
69	4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	1.31	351	-	-	-	B
70	4-[5-(4-Chlorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.52	340	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
71	4-{1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.78	390	-	-	-	B
72	N-{4-[5-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2,2-dimethylpropanamid	2.99	381	-	-	-	B
73	4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-methylpyridin	1.33	350	-	-	-	B
74	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfanyl)pyrimidin	3.58	371	-	-	-	B
75	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrimidin	3.58	391	-	-	-	B
76	4-[5-(2,3-Dichlorophenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.66	374	1.60	374	40:60	B
77	4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-methylpyrimidin	2.27	351	-	-	-	B
78	N-Ethyl-6-[3-(4-methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-4-amin	1.28	380	-	-	-	B
79	2-[3-(4-Fluorophenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-5-(trifluormethyl)pyridin	2.64	385	-	-	-	B
80	4-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin	1.87	375	-	-	-	B
81	1-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl}ethanon	3.85	405	-	-	-	B
82	2,2-Dimethyl-N-(4-{1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)propanamid	3.84	473	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
83	4-[3-(3-Chlorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-methylpyridin-2-carboxamid	3.15	397	-	-	-	B
84	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.50	367	-	-	-	A
85	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.15	353	-	-	-	A
86	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropanecarboxamid	2.07	365	-	-	-	B
87	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.89	381	-	-	-	B
88	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.11	298	1.05	298	70:30	A
89	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.16	282	-	-	-	B
90	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-methylpyridin-2-carboxamid	2.72	381	-	-	-	B
91	4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.5	296	-	-	-	A
92	4-[1-Cyclopentyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.65	308	1.65	308	85:15	A
92	4-[1-Cyclopentyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.65	308	1.65	308	80:20	A
93	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-carboxamid	2.46	367	-	-	-	B
94	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-phenylpyridin-2-carboxamid	4.34	443	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
95	4-[3-(3-Chlorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-carboxamid	2.93	383	-	-	-	B
96	4-[3-(3-Chlorphenyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-phenylpyridin-2-carboxamid	4.89	459	-	-	-	B
97	4-[5-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amin	1.25	297	-	-	-	B
98	4-{5-[2-(Benzoyloxy)phenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.64	412	-	-	-	B
99	8-[4-(Pyridin-4-yl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]chinolin	1.09	357	-	-	-	B
100	3-{[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}pyridin	0.78	331	-	-	-	B
101	4-{1-[1-(3-Chlorphenyl)ethyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	2.17	378	2.1	378	80:20	A
102	4-{1-[1-(2-Chlorphenyl)ethyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	2.16	378	2.13	378	91:9	A
103	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.41	322	1.33	322	91:9	A
104	4-[1-(2,3-Difluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.80	366	1.7	366	75:25	A
105	tert-Butyl-[3-(4-fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetat	1.67	354	1.59	354	78:22	A
106	Methyl-2-[3-(4-fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-methylbutanoat	1.67	354	1.6	354	93:7	A
107	Methyl-2-[3-(4-fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoat	1.20	326	-	-	-	A
108	4-[1-(2-Chlor-6-fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.90	382	1.82	382	87:13	A
109	4-{1-[4-(Difluormethoxy)benzyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.88	396	1.79	396	74:26	A
110	4-{1-[(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-3-(4-	1.54	371	-	-	-	A

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
111	fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin 4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-1H-pyrazol-4-yl}	2.90	392	-	-	-	A
112	4-[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-6-(trifluormethyl)pyrimidin	2.73	386	-	-	-	A
113	1-Cyclohexyl-2-[3-(4-fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon	1.86	364	1.76	364	80:20	A
114	1-Cyclopentyl-2-[3-(4-fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanon	1.63	350	1.54	350	75:25	A
115	2-{[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}pyridin	0.99	331	-	-	-	A
115	2-{[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}pyridin	1.08	331	0.97	331	75:25	A
116	4-{1-[2,2-Dichlorethyl]methyl}-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.76	362	1.68	362	75:25	A
117	4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.29	314	1.25	314	80:20	A
118	4-{1-[2-(3-Chlorphenyl)ethyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	2.04	378	1.9	378	70:30	A
119	4-{1-[2-(2-Chlorphenyl)ethyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	2.04	378	1.9	378	72:28	A
120	4-{1-[1-(4-Chlorphenyl)ethyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	2.18	378	2.12	378	80:20	A
121	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(pyridin-4-ylmethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	0.25	331	-	-	-	B
122	4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[2-(trifluormethoxy)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.66	352	1.59	352	88:12	A
122	4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[2-(trifluormethoxy)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.66	352	1.59	352	66:33	A

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
123	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.19	324	1.16	324	89:11	A
124	3-[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1,2-diol	0.17	314	-	-	-	A
125	4-[1-(Biphenyl-3-ylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.38	406	2.25	406	91:9	A
126	4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.33	294	-	-	-	A
127	4-[1-Benzyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.63	330	1.57	330	77:23	A
128	4-[1-(2-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.84	348	1.76	348	80:20	A
129	4-[1-(3-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.71	348	1.61	348	75:25	A
130	4-[1-(4-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.69	348	1.61	348	75:25	A
131	4-[1-(Biphenyl-4-ylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.39	406	2.3	406	95:5	A
132	Ethyl-3-[3-(4-fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoat	1.29	340	-	-	-	A
133	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl}-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.11	386	1.06	386	70:30	A
134	4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.04	342	-	-	-	A
134	4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.11	342	-	-	-	A
135	4-[1-(Biphenyl-2-ylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.34	406	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
136	2-{{3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl}methyl}benzonitril	1.49	355	-	-	-	A
137	4-{{3-(4-Fluorphenyl)-1-(naphthalen-1-yl)methyl}-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	2.12	380	1.99	380	84:16	A
138	4-{{3-(4-Fluorphenyl)-1-(3-phenoxybenzyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	2.36	422	-	-	-	A
139	4-[[1-(4-Fluor-3-phenoxybenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.40	440	-	-	-	A
140	3-{{3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl}methyl}benzonitril	1.50	355	-	-	-	A
140	3-{{3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl}methyl}benzonitril	1.51	355	1.38	355	60:40	A
141	4-{{3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl}methyl}benzonitril	1.48	355	-	-	-	A
141	4-{{3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl}methyl}benzonitril	1.50	355	1.38	355	70:30	A
142	3-{{3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl}dihydrofuran-2(3H)-on	0.95	324	-	-	-	A
143	4-{{3-(4-Fluorphenyl)-1-(1H-imidazol-2-yl)methyl}-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	0.41	320	-	-	-	B
144	1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-{{3-(4-fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl}ethanon	1.31	376	1.18	376	62:38	A
144	1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-{{3-(4-fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl}ethanon	1.30	376	-	-	-	A
145	2-{{3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl}ethylacetat	1.05	326	0.97	326	91:9	A
146	3-{{3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl}propanonitril	0.81	293	-	-	-	A
147	4-{{3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl}-1,3-dihydro-2H-pyrido[2,3-	2.6	351	-	-	-	C

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
	b]pyridin-2-on						
148	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-pyrido[2,3-b]pyridin-2-on	3.68	393	-	-	-	C
149	4-[5-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2-amin	2.37	352	-	-	-	C
150	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(prop-2-en-1-yl)pyrimidin-2-amin	2.46	352	-	-	-	C
153	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	1.61	369	-	-	-	B
154	2-Fluor-5-[1-(2-methylpropyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-yl]benzonitril	1.65	321	-	-	-	A
155	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.51	367	-	-	-	A
156	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclobutanecarboxamid	2.57	379	-	-	-	A
157	N-{4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.82	381	-	-	-	B
158	2-Cyclopropyl-N-{4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	3.03	393	-	-	-	B
159	N-{4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-cyclopropylacetamid	3	393	-	-	-	B
160	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-methylbutanamid	2.82	381	-	-	-	A
161	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	1.85	339	-	-	-	A

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
162	N-{4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.95	383	-	-	-	B
163	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.05	385	-	-	-	A
164	N-{4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.46	367	-	-	-	B
165	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid	2.6	379	-	-	-	B
166	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.96	383	-	-	-	B
167	N-{4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid	2.56	379	-	-	-	B
168	4-[1-Cyclohexyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.91	322	1.82	322	69:31	A
169	4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1	304	-	-	-	A
170	Ethyl-1-[3-(4-fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetat	1.31	326	-	-	-	B
171	4-[3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-1-(prop-2-in-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.51	292	2.33	292	62:19	C
172	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	1.37	298	-	-	-	A
173	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(prop-2-in-1-yl)pyrimidin-2-amin	1.44	294	-	-	-	A
174	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	2.39	354	-	-	-	C

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
175	3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-5-carbonitril	1.08	265	-	-	-	A
176	4-{1-[1-(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)ethyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin	1.82	385	-	-	-	B
177	4-[1-(1,3-Difluorpropan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.16	318	-	-	-	B
178	1-[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-methylbutan-2-on	1.37	324	-	-	-	A
179	4-[1-(2-Ethoxyethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.25	312	-	-	-	B
180	[3-(4-Fluorphenyl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetonitril	0.89	279	-	-	-	A
181	Propan-2-yl-{4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}carbamat	2.99	383	-	-	-	A
182	N-Benzyl-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	3.15	402	-	-	-	C
183	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(prop-2-in-1-yl)pyrimidin-2-amin	2.76	350	-	-	-	C
184	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	1.81	312	-	-	-	C
185	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2-methyl-N-(propan-2-yl)propanamid	4.25	424	-	-	-	C
186	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2,2,4-trimethyl-3-oxo-N-(propan-2-yl)pentanamid	3.02	494	-	-	-	A
187	1-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}pyrrolidin-2-on	3.19	379	-	-	-	C
188	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2-methyl-N-	4.74	452	-	-	-	C

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
189	(2-methylpropanoyl)propanamid N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.92	382	-	-	-	C
190	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-phenylacetamid	2.72	401	-	-	-	B
191	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-phenylacetamid	3.54	429	-	-	-	A
192	(2S)-N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-hydroxypropanamid	2.14	369	-	-	-	B
193	tert-Butyl-4-{3-(4-fluorphenyl)-4-[2-(propanoylamino)pyridin-4-yl]-1H-pyrazol-1-yl}piperidin-1-carboxylat	3.03	494	-	-	-	B
194	N-{4-[3-(4-Cyan-2,5-difluorphenyl)-5-(difluormethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid		0	-	-	-	B
195	N-{4-[3-(4-Chlor-2-fluorphenyl)-1-methyl-5-(methylsulfanyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.70	405	-	-	-	A
196	N-{4-[5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluor-2-hydroxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.12	407	-	-	-	A
197	N-{4-[3-(4-Chlor-2-fluorphenyl)-1-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	3.32	427	-	-	-	A
198	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	1.82	339	-	-	-	B
199	N-{4-[3-(4-Cyan-2,5-difluorphenyl)-5-(difluormethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.59	450	-	-	-	B
200	N-{4-[3-(4-Chlor-2-fluorphenyl)-1-methyl-5-	3.00	421	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
	(methylsulfanyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid						
201	N-{4-[5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluor-2-hydroxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.38	423	-	-	-	B
202	N-{4-[3-(4-Chlor-2-fluorphenyl)-1-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	3.45	443	-	-	-	B
203	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.20	355	-	-	-	A
204	tert-Butyl-4-[3-(4-fluorphenyl)-4-{2-[(methoxyacetyl)amino]pyridin-4-yl}-1H-pyrazol-1-yl]piperidin-1-carboxylat	3.51	510	-	-	-	A
205	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}benzamid	3.20	401	-	-	-	A
206	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}thiophen-2-carboxamid	3.14	407	-	-	-	A
207	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}thiophen-3-carboxamid	2.96	407	-	-	-	A
208	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-(2-methoxyethoxy)acetamid	2.62	413	-	-	-	A
209	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-hydroxy-2-methylpropanamid	2.42	383	-	-	-	A
210	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2,3-dihydroxypropanamid	1.76	385	-	-	-	A
211	1-Ethyl-3-{4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}harnstoff	2.02	368	-	-	-	A
212	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-	2.6	431	-	-	-	A

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
	1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-phenylacetamid						
213	N-{4-[1-(2-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.69	419	-	-	-	B
214	N-{4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.20	366	-	-	-	B
215	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	1.99	375	-	-	-	B
216	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.27	391	-	-	-	B
217	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid	2.07	388	-	-	-	B
218	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.29	389	-	-	-	B
219	N-{4-[1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.01	373	-	-	-	B
220	N-{4-[1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.36	389	-	-	-	B
221	N-{4-[1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid	2.10	385	-	-	-	B
222	N-{4-[1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.33	387	-	-	-	B
223	N-{4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.61	382	-	-	-	B
224	N-{4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-	2.29	377	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
	fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} cyclopropancarboxamid						
225	N-{4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.54	380	-	-	-	B
226	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yloxy)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} propanamid	2.58	369	-	-	-	A
227	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yloxy)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.58	298	-	-	-	A
228	3-(4-Fluorophenyl)-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.96	390	-	-	-	B
229	3-(3-Fluorophenyl)-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	3.13	390	-	-	-	B
230	N-{4-[3-(3-Cyan-4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} propanamid	2.67	392	-	-	-	B
231	1-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-ethylharnstoff	1.91	390	-	-	-	A
232	N-(4-{3-(4-Fluorophenyl)-1-[1-(2-fluorophenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)-2-methylpropanamid	3.41	447	-	-	-	B
233	3-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-1,1-dimethylharnstoff	1.60	368	-	-	-	A
234	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} propan-2-sulfonamid	3.96	425	-	-	-	B
235	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} thiophen-3-carboxamid	2.69	429	-	-	-	B
236	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} thiophen-2-	2.82	429	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
	carboxamid						
237	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}benzamid	2.90	423	-	-	-	B
238	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-methylbutanamid	2.63	403	-	-	-	B
239	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylbutanamid	2.62	403	-	-	-	B
240	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclobutanecarboxamid	2.42	401	-	-	-	B
241	Ethyl-4-[1-(2,2-difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}carbamat	2.45	391	-	-	-	B
242	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	1.74	361	-	-	-	B
243	N-{4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-hydroxy-2-methylpropanamid	2.18	405	-	-	-	B
244	N-(4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[1-(2-fluorphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)-2-methoxyacetamid	3.50	449	-	-	-	B
245	N-(4-{1-[(2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)-2-methoxyacetamid	3.22	449	-	-	-	B
246	N-{4-[3-(3-Cyan-4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.98	408	-	-	-	B
247	N-{4-[1-(2-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	3.09	435	-	-	-	B
248	N-(4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[1-(2-	3.03	433	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ⁺ 2	LogP _B ³	[M+H] _B ⁺ 2	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
	fluorphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)propanamid						
249	N-(4-{1-[(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)propanamid	2.80	433	-	-	-	B
250	2-Cyclopropyl-N-(4-{3-(4-fluorphenyl)-1-[1-(2-fluorphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)acetamid	3.54	459	-	-	-	B
251	2-Cyclopropyl-N-(4-{1-[(2,2-dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)acetamid	3.30	459	-	-	-	B
252	N-{4-[3-(3-Cyan-4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-cyclopropylacetamid	3.14	418	-	-	-	B
253	2-Cyclopropyl-N-{4-[1-(2-fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	3.17	445	-	-	-	B
254	N-(4-{1-[(2,2-Dichlorocyclopropyl)methyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)-2-methylpropanamid	3.17	447	-	-	-	B
255	N-{4-[3-(3-Cyan-4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	3.03	406	-	-	-	B
256	N-{4-[1-(2-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	3.03	433	-	-	-	B
257	N-{4-[5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluor-2-hydroxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.44	421	-	-	-	B
258	N-{4-[5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluor-2-hydroxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropanecarboxamid	2.22	419	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
259	N-(4-{3-(4-Fluorphenyl)-1-[1-(2-fluorphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)cyclopropancarboxamid	3.13	445	-	-	-	B
260	N-(4-{1-[(2,2-Dichlorethyl)methyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)cyclopropancarboxamid	2.67	445	-	-	-	B
261	N-{4-[3-(3-Cyan-4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid	2.77	404	-	-	-	B
262	N-{4-[1-(2-Fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid	2.77	431	-	-	-	B
263	Ethyl-(4-{3-(4-fluorphenyl)-1-[1-(2-fluorphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)carbamat	3.65	449	-	-	-	B
264	Ethyl-(4-{1-[(2,2-dichlorethyl)methyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)carbamat	3.37	451	-	-	-	B
265	Ethyl-(4-[3-(3-cyan-4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)carbamat	3.19	408	-	-	-	B
266	Ethyl-(4-[1-(2-fluorbenzyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)carbamat	3.24	435	-	-	-	B
267	Ethyl-(4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)carbamat	3.11	383	-	-	-	B
268	Ethyl-(4-[1-(butan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)carbamat	3.08	383	-	-	-	B
269	N-{4-[1-(Cyclopentyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclopropancarboxamid	3.35	407	-	-	-	A
270	N-{4-[1-(Cyclopentyl)-3-(4-fluorphenyl)-	3.65	409	-	-	-	A

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
	1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid						
271	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yloxy)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} cyclopropanecarboxamid	2.73	381	-	-	-	A
272	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yloxy)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	3.01	383	-	-	-	A
273	N-(Cyclopropylmethyl)-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	2.55	366	-	-	-	C
274	Methyl-2-{3-(4-fluorphenyl)-4-[2-(propionylamino)pyridin-4-yl]-1H-pyrazol-1-yl}-3-methylbutanoat	2.67	425	-	-	-	A
275	4-[1-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.02	326	-	-	-	A
276	N-{4-[1-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	1.99	411	-	-	-	A
277	Methyl-2-{3-(4-fluorphenyl)-4-[2-(isobutyrylamino)pyridin-4-yl]-1H-pyrazol-1-yl}-3-methylbutanoat	3.05	439	-	-	-	A
278	N-{4-[1-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl} propanamid	1.59	397	-	-	-	B
279	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(oxetan-3-yl)pyrimidin-2-amin	2.35	368	-	-	-	C
280	7-[3-(4-fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridine	1.82	322	-	-	-	C
281	N-Cyclopropyl-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	2.41	352	-	-	-	C

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ⁺ 2	LogP _B ³	[M+H] _B ⁺ 2	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
282	6-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-9H-purin	1.79	323	-	-	-	B
283	4-[3-(4-fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-2-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyridine	2.05	362	-	-	-	C
284	N-tert-Butyl-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	2.94	368	-	-	-	C
285	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(1-methoxypropan-2-yl)pyrimidin-2-amin	2.39	384	-	-	-	C
286	N-(Butan-2-yl)-4-[3-(4-fluorophenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	2.68	368	-	-	-	C
287	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(methylsulfonyl)pyrimidin	2.90	375	-	-	-	C
288	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl]-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidin	3.85	367	-	-	-	B
289	4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidin	3.45	365	-	-	-	B
290	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.14	353	-	-	-	B
291	2-Cyclopropyl-N-{4-[1-ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	2.29	365	-	-	-	B
292	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-propyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.15	353	-	-	-	B
293	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-propyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.58	369	-	-	-	B
294	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-propyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-	2.49	367	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
	methylpropanamid						
295	2-Cyclopropyl-N-{4-[3-(4-fluorophenyl)-1-propyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	2.66	379	-	-	-	B
296	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	1.56	325	-	-	-	B
297	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	1.89	341	-	-	-	B
298	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	1.83	339	-	-	-	B
299	2-Cyclopropyl-N-{4-[3-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	1.98	351	-	-	-	B
300	N-(4-{3-(4-Fluorophenyl)-1-[2-(methylsulfany)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)propanamid	2.12	385	-	-	-	B
301	N-{4-[1-(1-Cyclopropylethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.54	379	-	-	-	B
302	N-{4-[1-(3-Cyanbenzyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.38	426	-	-	-	B
303	N-{4-[1-(2-Cyanethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	1.63	364	-	-	-	B
304	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	4.07	421	-	-	-	B
305	4-[1-(1-Cyclopropylethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.59	308	-	-	-	B
306	N-(4-{3-(4-Fluorophenyl)-1-[2-(methylsulfany)ethyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridin-2-yl)-2-methylpropanamid	2.44	399	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
307	N-{4-[1-(1-Cyclopropylethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.90	393	-	-	-	B
308	N-{4-[1-(3-Cyanbenzyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.69	440	-	-	-	B
309	N-{4-[1-(2-Cyanethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	1.91	378	-	-	-	B
310	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin	1.61	322	-	-	-	B
311	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidin	1.29	338	-	-	-	B
312	N-{4-[1-(1-Cyanpropan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	1.87	378	-	-	-	B
313	N-{4-[1-(1-Cyanpropan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.17	394	-	-	-	B
314	N-{4-[1-(1-Cyanpropan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	1.29	392	-	-	-	B
315	N-{4-[1-(1-Cyanpropan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-cyclopropylacetamid	2.28	404	-	-	-	B
316	N-{4-[5-(Difluormethoxy)-3-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.33	391	-	-	-	B
317	4-[1-(Cyclopropylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)pyridin-2-amin	2.33	405	-	-	-	B
318	4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-	2.26	393	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
	4-y]]-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)pyridin-2-amin						
319	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)pyridin-2-amin	1.73	365	-	-	-	B
320	N-{4-[1-Cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	1.97	351	-	-	-	B
321	N-{4-[1-Cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.37	367	-	-	-	B
322	N-{4-[1-Cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.32	365	-	-	-	B
323	2-Cyclopropyl-N-{4-[1-cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	2.48	377	-	-	-	B
324	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-N-[2,2,2-trifluor-1-(4-fluorphenyl)ethyl]pyridin-2-amin	3.88	473	-	-	-	B
325	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]-N-(2,2,2-trifluor-1-phenylethyl)pyridin-2-amin	3.66	455	-	-	-	B
326	N-{4-[1-(2-Ethoxyethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	2.01	383	-	-	-	B
327	N-{4-[1-(2-Ethoxyethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.38	399	-	-	-	B
328	N-{4-[1-(2-Ethoxyethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.32	397	-	-	-	B
329	2-Cyclopropyl-N-{4-[1-(2-ethoxyethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	2.48	409	-	-	-	B

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
330	Methyl-6-(4-[1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)amino)-6-oxohexanoat	2.16	425	-	-	-	A
331	Methyl-5-(4-[1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)amino)-5-oxopentanoat	2.02	411	-	-	-	A
332	Ethyl-3-ethyl-5-(4-[1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl)amino)-5-oxopentanoat	2.90	453	-	-	-	A
333	3-(Difluormethyl)-N-{4-[1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxamid	2.47	441	-	-	-	A
334	2-(Difluormethyl)-N-{4-[1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}thiophen-3-carboxamid	3.27	443	-	-	-	A
335	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxamid	2.72	409	-	-	-	A
336	3-(4-Chlorphenyl)-N-{4-[1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}propanamid	3.32	449	-	-	-	A
337	(1R,2R)-N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}phenylcyclopropanecarboxamid	3.06	427	-	-	-	A
338	2-Cyclopentyl-N-{4-[1-ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	3.87	393	-	-	-	A
339	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-methylbutanamid	3.47	367	-	-	-	A
340	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylbutanamid	2.42	367	-	-	-	A
341	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-	2.16	365	-	-	-	A

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
	methylcyclopropancarboxamid						
342	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	1.57	325	-	-	-	A
343	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-phenylpropanamid	2.54	401	-	-	-	A
344	4-Fluor-N-{4-[3-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}benzamid	2.61	391	-	-	-	A
345	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-(2-methoxyethoxy)acetamid	1.96	385	-	-	-	A
346	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}benzamid	2.42	373	-	-	-	A
347	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-3-methylbutanamid	2.12	353	-	-	-	A
348	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-methylbutanamid	2.14	353	-	-	-	A
349	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}cyclobutanecarboxamid	1.93	351	-	-	-	A
350	N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}acetamid	1.32	311	-	-	-	A
351	N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}ethandiamid	1.99	354	-	-	-	A
352	(2S)-N-{4-[1-Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-hydroxypropanamid	1.83	354	-	-	-	A
353	(2S)-N-{4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-yl}-2-hydroxypropanamid	1.57	341	-	-	-	A

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
354	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2-methoxyacetamid	2.37	370	-	-	-	C
355	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}-2-methylpropanamid	2.55	368	-	-	-	C
356	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl} cyclopropancarboxamid	2.49	366	-	-	-	C
357	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl} acetamid	2.44	354	-	-	-	C
358	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	1.79	356	1.76	356	76:23	C
359	4-[1-(2-Chlorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	2.05	360	2.01	360	70:30	C
360	4-[1-(Butan-2-yl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	2.41	354	-	-	-	C
361	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	1.65	312	-	-	-	C
362	3-{3-(4-Fluorphenyl)-4-[2-(propan-2-ylamino)pyrimidin-4-yl]-1H-pyrazol-1-yl}propanonitril	1.74	351	-	-	-	C
363	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(prop-2-in-1-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	1.99	336	-	-	-	C
364	4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	2.05	362	-	-	-	C
365	N-{4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl}propanamid	2.70	368	-	-	-	C

Nr.	Name	LogP _A ¹	[M+H] _A ^{+ 2}	LogP _B ³	[M+H] _B ^{+ 2}	Isomerenverhältnis ⁴	Methode ⁵
366	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	1.54	298	-	-	-	C
367	4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(4-fluorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	1.49	318	1.43	318	66:23	C
368	4-[3-(4-Fluorphenyl)-5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin	2.07	310	1.98	310	64:28	C
369	N-Benzyl-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	3.31	388	-	-	-	C
370	4-[1-Ethyl-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	1.91	326	-	-	-	C
371	4-[3-(4-Fluorphenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-N-(propan-2-yl)pyrimidin-2-amin	2.92	340	-	-	-	C
372	N-(1-Cyclopropylethyl)-4-[3-(4-fluorphenyl)-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amin	2.73	380	-	-	-	C

¹ Bei dem angegebenen logP Wert handelt es sich um den Wert der benannten reinen Verbindung bzw. bei Vorliegen einer Mischung auf das Hauptisomer (1-substituiertes-3-Aryl-1H-pyrazol).

² Bei der angegebenen Masse handelt es sich um den Peak des Isotopenmusters des [M+H]⁺ Ions mit der höchsten Intensität; falls das [M-H]⁻ Ion detektiert wurde, ist die Massenangabe mit 6 gekennzeichnet.

³ Bei einem angegebenen logP Wert handelt es sich um den Wert des in einer Isomerenmischung (bezogen auf die Pyrazolsubstitution) vorliegenden Minderisomers (1-substituiertes-5-Aryl-1H-pyrazol)

⁴ Das Isomerenverhältnis bezieht sich auf eine gegebenenfalls erhaltene Mischung verschiedener Pyrazolisomere (Das Hauptisomer ist das 1-substituierte-3-Aryl-1H-pyrazol, das Minderisomer ist das entsprechende 1-substituierte-5-Aryl-1H-pyrazol). Wenn kein Isomerenverhältnis angegeben wurde, liegt ausschliesslich das Hauptisomer vor. Das Isomerenverhältnis bezieht sich auf die Fläche des UV-Chromatogramms (bei einer Wellenlänge von 210nm) des mit der Methode A, B oder C gemessenen LC-MS Spektrums.

⁵ Bei der Bestimmung der logP Werte wurden die unten beschriebenen Methoden angewendet.

⁶ Bei der angegebenen Masse handelt es sich um den Peak des Isotopenmusters des [M-H]⁻ Ions mit der höchsten Intensität.

Methode A Anmerkung zur Bestimmung der logP-Werte und Massendetektion: Die Bestimmung der angegebenen logP-Werte erfolgte gemäß EEC-Direktive 79/831 Annex V.A8 durch HPLC (High Performance Liquid Chromatography) an einer Phasenumkehrsäule (C18). Agilent 1100 LC-System; 50*4,6 Zorbax Eclipse Plus C18 1,8 microm; Eluent A: Acetonitril (0,1 % Ameisensäure); Eluent B: Wasser (0,09 % Ameisensäure); linearer Gradient von 10 % Acetonitril bis 95 % Acetonitril in 4,25 min, dann 95% Acetonitril für weitere 1,25 min; Ofentemperatur 55 °C; Fluß:2,0 mL/min. Die Massendetektion erfolgt über ein Agilent MSD-System.

Methode B Anmerkung zur Bestimmung der logP-Werte und Massendetektion: Die Bestimmung der angegebenen logP-Werte erfolgte gemäß EEC-Direktive 79/831 Annex V.A8 durch HPLC (High Performance Liquid Chromatography) an einer Phasenumkehrsäule (C18). HP1100; 50*4,6 Zorbax Eclipse Plus C18 1,8 microm; Eluent A: Acetonitril (0,1 % Ameisensäure); Eluent B: Wasser (0,08 % Ameisensäure); linearer Gradient von 5 % Acetonitril bis 95 % Acetonitril in 1,70 min, dann 95 % Acetonitril für weitere 1,00 min; Ofentemperatur 55°C; Fluß:2,0 mL/min. Die Massendetektion erfolgt über den Massendetektor Micromass ZQ2000 der Firma Waters.

Methode C Anmerkung zur Bestimmung der logP-Werte und Massendetektion: Die Bestimmung der angegebenen logP-Werte erfolgte gemäß EEC-Direktive 79/831 Annex V.A8 durch UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) an einer Phasenumkehrsäule (C18). HP1100; 50*2,1 Zorbax Eclipse Plus C18 1,8 microm; Eluent A: Acetonitril (0,09 % Ameisensäure); Eluent B: Wasser (0,1 % Ameisensäure); linearer Gradient von 10 % A bis 95 % A in 3,25 min; Ofentemperatur 40°C; Fluß:0,8 mL/min. Die Massendetektion erfolgt über den Massendetektor LCT Premier oder SQD der Firma Waters.

Die Eichung erfolgt mit unverzweigten Alkan-2-onen (mit 3 bis 16 Kohlenstoffatomen), deren logP-Werte bekannt sind (Bestimmung der logP-Werte anhand der Retentionszeiten durch lineare Interpolation zwischen zwei aufeinanderfolgenden Alkanonen).

Die lambda-max-Werte wurden an Hand der UV-Spektren von 200 nm bis 400 nm in den Maxima der chromatographischen Signale ermittelt.

Anwendungsbeispiele**Beispiel A: In vivo Test an *Peronospora parasitica* (Falscher Mehltau an Weißkohl):**

Eine wässrige Suspension des aktiven Wirkstoffes wurde durch Homogenisierung einer Mischung aus Aceton/Tween (Dispergenz)/Dimethylsulfoxid (DMSO) und anschließender Verdünnung mit Wasser auf die gewünschte Konzentration hergestellt. Kohlpflanzen (Sorte Eminence) werden in Aufzuchtsschalen auf ein Torferde-Puzzolanerde-Substrat (50/50) bei 18-20°C ausgesät und im Keimblattstadium mit der oben beschriebenen wässrigen Suspension besprüht. Als Kontrolle werden Pflanzen mit einer wässrigen Lösung ohne Wirkstoff besprüht. Nach 24 Stunden werden die Pflanzen durch Besprühen mit einer wässrigen Suspension von *Peronospora parasitica* Sporen (50 000 Sporen pro ml) inokuliert. Die Sporen stammen von infizierten Pflanzen. Die inokulierten Kohlpflanzen werden 5 Tage bei ca. 20°C in feuchter Atmosphäre inkubiert. Nach 5 Tagen wird im Vergleich mit den Kontrollpflanzen bonitiert. Unter diesen Bedingungen wird bei einer Dosis von 500 ppm eine gute (70% Wirkungsgrade) oder vollständige Inhibition für folgende Verbindungen beobachtet:

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	100	44	78	122	93
2	85	46	94	123	83
3	97	81	89	126	89
6	70	84	100	127	78
10	85	85	100	129	78
15	75	86	100	133	89
19	100	88	83	134	94
21	100	91	89	136	94
22	97	102	70	137	72
23	100	103	100	140	78
28	97	106	100	141	89
32	79	113	73	150	100
33	93	116	97	171	91
40	98	117	93		
41	72	120	85		

Beispiel B: In vivo Test an *Botrytis cinerea* (Grauschimmel an Gurken):

Eine wässrige Suspension des aktiven Wirkstoffes wurde durch Homogenisierung einer Mischung aus Aceton/Tween/Dimethylsulfoxid und anschließender Verdünnung mit Wasser auf die gewünschte Konzentration hergestellt. Gurkenpflanzen (Sorte Vert petit de Paris) werden in Aufzuchtsschalen auf ein Torferde-Puzzolanerde-Substrat (50/50) bei 18-20°C ausgesät und im Keimblattstadium Z11 mit der oben beschriebenen wässrigen Suspension besprüht. Als Kontrolle werden Pflanzen mit einer wässrigen Lösung ohne Wirkstoff besprüht. Nach 24 Stunden werden die

Pflanzen durch tropfenweise Beauftragung einer wäßrigen Suspension von *Botrytis cinerea* Sporen (150 000 Sporen pro ml) auf die Blattoberfläche inokuliert. Die Sporen stammen von einer 15 Tage alten Kultur, die in folgender Nährlösung suspendiert werden:

- 20 g/l Gelatine
- 5 - 50 g/l D-Fruktose
- 2 g/l NH_4NO_3
- 1 g/l KH_2PO_4

Die inokulierten Gurkenpflanzen werden 5-7 Tage in einer Klimakammer bei 15-11°C (Tag/Nacht) und 80%iger Luftfeuchtigkeit gehalten. Nach 5-7 Tagen wird im Vergleich mit den Kontrollpflanzen bonitiert. Unter diesen Bedingungen wird bei einer Dosis von 500 ppm eine gute (70% Wirkungsgrade) oder vollständige Inhibition für folgende Verbindungen beobachtet:

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungsgrad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungsgrad
1	100	40	100
2	74	44	71
8	94	84	100
10	73	85	100
13	100	86	100
14	100	171	71
17	83		

Beispiel C: In vivo Test an *Alternaria brassicae* (Dürrfleckenkrankheit an Radieschen):

- 15 Eine wässrige Suspension des aktiven Wirkstoffes wurde durch Homogenisierung einer Mischung aus Aceton/Tween/Dimethylsulfoxid und anschließender Verdünnung mit Wasser auf die gewünschte Konzentration hergestellt. Radieschenpflanzen (Sorte Pernot) werden in Aufzuchtsschalen auf ein Torferde-Puzzolanerde-Substrat (50/50) bei 18-20°C ausgesät und im Keimblattstadium mit der oben beschriebenen wäßrigen Suspension besprüht. Als Kontrolle werden Pflanzen mit einer
- 20 wäßrigen Lösung ohne Wirkstoff besprüht. Nach 24 Stunden werden die Pflanzen durch Besprühen mit einer wäßrigen Suspension von *Alternaria brassicae* Sporen (40 000 Sporen pro ml) inokuliert. Die Sporen stammen von einer 12 bis 13 Tage alten Kultur. Die inokulierten Radieschenpflanzen werden 6-7 Tage bei ca. 18°C in feuchter Atmosphäre inkubiert. Nach 6-7 Tagen wird im Vergleich mit den Kontrollpflanzen bonitiert. Unter diesen Bedingungen wird bei einer Dosis von 500 ppm eine
- 25 gute (70% Wirkungsgrade) oder vollständige Inhibition für folgende Verbindungen beobachtet:

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	94
2	77
3	88
10	85
84	75
86	75

Beispiel D: In vivo Test an *Sphaerotheca fuliginea* (Echter Mehltau an Gurke):

Eine wässrige Suspension des aktiven Wirkstoffes wurde durch Homogenisierung einer Mischung aus Aceton/Tween/Dimethylsulfoxid und anschließender Verdünnung mit Wasser auf die gewünschte Konzentration hergestellt. Gurkenpflanzen (Sorte Vert petit de Paris) werden in Aufzuchtschalen auf ein Torferde-Puzzolanerde-Substrat (50/50) bei 20/23°C ausgesät und im Keimblattstadium Z10 mit der oben beschriebenen wässrigen Suspension besprüht. Als Kontrolle werden Pflanzen mit einer wässrigen Lösung ohne Wirkstoff besprüht. Nach 24 Stunden werden die Pflanzen durch Besprühen mit einer wässrigen Suspension von *Sphaerotheca fuliginea* Sporen (100 000 Sporen pro ml) inokuliert. Die Sporen stammen von einer kontaminierten Pflanze. Die inokulierten Gurkenpflanzen werden bei ca. 20/25°C unter einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60/70% inkubiert. Nach 12 Tagen wird im Vergleich mit den Kontrollpflanzen bonitiert. Unter diesen Bedingungen wird bei einer Dosis von 500 ppm eine gute (70% Wirkungsgrade) oder vollständige Inhibition für folgende Verbindungen beobachtet:

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	100	41	98	114	79
2	93	44	98	116	89
3	93	46	81	117	93
6	95	53	98	122	99
9	75	81	77	123	86
10	80	84	100	126	85
11	93	85	100	127	85
12	95	86	100	129	92
13	90	88	86	132	82
14	80	91	88	133	95
15	87	92	93	133	91
17	80	102	71	134	85

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
22	71	103	100	136	91
24	88	105	82	138	77
26	80	106	100	141	77
27	73	107	91	150	96
33	71	108	82	171	100
37	78	110	79		
40	100	113	82		

Beispiel E: In vivo Test an *Pyrenophora teres* (Gersten Netzfleckenkrankheit):

Eine wässrige Suspension des aktiven Wirkstoffes wurde durch Homogenisierung einer Mischung aus Aceton/Tween/Dimethylsulfoxid und anschließender Verdünnung mit Wasser auf die gewünschte Konzentration hergestellt. Gerstenpflanzen (Sorte Plaisant) werden in Aufzuchtsschalen auf ein Torferde-Puzzolanerde-Substrat (50/50) bei 12°C ausgesät und im Erstblattstadium (10 cm groß) mit der oben beschriebenen wäßrigen Suspension besprüht. Als Kontrolle werden Pflanzen mit einer wäßrigen Lösung ohne Wirkstoff besprüht. Nach 24 Stunden werden die Pflanzen durch Besprühen mit einer wäßrigen Suspension von *Pyrenophora teres* Sporen (12 000 Sporen pro ml) inokuliert. Die Sporen stammen von einer 12 Tage alten Kultur. Die inokulierten Gerstenpflanzen werden erst für 24 Stunden bei ca. 20°C und 100% relativer Luftfeuchtigkeit und anschließend für 12 Tage bei 80% relativer Luftfeuchtigkeit inkubiert. Nach 12 Tagen wird im Vergleich mit den Kontrollpflanzen bonitiert. Unter diesen Bedingungen wird bei einer Dosis von 500 ppm eine gute (70% Wirkungsgrade) oder vollständige Inhibition für folgende Verbindungen beobachtet:

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	96	85	75
7	73	86	81
19	83	136	71
21	73	140	71
24	92	150	86

Beispiel F: In vivo Test an *Puccinia recondita* (Braunrost des Weizen):

Eine wässrige Suspension des aktiven Wirkstoffes wurde durch Homogenisierung einer Mischung aus Aceton/Tween/Dimethylsulfoxid und anschließender Verdünnung mit Wasser auf die gewünschte Konzentration hergestellt. Weizenpflanzen (Sorte Scipion) werden in Aufzuchtsschalen

auf ein Torferde-Puzzolanerde-Substrat (50/50) bei 12°C ausgesät und im Erstblattstadium (10 cm groß) mit der oben beschriebenen wäßrigen Suspension besprüht. Als Kontrolle werden Pflanzen mit einer wäßrigen Lösung ohne Wirkstoff besprüht. Nach 24 Stunden werden die Pflanzen durch Besprühen mit einer wäßrigen Suspension von *Puccinia recondita* Sporen (100 000 Sporen pro ml) inokuliert. Die Sporen stammen von einer 10 Tage alten infizierten Weizenkultur und werden in Wasser mit 2.5 ml/l Tween suspendiert. Die inokulierten Weizenpflanzen werden erst für 24 Stunden bei 20°C und 100% relativer Luftfeuchtigkeit und anschließend für 10 Tage bei 20°C und 70% relativer Luftfeuchtigkeit inkubiert. Nach 10 Tagen wird im Vergleich mit den Kontrollpflanzen bonitiert. Unter diesen Bedingungen wird bei einer Dosis von 500 ppm eine gute (70% Wirkungsgrade) oder vollständige Inhibition für folgende Verbindungen beobachtet:

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	89	84	78	126	75
40	86	91	94	171	94
44	71	93	83		

Beispiel G: In vivo Test an *Mycosphaerella graminicola* (Weizen-Blattfleckenkrankheit):

Eine wässrige Suspension des aktiven Wirkstoffes wurde durch Homogenisierung einer Mischung aus Aceton/Tween/Dimethylsulfoxid und anschließender Verdünnung mit Wasser auf die gewünschte Konzentration hergestellt. Weizenpflanzen (Sorte Scipion) werden in Aufzuchtsschalen auf ein Torferde-Puzzolanerde-Substrat (50/50) bei 12°C ausgesät und im Erstblattstadium (10 cm groß) mit der oben beschriebenen wäßrigen Suspension besprüht. Als Kontrolle werden Pflanzen mit einer wäßrigen Lösung ohne Wirkstoff besprüht. Nach 24 Stunden werden die Pflanzen durch Besprühen mit einer wäßrigen Suspension von *Mycosphaerella graminicola* Sporen (500 000 Sporen pro ml) inokuliert. Die Sporen stammen von einer 7 Tage alten Kultur. Die inokulierten Weizenpflanzen werden erst für 72 Stunden bei 18°C und 100% relativer Luftfeuchtigkeit und anschließend für 21 bis 28 Tage bei 90% relativer Luftfeuchtigkeit inkubiert. Nach 21 bis 28 Tagen wird im Vergleich mit den Kontrollpflanzen bonitiert. Unter diesen Bedingungen wird bei einer Dosis von 500 ppm eine gute (70% Wirkungsgrade) oder vollständige Inhibition für folgende Verbindungen beobachtet:

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
2	98	16	97	81	97
3	95	17	88	84	98
6	85	26	88	86	94
8	92	27	97	92	75
10	95	40	81	103	75
12	77	44	81	122	88
13	95	47	77	132	86
14	88	53	91	171	93
15	97	72	83		

Beispiel H: In vivo Test an *Pyricularia grisea* (Fleckenkrankheit an Reis):

Eine wässrige Suspension des aktiven Wirkstoffes wurde durch Homogenisierung einer Mischung aus Aceton/Tween/Dimethylsulfoxid und anschließender Verdünnung mit Wasser auf die gewünschte Konzentration hergestellt. Reispflanzen (Sorte Koshihikari) werden in Aufzuchtsschalen auf ein Torferde-Puzzolanerde-Substrat (50/50) bei 25°C ausgesät und im Zweitblattstadium (13 bis 15 cm groß) mit der oben beschriebenen wässrigen Suspension besprüht. Als Kontrolle werden Pflanzen mit einer wässrigen Aceton/Tween/DMSO Lösung ohne Wirkstoff besprüht. Nach 24 Stunden werden die Pflanzen durch Besprühen mit einer wässrigen Suspension von *Pyricularia grisea* Sporen (30 000 Sporen pro ml) inokuliert. Die Sporen stammen von einer 17 Tage alten Kultur und werden in Wasser, welches 2.5g/l Gelatine enthält, suspendiert. Die inokulierten Reispflanzen werden erst für 3 Tage bei ca. 25°C und 100% relativer Luftfeuchtigkeit und anschließend 3 Tage bei 25°C und 80% relativer Luftfeuchtigkeit tagsüber und 20% relativer Luftfeuchtigkeit bei Nacht inkubiert. Nach 6 Tagen wird im Vergleich mit den Kontrollpflanzen bonitiert. Unter diesen Bedingungen wird bei einer Dosis von 500 ppm eine gute (70% Wirkungsgrade) oder vollständige Inhibition für folgende Verbindungen beobachtet:

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungsgrad
1	82
91	75
148	71

Beispiel I: Produktion von Fumonisins FB1 durch *Fusarium proliferatum*

Die Verbindungen wurden in Mikrotiter-Platten in einem Fumonisin induzierenden Flüssig-Medium (0.5g Malzextrakt, 1g Hefeextrakt, 1g Bactopeptone, 20 g Fruktose, 1g KH_2PO_4 , 0.3g $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 0.3g KCl, 0.05g $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ und 0.01g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ pro Liter) mit DMSO (0,5 %) getestet. Die Inokulation erfolgte mit einer konzentrierten Sporen-Suspension von *Fusarium proliferatum* bei einer Endkonzentration von 2000 Sporen/ml.

Die Platte wurde bei hoher Luftfeuchtigkeit 5 Tage lang bei 20 °C inkubiert.

Zu Beginn und nach 5 Tagen wurde eine OD-Messung bei OD620 (mehrfache Messung: 3 x 3 Messungen pro Loch) zur Berechnung der Wachstumshemmung vorgenommen.

Nach 5 Tagen wurde eine Probe des flüssigen Mediums entnommen und 1:1000 in 50 %igem Acetonitril verdünnt. Die Konzentration von FB1 der verdünnten Proben wurden mittels HPLC-MS/MS analysiert und die Meßwerte zur Berechnung der Hemmung der Fumonisin FB1 Produktion im Vergleich zu einer wirkstofffreien Kontrolle genutzt.

15

HPLC-MS/MS wurde mit den folgenden Parametern durchgeführt:

Ionisierungs-Art: ESI positive

Ionen-Spray Spannung: 5500V

Spraygas-Temperatur: 500°C

20 Dekluster-Potential: 114 V

Kollisions-Energie: 51eV

Kollisions-Gas: N_2

NMR Spur: 722,3 > 352,3; dwell time 100ms

25 HPLC Säule: Waters Atlantis T3 (trifunktionelle C18 Bindung, verschlossen)

Partikelgröße: 3µm

Säulenmaße: 50 x 2 mm

Temperatur: 40°C

Lösungsmittel A: Wasser+0.1% HCOOH (v/v)

30 Lösungsmittel B: Acetonitril+0.1% HCOOH (v/v)

Durchfluß: 400 µL/Minute

Injektionsvolumen: 5 µL

Gradient:

Time [min]	A%	B%
0	90	10

Time [min]	A%	B%
2	5	95
4	5	95
4.1	90	10
9	90	10

Beispiele für die Hemmung von Fumonisin FB1 Produktion

- Die unten aufgeführten Beispiele zeigten eine > 80 %ige Hemmung der Fumonisin FB1 Produktion bei einer Konzentration von 50 μ M. Die Hemmung des Wachstums von *Fusarium proliferatum* der genannten Beispiele variierte von 0 bis 99 % bei 50 μ M.

Bsp. Verbindung Nr.	% Inhibition der FB1 produktion bei 50 μ M	% Inhibition des Pilzwachstums bei 50 μ M
19	100	68
20	100	65
21	100	55
23	100	73
29	82	34
33	99	99
40	100	98
41	100	56
44	100	33
47	98	0
50	89	8
53	96	0
54	100	47
58	89	42
59	95	0
60	100	92
66	85	40
70	92	0
84	100	88
85	100	95
86	100	96
87	100	83
146	100	41
153	100	48
155	100	97
156	100	93
163	100	72
164	100	97
165	100	90
166	100	98
189	90	0
191	96	1
193	85	0

Bsp. Verbindung Nr.	% Inhibition der FB1 produktion bei 50 μ M	% Inhibition des Pilzwachstums bei 50 μ M
195	100	17
196	100	25
198	100	99
200	99	1
203	100	99
213	100	56
214	100	96
215	100	94
216	100	97
217	100	97
218	100	79
219	100	97
220	100	99
221	100	99
222	100	96
223	100	96
224	100	99
225	100	93
5	100	79
9	96	40

Beispiel J: Produktion von DON/Acetyl-DON durch *Fusarium graminearum*

Die Verbindungen wurden in Mikrotiter-Platten in einem DON induzierenden Flüssig-Medium (1g (NH₄)₂HPO₄, 0.2g MgSO₄·7H₂O, 3g KH₂PO₄, 10g Glycerin, 5g NaCl and 40g Saccharose pro Liter) und DMSO (0,5 %) getestet. Die Inokulation erfolgte mit einer konzentrierten Sporen-Suspension von *Fusarium graminearum* bei einer Endkonzentration von 2000 Sporen/ml.

Die Platte wurde bei hoher Luftfeuchtigkeit 7 Tage lang bei 28 °C inkubiert.

Zu Beginn und nach 3 Tagen wurde eine OD-Messung bei OD₆₂₀ (mehrfache Messung: 3 x 3 Messungen pro Loch) zur Berechnung der Wachstumshemmung vorgenommen.

Nach 7 Tagen wurden 1 Volumen einer 84/16 Acetonitril/Wasser –Mischung hinzugefügt und aus jedem Loch wurde anschließend eine Probe des flüssigen Mediums entnommen und 1:100 in 10 %igem Acetonitril verdünnt. Die Anteile von DON und Acetyl-DON der Proben wurden mittels HPLC-MS/MS analysiert und die Meßwerte wurden zur Berechnung der Hemmung der DON/AcDON Produktion im Vergleich zu einer wirkstofffreien Kontrolle genutzt.

Die HPLC-MS/MS-Messungen wurden mit folgenden Parametern durchgeführt:

Ionisierungs-Art: ESI negativ

Ionen-Spray Spannung: - 4500 V

- 242 -

Spraygas-Temperatur: 500°C

Dekuster-Potential: - 40 V

Kollisions-Energie: -22eV

Kollisions-Gas: N₂

5 NMR Spur: 355,0 >264,9;

HPLC Säule: Waters Atlantis T3 (trifunktionelle C18 Bindung, verschlossen)

Partikelgröße: 3µm

Säulenmaße: 50 x 2 mm

10 Temperatur: 40°C

Lösungsmittel A: Wasser/2.5mM NH₄OAc+0.05% CH₃COOH (v/v)Lösungsmittel B: Methanol/2.5mM NH₄OAc+0.05% CH₃COOH (v/v)

Durchfluß: 400 µL/Minute

Injektionsvolumen: 11 µL

15 Gradient:

Time [min]	A%	B%
0	100	0
0.75	100	0
1.5	5	95
4	5	95
5	100	0
10	100	0

Beispiele für DON-Hemmung

- 20 Die unten aufgeführten Beispiele zeigten eine >=80%ige Hemmung der DON/AcDON Produktion bei 50 µM. Die Hemmung des Wachstums von *Fusarium graminearum* der genannten Beispiele variierte von 0 bis 100% bei 50 µM.

Bsp. Verbindung Nr.	% Inhibition der DON/AcDON produktion bei 50 µM	% Inhibition des Pilzwachstums bei 50 µM
5	100	97
20	87	21
37	80	13
40	100	100
54	85	31
84	99	92
85	99	100
86	98	94
87	100	97

Bsp. Verbindung Nr.	% Inhibition der DON/AcDON produktion bei 50 μM	% Inhibition des Pilzwachstums bei 50 μM
142	89	0
146	100	97
150	99	97
153	100	56
154	93	0
155	100	97
156	81	99
157	100	100
159	99	102
160	100	100
161	100	104
162	99	99
163	100	100
164	99	100
165	100	64
166	100	84
167	99	100
169	100	101
183	99	65
195	80	0
198	100	100
203	100	100
206	99	75
207	100	75
208	100	101
210	100	85
211	99	16
213	100	0
214	93	100
219	100	97
220	99	100
221	100	100
222	82	99
223	97	99
224	92	100
225	89	92
226	100	85
227	100	100
229	97	0
230	97	0
232	80	0
233	100	100
245	99	95
246	99	88
247	99	96
252	99	0
254	99	16
255	96	0
257	94	0

Bsp. Verbindung Nr.	% Inhibition der DON/AcDON produktion bei 50 μ M	% Inhibition des Pilzwachstums bei 50 μ M
258	98	79
260	99	5
261	99	39
262	99	35
264	99	17
265	98	9
267	97	59
268	90	32
271	99	71
272	99	33
326	100	107
327	100	105
328	100	101
329	100	104

Beispiel K: Produktion von Aflatoxinen durch *Aspergillus parasiticus*

- Die Verbindungen wurden in Mikrotiter-Platten (schwarze 96-Loch Platten mit flachem und transparentem Boden) in einem Aflatoxin induzierenden Flüssigmedium (20g Saccharose, 4g Hefeextrakt, 1g KH_2PO_4 und 0.5g $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ pro Liter) versetzt mit 20mM Cavasol (Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin) und 1 % DMSO getestet. Die Inokulation erfolgte mit einer konzentrierten Sporensuspension von *Aspergillus parasiticus* bei einer Endkonzentration von 1000 Sporen/ml.
- Die Platte wurde bei hoher Luftfeuchtigkeit 7 Tage bei 20 °C inkubiert.

- Nach 7 Tagen wurde eine OD-Messung bei OD₆₂₀ (mehrfache Messung: 4 x 4 Messungen pro Loch) zur Berechnung der Wachstumshemmung vorgenommen. Zur gleichen Zeit wurde über den Boden der Platte eine Fluoreszenzmessung mit Em_{360nm} und Ex_{426nm} (mehrfache Messung: 3 x 3 Messungen pro Loch) zur Berechnung der Hemmung der Aflatoxin Produktion im Vergleich zu einer wirkstofffreien Kontrolle vorgenommen.

Beispiele für Hemmung der Aflatoxin Produktion

Die unten aufgeführten Beispiele zeigten eine >80%ige Hemmung der Aflatoxin Produktion bei 50 μ M. Die Wachstumshemmung von *Aspergillus parasiticus* bei 50 μ M bei diesen Beispielen lag ebenfalls bei > 80%

Bsp Verbindung Nr.	% Inhibition der Aflatoxin produktion bei 50 μ M	% Inhibition des Pilzwachstums bei 50 μ M
40	99	88
84	100	98
85	100	98
86	100	97
87	100	97
146	100	99
155	100	100
203	100	100

Beispiel L: In vivo Test an *Sphaerotheca fuliginea* (echter Mehltau an Gurke / protektiv):

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile N, N - Dimethylformamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

5

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Gurkenpflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von *Sphaerotheca fuliginea* inokuliert. Anschließend werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 70 % relativer Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 23°C aufgestellt.

15

7 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, daß kein Befall beobachtet wird.

- 20 In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen der nachfolgenden Formeln bei einer Konzentration an Wirkstoff von 500ppm einen Wirkungsgrad von 70 % oder mehr.

Tabelle

Sphaerotheca-Test (Gurke) / protektiv

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
5	70	217	100	299	84
9	90	218	100	298	100
31	70	219	100	297	90
29	70	220	97	296	84
15	95	221	100	295	94
11	73	222	100	294	98
85	100	223	91	293	94
86	100	224	99	292	95
84	100	225	100	291	95
89	88	165	86	290	100
136	73	226	95	371	94
91	100	228	75	369	88
126	95	229	94	368	94
150	93	232	93	367	84
122	95	233	95	366	94
92	94	236	86	307	100
116	93	237	88	306	94
104	70	238	100	301	95
103	100	239	95	300	90
146	95	240	96	309	100
87	100	242	97	303	95
171	100	243	95	312	100
174	100	245	88	313	98
169	89	162	99	314	100
178	75	249	92	315	95
179	74	250	84	316	75
156	94	251	96	320	94
181	85	253	92	320	89
183	94	158	97	320	95
184	95	159	97	322	95
192	85	254	92	323	86
198	99	256	92	326	94
155	95	157	100	328	100
203	95	258	80	329	94
166	97	260	95	331	94
163	93	167	100	335	74
161	100	267	98	337	88
160	100	268	100	338	91
205	100	271	79	339	95
206	94	272	94	340	95
207	100	286	89	341	100
208	100	285	89	342	94
209	100	284	91	346	95
210	100	283	78	347	95
211	93	281	94	348	95
212	96	280	93	349	95
213	74	279	100	350	94
164	100	278	89	351	80
214	100	277	94	352	73

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
215	100	276	99		
216	89	274	94		

Beispiel M: In vivo Test an *Alternaria solani* (Blattfleckenkrankheit, Tomate / protektiv):

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile N, N - Dimethylformamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpoliglykolether

5

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Tomatenpflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von *Alternaria solani* inokuliert und stehen dann 24h bei 100% rel. Feuchte und 22°C. Anschließend stehen die Pflanzen bei 96% rel. Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 20°C.

15

7 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

- 20 In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen der nachfolgenden Formeln bei einer Konzentration an Wirkstoff von 500ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Beispiel

Alternaria-Test (Tomate) / protektiv

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
30	90	164	95	298	80
25	90	214	95	297	100
5	90	215	94	296	100
9	89	216	95	295	100
81	95	218	95	294	100
29	78	220	95	293	100

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
2	100	222	90	292	100
15	95	223	90	291	100
11	80	224	70	290	100
72	95	225	95	371	95
85	100	165	95	370	95
84	95	226	95	369	90
89	89	227	95	310	95
136	95	228	70	368	95
135	78	229	95	367	95
134	100	231	95	366	80
91	95	232	95	365	80
126	95	233	90	307	100
150	95	235	94	306	95
122	95	236	94	305	100
92	90	237	100	302	95
116	95	238	94	301	95
113	89	239	100	300	80
108	80	240	88	309	100
106	95	241	94	364	95
104	90	242	88	363	90
103	90	243	100	303	100
102	95	244	94	362	80
146	100	245	94	361	70
144	94	247	94	312	100
142	94	162	94	313	95
170	78	248	94	314	100
87	95	249	94	315	95
153	90	250	94	316	100
171	95	251	94	317	70
173	94	253	94	318	80
174	100	158	94	319	90
176	100	159	94	320	95
178	94	254	94	321	70
179	100	256	94	322	95
156	94	157	94	323	95
181	94	257	94	326	95
183	100	258	95	327	95
184	95	259	90	328	95
189	95	260	90	329	95
192	100	262	95	332	90
193	93	267	95	337	95
195	80	268	80	338	80
196	100	269	89	339	95
198	93	271	89	340	95
155	100	272	94	341	95
200	93	273	90	342	95
203	93	286	90	347	95
166	95	285	95	348	95
163	93	284	100	349	80

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
161	95	283	95	350	95
160	95	282	70	351	95
205	95	281	95	352	95
206	90	280	95	353	80
207	90	279	70	164	95
208	80	278	95	214	95
209	95	277	100	215	94
210	80	276	95	216	95
211	70	275	90	218	95
212	95	274	95	220	95
213	90	299	100	298	80
297	100	296	100	295	100
294	100	293	100		

Beispiel N: In vivo Test an *Plasmopara viticola* (falscher Mehltau, Rebe / protektiv):

Lösungsmittel : 24,5 Gewichtsteile Aceton

 24,5 Gewichtsteile Dimethylacetamid

5 Emulgator : 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge besprüht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit einer wäßrigen Sporensuspension von *Plasmopara viticola* inokuliert und verbleiben dann 1 Tag in einer Inkubationskabine bei ca. 20°C und 100% relativer Luftfeuchtigkeit. Anschließend werden die Pflanzen 4 Tage im Gewächshaus bei ca. 21°C und ca. 90% Luftfeuchtigkeit aufgestellt. Die Pflanzen werden dann angefeuchtet und 1 Tag in eine Inkubationskabine gestellt.

15 6 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0% ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100% bedeutet, daß kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 100ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	100	169	96	219	95
40	72	183	86	225	90
85	94	192	94	236	76
86	84	198	92	237	84
84	98	161	95	238	88
89	73	160	79	239	88
126	81	207	71	240	90
92	73	212	83	260	70
174	70	214	88		

Beispiel O: In vivo Test an *Venturia inaequalis* (Apfelschorf / protektiv):

Lösungsmittel : 24,5 Gewichtsteile Aceton

 24,5 Gewichtsteile Dimethylacetamid

5 Emulgator : 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge besprüht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit einer wäßrigen Konidiensuspension des Apfelschorferregers *Venturia inaequalis* inokuliert und verbleiben dann 1 Tag bei ca. 20°C und 100% relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubations-kabine.

Die Pflanzen werden dann im Gewächshaus bei ca. 21°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 90% aufgestellt.

15 10 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0% ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100% bedeutet, daß kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 100ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	99	160	94	236	94
40	97	205	91	237	95
85	88	206	83	238	98
86	96	207	86	239	98
84	100	208	78	240	96
89	100	209	89	242	89
126	98	210	78	243	98
92	93	211	92	162	96
87	95	212	85	249	96
174	100	164	97	251	84
169	99	214	88	159	97
179	100	215	96	254	73
180	96	217	98	157	94
156	91	218	95	260	94
183	73	219	96	167	89
184	92	220	96	268	98
189	84	221	91	271	81
192	95	222	95	272	89
198	96	224	71		
161	95	225	96		

Beispiel P: In vivo Test an *Botrytis cinerea* (Grauschimmel an Bohne / protektiv):

Lösungsmittel : 24,5 Gewichtsteile Aceton

 24,5 Gewichtsteile Dimethylacetamid

5 Emulgator : 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge besprüht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden auf jedes Blatt 2 kleine mit *Botrytis cinerea* bewachsene Agarstückchen aufgelegt. Die inokulierten Pflanzen werden in einer abgedunkelten Kammer bei ca. 20°C und 100% relativer Luftfeuchtigkeit aufgestellt.

15 2 Tage nach der Inokulation wird die Größe der Befallsflecken auf den Blättern ausgewertet. Dabei bedeutet 0% ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100% bedeutet, daß kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die nachfolgenden erfindungsgemäßen Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	99	155	99	224	99
40	100	161	100	225	96
85	100	160	100	225	93
86	100	205	100	236	100
84	99	206	100	237	100
89	100	207	100	238	93
126	100	208	100	240	99
92	100	209	100	242	99
87	100	210	98	243	75
171	84	211	100	162	100
174	80	212	98	249	100
169	100	213	91	251	95
179	100	214	100	159	98
180	93	215	98	157	78
156	98	217	95	260	100
183	93	218	98	167	100
184	100	219	100	268	100
189	93	220	100	271	93
192	100	221	100	272	100
198	99	222	85		

Beispiel Q: In vivo Test an *Leptosphaeria nodorum* (Spelzenbräune an Weizen / protektiv):

- 5 Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile *N,N*-Dimethylacetamid
 Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser
 10 auf die gewünschte Konzentration.

Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge.

- 15 Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit Sporen einer Sporensuspension von *Leptosphaeria nodorum* besprüht. Die Pflanzen verbleiben 48 Stunden bei 20°C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine.

Die Pflanzen werden in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von ca. 22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 80 % aufgestellt.

8 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen nachfolgenden Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 1000 ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	100	174	93	164	93
85	100	169	100	214	71
86	100	184	88	215	71
84	100	192	86	218	93
89	83	198	100	225	86
87	88	212	71	167	92

Beispiel R: In vivo Test an *Septoria tritici* (Blattfleckenkrankheit (Schwarzfleckigkeit) an Weizen / protektiv):

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile *N,N*-Dimethylacetamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge besprüht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit einer Sporensuspension von *Septoria tritici* besprüht. Die Pflanzen verbleiben 48 Stunden bei 20°C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine. Danach werden die Pflanzen für weitere 60 Stunden unter eine Klarsichthaube bei 15°C und 100% relativer Luftfeuchte gestellt.

Die Pflanzen werden in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von ca. 15°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % aufgestellt.

21 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0% ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100% bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

5

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen nachfolgenden Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 1000 ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	100	169	100	215	94
85	100	184	100	218	100
86	100	192	100	224	100
84	100	198	100	225	100
89	100	212	71	240	75
87	100	164	100	159	100
174	90	214	100	157	100

10 **Beispiel S:** In vivo Test an *Rhynchosporium secalis* (Blattfleckenkrankheit an Gerste / protektiv):

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile *N,N*-Dimethylacetamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolglykolether

15 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge.

20 Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit Sporen mit einer Sporensuspension von *Rhynchosporium secalis* besprüht. Die Pflanzen verbleiben 48 Stunden bei 20°C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine.

25 Die Pflanzen werden in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 80 % aufgestellt.

14 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

- 5 In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen nachfolgenden Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 1000 ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
86	86	184	71	214	100
84	90	192	71	215	90
87	88	198	90	218	100
169	100	164	100	225	90

Beispiel T: In vivo Test an *Fusarium nivale* (var.majus) (Taubährigkeit/ Weissährigkeit an Weizen / protektiv):

- 10 Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile *N,N*-Dimethylacetamid
Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 15

Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge.

Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit Sporen einer Sporensuspension von *Fusarium nivale* (var.majus) besprüht.

- 20

Die Pflanzen werden in einer Gewächshauskammer unter eine lichtdurchlässige Inkubationshaube bei 10°C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit gestellt.

- 25 5 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen nachfolgenden Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 1000 ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	92	192	100	225	100
85	100	198	100	238	75
86	100	212	75	240	75
84	100	164	100	159	75
89	92	214	100	157	88
87	92	215	100	167	100
169	71	218	92		
184	100	224	100		

- 5 **Beispiel T:** In vivo Test an *Fusarium graminearum* (Taubährigkeit/Weissährigkeit an Gerste / protektiv):

Lösungsmittel: 49 Gewichtsteile *N,N*-Dimethylacetamid

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolglykolether

- 10 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

- 15 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge.

Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit Sporen einer Sporensuspension von *Fusarium graminearum* besprüht.

- 20 Die Pflanzen werden in einer Gewächshauskammer unter eine lichtdurchlässige Inkubationshaube bei 22°C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit gestellt.

- 25 5 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen nachfolgenden Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 1000 ppm einen Wirkungsgrad von 70% oder mehr.

Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad	Bsp. Verbindung Nr.	% Wirkungs- grad
1	100	218	100	87	100
85	100	224	100	169	100
86	100	225	100	184	100
84	100	238	92	192	100
89	100	251	83	198	100
164	100	159	100	155	88
214	100	157	100		
215	100	167	100		

5 **Beispiel U:** In vivo Test an *Pythium ultimum* (Wurzelfäule/Umfallkrankheit an Baumwolle / Saatgutbehandlung):

Der Test wurde unter Gewächshaus-Bedingungen durchgeführt.

- 10 Baumwollsaamen, behandelt mit einer erfindungsgemäßen aktiven Verbindung bzw. einer Kombination von erfindungsgemäßen aktiven Verbindungen wurden in 6*6cm grosse Gefäße, in ein Gemisch aus gedämpfter Felderde und Sand (1:1), ausgesät. Die Testverbindung/en wurden in N-methyl-2-pyrrolidon gelöst und mit Wasser auf die gewünschte Konzentration verdünnt. Die Pflanzen wurden bei 10°C angezogen.

- 15 Perlite wurde mit Mycelium von *Pythium ultimum* inokuliert. 1mL des infizierten Perlites wurde zwischen den behandelten Baumwollsaamen verteilt. Die Samen wurden mit einer Deckschicht aus Tongranulat bedeckt und im Gewächshaus für 7 Tage bei 20°C und 80% relativer Luftfeuchtigkeit inkubiert.

Die Auswertung erfolgte durch Auszählung des Auflaufs. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der unbehandelten Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass alle Samen gekeimt sind.

- 20 In diesem Test zeigten folgende Verbindungen eine Effizienz von 70% und höher bei einer Dosis von 50 g/dt der aktiven erfindungsgemäßen Verbindung.

Bsp-Verbindung Nr.	% Wirkungsgrad
198	88

Beispiel V: In vivo Test an *Pyricularia oryzae* (Reisbräune / protektiv):

Lösungsmittel: 28,5 Gew.-Teile Aceton

Emulgator: 1,5 Gew.-Teil Alkylarylpolglykolether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser und der angegebenen Menge Emulgator auf die gewünschte Konzentration.

- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Reispflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer wässrigen Sporensuspension von *Pyricularia oryzae* inokuliert. Anschließend werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit und 25°C aufgestellt.

- 15 5 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen nachfolgenden Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250ppm einen Wirkungsgrad von 80% oder mehr.

20

Bsp Nr	% Wirkungsgrad
1	80
4	80
30	80
40	95
84	85
85	80
86	93
102	93
104	80
108	85
113	90
116	80
122	85
136	80
198	85
217	85
221	92

Beispiel W: In vivo Test an *Rhizoctonia solani* (Stängelfäule an Reis / protektiv):

Lösungsmittel: 28,5 Gew.-Teile Aceton

Emulgator: 1,5 Gew.-Teil Alkylarylpolglykolether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser und der angegebenen Menge Emulgator auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Reispflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit Hyphen von *Rhizoctonia solani* inokuliert. Anschließend werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit und 25°C aufgestellt.

4 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall
15 beobachtet wird.

In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen nachfolgenden Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250ppm einen Wirkungsgrad von 80% oder mehr.

Bsp Nr	% Wirkungsgrad
1	100
4	100
30	95
84	100
85	97
86	100
89	92
101	95
102	98
104	95
108	92
113	93
116	97
120	93
122	97

Bsp Nr	% Wirkungsgrad
136	97
169	100
174	93
176	97
198	88
217	100
221	100

Beispiel X: In vivo Test an *Cochliobolus miyabeanus* (Braunfleckigkeit, Reis / protektiv):

Lösungsmittel: 28,5 Gew.-Teile Aceton

Emulgator: 1,5 Gew.-Teil Alkylarylpolglykolether

5

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man I Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser und der angegebenen Menge Emulgator auf die gewünschte Konzentration.

- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit bespritzt man Junge Reispflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer wässrigen Sporensuspension von *Cochliobolus miyabeanus* inokuliert. Anschließend werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit und 25°C aufgestellt.

15

4 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

- 20 In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen nachfolgenden Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250ppm einen Wirkungsgrad von 80% oder mehr.

Bsp Nr	% Wirkungsgrad
1	85
40	85
84	93
85	90
86	80

Bsp Nr	% Wirkungsgrad
89	85
104	80
108	80
116	94
122	90
198	90
217	85
221	80

Beispiel Y: In vivo Test an *Gibberella zeae* (Weißfährigkeit an Reis / protektiv):

Lösungsmittel: 28,5 Gew.-Teile Aceton

Emulgator: 1,5 Gew.-Teil Alkylarylpolglykolether

5

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser und der angegebenen Menge Emulgator auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Reispflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer wässrigen Sporensuspension von *Gibberella zeae* inokuliert. Anschließend werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit und 25°C aufgestellt.

15 5 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

20 In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen nachfolgenden Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250ppm einen Wirkungsgrad von 80% oder mehr.

Bsp Nr	% Wirkungsgrad
198	80

Beispiel Z: In vivo Test an *Phakopsora pachyrhizi* (Sojabohnenrost / protektiv):

Lösungsmittel: 28,5 Gew.-Teile Aceton

Emulgator: 1,5 Gew.-Teil Alkylarylpolyglykoether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit der angegebenen Menge Lösungsmittel und verdünnt das Konzentrat mit Wasser und der
5 angegebenen Menge Emulgator auf die gewünschte Konzentration.

Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit bespritzt man junge Reispflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit einer wässrigen Sporensuspension von *Phakopsora pachyrhizi* inokuliert. Anschließend
10 werden die Pflanzen in einem Gewächshaus bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit und 20°C aufgestellt.

11 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, während ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird.

15


In diesem Test zeigen die erfindungsgemäßen nachfolgenden Verbindungen bei einer Konzentration an Wirkstoff von 250ppm einen Wirkungsgrad von 80% oder mehr.

Bsp Nr	% Wirkungsgrad
1	91
84	98

20

Patentansprüche

1. Verbindungen der Formel [I-a],

**[I-a]**

in welcher die Symbole folgende Bedeutungen haben:

- 5 X^1 steht für C-H oder N,
- R^1 steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^7 substituiertes Phenyl, Naphthalenyl, Chinolin-5-yl, Chinolin-8-yl, Isochinolin-5-yl, Isochinolin-8-yl, 1-Benzothiophen-4-yl, 1-Benzothiophen-7-yl, 1-Benzofuran-4-yl, 1-Benzofuran-7-yl, 1,3-Benzodioxol-4-yl oder 1,3-Benzodioxol-5-yl,
- 10 R^2 steht für Cyano, Nitro, Halogen, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Halogenalkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_3 - C_6 -Halogenocycloalkyl, C_1 - C_6 -Halogenalkoxy, C_1 - C_6 -Alkylthio C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder Wasserstoff,
- 15 R^3 steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Hydroxy, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, Halogenalkoxy, Phenyl, Phenoxy substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl- C_1 - C_6 -alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyloxy, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Alkoxy- C_1 - C_6 -alkyl, Acyloxy- C_1 - C_6 -alkyl, Heteroaryl- C_1 - C_6 -alkyl, Aryl- C_1 - C_6 -alkyl, C_1 - C_6 -Alkylthio- C_1 - C_6 -alkyl, C_1 - C_4 -Alkyl-C(O)- C_1 - C_6 -alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl-C(O)- C_1 - C_4 -alkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl-C(O)- C_1 - C_4 -alkyl, C_1 - C_4 -Alkyl-C(O)O- C_1 - C_6 -alkyl, C_1 - C_4 -Alkyl-C(O)O- C_3 - C_6 -cycloalkyl, C_1 - C_4 -Alkyl-C(O)O-heterocyclyl, Heterocyclyl- C_1 - C_6 -alkyl, Heterocyclyl, OxoHeterocyclyl oder Heteroaryl,
- 20 R^4 steht für Wasserstoff, Halogen, Cyano, $-C(O)OR^{12}$, $-SR^{12}$, $-NR^{12}R^{13}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$ oder $-NR^{12}R^{14}$, $-N=C=NR^{22}$, $-N=C(H)OR^{22}$, $-N=C(OR^{22})R^{23}$, $-N=C(SR^{22})R^{23}$, $-C(=NR^{22})NR^{22}R^{23}$, $-SO(=NR^{22})R^{23}$, $-SO_2R^{20}$
- 25

- oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_6 - C_{14} -Aryl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -Heteroaryl,
- 5 R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, -OH, -SH,
- oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_6 - C_{14} -Aryl, -O-(C_1 - C_4 -Alkyl), -O-(C_6 - C_{14} -Aryl), -S-(C_1 - C_4 -Alkyl), -S(O)-(C_1 - C_6 -Alkyl) oder -C(O)-(C_1 - C_6 -Alkyl)
- 10 oder bilden außerdem gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Sauerstoff, Cyano oder C_1 - C_4 -Alkyl substituierten Cyclus mit 3 bis 8 Ringatomen, wobei der Cyclus 1 bis 4 Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel oder -NR¹⁹ enthalten kann,
- 15 R^7 steht unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, -OH, -SH,
- oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl oder -O-(C_1 - C_4 -Alkyl) substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, 20 C_2 - C_6 -Alkynyl, Tri(C_1 - C_4 -alkyl)silyl, C_6 - C_{14} -Aryl, -O-(C_1 - C_4 -Alkyl), -O-(C_6 - C_{14} -Aryl), -S-(C_1 - C_4 -Alkyl), -S(O)-(C_1 - C_6 -Alkyl) oder -S(O)₂-(C_1 - C_6 -Alkyl),
- R^{11} steht für -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, -NH-C(O)R²⁰, -NR²⁰R²¹, -C(O)R²⁰, -C(O)OR²⁰, -C(O)NR²⁰R²¹, -SO₂R²⁰
- 25 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Carbonyl, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl oder -O-(C_1 - C_4 -Alkyl) substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_1 - C_{11} -Heteroalkyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, -O-(C_1 - C_4 -Alkyl), -S-(C_1 - C_4 -Alkyl), -O-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl), -S-(C_3 - C_8 -Cycloalkyl), C_6 - C_{14} -Aryl, -O-(C_6 - C_{14} -Aryl), -S-(C_6 - C_{14} -Aryl), C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl,

- R^{12} und R^{13} stehen unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: H, $-C(S)R^{15}$, $-C(O)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OR^{15}$ oder $-C(O)NR^{15}R^{16}$
- 5 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, $-O-C(O)R^{11}$, $-O-P(O)(OR^{11})_2$, $-O-B(OR^{11})_2$ oder $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$ substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_6 - C_{14} -Aryl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl,
- R^{14} steht für $-CH_2-NR^{22}R^{23}$, Piperidin-1-ylmethyl oder Morpholin-4-ylmethyl
- 10 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl oder $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$,
- R^{15} und R^{16} stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff oder -OH
- 15 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_6 - C_{14} -Aryl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl
- 20 oder bilden gemeinsam mit dem Stickstoffatom an das sie gebunden sind einen 3- bis 7-gliedrigen Ring, der ein weiteres dem Stickstoff nicht benachbartes Heteroatom aus der Reihe N, O enthalten kann,
- R^{17} und R^{18} stehen unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: H, $-C(O)OR^{11}$
- 25 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl, und $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$ substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_6 - C_{14} -Aryl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl,
- R^{19} steht für H, C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, $-C(S)R^{15}$, $-C(O)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$,

- R^{20} und R^{21} stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkinyl oder Wasserstoff,
- 5 R^{22} und R^{23} stehen unabhängig voneinander für C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkinyl oder Wasserstoff,
- sowie agrochemisch wirksame Salze davon,
- wobei folgende Verbindungen ausgenommen sind:
- a) Verbindungen in denen,
- 10 X^1 für N steht,
- R^1 für ein gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht,
- R^3 für Butyl oder Propyn-2-yl steht,
- R^4 für -NHR₁₂ steht,
- R^{12} für gegebenenfalls substituiertes Phenyl steht,
- 15 und b) Verbindungen in denen
- X^1 für N steht
- R^2, R^4, R^5, R^6 für H stehen,
- R^3 für Methyl, Ethyl, Allyl, 2-Methoxyethyl oder Benzyl steht, wenn R^1 für 4-Chlorphenyl steht, oder
- 20 R^3 für Methyl steht, wenn R^1 für Phenyl, 4-Methoxyphenyl oder 4-Fluorphenyl steht.
2. Verbindungen der Formel [I-a] nach Anspruch 1,
- in welcher die Symbole folgende Bedeutungen haben,
- R^1 steht für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden
- 25 durch R^7 substituiertes Phenyl,

	R ²	steht für Methyl, Ethyl, Isopropyl, Cyclopropyl oder Wasserstoff,
5	R ³	steht für Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, 2,2-Dimethylpropyl, 3-Methylbut-2-en-1-yl, But-2-en-1-yl, But-3-en-2-yl, Propadienyl, Prop-2-in-1-yl, But-2-in-1-yl, But-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, Cyanmethyl, 2-Cyanethyl, 1-Cyanpropan-2-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, (2,2-Dichlorcyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, Trichlormethyl, Trifluormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, 2-Chlorethyl, 2-Bromethyl, 2-Fluorpropyl, 10 3-Fluorpropyl, 2-Chlorpropyl, 3-Chlorpropyl, 1,3-Difluorpropan-2-yl, 2-Fluorbenzyl, 3-Fluorbenzyl, 4-Fluorbenzyl, 2,3-Difluorbenzyl, 2-Chlor-6-fluorbenzyl, 1-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-(3-Chlorphenyl)ethyl, 1-(4-Chlorphenyl)ethyl, 3-Cyanobenzyl, 4-Cyanobenzyl, 4-(Difluormethoxy)benzyl, 2-Cyanobenzyl, 2-(3-Chlorphenyl)ethyl, 2-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-Naphthylmethyl, (Pyridin-3-yl)methyl, 2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl, Methoxymethyl, 2-Methoxyethyl, 2-(Methylsulfanyl)ethyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, 1-Methoxypropan-2-yl, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl, 15 Tetrahydrofuran-2-ylmethyl, (3-Methyloxetan-3-yl)methyl, 1H-Imidazol-2-ylmethyl, Tetrahydrofuran-3-yl, 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl, 2-tert-Butoxy-2-oxoethyl, 1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl, 1-Methoxy-1-oxopropan-2-yl oder 3-Ethoxy-3-oxopropyl, Propan-2-yloxy, Methyl, Ethyl, n-Propyl, 2-Ethoxyethyl, 2-Chlorethyl,
20	R ⁴	steht für Wasserstoff oder -NR ¹² R ¹³ oder -NHR ¹³ ,
25	R ⁵ und R ⁶	stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor oder Cyano oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen Monocyclus, wobei sie gemeinsam für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R ¹¹ substituiertes -(CH=CH-CH=CH)-, -(CH=CH-N(R ¹⁹)), -(CH=CH-CH=N)-, -(NH-CH=N)- oder -(CH ₂ -C(O)-N(R ¹⁹))- 30 stehen,

- R^7 steht unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen:
Fluor, Chlor, Cyano oder Methyl,
- R^{11} steht für -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, $-\text{NH}-\text{C}(\text{O})\text{R}^{20}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{20}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{20}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{20}\text{R}^{21}$, $-\text{SO}_2\text{R}^{20}$
- 5 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, $\text{C}_1\text{-C}_6\text{-Alkyl}$ oder -O-($\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl}$) substituiertes $\text{C}_1\text{-C}_6\text{-Alkyl}$, $\text{C}_3\text{-C}_8\text{-Cycloalkyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_6\text{-Alkenyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_6\text{-Alkynyl}$, -O-($\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl}$), -S-($\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl}$), -O-($\text{C}_3\text{-C}_8\text{-Cycloalkyl}$) oder -S-($\text{C}_3\text{-C}_8\text{-Cycloalkyl}$),
- 10 R^{12} steht für Wasserstoff, $-\text{C}(\text{S})\text{R}^{15}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{15}$, $-\text{SO}_2\text{R}^{15}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{15}$, $-\text{OR}^{15}$ oder $-\text{C}(\text{O})\text{NR}^{15}\text{R}^{16}$,
- R^{13} steht für $\text{C}_1\text{-C}_6\text{-Alkyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_6\text{-Alkenyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_6\text{-Alkynyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_9\text{-Heterocyclyl}$ oder $\text{C}_2\text{-C}_9\text{-Heteroaryl}$ oder Wasserstoff,
- 15 R^{15} steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, -OH, Cyano oder $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl}$ substituiertes $\text{C}_1\text{-C}_6\text{-Alkyl}$, $\text{C}_3\text{-C}_6\text{-Cycloalkyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_6\text{-Alkenyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_6\text{-Alkynyl}$, $\text{C}_3\text{-C}_8\text{-Cycloalkyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_9\text{-Heterocyclyl}$, $\text{C}_2\text{-C}_9\text{-Heteroaryl}$
- oder für Wasserstoff
- R^{16} steht für Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Propyl,
- 20 R^{19} steht für H, $\text{C}_2\text{-C}_6\text{-Alkynyl}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{15}$, $-\text{SO}_2\text{R}^{15}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{15}$,
- R^{20} und R^{21} stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, iso-Propyl, Cyclopropyl, Cyclobutyl
- oder für Wasserstoff,
- 25 sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

3. Verbindungen der Formel **[I-a]** nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 2,

in welcher die Symbole folgende Bedeutungen haben,

X^1 steht für C-H,

R^4 steht für Wasserstoff

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

4. Verbindungen der Formel [I-a] nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 2,

5 in welcher die Symbole folgende Bedeutungen haben,


X^1 steht für N,

R^4 steht für $-NHR^{13}$,

10 R^{13} steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder C_2 - C_9 -Heteroaryl,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

5. Verbindungen der Formel [I-b],



[I-b]

15 in welcher die Symbole folgende Bedeutungen haben:

X^1 steht für C-H oder N,

20 R^1 steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^7 substituiertes Phenyl, Naphthalenyl, Chinolin-5-yl, Chinolin-8-yl, Isochinolin-5-yl, Isochinolin-8-yl, 1-Benzothiophen-4-yl, 1-Benzothiophen-7-yl, 1-Benzofuran-4-yl, 1-Benzofuran-7-yl, 1,3-Benzodioxol-4-yl oder 1,3-Benzodioxol-5-yl,

- 270 -

- R^2 steht für Cyano, Nitro, Halogen, C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_1 - C_6 -Halogenalkyl, C_1 - C_6 -Halogenalkoxy, C_1 - C_6 -Alkylthio, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_3 - C_6 -Halogencycloalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl oder Wasserstoff,
- 5 R^{301} steht für $-C(O)N(R^9R^{10})$, $-C(O)R^9$, $-C(O)OR^9$, $-S(O)_2R^9$ oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^8 substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Allenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_1 - C_6 -Alkoxy, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -OxoHeterocyclyl, oder Heteroaryl,
- R^{401} steht für $-NR^{12}R^{13}$, $-C(O)NR^{12}R^{13}$ oder $-N(R^{12})_2$
- 10 R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, -OH, -SH,
- 15 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_6 - C_{14} -Aryl, $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-O-(C_6-C_{14}\text{-Aryl})$, $-S-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-S(O)-(C_1-C_6\text{-Alkyl})$ oder $-C(O)-(C_1-C_6\text{-Alkyl})$,
- 20 oder bilden außerdem gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Sauerstoff, Cyano oder C_1 - C_4 -Alkyl substituierten Cyclus mit 3 bis 8 Ringatomen, wobei der Cyclus 1 bis 4 Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel oder $-N-R^{19}$ enthalten kann,
- R^7 steht unabhängig voneinander für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, -OH, -SH,
- 25 oder für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl oder $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$ substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, $\text{Tri}(C_1-C_4\text{-alkyl})\text{silyl}$, $C_6-C_{14}\text{-Aryl}$, $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-O-(C_6-C_{14}\text{-Aryl})$, $-S-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-S(O)-(C_1-C_6\text{-Alkyl})$, $-S(O)_2-(C_1-C_6\text{-Alkyl})$,
- R^8 steht für -OH, Halogen, NO_2 , Cyano, $-NR^9R^{10}$, $-C(O)N(R^9R^{10})$, $-C(O)R^9$, $-C(O)OR^9$, $-O-C(O)R^9$, $-(\text{CH}_2)_n\text{C(O)}R^9$ wobei n = eine ganze Zahl zwischen 1 und 6 ist
- 30

- 5 oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl, C₂-C₈-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₁-C₆-Halogenalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl, C₂-C₉-Heteroaryl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -S-(C₁-C₄-Alkyl), -O-(C₃-C₈-Cycloalkyl), -S-(C₃-C₈-Cycloalkyl),
- R⁹ und R¹⁰ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl, C₂-C₈-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl, C₂-C₉-Heteroaryl,
- 10 oder für Wasserstoff,
- R¹¹ steht für -OH, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, -NH-C(O)R²⁰, -NR²⁰R²¹, -C(O)R²⁰, -C(O)OR²⁰, -C(O)NR²⁰R²¹, -SO₂R²⁰
- 15 oder für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Carbonyl, Cyano, C₁-C₆-Alkyl oder -O-(C₁-C₄-Alkyl) substituiertes
- C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₁-C₁₁-Heteroalkyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, -O-(C₁-C₄-Alkyl), -S-(C₁-C₄-Alkyl), -O-(C₃-C₈-Cycloalkyl), S-(C₃-C₈-Cycloalkyl), C₆-C₁₄-Aryl, -O-(C₆-C₁₄-Aryl), -S-(C₆-C₁₄-Aryl), C₂-C₉-Heterocyclyl oder C₂-C₉-Heteroaryl,
- 20 R¹² steht für -C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OR¹⁵ oder -C(O)NR¹⁵R¹⁶,
- R¹³ steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano, C₁-C₆-Alkyl, -O-C(O)-C₁-C₄-Alkyl, -O-P(O)(O-C₁-C₄-Alkyl)₂, -O-B(O-C₁-C₄-Alkyl)₂ oder -O-(C₁-C₄-Alkyl) substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl,
- 25 C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₂-C₉-Heterocyclyl, C₂-C₉-Heteroaryl
- oder für Wasserstoff,
- R¹⁵ und R¹⁶ stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff oder -OH,
- oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R¹¹ substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-

Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl, C₆-C₁₄-Aryl, C₂-C₉-Heterocyclyl
oder C₂-C₉-Heteroaryl

oder bilden gemeinsam mit dem Stickstoffatom an das sie gebunden sind
einen 3 bis 7-gliedrigen Ring, der ein weiteres dem Stickstoff nicht
benachbartes Heteroatom aus der Reihe N, O enthalten kann,

5

R¹⁹ steht für H, C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl, -
C(S)R¹⁵, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵,

10

R²⁰ und R²¹ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder
mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano
substituiertes C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkynyl
oder Wasserstoff,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon,

wobei folgende Verbindungen ausgenommen sind:

a) Verbindungen in denen,

15

R³⁰¹ für gegebenenfalls substituiertes [1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl, 7,8-
Dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin 6-yl, 6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-
yl, 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl oder 6-Chlorpyridazin-3-yl steht,

R⁵, R⁶ für H stehen,

20

b) die Verbindungen 4-{1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-
yl}-N,N-dimethylpyridin-2-amin und 1-(4-{4-[1-Ethyl-3-(4-nitrophenyl)-1H-
pyrazol-4-yl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-yl}phenyl)-N,N-dimethylmethanamin.

6. Verbindungen der Formel **[I-b]** nach Anspruch 5,

in welcher die Symbole folgende Bedeutungen haben,

25

R¹ steht für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden
durch R⁷ substituiertes Phenyl,

R² steht für Methyl, Ethyl, Isopropyl, Cyclopropyl, oder Wasserstoff,

- R^{301} steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^8 substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_3 - C_6 -Allenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl oder C_1 - C_6 -Alkoxy,
- R^{401} steht für $-NR^{12}R^{13}$,
- 5 R^5 und R^6 stehen unabhängig voneinander für Wasserstoff, Fluor oder Cyano
- oder bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatomen, an das sie gebunden sind, einen Monocyclus, wobei sie gemeinsam für gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes $-(CH=CH-CH=CH)-$, $-(CH=CH-N(R^{19})-)$, $-(CH=CH-CH=N)-$ oder $-(CH_2-C(O)-N(R^{19})-)$ stehen,
- 10 R^7 steht für Fluor, Chlor, Cyano oder Methyl,
- R^8 steht für Fluor, Chlor, Cyano oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch R^{11} substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_8 -Alkenyl, C_2 - C_8 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_6 - C_{14} -Aryl, Heterocyclyl, Heteroaryl, $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-S-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-O-(C_3-C_8\text{-Cycloalkyl})$, $-S-(C_3-C_8\text{-Cycloalkyl})$,
- 15 R^{11} steht für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: $-OH$, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, $-NH-C(O)R^{20}$, $-C(O)R^{20}$, $-C(O)OR^{20}$, $-C(O)NR^{20}R^{21}$, $-SO_2R^{20}$
- oder für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, $-OH$, Cyano, C_1 - C_6 -Alkyl oder $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$ substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, $-O-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-S-(C_1-C_4\text{-Alkyl})$, $-O-(C_3-C_8\text{-Cycloalkyl})$ oder $-S-(C_3-C_8\text{-Cycloalkyl})$,
- 20 R^{12} steht für: $-C(S)R^{15}$, $-C(O)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OR^{15}$ oder $-C(O)NR^{15}R^{16}$,
- 25 R^{13} steht für C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl oder Wasserstoff,
- R^{15} steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, $-OH$, Cyano oder C_1 - C_4 -Alkyl substituiertes C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl, C_2 - C_6 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl, C_2 - C_9 -Heterocyclyl, C_2 - C_9 -Heteroaryl
- 30

oder für Wasserstoff,

R¹⁶ steht für Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Propyl,

R¹⁹ steht für H, -C₂-C₆-Alkynyl, -C(O)R¹⁵, -SO₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵,

5 R²⁰ und R²¹ stehen unabhängig voneinander für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom, -OH, Cyano substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, iso-Propyl, Cyclopropyl, Cyclobutyl oder für Wasserstoff,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

7. Verbindungen der Formel **[I-b]** nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 6,
10 in welcher die Symbole folgende Bedeutungen haben,

X¹ steht für N,

15 R¹ steht für Phenyl, 3-Methylphenyl, 2-Fluorphenyl, 3-Fluorphenyl, 4-Fluorphenyl, 3-Trifluormethylphenyl, 4-Chlorphenyl, 2,5-Difluorphenyl, 2,4-Difluorphenyl, 2,6-Difluorphenyl, 3-Methyl-4-fluorphenyl, 3-Cyan-4-fluorphenyl oder 2,4,6-Trifluorphenyl,

20 R³⁰¹ steht für Methyl, Ethyl, 1-Propyl, Propan-2-yl, Isobutyl, Butan-2-yl, 2-Methylpropyl, 2,2-Dimethylpropyl, 2-(Morpholin-4-yl)ethyl, 2-Cyanethyl, Cyanmethyl, 2-Cyan-2-methylpropyl, 3-Methylbut-2-en-1-yl, But-2-en-1-yl, But-3-en-2-yl, Propadienyl, Prop-2-en-1-yl, Prop-2-in-1-yl, But-2-in-1-yl, But-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, 2-Methylbut-3-in-2-yl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, (2,2-Dichloreyclopropyl)methyl, Cyclopropylmethyl, 1-Cyclopropylethyl, Trichlormethyl, Trifluormethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, 2-Chlorethyl, 2-Bromethyl, 2-Fluorpropyl, 3-Fluorpropyl, 2-Chlorpropyl, 3-Chlorpropyl, 1,3-Difluorpropan-2-yl, 1,1,1-Trifluorpropan-2-yl, 1,1,1-Trifluor-2-methylpropan-2-yl, 3,3,3-Trifluor-2-hydroxypropyl, 2-Fluorbenzyl, 3-Fluorbenzyl, 4-Fluorbenzyl, 2,3-Difluorbenzyl, 2-Chlor-6-fluorbenzyl, 1-(2-Chlorphenyl)ethyl, 1-(3-Chlorphenyl)ethyl, 1-(4-Chlorphenyl)ethyl, 3-Cyanobenzyl, 4-Cyanobenzyl, 4-(Difluormethoxy)benzyl, 2-Cyanobenzyl, 2-(3-Chlorphenyl)ethyl, 2-(2-

25

30

- 5 Chlorphenyl)ethyl, 1-Naphthylmethyl, (Pyridin-3-ylmethyl, 2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methyl, Methoxymethyl, 2-Methoxyethyl, 2-Methoxypropyl, 2-(Methylsulfanyl)ethyl, 2-(Trifluormethoxy)ethyl, 1-Methoxypropan-2-yl, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl, 1,3-Dimethoxypropan-2-yl, 2-(Cyclopropyloxy)ethyl, Tetrahydrofuran-2-ylmethyl, (3-Methyloxetan-3-yl)methyl, 1H-Imidazol-2-ylmethyl, Tetrahydrofuran-3-yl, 2-Oxotetrahydrofuran-3-yl, 2-tert-Butoxy-2-oxoethyl, 1-Methoxy-3-methyl-1-oxobutan-2-yl, 1-Methoxy-1-oxopropan-2-yl oder 3-Ethoxy-3-oxopropyl, 1-Cyanopropan-2-yl, Propan-2-yloxy, 2-Ethoxyethyl,
- 10 R^{401} steht für $-NHR^{12}$,
- R^{11} steht für eine oder mehrere der folgenden Gruppen: -OH, Fluor, Chlor, Cyano, Methyl, Ethyl, Cyclopropyl,
- R^{12} steht für $-C(S)R^{15}$, $-SO_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$ oder $-C(O)R^{15}$,
- 15 R^{15} steht für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach gleich oder verschieden durch Halogen, OH, Cyano oder C_1 - C_4 -alkyl substituiertes Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, sec-Butyl, Isobutyl, Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, 2-Methoxyethyl, (2-Methoxyethoxy)methyl, Cyclopentenyl, Cyclohexenyl, Oxetanyl, Tetrahydrofuran-2-yl, Ethinyl, Prop-1-in-1-yl, Prop-1-en-1-yl,
- 20 Aminomethyl, Aminoethyl, Aminopropyl, Aminobutyl, Aminoisopropyl, Aminocyclopropyl, Aminocyclobutyl, Aminocyclopentyl, Dimethylamino, Ethyl(methyl)amino, Pyrrolidinyl, Diethylamino, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl, Ethoxycarbonyl, Benzyl, Phenyl, 2-Thienyl, 3-Thienyl
- oder für Wasserstoff,
- 25 R^{19} steht für H, Acetyl, Ethoxycarbonyl, Methoxycarbonyl, Prop-2-in-1-yl, But-2-in-1-yl,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

8. Verbindungen der Formel **[I-b]** nach einem oder mehreren der Ansprüche 5 bis 6,

in welcher die Symbole folgende Bedeutungen haben,


- 30 X^1 steht für C-H,

- 276 -

- R¹ steht für 4-Fluorphenyl, 3-Chlorphenyl, 2,6-Difluorphenyl, 3-Methylphenyl,
- R² steht für Cyclopropyl, Methyl, H, Difluormethoxy,
- R⁴⁰¹ steht für Acetylamino, n-Propionylamino, Isobutyrylamino, (Cyclopropylcarbonyl)amino, (Methoxyacetyl)amino, 2-Methoxypropanoyl, (2-Methylbutanoyl)amino, But-2-enoylamino, Prop-2-inoylamino, 3-(Dimethylamino)prop-2-enoylamino, 3,3,3-Trifluorpropanoyl)amino, 3,3-Difluorpropanoyl)amino, (Cyclopropylacetyl)amino, Lactoylamino, (Cyclobutylcarbonyl)amino, (Cyclopentylacetyl)amino, 2-Methylcyclopropyl)carbonyl]amino, (3-Methylbutanoyl)amino, (Phenylacetyl)amino, Benzoylamino, (3-Thienylcarbonyl)amino, (2-Thienylcarbonyl)amino (2-Hydroxy-2-methylpropanoyl)amino, [(2-Methoxyethoxy)acetyl]amino, 2,3-Dihydroxypropanoyl)amino,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

9. Verfahren zur Bekämpfung phytopathogener und Mykotoxin produzierender Pilze, dadurch gekennzeichnet, dass man Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel **[I-a]** und/oder **[I-b]** gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 auf die Pilze und/oder deren Lebensraum ausbringt.
10. Mittel zur Bekämpfung phytopathogener und Mykotoxin produzierender Pilze, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einem Phenylpyri(mi)dinylazole der Formel **[I-a]** und/oder **[I-b]** gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 neben Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Stoffen.
11. Verbindungen der Formel **[X]**,



in welcher


- PG für Tetrahydro-2H-pyran-2-yl steht,

- 277 -

R^1 , R^2 , X^1 , R^6 , R^5 , $R^{4/401}$ für die gleichen Restdefinitionen wie für Formel **[I-a]** und **[I-b]** in den Ansprüchen 1 bis 8 definiert, stehen,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon.

5 12. Verbindungen der Formel **[XI]**



in welcher


Met^3 steht für Tributylstannyl, 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl,

PG steht für Tetrahydro-2H-pyran-2-yl, 2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl,

10 R^2 , X^1 , R^6 , R^5 , $R^{4/401}$ für die gleichen Restdefinitionen wie für Formel **[I-a]** und **[I-b]** in den Ansprüchen 1 bis 8 definiert, stehen,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon, wobei die Verbindung 1-({4-[1-(2,2-Difluorethyl)-3-(trimethylstannyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl} amino)propan-2-ol
15 ausgenommen ist.

13. Verbindungen der Formel **[III]**




in welcher

- 278 -

R^1 , R^2 , X^1 , R^6 , R^5 , $R^{3/301}$ für die gleichen Restdefinitionen wie für Formel [I-a] und [I-b] in den Ansprüchen 1 bis 8 definiert, stehen,

5 sowie agrochemisch wirksame Salze davon, wobei die Verbindungen 4-[3-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amine; 4-[3-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amine, 4-[3-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amine, 4-[3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-amine; 4-(5-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidin-2-amine und [4-(2-aminopyrimidin-4-yl)-3-(3-chloro-5-hydroxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetonitrile ausgenommen sind.

10 14. Verbindungen der Formel [V]




in welcher

$B(OR^*)_2$ für $-B(OiPr)_2$ oder $-B(OH)_2$ steht,

15 R^1 , R^2 , $R^{3/301}$ für die gleichen Restdefinitionen wie für Formel [I-a] und [I-b] in den Ansprüchen 1 bis 8 definiert, stehen,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon, wobei die Verbindung 1-methyl-3-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ausgenommen ist.

15. Verbindungen der Formel [VI]



20

in welcher

R^1 , R^2 , $R^{3/301}$ für die gleichen Restdefinitionen wie für Formel [I-a] und [I-b] in den Ansprüchen 1 bis 8 definiert, stehen,

sowie agrochemisch wirksame Salze davon, wobei Verbindungen ausgenommen sind bei denen $R^{3/301} = H, CH_3$ oder $C(CH_3)_3$ ist.