(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103251763 B
(45)授权公告日 2015.04.08

(21)申请号 201310128016.6

(22)申请日 2013.04.15

(73)专利权人 吴厚图
地址 239400 安徽省滁州市明光市花园路1号皖江中医康复门诊部

(72)发明人 吴厚图 吴杏黎

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112
代理人 余成俊

(51)Int.Cl.
A61K 36/889(2006.01)
A61K 36/896(2006.01)
A61K 9/14(2006.01)
A61P 19/08(2006.01)
A61P 1/14(2006.01)
A61K 35/32(2015.01)
A61K 35/36(2015.01)

(56)对比文件
CN 1296844 A,2001.05.30, 全文.
CN 101537093 A,2009.09.23, 全文.
孙贤杰等. 中医药治疗骨不连的研究现状. 《医学综述》. 2008, 第14卷(第24期), 3781-3783.
闵文等. 中医辨证内治骨关节炎的研究. 《中国中医骨伤科杂志》. 2003, 第11卷(第2期), 61-63.

审查员 张岩峰

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种补骨中药散剂及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种补骨中药散剂及其制备方法，其主要是将组成原料补骨脂、骨碎补、熟地、肉苁蓉、何首乌、狗骨、木香、牛膝、肉桂、红花阿胶、血竭按一定重量份磨粉，过160-180目筛，加水口服。本发明的配方合理，成本低，具有补气、补血、补骨、活血通路的疗效，可以有效的治疗骨头缺血坏死，骨不连和各种骨折。

CN 103251763 B

1. 一种补骨中药散剂，其特征在于其组成原料的重量份为：补骨脂 8-12 份、骨碎补 8-12 份、熟地 13-18 份、肉苁蓉 10-15 份、何首乌 10-15 份、狗骨 13-18 份、木香 3-8 份、牛膝 8-12 份、肉桂 6-8 份、红花 4-5 份、阿胶 8-12 份、血竭 8-12 份。

2. 根据权利要求 1 所述的补骨中药散剂，其特征在于其组成原料的重量份为：补骨脂 10 份、骨碎补 10 份、熟地 15 份、肉苁蓉 12 份、何首乌 12 份、狗骨 15 份、木香 5 份、牛膝 10 份、肉桂 7 份、红花 3 份、阿胶 10 份、血竭 10 份。

3. 一种如权利要求 1 所述的补骨中药散剂的制备方法，其特征在于：按组成原料的重量份称取各组分原料，磨粉，过 160-180 目筛，加水口服。

一种补骨中药散剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种补骨中药散剂及其制备方法，属于中药领域。

背景技术

[0002] 骨，即骨骼，指人或动物肢体中坚硬的组织部分，倘若骨骼受损，必定受害于身心，现如今，骨头缺血坏死，骨不连、各种骨折的疾病时常发生，相对应的药物也有很多，但是使用效果一直不加，需求提供一种高效的补骨中药及其制备方法。

发明内容

[0003] 为了用于治疗骨头缺血坏死，骨不连、各种骨折的疾病，本发明的目的在于提供一种补骨中药散剂及其制备方法。本发明的配方合理，成本低，具有补气、补血、补骨、活血通路的疗效，可以有效的治疗骨头缺血坏死，骨不连和各种骨折。

[0004] 为了实现上述目的本发明采用如下技术方案：

[0005] 补骨中药散剂，其组成原料的重量份为：补骨脂 8-12 份、骨碎补 8-12 份、熟地 13-18 份、肉苁蓉 10-15 份、何首乌 10-15 份、狗骨 13-18 份、木香 3-8 份、牛膝 8-12 份、肉桂 6-8 份、红花 4-5 份、阿胶 8-12 份、血竭 8-12 份。

[0006] 补骨中药散剂，其组成原料的重量份为：补骨脂 10 份、骨碎补 10 份、熟地 15 份、肉苁蓉 12 份、何首乌 12 份、狗骨 15 份、木香 5 份、牛膝 10 份、肉桂 7 份、红花 3 份、阿胶 10 份、血竭 10 份。

[0007] 补骨中药散剂的制备方法，按组成原料的重量份称取各组分原料，磨粉，过 160-180 目筛，加水口服。

[0008] 用法及用量：每日一剂，每剂 150-200g，加水口服。

[0009] 本发明的有益效果：

[0010] 本发明的配方合理，成本低，具有补气、补血、补骨、活血通路的疗效，可以有效的治疗骨头缺血坏死，骨不连和各种骨折。

具体实施方式

[0011] 实施例 1：补骨中药散剂，其组成原料的重量份为：补骨脂 10 份、骨碎补 10 份、熟地 15 份、肉苁蓉 12 份、何首乌 12 份、狗骨 15 份、木香 5 份、牛膝 10 份、肉桂 7 份、红花 3 份、阿胶 10 份、血竭 10 份。

[0012] 补骨中药散剂的制备方法，按组成原料的重量份称取各组分原料，磨粉，过 160-180 目筛，加水口服。

[0013] 病例 1：许某，女，42 岁；

[0014] 2010 年 7 月 13 日：由于务农时期，不小心腿部骨折，不能行走，生活不便自理，家人甚是担心，后经服用本发明的药物 10 天，可自行行走，继续服用 5-10 天，骨折痊愈。

[0015] 病案 2：侯某，女，54 岁；

[0016] 2008 年 2 月 14 日初诊 :患者长期腿部疼痛,缺血坏死,不易行走,长期卧床不起,生活家人照料,后代担心,后经服用本发明的药物 1-2 个月,疼痛症状减少,继续服用 3-4 个月,可自行行走。

[0017] 病案 3 :王某,男,66 岁 ;

[0018] 2006 年 7 月 23 日 :夏季关节疼,不能行走,生活不便自理,后经服用本发明的药物 20 天个月,可自行行走,继续服用一个月,关节疼痛痊愈。

[0019] 病案 4 :范某,男,36 岁 ;

[0020] 2010 年 7 月 13 日 :在外打工时期,不小心腿部骨折,不能行走,生活不便自理,家人甚是担心,后经服用本发明的药物 10 天,可自行行走,继续服用 10-20 天,骨折痊愈。

[0021] 病案 5 :张某,男,22 岁 ;

[0022] 2008 年 10 月 13 日 :患者四肢疼痛,乏力,晨起手发红,偶尔有发麻,心烦,轻咳,夜不能寐,生活不便自理,家人甚是担心,后经服用本发明的药物一个月,可自行行走,症状减少,继续服用 10-20 天,痊愈。