


申請日期	88 年 11 月 23 日
案 號	88120466
類 別	C _{7D} ²³⁹ / ₉₄ , A _{61K} ³¹ / ₄₉₅



519541

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書

一、發明 名稱	中 文	作為抗癌劑之經取代的雙環衍生物
	英 文	Substituted bicyclic derivatives useful as anticancer agents
二、發明 人	姓 名	(1) 約翰·凱斯 Kath, John Charles (2) 諾瑪·湯姆 Tom, Norma Jacqueline (3) 劉正宇 Liu, Zhengyu
	國 籍	(1) 美國 (2) 美國 (3) 美國
	住、居所	(1) 美國康乃狄克州水灘海岸路二五二號 252 Shore Road, Waterford, CT 06385, U.S.A. (2) 美國康乃狄格州瓦特佛約克郡道四十三號 43 Yorkshire Drive, Waterford, CT 06385, U.S.A. (3) 美國康乃狄格州瓦特佛佳拉普巷四十六號 46 Gallup Lane, Waterford, CT 06385, U.S.A.
	三、申請人	
	姓 名 (名稱)	(1) 輝瑞製品股份有限公司 Pfizer Products Inc.
	國 籍	(1) 美國
	住、居所 (事務所)	(1) 美國康乃狄克州格洛頓艾斯頓波因特路 Eastern Point Road, Groton, CT 06340, U.S.A.
	代 表 人 姓 名	(1) 艾倫·史匹戈爾 Spiegel, Allen J.

申請日期	88 年 11 月 23 日
案 號	88120466
類 別	

A4

C4

(以上各欄由本局填註)

發 明 專 利 說 明 書

一、發明 名稱	中 文	
	英 文	
二、發明 創作人	姓 名	(4) 艾瑞克·寇克斯 Cox, Eric David (5) 沙米特·巴特卡亞 Bhattacharya, Samit Kumar (6) 喬伊·莫里斯 Morris, Joel
	國 籍	(4) 美國 (5) 印度 (6) 美國 (4) 美國康乃狄格州米斯提克萊森街五〇七號 507 Judson Avenue, Mystic, CT 06355, U.S.A.
	住、居所	(5) 美國康乃狄格州格羅頓米歇爾巷二〇〇號一一 二號公寓 200 Michelle Lane, Apt. 112, Groton, CT 06340, U.S.A. (6) 美國康乃狄格州東林春石路二十四號 24 Spring Rock Road, East Lyme, CT 06333, U.S.A.
三、申請人	姓 名 (名稱)	
	國 籍	
	住、居所 (事務所)	
	代 表 人 姓 名	

裝

訂

線

(由本局填寫)

承辦人代碼：
大類：
I P C分類：

A6

B6

本案已向：

國(地區) 申請專利，申請日期： 案號： ，☐有 ☐無主張優先權美國 1999 年 1 月 27 日 60/117,346 ☒有主張優先權

有關微生物已寄存於： ，寄存日期： ，寄存號碼：

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

線

五、發明說明（¹）

發明之背景

本發明係關於可用於治療哺乳動物體內之異常細胞生長（諸如，癌症）的新穎雙環衍生物。本發明亦關於將如是化合物用於治療哺乳動物（尤指人類）體內之異常細胞生長的方法，以及含有如是化合物的藥學組成物。

已知細胞會因為其部分 D N A 轉化為致癌基因（亦即，在活化後會導致形成惡性腫瘤細胞的基因），而變成具有癌性。許多致癌基因係編碼能夠造成細胞轉形之畸形酪氨酸激酶蛋白質。另外，正常之原致癌性酪氨酸激酶的過度表現亦會造成增生性病徵，有時會導致惡性表現型的產生。

受體酪氨酸激酶係跨越細胞膜的酶，其具有針對於生長因子（諸如，上皮細胞生長因子）之胞外結合功能部位（一種穿透膜功能部位）以及作為蛋白質內之磷酸酯專一性酪氨酸殘基之激酶的細胞內部分，因此會影響細胞的增生。其他受體酪氨酸激酶包括 c - e r B - 2 、 c - m e t 、 t i e - 2 、 P D G F r 、 F G F r 及 V E G F R 。如是之激酶已知常在一般人類的癌症，諸如，乳癌、胃腸癌（諸如，結腸、直腸或胃癌）、白血病及卵巢、支氣管或胰臟癌，畸形地表現。亦為已知的是，具有酪氨酸激酶活性的上皮細胞生長因子受體（E G F R）在許多人類癌症中，諸如，腦、肺、鱗狀細胞、膀胱、胃、乳房、頭及頸、食道、婦科及甲狀腺腫瘤，突變及／或過度表現。

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

線

五、發明說明 (2)

因此，受體酪氨酸激酶的抑制劑已被認定為可作為哺乳動物癌細胞的選擇性抑制劑。例如，erbstatin（一種酪氨酸激酶抑制劑）能夠選擇性地減弱移植在無胸腺無毛鼠身上之人類乳房癌瘤（其表現出上皮細胞生長因子受體酪氨酸激酶（EGFR）的生長，但對於不表現出EGF受體之其他癌瘤的生長卻毫無效果。因此，本發明的化合物（其為某些受體酪氨酸激酶的選擇性抑制劑）係用於治療人體內不正常細胞的生長，尤指癌症。除了受體酪氨酸激酶之外，本發明的化合物亦對於多種其他非受體酪氨酸激酶（例如，lck、src、abl）或絲氨酸／蘇氨酸激酶（例如，環素（cyclin）依存性激酶），呈現出抑制活性。

各種其他化合物，諸如，苯乙烯衍生物，已知具有酪氨酸激酶抑制性質。最近，有五份歐洲專利公告案，即EP 0 566 226 A1（1993年10月20號公告）、EP 0 602 851 A1（1994年6月22公告）、EP 0 635 507 A1（1995年1月25日）、EP 0 635 498 A1（1995年1月25日公告）及EP 0 520 722 A1（1992年12月30日公告），係關於雙環衍生物，尤其是喹啉衍生物，彼等因具有酪氨酸激酶抑制性質，而具有抗癌性質。此外，世界專利申請案WO 92 / 20642（1992年11月26日公告）

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂


線

五、發明說明 (3)

係關於某些作為酪氨酸激酶抑制劑的二-單及雙環芳基及雜芳基化合物，彼等可用於抑制不正常細胞增生。世界專利申請案 W O 9 6 / 1 6 9 6 0 (1 9 9 6 年 6 月 6 日公告)、W O 9 6 / 0 9 2 9 4 (1 9 9 6 年 3 月 6 日公告)、W O 9 7 / 3 0 0 3 4 (1 9 9 7 年 8 月 2 1 日公告)、W O 9 8 / 0 2 4 3 4 (1 9 9 8 年 1 月 2 2 日公告)、W O 9 8 / 0 2 4 3 7 (1 9 9 8 年 1 月 2 2 日公告) 及 W O 9 8 / 0 2 4 3 8 (1 9 9 8 年 1 月 2 2 日公告) 亦係關於經取代的雙環雜芳族衍生物，彼等可作為酪氨酸激酶抑制劑，用於相同的目的。

發明總論

本發明係關於式 1 所示的化合物及其藥學上可接受之鹽類及溶劑化物



式中：

X 為 N 或 C H ；

A 示稠合的 5、6 或 7-員環，任意含有 1 至 4 個相同或互異且選自 - N - (R¹)、O 及 S (O)_j 的雜原子，其中 j 為 0 至 2 的整數，該稠合環總共含有 1、2 或 3

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始


五、發明說明（4）

個雙鍵（包括與之稠合之吡啶或嘧啶內的鍵），若雙鍵包括前述任意的氮原子團 $-N-(R^1)$ ，則該接在氮上的 R^1 基不存在，但先決條件為：該稠合環不形成嘌呤的一部分且該稠合環不含有二個相鄰的 O 或 S（O），且其中 A 原子團的碳原子可任意經 1 至 3 個 R^5 基團所取代；

各 R^1 及 R^2 係獨立為 H 或 $C_1 - C_6$ 烷基；

R^3 為 $-(CR^1R^2)_mR^8$ ，其中 m 為 0 或 1；

或是 R^1 及 R^3 一起形成下式所示的基團



其中該基團係任意經 1 至 3 個 R^5 基團所取代；

R^4 為 $-(CR^1R^2)_m - C \equiv C - (CR^1R^2)_tR^9$ 、 $-(CR^1R^2)_m - C = C - (CR^1R^2)_t - R^9$ 、 $-C = NOR^{12}$ 、或 $-X^1 - R^{12}$ ，其中 m 為 0 至 3 的整數，t 為 0 至 5 的整數，且 X^1 係由氮雜環丁二烯、氧雜環丁烷或 $C_3 - C_4$ 碳環基團所衍生得的二價基團；

或是 R^4 為 $-(CR^1R^2)_m - C \equiv C - (CR^1R^2)_kR^{13}$ 或 $-(CR^1R^2)_m - C = C - (CR^1R^2)_kR^{13}$ ，其中 k 為 1 至 3 的整數，且 m 為 0 至 3 的整數；

或是 R^4 為 $-(CR^1R^2)_tR^9$ ，其中 t 為 0 至 5 的

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

結

五、發明說明 (5)

整數且與 R^9 的接點係經過 R^9 基團的碳原子；

各 R^5 獨立選自鹵基、羥基、 $-NR^1R^2$ 、 C_1-C_6 烷基、三氟甲基、 C_1-C_6 烷氧基、三氟甲氧基、
 $-C(O)R^6$ 、 $-CO_2R^6$ 、 $-NR^6C(O)R^1$ 、
 $-C(O)NR^6R^7$ 、 $-SO_2NR^6R^7$ 、
 $-NR^6C(O)NR^7R^1$ 及 $-NR^6C(O)OR^7$ ；

R^6 及 R^7 各自獨立選自 H、 C_1-C_6 烷基、
 $-(CR^1R^2)_t(C_6-C_{10}$ 芳基) 以及
 $-(CR^1R^2)_t(4-10$ 員雜環)，其中 t 為 0 至 5 的整數，該雜環基團的 1 或 2 個碳原子可任意經酮基 ($=O$) 原子團所取代，且前述 R^6 及 R^7 基團之烷基、芳基及雜環原子團部分可任意經 1 至 3 個獨立選自下列的取代基所取代：鹵基、氰基、硝基、 $-NR^1R^2$ 、三氟甲氧基、 C_1-C_6 烷基、 C_2-C_6 烯基、 C_2-C_6 炔基、羥基及 C_1-C_6 烷氧基；

R^8 係獨立選自 $-(CR^1R^2)_t(C_6-C_{10}$ 芳基) 及 $-(CR^1R^2)_t(4-10$ 員雜環)，其中 t 為 0 至 5 的整數，該雜環基團的 1 或 2 個碳原子可任意經酮基 ($=O$) 原子團所取代，且前述 R^8 各可任意經 1 至 5 個 R^{10} 基團所取代；

R^9 為非芳族的單環、稠合的或橋接的雙環或是螺環，其中該環含有 3 至 12 個碳原子，在此等碳原子中有 0 至 3 個碳原子可任意經獨立選自 N、O、 $S(O)_j$ (其中 j 為 0 至 2 的整數) 的雜原子團所置換，但先決條件為：該

五、發明說明 (6)

環中的二個 O 原子、二個 S (O)_j 原子團、一個 O 原子及一個 S (O)_j 原子團、一個 N 原子及一個 S 原子，或一個 N 原子及一個 O 原子不互相直接相連接，且其中該環的碳原子可任意經 1 至 2 個 R^{1 1} 基團所取代；

R^{1 0} 各自獨立選自鹵基、氰基、硝基、三氟甲氧基、三氟甲基、疊氮基、羥基、C₁ - C₆ 烷氧基、C₁ - C₁₀ 烷基、C₂ - C₆ 烯基、C₂ - C₆ 炔基、- C (O) R⁶、- C (O) O R⁶、- O C (O) R⁶、- N R⁶ C (O) R⁷、- N R⁶ C (O) N R¹ R⁷、- N R⁶ C (O) O R⁷、- C (O) N R⁶ R⁷、- N R⁶ R⁷、N R⁶ O R⁷、- S O₂ N R⁶ R⁷、- S (O)_j (C₁ - C₆ 烷基) [其中 j 為 0 至 2 的整數]、- (C R¹ R²)_t (C₆ - C₁₀ 芳基)、- (C R¹ R²)_t (4 - 10 員雜環)、- (C R¹ R²)_q C (O) (C R¹ R²)_t (C₆ - C₁₀ 芳基)、- (C R¹ R²)_q C (O) (C R¹ R²)_t (4 - 10 員雜環)、- (C R¹ R²)_t C (O) (C R¹ R²)_q (C₆ - C₁₀ 芳基)、- (C R¹ R²)_t O (C R¹ R²)_q (4 - 10 員雜環)、- (C R¹ R²)_q S (O)_j (C R¹ R²)_j (C₆ - C₁₀ 芳基)、以及 - (C R¹ R²)_q S (O)_j (C R¹ R²)_t (4 - 10 員雜環)，其中 j 為 0、1 或 2，q 及 t 各自獨立為 0 至 5 的整數，該 R^{1 0} 基團之雜環部分的 1 或 2 個環碳原子可任意經酮基 (= O) 所取代，該 R^{1 0} 基團的烷基、烯基、炔

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (7)

基、芳基及雜環原子團可任意經 1 至 3 個選自獨立選自下列的取代基所取代：鹵基、氰基、硝基、三氟甲基、三氟甲氧基、疊氮基、 $-OR^6$ 、 $-C(O)R^6$ 、 $-OC(O)R^6$ 、 $-NR^6C(O)R^7$ 、 $-C(O)NR^6R^7$ 、 $-NR^6R^7$ 、 $-NR^6OR^7$ 、 C_1 烷基、 C_2-C_6 烯基、 C_2-C_6 炔基、 $-(CR^1R^2)_t$ (C_6-C_{10} 芳基) 以及 $-(CR^1R^2)_t$ (4-10 員雜環)，其中 t 為 0 至 5 的整數；

R^{11} 各自獨立選自 $-R^{12}$ 、 $-OR^1$ 、 $-NR^1R^2$ 、 $-NR^6C(O)R^7$ 、 $-NR^6C(O)NR^7R^1$ 、 $-NR^6C(O)OR^7$ 、以及 $-NR^6SO_2NR^7R^1$ ，或是 R^{11} 取代一個碳上的二個氫原子而形成酮基 ($=O$)；

R^{12} 為 R^6 、 $-C(O)R^6$ 或 $-SO_2R^6$ 、 $-C(O)NR^6R^7$ 、 $-SO_2NR^6R^7$ 、或是 $-CO_2R^6$ ；

R^{13} 為 $-NR^1R^{12}$ 或 $-OR^{12}$ ；

且其中在前述基團中，任何含有非連接於鹵基、 SO 或 SO_2 基團或非連接於 N、O 或 S 原子之 CH_3 (甲基)、 CH_2 (亞甲基) 或 CH (次甲基) 的取代基皆可於該基團上任意帶有選自下列的取代基：羥基、鹵基、 C_1-C_4 烷基、 C_1-C_4 烷氧基及 $-NR^1R^2$ 。

在本發明之一特定的體系中，式 1 化合物的 A 原子團

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)


裝

訂

始


五、發明說明 (8)

係選自下列：



其中前述 A 原子團帶有 R^4 基團作為取代基且任意帶有 1 至 3 個 R^5 基團作為取代基。


式 1 化合物之其他特定體系包括其 A 係選自下列者



其中前述 A 原子團帶有 R^4 基團作為取代基且任意帶有 1 至 3 個 R^5 基團作為取代基。


式 1 化合物之其他特定體系包括其 A 係選自下列者

五、發明說明(9)




其中前述 A 原子團帶有 R^4 基團作為取代基且任意帶有 1 至 3 個 R^5 基團作為取代基。

式 1 化合物之其他特定體系包括其 A 係選自下列者



其中前述 A 原子團帶有 R^4 基團作為取代基且任意帶有 1 至 3 個 R^5 基團作為取代基。

式 1 化合物之其他特定體系包括其 A 係選自下列者



其中前述 A 原子團帶有 R^4 基團作為取代基且任意帶有 1 至 3 個 R^5 基團作為取代基。

式 1 化合物之其他特定體系包括其 R^4 為
 $-(C R^1 R^2)_m - C \equiv C - (C R^1 R^2)_t R^9$ 者，其中
 m 為 0 至 3 的整數且 t 為 0 至 5 的整數。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (10)

式 1 化合物之其他特定體系包括其 R^4 為

— ($C R^1 R^2$)_m — C = C — ($C R^1 R^2$)_t R^9 者，其中 m 為 0 至 3 的整數且 t 為 0 至 5 的整數。

式 1 化合物之其他特定體系包括其 R^4 為

— ($C R^1 R^2$)_m — C ≡ C — ($C R^1 R^2$)_k R^{13} 或
— ($C R^1 R^2$)_m — C = C — ($C R^1 R^2$)_t R^{13} 者，其中 m 為 0 至 3 的整數且 k 為 0 至 5 的整數。

式 1 之其他特定體系包括其 R^4 為 — C = N O R^{12} 或

— X^1 — R^{12} 者 (其中 X^1 為衍生自氮雜環丁烯、氮雜環丁烷或 $C_3 - C_4$ 碳環基團的二價基團) 或其 R^4 為
— ($C R^1 R^2$)_t R^9 者 (其中與 R^9 之連接點係 R^9 的碳原子) 。

式 1 化合物之其他特定體系包括其 R^8 係選自

— ($C R^1 R^2$)_r (苯基) 、 — ($C R^1 R^2$)_t (吡啶基) 、 — ($C R^1 R^2$)_t (嘧啶基) 、 — ($C R^1 R^2$)_t (咪唑基) 、 — ($C R^1 R^2$)_t (吡唑基) 及
— ($C R^1 R^2$)_t (苯并咪唑基) 者，其中 t 為 0 至 5 的整數，且前述 R^8 基團各可任意經 1 至 5 個 R^{10} 基團所取代。

式 1 化合物之其他特定體系包括其 R^9 為式 1 中所示之含有 1 至 3 個雜原子的 4 至 10 員雜環且該 R^9 可任意經 1 至 2 個 R^{11} 基團所取代者。

較佳的化合物係選自下列化合物：

乙酸 3 — [4 — (1 — 苯磺醯基 — 1 H — 咪唑 — 5 —

五、發明說明 (11)

基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 烯丙酯;

(1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基) - { 6 - [3 - (4 - 甲基 - 六氫吡啶 - 1 - 基) - 丙 - 1 - 炔基] - 喹啉 - 4 - 基 } - 胺;

(1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基) - [6 - (3 - 吡咯啉 - 1 - 基 - 丙 - 1 - 炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺;

4 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 4 - 醇;

(1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基) - (6 - 六氫吡啶 - 4 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺;

[6 - (4 - 胺基 - 四氫吡喃 - 4 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基) - 胺;

1 - 甲基 - 4 - { 4 - [3 - 甲基 - 4 - (吡啶 - 2 - 基甲氧基) - 苯胺基] - 喹啉 - 6 - 基乙炔基 } - 六氫吡啶 - 4 - 醇

1 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 4 - 甲基 - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇;

4 - { 4 - [4 - (1 - 苯基乙氧基) - 苯胺基] - 喹啉 - 6 - 基乙炔基 } - 四氫 - 吡喃 - 4 - 醇;

1 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 4, 4 - 二甲基 - 戊 - 1 - 炔

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (12)

— 3 — 醇；

4，4-二甲基-1-〔4-〔4-(1-苯基-乙氧基)-苯胺基]-噻唑啉-6-基]-戊-1-炔-3-醇；

3-〔4-〔1-(丙烷-2-磺醯基)-1H-吡啶-5-基胺基]-噻唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇；

1-甲基-3-〔4-(4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇；

3-〔4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇；

3-〔4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-1-吡咯啉-2-基-丙-2-炔-1-醇；

5-〔4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-4，4-二甲基-噁唑啉-2-酮；

4-胺基-1-〔4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-戊-1-炔-3-醇；

4-胺基-1-〔4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-4-甲基-戊-1-炔-3-醇；

3-〔2-4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-乙基]-六氫吡啶-3-醇；

五、發明說明 (13)

以及前述化合物之藥學上可接受之鹽類及溶劑化物。

依本發明，最佳的化合物包括選自下列者：

(+) - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡啶 - 3 (R) - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺；

(-) - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡啶 - 3 (S) - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺；

3 - (S) - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸甲基醯胺；

3 - (S) - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸甲基醯胺；

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 吡咯啶 - 3 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺；

3 - [4 - (5 - 甲基 - 6 - 苯氧基 - 吡啶 - 3 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

(-) - 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

(+) - 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

4 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 四氫 - 呋喃 - 4 - 醇；

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

裝

五、發明說明 (14)

{ 6 - [1 - (2 - 甲氧基 - 乙基) - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基] - 喹啉 - 4 - 基 } - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺 ;

[4 - (2 - 氟 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯基] - (6 - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺 ;

[4 - (3 - 氟 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯基] - (6 - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺 ;

(6 - 氮雜環丁烯 - 3 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺 ;

3 - { 4 - [4 - (2 - 氟 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺基] - 喹啉 - 6 - 基乙炔基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇 ;

3 - { 4 - [4 - (3 - 氟 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺基] - 喹啉 - 6 - 基乙炔基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇 ;

4 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 4 - 醇 ;

(3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺 ;

3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 8 - 氮雜雙環 [3 . 2 . 1] 辛 - 3 - 醇 ;

(3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡啶 - 4 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺 ;

五、發明說明 (15)

3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 吡咯啉 - 3 - 醇 ;

3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 7 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇 ;

以及前述化合物之藥學上可接受的鹽類及溶劑化物。

其他之較佳化合物係選自下列者 :

N - { 3 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 乙醯胺 ;

N - { 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 乙醯胺 ;

(3 - { 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 3 - 氮雜雙環 [3 . 1 . 0] 己 - 6 - 基) - 甲醇 ;

4 - { 3 - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸甲基醯胺 ;

{ 6 - [3 - (1 , 1 - 二酮基 - 1 - 硫嗎福啉 - 4 - 基) - 丙 - 1 - 炔基] - 喹啉 - 4 - 基 } - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺 ;

1 - { 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 六氫吡啶 - 4 - 醇 ;

N - { 1 - 甲基 - 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 乙

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (16)

醯胺；

N - { 3 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基)
- 喹啉 - 6 - 基] - 1 - 甲基 - 丙 - 2 - 炔基 } - 乙醯
胺；

N - { 1 , 1 - 二甲基 - 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4
- 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基
} - 乙醯胺；

4 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺
基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 1 - 甲基 - 六氫吡啶 -
4 - 醇；

3 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺
基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

3 - [4 - (3 - 溴 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉
- 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

3 - [4 - (4 - 苯磺醯基 - 3 - 甲基 - 苯胺基) -
喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

3 - [4 - (4 - 環己氧基 - 3 - 甲基 - 苯胺基) -
喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

2 - 甲基 - 4 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯
胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丁 - 3 - 炔 - 2 - 醇；

2 - 胺基 - 4 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯
胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丁 - 3 - 炔 - 1 - 醇；

3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯基硫烷基 - 苯胺基)
- 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

修

五、發明說明 (17)

以及前述化合物之藥學上可接受之鹽類及溶劑化物。

本發明之其他較佳化合物包括選自下列者：

3 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 氟 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

3 - [4 - (3 - 乙炔基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 - 甲基 - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺；

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (2 - 六氫吡啶 - 3 - 基乙基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺；

3 - { 2 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 乙基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

3 - [4 - (4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇；

3 - 酮基 - 5 - (4 - 吡咯啶 - 1 - 基 - 丁基) - 1 , 2 , 3 , 5 - 四氫 - 苯并 [4 , 5] 咪唑并 [1 , 2 - a] 吡啶 - 4 - 羧酸苯甲基醯胺，

以及前述化合物之藥學上可接受的鹽類及溶劑化物。

本發明亦關於一種供治療哺乳動物（包括人類）體內之異常細胞生長的方法，其包含將可有效治療異長細胞生長之量的前文所定義式 1 化合物投予該哺乳動物。在此方法的一體系中，該異長細胞生長係為癌症，包括（但非侷限於下文所列舉者）：肺癌、骨癌、胰臟癌、皮膚癌、頭

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

備

五、發明說明（18）

或頸部的癌症、皮膚或眼內黑瘤、子宮癌、卵巢癌、直腸癌、肛門部位的癌症、胃癌、結腸癌、乳癌、輸卵管的癌瘤、子宮內膜的癌瘤、子宮頸的癌瘤、陰道的癌瘤、女陰的癌瘤、惡性肉芽腫、食道的癌瘤、小腸的癌症、內分泌系統的癌症、甲狀腺的癌症、副甲狀腺的癌症、腎上腺的癌症、軟組織的肉瘤、尿道的癌症、陰莖的癌症、前列腺癌、慢性或急性白血病、淋巴球的淋巴瘤、膀胱的癌症、腎或輸尿管的癌症、腎細胞癌瘤、腎盂的癌瘤、中樞神經系統（CNS）的贅瘤、原發性CNS淋巴瘤、脊椎腫瘤、腦幹神經膠瘤、垂體腺瘤或是前述一或多種癌症的組合。在該方法的另一體系中，該異常細胞生長係為良性增生性疾病，包括（但不侷限於下為所列舉者）：牛皮癬、良性前列腺肥大或再狹窄。

本發明亦關於一種供治療哺乳動物體內之異常細胞生長的方法，其包含將可有效治療異常細胞生長之量的前文所定義式1化合物連同選自下列之抗腫瘤劑：絲狀分裂抑制劑、烷化劑、抗新陳代謝物、嵌入抗生素、生長因子抑制劑、細胞周期抑制劑、酶、拓撲異構酶抑制劑、生物反應調節物、抗體、細胞毒素、抗激素及抗雄激素，投予該哺乳動物。

本發明亦關於一種供治療哺乳動物（包括人類）體內之異常細胞生長的藥學組成物，其包含可有效治療異常細胞生長之一定量的前文所定義式1化合物或其藥學上可接受的鹽類或溶劑化物以及藥學上可接受之載體。在該組成

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

裝

五、發明說明 (19)

物的體系之一中該異常細胞生長係癌症，包括（但非侷限於下文所列舉者）：肺癌、骨癌、胰臟癌、皮膚癌、頭或頸部的癌症、皮膚或眼內黑瘤、子宮癌、卵巢癌、直腸癌、肛門部位的癌症、胃癌、結腸癌、乳癌、輸卵管的癌瘤、子宮內膜的癌瘤、子宮頸的癌瘤、陰道的癌瘤、女陰的癌瘤、惡性肉芽腫、食道的癌瘤、小腸的癌症、內分泌系統的癌症、甲狀腺的癌症、副甲狀腺的癌症、腎上腺的癌症、軟組織的肉瘤、尿道的癌症、陰莖的癌症、前列腺癌、慢性或急性白血病、淋巴球的淋巴瘤、膀胱的癌症、腎或輸尿管的癌症、腎細胞癌瘤、腎盂的癌瘤、中樞神經系統（CNS）的贅瘤、原發性CNS淋巴瘤、脊椎腫瘤、腦幹神經膠瘤、垂體腺瘤或是前述一或多種癌症的組合。在該藥學組成物的另一體系中，該異常細胞生長係為良性增生性疾病，包括（但不侷限於下為所列舉者）：牛皮癬、良性前列腺肥大或再狹窄。

本發明還關於一種供治療哺乳動物（包括人類）體內之異常細胞生長的藥學組成物，其包含可有效治療異常細胞生長之一一定量的前文所定義式1化合物或其藥學上可接受的鹽類或溶劑化物以及藥學上可接受之載體，還有選自下列的抗腫瘤劑：絲狀分裂抑制劑、烷化劑、抗新陳代謝物、嵌入抗生素、生長因子抑制劑、細胞周期抑制劑、酶、拓撲異構酶抑制劑、生物反應調節物、抗體、細胞毒素、抗激素及抗雄激素。

本發明亦關於供製備式1化合物及其藥學上可接受之

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）


裝

訂

備


五、發明說明 (20)

鹽類及溶劑化物的方法




式中，A、X、R¹、R⁴及R³係如前文所定義

此方法包含：(a) 令式 1 或 2 之化合物與式 3 化合物反應



式中，Z為離去基且A、X、R¹、R⁴及R³如前文所定義，或是(b)令式 7 化合物與式 3 化合物反應




式中，X、R¹、A、R⁴及R³如前文所定義且Z¹係活化基團，以得到式 5 之中間產物

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (21)



式中， Z^1 、 X 、 R^1 、 A 及 R^3 如前文所定義且 Z^1 係轉化為 R^4 基團。

除非另有說明，本文所用的「異常細胞生長」一詞係指獨立於正常調節機構之外的細胞生長（例如，接觸抑制的喪失）。這包括了下列細胞的異常生長：（1）藉由突變之酪氨酸激酶的表現或受體酪氨酸激酶之過度表現而增生的腫瘤細胞（腫瘤）；（2）有畸型酪氨酸激酶活化作用發生之其他增生性疾病的良性及惡性細胞；（4）藉由受體酪氨酸激酶增生之任何腫瘤；（5）藉由畸型絲氨酸／蘇氨酸激酶活化而增生之任何腫瘤；以及（6）有畸型絲氨酸／蘇氨酸激酶活化作用發生之其他增生性疾病的良性及惡性細胞。

本文所用的「治療」一詞，除非另有說明，係指此詞所應用之病症或狀況或如是病症或狀況之一或多種徵候的反轉、減緩、進展的抑制或預防。除非另有說明，本文所用的「治療處理」係指前文所定義之「治療」的治療動作。

除非另有說明，本文所用的「鹵基」一詞係指氟基、氯基、溴基或碘基。較佳的鹵基為氟基、氯基及溴基。

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

線

五、發明說明 (22)

除非另有說明，本文所用的「烷基」一詞係包括具有直鏈、支鏈或環狀部分（包括稠合的及橋接的雙環及螺環部分）或前述部分之組合的飽和單價烴類原子團。若一烷基團含有環狀部分，則該基團必須至少具有 3 個碳原子。

除非另有說明，本文所用的「烯基」一詞係包括具有至少一個碳－碳雙鍵的烷基原子團（其中該烷基係如前文所定義者），包括該烯基原子團的 E 及 Z 異構物。

除非另有說明，本文所用之「炔基」一詞係包括具有至少一個碳－碳叁鍵的烷基原子團，其中該烷基係如前文所定義。

除非另有說明，本文所用之「烷氧基」一詞係包括 O－烷基原子團，其中該烷基係如前文所定義者。

除非另有說明，本文所用之「芳基」一詞係包括由芳基烴類去除一個氫所衍生得的有機原子團，諸如，苯基或萘基。

除非另有說明，本文所用之「4－10 員雜環」係包括芳族及非芳族之含有 1 至 4 個選自 O、S 及 N 之雜原子的雜環基團，其中各雜環基團在其環系統中含有 4 至 10 個原子，但先決條件為：彼等基團之環不含有相鄰的 O 或 S 原子。非芳族雜環基團包括在其環系中只含有 4 個原子的基團，但芳族基團則在其環系統中必須含有至少 5 個原子。該雜環基團包括與苯稠合的環系統。4 員雜環基團的例子之一為氮雜環丁烯基（衍生自氮雜環丁烯）。5 員雜環基團的例子之一為噻唑基，而 10 員雜環的例子之一為喹

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

始

五、發明說明 (23)

唑啉基。非芳族雜環基團的例子有：吡咯啉基四氫呋喃基、二氫呋喃基、四氫噻吩基、四氫哌喃基、二氫哌喃基、四氫硫哌喃基、N-六氫吡啶基、嗎福啉基、硫嗎福啉基、氧硫雜苯烷基 (thioxanyl)、六氫吡嗪基、氮雜環丁烯基、氧雜環丁烷基、硫雜環丁烷基、高六氫吡啶基、氧雜環丙烷基 (oxepanyl)、硫雜環丙烷基 (thiepanyl)、氧氮雜草基、二氮雜草基、硫氮雜草基、1, 2, 3, 6-四氫吡啶基、2-吡咯啉基、3-吡咯啉基、吲哚啉基、2H-哌喃基、4H-哌喃基、二噁烷基、1, 3-二噁茂酮基、吡唑啉基、二噻烷基、二硫茂環基、二氫哌喃基、二氫噻吩基、二氫呋喃基、吡啶啉基、咪唑啉基、咪唑啉基、3-氮雜雙環〔3.1.0〕己基、3-氮雜雙環〔4.1.0〕庚基、氮雜雙環〔2.2.2〕己基、3H-吲哚基及噻吡基。芳族雜環基團的例子有：吡啶基、咪唑基、嘧啶基、吡啶基、三唑基、吡嗪基、四唑基、呋喃基、噻吩基、異噻唑基、噻唑基、噻唑基、異噻唑基、吡咯基、喹啉基、異喹啉基、吲哚基、苯并咪唑基、苯并呋喃基、噻啉基、吲哚基、吲哚基、吡嗪基、噻吡基、三吡基、異吲哚基、噻啶基、噻啶基、噻二唑基、噻二唑基、呋咭基、苯并呋咭基、苯并硫苯基、苯并噻唑基、噻唑啉基、噻啶基、萘啶基及呋喃并吡啶基。由前文所列出基團的基團在可能的範圍內，可為C-連接或N-連接者。例如，衍生自吡咯的基團可為吡咯-1-基 (N-連接者) 或吡咯-3-基 (C-連接者)。此外，衍生自咪

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (24)

唑的基團可為咪唑 - 1 - 基 (N - 連接者) 或咪唑 - 3 - 基 (C - 連接者) 。其中 2 個環碳原子被酮基 (= O) 原子團所取代之雜環基團的一例為 1, 1 - 二酮基 - 硫嗎福啉基。

除非另有說明，本文所用的「藥學上可接受之鹽 (類) 」包括可能出現於式 1 化合物中之酸或鹼基的鹽類。本質為鹼性之式 1 化合物能夠和各種無機及有機酸形成各種鹽類。可用於形成如是式 1 鹼性化合物之藥學上可接受酸加成鹽類的酸類為可形成無毒性酸加成鹽類者，即含有藥學上可接受之陰離子的鹽類，諸如，乙酸鹽、苯磺酸鹽、苯甲酸鹽、碳酸氫鹽、硫酸氫鹽、酒石酸氫鹽、硼酸鹽、溴化物、艾得特酸鈣 (calcium edetate)、卡姆夕酸鹽 (camsylate)、碳酸鹽、氯化物、卡拉烏藍酸鹽 (clavulanate)、檸檬酸鹽、二氫氯化物、艾得特酸鹽 (edetate)、艾迪斯酸鹽 (edislyate)、艾斯托酸鹽 (estolate)、艾夕酸鹽 (esylate)、乙基琥珀酸鹽、富馬酸鹽、格魯瑟普特酸鹽 (gluceptate)、葡萄糖酸鹽、穀胺酸鹽、乙醇醯對氨苯基肼酸鹽、己基間苯二酚化物、海得拉伯胺 (hydrabamine)、氫溴化物、氫氯化物、碘化物、異硫逐酸鹽、乳酸鹽、乳糖醛酸鹽、月桂酸鹽、蘋果酸鹽、馬來酸鹽、杏仁酸鹽、甲磺酸鹽、甲基硫酸鹽、黏酸鹽、萘磺酸鹽、硝酸鹽、油酸鹽、草酸鹽、雙羥萘酸鹽、棕櫚酸鹽、泛酸鹽、磷酸鹽 / 二磷酸鹽、聚半乳糖醛酸鹽、柳酸鹽、硬脂酸鹽、鹼式乙酸鹽、琥珀酸鹽、單寧酸鹽、酒

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (25)

石酸鹽、堤歐克酸鹽 (teoclalte)、甲苯磺酸鹽、翠頁塞歐豆得 (triethiodode)、以及戊酸鹽。由於本發明之單一化合物可能包括一個以上的酸性或鹼性原子團，所以本發明之化合物在一單一化合物中可能包括單一、二一或三一鹽類。

本發明之化合物中本質為酸性者能夠與各種藥理上可接受的陽離子形成鹼式鹽類。如是鹽類的例子包括本發明化合物的鹼金屬或鹼土金屬鹽類，尤指鈣、鎂、鈉及鉀鹽類。

在使用了諸如 $(C R^1 R^2)_q$ 或 $(C R^1 R^2)_t$ 等術語之式 1 化合物中， R^1 及 R^2 係隨著大於 1 之 q 或 t 之重覆而變化。例如，當 q 或 t 為 2 時， $(C R^1 R^2)_q$ 或 $(C R^1 R^2)_t$ 可等於 $-CH_2CH_2-$ 或 $-CH(CH_3)C(CH_2CH_3)(CH_2CH_2CH_3)-$ 或是任何數目之在 R^1 及 R^2 定義範圍內的類似原子團。此外，如前文曾提及者，任何包含 CH_3 (甲基)、 CH_2 (亞甲基) 或 CH (次甲基) 基團且彼等基團不連接於鹵基、 SO 或 SO_2 基團或不連接於 N 、 O 或 S 原子之取代基可任意在前述基團上帶有選自羥基、 $C_1 - C_4$ 烷氧基及 $-NR^1R^2$ 的取代基。

在 R^4 係 $-(C R^1 R^2)_t - C R^1 R^{11} R^{12}$ 的前述式 1 化合物中，若其為單環，則該 R^{12} 基團宜經由一碳原子；若其為雙環，則該 R^{12} 基團可經由一碳原子或氮原子來連接。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

裝

五、發明說明 (26)

某些式 1 化合物可具有不對稱中心，因此可以各種不同的鏡像異構形式存在。式 1 化合物之所有旋光異構物及立體異構物以及彼等之混合物都視為在本發明的範圍內。關於式 1 化合物，本發明包括了消旋混合物、一或多種鏡像異構形式、一或多種非鏡像異構形式或彼等之混合物的用途。式 1 化合物亦可以互變異構物的形式存在。本發明係關於所有如是互變異構物及彼等混合物的用途。

本發明之標的亦包括了同位素標幟化合物，彼等係與式 1 所定義之化合物相同，但其中有一或多個原子被原子質量或質量數與自然界常見之原子質量或質量數不同的原子所取代。可併入本發明化合物的同位素例子包括氫、碳、氮、氧、磷、氟及氯的同位素，分別諸如， ^2H 、 ^3H 、 ^{13}C 、 ^{14}C 、 ^{15}N 、 ^{18}O 、 ^{17}O 、 ^{31}P 、 ^{32}P 、 ^{35}S 、 ^{18}F 及 ^{36}Cl 。含有前述同位素及或其他原子之其他同位素的本發明化合物、其前驅藥物以及該化合物或該前驅藥物之藥學上可接受的鹽類皆在本發明的範圍內。某些本發明之同位素標幟化合物，例如，併有諸如 ^3H 及 ^{14}C 之放射性同位素的化合物可用於藥物及／或受質組織分佈的分析。由於易於製備及可偵測性，經氘化（即 ^3H ）及碳- ^{14} （即 ^{14}C ）同位素係特別較佳者。此外，由於新陳代謝安定性較高，以較重的同位素，諸如，氘（即 ^2H ），來取代，可提供某些治療上的優點，例如，增加活體內半衰期或減少劑量的需求，因此，在某些情況下，係較佳者。同位素標幟之本發明式 1 化合物及彼等之前驅藥物通常可

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

備

五、發明說明 (27)

藉由下文所述之流程及或實施例所示之程序，用易於取得之同位素標幟試劑來取代非同位素標幟的試劑，來製備。


(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (28)

流程 1

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)


裝

訂

始

五、發明說明 (29)

流程 2



(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (30)

發明之詳述

可供參照之製備本發明化合物的一般合成方法係提供於美國專利第 5,747,498 號 (1998 年 5 月 5 日授予專利)、美國專利申請案第 08/953078 號 (1997 年 10 月 17 號申請)、WO 98/02434 (1998 年 1 月 22 日公告)、WO 98/02438 (1998 年 1 月 22 日公告)、WO 96/40142 (1996 年 12 月 19 日公告)、WO 96/09294 (1996 年 3 月 6 日公告)、WO 97/03069 (1997 年 1 月 30 日公告)、WO 95/19774 (1995 年 7 月 27 日) 及 WO 97/13771 (1997 年 4 月 17 日公告)。前述專利及專利申請案係以整體併入本文作為參考。某些起始物可藉由習於此藝之士所熟悉的方法製得，且某些合成上的變更係根據習於此藝之士所熟悉的方法來進行的。供製備 6-碘基喹啉酮的標準程序可見於 Stevenson, T.M., Kazmierczak, F., Leonard, N. J., J. Org. Chem. 1986, 51, 5, p. 616。經鈀催化之硼酸偶合係記載於 Miyaura, N., Yanagi, T., Suzuki, A. Syn. Comm. 1981, 11, 7, p. 513。鈀催化之海克偶合(Heck couplings)係記載於 Hect et. al. Organic Reactions, 1982, 27, 345 或是 Cabri et al., Acc. Chem. Res. 1995, 28, 2。至於經鈀催化之將端炔化合物偶合為芳基鹵化物的反應可見於：Castro et. al. J. Org. Chem. 1963, 28, 3136, 或 Sonogashira et. al. Synthesis, 1977,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (31)

777。至於烷基及環烷基鋅試劑的形成，習於此藝之士會參照 Rieke, R.D., Hanson, M. V., Brown, J.D., Niu, Q. J., J. Org. Chem., 1996, 61, 8, p. 2726。氮雜環丁烯基鋅化學可採用 Billotte, S. Synlett, 1998, 379 的方法來進行。端炔化合物的合成則可如下列文獻所記載者，使用經適當取代／保護的醛化合物來進行：Colvin, E.W. J. et. al., Chem. Soc. Perkin Trans. I, 1977, 869; Gilbert, J. C. et. al. J. Org. Chem., 47, 10, 1982; Hauske, J. R. et. al., Tet. Lett., 33, 26, 1992, 3715; Ohira, S. et. al., J. Chem. Soc. Chem. Commun., 9, 1992, 721; Trost, B. M. J. Amer. Chem. Soc., 119, 4, 1997, 698; 或 Marshall, J. A. et. al., J. Org. Chem., 62, 13, 1997, 4313。

另外，端炔化合物亦可藉由二步程序來製備。首先，如下列文獻所示者，將 T M S（三甲基單矽烷基）之鋰陰離子加成至經適當取代的酮或醛：Nakatani, K. et. al., Tetrahedron, 49, 9, 1993, 1901。然後，如下列文獻所述者，採用以鹼來去保護的方法，將中間產物之端炔化合物分離出來：Malacria, M., Tetrahedron, 33, 1977, 2813; 或 White, J. D. et. al., Tet. Lett., 31, 1. 1990, 59。芳基胺（諸如，苯氧基苯胺、苯甲氧基苯胺、苯基磺醯基吡啶、苯甲基吡啶或苯甲基吡啶）之製備可藉由將對應的硝基中間產物還原，來進行。芳族硝基的還原可藉由下列文獻所概述的方法來進行：Brown, R. K., Nelson, N. A., J. Org. Chem. 1954, p. 5149; Yuste, R., Saldana, M, Walls, F., Tet. Lett. 1982, 23, 2, p.

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

線

五、發明說明 (32)

147 或前文曾提及之 WO 96/09294。經硝基取代之 N 1 - 苯基磺醯基吡啶 / 吡啶化合物可藉由在下列文獻中所發現到的方法製備： Sundberg, R. J., Bloom, J. D., J. Org. Chem. 1980, 45, 17, p. 3382; Ottoni, O. et. al., Tetrahedron, 1998, 54, 13915; 或 Dale L. et. al., J. Org. Chem. 55, 4, 1990, 1379。經取代之硝基 N 1 - 苯甲基吡啶 / 吡啶藉由下列文獻中的方法來製備： Makosza, M.; Owczarczyk, Z., J. Org. Chem., 54, 21, 1989, 5094; Adebayo, Adelaide T. O. M. et al., J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 1989, 1415；或前文曾提及之 WO 98 / 02434。苯甲氧基 - 硝基苯中間產物可藉由前文曾提及之 WO 98 / 02434 所揭示的方法製備。另外，芳基甲氧基 - 或芳氧基 - 硝基苯衍生物可如下列文獻所述者，鹵基硝基苯衍生物先質為起始物，藉由鹵化物與適當醇之親核置換反應製備： Dinsmore, C.J. et. al., Biorg. Med. Chem. Lett., 7, 10, 1997, 1345; Loupy, A. et. al., synth. Commun., 20, 18, 1990, 2855; 或 Brunelle, D. J., Tet. Lett., 25, 32, 1984, 3383。

其合成方法未於前文特別說明之起始物係在市面上可購得者或是可藉由習於此藝之士所熟知的方法製得。

在前文之流程中所討論到或例示的各反應中，除非另有特別說明，壓力並無特別要求。由 0.5 大氣壓至約 5 大氣壓的壓力一般都可接受，且以方便的觀點而言，較佳者為周圍壓力，即約 1 大氣壓。

當式 $\text{H N R}^1 \text{R}^3$ 所示之化合物為經任意取代之吡啶或

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (33)

吡啶時，如是之化合物可依習於此藝之士已知之一或多
種方法製得。如是之方法係揭示於 P C T 國際專利申請公
開案號 W O 9 5 / 2 3 1 4 1 及 W.C. Sumpter 及 F.M.
Miller, "Heterocyclic Compounds with Indole and Carbazole
Systems", volume 8 of "The Chemistry of Heterocyclic
Compounds", Interscience publishers Inc., New York (1954)。
在流程 1 所示的偶合步驟之前或之後，視需要，可導入任
意的取代基。在偶合步驟之前，宜使用習於此藝之士已知
的氮保護基將一級及二級胺基原子團（非前述式
 $H N R^1 R^2$ 所示之胺）保護起來。如是之保護基及彼等之
用途係揭示於 T.W. Greene and P.G.M. Wuts, "Protective
Groups in Organic Synthesis", Second Edition, John Wiley &
Sons, New York, 1991。

參照前文之流程 1，式 1 化合物可藉令式 2 化合物〔
其中，X、A 及 R^4 係如前文所定義且 Z 為離去基，諸如，
經取代的苯氧基衍生物（該取代基可為鹵基、氰基硝基及
／或 $C_1 - C_6$ 烷基）或氨基〕與式 3 之胺（其中 R^1 及 R^3
如前文所定義），在無水溶劑中〔尤指選自 D M F（N，
N - 二甲基甲醯胺）、D M E（乙二醇二甲醚）、D C E
（二氯乙烷）、第三丁醇及酚的溶劑〕或彼等溶劑之混合
物中、約 $50 - 150^\circ C$ 的溫度下，進行偶合反應 1 小時
至 48 小時而製得。式 3 化合物可藉由習於此藝之士已知
的方法製得，諸如，腓的還原、亞胺類或烯胺類的還原、
肟類、一級及二級醯胺類的還原、硝基的還原或是

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

始

五、發明說明 (34)

R^1NH_2 及 $R^3CH(O)$ 或 R^3NH_2 及 $R^1CH(O)$ 之還原性胺化。式 2 化合物可藉由以一偶合夥伴，諸如端炔化合物、端烯化合物、乙烯基鹵化物、乙烯基錫烷、乙烯基硼烷、烷基硼烷或是烷基或烯基鋅試劑，處理式 4 化合物（參見流程 2）〔其中 Z^1 為活化基團，諸如，溴基、碘基、 $-N_2$ 或 $-OTF$ （其為 $-OSO_2CF_3$ ）或活化基的前體，諸如， NO_2 、 NH_2 或 OH 〕而製得。

在另一可採行的方式中，式 1 化合物係藉依循流程 2 所示的合成方法製備。在流程 2 中，式 8 化合物（其中 X 為 NH ）可依前文曾提級之 WO 95 / 19774 所揭示的程序，由式 9 化合物（其中 A 及 Z^1 係如前文所定義且 Z^3 係 NH_2 、 $C_1 - C_6$ 烷氧基或 OH ）製得，且式 8 化合物（其中 X 為 CH ）可依前文曾提及之

WO 95 / 19774 所記載的程序，由式 10 化合物（其中 A 及 Z^1 如前文所定義）製得。式 8 化合物可藉由下列方法轉化為式 7 化合物：在鹵化溶劑中、約 $60^\circ C$ 至 $150^\circ C$ 範圍內的溫度下，用氯化劑來處理該起始物約 2 至 24 小時。而該式 7 化合物可藉由下列程序轉化為式 6 化合物：在溶劑中（諸如，DMF 或酚）、約 $0^\circ C$ 至 $100^\circ C$ 範圍內的溫度下，用適當的金屬苯氧化物（諸如，苯氧化鈉）處理該起始物約 2 至 24 小時。式 6 化合物可與一偶合夥伴（諸如，端炔化合物、端烯化合物、乙烯基鹵化物、乙烯基錫烷、乙烯基硼烷、烷基硼烷或是烷基或烯基鋅試劑）反應，以提供式 2 化合物。然後，式 2 化

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

始

五、發明說明 (35)

合物可藉由與式 3 化合物偶合而轉化為式 1 化合物。另外，式 1 化合物可藉由端炔化合物、端烯化合物、乙烯基鹵化物、乙烯基錫烷、乙烯基硼烷、烷基硼烷或是烷基或烯基鋅試劑與式 7 化合物反應而形成式 1 1 之中間產物的反應製得。式 1 1 中間產物接著可與式 3 之胺偶合而形成式 1 化合物。還有另一個可供選用之合成式 1 衍生物的方式係令氨基喹啉 7 與胺 3 偶合，接著令中間產物 5 與端炔化合物、端烯化合物、乙烯基鹵化物、乙烯基錫烷、乙烯基硼烷、烷基硼烷或是烷基或烯基鋅試劑偶合。

本發明之化合物具有不對稱碳原子。藉由習於此藝之士已知的方法，例如，層析法或分晶法，基於物化性質的差異，可將非鏡像異構混合物分離為各別的非鏡像異構物。鏡像異構物的單離方法為：藉由與適當之具有旋光性的化合物（例如，醇類）的反應，將鏡像混合物轉化為非鏡像混合物、分離出非鏡像物並將各別的非鏡像異構物轉化（例如，水解）為對應的鏡像異構物。所有的如是異構物（包括非鏡像異構混合物及純鏡像異構物）皆被視為本發明的一部分。

本質為鹼性的式 1 化合物能夠與各種無機及有機酸類形成範圍廣泛的各種不同鹽類。雖然如是之鹽類必須是藥學上可接受的以供動物的投服，然而在實務上，通常較佳的是，先由反應混合物，將式 1 化合物以藥學上無法接受之鹽類的形式單離出來，然後，藉由鹼性試劑的處理，簡單地將該藥學上無法接受之鹽類轉化回自由鹼並接著將該

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

編

五、發明說明（36）

自由鹼轉化為藥學上可接受之酸加成鹽類。本發明之鹼化合物的酸加成鹽類可藉由在含水的溶劑介質中或在適當的有機溶劑中（諸如，甲醇或乙醇），以實質上等量的之選定的無機或有機酸處理該鹼化合物，而輕易製得。在小心地蒸發掉溶劑後，即可輕易獲得所要的固體鹽類。所要的酸加成鹽亦可藉由添加適當的無機或有機酸至該自由鹼於有機溶劑所形成的溶液，而沉澱析出。

本質為酸性之式 1 化合物能夠與各種藥理上可接受之陽離子形成鹼式鹽類。如是鹽類的例子包括鹼金屬或鹼土金屬鹽類，尤指鈉及鉀鹽類。此等鹽類皆係由習知技術製得。可用於製備本發明之藥學上可接受之鹼式鹽類的化學鹼係與式 1 之酸性化合物形成無毒性鹼式鹽者。如是之無毒性鹼式鹽類包括衍生自諸如鈉、鉀、鈣及鎂等藥理上可接受之陽離子者。此等鹽類可輕易地藉由下列方法製得：用含有所要之藥理上可接受之陽離子的水溶液處理對應的酸性化合物，然後，將所得之溶液蒸發至乾（宜於減壓下進行）。另外，彼等鹽類亦可藉由下列方法製得：將該酸性化合物之低級醇溶液與所要之鹼金屬烷氧化物混合在一起，然後，依前述方法相同的方式，將所得之溶液蒸發至乾。在前述任一情況下，所用之試劑的化學計量皆以能夠確保反應完全且所要之最終產物的產量達最大者為宜。由於本發明之單一化合物可包括一個以上的酸性或鹼性部分，因此，本發明之化合物可在單一化合物中包括單一、二或三鹽類。

五、發明說明 (37)

本發明之化合物為 e r B 系列之致癌及原致癌性蛋白質酪氨酸激酶〔諸如，上皮細胞生長因子受體 (E G F R)、e r b B 2、H E R 3 或 H E R 4〕的強力抑制劑，因此，皆適於治療用途，作為哺乳動物（尤指人類）體的抗增生劑（例如，抗癌劑）。詳而言之，本發明之化合物可用於預防及治療多種人類的增生過度性疾病，諸如，肝、腎、膀胱、乳房、胃、卵巢、結腸直腸、前列腺、胰臟、肺、女陰、甲狀腺、肝癌、肉瘤、神經膠母細胞瘤、頭部及頸部的惡性及良性腫瘤，以及其增殖性狀況，諸如，皮膚之良性增殖（例如，牛皮癬）以及前列腺的良性增殖（例如，B P H）。此外，本發明之化合物還預期具有對抗多種白血病及淋巴惡性的活性。

本發明之化合物還可用於治療涉及與各種蛋白質酪氨酸激酶相關之畸形表現配體／受體相互作用或活化或發訊息事件的其他疾病。如是之疾病包括涉及 e r b B 酪氨酸激酶之畸形功能、表現、活化或發訊息之神經單位、神經膠、星細胞、及其他淋巴腺、巨噬細胞、上皮、基質及胚囊腔性質的疾病。此外，本發明之化合物在炎性、血管性及免疫性及疾病上亦具有治療上的利用性，彼等疾病涉及已經鑑定出及未鑑定出之可被本發明之化所抑制的酪氨酸激酶。

式 1 化合物的體外活性可藉由下列程序予以測定。

c - e r b B 2 酪氨酸激酶係與前文曾提及之 Schrang et. al., Anal. Biochem. 211, 1993, p233-239 所述者相類似。

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

備

五、發明說明 (38)

藉由在 37 °C 下的隔夜培養，將 100 ml / 孔之 0.25 mg / ml 在 PBS (經磷酸鹽緩衝的鹽水) 中的 Poly(Glu,Tyr) 4:1 (PGT)(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) 塗覆於 Nunc MaxiSorp 96 孔培養平盤中。用抽吸法，去除過多的 PGT，並用清洗緩衝液 (0.1% Tween 20，於 PBS 中)，清洗平盤三次。於 50 ml 之含有 125 mM 氯化鈉、10 mM 氯化鎂、0.1 mM 鄰釩酸鈉、1 mM ATP、0.48 mg / ml (24 ng / 孔) 之 cerb B2 細胞內功能部位的 50 mM HEPES (pH 7.5) 中，進行激酶反應。該 cerb B2 酪氨酸激酶的細胞內功能部位 (胺基酸 674 - 1255) 係於桿病毒內，表現為 GST 融合蛋白質且藉由結合至經穀胱甘肽塗覆的球粒及洗提，而予以純化。添加在 DMSO (二甲亞砜) 中的化合物，以產生約 0.25% 之最終 DMSO 濃度。藉由添加 ATP 來起始磷酸化反應，並在室溫下進行 6 分鐘，同時持續地搖晃。藉由反應混合物的抽吸，來終止該激酶反應並接著用清洗緩衝液 (參見前文) 來進行清洗。藉由以 50 ml / 孔之 HRP - 結合的 PY54 (Oncogene Science Inc. Uniondale, NY) 抗磷酸酪氨酸抗體 [於封阻緩衝液 (3% BSA 及 0.05% Tween 20，於 PBS 中) 中稀釋為 0.2 mg / ml]，進行 25 分鐘的培養，以測量磷酸化的 PGT。藉由抽吸法，去除抗體，並用清洗緩衝液清洗平盤 4 次。藉由添加 TMB Microwell 過氧酶基質 (

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (39)

Kirkegaard and Perry, Gaithersburg, MD) (每孔 5 0 m l) 來展現出比色訊號，而以添加 0 . 0 9 M 之硫酸 (5 0 m l / 孔) 來予以終止。藉由測量在 4 5 0 n m 之吸收來評估磷酸酪氨酸。對照組的訊號在孔內實質上為無背景值以及無 P G T 的情況下，一般為 0 . 6 - 1 . 2 吸收單位，且與 1 0 分鐘培養的時間成比例。藉由降低無抑制劑之孔的訊號來鑑定抑制劑且測量相當於達到 5 0 % 抑制所需之化合物濃度的 I C ₅₀ 值。

式 1 化合物在活體內的活性可藉由測定受試化合物相對於對照組之抑制腫瘤生長的量來決定。依 Corbett T.H., et. al., "Tumor Induction Relationships in Development of Transplantable Cancers of the Colon in Mice for Chemotherapy Assay, with a Note on Carcinogen Struture", Cancer Res., 35, 2434-2439(1975)及 Corbett T.H., et al., "A Mouse Colon-tumor Model for Experimental Therapy", Cancer Chemother. Rep. (Part 2)", 5, 169-186(1975)的方法，稍加修飾，以測量各種化合物之抑制腫瘤生長的效果。藉由在左脇腹，經皮下注射 1 - 5 百萬指數期 (million log phase) 之經培養的腫瘤細胞 (鼠 F R E - E r b B 2 細胞或人類 S K - O V 3 卵巢癌細胞) (懸浮於 0 . 1 m l 之 R P M I 1 6 4 0 培養基中)，以誘發腫瘤。在經過足以使腫瘤變成可觸知者 (1 0 0 - 1 5 0 m M³ 的大小，直徑為 5 - 6 m m) 的時間後，用受試化合物 (調配為在 Gelucire 中之 1 0 至 1 5 m g / m l 的濃度)，經腹膜內 (

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

的

五、發明說明 (40)

i p) 或經口 (p o) 的投服途徑，來治療受試的動物 (無胸腺的雌鼠)，每天投藥一或二次，連續投服 7 至 10 天。爲了測定抗腫瘤的效果，用 Vernier 彎腳規，橫跨二個直徑來射測量腫瘤 (以 m m 爲單位) 並用下列算式來計算腫瘤的大小 (m m ³)：腫瘤大小 (m m ³) = (長 x [寬] ²) / 2，此乃根據 Geran, R.I., et. al., "Protocols for Screening Chemical Agents and Natural Products Against Animal Tumors and Other Biological Systems", Third Edition, Cancer Chemother. Rep., 3, 1-104(1972)的方法。結果依下式，以抑制 % 來表示：抑制 (%) = (T u W_{對照組} - T u W_{受試組}) / T u W_{對照組} x 100 %。植入腫瘤的腹脇部位對於各種化學治療劑提供了可再現的劑量 / 反應效果，且該測量方法 (腫脹直徑的測量) 爲評估腫瘤生長速率之可信賴的方法。

本發明之化合物 (下文稱爲活性化合物) 的投服可藉由任何可將化合物傳遞至作用部位的方法來進行。此等方法包括有：口服途徑、經十二指腸的途徑、非經腸注射 (包括有靜脈、皮下、肌下、血管內或浸入)、局部、及直腸投藥法。

所投服之活性化合物的量將取決於接受治療的患者、疾病或狀況的嚴重性、投服的途徑、化合物的素因及開處方之醫師的判斷。然而，有效的劑量 (單一劑量或攤分劑量) 係在約 0 . 001 至約 100 m g / k g (體重) / 天的範圍內，以約 1 至 35 m g / k g / 天較佳。對 70

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (41)

k g 的人而言，該劑量係相當於約 0 . 0 5 至約 7 g / 天，以約 0 . 2 至約 2 . 5 g / 天較佳。在某些情況下，在前述範圍之下限以下的劑量可能已足夠，而在其他情況下，可能使用更高的劑量，也不致於造成任何副作用，但前提為：如是之較高劑量係在一天中攤分為多個低劑量來投服。

本發明之活性化合物可應用於單一活性化合物的治療法或是可和一或多種其他抗腫瘤物質一起使用，例如，選自下列者：絲狀分裂抑制劑（例如，長春鹼）；烷化劑（例如，順式－網素、碳網素（carboplatin）及環磷醯胺）；抗新陳代謝物（例如，5－氟脲嘧啶、阿拉伯糖苷化胞嘧啶及羥基脲或是，例如，歐洲專利申請案所揭示之較佳抗新陳代謝物中的一者，諸如，N－（5－〔N－（3，4－二氫－2－甲基－4－酮基喹啉－6－基甲基）－N－甲基胺〕－2－噻吩甲醯基）－L－穀胺酸）；生長因子抑制劑；細胞周期抑制劑；嵌入抗生素（例如，阿霉毒素及博霉毒素）；酶（例如，干擾素）；以及抗激素（例如，抗雌激素，諸如，NolvadexTM（它眸汐芬（tamoxifen））或是，例如，抗雄激素，諸如，CasodexTM（4'－氰基－3－（4－氟苯磺醯基）－2－羥基－2－甲基－3'－（三氟甲基）丙醯替苯胺）。如是之合生治療可藉由同時、相繼或分別投用治療法之各別成份來達成。

藥學組成物可，例如，呈適於口服的形式（諸如，片劑、囊劑、丸劑、粉劑、緩釋配方、溶液、懸浮液）、非

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

線

五、發明說明（42）

經腸注射的形式（如無菌溶液、懸浮液或乳液）、局部投藥的形式（如軟膏或乳油）或直腸投藥的形式（如坐劑）。藥學組成物可為確切劑量之供單一次投藥的單位劑量形式。藥學組成物將包括習用的藥用載體或賦形劑以及作為活性成份之本發明化合物。此外，藥學組成物還可包括其他醫用或藥用劑、載體、佐劑等。

非經腸投服形式的例子包括活性化合物於無菌水溶液（例如，含水丙二醇或葡萄糖溶液）所形成的溶液或懸浮液。視需要，該劑量形式可予以適當地緩衝。

適當的藥用載體包括惰性稀釋劑或填充劑、水及各種有機溶劑。視需要，藥學組成物可含有額外的成份，諸如，調味劑、黏合劑等等。因此，就口服而言，所使用的片劑可含有各種賦形劑（諸如，檸檬酸）以及各種崩解劑（諸如，澱粉、褐藻酸及某些錯合的矽酸鹽類），還有黏合劑（諸如，蔗糖、明膠及阿拉伯膠）。此外，潤滑劑（諸如，硬脂酸鎂、月桂基硫酸鈉及滑石）常用於壓片。類似形式的固體組成物亦可用於軟或硬的填充膠囊。就此方面而言，較佳的物質包括乳糖及高分子量的聚乙二醇類。當欲使用含水的懸浮液或酏劑於口服時，其中的活性成份可和各種增甜劑或調味劑、染色物質或染料以及視需要採用之乳化劑或懸浮劑，連同稀釋劑（諸如，水、乙醇、丙二醇、甘油或彼等之組合）併用。

供製備各種含有特定用量之活性化合物的藥學組成物的方法係已知的，或為習於此藝之士所顯然易知者。例如

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

始

五、發明說明 (43)

，參見 Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Company, Easter, Pa., 15th Edition (1975)。

下文之實施例及製備例進一步說明及例示本發明的化合物及製備如是化合物的方法。本發明之範圍當然不侷限於下文之實施例及製備例的範圍。在下面的實施例中，除非另有說明，帶有單一對掌中心的分子係以消旋混合物的形式存在。帶有二或更多個對掌中心的分子，除非另有說明，係以非鏡像異構物的消旋混合物形式存在。單一鏡像異構物／非鏡像異構物可藉由習於此藝之士已知的方法獲得。

當下文之製備例及實施例提及 H P L C 色層分析時，除非另有說明，其所用的一般條件如下。所用的層柱為 ZORBAX™ R X C 1 8 層柱（Hewlett Packard 製造），長 1 5 0 m M，內徑為 4 . 6 m M。試樣係通過 Hewlett Packard-1100 系統。所採用的溶劑梯度法係以 1 0 0 % 之乙酸胺／乙酸緩衝液（0 . 2 M）至 1 0 0 % 之乙腈來進行 1 0 分鐘。然後，該系統進行以 1 0 0 % 乙腈（1 . 5 分鐘），然後為 1 0 0 % 緩衝液（3 分鐘）來清洗的清洗循環。在該段期間的流速恆定為 3 m l / 分鐘。

在下文的實施例及製備例中，"E t" 係示乙基、"A c" 係示乙醯基，"M e" 示甲基，且 "B u" 示丁基。

3 - 甲基 - 4 - 苯氧基硝基苯的製備

在氮氣氛下，將氫化鈉（9 5 % 乾粉）（8 3 . 6 2

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

始

五、發明說明 (44)

g , 3 . 3 1 m o l e s , 1 . 3 當量) 裝入乾淨且乾燥之裝備有冷凝器、滴液漏斗、機械攪拌子及二個氮氣入口—出口鼓泡器的 1 2 L 四頸瓶中 (注意 : 氫化鈉具有自燃性 , 應避免與水或濕氣接觸) 。將反應瓶冷卻至 0 °C (冰浴) , 然後使用滴液漏斗 , 小心地添加無水 D M F (1 2 8 0 m l) 。在 0 °C 下 , 將反應混合物攪拌 3 0 分鐘 ; 然後 , 使用滴液漏斗 , 以 2 小時的期間內 , 添加苯酚 (2 6 3 . 5 g , 2 . 8 m o l e s , 1 . 1 當量) 在無水 D M F (1 2 8 0 m l) 中所形成的溶液 (注意 : 放熱 , 有激烈的氫氣釋出) 。在完成添加後 , 在 0 °C 下 , 將反應混合物攪拌 4 0 分鐘 (反應混合物轉變為白色漿狀物) , 在 1 小時期間 , 逐滴添加 3 - 甲基 - 4 - 氟基硝基苯 (3 9 0 . 0 g , 2 . 5 1 m o l e s , 1 . 0 當量) 於無水 D M F (二甲基甲醯胺) (1 2 8 0 m l) 所形成的溶液。將反應混合物緩慢地溫熱至室溫並於室溫下攪拌 1 5 - 2 2 小時 (黑棕色黏稠溶液) , 直至所有的起始物皆轉化為苯氧基硝基甲苯為止 (T L C , 2 % 在己烷中的乙酸乙酯) 。再次將反應混合物冷卻至 0 °C (冰浴) , 然後 , 於 2 小時期間 , 用冷水 (5 0 0 0 m l) 小心地猝熄 (注意 : 放熱 , 氫釋出 ; 第一個 1 0 0 m l 的水在 9 0 分鐘的期間內加入) 。將反應混合物攪拌 1 小時 , 然後 , 將其移至二個各含有 4 0 L 水的玻璃罈中。將玻璃罈的內容物攪拌並令其靜置於室溫下 2 4 小時 , 以產生呈黃色固體的苯氧基硝基苯。過濾出該黃色固體、用過量的水予以清洗並

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (45)

予以空氣乾燥，可得 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基硝基苯 (5 5 2 g ，產率 9 6 %) 。由 ^1H 及 ^{13}C NMR 光譜，發現該粗製的 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基硝基苯係為純的，而將其直接用於下一個反應；m . p . 5 1 - 5 2 °C ；

FT - IR (cm^{-1}) : 1 5 8 2 , 1 5 0 9 , 1 4 8 0 , 1 3 3 9 , 1 2 4 2 , 1 2 0 4 , 1 0 9 1 及 7 9 6 ；

^1H NMR (3 0 0 M H z , CDCl_3) δ

2 . 4 1 (s , 3 H) ,

6 . 7 8 (d , 1 H , $J = 8 . 7 \text{ H z}$) ,

7 . 0 2 - 7 . 0 8 (m , 2 H) ,

7 . 1 9 - 7 . 2 9 (m , 1 H) ,

7 . 3 8 - 7 . 4 6 (m , 2 H) ,

7 . 9 9 (dd , 1 H , $J = 9 . 1 5 \text{ H z}$, $2 . 7 \text{ H z}$) ；

^{13}C NMR (7 5 . 4 5 M H z , CDCl_3)

1 6 . 2 2 , 1 1 5 . 9 3 , 1 1 9 . 1 1 ,

1 2 3 . 1 7 , 1 2 4 . 9 , 1 2 6 . 7 9 ,

1 2 9 . 5 3 , 1 3 0 . 2 8 , 1 4 2 . 6 6 ,

1 5 5 . 4 4 及 1 6 1 . 4 。

3 - 甲基 - 4 - 苯氧基硝基苯氫氨酸鹽的製備

將 1 0 % 之 Pd / C (1 0 0 g , 5 0 % 濕度 , 4 6 . 9 8 m m o l , 0 . 0 2 當量) 添加至 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基硝基苯 (2) (5 4 8 g , 2 . 3 9 m m o l e s ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (46)

1 . 0 當量) 於甲醇 (5 L) 所形成之經過攪拌的溶液中。然後，於氫氣氛中 (6 0 - 8 0 p s i) 、室溫下，在 2 加倫的帕爾氫化器 (Parr hydrogenator) 中，將反應混合物攪拌 1 5 - 1 6 小時。用 T L C (5 0 % 於己烷中的乙酸乙酯， s m R f = 0 . 6 9 ， p r R f = 0 . 4 7 ， U V 可見光) ，來追蹤反應的進展。然後，令反應混合物過濾通過矽藻土並用過量的甲醇來清洗固體。於減壓下，將濾液濃縮，可得呈淡棕黏稠固體的 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基苯胺 (4 5 1 . 0 g ， 9 5 %) 。由 ^1H 及 ^{13}C N M R 光譜，可得知該 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基苯胺係純的，而可直接用於下一個反應。

將乾燥的 H C l 氣體通入由 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基苯胺 (4 5 1 . 0 g ， 2 . 2 6 m o l e s ， 1 . 0 當量) 於無水乙醚 (1 2 L) 所形成之已冷卻 (0 °C) 及已攪拌過的溶液中，歷時 4 0 - 9 0 分鐘，直至所有的起始物皆轉化為苯胺氫氯酸鹽為止。過濾出雜白色的固體，用乙醚予以清洗並令其於真空烤箱中，以 6 0 °C 乾燥 6 小時，可得 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基氫氯酸鹽 (5 1 1 . 8 g ， 9 6 %) ； m . p . 1 7 3 - 1 7 4 °C ；

F T - I R (c m $^{-1}$) : 3 0 5 8 ， 3 0 1 9 ， 2 8 4 0 ， 2 5 7 3 ， 1 4 8 5 ， 1 2 5 3 ， 1 2 2 3 及 6 9 1 ；

^1H N M R (3 0 0 M H z ， C D C l $_3$) δ

2 . 2 2 (s ， 3 H) ，

6 . 8 1 - 6 . 9 (m ， 3 H) ，

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

的

五、發明說明 (47)

7 . 0 4 - 7 . 1 1 (m , 1 H) ,

7 . 2 5 - 7 . 3 7 (m , 3 H) ,

7 . 4 3 (d , 1 H , J = 2 . 4 H z) ,

1 0 . 4 5 (s , 2 H) ;

^{13}C NMR (7 5 . 4 5 M H z , CDCl_3)

1 6 . 0 3 , 1 1 8 . 0 1 , 1 1 9 . 9 , 1 2 2 . 1 2

, 1 2 3 . 3 5 , 1 2 4 . 7 8 , 1 2 6 . 1 3 ,

1 2 9 . 9 3 , 1 3 1 . 8 9 , 1 5 5 . 5 及

1 5 6 . 9 6 ;

A P C I (- F A B) 2 0 . 3 (1 0 0 %) ;

$\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{ClNO}$ 之元素分析：理論值 - C , 6 6 . 2 4

; H , 5 . 9 9 ; N , 5 . 9 4 ; 實測值 - C ,

6 0 . 0 5 ; H , 6 . 0 1 ; N , 5 . 9 8 。

藉由前述方法所製得之其他胺類的例子有：

3 - 氯 - 4 - 苯氧基苯胺

3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基苯胺

4 - 苯氧基 - 3 - 三氟甲基苯胺

3 - 氟 - 4 - 苯氧基苯胺

5 - 胺基 - 2 - 苯氧基苯腈

4 - (2 - 甲氧基 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺

4 - (3 - 甲氧基 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺

4 - (4 - 甲氧基 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺

4 - (2 - 氟 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺

4 - (3 - 氟 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (48)

4 - (4 - 氟 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺
 4 - (2 - 甲基 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺
 4 - (3 - 甲基 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺
 4 - (4 - 甲基 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺
 4 - (2 , 6 - 二氟 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺
 3 , 5 - 二氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺
 3 - 甲基 - 4 - 苯基硫烷基 - 苯胺
 4 - 苯基硫烷基 - 苯胺
 4 - 環己氧基 - 3 - 甲基 - 苯胺
 4 - 環戊氧基 - 3 - 甲基 - 苯胺
 4 - 環丁氧基 - 3 - 甲基 - 苯胺
 2 - 氟 - 4 - 苯氧基苯胺
 4 - 氟 - 2 - 苯氧基苯胺
 3 - 溴 - 4 - 苯氧基 - 苯胺
 4 - (2 - 氯 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺
 4 - (2 - 甲氧基 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺
 4 - (2 - 乙基 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺
 4 - (2 - 三氟甲基 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺
 1 - (5 - 胺基 - 2 - 苯氧基 - 苯基) - 乙酮
 (+ / -) - 4 - 苯亞磺醯基 - 3 - 甲基 - 苯胺、 (+ / -) 4 - 苯亞磺醯基 - 苯胺、 4 - 苯磺醯基 - 3 - 甲基 - 苯胺、 4 - 苯磺醯基 - 苯胺係以 3 - 甲基 - 4 - 苯基硫烷基 - 苯胺及 4 - 苯基硫烷基苯胺為起始物，藉由習於此藝之士已知的氧化方法製得。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (49)

3 - 乙基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺

在氮氣氛下，將硼氫化鈉 (0 . 4 g , 1 0 . 5 m m o l) 及 $AlCl_3$ (無水) (0 . 8 0 3 g , 6 . 0 2 m m o l) 添加至 1 - (5 - 胺基 - 2 - 苯氧基 - 苯基) - 乙酮 (0 . 5 g , 2 . 2 0 m m o l) 於 T H F (1 5 m l) 所形成的溶液中。將所得的反應混合物回流加熱 4 小時。然後，將該混合物冷卻並添加冰水。用乙酸乙酯萃取所得之混合物並令其經硫酸鈉乾燥。去除溶劑後，可得帶棕色的殘留物，用 4 : 1 己烷 / 乙酸乙酯，對其進行層析，可得產物 3 - 乙基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺 (1 5 m g , 1 0 %) 。

3 - 羥基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺

用 4 8 % 之 H B r (2 0 m l) 及 H O A c (2 0 m l) 來處理 3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基硝基苯 (2 g , 8 . 1 5 m m o l) 。在 1 1 0 °C 下，將反應混合物加熱 2 4 小時，然後，將反應混合物倒入冰中並用乙酸乙酯予以萃取，用鹽水清洗有機層並令其經硫酸鈉乾燥。將溶劑去除後，可得帶棕的殘留物，5 - 硝基 - 2 - 苯氧基 - 苯酚，其無需進一步純化，即可用於下一步驟 (幾乎為定量產量) 。

^1H N M R ($CDCl_3$) : δ
7 . 9 1 (d , 1 H , 2 . 7 H z) ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (50)

7 . 7 2 (d d , 1 H , J 1 = 8 . 8 H z , J 2 = 2 . 4 H z) ,

7 . 4 3 (t , 2 H , J = 7 . 9 H z) ,

7 . 2 8 (d , 1 H , 7 . 9 H z) ,

7 . 1 0 (d , 1 H , J = 8 . 3 H z) ,

6 . 7 8 (d , 2 H , J = 8 . 9 H z) 。

乙氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺

將溴基乙烷 (0 . 3 5 3 g , 3 . 2 6 m m o l) 及碳酸鉀 (0 . 4 4 7 g , 3 . 2 6 m m o l) 添加至 5 - 硝基 - 2 - 苯氧基 - 苯胺 (5 0 0 m g , 2 . 1 6 m m o l) 於丙酮 (2 0 m l) 所形成的溶液。在室溫下，將該反應混合物攪拌 2 小時，然後，在 5 0 °C 下，將反應混合物加熱 4 小時。添加水並用乙酸乙酯 (3 x 3 0 m l) 萃取水層，用鹽水清洗有機層並令其經硫酸鈉乾燥。去除溶劑後，可得 2 - 乙氧基 - 4 - 苯氧基 - 硝基苯。以 % P d - C (於甲醇中) ，對該產物進行氫化，可得 0 . 1 g (3 8 %) 之 3 - 乙氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺。M / z , 2 3 0 . 0 ,

¹ H N M R (C D C l 3) :

7 . 9 1 (d , 1 H , 2 . 7 H z) ,

7 . 7 2 (d d , 1 H , J 1 = 8 . 8 H z , J 2 = 2 . 4 H z) ,

7 . 4 3 (a p p t , 2 H , J = 7 . 9 H z) ,

五、發明說明 (51)

7 . 2 8 (d , 1 H , 7 . 9 H z) ,

7 . 1 0 (d , 1 H , J = 8 . 3 H z) ,

6 . 7 8 (d , 2 H , J = 8 . 9 H z) ,

4 . 1 7 (d d , 2 H , J 1 = 1 3 . 9 H z , J 2 = 7 . 1 H z) ,

1 . 4 2 (t , 3 H , J = 7 . 1 H z) 。

3 - 異丙氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺亦可藉由前述烷基化程序製得。

3 - 苯基 - 1 H - 吡啶 - 6 - 基胺

將無水的肼 (1 2 0 m g) 添加至 2 - 氯 - 5 - 硝基 - 二苯甲酮 (1 . 0 g) 在 T H F (四氫呋喃) (1 5 m l) 中的溶液。將所得之反應混合物保持於室溫下 2 - 4 小時。於真空下去除溶劑並將殘留物溶於乙酸乙酯中，用水及鹽水予以清洗，並令其經硫酸鈉乾燥。去除溶劑後，可得 0 . 8 g (8 8 %) 產物，6 - 硝基 - 3 - 苯基 - 1 H - 吡啶 (5)。以 H_2 / Pd ，將 6 - 硝基 - 3 - 苯基 - 1 H - 吡啶氫化，可得 0 . 5 g 之 3 - 苯基 - 1 H - 吡啶 - 6 - 基胺 (7 1 . 5 %)。M / z : 2 1 0 . 0。

^1H N M R (CD_3OD) :

7 . 8 6 (d , 2 H , J = 7 . 9 H z) ,

7 . 4 7 (t , J = 8 . 1 H z) ,

7 . 3 5 (t , 3 H , J = 8 . 7 H z) ,

7 . 0 1 (d , 1 H , J = 8 . 7 H z) 。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (52)

將 1 - 鋰硫基 - 2 - 三甲基單矽烷基乙炔添加至羰基上的一般程序

在氮氣氛下，用正丁基鋰（1 . 2 當量）處理（三甲基單矽烷基）乙炔（1 . 2 當量）在無水 T H F 中所形成之冷卻（- 7 8 °C）、已攪拌過的溶液中（在含有自由 N H 基之經 B O C - 保護的胺基醛類的情況下，（三甲基單矽烷基）乙炔及正丁基鋰的量要加倍）。將該無色的溶液攪拌 3 0 - 4 0 分鐘，接著添加在無水 T H F 中的羰基化合物（1 . 0 當量）。將反應液溫熱至室溫，予以攪拌 2 至 4 小時，並用水予以猝熄。在去除 T H F 後，令殘留物分溶於乙醚或乙酸乙酯及水中，用鹽水清洗分離出的有機層，令其經硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得粗製之 T M S 經保護的炔丙醇。接著，在室溫下，將粗製炔丙醇（1 . 0 當量）及碳酸鉀（2 . 0 當量）於甲醇中的混合物攪拌 0 . 5 至 1 小時。過濾出固體並用乙醚予以清洗。將濾液濃縮，溶於乙醚中並用水及鹽水予以清洗，且經硫酸鈉乾燥。去除溶劑後，可得粗製的端乙炔產物，其可藉由蒸餾法或層析法（乙酸乙酯／己烷）來純化。此程序之總產率係在 6 2 - 9 7 % 的範圍內。

藉由前述方法製得之端炔化合物的例子有：

3 - 乙炔基 - 3 - 羥基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯

4 - 乙炔基 - 4 - 羥基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

備

五、發明說明 (53)

酯

3 - 乙炔基 - 3 - 羥基 - 吡咯啉 - 1 - 羧酸第三丁酯

內向 - α - 3 - 乙炔基 - 3 - 羥基 - 8 - 氮雜 - 二環
〔 3 . 2 . 1 〕 辛烷 - 8 - 羧酸第三丁酯

外向 - β - 乙炔基 - 3 - 羥基 - 8 - 氮雜 - 二環〔 3
. 2 . 1 〕 辛烷 - 8 - 羧酸第三丁酯

2 - (1 - 羥基 - 丙 - 2 - 炔基) - 吡咯啉 - 1 - 羧
酸第三丁酯

1 - 環丁基 - 丙 - 2 - 炔 - 1 - 醇

戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇

4 - 胺基 - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇

1 - (3 - 氮雜 - 二環〔 3 . 1 . 0 〕 己 - 6 - 基)
- 丙 - 2 - 炔 - 1 - 醇

4 - 乙炔基 - 四氫吡喃 - 4 - 醇

(4 - 乙炔基 - 四氫吡喃 - 4 - 基) - 胺甲酸第三丁
酯

2 - (1 - 羥基 - 丙 - 2 - 炔基) - 六氫吡啶 - 1 -
羧酸第三丁酯

3 - (1 - 羥基 - 丙 - 2 - 炔基) - 六氫吡啶 - 1 -
羧酸第三丁酯

4 - 乙炔基 - 1 - 甲基 - 六氫吡啶 - 4 - 醇

(2 - 羥基 - 丁 - 3 - 炔基) - 甲基 - 胺甲酸第三丁
酯

(2 - 乙炔基 - 2 - 羥基 - 環己基) - 胺甲酸第三丁

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (54)

酯

R 及 S - 3 - 乙炔基 - 1 - 氮雜 - 二環 [2 . 2 . 2] 辛 - 3 - 醇。

將醛類同族化 (homologating) 為端炔化合物的一般程序

於氮氣氛下，將 (三甲基單矽烷基) 重氮甲烷於己烷 (1 . 3 當量中的溶液逐滴地添加至由 L D A (二異丙醯胺鋰) (1 . 3 當量) 於無水 T H F 所形成之冷卻 (- 7 8 ° C) 、已攪拌過的溶液中 (在含有自由 N H 基之經 B O C - 保護之胺基醛類的情況下，(三甲基單矽烷基) 重氮甲烷及 L D B 的量要加倍) 。 1 小時後，導入在 T H F 中的醛 (1 . 0 當量) 並移除冷卻浴。在室溫下，將反應液攪拌 1 至 2 小時，用水猝熄，予以濃縮並令其分溶於乙醚及水中。用鹽水清洗分離出的有機層，令其經硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得一粗製產物，其可用蒸餾法或層析法 (乙酸乙酯 / 己烷) 進行純化。此程序的總產率係在 3 7 - 7 2 % 的範圍內。

藉由此方法可製得之端炔化合物的例子有：

- 4 - 乙炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯
- 3 (S) - 乙炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯
- 3 (R) - 乙炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯
- 2 - 乙炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯
- 3 - 乙炔基 - 吡咯啶 - 1 - 羧酸第三丁酯
- 3 - 乙炔基 - 氮雜環丁烯 - 1 - 羧酸第三丁酯

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (55)

(4 - 乙炔基 - 四氫吡喃 - 4 - 基) - 胺甲酸第三丁酯

[1 - (第三丁基二甲基單矽烷氧基甲基) - 丙 - 2 - 炔基] - 胺甲酸第三丁酯

4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯

將碳酸鉀 (3 . 7 0 g , 2 6 . 8 m m o l) 添加至 N - 第三丁氧羰基六氫吡啶 (5 . 0 g , 2 6 . 8 m m o l) 於丙酮 (4 0 m l) 中所形成的溶液。將在丙酮 (1 0 m l) 中之炔丙基溴 (2 . 3 9 m l , 2 6 . 8 m m o l) 逐滴添加至前述反應混合物中。於室溫下，將所得之反應混合物攪拌一整夜。添加水，用乙醚萃取水層並用鹽水清洗合併的有機層，令其經硫酸鈉乾燥並於真空濃縮，可得 4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯，其為一粗製產物，可與適當的苯胺基喹啉進行 P d 偶合反應。

藉由此方法所製得之端炔化合物的例子有：

1 - 丙 - 2 - 炔基 - 吡咯啉

3 - 甲基 - 4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯

3 , 5 - 二甲基 - 4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯

1 - 甲基 - 4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶

4 - 丙 - 2 - 炔基 - 嗎福啉

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (56)

(3 - 丙 - 2 - 炔基 - 3 - 氮雜二環 [3 . 1 . 0]
己 - 6 - 基) - 甲醇

1 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 4 - 醇

1 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 3 - 醇

1 - 丙 - 2 - 炔基 - 吡咯啶 - 3 - 醇

(1 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 4 - 基) - 甲醇

(1 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 3 - 基) - 甲醇

(1 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 2 - 基) - 甲醇

(1 - 丙 - 2 - 炔基 - 吡咯啶 - 2 - 基) - 甲醇

2 - (1 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 4 - 基) - 乙
醇

2 - (4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 基) - 乙
醇

4 , 4 - 二甲氧基 - 1 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶

1 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 4 - 基胺

2 - (甲基 - 丙 - 2 - 炔基 - 胺基) - 乙醇

4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸甲基醯胺

1 - (4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 基) - 乙
酮

4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 甲醯胺

1 - 甲烷磺醯基 - 4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡啶

2 - 氯 - N - 丙 - 2 - 炔基 - 乙醯胺

將炔丙基胺 (2 5 0 m g , 0 . 3 4 m l , 4 . 6

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (57)

m m o l) 溶於二氯甲烷 (1 0 m l) 中並冷卻至 0 °C 。
將氯基乙醯氯 (2 5 6 m g , 0 . 1 8 m o , 2 . 3
m m o l) 突逐滴地添加至該溶液中並予以攪拌 3 0 分鐘
，然後令其溫熱至室溫。用 2 x H₂O 清洗該溶液，令其經
硫酸鈉乾燥並去除溶劑。可得呈白色晶體的 2 - 氯 - N -
丙 - 2 - 炔基 - 乙醯胺 (3 8 5 m g) 。

¹H N M R (4 0 0 M H z ; C D C l₃)
2 . 2 7 (1 H , M) , 4 . 0 7 (2 H , s) ,
4 . 0 9 (2 H , q , J = 2 . 5 H z) ,
6 . 7 8 (1 H , b r s) 。

藉由前述方法所製得之端乙炔化合物有：

N - 丙 - 2 - 炔基 - 乙醯胺

N - 丙 - 2 - 炔基 - 丙醯胺

環丙烷羧酸丙 - 2 - 炔基醯胺

2 , 2 - 二甲基 - N - 丙 - 2 - 炔基丙醯胺

N - 丙 - 2 - 炔基 - 甲烷磺醯胺

N - 甲基 - N - 丙 - 2 - 炔基乙醯胺

N - (1 - 甲基 - 丙 - 2 - 炔基) 乙醯胺

N - (1 , 1 - 二甲基 - 丙 - 2 - 炔基) - 乙醯胺

2 - 甲氧基 - N - 丙 - 2 - 炔基乙醯胺

2 - (第三丁氧羰基胺基) - 2 - 甲基 - 1 - 丙醇

將 2 - 胺基 - 2 - 甲基 - 1 - 丙醇 (8 . 9 g ,
0 . 1 m o l) 、二碳酸二第三丁酯 (2 2 . 0 g ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (58)

0 . 1 m o l) 以及碳酸鈉 (21 . 0 g , 0 . 2 m o l) 於水 / T H F (150 / 150 m l) 所形成之混合物回流加熱 1 小時。在去除 T H F 後，將令殘留物分溶於乙醚 (200 m l) 及水 (150 m l) 中。用鹽水清洗分離出的有機層，令其經硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得呈蠟狀、白色固體之 2 - (第三丁氧羰基胺基) - 2 - 甲基 - 1 - 丙醇 (17 . 97 g , 95 %) :

^1H N M R (C D C l ₃) δ

1 . 23 (s , 6 H) , 1 . 41 (s , 9 H) ,

3 . 56 (s , 2 H) 。

2 - (第三丁氧羰基胺基) - 2 - 甲基丙醛

在室溫下，將三氧化硫吡啶錯合物 (14 . 3 g , 90 . 0 m m o l) 於無水 D M S O (二甲亞砜) (50 m l) 之混合物添加至 (2 - 第三丁氧羰基胺基) - 2 - 甲基 - 1 - 丙醇 (5 . 7 g , 30 . 0 m m o l) 於三乙胺 (42 m l) 所形成的溶液中。在氮氣氛下，將該反應液攪拌 1 小時，然後，予以濃縮。將殘留物溶於乙酸乙酯 (200 m l) 中，用水 (100 m l) 及鹽水 (100 m l) 予以清洗，令其經硫酸鈉乾燥並進行濃縮，可得呈黃色油狀物之粗製的 2 - (第三丁氧羰基胺基) - 2 - 甲基丙醛。以蒸餾法純化後，可得 4 . 90 g (87 %) 蠟狀白色固體：

^1H N M R (C D C l ₃) δ

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (59)

1 . 3 0 (s , 6 H) , 1 . 4 1 (s , 9 H) ,
4 . 9 7 (b r , 1 H) , 9 . 4 0 (s , 1 H) 。

4 , 4 - 二 甲 基 - 5 - 三 甲 基 單 矽 烷 基 乙 炔 基 - 2 - 噁 唑 烷 酮

在氮氣氛下，用正丁基鋰 (1 8 m l , 4 5 . 0 m m o l) 處理 (三 甲 基 單 矽 烷 基) 乙 炔 (4 . 4 2 g , 4 5 . 0 m m o l) 於無水 T H F (2 0 m l) 所形成之冷卻 (- 7 8 ℃) 、已攪拌過的溶液。將該無色的溶液攪拌 3 0 分鐘，接著添在無水 T H F (2 0 m l) 中的 2 - (第 三 丁 氧 羰 基 胺 基) - 2 - 甲 基 丙 醛 (2 . 8 0 g , 1 5 m m o l) 。將反應液溫熱至室溫，予以攪拌 2 小時並用水猝熄。在去除 T H F 後，令殘留物分溶於乙醚 (1 5 0 m l) 及水 (1 0 0 m l) 中。用鹽水 (1 0 0 m l) 清洗分離出的有機層，令其經硫酸鈉乾燥並進行濃縮，可得呈黃色油狀物之粗製 4 , 4 - 二 甲 基 - 5 - 三 甲 基 單 矽 烷 基 乙 炔 基 - 2 - 噁 唑 烷 酮 (1 0 0 %) ，其可用下一步驟。

4 , 4 - 二 甲 基 - 5 - 乙 炔 基 - 2 - 噁 唑 烷 酮

在室溫下，將 4 , 4 - 二 甲 基 - 5 - 三 甲 基 單 矽 烷 基 乙 炔 基 - 2 - 噁 唑 烷 酮 (1 5 . 0 m m o l) 及碳酸鉀 (4 . 1 g , 3 0 . 0 m m o l) 於甲醇 (3 0 . 0 m l) 中所形成的混合物攪拌 3 0 分鐘。過濾出固體並用乙醚予

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (60)

以清洗。將濾液濃縮，溶於乙醚 (1 0 0 m l) 中，用水 (5 0 m l) 及鹽水 (5 0 m l) 清洗，並令其經硫酸鈉乾燥。去除溶劑後，可得呈黃色油狀物之 1 . 1 0 g (5 3 %) 4 , 4 - 二甲基 - 5 - 乙炔基 - 2 - 嘔唑烷酮：

$^1\text{H NMR (CDCl}_3\text{)} \delta$

1 . 3 7 (s , 3 H) , 1 . 3 9 (s , 3 H) ,
2 . 6 8 (s , 1 H) , 4 . 8 2 (s , 1 H) ,
6 . 0 0 (b r s , 1 H) 。

4 - 乙炔基 - 4 - 羥基 - 四氫呔喃 - 2 - 羧酸醯胺

4 - 酮基 - 3 , 4 - 二氫 - 2 H - 呔喃 - 2 - 羧酸乙酯

將 ZnCl_2 (0 . 6 3 g , 4 . 6 m m o l) 溶於無水 THF (1 5 m l) 中並於室溫下，將其添加至 1 - 甲氧基 - 3 - (三甲基單矽烷氧基) - 1 , 3 - 丁二烯 (7 . 9 4 g , 4 6 . 0 m m o l) 及乙醛酸乙酯 (7 . 0 5 g , 6 9 . 0 m m o l) 於甲苯 (3 0 m l) 中所形成的溶液。在攪拌 3 0 分鐘後，添加水 (3 0 m l) 及 TFA (三氟乙酸 (2 m l)) 並將混合物激烈地攪拌 2 0 分鐘。用鹽水清洗分離出的有機層，令其經硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得 8 . 0 g (1 0 0 %) 之棕色油狀物，其無需進一步純化，即可用於下一個步驟。

$^1\text{H NMR (CDCl}_3\text{)} \delta$

1 . 3 0 (t , 3 H) , 2 . 8 5 (d , 2 H) ,
4 . 2 6 (q , 2 H) , 5 . 0 0 (t , 1 H) ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (61)

5 . 4 8 (d , 1 H) , 7 . 3 9 (d , 1 H) 。

4 - 酮基 - 四氫哌喃 - 2 - 羧酸乙酯

將 4 - 酮基 - 3 , 4 - 二氫 - 2 H - 哌喃 - 2 - 羧酸乙酯 (8 . 0 g , 4 6 . 0 m m o l) 及 P d / C (1 0 % , 0 . 2 0 g) 於乙酸乙酯 (7 0 m l) 所形成的混合物置於內有 5 0 p s i 氫氣的帕爾瓶中搖晃一整夜並令其通過矽藻土濾墊過濾。將濾液濃縮並將殘留物蒸餾, 可得 2 . 6 2 g (3 3 %) 帶黃色的油狀物:

^1H N M R (C D C l ₃) δ

1 . 2 9 (t , 3 H) , 2 . 4 0 (d , 1 H) ,

2 . 5 8 - 2 . 7 5 (m , 3 H) ,

3 . 7 9 (t t , 1 H) , 4 . 2 3 (q , 2 H) ,

4 . 2 8 (m , 1 H) , 4 . 4 0 (m , 1 H) 。

4 - 羥基 - 4 - 三甲基單矽烷基乙炔基 - 四氫哌喃 - 2 - 羧酸乙酯

於氮氣氛中, 用正丁基鋰 (7 . 3 m l , 於己烷中, 1 8 . 2 4 m m o l) 處理 (三甲基單矽烷基) 乙炔 (1 . 8 0 g , 1 8 . 2 4 m m o l) 於無水 T H F (3 0 m l) 所形成之冷卻 (- 7 8 ° C) 、已攪拌過的溶液。將該無色的溶液攪拌 3 0 分鐘, 接著添加在無水 T H F (3 0 m l) 中的 4 - 酮基 - 四氫 - 哌喃 - 2 - 羧酸乙酯 (2 . 6 2 g , 1 5 . 2 m m o l) 。將反應液溫熱至室溫

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (62)

，予以攪拌 2 小時，然後用水 (3 0 m l) 猝熄。在去除 T H F 後，用乙酸乙酯 (2 x 6 0 m l) 萃取產物。用鹽水清洗合併的有機層，令其經硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得 2 . 5 0 g (6 1 %) 黃色油狀物：

^1H N M R (C D C l ₃) δ
 0 . 1 7 (s , 9 H) , 1 . 3 0 (t , 3 H) ,
 1 . 7 6 - 1 . 9 0 (m , 3 H) ,
 2 . 2 5 (m , 1 H) , 3 . 6 6 (t t , 1 H) ,
 4 . 1 1 - 4 . 2 1 (m , 2 H) ,
 4 . 2 4 (q , 2 H) 。

4 - 乙炔基 - 4 - 羥基 - 四氫吡喃 - 2 - 羧酸醯胺

於壓力反應管中，將 4 - 羥基 - 4 - 三甲基單矽烷基乙炔基 - 四氫吡喃 - 2 - 羧酸乙酯 (2 . 5 0 g , 9 . 2 5 m m o l) 溶於甲醇 (2 0 m l) 並在攪拌的同時，將 N H ₃ 氣體通入該溶液。將該反應管緊緊蓋住並將反應液攪拌三天。在去除溶劑後，可得 1 . 5 3 g (9 7 %) 黃色油狀物：

^1H N M R (C D ₃ O D) δ
 1 . 4 8 (t , 1 H) , 1 . 7 0 (t d , 1 H) ,
 1 . 8 5 (d , 1 H) , 2 . 3 0 (d , 1 H) ,
 3 . 0 4 (s , 1 H) , 3 . 2 9 (s , 1 H) ,
 3 . 7 1 (t , 1 H) , 3 . 9 8 (d , 1 H) ,
 4 . 0 6 (d t , 1 H) 。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (63)

2 - (第三丁基 - 二甲基單矽烷氧基甲基) - 4 - 乙炔基 - 四氫吡喃 - 4 - 醇

2 - 羥基甲基 - 四氫吡喃 - 4 - 醇

將 4 - 酮基 - 四氫吡喃 - 2 - 羧酸乙酯 (5 . 1 7 g , 3 0 . 0 m m o l) 的溶液逐滴地添加至 LiAlH_4 (3 . 4 2 g , 9 0 . 0 m m o l) 於無水 THF (5 0 m l) 所形之冷卻 (0 °C) 、已攪拌過的懸浮液中。在攪拌 1 小時後，藉由緩慢地依序添加水 (3 . 4 m l) 、 1 5 % 氫氧化鈉 (3 . 4 m l) 及水 (1 0 . 0 m l) ，將反應猝熄。過濾出無機鹽，由於產物係吸附於該固體上，因此用乙酸乙酯反覆萃取。去除溶劑後，可得 2 . 4 2 g (6 1 %) 黃色油狀物。此粗製混合物可直接用於下一步驟，無需純化。

2 - (第三丁基 - 二甲基 - 單矽烷氧基甲基) - 四氫吡喃 - 4 - 醇

於室溫下，將第三丁基二甲基單矽烷基氯 (2 . 7 6 g , 1 8 . 3 m m o l) 添加至由 2 - 羥基甲基 - 四氫吡喃 - 4 - 醇 (2 . 4 2 g , 1 8 . 3 m m o l) 、 DMA P (4 - 二甲基胺基吡啶) (9 0 m g , 0 . 7 4 m m o l) 及 Et_3N (2 . 0 4 g , 2 0 . 1 m m o l) 於無水二氯甲烷 (5 0 m l) 所形成的溶液中。在攪拌一整夜後，用鹽水 (3 0 m l) 猝熄反應溶液並用二氯甲烷

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

收

五、發明說明 (64)

(4 0 m l) 萃取分離出的水層。令合併的有機層經硫酸鈉乾燥並進行濃縮。利用矽膠層柱，採用 3 0 % 乙酸乙酯／己烷，進行純化，可得 2 . 2 7 g (5 0 %) 無色油狀物：

^1H N M R (C D C l ₃) δ

0 . 0 4 (s , 6 H) , 0 . 8 8 (s , 9 H) ,

1 . 2 1 (m , 1 H) , 1 . 4 3 (m , 1 H) ,

1 . 8 2 (d t , 1 H) , 2 . 0 0 (d t , 1 H) ,

3 . 3 5 (m , 1 H) , 3 . 5 1 (q , 1 H) ,

3 . 6 6 (q , 1 H) , 3 . 7 9 (m , 1 H) ,

4 . 0 1 (m , 1 H) 。

2 - (第三丁基 - 二甲基 - 單矽烷氧基甲基) - 四氫呔喃
- 4 - 酮

於室溫下，以三氧化硫吡啶錯合物 (7 . 3 3 g ,
4 6 . 1 m m o l) ，逐份地處理 2 - (第三丁基二甲基
- 單矽烷氧基甲基) - 四氫呔喃 - 4 - 醇 (2 . 2 7 g ,
9 . 2 1 m m o l) 於無水 D M S O / E t ₃ N (1 5 /
1 3 m l) 所形成之溶液。在攪拌 1 小時後，將反應液濃
縮並令殘留物分溶於乙酸乙酯 (1 0 0 m l) 及水 (5 0
m l) 中。用鹽水 (7 0 m l) 清洗分離出的有機層，令
其經硫酸鈉乾燥並予以濃縮。利用矽膠層柱進行純化，使
用 1 0 - 2 0 % 之乙酸乙酯／己烷，可得 1 . 4 8 g (6 6 %) 之無色油狀物：

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

修

五、發明說明 (65)

^1H NMR (CDCl_3) δ

0 . 0 5 (s , 6 H) , 0 . 8 8 (s , 9 H) ,
2 . 3 2 (d t , 1 H) , 2 . 4 1 (m , 2 H) ,
2 . 5 8 (m , 1 H) , 3 . 6 2 (m , 2 H) ,
3 . 7 0 (d , 2 H) , 4 . 3 1 (m , 1 H) .

2 - (第三丁基 - 二甲基單矽烷氧基) - 4 - 三甲基單矽
烷基乙炔基 - 四氫 - 呓喃 - 4 - 醇

在氮氣氛下，用正丁基鋰 (4 . 1 2 m l , 於己烷中
， 1 0 . 3 m m o l) 處理 (三甲基單矽烷基) 乙炔 (
1 . 0 1 g , 1 0 . 3 m m o l) 於無水 T H F (2 5
m l) 所形成之冷卻 (- 7 8 ° C) 已攪拌過的溶液中。將
該無色溶液攪拌 3 0 分鐘，接著添加在無水 T H F (2 5
m l) 中的 2 - (第三丁基 - 二甲基 - 單矽烷氧基甲基)
- 四氫 - 呓喃 - 4 - 酮 (1 . 4 8 g , 6 . 0 6 m m o l
) 。將反應液溫熱至室溫，予以攪拌 2 小時並用水 (3 0
m l) 予以猝熄。在去除 T H F 後，用乙酸乙酯 (2 x
5 0 m l) 萃取產物。用鹽水萃取合併的有機層，令其經
硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得 1 . 7 5 g (8 4 %) 黃色
油狀物：

^1H NMR (CDCl_3) δ

0 . 0 5 (s , 6 H) , 0 . 1 6 (s , 9 H) ,
0 . 8 9 (s , 9 H) , 1 . 4 3 (m , 1 H) ,
1 . 7 8 (t d , 1 H) , 1 . 8 3 (d , 1 H) ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (66)

1 . 9 4 (d , 1 H) ,
 3 . 5 2 - 3 . 7 0 (m , 4 H) ,
 4 . 0 0 (m , 1 H) 。

2 - (第三丁基 - 二甲基 - 單矽烷氧基甲基) - 4 - 乙炔基 - 四氫 - 吡喃 - 4 - 醇

在室溫下，將 (2 - 第三丁基 - 二甲基 - 單矽烷氧基甲基) - 4 - 三甲基單矽烷基乙炔基 - 四氫 - 吡喃 - 4 - 醇 (1 . 7 5 g , 5 . 1 m m o l) 及 K_2CO_3 (1 . 4 g , 1 0 . 2 m m o l) 之混合物攪拌 3 0 分鐘。在濃縮後，令殘留物分溶於乙酸乙酯 (5 0 m l) 及水 (3 0 m l) ，並用乙酸乙酯萃取分離出的水層。令合併的有機萃出物經硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得 1 . 3 3 g (9 6 %) 淡黃色油狀物：

^1H N M R ($CDCl_3$) δ

0 . 0 5 (s , 6 H) , 0 . 8 8 (s , 9 H) ,
 1 . 5 0 (m , 1 H) , 1 . 7 8 (m , 1 H) ,
 1 . 8 4 (d , 1 H) , 2 . 0 1 (m , 1 H) ,
 2 . 5 5 (s , 1 H) ,
 3 . 5 5 - 3 . 7 0 (m , 4 H) ,
 4 . 0 0 (m , 1 H) 。

6 - 碘基 - 4 - 噻唑啉酮

將 2 - 胺基 - 5 - 碘基苯甲酸 (2 6 . 3 g , 1 0 0

五、發明說明 (67)

m m o l) 及甲脒乙酸酯 (13 . 5 g , 130 m m o l) 於乙醇 (400 m l) 之溶液回流 20 小時。在冷卻至 0 °C 後，過濾收集固體產物。進一步於真空中乾燥後，可得呈灰色晶狀固體的 6 - 碘基 - 4 - 喹啉酮 (22 . 0 g , 81 %) 。

¹ H N M R (400 M H z ; D M S O - d ₆) δ :

12 . 38 (b r . s , 1 H) ,

8 . 35 (d , 1 H) ,

8 . 05 - 8 . 10 (m , 2 H) ,

7 . 43 (d d , 1 H) ,

L R M S : 272 . 9 (M H ⁺) 。

6 - 碘基 - 4 - 氨基喹啉 (12) :

將草醯氯的溶液 (60 m l 之於 D C E 中的 2 M 溶液) 逐滴地添加 D M F (6 . 3 m l) 於 D C E (20 m l) 所形成之冷卻至 0 °C 的已攪拌溶液中。在完成添加後，去除冷卻浴並添加呈固態之 6 - 碘基 - 3 H - 喹啉酮 (10 g , 36 . 8 m m o l) 。於氮氣氛下，將所得之混合物加熱回流 3 小時。在冷卻至室溫後，小心地用水猝熄反應。添加二氯甲烷並將所得之雙層物移置於分液漏斗。用二氯甲烷 (2 x 50 m l) 萃取水層，並將合併的有機層乾燥 (硫酸鈉) 。於真空中去除溶劑，可得一黃色固體，用乙醚予以碾製，可去除任何剩餘的雜質。過濾後所得之黃色固體經 N M R 顯示為純的。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

位

五、發明說明 (68)

^1H NMR (CDCl_3 , 400 MHz) : δ :
 9 . 0 5 (s , 1 H) , 8 . 6 5 (d , 1 H) ,
 8 . 2 1 (d d , 1 H) , 7 . 7 8 (d , 1 H) 。

6 - 碘基 - 4 - 苯氧基喹唑啉 (13) :

將 NaH (經過清洗 , 不含油) 於 DMF (40 ml) 之懸浮液冷卻至 0 °C 並逐滴地添加苯酚 (5 . 65 g , 60 mmol) 於 DMF (20 ml) 中的溶液。在添加完成後, 將呈固態之 6 - 碘基 - 4 - 氨基喹唑啉 (14 . 6 g , 50 . 3 mmol) 分成小份, 逐份地添加。去除冷卻浴, 於室溫下, 將反應混合物攪拌 2 小時。然後, 用水 (200 ml) 猝熄混合物, 用乙酸乙酯 (300 ml) 予以稀釋並將其轉置於分液漏斗。用稀釋的含水氫氧化鈉、水及鹽水清洗有機層並令其經硫酸鈉乾燥。過濾出固體並去除溶劑後, 可得呈黃色固體之喹唑啉 13 (17 . 2 g , 98 %) 。

^1H NMR (400 MHz ; CDCl_3) : δ :
 8 . 7 4 (d , 1 H) , 8 . 1 4 (s , 1 H) ,
 8 . 1 2 (d d , 1 H) , 7 . 7 1 (d , 1 H) ,
 7 . 4 9 (d d , 2 H) , 7 . 3 2 (t , 1 H) ,
 7 . 2 2 (m , 2 H) 。

方法 A : (1 - 苯磺醯基 - 1H - 吡啶 - 5 - 基) - [6 - (3 - 咪唑 - 1 - 基丙 - 1 - 炔基) - 喹唑啉 - 4 - 基

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (69)

〕 - 胺 (1 5)

(1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基) - (6 - 碘基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺 (1 4)

令 6 - 碘基 - 4 - 氨基喹啉 (2 . 3 8 , 8 . 2 0 m m o l) 及 5 - 胺基 - 1 - 苯磺醯基吡啶 (2 . 4 6 g , 9 . 0 0 m m o l) 於 D C E (2 0 m l) 及第三丁醇 (2 0 m l) 中併合。在氮氣氛中，將如是所得之混合物加熱回流 1 8 小時，而形成亮黃色的懸浮液。在冷卻後，過濾出固體並用二氯甲烷予以漂洗，然後將其置於高真空下，以移除任何過量的溶劑。可得成黃色固體之喹啉 1 4 (3 . 2 3 g , 7 5 %) 。

¹ H N M R (D M S O - d 6 ; 4 0 0 M H z) : δ :
 9 . 2 4 (s , 1 H , N H) ,
 8 . 8 4 (s , 1 H) ,
 8 . 3 3 (d d , 1 H , 8 . 9 H z , 1 . 7 H z) ,
 8 . 0 1 (m , 4 H) , 7 . 9 0 (m , 2 H) ,
 7 . 7 0 (m , 2 H) , 7 . 6 0 (m , 3 H) ,
 6 . 9 2 (d d , 1 H , J = 3 . 7 H z , 0 . 6 H z)
 。

(1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基) - [6 - (3 - 咪唑 - 1 - 基 - 丙 - 1 - 炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺 (1 5)

令喹啉 1 4 (1 5 0 m g , 0 . 2 8 m m o l) 、

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (70)

1 - N - 丙炔基咪唑 (2 0 0 m g , 1 . 8 9 m m o l)
 、 P d (O A c) ₂ (4 m g , 0 . 0 1 6 m m o l) 及
 P P h ₃ (9 m g , 0 . 0 3 3 m m o l) 於 N e t ₃ (1 . 2 5 m l) 及 D M F (0 . 5 m l) 中混合。於氮氣
 氛中，在 8 0 °C 下，將該混合物攪拌 1 6 小時。在冷卻後
 ，於減壓下，將所得的黑色懸浮液濃縮並將殘留物溶於甲
 醇中。添加矽膠 (1 g) 並於真空中去除甲醇。將如是所
 得之矽膠放在一矽膠 (4 0 g) 層柱的最上端，然後，先
 後用 2 0 0 m l 5 0 : 1 C H ₂ C l ₂ : M e O H 及
 3 0 0 m l 之 2 5 : 1 C H ₂ C l ₂ : M e O H 來洗提該
 層柱，可得呈黃色泡沫狀之炔化合物 1 5 (7 2 m g ,
 5 1 %) 。

¹ H N M R (C D C l ₃ ; 4 0 0 M H z) : δ :
 8 . 9 5 (b r , 1 H , N H) ,
 8 . 6 3 (s , 1 H) , 8 . 6 2 (s , 1 H) ,
 8 . 2 4 (s , 1 H) ,
 7 . 9 6 (d , 1 H , J = 1 . 7 H z) ,
 7 , 8 4 (m , 3 H) , 7 . 7 1 (m , 2 H) ,
 7 . 5 1 (m , 3 H) , 7 . 4 1 (m , 2 H) ,
 7 . 1 4 (s , 1 H) , 7 . 1 0 (s , 1 H) ,
 6 . 5 5 (d , 1 H , J = 3 . 5 H z) ,
 5 . 0 1 (s , 2 H) 。

方法 A' : (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (3

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (71)

一 六 氫 吡 咩 - 1 - 基 - 丙 - 1 - 炔 基) - 喹 啉 - 4 - 基
〕 - 胺

(6 - 碘 基 - 喹 啉 - 4 - 基) - (3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧
 基 - 苯 基) - 胺

在 1 : 1 的 二 氯 乙 烷 級 第 三 丁 醇 (5 0 m l) 中 , 將
 4 - 氯 - 6 - 碘 基 喹 啉 (5 . 0 g , 1 7 . 2 m m o l)
) 及 3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧 基 苯 胺 (1 7 . 2 m m o l) 混
 合 在 一 起 。 在 3 0 ° C 下 , 將 該 反 應 混 合 物 加 熱 4 小 時 , 於
 是 可 觀 察 到 黃 色 沉 澱 物 產 生 。 將 反 應 液 冷 卻 並 收 集 沉 澱 物
 , 可 得 到 (6 - 碘 基 - 喹 啉 - 4 - 基) - (3 - 甲 基 -
 4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - 胺 (8 . 0 g , 9 4 %) 。 M / z
 , 4 5 4 。

¹ H N M R (C D ₃ O D) : δ :

9 . 1 2 (s , 1 H) , 8 . 8 3 (s , 1 H) ,
 8 . 3 9 (d , 1 H , J = 8 . 8 H z) ,
 7 . 6 3 (d , 1 H , J = 8 . 8 H z) ,
 7 . 5 5 (d , 1 H , J = 2 . 1 H z) ,
 7 , 3 5 (d d , 1 H , J ₁ = J ₂ = 8 . 5 H z) ,
 7 . 2 8 (t , 2 H , J = 8 . 1 H z) ,
 7 . 0 5 (t , J = 8 . 5 H z) ,
 6 . 8 7 (d , 1 H , J = 8 . 1 H z) ,
 3 . 8 1 (s , 3 H) 。

(3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - [6 - (3 - 六 氫 吡

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

收

五、發明說明 (72)

吡 - 1 - 基 - 丙 - 1 - 炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺

將 4 - 丙 - 2 - 炔基 - 六氫吡吡 - 1 - 羧酸第三丁酯 (2 . 3 7 g , 粗製) 及 (6 - 碘基 - 喹啉 - 4 - 基) - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺 (8 0 0 m g , 1 . 7 6 m m o l) 、 P d (O A c) ₂ (2 3 . 7 m g , 0 . 1 0 5 m m o l) 、 於 E t ₃ N 中之 P P h ₃ (5 . 5 3 m g , 0 . 2 1 m m o l) 及 D M F (3 m l) 混合在一起。在 8 0 °C 下，將所得之反應混合物加熱一整夜。在冷卻後，將二氯甲烷添加至反應混合物中並用鹽水來清洗所形成的深色混合物並令其經硫酸鈉乾燥。去除溶劑並用矽膠層析法 (1 : 1 己烷 + 乙酸乙酯) 來層析殘留物，可得產物 2。將 2 溶於二氯甲烷中並通入 H C l 氣 5 分鐘，收集沉澱物，可得產物 (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (3 - 六氫吡吡 - 1 - 基 - 丙 - 1 - 炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺。

M / z , 4 5 0 。

¹ H N M R (D M S O) , δ (p p m) ,

9 . 5 2 (s , 1 H) , 8 . 8 4 (s , 1 H) ,

8 . 2 0 (d d , 1 H , J 1 = 8 . 7 H z , J 2 = 1 . 3 H z) ,

7 . 9 9 (d , 1 H , J = 2 . 5 H z) ,

7 . 6 0 (d d , J 1 = 8 . 7 H z , J 2 = 2 . 7 H z

) , 7 . 3 6 (a p p t , 2 H , J = 8 . 5 H z) ,

7 . 1 1 (t , 1 H , J = 7 . 5 H z) ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (73)

6 . 9 2 (d , 1 H , J = 8 . 8 H z) ,
 6 . 9 1 (d , 1 H , J = 7 . 9 H z) ,
 3 . 5 5 (b r , 4 H) , 3 . 4 4 (b r , 4 H) ,
 3 . 3 0 (s , 2 H) , 2 . 1 9 (s , 3 H) 。

方法 B : (6 - 環丁基 - 喹啉 - 4 - 基) - (4 - 苯氧基 - 苯基) 胺 (1 7)

6 - 環丁基 - 4 - 苯氧基喹啉 (1 6)

將切碎的鋰金屬 (0 . 2 1 g , 3 0 m m o l) 分成小份，逐份地添加至苯 (3 . 8 5 g , 3 0 m m o l) 於無水 T H F (四氫呋喃) (2 0 m l) 中之已攪拌過的溶液中。混合物變成深綠色並予以持續攪拌 2 小時。然後，經由注射器，逐滴地添加 Z n C l ₂ 溶液 (3 3 m l 之在 T H F 中的 0 . 5 M 溶液， 1 6 . 5 m m o l)，賦予黑色的顏色。在 3 小時後，中斷攪拌並令細碎的 Z n 粉沉澱。用乾的吸管將上清液移出並用新鮮的 T H F (1 0 m l) 予以置換。然後，添加環丁基溴 (2 . 0 g , 1 4 . 8 m m o l) 並在室溫下，將所得之深色混合物攪拌 1 6 小時。再次停止攪拌，並將上清的有機鋅試劑立即用於下一個反應。

將前述所製得之環丁基鋅添加至 6 - 碘基 - 4 - 苯氧基喹啉 (1 . 7 5 g , 5 . 0 3 m m o l)、

P d ₂ (d b a) ₃ [叁 (二亞苯甲基乙醯胺) 二鈀 (0)] (9 0 m g , 0 . 1 m m o l) 及三呋喃基膦 (1 8 5

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (74)

m g , 0 . 8 m m o l) 於 T H F (1 0 m l) 所形成的溶液。將所得之混合物攪拌 6 小時，然後用 T H F (3 0 m l) 予以稀釋並用飽和的 N H ₄ C l 溶液 (4 0 m l) 予以猝熄。將二層分離並用水及鹽水清洗有機層，然後，予以乾燥 (硫酸鈉) 。移出固體並於真空中去除溶劑，可得一棕色油狀物。使用矽膠層析，以 1 : 1 乙酸乙酯 : 己烷洗提，來進行純化，可得呈黃色油狀物之 6 - 環丁基 - 4 - 苯氧基喹啉 (0 . 7 8 g , 5 6 %) 。

¹ H N M R (4 0 0 M H z , C D C l ₃) : δ :

8 . 7 1 (s , 1 H) , 8 . 1 4 (s , 1 H) ,

7 . 9 2 (d , 1 H) , 7 . 7 8 (d , 1 H) ,

7 . 5 0 (t , 2 H) , 7 . 3 1 (t , 1 H) ,

7 . 2 5 (d , 2 H) , 3 . 7 8 (m , 1 H) ,

2 . 4 3 (m , 2 H) , 2 . 2 5 (m , 2 H) ,

2 . 1 1 (m , 1 H) , 1 . 9 2 (m , 1 H) 。

(6 - 環丁基 - 喹啉 - 4 - 基) - (4 - 苯氧基 - 苯基) 胺

令喹啉 1 6 (5 0 m g , 0 . 1 8 m m o l) 及 4 - 苯氧基苯胺 (6 7 m g , 0 . 3 6 m m o l) 於苯酚中 (0 . 4 5 g) 混合。在 1 0 0 ° C 下，將該混合整整加熱 1 7 小時。利用減壓蒸發，將過多的苯酚去除，可得一殘留物，用二氯甲烷予以碾製，可得呈黃色固體之所要的喹啉 1 7 (2 0 m g , 3 0 %) 。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (75)

^1H NMR (DMSO d_6 , 400 MHz) : δ :

9 . 7 6 (s , 1 H) , 8 . 4 7 (s , 1 H) ,

8 . 3 1 (s , 1 H) , 7 . 7 7 (d , 2 H) ,

7 . 6 9 (m , 2 H) , 7 . 3 6 (t , 2 H) ,

7 . 1 1 (t , 1 H) , 7 . 0 3 (d , 2 H) ,

6 . 9 8 (d , 2 H) , 3 . 6 9 (m , 1 H) ,

2 . 3 5 (m , 2 H) , 2 . 2 3 (m , 2 H) ,

2 . 0 1 (m , 1 H) , 1 . 8 6 (m , 1 H) 。

方法 C : 順式 - 及反式 - 3 - [4 - (1 - 苯磺醯基 -
1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 環丁烷
羧酸乙酯 (19 a / 19 b)

順式 - 及反式 - 3 - (4 - 苯氧基 - 喹啉 - 6 - 基) -
環丁烷羧酸乙酯 (18 a , b)

於氮氣氛下，將切碎的鋰金屬 (104 mg , 15 mmol) 分成小份，逐份地添加至萘 (1.92 g , 15 mmol) 於無水 THF 所形成之溶液中，產生一綠色混合物，將該混合物攪拌 2 小時。然後，經由注射器，逐滴添加氯化鋅 (16 ml 之在 THF 中的 0.5 M 溶液 , 8 mmol) ，在室溫下，將該混合物攪拌 3 小時。停止攪拌，並移出上清液，用 3 - 碘基環丁烷 - 1 - 羧酸乙酯溶液 (790 mg , 3 mmol) 予以置換。將所得之懸浮液攪拌 20 小時，當攪拌停止時，令剩餘的鋅金屬沉澱析出。然後，將剩餘的溶液轉置於含有喹啉 13 (

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (76)

520 mg, 1.5 mmol)、Pd₂(dba)₃ (27 mg, 0.03 mmol) 及三-2-呋喃基膦 (56 mg, 0.24 mmol) 的乾燥燒瓶中。在室溫下，將該混合物攪拌 16 小時。將該混合物濃縮，並將殘留物納入乙酸乙酯 (30 ml) 並用飽和的氯化銨水溶液、鹽水及水予以清洗並予以乾燥 (硫酸鈉)。於真空中去除溶劑並用矽膠層析法來純化所得的殘留物，可得呈順式及反式異構物之混合物的環丁酯 18 a 及 18 b (300 mg, 57%)。LRMS: 349.2 (MH⁺)。HPLC: 7.31 分鐘 (27%) ; 7.44 分鐘 (72%)。

順式-及反式- { 3 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 噁唑啉 - 6 - 基] - 環丁烷羧酸乙酯 (19 a , b)

將酯類 18 a 及 18 b (300 mg, 0.86 mmol) 與 5 - 胺基 - 1 - 苯基磺醯基吡啶 (270 mg, 1.0 mmol) 及苯酚 (1.0 g) 混合。在 100 °C 下，將該混合物加熱 48 小時。用蒸餾法去除過多的苯酚並將殘留物溶於二氯甲烷中，然後將其轉置於分液漏斗並用水及鹽水予以清洗。將有機層乾燥 (硫酸鈉) 並去除溶劑，可得一深色殘留物，用製備 TLC (以乙酸乙酯洗提)，對其進行純話，可得呈蠟狀固體的酯類 19 a 及 19 b (0.20 g, 44%)。LRMS:

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 · 訂

五、發明說明 (77)

5 2 7 . 2 (M H ⁺) 。 H P L C : 7 . 5 4 分鐘 (1 6 %) ; 7 . 6 4 分鐘 (8 4 %) 。

方法 D : 順式 - 及反式 - { 3 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 5 - 基胺基) - 喹唑啉 - 6 - 基] - 環丁基 } - 甲
醇 (2 0 a , b)

經由注射器，將 0 . 7 8 m l 之 D I B A L - H (氫化二異丁基鋁) (1 M ， 於 甲 苯 中) 逐滴地添加至乙酯 1 9 a / 1 9 b (7 0 m g ， 0 . 1 3 m m o l) 於無水甲 苯 (5 m l) 所形成之冷卻 (- 7 8 ° C) 、 已攪拌過的溶液中。將該反應液溫熱至 ° C ， 予以攪拌 3 小時，然後藉由含水氯化銨的稀釋，予以猝熄。將該混合物轉置於分液漏斗並用乙酸乙酯萃取。將有機層乾燥 (硫酸鈉) ， 去除固體並將剩餘的濾液濃縮，可得一油狀物，藉由製備 T L C (以乙酸乙酯洗提) ， 予以純化，可得 7 m g (1 1 %) 呈黃色固體之 2 0 a / 2 0 b : M S m / z (M H ⁺) 4 8 5 . 2 ; H P L C 5 . 9 7 分鐘。

方法 E : 順式及反式 - { 3 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹唑啉 - 6 - 基] - 環丁基
} - 吡咯啉 - 1 - 基甲烷酮 (2 1 a , b)

將該乙酯 (1 9 a / 1 9 b) (6 0 m g ， 0 . 1 1 m m o l) 溶於甲醇 (5 m l) 中並予以回流 1 小時，以將該乙酯轉化為甲酯。在去除甲醇後，將殘留物溶於吡咯

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (78)

啖 (5 m l) 並予以加熱回流 2 0 小時。去除吡咯啖後，可得油狀、棕色的產物混合物，用製備 T L C (乙酸乙酯洗提) 予以純化，可得 2 2 m g (3 6 %) 呈蠟狀、黃色固體之醯胺 2 1 a / 2 1 b : M S m / z (M H ⁺) 5 5 2 . 2 ; H P L C 6 . 4 4 7 分鐘。

方法 F : 4 - [4 - (1 - 苯甲基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 1 - 甲基 - 六氫吡啶 - 4 - 醇 (2 3)

1 - 甲基 - 4 - (4 - 苯氧基 - 喹啉 - 6 - 基乙炔基) - 六氫吡啶 - 4 - 醇 (2 2)

將喹啉 1 3 (1 . 3 2 g , 3 . 8 0 m m o l) 、 4 - 乙炔基 - 1 - 甲基 - 六氫吡啶 - 4 - 醇 (1 . 0 6 g , 7 . 6 m m o l) 、 P d (O A c) ₂ (5 1 m g , 0 . 2 3 m m o l) 、 P P h ₃ (1 2 0 m g , 0 . 4 6 m m o l) 及三乙胺 (1 8 m l) 添加至在氮氣氛內的 1 0 0 m l 圓底瓶中。將該燒瓶裝備上回流冷凝器，並在 1 0 0 °C 下，將該混合物加熱 1 6 小時。然後，將該深色溶液冷卻並在減壓下去除三乙胺。用乙酸乙酯 (7 5 m l) 及水 (2 5 m l) 稀釋所得之殘留物並將其轉置於分液漏斗。連續用水 (2 x 2 5 m l) 清洗有機層並用乙酸乙酯 (2 5 m l) 來反萃取含水的洗液。將合併的有機層乾燥 (硫酸鎂) 並於減壓下去除溶劑。在矽膠 (5 0 g) 上，先後以 2 5 0 m l 之 3 0 : 1 二氯甲烷 : 甲醇及

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (79)

4 0 0 m l 之 3 0 : 1 : 1 二氯甲烷 : 甲醇 : N e t ₃ 洗提，以純化所得的黑色泡沫狀物，可得呈黃色泡沫狀物的所要產物 (9 3 0 m g , 6 8 %) 。

¹ H N M R (C D C l ₃ ; 4 0 0 M H z) : δ :

8 . 7 1 (s , 1 H) ,

8 . 3 6 (d , 1 H , J = 1 . 9 H z) ,

7 . 8 9 (d , 1 H , J = 8 . 7 H z) ,

7 . 8 0 (d d , 1 H , J = 8 . 7 H z , 1 . 9 H z)

, 7 . 4 5 (t , 2 H , J = 8 . 3 H z) ,

7 . 3 1 (m , 1 H) , 7 . 2 1 (m , 2 H) ,

2 . 7 2 (b r , 2 H) , 2 . 4 7 (b r , 2 H) ,

2 . 3 1 (s , 3 H) , 2 . 0 9 (m , 2 H) ,

2 . 0 0 (m , 2 H) 。

4 - [4 - (1 - 苯甲基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 1 - 甲基 - 六氫吡啶 - 4 - 醇 (2 3)

於 1 m l 之惠頓 (W h e a t o n) 玻璃小瓶中，令喹啉 2 2 (8 0 m g , 0 . 2 2 m m o l) 與 5 - 胺基 - 1 - 苯甲基吡啶 (5 4 m g , 0 . 2 4 m m o l) 、 氫氯化吡啶 (pyridium hydrochloride) (5 m g , 0 . 0 4 m m o l) 及苯酚 (1 0 4 m g , 1 . 1 1 m m o l) 併合。將該小瓶蓋住並在 1 0 0 ° C 下，加熱 1 6 小時。在將惠頓玻璃小瓶內容物冷卻後，以最少量的乙酸乙酯予以溶

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

檢

五、發明說明 (81)

4)

於一壓力瓶中，裝入喹啉 1 3 (3 . 5 g ,
1 0 . 0 m m o l)、丙烯酸甲酯 (6 . 0 g , 7 0 . 0
m m o l)、P d (O A c) ₂ (1 4 0 m g , 0 . 6 2
m m o l)、P P h ₃ (3 2 0 m g , 1 . 2 2 m m o l)
、D M F (4 m l) 及 N E t ₃ (1 5 m l) 用氮氣清洗該反
應瓶、予以密封並在 1 1 0 °C 加熱且攪拌 3 小時。將混合
物冷卻並用乙酸乙酯予以稀釋，然後將其移至分液漏斗，
用水及鹽水清洗，並予以乾燥 (硫酸鎂)。在過濾後，在
減壓下，將濾液濃縮，可得一黃色固體，將其再結晶 (乙
酸乙酯)，可得呈淺黃色固體之酯 2 4 (2 . 2 g , 7 2
%)。

¹ H N M R (C D C l ₃ ; 4 0 0 M H z) : δ :
8 . 7 6 (s , 1 H) , 8 . 4 7 (s , 1 H) ,
8 . 0 8 (d , 1 H) , 8 . 0 6 (d , 1 H) ,
7 . 8 7 (d d , J = 1 6 H z , 1 H z) ,
7 . 4 8 (t , 2 H) , 7 . 3 5 (t , 1 H) ,
7 . 2 5 (m , 2 H) ,
6 . 6 0 (d , J = 1 6 H z , 1 H z) ,
3 . 8 3 (s , 3 H) 。

3 - (4 - 苯氧基 - 喹啉 - 6 - 基) - 丙 - 2 - 烯 - 1
- 醇 (2 5)

將 D I B A L - H (8 . 8 m l , 1 M 之在甲苯中的

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (82)

溶液，8 . 8 m m o l) 逐滴地添加至在氮氣氛中、
 - 7 8 °C 之酯 2 4 (1 . 3 5 g , 4 . 4 1 m m o l) 於
 甲苯 (6 0 m l) 的溶液。然後，將反應液溫熱至 0 °C 並
 予以攪拌 3 0 分鐘，接著用 3 0 m l 之飽和的 Rochelle's 鹽
 淬熄，並將混合物攪拌一整夜。將雙層物移至分液漏斗並
 用水及鹽水清洗有機層，然後予以乾燥 (硫酸鎂) 。在過
 濾後，於減壓下，將有機層濃縮，可得一黃色油狀物，用
 矽膠層析法 (先後用 1 : 1 己烷 : 乙酸乙酯及乙酸乙酯
 洗提) ，將該油狀物純化。烯丙醇 2 5 以淺黃色油狀物
 的形式被分離出來 (9 0 0 m g , 7 3 %) 。

¹ H N M R (C D C l ₃ ; 4 0 0 M H z) : δ :

8 . 7 2 (s , 1 H) , 8 . 2 7 (s , 1 H) ,
 7 . 6 6 (m , 2 H) , 7 . 6 2 (m , 1 H) ,
 7 . 4 7 (m , 3 H) , 7 . 3 4 (m , 1 H) ,
 7 . 2 4 (m , 2 H) , 6 . 8 2 (d d , 1 H) ,
 6 . 5 6 (m , 1 H) , 4 . 4 1 (d d , 1 H) 。

乙酸 3 - (4 - 苯氧基喹啉 - 6 - 基) - 烯丙酯 (2 6)

將乙醯氯 (0 . 3 m l , 4 . 2 m m o l) 添加至醇
2 5 (9 0 0 m g , 3 . 2 3 m m o l) 及吡啶 (0 . 8
 m l , 1 0 m m o l) 於無水二氯甲烷 (1 5 m l) 所形
 成之 0 °C 溶液中。將所得的混合物攪拌 2 小時，用二氯甲
 烷 (1 0 m l) 及 5 % H C l (1 0 m l) 予以稀釋。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

結

五、發明說明 (83)

將該混合物移至分液漏斗並用水及鹽水清洗有機層。將有機層乾燥 (硫酸鈉) , 過濾出固體並於真空下去除溶劑, 可得呈黃色蠟狀固體之所要的乙酸酯 26 (1 . 04 g , 100 %) 。

^1H NMR (CDCl_3 ; 400 MHz) : δ :
 8 . 72 (s , 1 H) ,
 8 . 30 (d , 1 H , $J = 1 . 7 \text{ Hz}$) ,
 7 . 98 (m , 2 H) , 7 . 49 (m , 2 H) ,
 7 . 30 (m , 1 H) , 7 . 25 (m , 2 H) ,
 6 . 84 (d , 1 H , $J = 16 . 0 \text{ Hz}$) ,
 6 . 46 (m , 1 H) ,
 4 . 79 (dd , 2 H , $J = 6 . 2 \text{ Hz}$, $1 . 2 \text{ Hz}$)
 , 2 . 22 (s , 3 H) 。

乙酸 3 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 烯丙酯 (27)

在 100 °C 下, 將酯 26 (630 mg , 1 . 97 mmol) 及 5 - 胺基 - 1 - 苯基磺醯基吡啶於苯酚 (3 . 0 g) 所形成的混合物加熱 20 小時。利用蒸餾, 將過多的苯酚去除, 並用矽膠層析法 (先後用 1 : 1 乙酸乙酯 : 己烷及乙酸乙酯洗提) , 將所得的棕色油狀物純化。可得呈雜白色蠟狀固體之喹啉 27 (430 mg , 43 %) 。

^1H NMR (CDCl_3 ; 400 MHz) : δ :

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

結

五、發明說明 (84)

8 . 6 1 (s , 1 H) , 7 . 9 2 (m , 3 H) ,
 7 . 8 2 (m , 4 H) , 7 . 5 1 (m , 2 H) ,
 7 . 4 3 (m , 3 H) , 6 . 7 4 (d , 1 H) ,
 6 . 6 2 (d , 1 H) , 6 . 4 5 (d t , 1 H) ,
 4 . 7 4 (d d , 2 H) , 2 . 0 9 (s , 3 H) 。

方法 G' : 3 - [4 - (1 - 苯甲基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基
胺基) - 噻唑啉 - 6 - 基] - 丙烯酸甲酯 (2 8) 及 3 -
[4 - (4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 噻唑啉 - 6 - 基] - 丙
- 2 - 烯 - 1 - 醇 (2 9)

使用與將中間物 2 6 轉化為 2 7 所用者相同的程序，
 將 4 - 苯氧基噻唑啉中間物 2 4 及 2 5 分別轉化為彼等之
 4 - 芳胺基噻唑啉衍生物 2 8 及 2 9 。

方法 H : { 6 - [3 - (6 - 胺基 - 3 - 氮雜 - 雙環 [3
. 1 . 0] 己 - 3 - 基) - 丙烯基] - 噻唑啉 - 4 - 基 }
- (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基) - 胺 (3 0)

在室溫下，將乙酸鈣 (6 m g , 0 . 0 2 7 m m o l)
) 及 P (C ₆ H ₄ - m - S O ₃ N a) ₃ (3 0 m g ,
 0 . 0 5 3 m m o l) 於水 (0 . 3 m l) 中所形成之混
 合物攪拌 1 小時，接著添加乙酸烯丙酯 1 6 (1 5 0 m g
 , 0 . 3 0 m m o l) 及在 C H ₃ C N (3 m l) 中的 (1 a ,
 5 a , 6 a) - 6 - 第三丁氧羰基胺基 - 3 - 氮雜
 雙環 [3 . 1 . 0] 己烷 (如 Brighty, et. al. synlett 1996,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (85)

pp. 1097-1099 所述者製備) (7 1 m g , 0 . 3 6 m m o l) 。在 5 0 °C 下，將所得的混合物攪拌 1 . 5 小時，然後，將其納入乙酸乙酯 (1 0 m l) 中並用含水的氯化銨及水清洗。令分離出的有機層經硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得一棕色油狀物。用製備 T L C (乙酸乙酯洗提) 進行純化，可得 3 1 m g 的黃色固體。將所得之經 B O C - 保護的產物溶於甲醇 (5 m l) 並藉由在攪拌的同時，將 H C l 氣通入溶液，而予以去保護。在濃縮及於高真空中乾燥後，可得呈 H C l 鹽形式之胺 3 0 (1 8 m g , 1 1 %) : M S m / z (M H ⁺) 5 3 7 . 2 ; H P L C 4 . 4 2 3 分鐘。

方法 I : 4 - [4 - (4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 四氫吡喃 - 4 - 醇氫氯酸鹽 (3 2)
4 - (4 - 氯 - 喹啉 - 6 - 基乙炔基) - 四氫 - 吡喃 - 4 - 醇 (3 1)

用 N₂ 漂洗 4 - 乙炔基 - 4 - 羥基四氫吡喃 (7 0 m g , 0 . 5 5 m m o l) 、 4 - 氯 - 6 - 碘基喹啉 (1 4 5 m g , 0 . 5 0 m m o l) 、 氯化雙 (三苯基膦) 鈰 (II) (2 4 m g , 7 莫耳 %) 、 碘化銅 (I) (6 . 6 m g , 7 莫耳 %) 及二異丙胺 (5 6 m g , 0 . 5 5 m m o l) 於無水 T H F (5 m l) 所形成的混合物並於氮氣氛中，攪拌 2 小時。在用乙酸乙酯 (3 0 m l) 稀釋後，用含水的氯化銨、水及鹽水清洗該混合物

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (86)

、令其經硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得呈黃色固體的產物。
令該產物自乙酸乙酯／己烷再結晶析出，可得 0 . 1 3 g (9 0 %) 的黃褐色固體：

^1H NMR (CD_3OD) δ

1 . 8 8 (m , 2 H) , 2 . 0 4 (m , 2 H) ,
3 . 7 3 (m , 2 H) , 3 . 9 1 (m , 2 H) ,
8 . 0 4 (s , 1 H) , 8 . 0 5 (s , 1 H) ,
8 . 3 6 (s , 1 H) , 9 . 0 0 (s , 1 H) 。

4 - [4 - (4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 四氫呋喃 - 4 - 醇氫氨酸鹽 (3 2)

在反應瓶中，於 9 0 °C 下，在攪拌的同時，將 4 - (4 - 氯 - 喹啉 - 6 - 基乙炔基) - 四氫呋喃 - 4 - 醇 (4 3 m g , 0 . 1 5 m m o l) 及 4 - 苯氧基苯胺 (2 8 m g , 0 . 1 5 m m o l) 於 2 m l 第三丁醇／1，2 - 二氯甲烷 (1 : 1) 中的混合物加熱 1 小時。將反應液冷卻，用二氯甲烷予以稀釋並過濾收集產物，可得呈黃色固體之 5 2 m g (7 3 %) 3 2：

^1H NMR (CD_3OD) δ

1 . 8 6 (m , 2 H) , 2 . 0 2 (m , 2 H) ,
3 . 7 4 (m , 2 H) , 3 . 9 2 (m , 2 H) ,
7 . 0 5 (m , 4 H) ,
7 . 1 5 (t , J = 7 . 6 \text{ Hz} , 1 H) ,
7 . 3 8 (t , J = 7 . 6 \text{ Hz} , 2 H) ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

備

五、發明說明 (87)

7 6 9 (d , J = 6 . 8 H z , 2 H) ,

7 . 8 1 (d , J = 7 . 2 H z , 1 H) ,

8 . 0 7 (d , J = 7 . 2 H z , 1 H) ,

8 . 7 5 (s , 2 H) ;

H P L C : 6 . 3 6 分鐘。

方法 J : (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六
氫吡啶 - 4 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺

4 - (4 - 氯 - 喹啉 - 6 - 基乙炔基) - 六氫吡啶 - 1
- 羧酸第三丁酯

於氮氣氛中，在室溫下，將 4 - 乙炔基 - 六氫吡啶 -
1 - 羧酸第三丁酯 (1 . 1 2 g , 5 . 3 5 m m o l) 、
4 - 氯 - 6 - 碘基喹啉 (1 . 3 5 g , 4 . 6 5
m m o l) 、二氯基雙 (三苯基膦) 鈹 (II) (0 . 1 6
g , 0 . 2 3 m m o l) 、碘化銅 (I) (0 . 0 4 4 g
 , 0 . 2 3 m m o l) 及二異丙胺 (0 . 4 7 g ,
4 . 6 5 m m o l) 於無水 T H F (2 0 m l) 所形成的
混合物攪拌 2 小時。在濃縮後，將殘留物溶於二氯甲烷 (1 0 0 m l) ，用含水的氯化銨及鹽水予以清洗，令其經
硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得呈棕色油狀物的粗製產物。
用矽膠層柱 (採用 2 0 % 乙酸乙酯 / 己烷) ，進行純化，
可得 1 . 6 3 g (9 4 %) 之黏稠、黃色油狀物：

¹ H N M R (C D C l ₃)

1 . 4 5 (s , 9 H) ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (88)

1 . 6 7 - 1 . 7 5 (m , 2 H) ,

1 . 7 - 1 . 9 2 (m , 2 H) ,

2 . 8 4 (m , 1 H) ,

3 . 2 0 - 3 . 2 6 (m , 2 H) ,

3 . 7 8 (b r d , 2 H) , 7 . 8 8 (d d , 1 H) ,

7 . 9 7 (d , 1 H) , 8 . 2 6 (d , 1 H) ,

9 . 0 0 (s , 1 H) 。

(3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡啶 - 4 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺

於頂部緊緊蓋住的反應瓶內，在 9 0 °C 下，將 4 - (4 - 氯 - 喹啉 - 6 - 基乙炔基) - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯 (1 3 1 m g , 0 . 3 0 4 m m o l) 及 3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基苯胺氫氯酸鹽 (7 7 m g , 0 . 3 0 6 m m o l) 於第三丁醇 / C l C H ₂ C H ₂ C l (1 . 0 / 1 . 0 m l) 所形成的溶液加熱 3 0 分鐘。在冷卻後，用甲醇稀釋該黃色混合物並將 H C l 氣通入該混合物 1 0 分鐘。在攪拌 2 小時後，添加乙酸乙酯以沉澱析出更多的固體，用抽氣過濾法來收集固體，用乙酸乙酯予以清洗並進一步予以乾燥，可得 1 0 5 m g (6 6 %) 之黃色固體：

¹ H N M R (C D ₃ O D) δ

1 . 9 3 - 2 . 0 2 (m , 2 H) ,

2 . 1 8 - 2 . 2 4 (m , 2 H) ,

3 . 1 2 - 3 . 2 1 (m , 2 H) ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (89)

3 . 4 1 - 3 . 4 7 (m , 2 H) ,
 3 . 8 1 (s , 3 H) , 6 . 8 7 (d , 2 H) ,
 7 . 0 2 (t , 1 H) , 7 . 0 6 (d , 1 H) ,
 7 . 2 7 (t , 2 H) , 7 . 3 3 (d d , 1 H) ,
 7 . 5 6 (d , 1 H) , 7 . 8 0 (d , 1 H) ,
 8 . 0 6 (d , 1 H) , 8 . 7 9 (s , 1 H) ,
 8 . 8 3 (s , 1 H) ;

M S m / z (M H ⁺) 4 5 1 . 3 。

方法 K : (3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - [6 - (1
 - 丙 基 - 六 氫 吡 啶 - 3 - 基 乙 炔 基) - 喹 啉 - 4 - 基]
 - 胺

(3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - [6 - (1 - 丙 基 -
 六 氫 吡 啶 - 3 - 基 乙 炔 基) - 喹 啉 - 4 - 基] - 胺

將 (3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - (6 - 六 氫 吡
 啶 - 3 - 基 乙 炔 基 - 喹 啉 - 4 - 基) - 胺 (1 1 4 m g
 , 0 . 2 m m o l) 及 丙 醛 (1 1 6 m g , 2 . 0
 m m o l) 溶 於 甲 醇 / 水 (5 / 0 . 5 m l) 中 並 用 乙 酸
 將 p H 調 至 5 。 在 室 溫 下 , 將 反 應 液 攪 拌 一 整 夜 , 然 後 ,
 在 1 小 時 期 間 , 添 加 N a B H ₃ C N (1 3 m g , 0 . 2
 m m o l) 。 在 又 攪 拌 了 1 小 時 後 , 將 反 應 液 濃 縮 並 令 殘
 留 物 分 溶 於 二 氯 甲 烷 (3 0 m l) 及 飽 和 的 碳 酸 鈉 (2 0
 m l) 中 。 令 分 離 出 的 有 機 層 經 硫 酸 鈉 乾 燥 並 予 以 濃 縮 。
 利 用 製 備 T L C (採 用 1 0 % 甲 醇 / 乙 酸 乙 酯) , 進 行 純

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (90)

化，可得自由鹼產物，將其轉化為氫氯酸鹽，可得 4 2
m g (3 8 %) 的黃色固體：

^1H N M R ($\text{C D}_3\text{O D}$) δ

1 . 0 3 (t , 3 H) ,

1 . 7 8 - 1 . 8 7 (m , 4 H) ,

2 . 0 1 - 2 . 0 8 (m , 2 H) ,

2 . 2 8 (s , 3 H) , 2 . 9 6 (t , 1 H) ,

3 . 0 7 - 3 . 1 9 (m , 3 H) ,

3 . 3 1 (b r , 1 H) , 3 . 5 9 (d , 1 H) ,

3 . 8 0 (d , 1 H) , 6 . 9 4 (m , 3 H) ,

7 . 0 9 (t , 1 H) , 7 . 3 4 (t , 2 H) ,

7 . 5 3 (d , 1 H) , 7 . 6 3 (s , 1 H) ,

7 . 8 0 (d , 1 H) , 8 . 0 5 (d d , 1 H) ,

8 . 7 3 (s , 1 H) , 8 . 7 5 (s , 1 H) ;

M S m / z (M H^+) 4 7 7 . 1 。

方法 K' : { 6 - [1 - (2 - 胺基 - 乙基) - 六氫吡啶 -
3 - 基乙炔基] - 喹啉 - 4 - 基 } - (3 - 甲基 - 4 -
苯氧基 - 苯基) - 胺

{ 6 - [1 - (2 - 胺基 - 乙基) - 六氫吡啶 - 3 - 基乙
炔基] - 喹啉 - 4 - 基 } - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 -
苯基) - 胺

將 (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡
啶 - 3 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺 (1 1 4 m g

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (91)

， 0 . 2 m m o l) 及 N - (2 - 酮基乙基) 胺甲酸第三丁酯 (3 2 0 m g , 2 . 0 m m o l) 溶於甲醇 / 水 (5 / 0 . 5 m l) 中並用乙酸將 p H 調為 5 。在室溫下，將該反應液攪拌一整夜，然後，以 1 小時的時間，添加 N a B H ₃ C N (1 3 m g , 0 . 2 m m o l) 。在又攪拌了 1 小時後，將反應液濃縮並令殘留物分溶於二氯甲烷 (3 0 m l) 及飽和的碳酸鈉 (2 0 m l) 中。令分離出的有機層經硫酸鈉乾燥並進行濃縮。利用矽膠層柱 (採用 5 % 甲醇 / 乙酸乙酯) ，進行純化，可得自由鹼，將該自由鹼溶於甲醇。將 H C l 氣體通入該溶液 5 分鐘，經保護的產物會以氫氯酸鹽的形式沉澱析出。用乙酸乙酯稀釋該混合物並利用抽氣過濾法來收集固體，用乙酸乙酯予以清洗並進一步予以乾燥，可得 8 3 m g (7 1 %) 的黃色固體：

¹ H N M R (C D ₃ O D) δ

1 . 7 1 - 1 . 8 2 (b r , 2 H) ,

2 . 0 - 2 . 1 2 (b r , 2 H) ,

2 . 2 7 (s , 3 H) , 3 . 0 0 (t , 1 H) ,

3 . 0 3 - 3 . 1 9 (b r , 2 H) ,

3 . 4 0 (b r , 1 H) , 3 . 5 0 (s , 2 H) ,

3 . 6 2 (b r d , 1 H) , 3 . 7 0 (m , 1 H) ,

3 . 8 9 (b r d , 1 H) , 6 . 9 3 (m , 3 H) ,

7 . 0 8 (t , 1 H) , 7 . 3 3 (t , 2 H) ,

7 . 5 2 (d , 1 H) , 7 . 6 4 (s , 1 H) ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (92)

7 . 7 9 (d , 1 H) , 8 . 0 5 (d , 1 H) ,
 8 . 7 5 (s , 1 H) , 8 . 7 7 (s , 1 H) ;
 M S m / z (M H ⁺) 4 7 6 . 1 。

方法 L : 3 - { 2 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯
 胺基) - 喹唑啉 - 6 - 基] - 乙基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇
 3 - { 2 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) -
 喹唑啉 - 6 - 基] - 乙基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇

在內有 5 0 p s i 之氫氣的帕爾瓶中，將 3 - [4 -
 (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - [苯胺基] - 喹唑啉 - 6 - 基
 乙炔基) - 六氫吡啶 - 3 - 醇氫氯酸鹽 (1 0 0 m g ,
 0 . 1 9 m m o l) 及 P d / C (1 0 % , 6 m g) 的混
 合物搖晃一整夜並令其過濾通過矽藻土過濾墊。將濾液濃
 縮至小體積並在攪拌的同時，將其逐滴地添加至乙酸乙酯
 中。利用抽氣過濾法來收集固體，用乙酸乙酯予以清洗並
 進一步予以乾燥，可得 8 9 m g (8 9 %) 之黃色固體：

¹ H N M R (C D ₃ O D) δ

1 . 6 9 (d t , 1 H) , 1 . 8 1 (b r d , 1 H) ,
 1 . 9 5 (t , 3 H) , 2 . 1 5 (m , 1 H) ,
 2 . 2 8 (t , 3 H) , 2 . 9 3 (t , 1 H) ,
 3 . 0 2 (m , 3 H) , 3 . 1 8 (d , 1 H) ,
 3 . 3 1 (b r , 1 H) , 6 . 9 4 (m , 3 H) ,
 7 . 0 8 (t , 1 H) , 7 . 3 4 (t , 2 H) ,
 7 . 5 5 (d , 1 H) , 7 . 6 6 (d , 1 H) ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

結

五、發明說明 (93)

7 . 7 8 (d , 1 H) , 8 . 0 2 (d , 1 H) ,
 8 . 5 8 (s , 1 H) , 8 . 7 3 (s , 1 H) ;
 M S m / z (M H ⁺) 4 5 5 . 2 。

方法 M : N { 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺
 基) - 喹唑啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 2 - 嗎福啉
 - 4 - 基 - 乙醯胺

2 - 氯 - N - [3 - (4 - 氯 - 喹唑啉 - 6 - 基) - 丙 -
 2 - 炔基] - 乙醯胺

將 2 - 氯 - N - 丙 - 2 - 炔基 - 乙醯胺 (3 8 5 m g ,
 2 . 9 3 m m o l) 及 4 - 氯 - 6 - 碘基喹唑啉 (8 5 0 m g ,
 1 當量) 溶於無水 T H F 及二異丙胺 (2 9 6 m g ;
 0 . 4 1 m l ; 1 當量) 中。將 0 . 0 4 當量的碘化銅
 (2 2 m g) 及 P d (P P h ₃) ₂ C l ₂ (8 2 m g) 添加至該混合物中。
 於氮氣氛中，室溫下，將該反應液攪拌一整夜 (~ 2 0 小時) 。
 然後，於真空中去除溶劑並將殘留物溶於二氯甲烷中。
 將該溶液移至分液漏斗並用 1 x 飽和的氯化銨及鹽水予以清洗，
 令其經硫酸鈉乾燥並於真空中去除溶劑。利用矽膠層析法
 (以 1 : 1 己烷 / 乙酸乙酯洗提) 進行純化，收集 R _f = 0 . 2 5 的部
 份。如此可得呈雜白色固體的 2 - 氯 - N - [3 - (4 -
 氯 - 喹唑啉 - 6 - 基) - 丙 - 2 - 炔基] - 乙醯胺 (4 5 4 m g ,
 5 3 %) 。

¹ H N M R (4 0 0 M H z ; C D C l ₃) δ

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (94)

4 . 1 2 (2 H , s) ,

4 . 4 0 (2 H , d , J = 5 . 2 H z) ,

7 . 9 1 - 7 . 9 3 (1 H , d d , J = 2 , 6 . 8 H z) , 8 . 0 0 (1 H , d , J = 8 . 4 H z) ,

8 . 3 4 (1 H , d , J = 1 . 6 H z) ,

9 . 0 3 (1 H , s) 。

L R M S (M ⁺) : 2 9 4 . 0 , 2 9 6 . 0 , 2 9 8 . 1

。

2 - 氯 - N - { 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 乙醯胺

在 8 7 °C 下，將 2 - 氯 - N - [3 - (4 - 氯 - 喹啉 - 6 - 基) - 丙 - 2 - 炔基] - 乙醯胺 (5 0 m g , 0 . 1 7 m m o l) 及 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基苯胺 (3 6 m g , 0 . 9 當量) 於 1 , 2 - 二氯乙烷 (1 m l) 及第三丁醇 (1 m l) 中所形成的溶液加熱 3 0 分鐘。然後，將該混合物冷卻至室溫並用乙酸乙酯予以稀釋以進一步加速沉澱析出。然後將該溶液過濾以得到呈黃色粉末之偶合的產物 (7 3 m g , 9 0 %) 。

2 . 2 8 (3 H , s) , 4 . 1 0 (2 H , s) ,

4 . 3 0 (2 H , s) , 6 . 9 3 (3 H , d) ,

7 . 0 9 (1 H , t) , 7 . 3 4 (2 H , t) ,

7 . 5 0 - 7 . 5 3 (1 H , d d , J = 2 . 6 , 6 H z

), 7 . 6 3 (1 H , d , J = 2 . 4 H z) ,

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (95)

7 . 7 8 (1 H , d , J = 8 H z) ,

8 . 0 6 - 8 . 0 8 (1 H , d d , J = 1 . 4 ,
7 . 2 H z) ,

8 . 6 8 (1 H , d , J = 1 . 2 H z) ,

8 . 7 5 (1 H , s) 。

L R M S (M ⁺) : 4 5 7 . 0 , 4 5 9 . 1 ; (M ⁻) :
4 5 5 . 7 , 4 1 9 . 6 。

N - { 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) -
喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 2 - 嗎福啉 - 4 -
基乙醯胺

將 3 當量之嗎福啉 (3 1 m g) 添加至 2 - 氯 - N -
{ 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉
- 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 乙醯胺 (6 3 m g ,
0 . 1 2 m m o l) 於甲苯 (1 0 m l) 所形成的溶液中
，並將如是所得之混合物加熱回流一整夜。將該反應液冷
卻至室溫，過濾出嗎福啉鹽並將濾液中的溶劑移除。將殘
留物再溶於二氯甲烷 (帶有小量的甲醇) 並將 H C l 氣體
通入該溶液 2 - 3 分鐘。然後，將該溶液濃縮至 2 - 3
m l ，用乙酸乙酯予以稀釋並過濾，可得呈黃色 / 棕色固
體之 N - { 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) -
喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 2 - 嗎福啉 -
4 - 基乙醯胺 (6 5 m g , 9 4 %) 。

¹ H N M R (4 0 0 M H z ; C D ₃ O D) δ

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (96)

2 . 2 7 (3 H , s) , 3 . 2 1 (2 H , m) ,

3 . 5 6 (2 H , m) , 3 . 8 7 (2 H , m) ,

4 . 0 4 (2 H , m) , 4 . 0 9 (2 H , s) ,

4 . 3 6 (2 H , s) ,

6 . 9 3 (3 H , d , J = 8 . 4) ,

7 . 0 9 (1 H , t , J = 7 . 4 H z) ,

7 . 3 4 (2 H , t , J = 8 H z) ,

7 . 5 4 (1 H , d d) , 7 . 6 5 (1 H , s) ,

7 , 8 2 (1 H , d , J = 8 . 8 H z) ,

8 . 0 6 (1 H , d , J = 8 . 4 H z) ,

8 . 7 6 (1 H , s) , 8 . 8 0 (1 H , s) 。

L R M S (M ⁺) : 5 0 8 . 0 ; (M ⁻) : 5 0 6 . 0 。

方法 N : (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡啶 - 4 - 基乙炔基 - 吡啶并 [3 , 4 - d] 嘧啶 - 4 - 基) - 胺

4 , 6 - 二氯 - 吡啶并 [3 , 4 - d] 嘧啶 - 4 - 酮

將 D M F (0 . 1 m l) 添加至 6 - 氯 - 3 H - 吡啶并 [3 , 4 - d] 嘧啶 - 4 - 酮 (1 . 8 2 g , 1 0 m m o l) 中 , 接著逐滴添加亞磺醯氯 (1 0 m l) 。 將燒瓶裝上冷凝器及乾燥試管並將內容物加熱回流 ~ 2 0 分鐘 , 因而使固體溶解。 將加熱再持續 1 小時 , 然後冷卻。 添加甲苯以清洗燒瓶的側面並於真空中 , 將溶劑蒸發。 重覆與甲苯的共沸二次並將所得之粗製產物直接用於下

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (97)

一步驟。

(6 - 氯 - 吡啶并 [3 , 4 - d] 嘧啶 - 4 - 基) - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

將前述反應所得的 4 , 6 - 二氯 - 吡啶并 [3 , 4 - d] 嘧啶納入二噁烷 (5 0 m l) 中，添加 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基苯胺氫氯酸鹽 (2 . 8 g , 1 2 m m o l) 並並將內容物加熱至 $\sim 80^{\circ}\text{C}$ 的外部浴溫度 3 小時，因而有黃色沉澱發生。再添加二噁烷 (2 0 m l) 並在 $\sim 75^{\circ}\text{C}$ 下，將內容物加熱 1 2 小時。將該溶液過濾並將所得的黃色固體置於真空中，可得所要的 (6 - 氯 - 吡啶并 [3 , 4 - d] 嘧啶 - 4 - 基) - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺氫氯酸鹽 (3 . 6 g , $\sim 100\%$)。

^1H NMR (CD_3OD ; 4 0 0 M H z) : δ :

9 . 0 5 (s , 1 H) , 8 . 8 7 (s , 1 H) ,

8 . 4 (s , 1 H) ,

7 . 6 9 (d , $J = 2 . 5 \text{ H z}$, 1 H) ,

7 . 5 8 (d d , $J = 8 . 7 , 2 . 5 \text{ H z}$, 1 H) ,

7 . 3 5 (d d , $J = 8 . 7 , 7 . 5 \text{ H z}$, 2 H) ,

7 . 1 0 (t , $J = 7 . 2 \text{ H z}$, 1 H) ,

6 . 9 4 (d , $J = 8 . 7 \text{ H z}$, 3 H) ,

2 . 2 9 (s , 3 H) 。

MS m / z (MH^+) : 3 6 3 . 2 。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (98)

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡啶 - 4 - 基乙炔基 - 吡啶并 [3 , 4 - d] 嘧啶 - 4 - 基) - 胺

將 (6 - 氯 - 吡啶并 [3 , 4 - d] 嘧啶 - 4 - 基) - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺氫氯酸鹽 (200 mg , 0 . 5 mmol) 、 4 - 乙炔基 - 六氫吡啶 - 1 - 羧酸第三丁酯 (314 mg , 1 . 5 mmol) 、 Pd (PhCN) ₂ Cl₂ (19 mg , 0 . 05 mmol) 、 1 , 4 - 雙 (二苯基膦基) 丁烷 (32 mg , 0 . 075 mmol) 及 CuI (4 . 8 mg , 0 . 025 mmol) 裝入經火焰乾燥過的西洋梨形燒瓶中。添加二噁烷並在氬氣氛下，將二異丙胺 (0 . 32 ml , 2 . 28 mmol) 添加至該已攪拌過的懸浮液中，因而，有許多固體溶解。然後將該燒瓶 (裝有冷凝器) 置於已預熱過的油浴中並於 104 °C 的浴溫下，加熱 14 小時，在該時點，LC / MS 顯出起始物已消失了。然後，令該反應混合物過濾通過矽石過濾墊，予以濃縮及對其進行層析 (使用 20 - 80 % 乙酸乙酯 - 己烷的梯度洗提) ，可得呈固體之所要的偶合產物 (165 mg , 62 %) 。將該固體納入二氯甲烷 (及極小量的甲醇以助於溶解) ，通入 HCl 氣體，接著添加乙醚，因而有固體沉澱析出，過濾出固體並將其置於真空中，可得呈氫氯酸鹽形式之所要的 (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡啶 - 4 - 基乙炔基 - 吡啶并 [3 , 4 - d] 嘧啶 - 4 - 基) - 胺。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (99)

^1H NMR (CDCl_3 ; 400 MHz) : δ

9 . 12 (s , 1 H) , 8 . 85 (s , 1 H) ,

8 . 68 (s , 1 H) ,

7 . 70 (d , $J = 2 . 5 \text{ Hz}$, 1 H) ,

7 . 58 (dd , $J = 8 . 7$, $2 . 5 \text{ Hz}$) ,

7 . 34 (dd , $J = 8 . 3$, $7 . 5 \text{ Hz}$) ,

7 . 10 (app t , $J = 7 . 2 \text{ Hz}$, 1 H) ,

6 . 94 (d , $J = 8 . 7 \text{ Hz}$, 3 H) ,

3 . 42 (m , 2 H) , 3 . 19 (m , 3 H) ,

2 . 29 (s , 3 H) , 2 . 22 (m , 2 H) ,

2 . 0 (m , 2 H) 。

MS m / z (MH^+) : 436 . 3 。

方法 O : 4 - 胺基 - 4 - 甲基 - 1 - [4 - (3 - 甲基 -
4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 戊 - 1 - 炔
- 3 - 醇

5 - (4 - 氯 - 喹啉 - 6 - 基乙炔基) - 4 , 4 - 二甲基 - 噁唑啉 - 2 - 酮

於氮氣氛中，室溫下，將 4 , 4 - 二甲基 - 5 - 乙炔基 - 2 - 噁唑啉酮 (1 . 10 g , 7 . 90 mmol) 、 4 - 氯 - 6 - 碘基喹啉 (1 . 63 g , 5 . 60 mmol) 、二氯雙 (三苯基膦) 鈀 (II) (200 mg , 0 . 28 mmol) 、碘化銅 (53 mg , 0 . 28 mmol) 及二異丙胺 (0 . 57 g , 5 . 60

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (100)

m m o l) 於無水 T H F (3 0 m l) 所形成的混合物攪拌 4 小時。在濃縮後，將殘留物溶於二氯甲烷 (8 0 m l) ，用含水的氯化銨及鹽水予以清洗，令其經硫酸鈉乾燥並予以濃縮，可得呈棕色油狀物之粗製產物。用矽膠層柱 (使 5 0 - 7 0 % 乙酸乙酯 / 己烷) 進行純化，可得 1 . 2 2 g (7 2 %) 黃色固體：

^1H N M R (C D C l ₃) δ

1 . 4 9 (s , 3 H) , 1 . 5 3 (s , 3 H) ,
5 . 1 4 (s , 1 H) , 5 . 5 7 (b r s , 1 H) ,
7 . 9 5 (d d , 1 H) ,
8 . 0 4 (d , 1 H , J = 8 . 8 H z) ,
8 . 3 8 (d , 1 H , J = 2 . 0 H z) ,
9 . 0 5 (s , 1 H) 。

4 - 胺基 - 4 - 甲基 - 1 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹唑啉 - 6 - 基] - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇

於頂部緊緊蓋住的反應瓶中，在 9 0 °C 下，將 5 - (4 - 氯 - 喹唑啉 - 6 - 基乙炔基) - 4 , 4 - 二甲基 - 噁唑啉 - 2 - 酮 (1 5 1 m g , 0 . 5 m m o l) 及 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基苯胺氫氯酸鹽 (1 3 0 m g , 0 . 5 5 m m o l) 於第三丁醇 / C l C H ₂ C H ₂ C l (1 : 1 , 2 . 0 m l) 所形成的溶液加熱 3 0 分鐘。冷卻後，用乙酸乙酯稀釋該黃色混合物，以沉澱析出更多的固體，以抽氣過濾法來收集固體，用乙酸乙酯予以清洗並進一步予以

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (101)

乾燥，可得 215 mg (86 %) 之黃色固體。立即將該物質 (215 mg , 0.43 mmol) 與 KOH (0.51 g , 9.0 mmol) 併合於甲醇／水 (9 / 3 ml) 中並回流 20 小時。在冷卻後，用 0.60 g (10.0 mmol) 乙酸中和該反應液並予以濃縮。將殘留物懸浮於二氯甲烷中並於矽膠上進行純化 (使用 20 % 甲醇／二氯甲烷)。將純化的自由鹼轉化為氫氯酸鹽，可得 46 mg (22 %) 之黃色固體：

^1H NMR (CD_3OD) δ

1.49 (s , 3 H) , 1.52 (s , 3 H) ,
2.28 (s , 3 H) , 4.64 (s , 1 H) ,
6.93 (m , 3 H) , 7.09 (t , 1 H) ,
7.34 (m , 2 H) , 7.55 (dd , 1 H) ,
7.65 (dd , 1 H) , 7.65 (d , 1 H) ,
7.65 (d , 1 H) , 7.83 (d , 1 H) ,
8.13 (dd , 1 H) , 8.77 (s , 1 H) ,
8.87 (s , 1 H) ;

MS m/z (MH^+) 439.2。

下文的實施例係使用前文所述的方法製得。在下表中的實施例編號不等於前文之實驗部所提到的化合物編號。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

結

五、發明說明 (103)

		胺		
9	G'	3-[4-(4-苯甲基-苯胺基)-喹啉-6-基]-(E)-丙-2-烯-1-醇	368.2	6.20
10	G'	N,N-二乙基-3-[6-(3-羥基-(E)-丙烯基)-喹啉-4-基胺基]-苯甲醯胺	377.2	4.28
11	I'	4-[4-(1-苯甲基氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-1-甲基-六氫吡啶-4-醇	465.1	4.88
12	I	4-[4-(4-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基胺基)喹啉-6-基乙炔基]-1-甲基-六氫吡啶-4-醇	538.2, 445.0	4.86
13	I	4-[4-(4-苯甲基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-1-甲基-六氫吡啶-4-醇	449.2, 356.2	5.11
14	I	1-甲基-4-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-4-醇	451.2, 143.2	4.89
15	B	3-(6-環丁基-喹啉-4-基胺基)-N,N-二乙基-苯甲醯胺	375.3	6.24
16	B	(4-苯甲基-苯基)-(6-環丁基-喹啉-4-基)-胺	366.3	8.49
17	B	(6-環丁基-喹啉-4-基)-(1H-吡啶-5-基)-胺	315.2	5.63

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (104)

18	B	(4-苯甲基氧基-苯基)-(6-環 丁基-喹啉-4-基)-胺	382.2	7.98
19	G'	3-[4-(1H-吡啶-5-基胺基)-喹 啉-6-基]-(E)-丙-2-烯-1-醇	317.3	3.66
20	G'	3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹 啉-6-基]-(E)-丙-2-烯-1-醇	384.3	5.85
21	I	4-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹 啉-6-基乙炔基]-四氫-哌 喃-4-醇	438.1	6.34
22	I	4-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5 基胺基)-喹啉-6-基]-2-甲 基-丁-3-炔-2-醇	483.2	6.55
23	I	4-[4-(1H-吡啶-5-基胺基)-喹 啉-6-基]-2-甲基-丁-3-炔- 2-醇	343.2	4.61
24	I	4-[4-(4-苯甲基-苯胺基)-喹 啉-6-基]-2-甲基-丁-3-炔- 2-醇	394.2	7.06
25	C	3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹 啉-6-基]-環丁烷羧酸乙酯	440.2	7.93/7.83
26	B	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基)- (6-環丁基-喹啉-4-基)-胺	455.2	7.80
27	I	4-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹 啉-6-基]-2-吡啶-3-基-丁-	459.2	6.64

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (105)

		3-炔-2-醇		
28	I	4-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-2-吡啶-3-基-丁-3-炔-2-醇	546.2	6.27
29	G'	3-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-(E)-丙-2-烯-1-醇	457.2	5.80
30	G'	3-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-(E)-丙-2-烯-1-醇	407.3	5372
31	G'	3-[4-(1-苯甲基-1H-5-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-(E)-丙-2-烯-1-醇	408.2	5.15
32	I	4-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-1-甲基-六氫吡啶-4-醇	488.2	4.84
33	I	4-[4-(4-苯甲基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-四氫-哌喃-4-醇	525.1	6.11
34	I	4-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-四氫-哌喃-4-醇	436.2	6.56
35	A	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基)-[6-(3-咪唑-1-基-丙-1-炔基)-	505.2	5.80

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (106)

		喹啉-4-基]-胺		
36	I	5-甲氧基-3,5-二甲基-1-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-己-1-炔-3-醇	468.3	8.01
37	I	1-[4-(4-苯甲基-苯胺基)-喹啉-6-基]-5-甲氧基-3,5-二甲基-己-1-炔-3-醇	466.3	8.21
38	I	1-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-5-甲氧基-3,5-二甲基-己-1-炔-3-醇	555.2	7.55
39	I	4-[4-(4-苯甲基-苯胺基)-喹啉-6-基]-2-吡啶-3-基-丁-3-炔-2-醇	457.4	6.79
40	I	4-[(4-(4-苯甲基-苯胺基)-喹啉-6-基]-2-吡啶-4-基-丁-3-炔-2-醇	457.3	6.71
41	A	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基)-[6-(3-二甲基胺基-丙-1-炔基)-喹啉-4-基]-胺	482.2	5.16
42	G	乙酸 3-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-(E)-烯丙酯	499.2	7.01
43	C	3-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-	527.2	7.54/7.64

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (107)

		5-基胺基)-喹啉-6-基]-環 丁烷羧酸乙酯		
44	I	1-甲基-4-{4-[1-(丙烷-2-磺 醯基)-1H-吡啶-5-基胺基]- 喹啉-6-基乙炔基}-六氫吡 啶-4-醇	504.3	4.41
45	H	{6-[3-(6-胺基-3-氮雜-雙環 [3.1.0]己-3-基(1a,5a,6a))-丙 烯基]-喹啉-4-基}(1-苯磺 醯基-1H-吡啶-5-基)-胺	537.2	4.42
46	I	2-甲基-4-{4-[1-(丙烷-2-磺 醯基)-1H-吡啶-5-基胺基]- 喹啉-6-基}-丁-3-炔-2-醇	449.2	6.11
47	I	4-[4-(4-苯甲氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-2-甲基-丁- 3-炔-2-醇	410.3	6.63
48	I	N,N-二乙基-3-[6-(3-羥基-3- 甲基-丁-1-炔基)-喹啉-4- 基胺基]-苯甲醯胺	403.3	5.06
49	I	4-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶- 5-基胺基)-喹啉-6-基]-2- 吡啶-4-基-丁-3-炔-2-醇	546.3	6.26
50	D	{3-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶- 5-基胺基)-喹啉-6-基]-環	485.2	5.97

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (108)

		丁基)-甲醇		
51	A	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-[3-(2-甲氧基-乙基胺基)-丙-1-炔基]-喹啉-4-基)-胺	512.2	5.11
52	A	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-{6-[3-(2-六氫吡啶-1-基-乙胺基)-丙-1-炔基]-喹啉-4-基}-胺	563.2	5.23
53	E	{3-[(4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-環丁基}-吡咯啉-1-基-甲酮	552.2	6.45/6.64
54	A	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基)-[6-3-嗎福啉-4-基-丙-1-炔基]-喹啉-4-基]-胺	524.2	6.45
55	A	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基)-{6-[3-(1,1-二酮基-1&硫嗎福啉-4-基)-丙-1-炔基]-喹啉-4-基}-胺	572.2	6.36
56	A	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基)-[6-(3-甲胺基-丙-1-炔基)-喹啉-4-基]-胺	468.2	4.89
57	A	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基)-{6-[3-(2-嗎福啉-4-基-乙胺基)-丙-1-炔基]-喹啉-4-基	567.2	5.05

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (109)

		-胺		
58	A	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基)- [6-{3-[3-(4-甲基-六氫吡啶- 1-基)-丙基胺基]-丙-1-炔基 }-喹啉-4-基)-胺	594.2	4.41
59	A	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基)- {6-(3-吡咯啉-1-基-丙-1-炔 基)-喹啉-4-基]-胺	508.3	5.21
60	I	4-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5- 基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-四氫-哌喃-4-醇	476.2	5.55
61	I	4-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5- 基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-四氫-哌喃-4-醇	475.2	6.16
62	I	4-[4-(1-環丙基甲基-1H-吡 啶-5-基胺基)-喹啉-6-基 乙炔基]-四氫-哌喃-4-醇	439.3	5.82
63	I	4-[4-(1-乙烷磺醯基-1H-吡 啶-5-基胺基)-喹啉-6-基 乙炔基]-四氫-哌喃-4-醇	477.2	5.34
64	I	4-[4-(1-甲烷磺醯基-1H-吡 啶-5-基胺基)-喹啉-6-基 乙炔基]-四氫-哌喃-4-醇	463.2	4.99
65	G'	3-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-	436.2	6.59

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (110)

		基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-環己醇		
66	I	1-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5- 基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-環己醇	473.3	7.51
67	I	1-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶- 5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔 基]-環己醇	523.3	7.37
68	I	4-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶- 5-基胺基)-喹啉-6-基]-1- 甲氧基-2-甲基-丁-3-炔-2-醇	513.3	6.37
69	I	4-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5- 基胺基)-喹啉-6-基]-1-甲 氧基-2-甲基-丁-3-炔-2-醇	463.3	6.43
70	I	4-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5- 基胺基)-喹啉-6-基]-2-吡 啶-3-基-丁-3-炔-2-醇	496.2	6.38
71	J	4-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶- 5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔 基]-六氫吡啶-4-醇	524.2	4.78
72	J	(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基)- (6-六氫吡啶-4-基乙炔基-喹 啉-4-基)-胺	508.1	5.67
73	J	[6-(4-胺基-四氫-哌喃-4-基	524.3	5.00

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (111)

		乙炔基)-喹啉-4-基]-(1-苯 磺醯基-1H-吡啶-5-基)-胺		
74	I	4-[4-(4-苯甲氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-四氫- 吡喃-4-醇	452.3	6.26
75	I	4-{4-[3-甲基-4-(吡啶-2-基 甲氧基)-苯胺基]-喹啉-6- 基乙炔基}-四氫-吡喃-4-醇	467.3	5.24
76	I	1-甲基-4-{4-[3-甲基-4-(吡 啶-2-基甲氧基)-苯胺基]-喹 啉-6-基乙炔基}-六氫吡啶 -4-醇	480.3	4.07
77	J	3-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶- 5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔 基]-六氫吡啶-3-醇	524.2	5.6
78	I	1-環丙基-3-{4-[1-(丙烷-2- 磺醯基)-1H-吡啶-5-基胺基]-喹啉-6-基}-丙-2-炔-1- 醇	461.1	6.23
79	I	1-環丙基-3-[4-(4-苯氧基-苯 胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔 -1-醇	408.2	7.00
80	I	4-甲基-1-[4-(4-苯氧基-苯胺 基)-喹啉-6-]-戊-1-炔-3-	410.3	7.48

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (112)

		醇		
81	I	1-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-4-甲基-戊-1-炔-3-醇	497.2	7.09
82	I	1-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-4-甲基-戊-1-炔-3-醇	448.3	6.58
83	I	4-甲基-1-{4-[1-(丙烷-2-磺醯基)-1H-吡啶-5-基胺基]-喹啉-6-基}-戊-1-炔-3-醇	463.2	6.69
84	I	1-[4-(4-苯甲基氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-4-甲基-戊-1-炔-3-醇	424.2	7.31
85	I	4-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-4-醇	437.2	4.81
86	I	4-{4-[4-(1-苯基-乙氧基)-苯胺基]-喹啉-6-基乙炔基}-四氫-哌喃-4-醇	466.2	6.46
87	I	1-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-4,4-二甲基-戊-1-炔-3-醇	462.3	7.00
88	I	4,4-二甲基-1-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-戊-1-	424.2	7.89

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (113)

		炔 -3-醇		
89	I	4,4-二甲基-1-{4-[1-(丙烷-2- 磺醯基)-1H-吡啶-5-基胺基]-噻唑啉-6-基}-戊-1-炔-3- 醇	477.2	7.12
90	I	1-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶- 5-基胺基)-噻唑啉-6-基]- 4,4-二甲基-戊-1-炔-3-醇	511.2	7.51
91	I	1-[4-(4-苯甲氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-4,4-二甲基- 戊-1-炔-3-醇	438.2	7.74
92	I	4,4-二甲基-1-{4-[4-(1-苯基- 乙氧基)-苯胺基]-噻唑啉-6- 基}-戊-1-炔-3-醇	452.3	7.95
93	J	3-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5- 基胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	475.2	4.42
94	J	N,N-二乙基-3-[6-(3-羥基-六 氫吡啶-3-基乙炔基)-噻唑啉 -4-基胺基]-苯甲醯胺	444.3	3.74
95	J	3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-噻 唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶 -3-醇	437.2	4.97
96	J	3-[4-(4-苯甲氧基-苯胺基	451.3	4.94

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

裝

五、發明說明 (114)

		) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇		
97	J	3 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇	471.2	5.38
98	J	3 - [4 - (4 - 苯甲基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇	435.2	5.16
99	J	3 - [4 - (1H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇	384.2	3.22
100	I	3 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 1 - 環丁基 - 丙 - 2 - 炔 - 1 - 醇	509.1	7.21
101	I	1 - 環丁基 - 3 - { 4 - [1 - (丙烷 - 2 - 磺醯基) - 1H - 吡啶 - 5 - 基胺基] - 喹啉 - 6 - 基 } - 丙 - 2 - 炔 - 1 - 醇	475.2	6.81
102	I	3 - [4 - (3 - 氯 - 1 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 1 - 環丁基 - 丙 - 2 - 炔 - 1 - 醇	456.2	8.11
103	I	1 - 環丁基 - 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔 - 1 - 醇	436.2	7.95

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (115)

104	I	3-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基氨基)-喹啉-6-基]-1-環丁基-丙-2-炔-1-醇	460.2	6.69
105	I	1-環丁基-3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔-1-醇	422.2	7.59
106	J	3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔-1-醇	451.2	5.26
107	I	3-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基氨基)-喹啉-6-基乙炔基]-1-甲基-六氫吡啶-3-醇	538.2	4.92
108	J	3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-吡咯啉-3-醇	437.2	5.08
109	J	3-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基氨基)-喹啉-6-基]-1-吡咯啉-2-基-丙-2-炔-1-醇	474.2	5.00
110	I	5-[4-(4-苯甲基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-4,4-二甲基-噁唑啉-2-酮	449.2	7.03
111	I	4,4-二甲基-5-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-噁唑啉-2-酮	465.2	7.17

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (116)

112	I	5-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-4,4-二甲基-噁唑啉-2-酮	485.1	7.34
113	I	5-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-4,4-二甲基-噁唑啉-2-酮	489.2	6.00
114	I	5-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-4,4-二甲基-噁唑啉-2-酮	488.2	6.58
115	I	5-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-4,4-二甲基-噁唑啉-2-酮	538.1	6.21
116	J	3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-吡咯啉-3-醇	457.1	5.27
117	J	3-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-吡咯啉-3-醇	461.2	4.31
118	J	3-{4-[1-丙烷-2-磺醯基]-1H-吡啶-5-基胺基}-喹啉-6-基乙炔基)-吡咯啉-3-醇	476.1	4.35
119	J	3-[4-(3-苯甲基氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-吡咯啉-3-醇	437.2	4.85

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (117)

120	J	3-[4-(3-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-吡咯啉-3-醇	423.2	4.87
121	J	3-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-吡咯啉-3-醇	460.0	4.81
123	J	3-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-吡咯啉-3-醇	510.2	4.82
124	J	3-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	474.2	4.92
125	J	3-{4-[3-甲基-4-(吡啶-2-基甲氧基)-苯胺基]-喹啉-6-基乙炔基}-六氫吡啶-3-醇	466.2	4.14
126	J	3-{4-[1-(丙烷-2-磺醯基)-1H-吡啶-5-基胺基]-喹啉-6-基乙炔基}-六氫吡啶-3-醇	490.1	4.46
127	J	3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-1-吡咯啉-2-基-丙-2-炔-1-醇	437.2	5.08
128	J	3-[4-(1-苯甲基-1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-1-吡	475.2	4.45

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (119)

		3-甲基-苯胺基]-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇		
137	J	3-[4-(3-甲基-4-間甲苯基氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	465.1	5.56
138	J	3-{4-[4-(2-甲氧基-苯氧基)-3-甲基-苯胺基]-喹啉-6-基乙炔基}-六氫吡啶-3-醇	481.1	4.94
139	J	3-[4-(3-甲基-4-鄰甲苯基氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	465.2	5.50
140	L	3-{2-[4-(3-甲基-4-苯氧基-py 烯基胺基)-喹啉-6-基]-乙基}-六氫吡啶-3-醇	455.2	4.93
141	J	3-{4-[3-氯-4-(吡啶-2-基甲氧基)-苯胺基]-喹啉-6-基乙炔基}-六氫吡啶-3-醇	486.0	4.38
142	J	3-[4-(5-甲基-6-苯氧基-吡啶-3-基胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	452.0	4.70
143	L	3-{2-[4-(4-苯甲基-苯胺基)-喹啉-6-基]-乙基}-六氫吡啶-3-醇	439.2	4.81
144	I	5-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯	481.2	6.64

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (120)

		胺基)-喹啉-6-基乙炔基]- 4,4-二甲基-噁唑啉-2-酮		
145	I	1-甲基-3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	465.2	5.34
146	L	3-{2-[4-(1H-吡啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]-乙基}-六氫吡啶-3-醇	388.3	2.86
147	I	3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-1-甲基-六氫吡啶-3-醇	481.1	4.96
148	I	3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-1-甲基-六氫吡啶-3-醇	485.1	5.48
149	J	內向- α -3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-8-氮雜-雙環[3.2.1]辛-3-醇	497.1	5.47
150	J	內向- α -3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-8-氮雜-雙環[3.2.1]辛-3-醇	493.2	4.95
151	J	內向- α -3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基	477.2	5.29

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (121)

		乙炔基]-8-氮雜-雙環[3.2.1] 辛-3-醇		
152	J	外向- β -3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-8-氮雜-雙環[3.2.1]辛-3-醇	497.2	5.35
153	J	外向- β -3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-8-氮雜-雙環[3.2.1]辛-3-醇	493.2	4.86
154	J	外向- β -3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-8-氮雜-雙環[3.2.1]辛-3-醇	477.2	5.21
155	J	外向- β -3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-8-氮雜-雙環[3.2.1]辛-3-醇	463.2	4.96
156	J	(-)-3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	451.2	5.22
157	J	(+)-3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	451.2	5.22
158	J	內向- α -3-[4-(4-苯氧基-苯	463.2	5.02

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (122)

		胺基)-喹啉-6-基乙炔基]- 8-氮雜-雙環[3.2.1]辛-3-醇		
159	J	4-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯 胺基)-喹啉-6-基乙炔基]- 六氫吡啶-4-醇	467.2	4.77
160	J	4-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基) -喹啉-6-基乙炔基]-六氫 吡啶-4-醇	471.1	5.26
161	J	4-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺 基)-喹啉-6-基乙炔基]-六 氫吡啶-4-醇	451.2	5.09
162	I	4-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶- 5-基胺基)-喹啉-7-基乙炔 基]-四氫-吡喃-4-醇	525.1	6.02
163	I	4-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹 啉-7-基乙炔基]-四氫-吡 喃-4-醇	438.1	6.25
164	J	1-(3-氮雜-雙環[3.1.0]己-6- 基(1 α , 5 α , 6 α))-3-[4-(3- 甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)- 喹啉-6-基]-丙-2-炔-1-醇	479.1	5.73
165	J	1-(3-氮雜-雙環[3.1.0]己-6- 基(1 α , 5 α , 6 α))-3-[4-(3- 甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹	463.1	5.16

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (123)

		唑啉-6-基]-丙-2-炔-1-醇		
166	J	1-(3-氮雜-雙環[3.1.0]己-6-(1 α ,5 α ,6 α))-3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-炔-1-醇	449.0	4.89
167	J	3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-7-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	437.2	5.09
168	J	3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-7-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	467.2	4.97
169	J	3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-7-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	471.1	5.48
170	J	3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-7-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	451.2	5.35
171	O	4-胺基-1-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-4-甲基-p烯 t-1-炔-3-醇	455.2	4.91
172	O	4-胺基-4-甲基-1-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-戊-1-炔-3-醇	439.2	5.26

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (124)

173	J	3-[4-(3 乙炔基-苯胺基)-喹 唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶 -3-醇	369.2	4.11
174	J	3-[4-(3-氯-4-氟-苯胺基)-喹 唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶 -3-醇	397.1	4.43
175	J	[6-(4-胺基-四氫-哌喃-4-基 乙炔基)-喹唑啉-4-基]-(3-甲 基-4-苯氧基-苯基)-胺	451.2	5.43
176	J	[6-(4-胺基-四氫-哌喃-4-基 乙炔基)-喹唑啉-4-基]-(4-苯 氧基-苯基)-胺	437.2	5.15
177	J	[6-(4-胺基-四氫-哌喃-4-基 乙炔基)-喹唑啉-4-基]-(3-甲 氧基-4-苯氧基-苯基)-胺	467.2	5.00
178	J	(3-甲氧基-4-苯氧基-苯基)- (6-六氫吡啶-2-基乙炔基-喹 唑啉-4-基)-胺	451.0	5.25
179	J	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-(6- 六氫吡啶-2-基乙炔基-喹唑 啉-4-基)-胺	435.0	5.71
180	J	(4-苯氧基-苯基)-(6-六氫吡 啶-2-基乙炔基-喹唑啉-4-基)-胺	421.2	5.32

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

裝

五、發明說明 (125)

181	J	(3-氯-4-苯氧基-苯基)-(6-六 氫吡啶-2-基乙炔基-喹啉- 4-基)-胺	455.0	5.84
182	J	3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹 啉-6-基]-1-六氫吡啶-2-基 -丙-2-炔-1-醇	451.2	5.16
183	J	3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺 基)-喹啉-6-基]-1-六氫吡 啶-2-基-丙-2-炔-1-醇	465.2	5.44
184	J	3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-1-六氫吡啶-2- 基-丙-2-炔-1-醇	485.1	5.58
185	J	3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯 胺基)-喹啉-6-基]-1-六氫 吡啶-2-基-丙-2-炔-1-醇	481.2	5.05
186	J	(4-苯氧基-苯基)-(6-六氫吡 啶-3-基乙炔基-喹啉-4-基)-胺	421.2	5.27
187	J	(3-甲氧基-4-苯氧基-苯基)- (6-六氫吡啶-3-基乙炔基-喹 啉-4-基)-胺	451.2	5.21
188	J	(3-氯-4-苯氧基-苯基)-(6-六 氫吡啶-3-基乙炔基-喹啉- 4-基)-胺	455.0	5.79

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (126)

189	J	3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-1-六氫吡啶-3-基-丙-2-炔-1-醇	451.0	5.00
190	J	3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-1-六氫吡啶-3-基-丙-2-炔-1-醇	465.0	5.26
191	J	3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-1-六氫吡啶-3-基-丙-2-炔-1-醇	481.0	4.86
192	J	3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-1-六氫吡啶-3-基-丙-2-炔-1-醇	485.0	5.34
193	I	1-甲基-4-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-4-醇	465.0	5.18
194	I	4-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-1-甲基-六氫吡啶-4-醇	485.0	5.34
195	I	4-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-1-甲基-六氫吡啶-4-醇	481.0	4.81
196	I	N,N-二乙基-3-[6-(4-羥基-四氫-呋喃-4-基乙炔基)-喹啉-4-基胺基]-苯甲醯胺	445.3	4.66

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (127)

197	A	(3-{3-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡 啶-5-基胺基)-喹啉-6-基]- 丙-2-炔基}-3-氮雜-雙環 [3.1.0]己-6-基)-甲醇	550.3	5.38
198	I	4-{4-[1-(丙烷-2-磺醯基)- 1H-吡啶-5-基胺基]-喹啉- 6-基乙炔基}-四氫-吡喃-4- 醇	491.2	5.66
199	I	4-[4-(1H-吡啶-5-基胺基)-喹 啉-6-基乙炔基]-四氫-吡 喃-4-醇	385.2	4.22
200	A	1-甲基-3-[4-(4-苯氧基-苯胺 基)-喹啉-6-基乙炔基]-六 氫吡啶-3-醇	451.3	5.04
201	J	3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-1-吡咯啉-2- 基-丙-2-炔-1-醇	471.0	5.40
202	I	1-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶- 5-基胺基)-喹啉-6-基]-戊- 1-炔-3-醇	430.1	7.57
203	I	1-{4-{1-丙烷-2-磺醯基}-1H- 吡啶-5-基胺基]-喹啉-6- 基}-戊-1-炔-3-醇	449.2	6.28
204	I	1-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基	430.1	7.57

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

始

五、發明說明 (128)

		) - 喹啉 - 6 - 基] - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇		
205	I	1 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇	410.2	7.39
206	I	1 - [4 - (1 - 苯甲基 - 1H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇	434.2	6.16
207	I	1 - [4 - (4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇	396.2	7.04
208	I	3 - { 4 - [4 - (3 - 氟 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺基] - 喹啉 - 6 - 基乙炔基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇	469.1	5.32
209	J	3 - { 4 - [4 - (4 - 甲氧基 - 苯氧基) - 3 - 甲基 - 苯胺基] - 喹啉 - 6 - 基乙炔基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇	481.2	5.10
210	J	4 - 胺基 - 1 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇	425.2	5.13
211	J	4 - 胺基 - [4 - (4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇	410.3	4.86
212	J	4 - 胺基 - 1 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 戊 - 1 -	445.2	5.27

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

裝

五、發明說明 (129)

		炔 - 3 - 醇		
213	J	4 - 胺基 - 1 - { 4 - [1 - (丙烷 - 2 - 磺 醯基) - 1H - 吡啶 - 5 - 基胺基] - 噻唑啉 - 6 - } - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇	464.1	4.37
214	J	4 - 胺基 - 1 - { 4 - [4 - (3 - 氟 - 苯氧 基) - 3 - 甲基 - 苯胺基] - 噻唑啉 - 6 - 基 } - 戊 - 1 - 炔 - 3 - 醇	443.2	5.25
215	J	3 - { 4 - [4 - (4 - 氟 - 苯氧基) - 3 - 甲 基 - 苯胺基] - 噻唑啉 - 6 - 基乙 炔基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇	469.2	5.28
216	J	3 - { 4 - [4 - (2 - 氟 - 苯氧基) - 3 - 甲 基 - 苯胺基] - 噻唑啉 - 6 - 基乙 炔基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇	469.2	5.22
217	J	3 - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯 胺基) - 噻唑啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 3 - 醇	467.2	4.85
218	J	3 - { 4 - [1 - (3 - 氟 - 苯甲基) - 1H - 吡啶 - 5 - 基胺基] - 噻唑啉 - 6 - 基乙炔基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇	493.2	4.23
219	J	3 - { 4 - [1 - (3 - 甲氧基 - 苯甲基) - 1H - 吡啶 - 5 - 基胺基] - 噻唑啉 - 6 - 基乙炔基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇	505.11	4041
220	J	3 - { 4 - [1 - (3 - 甲基 - 苯甲基) - 1H - 吡啶 - 5 - 基胺基] - 噻唑啉 -	489.2	4.70

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

裝

五、發明說明 (130)

		6-基乙炔基}-六氫吡啶-3-醇		
221	J	3-{4-[1-(2-氟-苯甲基)-1H- 吡啶-5-基胺基]-噻唑啉-6- 基乙炔基}-六氫吡啶-3-醇	493.2	4.47
222	J	2-氯-N,N-二乙基-4-[6-(3-羥 基-六氫吡啶-3-基乙炔基)- 噻唑啉-4-]基胺基]-苯甲醯 胺	478.2	4.08
223	J	3-[4-(3-溴-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-六氫 吡啶-3-醇	516.0	5.41
224	J	3-[4-(3,5-二氯-4-苯氧基-苯 胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]- 六氫吡啶-3-醇	506.1	5.64
225	J	3-[4-(3-甲基-4-苯基硫烷基- 苯胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	467.2	5.64
226	J	3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯 胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]- 吡咯啉-3-醇	453.2	4.76
227	J	4-胺基-1-[4-(3-甲氧基-4-苯 氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]- 戊-1-炔-3-醇	441.2	4.78
228	J	1-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯	426.2	6.83

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明 (131)

		胺基)-喹啉-6-基]-戊-1-炔 -3-醇		
229	J	3-[4-(4-苯磺醯基-3-甲基-苯 胺基)-喹啉-6-基乙炔基]- 六氫吡啶-3-醇	483.1	4.08
230	J	3-[4-(4-苯磺醯基-苯胺基)- 喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡 啶-3-醇	485.1	4.49
231	J	3-[4-(4-苯磺醯基-苯胺基)- 喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡 啶-3-醇	469.1	3.89
232	J	3-[4-(4-苯磺醯基-3-甲基-苯 胺基)-喹啉-6-基乙炔基]- 六氫吡啶-3-醇	499.1	4.65
233	J	3-[4-(4-環戊氧基-3-甲基-苯 胺基)-喹啉-6-基乙炔基]- 六氫吡啶-3-醇	443.2	5.30
234	J	3-[4-(4-環丁氧基-3-甲基-苯 胺基)-喹啉-6-基乙炔基]- 六氫吡啶-3-醇	429.2	4.97
235	J	5-[6-(3-羥基-六氫吡啶-3-基 乙炔基)-喹啉-4-基胺基]- 2-苯氧基-苄腈	462.2	4.86
236	J	3-[4-]4-環己基氧基-3-甲基-	457.3	5.62

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

裝

五、發明說明 (132)

		苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇		
237	J	3-[4-(4-苯胺基-苯胺基)-喹 啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶 -3-醇	436.2	4.58
238	J	3-[4-(3-苯基-1H-吡啶-6-基 胺基)-喹啉-6-基乙炔基]- 六氫吡啶-3-醇	461.2	3.86
239	I	4-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺 基)-喹啉-6-基]-2-甲基-丁 -3-炔-2-醇	410.2	7.22
240	I	4-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-2-甲基-丁- 3-炔-2-醇	430.1	7.39
241	I	4-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯 胺基)-喹啉-6-基]-2-甲基- 丁-3-炔-2-醇	426.2	6.67
242	I	[6-(3-甲基-丁-1-炔基)-喹啉 -4-基]-(3-甲基-4-苯氧基- 苯基)-胺	394.2	9.08
243	I	(3-甲氧基-4-苯氧基-苯基)- [6-(3-甲基-丁-1-炔基)-喹啉 -4-基]-胺	410.2	8.47
244	I	(3-氯-4-苯氧基-苯基)-[6-(3-	414.1	9.21

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

裝

五、發明說明 (133)

		甲 基 - 丁 - 1 - 炔 基) - 喹 啉 - 4 - 基] - 胺		
245	J	3 - [4 - (4 - 苯 甲 基 - 3 - 甲 基 - 苯 胺 基) - 喹 啉 - 6 - 基 乙 炔 基] - 六 氫 吡 啶 - 3 - 醇	449.2	5.37
246	J	[6 - (3 - 胺 基 - 3 - 甲 基 - 丁 - 1 - 炔 基) - 喹 啉 - 4 - 基] - (3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - 胺	395.2	5.13
247	J	[6 - (3 - 胺 基 - 3 - 甲 基 - 丁 - 1 - 炔 基) - 喹 啉 - 4 - 基] - (4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - 胺	409.2	5.45
248	J	[6 - (3 - 胺 基 - 3 - 甲 基 - 丁 - 1 - 炔 基) - 喹 啉 - 4 - 基] - (3 - 甲 氧 基 - 4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - 胺	425.2	5.04
249	J	[6 - (3 - 胺 基 - 3 - 甲 基 - 丁 - 1 - 炔 基) - 喹 啉 - 4 - 基] - (3 - 氯 - 4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - 胺	429.1	5.56
250	J	[6 - (3 - 胺 基 - 丙 - 1 - 炔 基) - 喹 啉 - 4 - 基] - (4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - 胺	367.2	4.78
251	J	[6 - (3 - 胺 基 - 丙 - 1 - 炔 基) - 喹 啉 - 4 - 基] - (3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧 基 - 苯 基) - 胺	381.2	5.09
252	J	[6 - (3 - 胺 基 - 丙 - 1 - 炔 基) - 喹 啉	397.2	4.72

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (134)

		啉-4-基]-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯基)-胺		
253	J	[6-(3-胺基-丙-1-炔基)-喹啉啉-4-基]-(3-氯-4-苯氧基-苯基)-胺	401.1	5.28
254	J	[6-(3-甲基胺基-丙-1-炔基)-喹啉啉-4-基]-(4-苯氧基-苯基)-胺	381.2	5.05
255	J	[6-(3-甲基胺基-丙-1-炔基)-喹啉啉-4-基]-(3-甲基-1-苯氧基-苯基)-胺	395.2	5.32
256	J	(3-甲氧基-4-苯氧基-苯基)-[6-(3-甲基胺基-丙-1-炔基)-喹啉啉-4-基]-胺	411.2	4.87
257	J	(3-氯-4-苯氧基-苯基)-[6-(3-甲基胺基-丙-1-炔基)-喹啉啉-4-基]-胺	415.1	5.45
258	A	[6-(3-二甲基胺基-丙-1-炔基)-喹啉啉-4-基]-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-胺	409.3	5.94
259	J	3-[4-(3-乙基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	465.2	5.54
260	J	3-[4-(3-甲基-4-對甲苯氧基-	465.2	5.52

五、發明說明 (135)

		苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇		
261	J	3-[4-(3-羥基-4-苯氧基-苯胺 基)-喹啉-6-基乙炔基]-六 氫吡啶-3-醇	453.1	4.34
262	J	2-胺基-4-[4-(3-甲基-4-苯氧 基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丁 -3-炔-1-醇	411.2	4.95
263	J	2-胺基-4-[4-(3-甲氧基-4-苯 氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-]丁-3-炔-1-醇	427.1	4.60
264	J	3-[4-(3-乙氧基-4-苯氧基-苯 胺基)-喹啉-6-基乙炔基]- 六氫吡啶-3-醇	481.1	5.59
265	J	3-[4-(3-異丙氧基-4-苯氧基- 苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	495.2	5.40
266	J	3-[4-(2-氟-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫 吡啶-3-醇	455.2	4.9
267	J	3-[4-(4-氟-2-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫 吡啶-3-醇	455.2	4.61
268	J	3-[4-(4-吡啶-2-基甲基-苯胺 基)-喹啉-6-基乙炔基]-六 氫吡啶-3-醇	436.2	3.59

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (136)

		基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-六 氫吡啶-3-醇		
269	J	2-胺基-1-[4-(3-甲基-4-苯氧 基-苯胺基)-噻唑啉-6-基乙 炔基]-環己醇	465.1	5.45
270	J	2-胺基-1-[4-(3-甲氧基-4-苯 氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基 乙炔基]-環己醇	481.2	5.10
271	J	1-甲基胺基-4-[4-(3-甲基-4- 苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6- 基]丁-3-炔-2-醇	425.2	5.08
272	J	4-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯 胺基)-噻唑啉-6-基]-1-甲基 胺基-丁-3-炔-2-醇	441.2	4.76
273	A'	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-[6- (3-六氫吡啶-1-基-丙-1-炔基)-噻唑啉-4-基]-胺	450.0	5.25
274	A	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-[6- (3-吡咯啶-1-基-丙-1-炔基)- 噻唑啉-4-基]-胺	435.0	5.95
275	A'	(3-甲氧基-4-苯氧基-苯基)- [6-(3-六氫吡啶-1-基-丙-1- 炔基)-噻唑啉-4-基]-胺	466.3	4.95
276	I	3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺	477.2	5.31

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (137)

		基)-喹啉-6-基乙炔基]-1- 氮雜-雙環[2.2.2]辛-3-醇		
277	J	3-{4-[4-(2,6-二氟-苯氧基)- 3-甲基-苯胺基]-喹啉-6- 基乙炔基}-六氫吡啶-3-醇	487.0	5.22
278	A'	{6-[3-(6-胺基-3-氮雜-雙環 [3.1.0]己-3-基(1 α , 5 α , 6 α))-丙-1-炔基]-喹啉-4-基 }-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)- 胺	462.3	5.38
279	A	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-[6- (3-嗎福啉-4-基-丙-1-炔基)- 喹啉-4-基]-胺	451.0	7.27
280	A	(3-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2- 炔基}-3-氮雜-雙環[3.1.0]己 -6-基(1 α , 5 α , 6 α)-甲醇	477.3	5.70
281	A'	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-{6- [3-(2-甲基-六氫吡啶-1-基)- 丙-1-炔基]-喹啉-4-基}-胺	464.1	5.49
282	A'	{6-[3-(2,6-二甲基-六氫吡啶 -1-基)-丙-1-炔基]-喹啉- 4-基}-(3-甲基-4-苯氧基-苯 基)-胺	478.3	5.57

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (138)

283	A	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-{6-[3-(4-甲基-六氫吡啶-1-基)-丙-1-炔基]-喹啉-4-基}-胺	464.0	5.60
284	A	1-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-六氫吡啶-4-醇	465.0	5.45
285	A	1-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-吡咯啉-3-醇	451.3	5.38
286	K	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-[6-(1-甲基-六氫吡啶-3-基乙炔基)-喹啉-4-基]-胺	449.5	5.86
287	A	(1-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-吡咯啉-2-基)-甲醇	465.3	5.51
288	A	(1-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-六氫吡啶-2-基)-甲醇	479.1	5.58
289	A	1-(3-{4-[3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-六氫吡啶-3-基)-甲醇	478.9	5.59
290	A	2-(甲基-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-胺基)-乙醇	439.1	5.45

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (139)

291	A'	3-甲基-2-{3-[4-(3-甲基-4-苯 氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]- 丙-2-炔基胺基}-丁烷-1-醇	467.4	5.72
292	A	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-[6- (2-六氫吡啶-3-基乙基)-喹 啉-4-基]-胺	439.3	5.33
293	A	4-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺 基)-喹啉-6-基乙炔基]-四 氫-哌喃-4-醇	452.1	6.76
294	A	4-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-四氫- 哌喃-4-醇	471.9	6.94
295	K	4-甲基-2-{3-[4-(3-甲基-4-苯 氧基-苯胺基)-喹啉-6-基 乙炔基]-四氫-哌喃-4-醇	467.9	6.23
296	A	4-甲基-2-{3-[4-(3-甲基-4-苯 氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]- 丙-2-炔基胺基}-戊烷-1-醇	481.0	5.99
297	A'	3-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2- 炔基胺基}-丙烷-1,2-二醇	495.0	4.94
298	A	1-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2- 炔基}-吡咯啉-2-羧酸甲酯	493.3	7.90

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (141)

		基)-胺		
306	A	{6-[3-(3-二甲基胺基-吡咯啉-1-基)-丙-1-炔基]-喹唑啉-4-基}-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-胺	478.3	5.85
307	A	2-(1-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹唑啉-6-基]-丙-2-炔基}-六氫吡啶-4-基)-乙醇	493.1	5.50
308	K'	{6-[1-(2-胺基-丙基)-六氫吡啶-3-基乙炔基]-喹唑啉-4-基}-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-胺	492.4	6.28
309	K	2-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-1-基}-乙醇	479.3	5.66
310	J	3-[4-(4-溴-2-氟-苯胺基)-喹唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	442.9, 440.9	4.26
311	J	3-[4-(4-溴-2,6-二氟-苯胺基)-喹唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	460.9, 459.1	4.24
312	K	{6-[1-(2-甲氧基-乙基)-六氫吡啶-3-基乙炔基]-喹唑啉-	493.1	6.05

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (142)

		4-基 }-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-胺		
314	J	6-羥基甲基-3-{4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	424.2	8.64
315	A'	{6-[3-(2,5-二氮雜-雙環[2.2.1]庚-2-基)-丙-1-炔基]-喹啉-4-基 }-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯基)-胺	478.2	4.92
316	A	{6-[3-(6-二甲基胺基-3-氮雜-雙環[3.1.0]己-3-基(1 α , 5 α , 6 α))-丙-1-炔基]-喹啉-4-基 }-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯基)-胺	506.1	5.28
317	J	5-羥基-5-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-2-羧酸鹽胺	494.0	5.11
318	A	2-(4-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基 }-六氫吡啶-1-基)-乙醇	494.4	5.17
319	A	2-(4-{3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基 }-六氫吡啶-1-基)-乙	510.1	4.89

五、發明說明 (143)

		醇		
320	J	3-羥基甲基-4-[4-(3-甲基-4- 苯氧基-苯胺基)-喹啉-6- 基乙炔基]-六氫吡啶-4-醇	481.0	4.94
321	J	3-羥基甲基-4-[4-(3-甲氧基- 4-苯氧基-苯胺基)-喹啉- 6-y 乙炔基]-六氫吡啶-4-醇	497.0	4.63
322	A	1-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2- 炔基}-六氫吡啶-4-酮	463.0	7.17
323	J	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-[6- (3-硫嗎福啉-4-基-丙-1-炔基)-喹啉-4-基]-胺	467.3	8.06
324	J	5-羥基甲基-3-[4-(3-甲基-4- 苯氧基-苯胺基)-喹啉-6- 基乙炔基]-吡咯啶-3-醇	466.9	5.04
325	J	5-羥基甲基-3-[4-(3-甲氧基- 4-苯氧基-苯胺基)-喹啉- 6-基乙炔基]-吡咯啶-3-醇	482.9	4.72
326	A	1-{3-[4-{3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2- 炔基}-六氫吡啶-4-酮	478.3	6.43
327	J	2-羥基甲基-3-[4-(3-甲基-4- 苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-	482.0	6.13

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明 (144)

		基乙炔基]-四氫-哌喃-3-醇		
328	A	4-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2- 炔基}-六氫吡啶-1-羧酸乙酯	522.1	7.78
329	A	4-{3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基 -苯胺基)-喹啉-6-基]-丙- 2-炔基}-六氫吡啶-1-羧酸乙 酯	538.3	7.16
330	J	4-羥基-4-[4-(3-甲氧基-4-苯 氧基-苯胺基)-喹啉-6-基 乙炔基]-吡咯啉-2-羧酸鹽胺	496.1	4.70
331	J	4-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-4-羥 基-吡咯啉-2-羧酸鹽胺	500.2	5.21
332	J	4-羥基-4-[4-(3-甲基-4-苯氧 基-苯胺基)-喹啉-6-基乙 炔基]-吡咯啉-2-羧酸鹽胺	480.3	50.3
333	A	N-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2- 炔基}-甲烷磺鹽胺	459.0	6.85
334	A	1-(4-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基 -苯胺基)-喹啉-6-基]-丙- 2-炔基}-六氫吡啶-1-)-乙酮	492.3	6.39
335	I	4-羥基-4-[4-(3-甲基-4-苯氧	495.3	5.90

五、發明說明 (145)

		基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-四氫-哌喃-2-吡咯啉-2-羧酸鹽胺		
336	J	4-羥基-4-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-四氫-哌喃-2-吡咯啉-2-羧酸鹽胺	511.1	5.49
337	J	4-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-4-羥基-四氫-哌喃-2-吡咯啉-2-羧酸鹽胺	515.2	6.09
338	A	N-{3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-甲烷磺鹽胺	475.1	6.40
339	A	{6-[3-(4-甲烷磺鹽基-六氫吡啶-1-基)-丙-1-炔基]-喹啉-4-基}-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-胺	528.1	7.08
340	A	4-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-六氫吡啶-1-羧酸甲基鹽胺	507.3	6.12
341	A	4-{3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-	523.2	5.64

五、發明說明 (146)

		2-炔基}-六氫吡啶-1-羧酸甲 基鹽胺		
342	A	{6-[3-(4-甲炔磺基-六氫 吡啶-1-基)-丙-1-炔基]-喹啉 啉-4-}-(3-甲氧基-4-苯氧基- 苯基)-胺	544.1	6.54
343	J	2-羥基甲基-4-[4-(3-甲基-4- 苯氧基-苯胺基)-喹啉啉-6- 基乙炔基]-四氫-吡喃-4-醇	482.3	5.85
344	J	2-羥基甲基-4-[4-(3-甲氧基- 4-苯氧基-苯胺基)-喹啉啉- 6-基乙炔基]-四氫-吡喃-4- 醇	498.3	5.43
345	J	4-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉啉-6-基乙炔基]-2-羥 基甲基-四氫-吡喃-4-醇	502.2	6.04
346	A	{6-[3-(1,1-二酮基-1&-異噻 啉啉-2-基)-丙-1-炔基]-喹啉 啉-4-基}-(3-甲基-4-苯氧基- 苯基)-胺	485.3	7.30
347	A	{6-[3-(1,1 二酮基-1-&-異噻 啉啉-2-基)-丙-1-炔基]-喹啉 啉-4-基}-(3-甲氧基-4-苯氧 基-苯基)-胺	501.3	6.69

五、發明說明 (147)

348	I	N-{3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)- 喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-乙 醯胺	409.0	6.03
349	I	N-{3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯 胺基)-苯胺基]-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-乙醯胺	442.9	6.55
350	A	{6-[3-(1,1 二酮基-1-&-硫嗎 福啉-4-基)-丙-1-炔基]-喹啉 啉-4-基}-(3-甲氧基-4-苯氧 基-苯基)-胺	515.2	6.40
351	A	4-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2- 炔基胺基}-六氫吡啶-1-羧酸 乙酯	536.6	6.04
352	A	4-{3-[4-{3-甲氧基-4-苯氧基 -苯胺基)-喹啉-6-基]-丙- 2-炔基 1 胺基}-六氫吡啶-1- 羧酸乙酯	552.3	5.97
353	J	N-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2- 炔基}-丁醯胺	451.3	7.09
354	J	[4-(2-氟-苯氧基)-3-甲基-苯 基]-(6-六氫吡啶-3-基乙炔 基-喹啉-4-基)-胺	453.4	5.55

五、發明說明 (148)

355	J	[4-(3-氟-苯氧基)-3-甲基-苯基]-(6-六氫吡啶-3-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-胺	453.4	5.75
356	I	N-甲基-N-{3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-炔基}-乙醯胺	423.3	6.53
357	I	N-甲基-N-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-炔基}-乙醯胺	437.3	6.86
358	I	N-{3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-炔基}-N-甲基 1-乙醯胺	457.3	7.05
359	I	2,2-二甲基-N-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-炔基}-丙醯胺	465.0	7.57
360	J	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-(6-吡咯啶-3-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-胺	421.3	5.43
361	J	[4-(2-氟-苯氧基)-3-甲基-苯基]-(6-吡咯啶-3-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-胺	439.0	5.39
362	J	(3-氯-4-苯氧基-苯基)-(6-吡咯啶-3-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-胺	441.0	5.61

五、發明說明 (149)

363	J	(3-甲氧基-4-苯氧基-苯基)- (6-吡咯啉-3-基乙炔基-噻唑 啉-4-基)-胺	437.1	5.06
364	I	2-氯-N{3-[4-(3-甲基-4-苯氧 基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙 -2-炔基}-乙醯胺	457.0	7.00
365	I	環丙烷羧酸{3-[4-(3-甲基-4- 苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6- 基]-丙-2-炔基}-醯胺	449.1	6.97
366	I	N-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2- 炔基}-丙醯胺	437.1	6.74
367	I	2-甲氧基-N-{3-[4-(3-甲基- 4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉- 6-基]-丙-2-炔基}-乙醯胺	453.2	6.69
368	M	N-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2- 炔基}-2-嗎福啉-4-基-乙醯 胺	508.0	6.49
369	A'	1-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2- 炔基}-六氫吡啶-2-羧酸甲酯	508.0	5.66
370	A	4-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基- 苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-	493.5	5.87

五、發明說明 (150)

		炔基}-六氫吡啶-1-羧酸甲基 鹽胺		
371	J	(-)-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)- (6-六氫吡啶-3(S)-基乙炔基- 喹啉-4-基)-胺	435.1	5.61
372	A'	4-胺基甲基-1-{3-[4-(3-甲基 -4-苯氧基-苯胺基)-喹啉- 6-基]-丙-2-炔基}-吡咯啉-3- 醇	480.3	4.95
373	J	4-羥基-4-[4-(3-甲基-4-苯氧 基-苯胺基)-喹啉-6-基乙 炔基]-吡咯啉-2-羧酸甲基鹽 胺	494.0	5.18
374	N	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-(6- 六氫吡啶-3-基乙炔基-吡啶 并[3,4-d]嘧啶-4-基)-胺	436.3	5.40
375	N	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-(6- 六氫吡啶-4-基乙炔基-吡啶 并[3,4-d]嘧啶-4-基)-胺	436.3	5.32
376	J	(3-甲氧基-4-苯氧基-苯基)- (6-六氫吡啶-4-基乙炔基-喹 啉-4-基)-胺	451.3	5.17
377	J	(3-氯-4-苯氧基-苯基)-(6-六 氫吡啶-4-基乙炔基-喹啉- 4-基)-胺	455.0	5.73

五、發明說明 (151)

		4-基)-胺		
378	J	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-(6-六氫吡啶-4-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-胺	435.1	5.56
379	A	3(S)-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-1-羧酸甲基醯胺	492.3	7.15
380	I	3(S)-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-1-羧酸甲基醯胺	509.4	6.65
381	I	N-{1,1-二甲基-3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-炔基}-2,2,2-三氟-乙醯胺	505.0	8.15
382	J	(+)-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-(6-六氫吡啶-3(R)-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-醯胺	435.3	5.61
383	I	N-{1,1-二甲基-3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-炔基}-乙醯胺	451.2	7.00
384	I	N-{3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-1,1-二甲基-丙-2-炔基}-乙醯胺	471.1	7.22

五、發明說明 (152)

385	J	[4-(2-氯-苯氧基)-3-甲基-苯基]-(6-六氫吡啶-3-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-胺	469.0	5.97
386	J	[4-(2-甲氧基-苯氧基)-3-甲基-苯基]-(6-六氫吡啶-3-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-胺	465.1	5.31
387	J	[3-甲基-4-(2-三氟甲基-苯氧基)-苯基]-(6-六氫吡啶-3-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-胺	503.0	6.17
388	J	[4-(2-乙基-苯氧基)-3-甲基-苯基]-(6-六氫吡啶-3-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-胺	463.0	6.38
389	J	(6-氮雜環丁二烯-3-基乙炔基-噻唑啉-4-基)-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-胺	407.3	5.31
390	I	N-{1-甲基-3-[4-(3-氯-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-炔基}-乙醯胺	456.9	6.84
391	I	N-{1-甲基-3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-炔基}-乙醯胺	437.1	6.36
392	I	N-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-丙-2-炔基}-乙醯胺	422.8	

五、發明說明 (153)

使用方法 I 及適當的起始物 (依技藝上已知的方法製得) , 可製得下列化合物 (及彼等之藥學上可接受之鹽類及溶劑化物) , 彼等為本發明的一部分 :

1 - { 3 - [4 - { 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基 } - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 氮雜環丁二烯 - 1 - 基 } - 乙酮

1 - { 3 - [4 - { 3 - 甲氧基 1 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基 } - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 氮雜環丁二烯 - 1 - 基 } - 乙酮

1 - { 3 - [4 - { 3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基 } - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 氮雜環丁二烯 - 1 - 基 } - 乙酮

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 氮雜環丁二烯 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 氮雜環丁二烯 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 氮雜環丁二烯 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 吡咯啉 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基)

五、發明說明 (154)

— 胺

[6 — (1 — 甲烷磺醯基 — 吡咯啉 — 3 — 基乙炔基)
— 喹唑啉 — 4 — 基] — (3 — 甲氧基 — 4 — 苯氧基 — 苯基)
— 胺

[6 — (1 — 甲烷磺醯基 — 吡咯啉 — 3 — 基乙炔基)
— 喹唑啉 — 4 — 基] — (3 — 氯 — 4 — 苯氧基 — 苯基) —
胺

1 — { 3 — [4 — (3 — 甲基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基)
— 喹唑啉 — 6 — 基乙炔基] — 吡咯啉 — 1 — 基 } — 乙酮

1 — { 3 — [4 — (3 — 甲氧基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基)
— 喹唑啉 — 6 — 基乙炔基] — 吡咯啉 — 1 — 基 } — 乙
酮

1 — { 3 — [4 — (3 — 氯 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基)
— 喹唑啉 — 6 — 基乙炔基] — 吡咯啉 — 1 — 基 } — 乙酮

1 — { 3 — [4 — (3 — 甲基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基)
— 喹唑啉 — 6 — 基乙炔基] — 六氫吡啶 — 1 — 基 } — 乙
酮

1 — { 3 — [4 — (3 — 甲氧基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基)
— 喹唑啉 — 6 — 基乙炔基] — 六氫吡啶 — 1 — 基 } —
乙酮

1 — { 3 — [4 — (3 — 氯 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基)
— 喹唑啉 — 6 — 基乙炔基] — 六氫吡啶 — 1 — 基 } — 乙酮

[6 — (1 — 甲烷磺醯基 — 六氫吡啶 — 3 — 基乙炔基)
— 喹唑啉 — 4 — 基] — (3 — 甲基 — 4 — 苯氧基 — 苯基

五、發明說明 (155)

) - 胺

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

5 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 2 - 酮

5 - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 2 - 酮

5 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 2 - 酮

4 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 吡咯啉 - 2 - 酮

4 - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 吡咯啉 - 2 - 酮

4 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 吡咯啉 - 2 - 酮

1 - { 2 - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 嗎福啉 - 4 - 基 } - 乙酮

1 - { 2 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 嗎福啉 - 4 - 基 } - 乙酮

五、發明說明 (156)

[6 - (4 - 甲烷磺醯基 - 嗎福啉 - 2 - 基乙炔基)
- 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲基 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (4 - 甲烷磺醯基 - 嗎福啉 - 2 - 基乙炔基)
- 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲氧基 - 1 - 苯氧基 - 苯基)
- 胺

[6 - (4 - 甲烷磺醯基 - 嗎福啉 - 2 - 基乙炔基)
- 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 氯 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

6 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹
啉 - 6 - 基乙炔基] - 嗎福啉 - 3 - 酮

6 - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) -
喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 嗎福啉 - 3 - 酮

6 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉
- 6 - 基乙炔基] - 嗎福啉 - 3 - 酮

5 - [4 - { 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基 } - 喹
啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 2 - 酮

5 - [4 - { 3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基 } -
喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 2 - 酮

5 - [4 - { 3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基 } - 喹啉
- 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 2 - 酮

6 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹
啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 2 - 酮

6 - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) -
喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 六氫吡啶 - 2 - 酮

6 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉

五、發明說明 (157)

啉 - 6 - 基乙炔基 } - 六氫吡啶 - 2 - 酮

1 - { 5 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 3 , 4 - 二氫 - 2 H - 吡啶 - 1 - 基 } - 乙酮

1 - { 5 - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 3 , 4 - 二氫 - 2 H - 吡啶 - 1 - 基 } - 乙酮

1 - { 5 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 3 , 4 - 二氫 - 2 H - 吡啶 - 1 - 基 } - 乙酮

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 1 , 4 , 5 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 1 , 4 , 5 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 1 , 4 , 5 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

1 - { 5 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 3 , 6 - 二氫 - 2 H - 吡啶 - 1 - 基 } - 乙酮

1 - { 5 - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基) - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 3 , 6 - 二氫 - 2 H -

五、發明說明 (158)

吡啶 - 1 - 基 } - 乙 酮

1 - { 5 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基)
- 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 3 , 6 - 二氫 - 2 H - 吡啶
- 1 - 基 } - 乙 酮

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 1 , 2 , 5 , 6 - 四氫 -
吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲基
- 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 1 , 2 , 5 , 6 - 四氫 -
吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲氧
基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 1 , 2 , 5 , 6 - 四氫 -
吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 氯 -
4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

1 - { 4 - [4 - { 3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基
} - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 3 , 6 - 二氫 - 2 H - 吡
啶 - 1 - 基 } - 乙 酮

1 - { 4 - [4 - { 3 - 甲氧基 1 - 4 - 苯氧基 - 苯
胺基 } - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 3 , 6 - 二氫 - 2 H
- 吡啶 - 1 - 基 } - 乙 酮

1 - { 4 - [4 - { 3 - 氯 1 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基
} - 喹啉 - 6 - 基乙炔基] - 3 , 6 - 二氫 - 2 H - 吡
啶 - 1 - 基 } - 乙 酮

[6 - (1 - 甲烷磺醯基 - 1 , 2 , 3 , 6 - 四氫 -
吡啶 - 4 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - (3 - 甲基

五、發明說明 (159)

— 4 — 苯氧基 — 苯基) — 胺

[6 — (1 — 甲烷磺醯基 — 1 , 2 , 3 , 6 — 四氫 — 吡啶 — 4 — 基乙炔基) — 喹啉 — 4 — 基] — (3 — 甲氧基 1 — 4 — 苯氧基 — 苯基) — 胺

[6 — (1 — 甲烷磺醯基 — 1 , 2 , 3 , 6 — 四氫 — 吡啶 — 4 — 基乙炔基) — 喹啉 — 4 — 基] — (3 — 氯 — 4 — 苯氧基 — 苯基) — 胺

N — { 1 , 1 — 二甲基 — 3 — [4 — (3 — 甲基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 —] — 丙 — 2 — 炔基 } — 乙醯胺

N — { 1 , 1 — 二甲基 — 3 — [4 — (3 — 甲氧基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 —] — 丙 — 2 — 炔基 } — 乙醯胺

N — { 1 , 1 — 二甲基 — 3 — [4 — (3 — 氯 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 —] — 丙 — 2 — 炔基 } — 乙醯胺

N — { 1 , 1 — 二甲基 — 3 — [4 — (3 — 甲基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 —] — 丙 — 2 — 炔基 } — 甲烷磺醯胺

N — { 1 , 1 — 二甲基 — 3 — [4 — (3 — 甲氧基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 —] — 丙 — 2 — 炔基 } — 甲烷磺醯胺

N — { 1 , 1 — 二甲基 — 3 — [4 — (3 — 氯 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 —] — 丙 — 2 — 炔基 } —

五、發明說明 (160)

甲 烷 磺 醯 胺

N - { 1 - 甲 基 - 3 - [4 - (3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧
基 - 苯 胺 基) - 喹 啉 啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔 基 } - 乙
磺 胺

N - { 1 - 甲 基 - 3 - [4 - (3 - 甲 氧 基 1 - 4 -
苯 氧 基 - 苯 胺 基) - 喹 啉 啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔 基 }
- 乙 磺 胺

N - { 1 - 甲 基 - 3 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯 氧 基
- 苯 胺 基) - 喹 啉 啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔 基 } - 乙 磺
胺

N - { 1 - 甲 基 - 3 - [4 - (3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧
基 - 苯 胺 基) - 喹 啉 啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔 基 } - 甲
烷 磺 醯 胺

N - { 1 - 甲 基 - 3 - [4 - (3 - 甲 氧 基 1 - 4 -
苯 氧 基 - 苯 胺 基) - 喹 啉 啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔 基 }
- 甲 烷 磺 醯 胺

N - { 1 - 甲 基 - 3 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯 氧 基
- 苯 胺 基) - 喹 啉 啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔 基 } - 甲 烷
磺 醯 胺

1 - { 3 - [4 - (3 - 甲 基 - 4 - 苯 氧 基 - 苯 胺 基
) - 喹 啉 啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔 基 } - 六 氫 吡 啶 - 2
- 酮

1 - { 3 - [4 - (3 - 甲 氧 基 - 4 - 苯 氧 基 - 苯 胺
基) - 喹 啉 啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔 基 } - 六 氫 吡 啶 -

五、發明說明 (161)

2 - 酮

1 - { 3 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基)
- 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 六氫吡啶 - 2 -
酮

1 - { 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基)
- 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 吡咯啶 - 2 -
酮

1 - { 3 - [4 - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基)
- 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 吡咯啶 - 2 -
- 酮

1 - { 3 - [4 - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯胺基)
- 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 吡咯啶 - 2 - 酮
。

使用方法 J 及適當的起始物 (依技藝上已知的方法製
得者) , 可製得下列化合物 (及彼等之藥學上可接受之鹽
類及溶劑化物) , 彼等為本發明的一部分 :

(7 - 甲氧基 - 6 - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基 - 喹啉
- 4 - 基) - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

(3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (7 - 甲氧基 - 6
- 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺

(3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (7 - 甲氧基
- 6 - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺

[7 - (2 - 甲氧基 - 乙氧基) - 6 - 六氫吡啶 - 3

五、發明說明 (162)

— 基乙炔基 — 喹啉 — 4 — 基 } — (3 — 甲基 — 4 — 苯氧基 — 苯基) — 胺

(3 — 氯 — 4 — 苯氧基 — 苯基) — [7 — (2 — 甲氧基 — 乙氧基) — 6 — 六氫吡啶 — 3 — 基乙炔基 — 喹啉 — 4 — 基] — 胺

[7 — (2 — 甲氧基 — 乙氧基) — 6 — 六氫吡啶 — 3 — 基乙炔基 — 喹啉 — 4 — 基] — (3 — 甲氧基 — 4 — 苯氧基 — 苯基) — 胺

3 — [7 — (2 — 甲氧基 — 乙氧基) — 4 — (3 — 甲基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 — 基乙炔基] — 六氫吡啶 — 3 — 醇

3 — [7 — (2 — 甲氧基 — 乙氧基) — 4 — (3 — 氯 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 — 基乙炔基] — 六氫吡啶 — 3 — 醇

3 — [7 — (2 — 甲氧基 — 乙氧基) — 4 — (3 — 甲氧基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 — 基乙炔基] — 六氫吡啶 — 3 — 醇

3 — [7 — 甲氧基 — 4 — (3 — 甲基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 — 基乙炔基] — 六氫吡啶 — 3 — 醇

3 — [7 — 甲氧基 — 4 — (3 — 氯 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 — 基乙炔基] — 六氫吡啶 — 3 — 醇

3 — [7 — 甲氧基 — 4 — (3 — 甲氧基 — 4 — 苯氧基 — 苯胺基) — 喹啉 — 6 — 基乙炔基] — 六氫吡啶 — 3 — 醇

五、發明說明 (163)

(6 - 氮雜環丁二烯 - 3 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 嗎福啉 - 2 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺

(3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 嗎福啉 - 2 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺

(3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 嗎福啉 - 2 - 基乙炔基 - 喹啉 - 4 - 基) - 胺

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 , 4 , 5 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺

(3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 , 4 , 5 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺

(3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 , 4 , 5 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 , 2 , 5 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺

(3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 , 2 , 5 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基] - 胺

(3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 , 2 ,

五、發明說明 (164)

5 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基
] - 胺

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 , 2 ,
 3 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 -
 基] - 胺

(3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 ,
 2 , 3 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4
 - 基] - 胺

(3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 , 2 ,
 3 , 6 - 四氫 - 吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 喹啉 - 4 - 基
] - 胺

[6 - (3 - 胺基 - 3 - 甲基 - 丁 - 1 - 炔基) - 喹
 啉 - 4 - 基] - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (3 - 胺基 - 3 - 甲基 - 丁 - 1 - 炔基) - 喹
 啉 - 4 - 基] - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) -
 胺

[6 - (3 - 胺基 - 3 - 甲基 - 丁 - 1 - 炔基) - 喹
 啉 - 4 - 基] - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (3 - 胺基 - 丁 - 1 - 炔基) - 喹啉 - 4 -
 基] - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (3 - 胺基 - 丁 - 1 - 炔基) - 喹啉 - 4 -
 基] - (3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺

[6 - (3 - 胺基 - 丁 - 1 - 炔基) - 喹啉 - 4 -
 基] - (3 - 氯 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺。


(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

四、中文發明摘要 (發明之名稱： 作為抗癌劑之經取代的雙環衍生物)
 本發明係關於式 1 所示的化合物及其藥學上可接受之鹽類及溶劑化物




1

其中，A、X、R¹、R³及R⁴如說明書中所定義。
 本發明亦關於以投服式 1 化合物來治療異常細胞生長的方法以及含有式 1 化合物之用於治療如是病症的藥學組成物。
 本發明還關於式 1 化合物的製備方法。

英文發明摘要 (發明之名稱： Substituted bicyclic derivatives useful as anticancer agents)

The invention relates to compounds of the formula 1



1

and to pharmaceutically acceptable salts and solvates thereof, wherein A, X, R¹, R³ and R⁴ are as defined herein. The invention also relates to methods of treating abnormal cell growth in mammals with administering the compounds of formula 1 and to pharmaceutical compositions for treating such disorders which contain the compounds of formula 1. The invention also relates to methods of preparing the compounds of formula 1.

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

線

五、發明說明 (80)

修正
91年8月9日
補充

化並將其置於矽膠 (5 g) 層柱的最上端。用 1 : 1 : 0 . 1 己烷 : 乙酸乙酯 / N e t ₃ 洗提層柱，去除高 R_f 雜質。用 1 0 : 1 二氯甲烷 : 甲醇洗提所要的產物 2 3 (R_f 0 . 0 5 , 1 0 : 1 二氯甲烷 : 甲醇) ，可得一黃色固體 (6 5 m g , 6 0 %) 。

¹ H N M R (D M S O - d ₆ ; 4 0 0 M H z) : δ :
9 . 8 8 (s , 1 H , N H) ,
8 . 6 7 (s , 1 H) , 8 . 4 5 (s , 1 H) ,
7 . 9 2 (d , 1 . 7 H z) ,
7 . 7 6 (d , 1 H , J = 8 . 5 H z) ,
7 . 6 7 (d , 1 H , J = 8 . 5 H z) ,
7 . 5 0 (d , 1 H , J = 3 . 1 H z) ,
7 . 4 2 (d , 1 H , J = 8 . 9 H z) ,
7 . 3 5 (d d , 1 H , J = 8 . 9 H z , 1 . 9 H z)
, 7 . 3 1 - 7 . 1 8 (m , 6 H) ,
6 . 4 8 (d d , 1 H , J + 3 . 1 H z , 0 . 8 H z)
, 5 . 4 1 (s , 2 H) , 2 . 9 7 (b r , 2 H) ,
2 . 6 7 (b r , 2 H) , 2 . 4 7 (s , 3 H) ,
1 . 9 2 (b r , 2 H) , 1 . 8 2 (b r , 2 H) 。
L R M S : 4 8 8 . 2 (M H ⁺) , 1 2 6 . 1 。

方法 G : 乙酸 3 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 -
5 - 基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 烯丙酯 (2 7)
3 - (4 - 苯氧基 - 喹啉 - 6 - 基) - 丙烯酸甲酯 (2

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明 (102

表

修正
補充 本91年8月9日

實施例	製備方法	IUPAC 名	LRMS (MH ⁺)	HPLC 保留時間 (分鐘)
1	I	2-甲基-4-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丁-3-炔-2-醇	396.1	6.88
2	G'	3-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-(E)-丙-2-烯-1-醇	370.1	6.06
3	B	(6-環丁基-喹啉-4-基)-(4-苯氧基-苯基)-胺	368.2	8.35
4	B	(6-環丙基-喹啉-4-基)-(4-苯氧基-苯基)-胺	354.2	7.62
5	I	1-甲氧基-2-甲基-4-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丁-3-炔-2-醇	426.1	6.66
6	I	4-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-2-吡啶-4-基-丁-3-炔-2-醇	459.0	6.56
7	I	1-[4-(4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基乙炔基]-環己醇	436.1	7.80
8	G	N-甲基-3-[4-(4-苯氧基-苯基-胺基)-喹啉-6-基]-丙烯	397.2	5.81

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

A7

B7

本9月8日
補充

五、發明說明 (118)

		咯啉-2-基-丙-2-炔-1-醇		
129	J	3-{4-[1-(丙烷-2-磺醯基)- 1H-吡啶-5-基胺基]-噻唑啉- 6-基}-1-吡咯啉-2-基-丙-2- 炔-1-醇	490.2	4.52
130	J	3-[4-(4-苯甲基氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基]-1-吡咯啉-2- 基-丙-2-炔-1-醇	451.2	4.99
131	J	3-[4-(1-苯磺醯基-1H-吡啶- 5-基胺基)-噻唑啉-6-基]-1- 吡咯啉-2-基-丙-2-炔-1-醇	524.2	4.94
132	O	4-胺基-1-[4-(3-氯-4-苯氧基- 苯胺基)-噻唑啉-6-基]-4-甲 基-戊-1-炔-3-醇	459.1	5.41
133	J	3-[4-(3-氟-4-苯氧基-苯胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-六氫 吡啶-3-醇	455.2	5.19
134	J	3-[4-(4-苯氧基-3-三氟甲基- 苯胺基)-噻唑啉-6-基乙炔基]-六氫吡啶-3-醇	505.1	5.61
135	J	4-胺基-1-[4-(1-苯磺醯基- 1H-吡啶-5-基胺基)-噻唑啉- 6-基]-戊-1-炔-3-醇	498.1	4.82
136	J	3-{4-[4-(3-甲氧基-苯氧基)-	481.2	5.15

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

A7
修正 本91年8月9日
補充

五、發明說明 (140

299	K	(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-[6-(1-丙基-六氫吡啶-3-基乙炔基)-喹啉-4-基]-胺	477.1	6.24
300	A'	{6-[3-(4-胺基-六氫吡啶-1-基)-丙-1-炔基]-喹啉-4-基}-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-胺	464.3	5.10
301	K'	{6-[1-(2-胺基-乙基)-六氫吡啶-3-基乙炔基]-喹啉-4-基}-(3-甲基-4-苯氧基-苯基)-胺	478.1	5.84
302	A	1-{3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-吡咯啉-2-羧酸甲酯	509.0	7.37
303	A	(1-{3-[4-(3-甲基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-六氫吡啶-4-基)-甲醇	479.3	5.40
304	A	(1-{3-[4-(3-甲氧基-4-苯氧基-苯胺基)-喹啉-6-基]-丙-2-炔基}-六氫吡啶-4-基)-甲醇	495.3	4.99
305	A	{6-[3(4,4-二甲氧基-六氫吡啶-1-基)-丙-1-炔基]-喹啉	509.2	7.33

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

六、申請專利範圍

附件一 A:


公 告 本

第 88120466 號專利申請案

中文申請專利範圍修正本



民國 91 年 8 月 16 日修正

1. 一種式 1 所示的化合物或其藥學上可接受之鹽類
或溶劑化物，



其中：

X 為 N；

其中前述 A 部分帶有作為取代基之 R⁴ 基團；R¹ 為 H；R² 係獨立為 H 或 C₁ - C₆ 烷基；R³ 為 - (C R¹ R²)_m R⁸，其中 m 為 0 或 1；或是 R¹ 及 R³ 一起形成下式所示的基團

其中該基團係任意經 1 至 3 個選自苯並磺醯基及苯甲
基之取代基所取代；

R⁴ 為 - (C R¹ R²)_m - C ≡ C -

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

$$(C R^1 R^2)_t R^9, -X^1-$$

$$R^{12}, -(C R^1 R^2)_m - C \equiv C -$$

$$(C R^1 R^2)_k R^{13}, -(C R^1 R^2)_m - C = C -$$

$(C R^1 R^2)_k R^{13}$ 及 $-(C R^1 R^2)_t - R^9$ ，其中 m 為 0 至 3 的整數， t 為 0 至 5 的整數，及 k 為 1 至 3 的整數，且與 R^9 的接點係經過 R^9 基團的碳原子；

R^8 為經 1 至 3 個選自苯氧基及 C_{1-6} 烷基之取代基所取代的苯基；


R^9 為咪唑基、1-六氫吡啶基、六氫吡啶基及四氫吡喃基，其可任意地被 1 或 2 個選自羥基、 C_{1-6} 烷基及 C_{1-6} 烷基胺基之取代基所取代；

X^1 為 $C_3 - C_4$ 碳環基團；

R^{12} 為 R^6 或 $-C(O)R^6$ ；

R^{13} 為 $-NR^1 R^{12}$ 或 $-OR^{12}$ ；

R^6 為 H、任意地經鹵素取代的 C_{1-6} 烷基及



2. 如申請專利範圍第 1 項之化合物，其中 A 部分為



其中 A 部分帶有作為取代基之 R^4 基團。

3. 如申請專利範圍第 1 項之化合物，其中 R^4 為 $-(C R^1 R^2)_m - C \equiv C - (C R^1 R^2)_t R^9$ ，其中 m 為 0 至 3 的整數且 t 為 0 至 5 的整數。

4. 如申請專利範圍第 2 項之化合物，其中 R^4 為

六、申請專利範圍

— (C R¹ R²)_m — C ≡ C — (C R¹ R²)_t R⁹, 其中 m 為 0 至 3 的整數且 t 為 0 至 5 的整數。

5. 如申請專利範圍第 1 項之化合物, 其中 R⁴ 為
— (C R¹ R²)_m — C ≡ C — (C R¹ R²)_k R¹³ 或
— (C R¹ R²)_m — C = C — (C R¹ R²)_k R¹³, 其中 m 為 0 至 3 的整數及 k 為 1 至 3 的整數。

6. 如申請專利範圍第 2 項之化合物, 其中 R⁴ 為
— (C R¹ R²)_m — C ≡ C — (C R¹ R²)_k R¹³ 或
— (C R¹ R²)_m — C = C — (C R¹ R²)_k R¹³, 其中 m 為 0 至 3 的整數且 k 為 1 至 3 的整數。

7. 如申請專利範圍第 1 項之化合物, 其中 R⁴ 為
— X¹ — R¹², 其中 X¹ 為 C₃ — C₄ 碳環基團; 或是 R⁴ 為
— (C R¹ R²)_t R⁹, 其中與 R⁹ 的接點係經過 R⁹ 的碳原子。

8. 如申請專利範圍第 2 項之化合物, 其中 R⁴ 為
— X¹ — R¹², 其中 X¹ 為 C₃ — C₄ 碳環基團; 或是 R⁴ 為
— (C R¹ R²)_t R⁹, 其中與 R⁹ 的接點係經過 R⁹ 的碳原子。

9. 如申請專利範圍第 3 項之化合物, 其中 R⁸ 為經 1 至 3 個選自苯氧基及 C₁₋₆ 烷基之取代基所取代的苯基。

10. 如申請專利範圍第 4 項之化合物, 其中 R⁸ 為經 1 至 3 個選自苯氧基及 C₁₋₆ 烷基之取代基所取代的苯基。

11. 如申請專利範圍第 5 項之化合物, 其中 R⁸ 為經

六、申請專利範圍

1 至 3 個選自苯氧基及 C₁₋₆ 烷基之取代基所取代的苯基。

1 2 . 如申請專利範圍第 6 項之化合物，其中 R⁸ 為經 1 至 3 個選自苯氧基及 C₁₋₆ 烷基之取代基所取代的苯基。

1 3 . 如申請專利範圍第 7 項之化合物，其中 R⁸ 為經 1 至 3 個選自苯氧基及 C₁₋₆ 烷基之取代基所取代的苯基。

1 4 . 如申請專利範圍第 8 項之化合物，其中 R⁸ 為經 1 至 3 個選自苯氧基及 C₁₋₆ 烷基之取代基所取代的苯基。

1 5 . 如申請專利範圍第 10 項之化合物，其中 R⁴ 基團中的 m 變數為 0，R⁸ 基團中的 t 為 0 至 2 的整數，及 R⁹ 為咪唑基、1-六氫吡啶基、六氫吡啶基及四氫吡喃基，其可任意地被 1 或 2 個選自羥基、C₁₋₆ 烷基及 C₁₋₆ 烷基胺基之取代基所取代。

1 6 . 如申請專利範圍第 12 項之化合物，其中 R⁴ 為 $-(C R^1 R^2)_m - C \equiv C - (C R^1 R^2)_k R^{13}$ ，其中 m 為 0 且 k 為 1 或 2 的整數。

1 7 . 如申請專利範圍第 14 項之化合物，其中 R⁴ 為 $-(C R^1 R^2)_t R^9$ ，其中與 R⁹ 的接點係經過 R⁹ 的碳原子；t 為 0 至 2 的整數，且 R⁹ 為咪唑基、1-六氫吡啶基、六氫吡啶基及四氫吡喃基，其可任意地被 1 或 2 個選自羥基、C₁₋₆ 烷基及 C₁₋₆ 烷基胺基之取代基所取代。

六、申請專利範圍

。

1 8 . 如申請專利範圍第 1 項之化合物，其係選自：

(1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基) - [6 - (3 - 咪唑 - 1 - 基 - 丙 - 1 - 炔基) - 噻唑啉 - 4 - 基] - 胺；

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (3 - 六氫吡啶 - 1 - 基 - 丙 - 1 - 炔基) - 噻唑啉 - 4 - 基] - 胺；

(6 - 環丁基 - 噻唑啉 - 4 - 基) - (4 - 苯氧基 - 苯基) - 胺；

4 - [4 - (1 - 苯甲基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 噻唑啉 - 6 - 基乙炔基] - 1 - 甲基 - 六氫吡啶 - 4 - 醇；

乙酸 3 - [4 - (1 - 苯磺醯基 - 1 H - 吡啶 - 5 - 基胺基) - 噻唑啉 - 6 - 基] - 烯丙酯；

4 - [4 - (4 - 苯氧基 - 苯基胺基) - 噻唑啉 - 6 - 基乙炔基] - 四氫 - 吡喃 - 4 - 醇氫氯酸鹽；

(3 - 甲氧基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡啶 - 4 - 基乙炔基 - 噻唑啉 - 4 - 基) - 胺；

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - [6 - (1 - 丙基 - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基) - 噻唑啉 - 4 - 基] - 胺；

{ 6 - [1 - (2 - 胺基 - 乙基) - 六氫吡啶 - 3 - 基乙炔基] - 噻唑啉 - 4 - 基 } - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

基 - 苯基) - 胺 ;

3 - { 2 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 乙基 } - 六氫吡啶 - 3 - 醇 ;


2 - 氯 - N - { 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 乙醯胺 ;

N - { 3 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 丙 - 2 - 炔基 } - 2 - 嗎福啉 - 4 - 基 - 乙醯胺 ;

(3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基) - (6 - 六氫吡啶 - 4 - 基乙炔基 - 吡啶並 [3 , 4 - d] 嘧啶 - 4 - 基) - 胺 ;

4 - 胺基 - 4 - 甲基 - 1 - [4 - (3 - 甲基 - 4 - 苯氧基 - 苯基胺基) - 喹啉 - 6 - 基] - 戊 - 1 - 基 - 3 - 醇。

19 . 一種製備如申請專利範圍第 1 項之化合物的方法，其包含 (a) 令式 11 或 2 之化合物與式 3 化合物反應



式中，Z 為離去基，且 A、X、R¹，R⁴ 及 R³ 如前

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝


訂

線

六、申請專利範圍


文所定義，

或是 (b) 令式 7 化合物與式 3 化合物反應



式中，X、R¹、A、R⁴及R³如前文所定義且Z¹係活化基團，

以得到式 5 之中間產物



式中，Z¹、X、R¹、A及R³如前文所定義且Z¹係轉化為R⁴基團，而該R⁴基團可任意轉化為另一個R⁴基團。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線