

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公表特許公報(A)

(11)公表番号

特表2023-537271

(P2023-537271A)

(43)公表日 令和5年8月31日(2023.8.31)

(51)国際特許分類		F I		テーマコード (参考)	
C 0 7 D	333/38 (2006.01)	C 0 7 D	333/38	C S P	4 C 0 6 3
A 6 1 P	1/16 (2006.01)	A 6 1 P	1/16		4 C 0 7 1
A 6 1 P	3/00 (2006.01)	A 6 1 P	3/00		4 C 0 8 6
A 6 1 P	9/00 (2006.01)	A 6 1 P	9/00		
A 6 1 P	3/06 (2006.01)	A 6 1 P	3/06		
		審査請求	未請求	予備審査請求	未請求 (全142頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2023-504724(P2023-504724)	(71)出願人	523025056		
(86)(22)出願日	令和3年7月23日(2021.7.23)		イニファーム, インク.		
(85)翻訳文提出日	令和5年3月20日(2023.3.20)		アメリカ合衆国 9 8 0 0 4 ワシントン		
(86)国際出願番号	PCT/US2021/042960		州 ベルビュー 1 0 8 番アベニュー・ノ		
(87)国際公開番号	WO2022/020714		ースイースト 5 0 0 スイート 1 1 0 0		
(87)国際公開日	令和4年1月27日(2022.1.27)	(74)代理人	110003797		
(31)優先権主張番号	63/056,165		弁理士法人清原国際特許事務所		
(32)優先日	令和2年7月24日(2020.7.24)	(72)発明者	オディンゴ, ジョシュア		
(33)優先権主張国・地域又は機関	米国(US)		アメリカ合衆国 9 8 0 0 4 ワシントン		
(31)優先権主張番号	63/113,555		州 ベルビュー 1 0 8 番アベニュー・ノ		
(32)優先日	令和2年11月13日(2020.11.13)	(72)発明者	アナンダン, サンパース クマル		
(33)優先権主張国・地域又は機関	米国(US)		アメリカ合衆国 9 8 0 0 4 ワシントン		
(81)指定国・地域	AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA		州 ベルビュー 1 0 8 番アベニュー・ノ		
	最終頁に続く		ースイースト 5 0 0 スイート 1 1 0 0		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 チオフェンHSD17B13阻害剤とその使用

(57)【要約】

本明細書には、HSD17B13阻害剤、および当該阻害剤を含む医薬組成物が記載される。本件の化合物と組成物は、NAFLDやNAASH、もしくは薬物性肝障害(DILI)などの肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患の処置に有用である。


【選択図】なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

式 (I) :

【化 1】



10

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^1 はハロゲンであり、

R^2 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、または3つの R^{2a} により任意選択で置換され、

20

R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

30

R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

n は、1～3であり、

40

R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ア

50

リール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-\text{S}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

10

R^6 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換され、

20

R^{6a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^{20}$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^{20}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{R}^{20}$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NHS}(=\text{O})_2\text{R}^{20}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NR}^{21}\text{C}(=\text{O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}^{21}$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{OR}^{21}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(=\text{O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(=\text{O})\text{OR}^{21}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

30

R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

40

R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

50

R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

あるいは R^{22} と R^{23} は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

30

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハ

40

50

ロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項2】

R^1 がクロロである、請求項1に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項3】

R^2 が、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、または C_1-C_6 アルキルである、請求項1もしくは2に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項4】

R^2 が水素である、請求項1から3のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項5】

R^3 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである、請求項1から4のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項6】

R^3 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである、請求項1から5のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項7】

R^3 が、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである、請求項1から6のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項8】

R^3 がそれぞれ水素である、請求項1から7のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項9】

n が1である、請求項1から8のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項10】

R^4 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである、請求項1から9のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項11】

R^4 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである、請求項1から10のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

。

10

20

30

40

50

【請求項 1 2】

R⁴が、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、またはC₁－C₆アルキルである、請求項 1 から 1 1 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 1 3】

R⁴が、それぞれ水素またはハロゲンである、請求項 1 から 1 2 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 1 4】

R⁴がそれぞれ水素である、請求項 1 から 1 3 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

10

【請求項 1 5】

R⁴がそれぞれハロゲンである、請求項 1 から 1 3 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 1 6】

mが1である、請求項 1 から 1 5 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 1 7】

R⁵が、水素またはC₁－C₆アルキルである、請求項 1 から 1 6 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

20

【請求項 1 8】

R⁵が水素である、請求項 1 から 1 7 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 1 9】

R⁷が、水素またはC₁－C₆アルキルである、請求項 1 から 1 8 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 2 0】

R⁷が水素である、請求項 1 から 1 9 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 2 1】

R⁶が、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、C₁－C₆アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁－C₆アルキル（シクロアルキル）、C₁－C₆アルキル（ヘテロシクロアルキル）、C₁－C₆アルキル（アリール）、またはC₁－C₆アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールが、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換される、請求項 1 から 2 0 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

30

【請求項 2 2】

R⁶が、C₁－C₆アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁－C₆アルキル（シクロアルキル）、C₁－C₆アルキル（ヘテロシクロアルキル）、C₁－C₆アルキル（アリール）、またはC₁－C₆アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールが、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換される、請求項 1 から 2 1 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

40

【請求項 2 3】

R⁶が、C₁－C₆アルキル（アリール）またはC₁－C₆アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アリール、およびヘテロアリールが、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換される、請求項 1 から 2 2 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

50

【請求項 24】

R^6 が $C_1 - C_6$ アルキル（アリール）であり、アルキルとアリールが、独立して 1、2、または 3 つの R^{6a} により任意選択で置換される、請求項 1 から 23 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 25】

R^6 が、1、2、または 3 つの R^{6a} により任意選択で置換される $C_1 - C_6$ アルキルである、請求項 1 から 23 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 26】

R^{6a} が、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $C_1 - C_6$ アルキル、 $C_1 - C_6$ ハロアルキル、 $C_1 - C_6$ ジューテロアルキル、 $C_1 - C_6$ ヒドロキシアルキル、または $C_1 - C_6$ アミノアルキルである、請求項 1 から 24 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

10

【請求項 27】

R^{6a} が、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $C_1 - C_6$ アルキル、または $C_1 - C_6$ ハロアルキルである、請求項 1 から 26 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

20

【請求項 28】

R^{6a} がそれぞれ独立して $-OR^{20}$ である、請求項 1 から 27 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 29】

R^{20} が、それぞれ独立して $C_1 - C_6$ アルキル、 $C_1 - C_6$ ハロアルキル、 $C_1 - C_6$ ジューテロアルキル、または $C_1 - C_6$ ヒドロキシアルキルである、請求項 1 から 28 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 30】


R^{20} がそれぞれ独立して $C_1 - C_6$ アルキルである、請求項 1 から 29 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

30

【請求項 31】

式 (I I) :

【化 2】



式 (II)

40

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、

50

$-\text{NHS}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-\text{S}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^a$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NHS}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

p は、1～4であり、

R^9 は、水素、 $-\text{P}(\text{=O})\text{OH}_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^{10} は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換され、

R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^{20}$ 、 $-\text{OP}(\text{=O})\text{OH}_2$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^{20}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^{20}$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NHS}(\text{=O})_2\text{R}^{20}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OR}^{21}$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{OR}^{21}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{OR}^{21}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアル

10

20

30

40

50

キル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^{22} と R^{23} は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

30

【請求項 3 2】

R^9 が、水素または C_1-C_6 アルキルである、請求項 3 1 に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 3 3】

R^9 が C_1-C_6 アルキルである、請求項 3 1 もしくは 3 2 に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 3 4】

R^8 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである、請求項 3 1 から 3 3 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

40

【請求項 3 5】

R^8 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである、請求項 3 1 から 3 4 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 3 6】

R^8 が、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである、請求

50

項 3 1 から 3 5 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 3 7】

R⁸ がそれぞれ水素である、請求項 3 1 から 3 6 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 3 8】

p が 1 である、請求項 3 1 から 3 7 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 3 9】

R⁴ が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a、-NR^cR^d、-C(=O)R^a、-C(=O)OR^b、-C(=O)NR^cR^d、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、またはC₁-C₆ジューテロアルキルである、請求項 3 1 から 3 8 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

10

【請求項 4 0】

R⁴ が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a、C₁-C₆アルキル、またはC₁-C₆ハロアルキルである、請求項 3 1 から 3 9 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 4 1】

20

R⁴ が、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、またはC₁-C₆アルキルである、請求項 3 1 から 4 0 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 4 2】

R⁴ が、それぞれ水素またはハロゲンである、請求項 3 1 から 4 1 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 4 3】

R⁴ がそれぞれ水素である、請求項 3 1 から 4 2 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 4 4】

30

R⁴ がそれぞれハロゲンである、請求項 3 1 から 4 2 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 4 5】

m が 1 である、請求項 3 1 から 4 4 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 4 6】

R⁵ が、水素またはC₁-C₆アルキルである、請求項 3 1 から 4 5 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 4 7】

R⁵ が水素である、請求項 3 1 から 4 6 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

40

【請求項 4 8】

R⁷ が、水素またはC₁-C₆アルキルである、請求項 3 1 から 4 7 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 4 9】

R⁷ が水素である、請求項 3 1 から 4 8 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 5 0】

R¹⁰ が、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールが、

50

1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される、請求項31から49のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項51】

R^{10} が、アリールまたはヘテロアリールであり、アリールとヘテロアリールが、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される、請求項31から50のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項52】

R^6 が、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換されるアリールである、請求項31から51のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

10

【請求項53】

R^{10a} が、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである、請求項31から52のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

20

【請求項54】

R^{10a} が、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである、請求項31から53のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項55】


R^{10a} が、それぞれ独立してハロゲンまたは $-OH$ である、請求項31から54のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項56】

式(IV)：

30

【化3】



式(IV)

40

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^1 はハロゲンであり、

R^2 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、

50

またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、または3つの R^{2a} により任意選択で置換され、

R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

n は、1～3であり、

R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^6 は、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換され、

R^{6a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-SH$ 、 $-SR^{20}$ 、 $-S(=O)R^{20}$ 、 $-S(=O)_2R^{20}$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^{22}R$

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項57】

R^1 がク口口である、請求項56に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項58】

R^2 が、水素または $-P(=O)OH_2$ である、請求項56もしくは57に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項59】

R^2 が水素である、請求項56から58のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項60】

R^3 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである、請求項56から59のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶

媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 6 1】

R^3 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである、請求項 5 6 から 6 0 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 6 2】

R^3 が、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである、請求項 5 6 から 6 1 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

10

【請求項 6 3】

R^3 がそれぞれ水素である、請求項 5 6 から 6 2 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 6 4】

n が 1 である、請求項 5 6 から 6 3 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 6 5】

R^4 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-6 ジューテロアルキルである、請求項 5 6 から 6 4 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

20

【請求項 6 6】

R^4 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである、請求項 5 6 から 6 5 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 6 7】

R^4 が、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである、請求項 5 6 から 6 6 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

30

【請求項 6 8】

R^4 が、それぞれ水素またはハロゲンである、請求項 5 6 から 6 7 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 6 9】

R^4 がそれぞれ水素である、請求項 5 6 から 6 8 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 7 0】

m が 1 である、請求項 5 6 から 6 9 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

40

【請求項 7 1】

2 つの R^4 が一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールが、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される、請求項 5 6 から 6 4 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

50

【請求項 7 2】

2つのR⁴が一体となってシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルが、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁-C₆アミノアルキルにより任意選択で置換される、請求項56から64もしくは71のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 7 3】

2つのR⁴が一体となってシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルが、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-NH₂、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁-C₆アミノアルキルにより任意選択で置換される、請求項56から64または請求項71もしくは72のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 7 4】

R⁵が、水素またはC₁-C₆アルキルである、請求項56から73のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 7 5】

R⁵が水素である、請求項56から74のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 7 6】

R⁷が、水素またはC₁-C₆アルキルである、請求項56から75のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 7 7】

R⁷が水素である、請求項56から76のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 7 8】

R⁶が、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁-C₆アルキル（シクロアルキル）、C₁-C₆アルキル（ヘテロシクロアルキル）、C₁-C₆アルキル（アリール）、またはC₁-C₆アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換される、請求項56から77のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 7 9】

R⁶が、C₁-C₆アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁-C₆アルキル（シクロアルキル）、C₁-C₆アルキル（ヘテロシクロアルキル）、C₁-C₆アルキル（アリール）、またはC₁-C₆アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールが、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換される、請求項56から78のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 8 0】

R⁶が、C₁-C₆アルキル（アリール）またはC₁-C₆アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アリール、およびヘテロアリールが、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換される、請求項56から79のいずれか一項に記載の化合

10

20

30

40

50

物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 8 1】

R^6 が $C_1 - C_6$ アルキル（アリール）であり、アルキルとアリールが、独立して 1、2、または 3 つの R^{6a} により任意選択で置換される、請求項 5 6 から 8 0 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 8 2】

R^6 が、1、2、または 3 つの R^{6a} により任意選択で置換される $C_1 - C_6$ アルキルである、請求項 5 6 から 8 1 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 8 3】

R^{6a} が、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $C_1 - C_6$ アルキル、 $C_1 - C_6$ ハロアルキル、 $C_1 - C_6$ ジューテロアルキル、 $C_1 - C_6$ ヒドロキシアルキル、または $C_1 - C_6$ アミノアルキルである、請求項 5 6 から 8 2 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 8 4】

R^{6a} が、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $C_1 - C_6$ アルキル、または $C_1 - C_6$ ハロアルキルである、請求項 5 6 から 8 3 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 8 5】

R^{6a} がそれぞれ独立して $-OR^{20}$ である、請求項 5 6 から 8 4 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 8 6】

R^{20} が、それぞれ独立して $C_1 - C_6$ アルキル、 $C_1 - C_6$ ハロアルキル、 $C_1 - C_6$ ジューテロアルキル、または $C_1 - C_6$ ヒドロキシアルキルである、請求項 5 6 から 8 5 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。


【請求項 8 7】

R^{20} がそれぞれ独立して $C_1 - C_6$ アルキルである、請求項 5 6 から 8 6 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 8 8】

式 (V) :

【化 4】



式 (V)

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

p は、1～4であり、

R^9 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^{10} は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換され、

R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-SH$ 、 $-SR^{20}$ 、 $-S(=O)R^{20}$ 、 $-S(=O)_2R^{20}$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-NHS(=O)_2R^{20}$ 、 $-S(=O)_2NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-OC(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-OC(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-OC(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-NR^{21}C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-NR^{21}C(=O)R^{20}$ 、 $-NR^{21}C(=O)OR^{21}$ 、

C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、C₁－C₆アミノアルキル、C₂－C₆アルケニル、C₂－C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R²⁰は、それぞれ独立して、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、C₁－C₆アミノアルキル、C₂－C₆アルケニル、C₂－C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、－CN、－OH、－OMe、－S(=O)Me、－S(=O)₂Me、－NH₂、－S(=O)₂NH₂、－C(=O)Me、－C(=O)OH、－C(=O)OMe、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁－C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

R²¹は、それぞれ独立して、水素、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、C₁－C₆アミノアルキル、C₂－C₆アルケニル、C₂－C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、－CN、－OH、－OMe、－S(=O)Me、－S(=O)₂Me、－NH₂、－S(=O)₂NH₂、－C(=O)Me、－C(=O)OH、－C(=O)OMe、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁－C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

R²²とR²³は、それぞれ独立して、水素、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、C₁－C₆アミノアルキル、C₂－C₆アルケニル、C₂－C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、－CN、－OH、－OMe、－S(=O)Me、－S(=O)₂Me、－NH₂、－S(=O)₂NH₂、－C(=O)Me、－C(=O)OH、－C(=O)OMe、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁－C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

30

あるいはR²²とR²³は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、－CN、－OH、－OMe、－S(=O)Me、－S(=O)₂Me、－NH₂、－S(=O)₂NH₂、－C(=O)Me、－C(=O)OH、－C(=O)OMe、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁－C₆アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

40

R^aは、それぞれ独立して、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、C₁－C₆アミノアルキル、C₂－C₆アルケニル、C₂－C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁－C₆アルキル（シクロアルキル）、C₁－C₆アルキル（ヘテロシクロアルキル）、C₁－C₆アルキル（アリール）、またはC₁－C₆アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、－CN、－OH、－OMe、－S(=O)Me、－S(=O)₂Me、－NH₂、－S(=O)₂NH₂、－C(=O)Me、－C(=O)OH、－C(=O)OMe、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ジューテロアル

50

キル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、


20

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

30

但し、式(V)の化合物が

【化5】



40

ではないことを前提とする、

化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項89】

R^9 が、水素または C_1-C_6 アルキルである、請求項88に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項90】

R^9 が C_1-C_6 アルキルである、請求項88もしくは89に記載の化合物、またはそ

50

の薬学的に許容可能な塩 32、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 91】

R^8 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである、請求項 88 から 90 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 92】

R^8 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである、請求項 88 から 91 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

10

【請求項 93】

R^8 が、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである、請求項 88 から 92 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 94】

R^8 がそれぞれ水素である、請求項 88 から 93 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 95】

p が 1 である、請求項 88 から 94 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

20

【請求項 96】

R^4 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである、請求項 88 から 95 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 97】

R^4 が、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである、請求項 88 から 96 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

30

【請求項 98】

R^4 が、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである、請求項 88 から 97 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 99】

R^4 が、それぞれ水素またはハロゲンである、請求項 88 から 98 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

40

【請求項 100】

R^4 がそれぞれ水素である、請求項 88 から 99 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 101】

m が 1 である、請求項 88 から 100 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 102】

2 つの R^4 が一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールが、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$

50

、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される、請求項88から95のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項103】

2つの R^4 が一体となってシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルが、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される、請求項88から95もしくは102のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

10

【請求項104】

2つの R^4 が一体となってシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルが、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される、請求項88から95または請求項102もしくは103のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

20

【請求項105】

R^5 が、水素または C_1-C_6 アルキルである、請求項88から104のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項106】

R^5 が水素である、請求項88から105のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項107】

R^7 が、水素または C_1-C_6 アルキルである、請求項88から106のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

30

【請求項108】

R^7 が水素である、請求項88から107のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項109】

R^{10} が、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールが、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される、請求項88から108のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

40

【請求項110】

R^{10} が、アリールまたはヘテロアリールであり、アリールとヘテロアリールが、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される、請求項88から109のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項111】

R^6 が、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換されるアリールである、請求項88から110のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

50

【請求項 1 1 2】

R^{10a} が、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである、請求項 8 8 から 1 1 1 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 1 1 3】

R^{10a} が、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである、請求項 8 8 から 1 1 2 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

10

【請求項 1 1 4】

R^{10a} が、それぞれ独立してハロゲンまたは $-OH$ である、請求項 8 8 から 1 1 3 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 1 1 5】

表 1 に見られる化合物から選択される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体。

【請求項 1 1 6】

請求項 1 から 1 1 5 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体と、薬学的に許容可能な担体とを含む医薬組成物。

20

【請求項 1 1 7】

疾患の処置を必要とする対象の疾患を処置する方法であって、請求項 1 から 1 1 5 のいずれか一項に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体、あるいは請求項 1 1 6 に記載の医薬組成物を薬学的有効量で投与する工程を含む方法。

【請求項 1 1 8】

前記疾患が、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患である、請求項 1 1 7 に記載の方法。

30

【請求項 1 1 9】

前記疾患が $NAFLD$ である、請求項 1 1 7 または 1 1 8 に記載の方法。

【請求項 1 2 0】

前記疾患が $NAASH$ である、請求項 1 1 7 または 1 1 8 に記載の方法。

【請求項 1 2 1】

前記疾患が薬物性肝障害 ($DILI$) である、請求項 1 1 7 または 1 1 8 に記載の方法。

【請求項 1 2 2】

前記疾患が $HSD17B13$ に関連する、請求項 1 1 7 または 1 1 8 に記載の方法。

【請求項 1 2 3】

前記疾患がアルコール性肝疾患である、請求項 1 1 7 または 1 1 8 に記載の方法。

40

【請求項 1 2 4】

前記疾患が肝硬変である、請求項 1 1 7 または 1 1 8 に記載の方法。

【請求項 1 2 5】

前記疾患が非代償性門脈圧亢進症である、請求項 1 1 7 または 1 1 8 に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願への相互参照

本特許出願は、2020年7月24日出願の米国仮特許出願第63／056,165号

50

、および2020年11月13日出願の米国仮特許出願第63／113，555号に基づく利益を主張し、これらはそれぞれ全体を参照することで本明細書に援用される。

【背景技術】

【0002】

NASH（非アルコール性脂肪性肝炎）を含む非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）は、メタボリック症候群の肝臓表現型（hepatic manifestations）とみなされており、過剰なアルコール摂取の既往歴のない患者の肝臓にトリグリセリドが蓄積することを特徴とする。NAFLD患者の大多数は肥満または病的肥満であり、インスリン抵抗性が付随する。NAFLD／NASHの出現は、肥満症の蔓延増加に伴い世界中で急速に増えつつあり、現在では最もよくみられる慢性肝炎である。

10

【0003】

NAFLDは、脂肪肝のみが観察される単純な脂肪過多症、および肝細胞の小葉内炎症と気球状変性が脂肪肝とともに観察されるNASHに分類される。NASHを患うNAFLD患者の割合は依然として明らかではないが、20～40%となる場合がある。NASHは進行性疾患であり、肝硬変や肝細胞癌を生じさせるおそれがある。NASH患者の20パーセントが肝硬変を発症すると報告され、NASH肝硬変患者の30～40%が肝臓関連で死亡する。近年では、NASHは米国で第3位の肝移植適応症となっている。現在、NAFLD／NASHの主な処置は、食事と運動による生活様式の改善である。しかし、NAFLDを患う肥満患者は生活様式の改善を維持するのに苦労することが多いため、医薬による治療が不可欠である。

20

【0004】

17β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ（HSD17B）は15員の大型ファミリーであり、その一部は性ホルモン代謝に関与する。一部のHSD17B酵素は、コレステロール代謝と脂肪酸代謝でも重要な役割を果たす。近年の試験では、未知の生体機能を有する酵素であるヒドロキシステロイド17β-デヒドロゲナーゼ13（HSD17B13）が、マウスおよびヒトに対する新規な肝臓特異的脂質滴（LD）関連タンパク質であることが示されている。HSD17B13の発現は、非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）の患者およびマウスにおいて顕著にアップレギュレートされる。HSD17B13が肝臓で過剰発現されると、肝臓での脂質蓄積が促進される。HSD17B13はさらに、アルコール性肝臓疾患（ALD）、非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）（例えば、脂肪過多症、非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）、NASH線維症、肝硬変）、脂肪性肝炎、肝臓癌などの慢性肝炎のバイオマーカーとなる可能性もある。

30

【発明の概要】

【0005】

本明細書には、HSD17B13の発現または活性を減少させることを必要とする対象のHSD17B13の発現または活性を減少させるのに有用な方法、化合物、および組成物を提供する。また本明細書には、HSD17B13に関連する疾患または疾病の罹患率を下げることを必要とする対象のHSD17B13に関連する疾患または疾病の罹患率を下げるのに有用な可能性のある方法、化合物、およびHSD17B13特異的阻害剤を含む組成物を提供する。このような方法、化合物、および組成物は、例えば、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患を処置、予防、遅延、または軽快するのに有用な可能性がある。


40

【0006】

本明細書には、式（I）：

【0007】

【化 1】



式 (I)

10

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^1 はハロゲンであり、

R^2 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、または3つの R^{2a} により任意選択で置換され、

20

R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

30

n は、1～3であり、

R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

40

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=$

50

O) 2NH_2 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-\text{S}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^6 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換され、

R^{6a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^{20}$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^{20}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{R}^{20}$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NHS}(=\text{O})_2\text{R}^{20}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NR}^{21}\text{C}(=\text{O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}^{21}$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{OR}^{21}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(=\text{O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(=\text{O})\text{OR}^{21}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロ

あるいは R^{22} と R^{23} は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^bは、それぞれ独立して、水素、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、C₁－C₆アミノアルキル、C₂－C₆アルケニル、C₂－C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁－C₆アルキル（シクロアルキル）、C₁－C₆アルキル（ヘテロシクロアルキル）、C₁－C₆アルキル（アリール）、またはC₁－C₆アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、－CN、－OH、－OMe、－S(=O)Me、－S(=O)₂Me、－NH₂、－S(=O)₂NH₂、－C(=O)Me、－C(=O)OH、－C(=O)OMe、C₁－C₆アルキル、C₁－C₆ハロアルキル、C₁－C₆ジューテロアルキル、C₁－C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁－C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3

50

つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、

化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。


【0008】

また本明細書には、式(II)：

【0009】

10

【化2】



式(II)

20

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^a$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NHS}(=\text{O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(=\text{O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(=\text{O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

30

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

40

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-\text{S}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^a$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NHS}(=\text{O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$ 、 $-\text{OC}(=\text{O})$

50

) R^a 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

p は、1～4であり、

R^9 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

10

R^{10} は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換され、

R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-SH$ 、 $-SR^{20}$ 、 $-S(=O)R^{20}$ 、 $-S(=O)_2R^{20}$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-NHS(=O)_2R^{20}$ 、 $-S(=O)_2NR^{22}R^{23}$ 、 $-S(=O)_2NR^{21}C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-OC(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-OC(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-OC(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-NR^{21}C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-NR^{21}C(=O)R^{20}$ 、 $-NR^{21}C(=O)OR^{21}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

20

R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

30

R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

40

R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジュー

50

テロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^{22} と R^{23} は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C

1-C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいはR^cとR^dは、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁-C₆アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、

化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。


【0010】

10

また本明細書には、式(IV)：

【0011】

【化3】



20

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R¹はハロゲンであり、

R²は、水素、-P(=O)OH₂、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、または3つのR^{2a}により任意選択で置換され、

30

R^{2a}は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a、-NR^cR^d、-C(=O)R^a、-C(=O)OR^b、-C(=O)NR^cR^d、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R³は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a、-SH、-SR^a、-S(=O)R^a、-S(=O)₂R^a、-NO₂、-NR^cR^d、-NHS(=O)₂R^a、-S(=O)₂NR^cR^d、-C(=O)R^a、-OC(=O)R^a、-C(=O)OR^b、-OC(=O)OR^b、-C(=O)NR^cR^d、-OC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)R^a、-NR^bC(=O)OR^b、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

40

nは、1~3であり、

R⁴は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a、

50

$-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^c\text{R}^d$ 、
 $-\text{NHS}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{R}^a$ 、
 $-\text{OC}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、
 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、
 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6
 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アル
 キニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールで
 あり、

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリ
 ール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリ
 ール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、
 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NH}_2$ 、
 $-\text{C}(\text{=O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、
 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-\text{S}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、
 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、
 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、
 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^6 は、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアル
 キル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニ
 ル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロ
 アリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロ
 アルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリ
 ール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアル
 キル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により
 任意選択で置換され、

R^{6a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^{20}$ 、
 $-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^{20}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^{20}$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、
 $-\text{NHS}(\text{=O})_2\text{R}^{20}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、
 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OR}^{21}$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{OR}^{21}$ 、
 $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、
 $-\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{OR}^{21}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、
 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、
 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、または
 ヘテロアリールであり、

R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6
 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、
 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキ
 ル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シク
 ロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独
 立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、
 $-\text{S}(\text{=O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{Me}$ 、
 $-\text{C}(\text{=O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロ
 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6
 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル

、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^{22} と R^{23} は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアル

キル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。


20

【0012】

また本明細書には、式(V)：

【0013】

【化4】



30

式(V)

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

40

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=$

50

O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁-C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

mは、1または2であり、

R⁵とR⁷は、独立して、水素、-S(=O)R^a、-S(=O)₂R^a、-S(=O)₂NR^cR^d、-C(=O)R^a、-C(=O)OR^b、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R⁸は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a、-SH、-SR^a、-S(=O)R^a、-S(=O)₂R^a、-NO₂、-NR^cR^d、-NHS(=O)₂R^a、-S(=O)₂NR^cR^d、-C(=O)R^a、-OC(=O)R^a、-C(=O)OR^b、-OC(=O)OR^b、-C(=O)NR^cR^d、-OC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)R^a、-NR^bC(=O)OR^b、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

pは、1~4であり、

R⁹は、水素、-P(=O)OH₂、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R¹⁰は、水素、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁-C₆アルキル(シクロアルキル)、C₁-C₆アルキル(ヘテロシクロアルキル)、C₁-C₆アルキル(アリール)、またはC₁-C₆アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つのR¹⁰により任意選択で置換され、

R^{10a}は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR²⁰、-OP(=O)OH₂、-SH、-SR²⁰、-S(=O)R²⁰、-S(=O)₂R²⁰、-NO₂、-NR²²R²³、-NHS(=O)₂R²⁰、-S(=O)₂NR²²R²³、-S(=O)₂NR²¹C(=O)R²⁰、-C(=O)R²⁰、-OC(=O)R²⁰、-C(=O)OR²¹、-OC(=O)OR²¹、-C(=O)NR²²R²³、-OC(=O)NR²²R²³、-NR²¹C(=O)NR²²R²³、-NR²¹C(=O)R²⁰、-NR²¹C(=O)OR²¹、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R²⁰は、それぞれ独立して、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁

—C₆ アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{2 1}は、それぞれ独立して、水素、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、C₁—C₆アミノアルキル、C₂—C₆アルケニル、C₂—C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、—CN、—OH、—OMe、—S(=O)Me、—S(=O)₂Me、—NH₂、—S(=O)₂NH₂、—C(=O)Me、—C(=O)OH、—C(=O)OMe、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

R^{2 2}とR^{2 3}は、それぞれ独立して、水素、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、C₁—C₆アミノアルキル、C₂—C₆アルケニル、C₂—C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、—CN、—OH、—OMe、—S(=O)Me、—S(=O)₂Me、—NH₂、—S(=O)₂NH₂、—C(=O)Me、—C(=O)OH、—C(=O)OMe、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

あるいはR^{2 2}とR^{2 3}は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、—CN、—OH、—OMe、—S(=O)Me、—S(=O)₂Me、—NH₂、—S(=O)₂NH₂、—C(=O)Me、—C(=O)OH、—C(=O)OMe、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C₆アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^aは、それぞれ独立して、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、C₁—C₆アミノアルキル、C₂—C₆アルケニル、C₂—C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁—C₆アルキル(シクロアルキル)、C₁—C₆アルキル(ヘテロシクロアルキル)、C₁—C₆アルキル(アリール)、またはC₁—C₆アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、—CN、—OH、—OMe、—S(=O)Me、—S(=O)₂Me、—NH₂、—S(=O)₂NH₂、—C(=O)Me、—C(=O)OH、—C(=O)OMe、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

30

R^bは、それぞれ独立して、水素、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、C₁—C₆アミノアルキル、C₂—C₆アルケニル、C₂—C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁—C₆アルキル(シクロアルキル)、C₁—C₆アルキル(ヘテロシクロアルキル)、C₁—C₆アルキル(アリール)、またはC₁—C₆アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、—CN、—OH、—OMe、—S(=O)Me、—S(=O)₂Me、—NH₂、—S(=O)₂NH₂、—C(=O)Me、—C(=O)OH、—C(=O)OMe、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C

40

50

6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10


あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

但し、式 (V) の化合物が

20

【0014】

【化5】



30

ではないことを前提とする、

化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。

【0015】

また本明細書には、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体と、薬学的に許容可能な賦形剤とを含む医薬組成物が、開示される。

【0016】

また本明細書には、疾患の処置を必要とする対象の疾患を処置する方法であって、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体、あるいは本明細書に開示される医薬組成物を、薬学的有効量で投与する工程を含む方法が、開示される。疾患を処置する方法のいくつかの実施形態では、疾患は、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患である。疾患を処置する方法のいくつかの実施形態では、疾患はNAFLDである。疾患を処置する方法のいくつかの実施形態では、疾患はNASHである。疾患を処置する方法のいくつかの実施形態では、疾患は、薬物性肝損傷（drug induced liver injury：DILI）である。疾患を処置する方法のいくつかの実施形態では、疾患はHSD17B13に関連する。疾患を処置する方法のいくつかの実施形態では、疾患はアルコール性肝疾患である。疾患を処置する方法のいくつかの実施形態では、疾患は肝硬変である。疾患を処置する方法のいくつかの実施形態

40

50

では、疾患は非代償性門脈圧亢進症である。

【0017】

参照による引用

本明細書で言及される刊行物、特許、および特許出願はすべて、あたかも個々の刊行物、特許、または特許出願がそれぞれ参照により援用されるように具体的かつ個々に示されるのと同じ程度にまで、参照により本明細書に援用される。

【発明を実施するための形態】

【0018】

定義

以下の記載では、様々な実施形態の完全な理解をもたらすために、ある特定の詳細が記述される。しかし、当業者は、これらの詳細なしに本発明が実施される場合があることを理解する。他の例では、実施形態の記載を不必要に不鮮明にすることを避けるべく、周知の構造は詳細に示すことも記載することもされていない。前後関係からの要求がない限り、本明細書と後述する特許請求の範囲全体にわたり、「含む (comprise)」およびその変形（「含む (comprises)」及び「含むこと (comprising)」など）の語は、開放的で包括的な意味、つまり、「含むが、限定されない (including, but not limited)」として解釈されることになる。さらに、本明細書で提供される見出しは便宜性のためだけのものであり、請求された発明の範囲または意味を解釈するものではない。

【0019】

「いくつかの実施形態」または「一実施形態」に対する本明細書全体での言及は、実施形態に関連して記載される特定の特徵、構造、または特性が、少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。ゆえに、本明細書全体にわたる様々な場所での「一実施形態では (in one embodiment)」または「一実施形態では (in an embodiment)」という句が現れることは、必ずしも全てが同じ実施形態を指すものではない。さらに、特定の特徵、構造、または特性は、1つまたは複数の実施形態においてあらゆる適切な方法で組み合わせられてよい。また、本明細書と添付の特許請求の範囲で使用する時、単数形「a」、「an」、および「the」は、前後関係から明らかでない限り、複数の指示対象を含む。「または」という用語は、概して内容に明らかな指定のない限り、「および／または」を含む意味で利用されることにも留意されたい。

【0020】

以下の用語は、本明細書で使用する時、別段の定めのない限り以下の意味を有する。

【0021】

「オキソ」は、=Oを指す。

【0022】

「カルボキシル」は、-COOHを指す。

【0023】

「アルキル」は、1～約10個の炭素原子、より好ましくは1～6個の炭素原子を有する、直鎖または分枝鎖の飽和炭化水素モノラジカルを指す。例として、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、2-メチル-1-プロピル、2-メチル-2-プロピル、2-メチル-1-ブチル、3-メチル-1-ブチル、2-メチル-3-ブチル、2,2-ジメチル-1-プロピル、2-メチル-1-ペンチル、3-メチル-1-ペンチル、4-メチル-1-ペンチル、2-メチル-2-ペンチル、3-メチル-2-ペンチル、4-メチル-2-ペンチル、2,2-ジメチル-1-ブチル、3,3-ジメチル-1-ブチル、2-エチル-1-ブチル、*n*-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、*n*-ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、tert-アミル、ヘキシル、ヘプチルやオクチルなどの長いアルキル基が挙げられるが、これらに限定されない。「C₁-C₆アルキル」や「C₁-6アルキル」などの数的範囲は、本明細書で現れる場合は常に、アルキル基が1個の炭素原子、2個の炭素原子、3個の炭素原子、4個の炭素原子、5個の炭素原子、または6個の炭素原子からなる場合があることを意味するが、数的範囲の指定がない

場合、本定義は用語「アルキル」の出現も包含する。いくつかの実施形態では、アルキルは、 C_{1-10} アルキルである。いくつかの実施形態では、アルキルは、 C_{1-6} アルキルである。いくつかの実施形態では、アルキルは、 C_{1-5} アルキルである。いくつかの実施形態では、アルキルは、 C_{1-4} アルキルである。いくつかの実施形態では、アルキルは、 C_{1-3} アルキルである。本明細書中に別段の定めのない限り、アルキル基は、例えば、オキソ、ハロゲン、アミノ、ニトリル、ニトロ、ヒドロキシル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシル、カルボキシレート、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリールなどにより任意選択で置換される場合がある。いくつかの実施形態では、アルキルは、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-COOH$ 、 $-COOMe$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、または $-NO_2$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アルキルは、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、または $-OMe$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アルキルはハロゲンにより任意選択で置換される。

10

【0024】

「アルケニル」は、1つまたは複数の炭素炭素二重結合と、2～約10個の炭素原子、より好ましくは2～約6個の炭素原子とを有する、直鎖または分枝鎖の炭化水素モノラジカルを指す。基は、二重結合ではシス配置またはトランス配置のいずれかにあってよく、両異性体を含むものと理解されたい。例として、エテニル ($-CH=CH_2$)、1-プロペニル ($-CH_2CH=CH_2$)、イソプロペニル [$-C(CH_3)=CH_2$]、ブテニル、1,3-ブタジエニルなどが挙げられるが、これらに限定されない。「 C_2-C_6 アルケニル」や「 C_2-6 アルケニル」などの数値範囲は、本明細書で現れる場合は常に、アルケニル基が、2個の炭素原子、3個の炭素原子、4個の炭素原子、5個の炭素原子、または6個の炭素原子からなる場合があることを意味するが、数値範囲の指定がない場合、本定義は用語「アルケニル」の出現も包含する。本明細書中に別段の定めのない限り、アルケニル基は、例えば、オキソ、ハロゲン、アミノ、ニトリル、ニトロ、ヒドロキシル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシル、カルボキシレート、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリールなどにより任意選択で置換される場合がある。いくつかの実施形態では、アルケニルは、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-COOH$ 、 $-COOMe$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、または $-NO_2$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アルケニルは、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、または $-OMe$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アルケニルは、ハロゲンにより任意選択で置換される。

20

30

【0025】

「アルキニル」は、1つまたは複数の炭素炭素三重結合と、2～約10個の炭素原子、より好ましくは2～約6個の炭素原子とを有する、直鎖または分枝鎖の炭化水素モノラジカルを指す。例として、エチニル、2-プロピニル、2-ブチニル、1,3-ブタジイニルなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。「 C_2-C_6 アルキニル」や「 C_2-6 アルキニル」などの数値範囲は、本明細書で現れる場合は常に、アルキニル基が、2個の炭素原子、3個の炭素原子、4個の炭素原子、5個の炭素原子、または6個の炭素原子からなる場合があることを意味するが、数値範囲の指定がない場合、本定義は用語「アルキニル」の出現も包含する。本明細書中に別段の定めのない限り、アルキニル基は、例えば、オキソ、ハロゲン、アミノ、ニトリル、ニトロ、ヒドロキシル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシル、カルボキシレート、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリールなどにより任意選択で置換される場合がある。いくつかの実施形態では、アルキニルは、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $COOH$ 、 $-COOMe$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、または $-NO_2$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アルキニルは、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、または $-OMe$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アルキニルは、ハロゲンにより任意選択で置換される。

40

【0026】

「アルキレン」は、直鎖または分枝鎖の二価炭化水素鎖を表す。本明細書中に別段の定

50

めのない限り、アルキレン基は、例えば、オキソ、ハロゲン、アミノ、ニトリル、ニトロ、ヒドロキシル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシル、カルボキシレート、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリールなどにより任意選択で置換される場合がある。いくつかの実施形態では、アルキレンは、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-COOH$ 、 $-COOMe$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、または $-NO_2$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アルキレンは、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、または $-OMe$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アルキレンは、ハロゲンにより任意選択で置換される。

【0027】

「アルコキシ」は、 R^a が定義されるとおりのアルキルラジカルである式 $-OR^a$ のラジカルを指す。本明細書中に別段の定めのない限り、アルコキシ基は、例えば、オキソ、ハロゲン、アミノ、ニトリル、ニトロ、ヒドロキシル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシル、カルボキシレート、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリールなどにより任意選択で置換される場合がある。いくつかの実施形態では、アルコキシは、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-COOH$ 、 $-COOMe$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、または $-NO_2$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アルコキシは、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、または $-OMe$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アルコキシは、ハロゲンにより任意選択で置換される。

【0028】

「アリール」は、6～30個の炭素原子と少なくとも1個の芳香環を含む、炭化水素環系由来のラジカルを指す。アリールラジカルは、単環式、二環式、三環式、または四環式の環系の場合があり、これは、縮合環系（シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルの環とともに縮合されると、アリールは芳香環原子を介して結合する）または架橋環系を含む場合がある。いくつかの実施形態では、アリールは、6～10員アリールである。いくつかの実施形態では、アリールは、6員アリール（フェニル）である。アリールラジカルとして、アントリレン、ナフチレン、フェナントリレン、アントラセン、アズレン、ベンゼン、クリセン、フルオランテン、フルオレン、*a*s-インダセン、*s*-インダセン、インダン、インデン、ナフタレン、フェナレン、フェナントレン、プレイアデン、ピレン、トリフェニレンの炭化水素環系由来のアリールラジカルが挙げられるが、これらに限定されない。本明細書中に別段の定めのない限り、アリールは、例えば、ハロゲン、アミノ、ニトリル、ニトロ、ヒドロキシル、アルキル、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、カルボキシル、カルボキシレート、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリールなどにより任意選択で置換される場合がある。いくつかの実施形態では、アリールは、ハロゲン、メチル、エチル、 $-CN$ 、 $-COOH$ 、 $-COOMe$ 、 $-CF_3$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、または $-NO_2$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アリールは、ハロゲン、メチル、エチル、 $-CN$ 、 $-CF_3$ 、 $-OH$ 、または $-OMe$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、アリールは、ハロゲンにより任意選択で置換される。

【0029】

「シクロアルキル」は、部分的もしくは完全に飽和した単環式または多環式の環状炭素を指し、この環状炭素は、縮合環系（アリールまたはヘテロアリール環と縮合されると、シクロアルキルは非芳香環原子を介して結合される）または架橋環系を含む場合がある。いくつかの実施形態では、シクロアルキルは完全に飽和している。代表的なシクロアルキルとして、3～15個の炭素原子（ C_3-C_{15} シクロアルキルまたは C_3-C_{15} シクロアルケニル）、3～10個の炭素原子（ C_3-C_{10} シクロアルキルまたは C_3-C_{10} シクロアルケニル）、3～8個の炭素原子（ C_3-C_8 シクロアルキルまたは C_3-C_8 シクロアルケニル）、3～6個の炭素原子（ C_3-C_6 シクロアルキルまたは C_3-C_6 シクロアルケニル）、3～5個の炭素原子（ C_3-C_5 シクロアルキルまたは C_3-C_5 シクロアルケニル）、または3～4個の炭素原子（ C_3-C_4 シクロアルキルまたは C_3-C_4 シクロアルケニル）が挙げられるが、これらに限定されない。いくつかの実施形

10

20

30

40

50

態では、シクロアルキルは、3～10員シクロアルキルまたは3～10員シクロアルケニルである。いくつかの実施形態では、シクロアルキルは、3～6員シクロアルキルまたは3～6員シクロアルケニルである。いくつかの実施形態では、シクロアルキルは、5～6員シクロアルキルまたは5～6員シクロアルケニルである。単環式シクロアルキルとして、例えばシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチルが挙げられるが、これらに限定されない。多環式シクロアルキルとして、例えば、アダマンチル、ノルボルニル、デカリニル (decalinyl)、ビシクロ [3.3.0] オクタン、ビシクロ [4.3.0] ノナン、シス-デカリン、トランス-デカリン、ビシクロ [2.1.1] ヘキサン、ビシクロ [2.2.1] ヘプタン、ビシクロ [2.2.2] オクタン、ビシクロ [3.2.2] ノナン、およびビシクロ [3.3.2] デカン、ならびに7,7-ジメチル-ビシクロ [2.2.1] ヘプタニルが挙げられる。部分的に飽和したシクロアルキルとして、例えば、シクロペンテニル、シクロヘキセニル、シクロヘプテニル、シクロオクテニルが挙げられる。本明細書中に別段の定めのない限り、シクロアルキルは、例えば、オキソ、ハロゲン、アミノ、ニトリル、ニトロ、ヒドロキシル、アルキル、アルケニル、アルキニル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシル、カルボキシレート、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリールなどにより任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、シクロアルキルは、オキソ、ハロゲン、メチル、エチル、-CN、COOH、-COOMe、-CF₃、-OH、-OMe、-NH₂、または-NO₂により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、シクロアルキルは、オキソ、ハロゲン、メチル、エチル、-CN、-CF₃、-OH、-OMe、-NH₂、または-OMeにより任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、シクロアルキルは、ハロゲンにより任意選択で置換される。

10

20

30

40

50

【0030】

「ハロ」または「ハロゲン」は、ブロモ、クロロ、フルオロ、またはヨードを指す。いくつかの実施形態では、ハロゲンは、フルオロまたはクロロである。いくつかの実施形態では、ハロゲンはフルオロである。

【0031】

「ハロアルキル」は、上記で定義される1つまたは複数のハロラジカル、例えば、トリフルオロメチル、ジフルオロメチル、フルオロメチル、トリクロロメチル、2,2,2-トリフルオロエチル、1,2-ジフルオロエチル、3-ブロモ-2-フルオロプロピル、1,2-ジブロモエチルなどにより置換される、上記で定義されるアルキルラジカルを指す。

【0032】

「ヒドロキシアルキル」は、1つまたは複数のヒドロキシルにより置換される、上記に定義されるアルキルラジカルを指す。いくつかの実施形態では、アルキルは、1つのヒドロキシルで置換される。いくつかの実施形態では、アルキルは、1、2、または3つのヒドロキシルで置換される。ヒドロキシアルキルとして、例えば、ヒドロキシメチル、ヒドロキシエチル、ヒドロキシプロピル、ヒドロキシブチル、またはヒドロキシペンチルが挙げられる。いくつかの実施形態では、ヒドロキシアルキルは、ヒドロキシメチルである。

【0033】

「アミノアルキル」は、1つまたは複数のアミンにより置換される、上記に定義されるアルキルラジカルを指す。いくつかの実施形態では、アルキルは、1つのアミンで置換される。いくつかの実施形態では、アルキルは、1、2、または3つのアミンで置換される。アミノアルキルとして、例えば、アミノメチル、アミノエチル、アミノプロピル、アミノブチル、またはアミノペンチルが挙げられる。いくつかの実施形態では、アミノアルキルは、アミノメチルである。

【0034】

「ジューテロアルキル」は、1つまたは複数の重水素により置換される、上記に定義されるアルキルラジカルを指す。いくつかの実施形態では、アルキルは、1つの重水素で置換される。いくつかの実施形態では、アルキルは、1、2、または3つの重水素で置換さ

れる。いくつかの実施形態では、アルキルは、1、2、3、4、5、または6つの重水素で置換される。ジューテロアルキルとして、例えば、 CD_3 、 CH_2D 、 CHD_2 、 CH_2CD_3 、 CD_2CD_3 、 $CHDCD_3$ 、 CH_2CH_2D 、 CH_2CHD_2 が挙げられる。いくつかの実施形態では、ジューテロアルキルは、 CD_3 である。

【0035】

「ヘテロシクロアルキル」は、2～23個の炭素原子と、窒素、酸素、リン、および硫黄からなる群から選択される1～8個のヘテロ原子とを含む、部分的または完全に飽和した3～24員の環ラジカルを指す。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは完全に飽和している。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、窒素、酸素、および硫黄からなる群から選択される1～3個のヘテロ原子を含む。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、窒素および酸素からなる群から選択される1～3個のヘテロ原子を含む。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、1～3個の窒素を含む。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、1または2個の窒素を含む。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、1個の窒素を含む。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、1個の窒素と1個の酸素を含む。本明細書で別段の定めのない限り、ヘテロシクロアルキルラジカルは、単環式、二環式、三環式、または四環式の環系の場合があり、この環系は、縮合環系（アリールまたはヘテロアリール環と縮合されると、ヘテロシクロアルキルは非芳香環原子を介して結合される）または架橋環系を含む場合があり、ヘテロシクロアルキルラジカル中の窒素、炭素、または硫黄の原子は、任意選択で酸化される場合があり、窒素原子は任意選択で四級化される場合がある。代表的なヘテロシクロアルキルとして、2～15個の炭素原子（ C_2-C_{15} ヘテロシクロアルキルまたは C_2-C_{15} ヘテロシクロアルケニル）、2～10個の炭素原子（ C_2-C_{10} ヘテロシクロアルキルまたは C_2-C_{10} ヘテロシクロアルケニル）、2～8個の炭素原子（ C_2-C_8 ヘテロシクロアルキルまたは C_2-C_8 ヘテロシクロアルケニル）、2～7個の炭素原子（ C_2-C_7 ヘテロシクロアルキルまたは C_2-C_7 ヘテロシクロアルケニル）、2～6個の炭素原子（ C_2-C_6 ヘテロシクロアルキルまたは C_2-C_6 ヘテロシクロアルケニル）、2～5個の炭素原子（ C_2-C_5 ヘテロシクロアルキルまたは C_2-C_5 ヘテロシクロアルケニル）、または2～4個の炭素原子（ C_2-C_4 ヘテロシクロアルキルまたは C_2-C_4 ヘテロシクロアルケニル）を有するヘテロシクロアルキルが挙げられるが、これらに限定されない。かかるヘテロシクロアルキルラジカルの例として、アジリジニル、アゼチジニル、オキセタニル、ジオキソラニル、チエニル [1, 3] ジチアニル、デカヒドロイソキノリル、イミダゾリニル、イミダゾリジニル、イソチアゾリジニル、イソキサゾリジニル、モルホリニル、オクタヒドロインドリル、オクタヒドロイソインドリル、2-オキソピペラジニル、2-オキソピペリジニル、2-オキソピロリジニル、オキサゾリジニル、ピペリジニル、ピペラジニル、4-ピペリドニル（*piperydonyl*）、ピロリジニル、ピラゾリジニル、キヌクリジニル、チアゾリジニル、テトラヒドロフリル、トリチアニル、テトラヒドロピラニル、チオモルホリニル、チアモルホリニル（*thiamorpholiny l*）、1-オキソ-チオモルホリニル、1, 1-ジオキソ-チオモルホリニル、1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-1-イル、3-オキソ-1, 3-ジヒドロイソベンゾフラン-1-イル、メチル-2-オキソ-1, 3-ジオキソール-4-イル、2-オキソ-1, 3-ジオキソール-4-イルが挙げられるが、これらに限定されるものではない。「ヘテロシクロアルキル」という用語として、単糖類、二糖類、オリゴ糖を含むがこれらに限定されない炭水化物の環状形態すべても挙げられる。他に明記されない限り、ヘテロシクロアルキルは、環に2～10個の炭素を有する。ヘテロシクロアルキル中の炭素原子数は、ヘテロシクロアルキル中の炭素原子数を表すとき、ヘテロシクロアルキルを構築する原子（ヘテロ原子を含む）（すなわち、ヘテロシクロアルキル環の骨格原子）の総数と同じでないことが理解される。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、3～8員ヘテロシクロアルキルまたは3～8員ヘテロシクロアルケニルである。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、3～7員ヘテロシクロアルキルまたは3～7員ヘテロシクロアルケニルである。いくつかの実施形態

10

20

30

40

50

では、ヘテロシクロアルキルは、3～6員ヘテロシクロアルキルまたは3～6員ヘテロシクロアルケニルである。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、4～6員ヘテロシクロアルキルまたは4～6員ヘテロシクロアルケニルである。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、5～6員ヘテロシクロアルキルまたは5～6員ヘテロシクロアルケニルである。本明細書中に別段の定めのない限り、ヘテロシクロアルキルは、後述のように、例えば、オキソ、ハロゲン、アミノ、ニトリル、ニトロ、ヒドロキシル、アルキル、アルケニル、アルキニル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシル、カルボキシレート、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリールなどにより任意選択で置換される場合がある。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、オキソ、ハロゲン、メチル、エチル、 $-CN$ 、 $-COOH$ 、 $-COOMe$ 、 $-CF_3$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、または $-NO_2$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、ハロゲン、メチル、エチル、 $-CN$ 、 $-CF_3$ 、 $-OH$ 、または $-OMe$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、ヘテロシクロアルキルは、ハロゲンにより任意選択で置換される。

10

【0036】

「ヘテロアリール」は、1～13個の炭素原子と、窒素、酸素、リン、および硫黄から成る群から選択される1～6個のヘテロ原子と、少なくとも1つの芳香環とを含む5～14員環の環系ラジカルを指す。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、窒素、酸素、および硫黄からなる群から選択される1～3個のヘテロ原子を含む。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、窒素および酸素からなる群から選択される1～3個のヘテロ原子を含む。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、1～3個の窒素を含む。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、1または2個の窒素を含む。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、1個の窒素を含む。ヘテロアリールラジカルは、単環式、二環式、三環式、または四環式の環系の場合があり、これは、縮合環系（シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルの環と縮合されると、ヘテロアリールは芳香環原子を介して結合する）または架橋環系を含む場合があり、ヘテロアリールラジカル中の窒素、炭素、または硫黄の原子は、任意選択で酸化される場合があり、窒素原子は任意選択で四級化される場合がある。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、5～10員ヘテロアリールである。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、5～6員ヘテロアリールである。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは6員ヘテロアリールである。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは5員ヘテロアリールである。例として、アゼピニル、アクリジニル、ベンズイミダゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンズインドリル、ベンゾジオキサリル、ベンゾフラニル、ベンゾオキサゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾチアジアゾリル、ベンゾ[b][1,4]ジオキセピニル、1,4-ベンゾジオキサニル、ベンゾナフトフラニル、ベンゾオキサゾリル、ベンゾジオキサリル、ベンゾジオキシニル、ベンゾピラニル、ベンゾピラノニル、ベンゾフラニル、ベンゾフラノニル、ベンゾチエニル、ベンゾチオフエニル、ベンゾトリアゾリル、ベンゾ[4,6]イミダゾ[1,2-a]ピリジニル、カルバゾリル、シンノリニル、ジベンゾフラニル、ジベンゾチオフエニル、フラニル、フラノニル、イソチアゾリル、イミダゾリル、インダゾリル、インドリル、インダゾリル、イソインドリル、インドリニル、イソインドリニル、イソキノリル、インドリジニル、イソオキサゾリル、ナフチリジニル、オキサジアゾリル、2-オキソアゼピニル、オキサゾリル、オキシラニル、1-オキシドピリジニル、1-オキシドピリミジニル、1-オキシドピラジニル、1-オキシドピリダジニル、1-フェニル-1H-ピロリル、フェナジニル、フェノチアジニル、フェノキサジニル、フタラジニル、プテリジニル、プリニル、ピロリル、ピラゾリル、ピリジニル、ピラジニル、ピリミジニル、ピリダジニル、キナゾリニル、キノキサリニル、キノリニル、キヌクリジニル、イソキノリニル、テトラヒドロキノリニル、チアゾリル、チアジアゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、トリアジニル、チオフエニル（すなわち、チエニル）が挙げられるが、これらに限定されない。本明細書中に別段の定めのない限り、ヘテロアリールは、例えば、ハロゲン、アミノ、ニトリル、ニトロ、ヒドロキシル、アルキル、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、カルボキシ

20

30

40

50

ル、カルボキシレート、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリールなどにより任意選択で置換される場合がある。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、メチル、エチル、 $-CN$ 、 $COOH$ 、 $-COOMe$ 、 $-CF_3$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、または $-NO_2$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、ハロゲン、メチル、エチル、 $-CN$ 、 $-CF_3$ 、 $-OH$ 、または $-OMe$ により任意選択で置換される。いくつかの実施形態では、ヘテロアリールは、ハロゲンにより任意選択で置換される。

【0037】

「任意選択の」または「任意選択で」という用語は、後に記載される事象または状況が生じることもあれば、生じないこともあること、および、この記載が、前述の事象または状況が生じる例と、それらが生じない例とを含んでいることを意味する。例えば、「任意選択で置換したアルキル」は、上記で定義されるような「アルキル」または「置換したアルキル」を意味する。さらに、任意選択で置換した基は、置換されていない（例えば、 $-CH_2CH_3$ ）か、完全に置換される（例えば、 $-CF_2CF_3$ ）か、単置換である（例えば、 $-CH_2CH_2F$ ）か、または完全な置換と単置換との間のいずれかにあるレベルで置換される（例えば、 $-CH_2CHF_2$ 、 $-CH_2CF_3$ 、 $-CF_2CH_3$ 、 $-CFHCH_2F$ など）場合がある。1つまたは複数の置換基を含有するいずれかの基に関して、このような基は、立体的に非実用的な、および／または合成的に実行不可能ないずれかの置換もしくは置換パターン（例えば、置換されたアルキルは、任意選択で置換されたシクロアルキル基を含み、このシクロアルキル基は、任意選択で置換されたアルキル基を無限に含む可能性があるものとして定義される）を導入することを意図していないことが、当業者により理解されるであろう。ゆえに、記載される任意の置換基は通常、約1,000ダルトン、より典型的には最大約500ダルトンの最大分子量を有していると理解されたい。

【0038】

「有効量」または「治療有効量」は、単一用量、または一連の用量の一部として、哺乳動物対象に投与される化合物の量を指し、この量は所望の治療効果をもたらすのに有効である。

【0039】

個体（例えばヒトなどの哺乳動物）または細胞の「処置」は、個体または細胞の自然経過を変えようとする際に使用される、あらゆる種類の介入である。いくつかの実施形態では、処置は、病理学的事象の開始後または原因微生物との接触後の医薬組成物の投与を含み、かつ、疾病（例えば、疾病は悪化しない）の安定化または疾病の緩和を含む。他の実施形態では、処置はまた、予防処置（例えば、個体が肝疾患、例えばNAFLDを患っている疑いがあるときの、本明細書に記載の組成物の投与）を含む。

【0040】

「相乗作用」または「相乗作用する」は、同じ用量における各成分の効果の相加より大きい、組合せの効果を指す。

【0041】

「HSD17B13」は、ヒドロキシステロイド17- β デヒドロゲナーゼ13を意味し、HSD17B13の核酸を指す。例えば、いくつかの実施形態では、HSD17B13は、HSD17B13をコードするDNA配列、HSD17B13をコードするDNAから転写されるRNA配列（イントロンおよびエクソンを含むゲノムDNAを備える）を含む。HSD17B13はまた、DNA配列および／またはRNA配列によりコードされる、HSD17B13のアミノ酸配列を指す可能性もある（タンパク質分子の2次構造または3次構造を含む場合がある）。この標的は、上位または下位のいずれかの場合において言及される場合がある。

【0042】

化合物

本明細書には、肝疾患の処置に有用な、式（I）、（II）、もしくは（III）の化


合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が記載される。
いくつかの実施形態では、肝疾患は N A F L D である。

【0043】

本明細書には、式 (I) :

【0044】

【化6】



式 (I)

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、
式中、

R^1 はハロゲンであり、

R^2 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、または3つの R^{2a} により任意選択で置換され、

R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

n は、1~3 であり、

R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、

またはヘテロアリールであり、

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

10

R^6 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換され、

20

R^{6a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-SH$ 、 $-SR^{20}$ 、 $-S(=O)R^{20}$ 、 $-S(=O)_2R^{20}$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-NHS(=O)_2R^{20}$ 、 $-S(=O)_2NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-OC(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-OC(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-OC(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-NR^{21}C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-NR^{21}C(=O)R^{20}$ 、 $-NR^{21}C(=O)OR^{21}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

30

R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

40

R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、また

50

は C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

あるいは R^{22} と R^{23} は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

30

40

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=$

50

O) Me、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアリル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアリル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。


10

【0045】

本明細書には、式(I)：

【0046】

【化7】



20

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^1 はハロゲンであり、

30

R^2 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアリル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、または3つの R^{2a} により任意選択で置換され、

R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアリル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

40

R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアリル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

50

n は、1～3 であり、

R⁴ は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a、-SH、-SR^a、-S(=O)R^a、-S(=O)₂R^a、-NO₂、-NR^cR^d、-NHS(=O)₂R^a、-S(=O)₂NR^cR^d、-C(=O)R^a、-OC(=O)R^a、-C(=O)OR^b、-OC(=O)OR^b、-C(=O)NR^cR^d、-OC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)R^a、-NR^bC(=O)OR^b、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

10

あるいは、2つのR⁴は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁-C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1 または 2 であり、

R⁵ と R⁷ は、独立して、水素、-S(=O)R^a、-S(=O)₂R^a、-S(=O)₂NR^cR^d、-C(=O)R^a、-C(=O)OR^b、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

20

R⁶ は、水素、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁-C₆アルキル(シクロアルキル)、C₁-C₆アルキル(ヘテロシクロアルキル)、C₁-C₆アルキル(アリール)、またはC₁-C₆アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換され、

30

R^{6a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR²⁰、-SH、-SR²⁰、-S(=O)R²⁰、-S(=O)₂R²⁰、-NO₂、-NR²²R²³、-NHS(=O)₂R²⁰、-S(=O)₂NR²²R²³、-S(=O)₂NR²¹C(=O)R²⁰、-C(=O)R²⁰、-OC(=O)R²⁰、-C(=O)OR²¹、-OC(=O)OR²¹、-C(=O)NR²²R²³、-OC(=O)NR²²R²³、-NR²¹C(=O)NR²²R²³、-NR²¹C(=O)R²⁰、-NR²¹C(=O)OR²¹、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

40

R²⁰ は、それぞれ独立して、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁

50

—C₆ アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{2 1}は、それぞれ独立して、水素、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、C₁—C₆アミノアルキル、C₂—C₆アルケニル、C₂—C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、—CN、—OH、—OMe、—S(=O)Me、—S(=O)₂Me、—NH₂、—S(=O)₂NH₂、—C(=O)Me、—C(=O)OH、—C(=O)OMe、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

R^{2 2}とR^{2 3}は、それぞれ独立して、水素、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、C₁—C₆アミノアルキル、C₂—C₆アルケニル、C₂—C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、—CN、—OH、—OMe、—S(=O)Me、—S(=O)₂Me、—NH₂、—S(=O)₂NH₂、—C(=O)Me、—C(=O)OH、—C(=O)OMe、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

あるいはR^{2 2}とR^{2 3}は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、—CN、—OH、—OMe、—S(=O)Me、—S(=O)₂Me、—NH₂、—S(=O)₂NH₂、—C(=O)Me、—C(=O)OH、—C(=O)OMe、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C₆アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^aは、それぞれ独立して、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、C₁—C₆アミノアルキル、C₂—C₆アルケニル、C₂—C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁—C₆アルキル(シクロアルキル)、C₁—C₆アルキル(ヘテロシクロアルキル)、C₁—C₆アルキル(アリール)、またはC₁—C₆アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、—CN、—OH、—OMe、—S(=O)Me、—S(=O)₂Me、—NH₂、—S(=O)₂NH₂、—C(=O)Me、—C(=O)OH、—C(=O)OMe、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

30

R^bは、それぞれ独立して、水素、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、C₁—C₆アミノアルキル、C₂—C₆アルケニル、C₂—C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁—C₆アルキル(シクロアルキル)、C₁—C₆アルキル(ヘテロシクロアルキル)、C₁—C₆アルキル(アリール)、またはC₁—C₆アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、—CN、—OH、—OMe、—S(=O)Me、—S(=O)₂Me、—NH₂、—S(=O)₂NH₂、—C(=O)Me、—C(=O)OH、—C(=O)OMe、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C

40

50

6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、

化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。

20

【0047】

式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^1 は、クロロまたはフルオロである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^1 はクロロである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^1 はフルオロである。

【0048】

式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルであり、アルキルは、1、2、または3つの R^{2a} により任意選択で置換される。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルであり、アルキルは、1、2、または3つの R^{2a} により任意選択で置換される。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、または C_1-C_6 アルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は水素である。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は C_1-C_6 アルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は $-P(=O)OH_2$ である。

30

40

【0049】

式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1または2つの R^{2a} により任意選択で置換される。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは

50

、1つの R^{2a} により任意選択で置換される。

【0050】

式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、または $-NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキルである。

10

【0051】

式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。

【0052】

式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、またはヘテロシクロアルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 はそれぞれ水素である。

20

30

【0053】

式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 n は、1または2である。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 n は1である。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 n は2である。

40

【0054】

式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(I)の化合物、

50

またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、またはシクロアルキル、ヘテロシクロアルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ水素またはハロゲンである。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 はそれぞれ水素である。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 はそれぞれハロゲンである。

10

20

【0055】

式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(I)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つのハロゲン、-

30

40

50

【 0 0 5 6 】

【 0 0 5 7 】

10

【 0 0 5 8 】

20

【 0 0 5 9 】

30

40

50

、 R^6 は、 C_1-C_6 アルキル（アリール）であり、アルキルとアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換される。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、 C_2 アルキル（アリール）であり、アルキルとアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換される。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、 C_2 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキルとアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換される。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換される C_1-C_6 アルキルである。

10

【0060】

式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1または2つの R^{6a} により任意選択で置換される。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1つの R^{6a} により任意選択で置換される。

【0061】

式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{6a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{6a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{6a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{6a} は、それぞれ独立して、ハロゲン、 $-OH$ 、または $-OR^{20}$ である。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{6a} は、それぞれ独立して、ハロゲン、 $-OH$ 、または $-OR^{20}$ である。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{6a} はそれぞれ独立して $-OR^{20}$ である。

20

30

40

【0062】

式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C

50

10

20

30

40

50

【0064】


式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルであり、アルキルは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ヒドロキシアルキルである。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して水素または C_1-C_6 アルキルである。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して C_1-C_6 アルキルである。式（I）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ水素である。

【0065】

また本明細書には、式（II）：

【0066】

【化8】



式（II）

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)$

) R^a 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

p は、1～4であり、

R^9 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^{10} は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換され、

R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-SH$ 、 $-SR^{20}$ 、 $-S(=O)R^{20}$ 、 $-S(=O)_2R^{20}$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-NHS(=O)_2R^{20}$ 、 $-S(=O)_2NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-OC(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-OC(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-OC(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-NR^{21}C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-NR^{21}C(=O)R^{20}$ 、 $-NR^{21}C(=O)OR^{21}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリール

10

20

30

40

50

であり、

R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

30

あるいは R^{22} と R^{23} は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル (シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル (ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル (アリール)、または C_1-C_6 アルキル (ヘテロアリール) であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

40

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、

50

C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、C₁ - C₆ アミノアルキル、C₂ - C₆ アルケニル、C₂ - C₆ アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁ - C₆ アルキル（シクロアルキル）、C₁ - C₆ アルキル（ヘテロシクロアルキル）、C₁ - C₆ アルキル（アリール）、または C₁ - C₆ アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、または C₁ - C₆ アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

R^cとR^dは、それぞれ独立して、水素、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、C₁ - C₆ アミノアルキル、C₂ - C₆ アルケニル、C₂ - C₆ アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁ - C₆ アルキル（シクロアルキル）、C₁ - C₆ アルキル（ヘテロシクロアルキル）、C₁ - C₆ アルキル（アリール）、または C₁ - C₆ アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、または C₁ - C₆ アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

あるいはR^cとR^dは、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、または C₁ - C₆ アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、

化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。


30

【0067】

また本明細書には、式 (II) :

【0068】

【化9】



式 (II)

40

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R⁴は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a、

50

$-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^c\text{R}^d$ 、
 $-\text{NHS}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-\text{S}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^a$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NHS}(\text{=O})_2\text{R}^a$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{NR}^c\text{R}^d$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{R}^a$ 、 $-\text{NR}^b\text{C}(\text{=O})\text{OR}^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

p は、1～4であり、

R^9 は、水素、 $-\text{P}(\text{=O})\text{OH}_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^{10} は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換され、

R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^{20}$ 、 $-\text{OP}(\text{=O})\text{OH}_2$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{SR}^{20}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^{20}$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NHS}(\text{=O})_2\text{R}^{20}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{S}(\text{=O})_2\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{OR}^{21}$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{OR}^{21}$ 、 $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{OC}(\text{=O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{NR}^{22}\text{R}^{23}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{R}^{20}$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{C}(\text{=O})\text{OR}^{21}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、

C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、C₁ - C₆ アミノアルキル、C₂ - C₆ アルケニル、C₂ - C₆ アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R²⁰ は、それぞれ独立して、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、C₁ - C₆ アミノアルキル、C₂ - C₆ アルケニル、C₂ - C₆ アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、またはC₁ - C₆ アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

R²¹ は、それぞれ独立して、水素、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、C₁ - C₆ アミノアルキル、C₂ - C₆ アルケニル、C₂ - C₆ アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、またはC₁ - C₆ アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

R²² と R²³ は、それぞれ独立して、水素、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、C₁ - C₆ アミノアルキル、C₂ - C₆ アルケニル、C₂ - C₆ アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、またはC₁ - C₆ アミノアルキルにより任意選択で置換され、

30

あるいはR²² と R²³ は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、またはC₁ - C₆ アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^a は、それぞれ独立して、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、C₁ - C₆ アミノアルキル、C₂ - C₆ アルケニル、C₂ - C₆ アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁ - C₆ アルキル (シクロアルキル)、C₁ - C₆ アルキル (ヘテロシクロアルキル)、C₁ - C₆ アルキル (アリール)、またはC₁ - C₆ アルキル (ヘテロアリール) であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁ - C₆ アルキル、C₁ - C₆ ジューテロアルキル、C₁ - C₆ ハロアルキル、C₁ - C₆ ヒドロキシアルキル、またはC₁ - C₆ アミ

40

50

ノアルキルにより任意選択で置換され、

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。

30

【0069】

式 (II) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^9 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式 (II) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^9 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、または C_1-C_6 アルキルである。式 (II) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^9 は、水素または C_1-C_6 アルキルである。式 (II) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^9 は C_1-C_6 アルキルである。

40

【0070】

式 (II) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式 (II) の化合

50

物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 はそれぞれ水素である。

10

【0071】

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p は、1、2、または3である。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p は、1または2である。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p は1である。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p は2である。

【0072】

20

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、またはシクロアルキル、ヘテロシクロアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ水素またはハロゲンである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 はそれぞれ水素である。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 はそれぞれハロゲンである。

30

40

【0073】

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシ

50

クロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、また C_1-C_6 アルキルにより任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つのハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、または C_1-C_6 アルキルにより任意選択で置換される。

10

20

【0074】

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 m は1である。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 m は2である。

30

【0075】

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素または C_1-C_6 アルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は水素である。

40

【0076】

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許

50

容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素または C_1-C_6 アルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は水素である。

【0077】

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} は、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} は、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} は、シクロアルキル、アリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、または C_1-C_6 アルキル(アリール)であり、アルキル、シクロアルキル、およびアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかのものは、 R^{10} は、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} は、アリールまたはヘテロアリールであり、アリールとヘテロアリールは、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換されるアリールである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換されるフェニルである。

【0078】

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1または2つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1つの R^{10a} により任意選択で置換される。

【0079】

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、も

しくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立してハロゲンまたは $-OH$ である。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立して、ハロゲン、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立して、ハロゲン、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、または C_1-C_6 アルキルである。

10

20

30

40

50

【0080】

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルであり、アルキルは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、または C_1-C_6 ヒドロキシアルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} はそれぞれ独立して C_1-C_6 アルキルである。

【0081】

式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オ

20

30

50

体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して水素または C_1-C_6 アルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して C_1-C_6 アルキルである。式(II)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ水素である。


【0083】

また本明細書には、式(III)：

【0084】

【化10】

10



式(III)

20

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

$R^{3'}$ は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

30

n' は、1~4であり、

R^4 は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

40

R^4' は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_2-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 ア

50

ルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

あるいは、 R^4 と R^4' は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

p' は、1～5であり、

R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミ

ノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

10

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。


20

【0085】

また本明細書には、式(III)：

【0086】

【化11】



式(III)

30

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

$R^{3'}$ は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-S(=O)_2NR^bC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

40

n' は、1~4であり、

R^4 は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)$

50

OR^b、-OC(=O)OR^b、-C(=O)NR^cR^d、-OC(=O)NR^cR^d、
-NR^bC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)R^a、-NR^bC(=O)OR^b、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆
ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールで
あり、

R⁴は、水素、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a、-SH、-SR^a、
-S(=O)R^a、-S(=O)₂R^a、-NO₂、-NR^cR^d、-NHS(=O)₂R^a、
-S(=O)₂NR^cR^d、-C(=O)R^a、-OC(=O)R^a、-C(=O)
OR^b、-OC(=O)OR^b、-C(=O)NR^cR^d、-OC(=O)NR^cR^d、
-NR^bC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)R^a、-NR^bC(=O)OR^b、C₂-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆
ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールで
あり、

10

あるいは、R⁴とR⁴は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、
アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ア
リール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、
-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(
=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁-C₆
アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒド
ロキシアルキル、またはC₁-C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

R⁵とR⁷は、独立して、水素、-S(=O)R^a、-S(=O)₂R^a、-S(
=O)₂NR^cR^d、-C(=O)R^a、-C(=O)OR^b、C₁-C₆アルキル、C₁-
C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-
C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキ
ル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R⁸は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a
、-OP(=O)OH₂、-SH、-SR^a、-S(=O)R^a、-S(=O)₂R^a、
-NO₂、-NR^cR^d、-NHS(=O)₂R^a、-S(=O)₂NR^cR^d、-S(
=O)₂NR^bC(=O)R^a、-C(=O)R^a、-OC(=O)R^a、-C(=O)O
R^b、-OC(=O)OR^b、-C(=O)NR^cR^d、-OC(=O)NR^cR^d、-
NR^bC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)R^a、-NR^bC(=O)OR^b、C₁-
C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆
ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アル
キニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールで
あり、

30

p'は、1~5であり、

R^aは、それぞれ独立して、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-
C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、
C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル
、アリール、ヘテロアリール、C₁-C₆アルキル(シクロアルキル)、C₁-C₆アル
キル(ヘテロシクロアルキル)、C₁-C₆アルキル(アリール)、またはC₁-C₆アル
キル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル
、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、
2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)
)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-
C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ジューテロアル
キル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁-C₆アミ
ノアルキルにより任意選択で置換され、

40

50

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。

【0087】

式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、 $-OH$ 、または C_1-C_6 アルキルである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、も

しくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立してハロゲンまたは $-OH$ である。

【0088】

式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 n' は、1、2、または3である。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 n' は、1または2である。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 n' は1である。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 n' は2である。

10

【0089】

式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_2-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_2-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、またはシクロアルキル、ヘテロシクロアルキルである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_2-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_2-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素、ハロゲン、または C_2-C_6 アルキルである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素またはハロゲンである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は水素である。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 はハロゲンである。

20

30

【0090】

式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、またはシクロアルキル、ヘテロシクロアルキルである。式 (III) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR$

40

50

$^c R^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は水素である。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 はハロゲンである。

10

【0091】

式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素または C_1-C_6 アルキルである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は水素である。

20

【0092】

式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素または C_1-C_6 アルキルである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は水素である。

30

【0093】

式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(ⅠⅠⅠ)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル

40

50

、または $C_1 - C_6$ ジューテロアルキルである。式 (I I I) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $C_1 - C_6$ アルキル、または $C_1 - C_6$ ハロアルキルである。式 (I I I) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または $-OR^a$ 、 $C_1 - C_6$ アルキルである。式 (I I I) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して $-OR^a$ である。

【0094】


式 (I I I) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p' は、1、2、または3である。式 (I I I) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p' は、1または2である。式 (I I I) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p' は2である。式 (I I) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p' は1である。

【0095】

また本明細書には、式 (I V) :

【0096】

【化12】



の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^1 はハロゲンであり、

R^2 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 $C_1 - C_6$ ハロアルキル、 $C_1 - C_6$ ジューテロアルキル、 $C_1 - C_6$ ヒドロキシアルキル、 $C_1 - C_6$ アミノアルキル、 $C_2 - C_6$ アルケニル、 $C_2 - C_6$ アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、または3つの R^{2a} により任意選択で置換され、

R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $C_1 - C_6$ アルキル、 $C_1 - C_6$ ハロアルキル、 $C_1 - C_6$ ジューテロアルキル、 $C_1 - C_6$ ヒドロキシアルキル、 $C_1 - C_6$ アミノアルキル、 $C_2 - C_6$ アルケニル、 $C_2 - C_6$ アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC$

(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)R^a、-NR^bC(=O)OR^b、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

nは、1～3であり、

R⁴は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR^a、-SH、-SR^a、-S(=O)R^a、-S(=O)₂R^a、-NO₂、-NR^cR^d、-NHS(=O)₂R^a、-S(=O)₂NR^cR^d、-C(=O)R^a、-OC(=O)R^a、-OC(=O)OR^b、-C(=O)NR^cR^d、-OC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)NR^cR^d、-NR^bC(=O)R^a、-NR^bC(=O)OR^b、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

10

あるいは、2つのR⁴は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、-CN、-OH、-OMe、-S(=O)Me、-S(=O)₂Me、-NH₂、-S(=O)₂NH₂、-C(=O)Me、-C(=O)OH、-C(=O)OMe、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁-C₆アミノアルキルにより任意選択で置換され、

20

mは、1または2であり、

R⁵とR⁷は、独立して、水素、-S(=O)R^a、-S(=O)₂R^a、-S(=O)₂NR^cR^d、-C(=O)R^a、-C(=O)OR^b、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R⁶は、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、C₁-C₆アルキル(シクロアルキル)、C₁-C₆アルキル(ヘテロシクロアルキル)、C₁-C₆アルキル(アリール)、またはC₁-C₆アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換され、

30

R^{6a}は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、-CN、-OH、-OR²⁰、-SH、-SR²⁰、-S(=O)R²⁰、-S(=O)₂R²⁰、-NO₂、-NR²²R²³、-NHS(=O)₂R²⁰、-S(=O)₂NR²²R²³、-C(=O)R²⁰、-OC(=O)R²⁰、-C(=O)OR²¹、-OC(=O)OR²¹、-C(=O)NR²²R²³、-OC(=O)NR²²R²³、-NR²¹C(=O)NR²²R²³、-NR²¹C(=O)R²⁰、-NR²¹C(=O)OR²¹、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

40

R²⁰は、それぞれ独立して、C₁-C₆アルキル、C₁-C₆ハロアルキル、C₁-C₆ジューテロアルキル、C₁-C₆ヒドロキシアルキル、C₁-C₆アミノアルキル、C₂-C₆アルケニル、C₂-C₆アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立

50

10

20

30

40

50

、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル（シクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（ヘテロシクロアルキル）、 C_1-C_6 アルキル（アリール）、または C_1-C_6 アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OMe}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{Me}$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{Me}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(=\text{O})\text{OMe}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成する、化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。

【0097】

式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^1 は、クロロまたはフルオロである。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^1 はクロロである。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^1 はフルオロである。

【0098】

式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は、水素、 $-\text{P}(=\text{O})\text{OH}_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルであり、アルキルは、1、2、または3つの R^{2a} により任意選択で置換される。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は、水素、 $-\text{P}(=\text{O})\text{OH}_2$ 、または C_1-C_6 ハロアルキルであり、アルキルは、1、2、または3つの R^{2a} により任意選択で置換される。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は、水素または $-\text{P}(=\text{O})\text{OH}_2$ である。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は水素である。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 は $-\text{P}(=\text{O})\text{OH}_2$ である。

【0099】

式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1または2つの R^{2a} により任意選択で置換される。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、

溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^2 のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1つの R^{2a} により任意選択で置換される。

【0100】

式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{2a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、または $-NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキルである。

10

【0101】

式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。

20

【0102】

式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、またはヘテロシクロアルキルである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジュートロアルキルである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^3 はそれぞれ水素である。

30

【0103】

式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 n は、1 または 2 である。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 n は 1 である。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 n は 2 である。

40

【0104】

式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジュートロアルキル、 C_1-C

50

C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、またはシクロアルキル、ヘテロシクロアルキルである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ水素またはハロゲンである。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 はそれぞれ水素である。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 はそれぞれハロゲンである。

10

20

【0105】

式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、また C_1-C_6 アルキルにより任意選択で置換される。式 (I V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの

30

40

50

実施形態では、2つの R^4 は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つのハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、または C_1-C_6 アルキルにより任意選択で置換される。

【0106】

式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 m は1である。式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 m は2である。

【0107】

式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素または C_1-C_6 アルキルである。式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は水素である。

【0108】

式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素または C_1-C_6 アルキルである。式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は水素である。

【0109】

式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換される。式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、 C_1-C_6 アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換される。式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{6a} により任意選択で置換される。式(I V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、 C_1-C_6 アルキル(アリール)または C_1

10

20

30

40

50

—C₆アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換される。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R⁶は、C₁—C₆アルキル（アリール）であり、アルキルとアリールは、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換される。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R⁶は、C₂アルキル（アリール）であり、アルキルとアリールは、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換される。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R⁶は、C₂アルキル（ヘテロアリール）であり、アルキルとアリールは、独立して1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換される。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R⁶は、1、2、または3つのR^{6a}により任意選択で置換されるC₁—C₆アルキルである。

10

【0110】

式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R⁶のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1または2つのR^{6a}により任意選択で置換される。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R⁶のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1つのR^{6a}により任意選択で置換される。

20

【0111】

式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R^{6a}は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、—CN、—OH、—OR²⁰、—NR²²R²³、—C(=O)R²⁰、—C(=O)OR²¹、—C(=O)NR²²R²³、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、C₁—C₆アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R^{6a}は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、—CN、—OH、—OR²⁰、—NR²²R²³、—C(=O)R²⁰、—C(=O)OR²¹、—C(=O)NR²²R²³、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁—C₆アミノアルキルである。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R^{6a}は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、—CN、—OH、—OR²⁰、—NR²²R²³、C₁—C₆アルキル、またはC₁—C₆ハロアルキルである。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R^{6a}は、それぞれ独立して、ハロゲン、—OH、または—OR²⁰である。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R^{6a}は、それぞれ独立して、ハロゲン、—OH、または—OR²⁰である。式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R^{6a}はそれぞれ独立して—OR²⁰である。

30

40

【0112】

式（I V）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R²⁰は、それぞれ独立して、C₁—C₆アルキル、C₁—C₆ハロアルキル、C₁—C₆ジューテロアルキル、C₁—C₆ヒドロキシアルキル、C₁—C₆アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、

50

20

30

40

、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{21} はそれぞれ独立して水素である。式（IV）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{21} はそれぞれ独立して C_1-C_6 アルキルである。

【0114】


式（IV）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式（IV）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルであり、アルキルは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式（IV）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して水素または C_1-C_6 アルキルである。式（IV）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して C_1-C_6 アルキルである。式（IV）の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ水素である。

【0115】

また本明細書には、式（V）：

【0116】

【化13】



式(V)

の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体であって、式中、

R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

10

あるいは、2つの R^4 は一体となって、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

m は、1または2であり、

R^5 と R^7 は、独立して、水素、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

20

R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-SH$ 、 $-SR^a$ 、 $-S(=O)R^a$ 、 $-S(=O)_2R^a$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-NHS(=O)_2R^a$ 、 $-S(=O)_2NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-OC(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-OC(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 $-OC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)NR^cR^d$ 、 $-NR^bC(=O)R^a$ 、 $-NR^bC(=O)OR^b$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

30

p は、1～4であり、

R^9 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^{10} は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換され、

40

R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-SH$ 、 $-SR^{20}$ 、 $-S(=O)R^{20}$ 、 $-S(=O)_2R^{20}$ 、 $-NO_2$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-NHS(=O)_2R^{20}$ 、 $-S(=O)_2NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-OC(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-OC(=O)$

50

) OR^{21} 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-OC(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-NR^{21}C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 $-NR^{21}C(=O)R^{20}$ 、 $-NR^{21}C(=O)OR^{21}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、

R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^{22} と R^{23} は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)$

) Me、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、


R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、 C_2-C_6 アルケニル、 C_2-C_6 アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換され、

あるいは R^c と R^d は、それらが結合する原子と一体となって、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換されるヘテロシクロアルキルを形成し、

但し、式(V)の化合物が

【0117】

【化14】



ではないことを前提とする、

化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が、開示される。

【0118】

10

20

30

40

50

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^9 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^9 は、水素、 $-P(=O)OH_2$ 、または C_1-C_6 アルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^9 は、水素または C_1-C_6 アルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^9 は C_1-C_6 アルキルである。

【0119】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ジューテロアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、または C_1-C_6 アルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^8 はそれぞれ水素である。

【0120】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p は、1、2、または3である。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p は、1または2である。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p は1である。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 p は2である。

【0121】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)OR^b$ 、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、またはシクロアルキル、ヘテロシクロアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^4 は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、 $-NR^cR^d$ 、 $-C(=O)R^a$ 、 $-C(=O)$

OR^b、 $-C(=O)NR^cR^d$ 、C₁–C₆アルキル、C₁–C₆ハロアルキル、またはC₁–C₆ジューテロアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R⁴は、それぞれ独立して、水素、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^a$ 、C₁–C₆アルキル、またはC₁–C₆ハロアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R⁴は、それぞれ独立して、水素、ハロゲン、またはC₁–C₆アルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R⁴は、それぞれ水素またはハロゲンである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、R⁴はそれぞれ水素

10

【0122】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つのR⁴は、一体となることでシクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールを形成し、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、C₁–C₆アルキル、C₁–C₆ハロアルキル、C₁–C₆ジューテロアルキル、C₁–C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁–C₆アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つのR⁴は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、C₁–C₆アルキル、C₁–C₆ハロアルキル、C₁–C₆ジューテロアルキル、C₁–C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁–C₆アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つのR⁴は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、C₁–C₆アルキル、C₁–C₆ハロアルキル、C₁–C₆ジューテロアルキル、C₁–C₆ヒドロキシアルキル、またはC₁–C₆アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つのR⁴は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、またC₁–C₆アルキルにより任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、2つのR⁴は、一体となることでシクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルを形成し、シクロアルキルとヘテロシクロアルキルは、1、2、もしくは3つのハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-NH_2$ 、またはC₁–C₆アルキルにより任意選択で置換される。

20

30

40

【0123】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、mは1である。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、mは2である。

【0124】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体

50

のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は、水素または C_1-C_6 アルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^5 は水素である。

【0125】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は、水素または C_1-C_6 アルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^7 は水素である。

【0126】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} は、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} は、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(ヘテロシクロアルキル)、 C_1-C_6 アルキル(アリール)、または C_1-C_6 アルキル(ヘテロアリール)であり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} は、シクロアルキル、アリール、 C_1-C_6 アルキル(シクロアルキル)、または C_1-C_6 アルキル(アリール)であり、アルキル、シクロアルキル、およびアリールは、独立して1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} は、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} は、アリールまたはヘテロアリールであり、アリールとヘテロアリールは、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換されるアリールである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^6 は、1、2、または3つの R^{10a} により任意選択で置換されるフェニルである。

【0127】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1または2つの R^{10a} により任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10} のアルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、1つの R^{10a} により任意選択で置換される。

【0128】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-OP(=O)OH_2$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 $-C(=O)R^{20}$ 、 $-C(=O)OR^{21}$ 、 $-C(=O)NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立して、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 $-NR^{22}R^{23}$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立してハロゲンまたは $-OH$ である。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立して、ハロゲン、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{10a} は、それぞれ独立して、ハロゲン、 $-OH$ 、 $-OR^{20}$ 、または C_1-C_6 アルキルである。

【0129】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールであり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、およびヘテロアリールは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルであり、アルキルは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒

和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、または C_1-C_6 ヒドロキシアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{20} はそれぞれ独立して C_1-C_6 アルキルである。

【0130】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリアル、またはヘテロアリアルであり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリアル、およびヘテロアリアルは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルであり、アルキルは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つの重水素、オキソ、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{21} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{21} は、それぞれ独立して水素または C_1-C_6 アルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{21} はそれぞれ独立して C_1-C_6 アルキルである。

【0131】

式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリアル、またはヘテロアリアルであり、アルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリアル、およびヘテロアリアルは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロア

ルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルであり、アルキルは、それぞれ独立して、1、2、もしくは3つのオキソ、重水素、ハロゲン、 $-CN$ 、 $-OH$ 、 $-OMe$ 、 $-S(=O)Me$ 、 $-S(=O)_2Me$ 、 $-NH_2$ 、 $-S(=O)_2NH_2$ 、 $-C(=O)Me$ 、 $-C(=O)OH$ 、 $-C(=O)OMe$ 、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、または C_1-C_6 アミノアルキルにより任意選択で置換される。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ジューテロアルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、または C_1-C_6 ヒドロキシアルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して水素または C_1-C_6 アルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ独立して C_1-C_6 アルキルである。式(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^{22} と R^{23} は、それぞれ水素である。

10

【0132】

20

式(I)~(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(I)~(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、シクロアルキル、またはヘテロシクロアルキルである。式(I)~(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^a は、それぞれ独立して、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、またはシクロアルキルである。式(I)~(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^a は、それぞれ独立して C_1-C_6 アルキルまたは C_1-C_6 ハロアルキルである。式(I)~(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^a はそれぞれ独立して C_1-C_6 アルキルである。

30

【0133】

式(I)~(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(I)~(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、シクロアルキル、またはヘテロシクロアルキルである。式(I)~(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^b は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、またはシクロアルキルである。式(I)~(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^b は、それぞれ独立して水素または C_1-C_6 アルキルである。式(I)~(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能

40

50

な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^b はそれぞれ水素である。式(I)～(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^b はそれぞれ独立して C_1-C_6 アルキルである。

【0134】

式(I)～(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、 C_1-C_6 ヒドロキシアルキル、 C_1-C_6 アミノアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、またはヘテロアリールである。式(I)～(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、シクロアルキル、またはヘテロシクロアルキルである。式(I)～(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 ハロアルキル、またはシクロアルキルである。式(I)～(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^c と R^d は、それぞれ独立して、水素、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルである。式(I)～(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^c と R^d は、それぞれ独立して水素または C_1-C_6 アルキルである。式(I)～(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^c と R^d はそれぞれ水素である。

【0135】

式(I)～(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体のいくつかの実施形態では、 R^c と R^d は、それらが結合される原子と一体となって、1、2、もしくは3つのハロゲン、 C_1-C_6 アルキル、または C_1-C_6 ハロアルキルにより任意選択で置換されたヘテロシクロアルキルを形成する。

【0136】

様々な変形における上述の基のあらゆる組合せも、本明細書で企図されている。本明細書全体にわたり、基とその置換基は、安定した部分と化合物を提供するために当業者により選択される。

【0137】

本明細書には、表1の化合物から選択される、式(I)～(V)の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が記載される。

【0138】

10

20

30

40

50

【表 1 - 1】

表 1. 例示的な化合物

例	構造	名称
1		3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チオフエン-2-カルボキサミド
2		3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-イソプロチルチオフエン-2-カルボキサミド
3		3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(3,3-ジメチルブチル)チオフエン-2-カルボキサミド
4		N-((1H-インドール-3-イル)メチル)-3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)チオフエン-2-カルボキサミド
5		3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-エチルチオフエン-2-カルボキサミド
6		3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(クロマン-3-イル)チオフエン-2-カルボキサミド

10

20







30

40

【0139】

50

【表 1 - 2】

例	構造	名称
7		3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-(4-メトキシピリジン-3-イル)エチル)チオフエン-2-カルボキサミド
8		3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシベンジル)チオフエン-2-カルボキサミド
9		3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-フルオロフェニル)チオフエン-2-カルボキサミド
10		N-(2-((2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフエン-3-イル)イソニコチンアミド
11		2-(2-クロロ-4-((2-((2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフエン-3-イル)カルバモイル)フェノキシ)酢酸
12		7-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チエノ[2,3-b]ピラジン-6-カルボキサミド

10

20








30

40

【 0 1 4 0 】

50

【表 1 - 3】

例	構造	名称
13		2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チオフエン-3-カルボキサミド
14		2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾ[b]チオフエン-3-カルボキサミド
15		2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)-6-メチル-4,5,6,7-テトラヒドロチエノ[2,3-c]ピリジン-3-カルボキサミド
16		2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボキサミド
17		5-クロロ-3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チオフエン-2-カルボキサミド
18		3-(3,5-ジフルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(3,3-ジメチルブチル)チオフエン-2-カルボキサミド
19		N-(3,3-ジメチルブチル)-3-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)チエノ[2,3-c]ピリジン-2-カルボキサミド

10

20






30

40

【 0 1 4 1 】

50

【表 1 - 4】

例	構造	名称
20		3-(2-(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)アセトアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チオフエン-2-カルボキサミド
21		5-クロロ-6-ヒドロキシ-N-(2-((2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフエン-3-イル)ニコチンアミド
22		3-(2-フルオロ-4-((2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフエン-3-イル)カルバモイル)フェニル)プロパン酸
23		3-(3-クロロ-4-ヒドロキシ-5-イソプロピルベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チオフエン-2-カルボキサミド
24		3-(4-(N-ベンゾイルスルファモイル)-3-クロロベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チオフエン-2-カルボキサミド

【 0 1 4 2 】

10

20

30

40

50

【表 1 - 5】

例	構造	名称
25		2-(2-クロロ-4-((2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフェン-3-イル)カルバモイルフェノキシ)-2,2-ジフルオロ酢酸
26		3-(3-クロロ-4-スルファモイルベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チオフェン-2-カルボキサミド
27		2,2-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-((2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフェン-3-イル)カルバモイルフェニル)酢酸
28		3-クロロ-N-(2-((2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフェン-3-イル)-1H-インダゾール-5-カルボキサミド
29		1-(2-クロロ-4-((2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフェン-3-イル)カルバモイルフェニル)ピロリジン-3-カルボン酸

【 0 1 4 3 】

10







20

30

40

50

【表 1 - 6】

例	構造	名称
30		3-(3-フルオロ-4- ヒドロキシベンズアミド) -N-(2- メトキシフェネチル)チオ フェン-2-カルボキサミド
31		3-(3-クロロ-4- ヒドロキシベンズアミド) -N-(2- メトキシフェネチル)ベン ゾ[b]チオフェン-2- カルボキサミド
32		3-(3,5-ジクロロ-4- ヒドロキシベンズアミド) -N-(2- メトキシフェネチル)チオ フェン-2-カルボキサミド
33		3-(4-ヒドロキシ-3-(トリ フルオロメチル)ベンズア ミド)-N-(2- メトキシフェネチル)チオ フェン-2-カルボキサミド
34		5-クロロ-N-(2-クロロ-4- フルオロフェニル)-3-(3- フルオロ-4- ヒドロキシベンズアミド) チオフェン-2- カルボキサミド
35		5-クロロ-3-(3,5- ジフルオロ-4- ヒドロキシベンズアミド) -N-(1-(4- フルオロフェニル)シク ロプロピル)チオフェン- 2-カルボキサミド

10

20

30

40

【 0 1 4 4 】

50

【表 1 - 7】

例	構造	名称
36		5-クロロ-N-(2,4-ジクロロフェネチル)-3-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)チオフエン-2-カルボキサミド
37		5-クロロ-3-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-(4-メチルピペラジン-1-イル)エチル)チオフエン-2-カルボキサミド
38		5-クロロ-3-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-モルホリノエチル)チオフエン-2-カルボキサミド
39		5-クロロ-N-(2,4-ジフルオロフェニル)-3-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)チオフエン-2-カルボキサミド
40		5-クロロ-2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-(トリフルオロメトキシ)フェネチル)チオフエン-3-カルボキサミド
41		5-クロロ-2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-モルホリノエチル)チオフエン-3-カルボキサミド.

【 0 1 4 5 】

10

20

30

40

50

【表 1 - 8】

例	構造	名称
42		5-クロロ-2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-(4-メチルピペラジン-1-イル)エチル)チオフエン-3-カルボキサミド
43		5-クロロ-2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-フルオロフェニル)チオフエン-3-カルボキサミド
44		5-クロロ-3-(3,5-ジフルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-(トリフルオロメチル)フェネチル)チオフエン-2-カルボキサミド
45		5-クロロ-3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-(トリフルオロメチル)フェネチル)チオフエン-2-カルボキサミド
46		5-クロロ-2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-(トリフルオロメトキシ)フェネチル)チオフエン-3-カルボキサミド
47		3-(3-クロロ-5-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(3,3-ジメチルブチル)チオフエン-2-カルボキサミド

【0146】

10



20

30

40

50

【表 1 - 9】

例	構造	名称
48		(S)-3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-ヒドロキシ-1-フェニルエチル)チオフェン-2-カルボキサミド
49		(R)-3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-ヒドロキシ-1-フェニルエチル)チオフェン-2-カルボキサミド

10

20

【0147】

本明細書には、表 1 a の化合物から選択される、式 (I) ~ (V) の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体が記載される。

【0148】







30

40

50

【表 2 - 1】

表 1a. 例示的な化合物

構造	名称
	5-クロロ-3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシベンジル)チオフエン-2-カルボキサミド
	3-(4-ヒドロキシ-3-イソプロピルベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チオフエン-2-カルボキサミド
	4-((2-(2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフエン-3-イル)カルバモイル)ピリジン1-オキシド
	2-クロロ-4-((2-(2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフエン-3-イル)カルバモイル)フェニルリン酸二水素
	3-(4-ヒドロキシシクロヘキサン-1-カルボキサミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チオフエン-2-カルボキサミド
	4-ヒドロキシ-N-(2-(2-メトキシフェネチル)カルバモイル)チオフエン-3-イル)ピペリジン-1-カルボキサミド

10

20



30

40

【 0 1 4 9 】

50

【表 2 - 2】

	5-クロロ-3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-2-カルボキサミド
	5-クロロ-3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(ピリジン-3-イルメチル)チオフェン-2-カルボキサミド

10

【0150】

本明細書に開示される化合物のさらなる形態

20

異性体／立体異性体

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の化合物は、幾何異性体として存在する。いくつかの実施形態では、本明細書に記載の化合物は、1つまたは複数の二重結合を有する。本明細書に示される化合物は、シス、トランス、シン、アンチ、エントゲーゲン（E）、およびツザメン（Z）の異性体のほか、それらの対応する混合物すべてを含む。状況によっては、本明細書に記載の化合物は、1つまたは複数のキラル中心を有し、各中心はR配置またはS配置に存在する。本明細書に記載の化合物は、ジアステレオマー、エナンチオマー、およびエピマーの形態のほか、それらの対応する混合物すべてを含む。本明細書に提供される化合物と方法の追加の実施形態では、単一の調製工程、組合せ、もしくは相互変換から結果として得られるエナンチオマーおよび／またはジアステレオ異性体の混合物は、本明細書に記載される用途に有用である。いくつかの実施形態では、本明細書に記載の化合物は、化合物のラセミ混合物を光学的に活性な分解剤と反応させて一対のジアステレオ異性体化合物を形成し、ジアステレオマーを分離し、光学的に純粋なエナンチオマーを回収することにより、化合物の個々の立体異性体として調製される。いくつかの実施形態では、分離可能な複合体が好ましい。いくつかの実施形態では、ジアステレオマーは、別個の物理的特性（例えば、融点、沸点、溶解度、反応性など）を有し、これら相違点を利用することにより分離される。いくつかの実施形態では、ジアステレオマーは、キラルクロマトグラフィー、または好ましくは、溶解度の相違に基づく分離／分解技法により分離される。いくつかの実施形態では、光学的に純粋なエナンチオマーは、ラセミ化を生じないいずれかの実用的な手段により、分解剤とともに回収される。

30

40

【0151】

標識化合物

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の化合物は、同位体標識された形態で存在する。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される方法は、このような同位体標識された化合物の投与により疾患を処置する方法を含む。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される方法は、このような同位体標識された化合物を医薬組成物として投与することにより疾患を処置する方法を含む。ゆえに、いくつかの実施形態では、本明細書に開示される化合物は同位体標識された化合物を含み、この化合物は、1つまたは複数の原子が、通常自然に見出される原子質量または質量数とは異なる原子質量または質量数を有する原子により置き換えられること以外、本明細書に列記されるものと同一である。本明細書に開

50

示される化合物に組み込むことができる同位体の例として、水素、炭素、窒素、酸素、亜リン酸、硫黄、フッ素、およびクロリドの同位体が挙げられ、それぞれ ^2H 、 ^3H 、 ^{13}C 、 ^{14}C 、 ^{15}N 、 ^{18}O 、 ^{17}O 、 ^{31}P 、 ^{32}P 、 ^{35}S 、 ^{18}F 、および ^{36}Cl などである。前述の同位体および／または他の原子の他の同位体を含有する、本明細書に記載の化合物、ならびにその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、または立体異性体は、本発明の範囲内にある。特定の同位体標識された化合物、例えば ^3H や ^{14}C などの放射性同位体を取り込まれる化合物は、薬物および／または基質組織分布アッセイに有用である。トリチウム化（すなわち ^3H ）および炭素-14（すなわち ^{14}C ）同位体は、調製および検出が容易なため特に好ましい。さらに、重水素、すなわち ^2H などの重同位体での置換により、より大きな代謝安定性から結果として生じる特定の治療上の利点、例えば、*in vivo* での半減期の増加または必要用量の減少がもたらされる。

10

【0152】

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の化合物は、発色団または蛍光部分、生物発光標識、化学発光標識の使用を含むがこれらに限定されない他の手段により標識される。

【0153】

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の標識化合物は、未標識の HSD17B13 阻害剤の *in vitro* および *in vivo* での結合の測定に使用される。

【0154】

薬学的に許容可能な塩

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の化合物は、その薬学的に許容可能な塩として存在する。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される方法は、このような薬学的に許容可能な塩を投与することにより疾患を処置する方法を含む。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される方法は、このような薬学的に許容可能な塩を医薬組成物として投与することにより疾患を処置する方法を含む。

20

【0155】

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の化合物は、酸性基または塩基性基を有しているため、多くの無機塩基または有機塩基、ならびに無機酸および有機酸のいずれかと反応することで薬学的に許容可能な塩を生じさせる。いくつかの実施形態では、これらの塩は、本明細書に開示される化合物またはその溶媒和物もしくは立体異性体の最終的な単離と精製中に、または、遊離形態にある精製化合物を適切な酸または塩基と別々に反応させて、これにより形成された塩を分離することによって、*in situ* で調製される。

30

【0156】

薬学的に許容可能な塩の例として、本明細書に記載の化合物と鉱物、有機酸、または無機塩基との反応により調製された塩が挙げられ、このような塩として、酢酸塩、アクリル酸塩、アジピン酸塩、アルギン酸塩、アスパラギン酸塩、安息香酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、重硫酸塩、亜硫酸水素塩、臭化物、酪酸塩、ブチン-1, 4-ジオエート、樟脳酸塩、樟脳スルホン酸塩、カプロン酸塩、カプリル酸塩、クロロ安息香酸、塩化物、クエン酸塩、シクロペンタンプロピオン酸塩、デカン酸塩、ジグルコン酸塩、リン酸二水素、ジニトロ安息香酸塩、ドデシル硫酸塩、エタンスルホン酸塩、ギ酸塩、フマル酸塩、グルコヘプタン酸塩 (*glucoheptanoate*)、グリセロリン酸塩、グリコール酸塩、ヘミ硫酸塩、ヘプタン酸塩、ヘキサン酸塩、ヘキシン-1, 6-ジオエート、ヒドロキシ安息香酸塩、 γ -ヒドロキシ酪酸塩、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、2-ヒドロキシエタンスルホン酸塩、ヨウ化物、イソ酪酸塩、乳酸塩、マレイン酸塩、マロン酸塩、メタンスルホン酸塩、マンデル酸塩、メタリン酸塩、メタンスルホン酸塩、メトキシ安息香酸塩、メチル安息香酸塩、リン酸一水素、1-ナフタレンスルホネート、2-ナフタレンスルホネート、ニコチン酸塩、硝酸塩、パモ酸塩 (*palmoate*)、ペクチン酸塩、過硫酸塩、3-プロピオン酸フェニル、リン酸塩、ピクリン酸塩、ピバル酸塩、プロピオン酸塩、ピロ硫酸塩、ピロリン酸塩、プロピオン酸塩 (*propiolate*)、フタル酸塩、フェニル酢酸塩、フェニル酪酸塩、プロパンスルホン酸塩、サリチル酸塩、コハク酸塩、硫酸塩、亜硫酸塩、コハク酸塩、スペリン酸塩、セバシン酸塩、スルホン酸

40

50

塩、酒石酸塩、チオシアン酸塩、トシル酸塩、ウンデカン酸塩、キシレンスルホン酸塩が挙げられる。

【0157】

さらに、本明細書に記載の化合物は、化合物の遊離塩基形態を薬学的に許容可能な無機酸または有機酸と反応させることによって形成される薬学的に許容可能な塩として調製可能であり、限定されないが、無機酸として、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸、メタリン酸などが挙げられ、有機酸として、酢酸、プロピオン酸、ヘキサン酸、シクロペンタプロピオン酸、グリコール酸、ピルビン酸、乳酸、マロン酸、コハク酸、リンゴ酸、マレイン酸、フマル酸、p-トルエンスルホン酸、酒石酸、トリフルオロ酢酸、クエン酸、安息香酸、3-(4-ヒドロキシベンゾイル)安息香酸、桂皮酸、マンデル酸、アリールスルホン酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、1,2-エタンジスルホン酸、2-ヒドロキシエタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、2-ナフタレンスルホン酸、4-メチルビシクロ-[2.2.2]オクタ-2-エン-1-カルボン酸、グルコペプトン酸、4,4'-メチレンビス-(3-ヒドロキシ-2-エン-1-カルボン酸)、3-フェニルプルピオン酸、トリメチル酢酸、三級ブチル酢酸、ラウリル硫酸、グルコン酸、グルタミン酸、ヒドロキシナフトエ酸、サリチル酸、ステアリン酸、ムコン酸などが挙げられるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、シュウ酸などの他の酸は、それ自体では薬学的に許容可能ではないが、本開示の化合物、その溶媒和物、または立体異性体、および薬学的に許容可能な酸付加塩を得る際に、中間体として有用な塩の調製に利用される。

10

20

【0158】

いくつかの実施形態では、本明細書に記載される化合物のうち遊離酸基を含むものは、水酸化物、炭酸塩、重炭酸塩、硫酸塩など、薬学的に許容可能な金属カチオンの適切な塩基と、アンモニアと、または薬学的に許容可能な有機一級アミン、二級アミン、三級アミン、もしくは四級アミンと反応する。代表的な塩として、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムのようなアルカリまたはアルカリ土類の塩、アルミニウム塩などが挙げられる。塩基の例示的な例として、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、コリン水酸化物、炭酸ナトリウム、 $N^+(C_{1-4} \text{アルキル})_4$ などが挙げられる。

【0159】

塩基付加塩の形成に役立つ代表的な有機アミンとして、エチルアミン、ジエチルアミン、エチレンジアミン、エタノールアミン、ジエタノールアミン、ピペラジンなどが挙げられる。本明細書に記載の化合物は、それらに含有されるあらゆる塩基性窒素含有基の四級化も含むことを理解されたい。いくつかの実施形態では、水溶性、油溶性、または分散性の生成物は、このような四級化により得られる。

30

【0160】

溶媒和物

いくつかの実施形態では、本明細書に記載の化合物は溶媒和物として存在する。本発明は、このような溶媒和物の投与により疾患を処置する方法を提供する。本発明はさらに、かかる溶媒和物を医薬組成物として投与することにより疾患を処置する方法を提供する。

【0161】

溶媒和物は、化学量論量または非化学量論量の溶媒を含み、いくつかの実施形態では、水やエタノールなどの薬学的に許容可能な溶媒を用いた結晶化プロセス中に形成される。溶媒が水有的时候には水和物が形成され、または溶媒がアルコール有的时候にはアルコールが形成される。本明細書に記載の化合物の溶媒和物は、本明細書に記載のプロセス中に都合よく調製または形成することができる。ほんの一例ではあるが、本明細書に記載の化合物の水和物は、ジオキサン、テトラヒドロフラン、メタノールなどを含むがこれらに限定されない有機溶媒を用いて、水性／有機溶媒混合物からの再結晶により都合よく調製することができる。加えて、本明細書で提供される化合物は、非溶媒和形態に加え、溶媒和形態でも存在することができる。通常、溶媒和形態は、本明細書に提供される化合物と方法の目的において非溶媒和形態と同等であるとみなされる。

40

50

【0162】

互変異性体

状況によっては、化合物は互変異性体として存在する。本明細書に記載の化合物は、本明細書に記載の式の中にすべての可能な互変異性体を含む。互変異性体は水素原子の移動により相互転換可能な化合物であり、単結合および隣接する二重結合の切り換えが付随する。互変異性化が起こり得る結合構成では、互変異性体の化学平衡が存在する。本明細書に開示される化合物の互変異性型が、すべて企図される。互変異性体の正確な比は、温度、溶媒、およびpHを含む様々な要因に依存する。

【0163】

処置方法

本明細書には、NAFLDやNASHなどHSD17B13に関連する疾患を処置、予防、または軽快することを必要とする対象のHSD17B13に関連する疾患を、HSD17B13を標的とする化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体の投与により処置、予防、または軽快するのに有用であり得る、HSD17B13の発現または活性を阻害する方法が、提供される。

【0164】

本明細書には、細胞中のHSD17B13の発現または活性を阻害する方法であって、本開示のHSD17B13阻害剤またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体に細胞を接触させることで、細胞中のHSD17B13の発現または活性を阻害する工程を含む方法が、提供される。いくつかの実施形態では、細胞は肝細胞である。いくつかの実施形態では、細胞は肝臓にある。いくつかの実施形態では、細胞は、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患もしくは障害に関連する疾患、障害、疾病、症状、または生理学的マーカを有するか、そのリスクにある対象の肝臓にある。いくつかの実施形態では、細胞は、疾患を患っているかそのリスクにある対象の脂肪細胞または単球である。いくつかの実施形態では、細胞は、疾患を患っているかそのリスクにある対象のリンパ球である。いくつかの実施形態では、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患もしくは障害は、メタボリック症候群、脂肪肝疾患、慢性肝疾患、肝硬変、脂肪肝、脂肪性肝炎、非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）、アルコール性肝臓疾患、非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）、劇症性ウィルソン病、急速に線維組織を形成するC型肝炎ウイルス損傷、および非代償性門脈高血圧症である。いくつかの実施形態では、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患もしくは障害は、NASHである。

【0165】

いくつかの実施形態では、肝疾患は、原発性胆汁性肝硬変または原発性硬化性胆管炎である。

【0166】

本明細書には、HSD17B13に関連する1つもしくは複数の疾患、障害、疾病、症状、または生理学的マーカを処置し、予防し、その発症を遅らせ、その進行を緩やかにし、または軽快する方法であって、本開示の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体を、それを必要とする対象に投与する工程を含む方法が、提供される。いくつかの実施形態では、必要とする対象は、疾患、障害、疾病、症状、または生理学的マーカを有しているかそのリスクがあると特定される。いくつかの実施形態では、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患もしくは障害は、メタボリック症候群、肝疾患、脂肪肝疾患、慢性肝疾患、肝硬変、脂肪肝、脂肪性肝炎、アルコール性肝臓疾患、非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）、および非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）である。いくつかの実施形態では、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患もしくは障害は、NASHである。

【0167】

本明細書には、対象の脂肪肝、肝線維症、トリグリセリド合成、脂質レベル、肝臓脂質、ALT値、NAFLD活性スコア（NAS）、コレステロール値、もしくはトリグリセリド値、またはそれらの組合せを低下、改善、または調節する方法であって、本開示の化

10

20

30

40

50

合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体を対象に投与する工程を含む方法が、提供される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体は、個体の脂肪肝の低下、改善、または調節での使用において提供される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体は、個体の肝臓線維症の低下、改善、または調節での使用において提供される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体は、個体のトリグリセリド合成の低下、改善、または調節での使用において提供される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体は、個体の脂質レベルの低下、改善、または調節での使用において提供される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体は、個体の脂肪肝の低下、改善、または調節での使用において提供される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体は、個体のALT値の低下、改善、または調節での使用において提供される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体は、個体のNAFLD活性スコアの低下、改善、または調節での使用において提供される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体は、個体のコレステロール値の低下、改善、または調節での使用において提供される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体は、個体のトリグリセリド値の低下、改善、または調節での使用において提供される。いくつかの実施形態では、対象は、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患もしくは障害に関連する疾患、障害、疾病、症状、または生理学的マーカーを有しているか、そのリスクにあると特定される。いくつかの実施形態では、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患もしくは障害は、メタボリック症候群、肝疾患、脂肪肝疾患、慢性肝疾患、肝硬変、脂肪肝、脂肪性肝炎、非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）、および非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）である。いくつかの実施形態では、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患もしくは障害は、NASHである。

10

20

30

40

50

【0168】

本明細書には、対象の薬物性肝障害（DILI）を処置、予防、またはその発症を遅らせる方法が提供される。いくつかの実施形態では、肝損傷は脂肪性肝炎である。また本明細書には、対象の薬物性脂肪性肝炎（DISH）を処置、予防、またはその発症を遅らせる方法が提供される。いくつかの実施形態では、対象は、癌を処置するための化学療法を受けている。いくつかの実施形態では、対象は、循環器疾患の処置を受けている。いくつかの実施形態では、対象は、精神医学的疾患／疾病の処置を受けている。いくつかの実施形態では、対象は、疼痛の処置を受けている。いくつかの実施形態では、対象は、関節炎の処置を受けている。いくつかの実施形態では、化学療法は、タモキシフェン、トレミフェン、イリノテカン、メトトレキサート、フルオロウラシル（5-FU）、またはそれらのあらゆる組合せである。いくつかの実施形態では、対象は、アミオダロン、ペルヘキシリン、プロプラノロール、またはそれらのあらゆる組合せを与えられている。いくつかの実施形態では、対象は、アミトリプチリン、クロザピン、またはそれらのあらゆる組合せを与えられている。いくつかの実施形態では、対象は、メトトレキサート、ピルプロフェン、またはそれらのあらゆる組合せを与えられている。

【0169】

投薬

ある実施形態では、本明細書に記載の化合物を含有する組成物は、予防的および／または治療的処置のために投与される。特定の治療用途では、組成物は、疾患または疾病の症状の少なくとも1つを治療するか少なくとも部分的に阻止するのに十分な量で、疾患または疾病を既に患っている患者に投与される。この使用に有効な量は、疾患または疾病の重

症度と経過、治療歴、患者の健康状態、体重、および薬物に対する反応、ならびに処置を行う医師の判断に依存する。治療有効量は、用量漸増試験および／または用量範囲の臨床試験を含むがこれらに限定されない方法によって任意選択で決定される。

【0170】

予防用途では、本明細書に記載の化合物を含む組成物は、特定の疾患、障害、もしくは疾病の影響を受け易いか、またはそのリスクに曝されている患者に投与される。かかる量は、「予防的有効量または用量」であると定義される。この用途では、正確な量は、患者の健康状態や体重などにも依存する。患者に使用するとき、この用途に有効な量は、疾患、障害、または疾病の重症度と経過、治療歴、患者の健康状態および薬物に対する反応、ならびに処置する医師の判断に依存する。一態様では、予防的処置は、疾患または疾病の症状の再発を防ぐために、処置されている疾患の少なくとも1つの症状またはリスク因子を経験したことがあって現在は寛解期にある哺乳動物に、本明細書に記載の化合物またはその薬学的に許容可能な塩を投与する工程を含む。一態様では、予防的処置は、肝損傷を予防するために、パタチン様ホスホリパーゼドメイン含有3 (patatin-like phospholipase domain-containing 3: PNPLA3) 多型を有する哺乳動物に、本明細書に記載の化合物またはその薬学的に許容可能な塩を含む医薬組成物を投与する工程を含む。肝臓で発現されて脂質代謝に関係するタンパク質である、パタチン様ホスホリパーゼドメイン含有3 (PNPLA3) の148イソロイシン-メチオニンタンパク質変異体 (148 Isoleucine to Methionine protein variant) (I148M) は、近年では肝臓脂肪含有量の主要な決定因子であると特定されている。一部の試験では、I148M変異体は、単純な脂肪過多症から脂肪性肝炎や進行性線維症まで、脂肪肝に関連する肝損傷の全スペクトルの素因となることが認められた。さらに、I148M変異体は、アルコール性脂肪性肝炎から肝硬変への進行の主要な決定因子を表し、慢性C型肝炎ウイルス肝炎、場合によっては慢性B型肝炎ウイルス肝炎、遺伝性ヘモクロマトーシス、および原発性硬化性胆管炎における線維発生および関連する臨床的転帰に影響を及ぼす。いくつかの実施形態では、PNPLA3多型は、肝疾患の進行を予測するために使用される。

【0171】

患者の疾病が改善されない特定の実施形態では、患者の疾患もしくは疾病の症状を改善、またはその他の方法で抑制するか制限するために、医師の裁量により化合物の投与は、長期的に、すなわち患者の生存時間全体を含む長期間にわたり投与される。

【0172】

患者の状態が改善する特定の実施形態では、投与されている薬物の用量は、一時的に減らされるか、または一定期間にわたり一時的に止められる（すなわち、「休薬期間」）。特定の実施形態では、休薬期間の長さは、ほんの一例として、2日、3日、4日、5日、6日、7日、10日、12日、15日、20日、または28日以上を含めて、2日から1年の間である。休薬期間中の用量減少は、ほんの一例として、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、および100%を含めて、ほんの一例として10%～100%である。

【0173】

患者の状態が改善すると、必要に応じて維持量が投与される。続いて、特定の実施形態では、投与の用量もしくは頻度、またはその両方は、症状に応じて、疾患、障害、または疾病の改善が保持される程度にまで減少される。しかし、ある実施形態では、患者は、症状の再発後に長期間にわたり間欠的または毎日の処置を必要とする。

【0174】

このような量に相当する所与の薬剤の量は、特定の化合物、疾患の状態と重症度、処置を必要とする対象または宿主の同一性（例えば、体重、性別）などの因子に依存して変動するが、それにも関係なく、例えば投与されている特定の薬剤、投与経路、処置されている疾病、および処置されている対象または宿主を含む、その症例を取り巻く特別な状況に

応じて決定される。

【0175】

しかし、一般的にヒト成人の処置に使用される用量は、典型的に1日に0.01mg～5000mgの範囲である。一態様では、成人の処置に利用される用量は、約1mg/日～約1000mg/日である。一実施形態では、望ましい用量は、単回用量で、または、例えば1日2、3、4回以上のサブ用量として、同時もしくは適切な間隔で投与される分割用量で提供される。

【0176】

一実施形態では、本明細書に記載の化合物またはその薬学的に許容可能な塩に適切な毎日の投与量は、体重1kgにつき約0.01～約50mgである。いくつかの実施形態では、剤形中の有効成分の毎日の投与量または量は、個々の処置レジメンに関する多くの変数に基づいて、本明細書に示される範囲より少なくなるか、または高くなる。様々な実施形態では、毎日の投与量および単位投与量は、使用される化合物の活性、処置される疾患または疾病、投与の様式、対象個別の要件、処置されている疾患または疾病の重症度、医師の判断を含むがこれらに限定されない多くの変数に依存して変更される。

【0177】

こうした治療レジメンの毒性と治療効果は、LD₁₀とED₉₀の判定を含むがこれらに限定されない、細胞培養物または実験動物における標準の製薬手順により判定される。治療指数は毒性と治療効果との用量比であり、LD₁₀とED₉₀の比として表される。ある実施形態では、細胞培養アッセイと動物試験から得たデータは、ヒトを含む哺乳動物に使用するための治療上有効な1日量の範囲および/または治療上有効な単位用量を製剤化するのに使用される。いくつかの実施形態では、本明細書に記載の化合物の毎日の投与量は、毒性が最小限であるED₅₀を含む循環濃度の範囲内にある。ある実施形態では、毎日の投与量の範囲および/または単位投与量は、使用される剤形および利用される投与経路に応じて、この範囲内で変動する。

【0178】

前述の態様のいずれかでは、本明細書に記載の化合物またはその薬学的に許容可能な塩が、有効量で（a）哺乳動物に全身に投与され、および/または（b）哺乳動物に経口投与され、および/または（c）哺乳動物に静脈内投与され、および/または（d）哺乳動物に注射され、および/または（e）哺乳動物に局所投与され、および/または（f）哺乳動物に非全身または局所投与される、さらなる実施形態がある。

【0179】

前述の態様のいずれかでは、（i）化合物が1日1回投与される、または（ii）化合物が1日にわたり哺乳動物に複数回投与されるさらなる実施形態を含む、有効量の化合物の単回投与を含むさらなる実施形態がある。

【0180】

前述の態様のいずれかでは、有効量の化合物の複数回投与を含むさらなる実施形態が提供され、当該実施形態は、（i）化合物が継続的または断続的に単回投与として投与され、（ii）複数回投与の間隔が6時間ごとであり、（iii）化合物が8時間ごとに哺乳動物に投与され、（iv）化合物が12時間ごとに対象に投与され、（v）化合物が24時間ごとに対象に投与される、さらなる実施形態を含む。さらなるまたは代替的な実施形態では、上記方法は休薬期間を含み、化合物の投与は一時的に中断され、または投与されている化合物の量は一時的に減らされ、休薬期間の終わりに化合物の投薬が再開される。一実施形態では、休薬期間の長さは2日から1年まで変動する。

【0181】

投与経路

適切な投与経路として、経口投与、静脈内投与、直腸投与、エアロゾル投与、非経口投与、経眼投与、経肺投与、経粘膜投与、経皮投与、腔内投与、経耳投与、経鼻投与、局所投与が挙げられるが、これらに限定されない。加えて、ほんの一例ではあるが、非経口送達として、筋肉内注射、皮下注射、静脈内注射、髄内注射のほか、くも膜下腔内注射、直

10

20

30

40

50

接脳室内注射、腹腔内注射、リンパ内注射、鼻腔内注射も挙げられる。

【0182】

ある実施形態では、本明細書に記載される化合物は、全身的ではなく局所的に、例えば、多くの場合にデポー製剤または徐放製剤において、器官への化合物の直接注射を介して投与される。ある実施形態では、植込み（例えば、皮下または筋肉内）または筋肉内注射により、長期間作用型製剤が投与される。さらに、他の実施形態では、薬物は、標的とされた薬物送達系において、例えば、器官特異的抗体（organ-specific antibody）を被覆したリポソームにおいて送達される。かかる実施形態では、リポソームは器官に対し標的とされ、器官により選択的に吸収される。また他の実施形態では、本明細書に記載される化合物は、急速放出製剤の形態、持続放出製剤の形態、または中間体放出製剤の形態で提供される。また他の実施形態では、本明細書に記載の化合物は局所投与される。

10

【0183】

医薬組成物／製剤

本明細書に記載の化合物は、標準薬務に従い単独で、または医薬組成物中に薬学的に許容可能な担体、賦形剤、もしくは希釈剤と組み合わせて、投与を必要とする対象に投与される。一実施形態では、本発明の化合物は動物に投与される場合がある。化合物は、経口投与、または静脈内、筋肉内、腹腔内、皮下、直腸、局所の投与経路を含めて非経口投与することができる。

【0184】

本明細書の別の態様では、本明細書に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体と、少なくとも1つの薬学的に許容可能な賦形剤とを含む医薬組成物が記載される。医薬組成物は、活性化合物を薬学的に使用可能な製剤へと処理するのを容易にする1つまたは複数の薬学的に許容可能な不活性成分を用いて、従来どおりに製剤化される。適切な製剤は、選択される投与経路に依存する。本明細書に記載の医薬組成物の概要は、例えば、Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Nineteenth Ed (Easton, Pa.: Mack Publishing Company, 1995)、Hoover, John E., Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Co., Easton, Pennsylvania 1975、Lieberman, H. A. and Lachman, L., Eds., Pharmaceutical Dosage Forms, Marcel Dekker, New York, N. Y., 1980、およびPharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Seventh Ed. (Lippincott Williams & Wilkins 1999)で見ることができ、これらの文献は開示のために参照により本明細書で援用される。

20

30

【0185】

いくつかの実施形態では、薬学的に許容可能な賦形剤は、担体、充填剤、懸濁化剤、香料、甘味剤、崩壊剤、分散剤、界面活性剤、潤滑剤、着色剤、希釈剤、可溶化剤、湿潤剤、可塑剤、安定化剤、浸透促進剤、湿潤剤、起泡防止剤、抗酸化剤、防腐剤、およびそれらのあらゆる組合せから選択される。

40

【0186】

本明細書に記載の医薬組成物は、経口、非経口（例えば、静脈内、皮下、筋肉内）、鼻腔内、頬側、局所、直腸、または経皮の投与経路を含むがこれらに限定されない多くの投与経路により対象に投与される。本明細書に記載の医薬製剤には、水性液体分散剤、液体、ゲル、シロップ、エリキシル剤、スラリー、懸濁剤、自己乳化分散剤、固溶体、リポソーム分散剤、エアロゾル、固形経口剤形、粉末剤、即時放出製剤、制御放出製剤、急速溶解剤、錠剤、カプセル剤、丸剤、粉末剤、糖衣錠、発泡性製剤、凍結乾燥製剤、遅延放出製剤、持続放出製剤、徐放製剤、パルス放出製剤、多重微粒子製剤、および即時放出・

50

制御放出の混合型製剤 (mixed immediate and controlled release formulations) が挙げられるが、これらに限定されない。

【0187】

本明細書に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体を含む医薬組成物は、ほんの一例として、従来の混合、溶解、粒状化、糖衣錠製造、粉末化、乳化、カプセル化、封入、圧縮のプロセスなどの従来様式で製造される。

【0188】

経口用の医薬組成物は、1つまたは複数の固形賦形剤を、本明細書に記載される1つまたは複数の化合物と混合し、得られた混合物を任意選択で粉砕し、必要に応じて適切な助剤を添加した後に顆粒の混合物を処理して、錠剤または糖衣錠コア (dragée core) を得ることにより混合される。適切な賦形剤として、例えばラクトース、スクロース、マンニトール、ソルビトールを含む糖などの充填材、例えばトウモロコシデンプン、小麦デンプン、米デンプン、ジャガイモデンプン、ゼラチン、トラガカントガム、メチルセルロース、微結晶性セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウムなどのセルロース調製物、またはポリビニルピロリドン (PVP もしくはポビドン) やリン酸カルシウムなどの他のものが挙げられる。必要に応じて、架橋クロスカルメロースナトリウム、ポリビニルピロリドン、寒天、もしくはアルギン酸、またはアルギン酸ナトリウムなどのアルギン酸塩といった崩壊剤が添加される。いくつかの実施形態では、識別のために、または活性化合物用量の異なる組合せを特徴付けるために、染料または色素が、錠剤または糖衣錠コーティングに添加される。

【0189】

経口投与される医薬組成物として、ゼラチン製の押込み式カプセルのほか、ゼラチン、およびグリセロールやソルビトールなどの可塑剤で作られた密閉式の軟カプセルが挙げられる。押込み式カプセルには、ラクトースなどの充填剤、デンプンなどの結合剤、および／またはタルクやステアリン酸マグネシウムなどの潤滑剤、ならびに任意選択で安定剤と混合した有効成分が含まれる。軟カプセル中、活性化合物は、脂肪油、流動パラフィン、液体ポリエチレングリコールなどの好適な液体に溶解または懸濁される。いくつかの実施形態では、安定剤が添加される。

【0190】

非経口用の医薬組成物は、注入または注射として製剤化される。いくつかの実施形態では、注射または注入に適した医薬組成物として、本明細書に記載の化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体を含む滅菌水溶液、分散液、または滅菌粉末が挙げられる。いくつかの実施形態では、医薬組成物は液体担体を含む。いくつかの実施形態では、液体担体は、例えば、水、生理食塩水、エタノール、ポリオール (例えば、グリセリン、プロピレングリコール、液体ポリエチレングリコールなど)、植物油、非毒性グリセリルエステル、およびこれらのあらゆる組合せを含む溶媒または液体分散媒体である。いくつかの実施形態では、医薬組成物は、微生物の成長を防止する防腐剤をさらに含む。

【0191】

組合せ

本明細書には、本明細書に開示される化合物、またはその薬学的に許容可能な塩、溶媒和物、もしくは立体異性体を追加の治療剤と組み合わせて使用し、肝疾患、代謝疾患、または循環器疾患を処置する方法が開示される。

【0192】

いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、糖尿病または糖尿病関連の疾患もしくは疾病の処置に使用される。

【0193】

いくつかの例では、追加の治療剤は、スタチン、インスリン抵抗性改善薬、インスリン分泌促進薬、 α グルコシダーゼ阻害剤、GLP アゴニスト、GIP アゴニスト、THR β

アゴニスト、PDE阻害剤、DPP-4阻害剤（シタグリブチン、ビルダグリブチン、サキサグリブチン、リナグリブチン、アナグリブチン、テネリグリブチン、アログリブチン、ゲミグリブチン、デュトグリブチンなど）、カテコールアミン（エピネフリン、ノルエピネフリン、ドーパミンなど）、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体（PPAR）- γ アゴニスト（例えば、チアゾリジンジオン（TZD）[ピオグリタゾン、ロシグリタゾン、リボグリタゾン、トログリタゾンなど]、アレグリタザル、ファルグリタザル、ムラグリタザル、またはテサグリタザル）、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体（PPAR）- α アゴニスト、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体（PPAR）- δ アゴニスト、ファルネソイドX受容体（FXR）アゴニスト（例えば、オベチコール酸）、またはそれらの組合せを含む。場合により、スタチンはHMG-CoA還元酵素阻害剤である。他の例では、追加の治療剤として、魚油、フィブラート、ナイアシンなどのビタミン、レチノイン酸（例えば、9シス-レチノイン酸）、ニコチンアミドリボヌクレオシド、もしくはそれらのアナログ、またはそれらの組合せが挙げられる。他の例では、追加の治療剤として、ACC阻害剤、FGF19およびFGF21模倣物、CCR2/CCR5アンタゴニスト、またはそれらの組合せが挙げられる。

10

【0194】

いくつかの実施形態では、追加の治療剤はビビトロールである。

【0195】

いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、HMG-CoAリダクターゼ阻害剤、魚油、フィブラート、ナイアシンなどのスタチン、またはそれらの組合せである。他の例では、追加の治療剤は、オルリスタットなど脂質吸収を予防する脂質異常症薬である。

20

【0196】

いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、食物摂取による体重増加および／または血糖値上昇を低下させるなど、糖尿病と糖尿病関連の障害または疾病の処置のための、レチノイン酸やトコフェニルなどのビタミンである。

【0197】

いくつかの実施形態で、追加の治療剤は、グルコース低下剤である。いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、抗肥満症剤である。いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体（PPAR）アゴニスト（ガンマ、デュアル、またはパン）、ジペプチジルペプチダーゼ（IV）阻害剤、グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アナログ、インスリンまたはインスリンアナログ、インスリン分泌促進物質、ナトリウムグルコース共輸送体2（SGLT2）阻害剤、グルコファージ（glucophage）、ヒトアミリンアナログ、ビッグアニド、アルファ-グルコシダーゼ阻害剤、メグリチニド、チアゾリジンジオン、およびスルホニル尿素の中から選択される。いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、メトホルミン、シタグリブチン、サキサグリブチン、レパグリニド、ナテグリニド、エキセナチド、リラグルチド、インスリンリスプロ、インスリンアスパルト、インスリングルラギン、インスリンデテミル、インスリンイソフェン、およびグルカゴン様ペプチド1、またはそれらのあらゆる組合せである。いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、脂質低下剤である。

30

【0198】

いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、抗酸化剤、ブデソニドなどのコルチコステロイド、抗腫瘍壊死因子（TNF）、またはそれらの組合せである。

40

【0199】

いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、本明細書に開示される化合物と同時に投与される。いくつかの実施形態では、追加の治療剤と本明細書に開示される化合物は、連続して投与される。いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、本明細書に開示される化合物ほど頻繁に投与されない。いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、本明細書に開示される化合物より頻繁に投与される。いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、本明細書に開示される化合物の投与前に投与される。いくつかの実施形態では、追加の治療剤は、本明細書に開示される化合物の投与後に投与される。

50


【実施例】

【0200】

実施例1：3-（3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド）-N-〔2-（2-メトキシフェニル）エチル〕チオフエン-2-カルボキサミドの合成

【0201】

【化15】



10

20

【0202】

工程1：メチル3-（3-クロロ-4-メトキシベンズアミド）チオフエン-2-カルボキシレートの合成

3-クロロ-4-メトキシ安息香酸（1.25 g、6.70 mmol）とメチル3-アミノチオフエン-2-カルボキシレート（1.05 g、6.70 mmol）のピリジン（25.0 mL）攪拌溶液に、塩化ホスホリル（0.63 mL、6.70 mmol）を0℃で添加した。反応混合物を室温で3時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物を氷冷2 N 塩酸（100 mL）に注ぎ入れた。沈殿した固形物を濾過して水（25 mLで2回）で洗浄し、真空下で乾燥することで、メチル3-（3-クロロ-4-メトキシベンズアミド）チオフエン-2-カルボキシレートを黄色固形物（1.2 g、粗製）として得た。LCMS (ES) m/z calcd. for C₁₄H₁₂ClNO₄S, 325.8; found, 326.1 (M+H)。

30

【0203】

工程2：4-（3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド）チオフエン-3-カルボン酸の合成

メチル4-（3-クロロ-4-メトキシベンズアミド）チオフエン-3-カルボキシレート（0.8 g、2.46 mmol）をジクロロメタン（100 mL）に溶解した攪拌溶液に、トリクロロアルミニウム（1.64 g、12.3 mmol）とエタントール（0.8 mL、12.3 mmol）を0℃で添加した。反応混合物を周囲温度で16時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物をジクロロメタン（400 mL）で希釈し、水（150 mL）で洗浄した。有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、真空下で乾燥することで、粗製の4-（3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド）チオフエン-3-カルボン酸を黄色のガム（0.4 g、粗製）として得た。LCMS (ES) m/z calcd. for C₁₂H₈ClNO₄S, 297.7; found, 298.0 (M+H)。

40

【0204】

工程3：3-（6-（（1H-インダゾール-6-イル）オキシ）ピリジン-2-イル）-2-フルオロフェノールの合成

3-（3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド）チオフエン-2-カルボン酸（0.6 g、2.02 mmol）の固形物に塩化チオニル（10.0 mL）を0℃で添加した。反応混合物を70℃に加温して3時間維持した。反応の完了後、反応混合物を真空下で蒸

50

発させることで、2-(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-4H-チエノ[3,2-d][1,3]オキサジン-4-オンを茶色の粘性固形物(0.4g、粗製)として得た。LCMS(ES)m/z calcd. for C₁₂H₆ClNO₃S, 279.7; found, 280.0 (M+H)。

【0205】

工程4: 3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-[2-(2-メトキシフェニル)エチル]チオフェン-2-カルボキサミドの合成

2-(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-4H-チエノ[3,2-d][1,3]オキサジン-4-オン(0.35g、1.25mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(5mL)攪拌溶液に、N,N-ジイソプロピルエチルアミン(1.2mL、7.15mmol)と(2-(2-メトキシフェニル)エタン-1-アミン(0.2g、1.25mmol)を周囲温度で添加し、さらに3時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物を水(20mL)に注ぎ入れ、酢酸エチル(10mLで3回)で抽出した。有機相を水、ブライン溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で乾燥することで、粗製生成物を得た。この粗製生成物をさらに逆相分取HPLCにより精製し、純粋な画分を集めて真空下で蒸発させることで、純粋な3-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-[2-(2-メトキシフェニル)エチル]チオフェン-2-カルボキサミド(50mg、8.1%)をオレンジ色の固形物として得た。LCMS(ES)m/z calcd. for C₂₁H₁₉ClN₂O₄S, 430.9; found, 431.1 (M+H)。¹H NMR(400MHz, DMSO-d₆) δ 12.106(s, 1H), 11.07(s, 1H), 8.38(s, 1H), 8.03(m, 1H), 7.83(s, 1H), 7.72-7.65(m, 2H), 7.18-7.09(s, 3H), 6.98-6.91(m, 1H), 6.89-6.80(m, 1H), 3.76(s, 3H), 3.48-3.41(m, 2H), 2.83-2.77(m, 2H)。

【0206】

以下の化合物を、実施例1に記載の方法と実験手順を使用して合成した。

【0207】

10

20

30

40

50

【表 3】

Ex.	スペクトルデータ
2	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{16}H_{17}ClN_2O_3S$, 352.8; found, 353.0 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.13 (s, 1H), 11.07 (s, 1H), 8.37 (s, 1H), 8.05 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 7.84 (s, 1H), 7.76-7.68 (m, 2H), 7.13 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 3.07 (t, $J=6.4$, 2H), 1.89-1.83 (m, 1H), 0.83 (d, $J=6.8$ Hz, 6H).
3	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{18}H_{21}ClN_2O_3S$, 380.9; found, 381.1 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.13 (s, 1H), 11.07 (s, 1H), 8.28 (s, 1H), 8.04 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.74-7.69 (m, 2H), 7.13 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 3.28 (s, 2H), 1.45 (t, $J=8.4$ Hz, 2H), 0.91 (s, 9H).
4	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{21}H_{16}ClN_3O_3S$, 425; found, 424 (M-H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO d_6) δ 12.25 (s, 1H), 11.10-11.05 (bs, 1H), 10.89 (s, 1H), 8.76 (s, 1H), 8.04 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 7.87 (s, 1H), 7.78-7.60 (m, 3H), 7.40-7.25 (m, 2H), 7.14 (d, $J=12$ Hz, 1H), 7.05(t, $J=8$ Hz, 1H), 6.96(t, $J=8$ Hz, 1H), 4.61(d, $J=4.8$ Hz, 2H).
5	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{14}H_{13}ClN_2O_3S$ 324; found, 324.9 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO d_6) δ 12.20 (s, 1H), 11.1 (bs, 1H), 8.40 (s, 1H), 8.05 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.77-7.65 (m, 2H), 7.13 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 3.28-3.25 (m, 2H). 1.11 (t, $J=7.2$ Hz, 3H).
6	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{21}H_{17}ClN_2O_4S$, 428; found, 429.0 (M+H); ^1H NMR (400 MHz, DMSO d_6) δ 12.02 (s, 1H), 11.08 (bs, 1H), 8.34 (d, $J=6.8$ Hz, 1H), 8.05(d, $J=5.6$ Hz, 1H), 7.86-7.80 (m, 2H), 7.71 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.14-7.07 (m, 3H), 6.87-6.77 (m, 2H), 4.45-4.39 (m, 1H), 4.24-4.20 (m, 1H), 3.88 (t, $J=9.6$ Hz, 1H), 3.0-2.98 (m, 2H).
7	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{20}H_{18}ClN_3O_4S$, 431.89; found, 432.8. (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO d_6) δ 12.03 (s, 1H), 11.16 (bs, 1H), 8.77 (d, $J=6.8$ Hz, 1H), 8.52 (s, 1H), 8.45-8.43 (m, 1H), 8.03 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 7.80-7.75 (m, 2H), 7.68 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.54 (d, $J=6.4$ Hz, 1H), 7.13 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 4.04 (s, 3H), 3.54-3.0 (m, 2H), 2.95-2.90 (m, 2H).
8	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{20}H_{17}ClN_2O_4S$, 416.06; found, 416.9 (M+H); ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.09 (s, 1H), 11.1 (s, 1H), 8.79 (s, 1H), 8.07 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 7.83-7.79 (m, 2H), 7.67 (d, $J=8$ Hz, 1H), 7.22 (t, $J=7.2$ Hz, 1H), 7.14-7.09 (m, 2H), 6.99-6.87 (m, 2H), 4.43 (d, $J=8$ Hz, 2H) 3.8 (s, 3H).
9	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{20}H_{16}ClFN_2O_3S$, 418.06; found, 418.9 (M+H); ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.05 (s, 1H), 11.12 (s, 1H), 8.50 (s, 1H), 8.04 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 7.83 (s, 1H), 7.75 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 7.68 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.31-7.21 (m, 2H), 7.14-7.08 (m, 3H), 3.48 (d, $J=6$ Hz, 2H) 2.87 (t, $J=6.8$ Hz, 2H).

10

20

30

【0208】


実施例 10 : N - (2 - { [2 - (2 - メトキシフェニル) エチル] カルバモイル } チオフェン - 3 - イル) ピリジン - 4 - カルボキサミドの合成

【0209】

40

50

【化 1 6】



10

【0210】

工程1：メチル3-（イソニコチンアミド）チオフエン-2-カルボキシレートの合成

ピリジン-4-カルボン酸（1.0 g、8.12 mmol）のピリジン（20 mL）攪拌溶液に、メチル3-アミノチオフエン-2-カルボキシレート（1.02 g、6.50 mmol）と塩化ホスホリル（1.25 mL、24.4 mmol）を0℃で滴加した後、窒素雰囲気下、室温で2時間攪拌した。反応の進行状況をTLCによりモニタリングした。酢酸エチル（50 mL）を反応混合物に添加し、沈殿した固形物を濾過し、得られた濾液を真空下で濃縮することで、メチル3-（ピリジン-4-アミド）チオフエン-2-カルボキシレート（650 mg、2.48 mmol）を黄色固形物として得た。LCMS（ES） m/z calcd. for $C_{12}H_{10}N_2O_3S$, 262.04; found, 263.0 (M+H)。

20

【0211】

工程2：3-（イソニコチンアミド）チオフエン-2-カルボン酸の合成

メチル3-（ピリジン-4-アミド）チオフエン-2-カルボキシレート（0.65 g、2.48 mmol）のテトラヒドロフラン：水：メタノール（4：1：1）（10.0 mL）攪拌溶液を室温で5分間攪拌後、これに水酸化リチウム粉体溶液（0.21 g、8.67 mmol）を添加し、室温で1時間攪拌した。反応混合物を真空下で濃縮し、得られた残渣を水（10 mL）で希釈し、1 N塩酸水溶液で酸性化してpHを約4.0とし、沈殿した固形物を濾過し、得られた固形物をn-ペンタン（20 mL）で洗浄することで、3-（ピリジン-4-アミド）チオフエン-2-カルボン酸を茶色固形物（0.15 g、24% mmol）として得た。LCMS（ES） m/z calcd. for $C_{11}H_8N_2O_3S$, 248.03; found, 249.1 (M+H)。

30

【0212】

工程3：N-（2-〔〔2-（2-メトキシフェニル）エチル〕カルバモイル〕チオフエン-3-イル）ピリジン-4-カルボキサミドの合成

3-（ピリジン-4-アミド）チオフエン-2-カルボン酸（0.15 g、0.60 mmol）のN，N-ジメチルホルムアミド（2 mL）攪拌溶液に、N，N-ジメチルピリジン-4-アミン（0.25 g、2.11 mmol）、（〔〔3-（ジメチルアミノ）プロピル〕イミノ〕メチリデン）（エチル）アミンヒドロクロリド（0.23 g、1.21 mmol）を添加し、不活性条件下、0℃で10分間攪拌した後、この溶液に2-（2-メトキシフェニル）エタン-1-アミン（91.4 mg、0.604 mmol）を添加し、室温で16時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物を水（20 mL）に注ぎ入れ、酢酸エチル（25 mLで2回）で抽出した。有機相を水、ブライン溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で乾燥することで、粗製生成物（crude）を得た。粗

40

50

製生成物をフラッシュクロマトグラフィーにより精製し、得られた固形物をジエチルエーテル（10 mL）でさらにトリチュレートすることで、N-（2-〔2-（2-メトキシフェニル）エチル〕カルバモイル）チオフェン-3-イル）ピリジン-4-カルボキサミド（0.015 g、収率：7%）を白色結晶固形物として得た。LCMS（ES） m/z calcd. for $C_{20}H_{19}N_3O_3S$, 381.11; found, 380.0 (M-H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.39 (s, 1H), 8.84 (d, $J=4.8$ Hz, 2H), 8.51 (s, 1H), 8.061 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 7.79 (m, 3H), 7.12-7.19 (m, 2H), 6.94 (d, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.84 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.45 (q, $J=6.4$ Hz, 2H), 2.82 (t, $J=7.2$ Hz, 2H)。


10

【0213】

実施例11：2-（2-クロロ-4-（（2-（（2-メトキシフェネチル）カルバモイル）チオフェン-3-イル）カルバモイル）フェノキシ）酢酸の合成

【0214】

【化17】



20

【0215】

工程1：エチル 2-（2-クロロ-4-（（2-（（2-メトキシフェネチル）カルバモイル）チオフェン-3-イル）カルバモイル）フェノキシ）アセテートの合成

30

3-（3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド）-N-〔2-（2-メトキシフェニル）エチル〕チオフェン-2-カルボキサミド（0.15 g、0.348 mmol）をアセトン（3 mL）に溶解した攪拌溶液に、炭酸カリウム（0.14 g、1.04 mmol）を添加し、反応混合物を16時間かけて60 °Cに加温した。反応の完了後、反応混合物を水（10 mL）に注ぎ入れ、酢酸エチル（10 mLで3回）で抽出した。有機相を水、ブライン溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で乾燥することで、粗製生成物を得た。粗製生成物を、酢酸エチル-ヘキサン勾配を用いたフラッシュクロマトグラフィー（生成物は約15%の酢酸エチル-ヘキサンで溶出する）により精製した。精製により、エチル 2-（2-クロロ-4-（（2-（（2-メトキシフェネチル）カルバモイル）チオフェン-3-イル）カルバモイル）フェノキシ）アセテートを白色固形物（0.1 g、55.5%）として得た。LC-MS m/z calcd for $C_{25}H_{25}ClN_2O_6S$, 516.11; found 517.1 [M+H]。

40

【0216】

工程2：2-（2-クロロ-4-（（2-（（2-メトキシフェネチル）カルバモイル）チオフェン-3-イル）カルバモイル）フェノキシ）酢酸の合成

エチル 2-（2-クロロ-4-（（2-（（2-メトキシフェネチル）カルバモイル）チオフェン-3-イル）カルバモイル）フェノキシ）アセテート（0.1 g、0.193 mmol）のテトラヒドロフラン：水：メタノール（4：1：1、3.0 mL）の攪拌溶液を室温で5分間攪拌し、水酸化リチウム（0.035 g、0.774 mmol）を添加した。室温で1時間、攪拌を継続した。TLCにより、出発材料の完全な消費と極性スポ

50

ット (polar spot) の形成を認めた。反応混合物を真空下で濃縮し、水 (10 mL) で希釈し、1 N HCl で酸性化して pH を約 4.0 とした。沈殿した固形物を濾過し、n-ペンタン (15 mL) で洗浄することで、2-(2-クロロ-4-((2-(2-メトキシフェニル)カルバモイル)チオフェン-3-イル)カルバモイル)フェノキシ)酢酸を白色固形物 (0.08 g, 84.6%) として得た。LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{23}H_{21}ClN_2O_6S$, 488.08; found, 489.1 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.12 (s, 1H), 8.39 (s, 1H), 8.03 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.84 (s, 1H), 7.74 (s, 2H), 7.16–7.12 (m, 2H), 7.02 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 6.94 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.83 (t, $J=6.4$ Hz, 1H), 4.35 (s, 2H), 3.77 (s, 3H), 3.44 (d, $J=5.6$ Hz, 2H), 2.82 (d, $J=6$ Hz, 2H)。


10

【0217】

実施例 12: 7-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェニル)チエノ[2,3-b]ピラジン-6-カルボキサミドの合成

【0218】

【化18】



20

30

【0219】

工程 1: メチル 7-(3-クロロ-4-メトキシベンズアミド)チエノ[2,3-b]ピラジン-6-カルボキシレートの合成

メチル 7-アミノチエノ[2,3-b]ピラジン-6-カルボキシレート (0.3 g、1.43 mmol) のテトラヒドロフラン (5 mL) 攪拌溶液に、水素化ナトリウム (0.12 g、2.87 mmol) を 0°C で添加し、同温度で 15 分間攪拌した。これに 3-クロロ-4-メトキシベンゾイルクロリド (0.29 g、1.43 mmol) のテトラヒドロフラン (2 mL) 溶液を、0°C で 10 分かけて滴加した。次いで反応混合物を 65°C で 16 時間還流した。反応の完了後、反応混合物を、氷冷水 (10 mL) でクエンチし、酢酸エチル (2 mL で 15 回) で抽出した。有機相をブライン溶液 (10 mL) で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、真空下で蒸発させることで、粗製生成物を得た。粗製生成物をフラッシュクロマトグラフィーにより精製することで、メチル 7-(3-クロロ-4-メトキシベンズアミド)チエノ[2,3-b]ピラジン-6-カルボキシレートを黄色固形物 (0.17 g、31%) として得た。LCMS (ES) m/z calcd. For $C_{16}H_{12}ClN_3O_4S$, 377.02; found, 378.0 (M+H)。

40

【0220】

工程 2: 7-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)チエノ[2,3-b]ピラジ

50

ン-6-カルボン酸の合成

メチル7-(3-クロロ-4-メトキシベンズアミド)チエノ[2,3-b]ピラジン-6-カルボキシレート(0.12g、0.32mmol)のジクロロメタン(2mL)攪拌溶液に、トリプロモボラン(3.18mL、3.18mmol)を0℃で添加した。反応混合物を周囲温度で16時間攪拌した。反応混合物を氷冷水(25mL)でクエンチし、ジクロロメタン(2mLで25回)で抽出した。有機相をブライン溶液(20mL)で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、真空下で蒸発させることで、7-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)チエノ[2,3-b]ピラジン-6-カルボン酸(0.09g)を黄色固形物として得た。LCMS(ES)m/z calcd. For C₁₄H₈ClN₃O₄S, 348.99; found, 350.0 (M+H)。

10

【0221】

工程3: 2-(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-4H-ピラジノ[2',3':4,5]チエノ[3,2-d][1,3]オキサジン-4-オンの合成

7-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)チエノ[2,3-b]ピラジン-6-カルボン酸(120mg、0.34mmol)の固形物に塩化チオニル(2mL)を0℃で添加した。反応混合物を2時間かけて80℃に加温した。反応の完了後に、反応混合物を真空下で蒸発させることで、2-(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-4H-ピラジノ[2',3':4,5]チエノ[3,2-d][1,3]オキサジン-4-オンを茶色の粘性固形物(0.09g)として得て、これには何のカラム精製も行わず、次の工程に使用した。LCMS(ES)m/z calcd. For C₁₄H₆ClN₃O₃S, 330.98; found, 332.0 (M+H)。

20

【0222】

工程5: 7-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チエノ[2,3-b]ピラジン-6-カルボキサミドの合成

2-(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-4H-ピラジノ[2',3':4,5]チエノ[3,2-d][1,3]オキサジン-4-オン(0.1g、0.31mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(2mL)攪拌溶液に、トリエチルアミン(0.21mL、1.51mmol)を添加し、これに2-(2-メトキシフェニル)エタン-1-アミン(0.046g、0.31mmol)を周囲温度で添加して、1時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物を水(5mL)に注ぎ入れ、酢酸エチル(5mLで3回)で抽出した。有機相を水、ブライン溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で濃縮した。粗製生成物をフラッシュクロマトグラフィーにより精製した富化画分をプールし、得られた残渣を逆相分取HPLCにより再び精製した。純粋な画分を真空下で濃縮することで、純粋な7-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-[2-(2-メトキシフェニル)エチル]チエノ[2,3-b]ピラジン-6-カルボキサミド(0.012g、8%)を得た。LCMS(ES)m/z calcd. for C₂₃H₁₉ClN₄O₄S, 482.08; found, 482.9 (M+H)。¹H NMR(400MHz, DMSO-d₆) δ 10.29(s, 2H), 8.77(d, J=24Hz, 2H), 8.37(s, 1H), 8.07(s, 1H), 7.82(d, J=8Hz, 1H), 7.13-7.04(m, 3H), 6.87(d, J=8Hz, 1H), 6.71(t, J=16Hz, 1H), 3.73(s, 3H), 3.44-3.45(m, 2H), 2.75(t, J=12Hz, 2H)。

30


40

【0223】

実施例13: 2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)チオフェン-3-カルボキサミドの合成

【0224】

【化 19】



10

【0225】

工程1：メチル2-（3-クロロ-4-メトキシベンズアミド）チオフエン-3-カルボキシレートの合成

メチル2-アミノチオフエン-3-カルボキシレート（1.00g、6.36mmol）と3-クロロ-4-メトキシ安息香酸（1.54g、8.27mmol）のピリジン（25.0mL）攪拌溶液に、塩化ホスホリル（1.78mL、19.1mmol）を0℃で添加した。反応混合物を16時間室温で攪拌した。反応の完了後、反応混合物を冷2N HCl（100mL）に注ぎ入れた。沈殿した固形物を濾過して水（25mLで2回）で洗浄し、真空下で乾燥することで、メチル2-（3-クロロ-4-メトキシベンズアミド）チオフエン-3-カルボキシレートを黄色固形物（0.8g、40%）として得た。LCMS（ES）m/z calcd. for C₁₄H₁₂ClNO₄S, 325.0; found, 326.1（M+H）。

20

【0226】

工程2：2-（3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド）チオフエン-3-カルボン酸の合成

メチル2-（3-クロロ-4-メトキシベンズアミド）チオフエン-3-カルボキシレート（0.7g、2.15mmol）のジクロロメタン（3mL）攪拌溶液に、三塩化アルミニウム（0.43g、3.22mmol）とエタントール（0.05mL、6.45mmol）を0℃で添加した。反応混合物を周囲温度で16時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物をジクロロメタン（200mL）で希釈し、水（150mL）で洗浄した。有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、真空下で乾燥することで、2-（3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド）チオフエン-3-カルボン酸を黄色の粘性固形物（0.4g、62%）として得た。LCMS（ES）m/z calcd. for C₁₂H₈ClNO₄S, 296.99; found, 298.0（M+H）。

30

【0227】

工程3：2-（3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル）-4H-チエノ[2,3-d][1,3]オキサジン-4-オン

2-（3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド）チオフエン-3-カルボン酸（0.2g、0.67mmol）の固形物に塩化チオニル（3mL）を0℃で添加した。反応混合物を1時間かけて80℃に加温した。反応の完了後、反応混合物を真空下で蒸発させることで、2-（3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル）-4H-チエノ[2,3-d][1,3]オキサジン-4-オンを茶色の粘性固形物（0.2g、定量）として得た。この粗製生成物をさらに精製することなく次の工程に使用した。

40

【0228】

工程4：2-（3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド）-N-〔2-（2-メトキシ

50

フェニル) エチル] チオフェン-3-カルボキサミド

2-(2-メトキシフェニル)エタン-1-アミン(0.1g、0.71mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(3mL)攪拌溶液に、2-(3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-4H-チエノ[2,3-d][1,3]オキサジン-4-オン(0.2g、0.71mmol)とトリエチルアミン(0.03mL、2.15mmol)を周囲温度で添加し、さらに1時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物を氷水(20mL)に注ぎ入れ、酢酸エチル(10mLで3回)で抽出した。有機相を水、ブライン溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で濃縮することで、粗製生成物を得た。粗製生成物を分取HPLC[(カラム: Inertsil C18(250mm×20mm×5mm)、移動相A: 水中で0.1% TFA; 移動相B: ACN、流速: 19mL/分)により精製した。純粋な画分を集め、真空下で蒸発させることで、2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-[2-(2-メトキシフェニル)エチル]チオフェン-3-カルボキサミド(0.04g、12%)を白色固形物として得た。LCMS(ES)m/z calcd. for C₂₁H₁₉ClN₂O₄S, 430.08; found, 431.1 (M+H); ¹H NMR(400MHz, DMSO-d₆) δ 13.20(s, 1H), 11.22(s, 1H), 8.56(s, 1H), 7.84(s, 1H), 7.70(d, J=8.4Hz, 1H), 7.46(t, J=5.6Hz, 1H), 7.20-7.14(m, 3H), 7.01-6.96(m, 2H), 6.94-6.83(m, 1H), 3.77(s, 3H), 3.47(d, J=8.0Hz, 2H), 2.83(t, J=8.6Hz, 2H)。

10


20

【0229】

実施例14: 2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェニル)-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾ[b]チオフェン-3-カルボキサミドの合成

【0230】

【化20】



30

【0231】

工程1: 3-クロロ-4-メトキシベンゾイルクロリドの合成

40

3-クロロ-4-メトキシ安息香酸(1g、5.36mmol)のジクロロメタン(10mL)攪拌溶液に、塩化オキサリル(2.11mL、10.7mmol)と触媒量のジメチルホルムアミド(0.15μL)を0°Cで添加した。得られた反応混合物を周囲温度で3時間攪拌した。反応の進行状況をTLCによりモニタリングした。反応の完了後、反応混合物を真空下で蒸発させることで、3-クロロ-4-メトキシベンゾイルクロリドを淡黄色固形物(1.05g)として得た。粗製生成物をそのまま次の工程に使用した。

【0232】

工程2: メチル2-(3-クロロ-4-メトキシベンズアミド)-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾ[b]チオフェン-3-カルボキシレート

50

メチル2-アミノ-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾ[b]チオフェン-3-カル

ボキシレート (0.72 g、3.41 mmol) のテトラヒドロフラン (5 mL) 攪拌溶液に、水素化ナトリウム (0.23 g、9.75 mmol) を 0℃ で添加し、得られた混合物を同温度で 30 分間攪拌した。これに、3-クロロ-4-メトキシベンゾイルクロリド (1 g、4.88 mmol) をテトラヒドロフラン (5 mL) に溶解したものを 0℃ で添加した。添加の完了後、反応混合物を 16 時間かけて 60℃ に加温した。次いで反応混合物を氷冷水 (50 mL) でクエンチし、酢酸エチル (75 mL で 2 回) で抽出した。有機相をブライン溶液 (25 mL) で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、真空下で蒸発させることで、粗製生成物を得た。粗製生成物を、酢酸エチル-ヘキサン勾配を用いたフラッシュクロマトグラフィー (生成物は約 18% の酢酸エチル-ヘキサンで溶出する) により精製した。精製により、メチル 2- (3-クロロ-4-メトキシベンズアミド) -4, 5, 6, 7-テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3-カルボキシレート (0.48 g、26%) として得た。LC-MS m/z calcd for $C_{18}H_{18}ClNO_4S$, 379.06; found 380.1 [M+H]⁺. [0233]

工程 3: 2- (3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド) -4, 5, 6, 7-テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3-カルボン酸の合成

メチル 2- (3-クロロ-4-メトキシベンズアミド) -4, 5, 6, 7-テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3-カルボキシレート (0.48 g、1.26 mmol) のジクロロメタン (2.0 mL) 攪拌溶液に、トリブロモボラン (6.2 mL、6.32 mmol) を 0℃ で添加した。反応混合物を周囲温度で 16 時間攪拌した。完了後、反応混合物を氷冷水 (25 mL) でクエンチし、ジクロロメタン (25 mL で 2 回) へと抽出した。有機相をブライン溶液 (20 mL) で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、真空下で蒸発させることで、2- (3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド) -4, 5, 6, 7-テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3-カルボン酸を茶色の粘性固形物 (0.38 g、85%) として得た。LC-MS m/z calcd for $C_{16}H_{14}ClNO_4S$, 351.03; found 352.1 [M+H]⁺. [0234]

工程 4: 2- (3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル) -5, 6, 7, 8-テトラヒドロ-4H-ベンゾ [4, 5] チエノ [2, 3-d] [1, 3] オキサジン-4-オン

2- (3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド) -4, 5, 6, 7-テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3-カルボン酸 (0.38 g、1.08 mmol) の固形物に塩化チオニル (10.0 mL) を 0℃ で添加した。反応混合物を 3 時間かけて 70℃ に加温した。反応の完了後、反応混合物を真空下で蒸発させることで、2- (3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル) -5, 6, 7, 8-テトラヒドロ-4H-ベンゾ [4, 5] チエノ [2, 3-d] [1, 3] オキサジン-4-オンを茶色の粘性固形物 (0.35 g) として得た。LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{16}H_{12}ClNO_3S$, 333.79; found, 334.1 (M+H)⁺. [0235]

工程 5: 2- (3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド) -N- (2-メトキシフェニル) -4, 5, 6, 7-テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3-カルボキサミド

2- (3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル) -5, 6, 7, 8-テトラヒドロ-4H-ベンゾ [4, 5] チエノ [2, 3-d] [1, 3] オキサジン-4-オン (0.38 g、1.14 mmol) の N, N-ジメチルホルムアミド (5 mL) 攪拌溶液に、トリエチルアミン (1.2 mL、3.42 mmol) と (2- (2-メトキシフェニル) エタン-1-アミン (0.17 g、1.14 mmol) を周囲温度で添加し、3 時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物を水 (20 mL) に注ぎ入れ、酢酸エチル (25 mL で 2 回) で抽出した。有機相を水、ブライン溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で濃縮することで、粗製生成物を得た。粗製生成物を逆相分取 HPLC [(カラム: Inertsil C-18 (250 mm × 20 mm × 5 μm)、移動相 A: 水中で 0.1% TFA、移動相 B: メタノール、流速: 19 mL/分) により精製した。純粋な画分を集

10

20

30

40

50

めて真空下で蒸発させることで、2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾ[b]チオフェン-3-カルボキサミドを白色固形物(4mg)として得た。LCMS(ES)m/z calcd. for C₂₅H₂₅ClN₂O₄S, 484.12; found, 485.0 (M+H)。¹H NMR(400MHz, DMSO-d₆) δ 12.41(s, 1H), 11.2(s, 1H), 7.79(s, 1H), 7.63-7.65(m, 1H), 7.32-7.39(m, 2H), 7.13-7.15(m, 2H), 6.94(d, J=8.0Hz, 1H), 6.84(t, J=6.8Hz, 1H), 3.77(s, 3H), 3.51-3.59(m, 2H), 2.83-2.89(m, 2H), 2.6-2.62(m, 2H), 1.68-1.91(m, 4H), 1.01-1.15(m, 2H)。


10

【0236】

実施例15: 2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)-6-メチル-4,5,6,7-テトラヒドロチエノ[2,3-c]ピリジン-3-カルボキサミドの合成

【0237】

【化21】



20

【0238】

工程1: メチル2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-6-メチル-4,5,6,7-テトラヒドロチエノ[2,3-c]ピリジン-3-カルボキシレート

メチル2-アミノ-6-メチル-4,5,6,7-テトラヒドロチエノ[2,3-c]ピリジン-3-カルボキシレート(0.01g、0.44mmol)のクロロベンゼン(3.00mL)攪拌溶液に、3-フルオロ-4-ヒドロキシ安息香酸(0.076g、0.44mmol)を添加し、トリクロロホスファen(0.019mL、0.22mmol)を反応混合物に滴加した。次いで反応物を130℃で16時間攪拌した。反応をTLCによりモニタリングした。反応物を室温に降温し、これに氷水(5.0mL)、飽和重炭酸ナトリウム溶液(2.0mL)を添加し、5分間攪拌した。得られた沈殿物を濾過して乾燥することで、メチル2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-6-メチル-4,5,6,7-テトラヒドロチエノ[2,3-c]ピリジン-3-カルボキシレートを淡黄色固形物(0.15g、85.9%)として得た。LCMS(ES)m/z calcd. for C₁₇H₁₇ClN₂O₄S, 380.06; found, 381.1 (M+H)。

30

【0239】

工程2: 2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)-6-メチル-4,5,6,7-テトラヒドロチエノ[2,3-c]ピリジン-3-カルボキサミド

メチル2-(3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-6-メチル-4,5,6,7-テトラヒドロチエノ[2,3-c]ピリジン-3-カルボキシレート(0.15g、0.394mmol)と2-(2-メトキシフェニル)エタン-1-アミン(0.197mL、0.394mmol)のトルエン(3.0mL)攪拌溶液を0℃で維持し、これにトリメチルアルマン(trimethylaluminum)(0.59mL、0.88mmol)を2分間かけて添加し、反応混合物を110℃で4時間攪拌した。反応をTLCによってモニタリングした。反応の完了後、反応混合物を氷冷水(10mL)によりクエ

40

50

ンチし、酢酸エチル（2 mLで10回）へと抽出した。有機相を水、ブライン溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で濃縮することで、粗製生成物を得た。粗製生成物をさらに分取HPLC〔（カラム：XBridge-18（250 mm×4.6 mm×5 μm）；移動相A：水中で0.1% TFA、移動相B：アセトニトリル；流速：19 mL／分〕により精製した。純粋な画分を集めて真空下で蒸発させることで、2-（3-クロロ-4-ヒドロキシベンズアミド）-N-（2-メトキシフェネチル）-6-メチル-4,5,6,7-テトラヒドロチエノ〔2,3-c〕ピリジン-3-カルボキサミド（0.024 g、12.15%）を白色固形物として得た。LCMS（ES） m/z calcd. for $C_{25}H_{26}ClN_3O_4S$, 449.13; found, 498.2, (M-H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.21 (s, 1H), 11.20 (s, 1H), 10.06 (s, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.69 (d, J=8.0 Hz, 2H), 7.15 (d, J=8.0 Hz, 2H), 6.96 (d, J=7.2 Hz, 1H), 6.85 (d, J=6.8 Hz, 1H), 4.27 (m, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.54 (s, 4H), 2.92 (m, 7H).

10


【0240】

実施例16：2-（3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド）-N-（2-メトキシフェネチル）-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボキサミドの合成

【0241】

【化22】

20



30

【0242】

工程1：メチル2-アミノ-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボキシレート

2-アミノ-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボキシレート（0.5 g、2.92 mmol）のテトラヒドロフラン（5.0 mL）攪拌溶液に、ジトリクロロメチルカーボネート固形物（1.30 g、4.38 mmol）を0℃で添加した。反応混合物を60℃で16時間加温した。反応の完了後、反応混合物を真空下で蒸発させ、得られた固形物をジエチルエーテル（25 mLで2回）で洗浄し、真空下で乾燥することで、5,6-ジメチル-2H-チエノ〔2,3-d〕〔1,3〕オキサジン-2,4（1H）-ジオンを赤茶色固形物（0.45 g）として得た。LCMS（ES） m/z calcd. for $C_8H_7NO_3S$, 197.0; found, 198.0 (M+H).

40

【0243】

5,6-ジメチル-2H-チエノ〔2,3-d〕〔1,3〕オキサジン-2,4（1H）-ジオン（0.3 g、1.52 mmol）のメタノール（5.0 mL）攪拌溶液に、25%ナトリウムメトキシドのメタノール（1.22 mL、7.61 mmol）溶液を0℃で添加した。反応混合物を周囲温度で16時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物を真空下で蒸発させることで粗製生成物を得た。粗製生成物を、ヘキサン勾配で酢酸エチルを用いたフラッシュクロマトグラフィー（必要な生成物は約10%の酢酸エチル-ヘキサンで溶出する）により精製した。精製により、メチル2-アミノ-4,5-ジメチルチオフ

50

エン-3-カルボキシレートを白色固形物 (0.2 g、70.9%) として得た。LCMS m/z calcd for $C_8H_{11}NO_2S$, 185.0; found 186.1 [M+H]。

【0244】

工程2: メチル2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボキシレート

メチル2-アミノ-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボキシレート (0.1 g、0.54 mmol) のクロロベンゼン (3.00 mL) 攪拌溶液に、3-フルオロ-4-ヒドロキシ安息香酸 (0.084 g、0.54 μ mol) を添加した。これにトリクロロホスファン (0.023 mL、0.27 mmol) を滴加した。次いで反応物を130℃で16時間攪拌した。反応をTLCによりモニタリングした。反応物を室温に降温し、これに氷水 (5.0 mL)、飽和炭酸水素ナトリウム溶液 (2.0 mL)、および6N HCl水溶液 (2.0 mL) を添加し、5分間攪拌した。濾過後に観察した沈降反応により、メチル2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボキシレートを淡黄色固形物 (0.15 g、85.93%) として得た。LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{15}H_{14}FNO_4S$, 323.06; found, 324.1 (M+H)。

10

【0245】

工程3: 2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボン酸

メチル2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボキシレート (0.15 g、0.46 mmol) のテトラヒドロフラン: 水: メタノール (4:1:1、5.0 mL) 溶液を、室温で5分間攪拌し、水酸化リチウム粉体溶液 (0.058 g、1.39 mmol) を添加し、室温で1時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物を真空下で濃縮し、得られた残渣を水 (5 mL) で希釈し、1N HClで酸性化することでpHを約4.0とした。沈殿した固形物を濾過し、n-ペンタン (20 mL) で洗浄することで、2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボン酸をオフホワイト固形物 (0.07 g、48.7%) として得た。LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{14}H_{12}FNO_4S$, 309.05; found, 310.1 (M+H)。

20

30

【0246】

工程4: 2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)-5,6-ジメチル-4H-チエノ[2,3-d][1,3]オキサジン-4-オン

2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボン酸 (0.07 g、0.22 mmol) の固形物に塩化チオニル (2.0 mL) を0℃で添加した。反応混合物を2時間かけて80℃に加温した。反応をTLCによりモニタリングした。反応の完了後、反応混合物を真空下で蒸発させることで、2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)-5,6-ジメチル-4H-チエノ[2,3-d][1,3]オキサジン-4-オン (0.095 g) を得た。LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{14}H_{10}FNO_3S$, 291.0; found, 292.1 (M+H)。

40

【0247】

工程5: 2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド)-N-(2-メトキシフェネチル)-4,5-ジメチルチオフエン-3-カルボキサミドの合成

2-(2-メトキシフェニル)エタン-1-アミン (0.050 g、0.33 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (2 mL) 攪拌溶液に、2-(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル)-5,6-ジメチル-4H-チエノ[2,3-d][1,3]オキサジン-4-オン (0.096 g、0.33 mmol) とトリエチルアミン (0.13 mL、0.992 mmol) を周囲温度で添加し、さらに1時間攪拌した。反応の完了後、反応混合物を氷水 (5 mL) に注ぎ入れ、酢酸エチル (10 mLで3回) へと抽出した。有

50

機相を水、ブライン溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、真空下で濃縮することで、粗製生成物を得た。粗製生成物をさらに分取HPLC（カラム：X Bridge C-18（250mm×20mm×5μm）；移動相A：水中で0.1%アンモニア、移動相B：ACN；流速：19.0mL／分）により精製した。純粋な画分を集め、真空下で蒸発させることで、2-（3-フルオロ-4-ヒドロキシベンズアミド）-N-N-[2-（2-メトキシフェニル）エチル]-4,5-ジメチルチオフェン-3-カルボキサミド（0.027g、18.4%）を白色固形物として得た。LCMS（ES） m/z calcd. for $C_{23}H_{23}FN_2O_4S$, 442.1; found, 443.2, (M+H). ^1H NMR (400MHz, DMSO-d₆) δ 12.04 (s, 1H), 10.77 (s, 1H), 7.57 (d, J=12Hz, 2H), 7.51 (d, J=8.4Hz, 1H), 7.13 (m, 3H), 6.93 (d, J=8.4Hz, 1H), 6.82 (t, J=14.4Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.52 (m, 2H), 2.84 (t, J=14.0Hz, 2H), 2.30 (s, 3H), 2.09 (s, 3H)。

10

【0248】

以下の化合物を、実施例1および10～16に記載の方法と実験手順を使用して合成した。

【0249】

20

30

40

50

【表 4 - 1】

Ex.	スペクトルデータ
17	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{21}H_{18}Cl_2N_2O_4S$, 464.04; found, 465.2 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.12 (s, 1H), 11.16 (s, 1H), 8.48 (s, 1H), 8.03 (s, 1H), 7.83 (s, 1H), 7.68 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.19 – 7.13 (m, 3H), 6.95 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 6.85 (t, J = 14.4 Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.43 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 2.81 (t, J = 14.0 Hz, 2H).
18	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{18}H_{20}F_2N_2O_3S$, 382.12; found, 383.2 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.13 (s, 1H), 11.2 (s, 1H), 8.32 (s, 1H), 8.03 (d, J = 3.6 Hz, 1H), 7.77 (d, J = 5.6 Hz, 1H), 7.50 (s, 2H), 2.63 (t, J = 36.4 Hz, 2H), 1.46 (t, J = 8.4 Hz, 2H), 0.93 (s, 9H).
19	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{21}H_{22}FN_3O_3S$, 415.14; found, 416.3 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 10.72 (s, 1H), 10.43 (s, 1H), 9.31 (s, 1H), 8.52 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 8.35 (br s, 1H), 7.87 (d, J = 12.0 Hz, 1H), 7.73 (dd, J_1 = 8.4 Hz, J_2 = 14.4 Hz, 2H), 7.11 (t, J = 8.4 Hz, 1H), 3.26 (t, J = 6.4 Hz, 2H), 1.38 (t, J = 10.8 Hz, 2H), 0.85 (s, 9H).
20	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{22}H_{21}ClN_2O_4S$ 444.09; found, 445.2 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO d_6) δ 11.07 (s, 1H), 10.04 (s, 1H), 8.26 (s, 1H), 7.88 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 7.65 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 7.29 (s, 1H), 7.20 – 7.05 (m, 3 H), 6.95 – 6.85 (m, 3H), 3.76 (s, 3H), 3.61 (s, 2H), 3.35 (m, 2H), 2.78 (m, 2H).
21	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{20}H_{18}ClN_3O_4S$, 431.07; found, 432.1 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.67 (s, 1H), 11.90 (s, 1H), 8.42 (s, 1H), 7.93-7.98 (m, 3H), 7.78 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.11-7.17 (m, 2H), 6.94 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 6.14 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.43 (t, J = 6.4 Hz, 2H), 2.81 (m, 2 H)
22	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{24}H_{23}FN_2O_5S$ 470.13; found, 471.2 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO d_6) δ 12.24 (s, 2 H), 8.45 (t, J = 12 Hz, 1 H), 8.04 (d, J = 4 Hz, 1 H), 7.76 (d, J = 4 Hz, 1 H), 7.65 – 7.53 (m, 3 H), 7.18 – 7.12 (m, 2 H), 6.94 (d, J = 8 Hz, 1 H), 6.84 (t, J = 12 Hz, 1 H), 3.76 (s, 3 H), 3.47-3.44 (q, J = 6.4 Hz, 2 H), 2.91 (t, J = 16 Hz, 2 H), 2.82 (t, J = 12 Hz, 2 H), 2.58 (t, J = 16 Hz, 2 H).
23	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{24}H_{25}ClN_2O_4S$, 472.12; found, 473.2 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.18 (s, 1H), 9.95 (s, 1H), 8.38 (t, J = 4.8 Hz, 1H), 8.03 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 7.70-7.75 (m, 3H), 7.12-7.18 (m, 2H), 6.94 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 6.84 (t, J = 7.2 Hz, 1H) 3.77 (s, 3H), 3.45 (q, J = 6.4 Hz, 2H), 3.27-3.34 (m, 1H), 2.83 (t, J = 6.8 Hz, 2H), 1.21 (d, J = 6.8 Hz, 6H).
24	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{28}H_{24}ClN_3O_6S_2$ 597.08; found, 598.3 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.24 (s, 1H), 8.45 (s, 1H), 8.36 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 8.01 (m, 2H), 7.91 (m, 2H), 7.78 (d, J = 5.2 Hz 1H), 7.5 (m 1H), 7.4 (m, 2H), 7.15 (m, 2H), 6.9 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 6.82 (t, J = 14.4 Hz, 1H), 3.75 (s, 3H), 3.44 (d, J = 6.8 Hz, 2H), 2.81 (t, J = 14.4 Hz, 2H).
25	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{23}H_{19}ClF_2N_2O_6S$, 524.06; found, 525.2 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.21 (s, 1H), 8.42 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 8.02 (s, J = 5.2 Hz, 2H), 7.88 (t, J = 10.8 Hz, 1H), 7.77 (d, J = 5.6 Hz, 1H), 7.6 (d, J = 8.4 Hz 1H), 7.15 (m, 2H), 6.93 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 6.83 (t, J = 14.8 Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.45 (m, 2H), 2.82 (t, J = 14.8 Hz ,2H).
26	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{21}H_{20}ClN_3O_5S_2$ 493.05; found, 494.2 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.26 (s, 1H), 8.46 (s, 1H), 8.17 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.02 (s, 2H), 7.96 (d, J = 8.4 Hz 1H), 7.78 (s, 3H), 7.18-7.12 (m, 2H), 6.94 (d, J = 8.4, 1H), 6.85-6.82 (m, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.47-3.43 (m, 2 H), 2.83 (d, J = 7.2 Hz, 2 H).
27	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{23}H_{19}F_3N_2O_5S$ 492.1; found, 493.2 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO d_6) δ 12.28 (s, 1H), 8.46 (t, J = 5.6 Hz, 1H), 8.03 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 7.93 – 7.78 (m, 4H), 7.18 – 7.12 (m, 2 H), 6.93 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 6.83 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.47-3.33 (m, 2H), 2.83 (t, J = 7.6 Hz, 2 H).
28	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{22}H_{19}ClN_4O_3S$, 454.09; found, 455.2 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 13.64 (s, 1H), 12.32 (s, 1H), 8.41 (s, 1H), 8.23 (s, 1H), 8.10 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 7.96 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 7.76 (t, J = 5.6 Hz, 2H), 7.18 -7.13 (m, 2H), 6.94 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 6.84 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.47 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 2.83 (t, J = 7.6 Hz, 2H).

10

20

30

40

【 0 2 5 0 】

【表 4 - 2】

Ex.	スペクトルデータ
29	LCMS (ES) m/z calcd. For $C_{26}H_{26}ClN_3O_3S$, 527.1; found, 528.3 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 12.47 (s, 1H), 12.12 (s, 1H), 8.36 (t, $J=5.2$ Hz, 1H), 8.06 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 7.78 (d, $J=1.6$ Hz, 1H), 7.74 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 7.69 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.19-7.12 (m, 2H), 7.03 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 6.95 (d, $J=8$ Hz, 1H), 6.84 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.75-3.65 (m, 1H), 3.54-3.44 (m, 3H), 3.17-3.10 (m, 1H), 2.82 (t, $J=6.8$ Hz, 2H), 2.20-2.05 (m, 3H).
30	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{21}H_{19}FN_2O_4S$, 414.1; found, 415.1 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.13 (s, 1H), 10.77 (s, 1H), 8.40 (s, 1H), 8.04 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 7.74 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 7.63-7.56 (m, 2H), 7.19-7.12 (m, 3H), 6.94 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 6.84 (t, $J=14.4$, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.44 (d, $J=6.8$ Hz, 2H), 2.8 (d, $J=6.4$ Hz, 2H).
31	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{25}H_{21}ClN_2O_4S$, 480.09; found, 480.9 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 10.92 (s, 1H), 10.35 (s, 1H), 8.16 (s, 1H), 8.06 (s, 1H), 7.98 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.83 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 7.69 (d, $J=8.0$ Hz, 1H), 7.48-7.38 (m, 2H), 7.13-7.04 (m, 3H), 6.89 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 6.74 (t, $J=7.6$ Hz, 1H), 3.73 (s, 3H), 3.41-3.31 (m, 2H), 2.73 (t, $J=7.2$ Hz, 2H).
32	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{21}H_{18}Cl_2N_2O_4S$, 464.0; found, 464.9 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.09 (s, 1H), 11.10 (s, 1H), 8.40 (s, 1H), 7.99 (d, $J=5.2$ Hz, 1H), 7.75 (m, 3H), 7.11-7.18 (m, 2H), 6.93 (d, $J=8$ Hz, 1H), 6.83 (t, $J=7$ Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.45 (d, $J=5.2$ Hz, 2H), 2.81 (m, 2H).
33	LCMS (ES) m/z calcd. For $C_{22}H_{19}F_3N_2O_4S$, 464.1; found, 465.0 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ 12.18 (s, 1H), 11.47 (s, 1H), 8.39 (s, 1H), 8.04 (d, $J=5.2$ Hz, 2H), 7.96 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 7.74 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 7.12-7.20 (m, 2H), 6.93 (m, $J=7.6$ Hz, 1H), 6.83 (t, $J=7.6$, 2H), 3.76 (s, 3H), 3.44 (d, $J=6.8$ Hz, 2H), 2.81 (t, $J=7.2$ Hz, 2H).
34	LCMS (ES): m/z calcd. For $C_{20}H_{14}Cl_2F_2N_2O_3S$, 470.0; found 469.0 (M-H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 12.06 (s, 1H), 10.84 (s, 1H), 8.58-8.52 (m, 1H), 8.02 (s, 1H), 7.60-7.53 (m, 2H), 7.4 -7.34 (m, 2H), 7.16 - 7.10 (m, 2H), 3.49 (m, 2H), 2.94-2.91 (m, 2H).
35	LCMS (ES): m/z calcd. For $C_{21}H_{14}ClF_3N_2O_3S$, 466.0; found 467.0 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 11.93 (s, 1H), 11.25 (s, 1H), 9.17 (s, 1H), 8.00 (s, 1H), 7.49 (d, 8.8 Hz, 2H), 7.27-7.24 (m, 2H), 7.13-7.08 (m, 2H), 1.29-1.27 (m, 4H).
36	LCMS (ES): m/z calcd. For $C_{20}H_{14}Cl_3FN_2O_3S$, 485.98; found 487.0 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 12.05 (s, 1H), 10.84 (s, 1H), 8.52 (s, 1H), 8.02 (s, 1H), 7.61-7.53 (m, 3H), 7.34 (s, 2H), 7.14-7.10 (m, 1H), 3.50-3.46 (m, 2H), 2.95-2.92 (m, 2H).
37	LCMS (ES): m/z calcd. For $C_{19}H_{22}ClFN_4O_3S$, 440.1; found 441.2 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 12.08 (s, 1H), 10.8 (s, 1H), 8.33 (s, 1H), 8.01 (s, 1H), 7.63-7.55 (m, 2H), 7.14 -7.07 (m, 1H), 3.55 (m, 2H, merged with water peak), 2.44 (m, 8H), 2.31 (m, 2H), 2.11 (s, 3H).
38	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{18}H_{19}ClFN_3O_4S$, 427.08; found, 428.1 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 12.09 (s, 1H), 10.84 (s, 1H), 8.37-8.35 (m, 1H), 8.01 (s, 1H), 7.63-7.55 (m, 2H), 7.14-7.10 (m, 1H), 3.54 (t, $J=4.4$ Hz, 4H), 3.37-3.30 (m, 2H), 2.44-2.41 (m, 2H), 2.31-2.29 (m, 4H).
39	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{20}H_{14}ClF_3N_2O_3S$, 454.04; found, 455.0 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 12.0 (s, 1H), 10.84 (s, 1H), 8.56-8.53 (m, 1H), 8.02 (s, 1H), 7.59 (d, $J=12$ Hz, 1H), 7.54 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 7.36-7.29 (m, 1H), 7.18-7.10 (m, 2H), 7.01- 7.69 (t, $J=8$ Hz, 1H) 3.46-3.42 (m, 2H), 2.83 (t, $J=6.8$ Hz, 2H).
40	LCMS (ES) m/z calcd. for $C_{21}H_{15}Cl_2F_3N_2O_4S$, 518; found, 519 (M+H). ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 13.17 (s, 1H), 11.29 (s, 1H), 8.64-8.62 (m, 1H), 7.82-7.80 (m, 1H), 7.70-7.68 (m, 1H), 7.51 (s, 1H), 7.44-7.42 (m, 1H), 7.35-7.32 (m, 3H), 7.16 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 3.35-3.48 (m, 2H), 2.92 (t, $J=7$ Hz, 2H).
41	LCMS (ES) m/z calcd. For $C_{18}H_{19}ClFN_3O_4S$, 427.08; found, 428.1 (M+H).

10

20

30

40

【 0 2 5 1 】

【表 4 - 3】

Ex.	スペクトルデータ
	¹ H NMR (400 MHz, DMSO-d ₆): δ 12.97 (s, 1H), 11.02 (s, 1H), 9.48 (bs, 1H), 8.71 (bs, 1H), 7.63-7.55 (m, 1H), 7.49 (s, 1H), 7.15 (t, <i>J</i> = 8 Hz, 1H), 4.02-3.99 (m, 2H), 3.64-3.56 (m, 4H), 3.35-3.30 (m, 4H) DMSO-水のピークと統合), 3.15-3.16 (m, 2H).
42	LCMS (ES) <i>m/z</i> calcd. For C ₁₉ H ₂₂ ClFN ₄ O ₃ S, 440.1; found, 441.2 (M+H). ¹ H NMR (400 MHz, DMSO-d ₆): δ 13.16 (s, 1H), 11.00 (s, 1H), 9.48 (bs, 2H), 8.50 (bs, 1H), 7.62-7.53 (m, 2H), 7.15 (t, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1H), 3.76 (m, 4H、DMSO-水のピークと統合), 3.45-3.44 (m, 4H), 3.15-3.12 (m, 2H), 3.0-2.96 (m, 2H), 2.74 (s, 3H).
43	LCMS (ES) <i>m/z</i> calcd. For C ₂₀ H ₁₅ ClF ₂ N ₂ O ₃ S, 436.05; found, 437.1 (M+H). ¹ H NMR (400 MHz, DMSO-d ₆) δ 13.15 (s, 1H), 10.96 (s, 1H), 8.61 (t, <i>J</i> = 5.6 Hz, 1H), 7.61 (dd, <i>J</i> = 2.4 Hz, <i>J</i> = 8.0 Hz, 1H), 7.55 (dd, <i>J</i> = 2.0 Hz, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 7.51 (s, 1H), 7.33-7.22 (m, 2H), 7.18-7.10 (m, 3H), 3.50 (t, <i>J</i> = 6.4 Hz, 2H), 2.88 (t, <i>J</i> = 6.8 Hz, 2H).
44	LCMS (ES) <i>m/z</i> calcd. for C ₂₁ H ₁₄ ClF ₅ N ₂ O ₃ S, 504.03; found, 505.0 (M+H), ¹ H NMR (400 MHz, DMSO-d ₆) δ 12.01 (s, 1H), 11.28 (s, 1H), 8.63 (bs, 1H), 7.97 (s, 1H), 7.68-7.66 (m 1H), 7.59-7.57 (m, 1H), 7.50-457.41 (m, 3H) 3.52-3.44 (m, 2H), 3.02 (t, <i>J</i> = 8.0 Hz, 2H).
45	LCMS (ES) <i>m/z</i> calcd. for C ₂₁ H ₁₅ Cl ₂ F ₃ N ₂ O ₃ S, 502.01; found, 503.0 (M+H), ¹ H NMR (400 MHz, DMSO-d ₆) δ 12.05 (s, 1H), 11.16 (s, 1H), 8.62-8.59 (m, 1H), 8.05 (s, 1H), 7.84 (d, <i>J</i> = 2.0 Hz, 1H), 7.71-7.60 (m, 3H), 7.51-7.49 (m, 1H), 7.45-7.41 (m, 1H), 7.12 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1H), 3.52 (q, <i>J</i> = 7.2 Hz, 2H), 3.03 (t, <i>J</i> = 7.2 Hz, 2H).
46	LCMS (ES) <i>m/z</i> calcd. for C ₂₁ H ₁₅ ClF ₄ N ₂ O ₄ S, 502.04; found, 503.0 (M+H). ¹ H NMR (400 MHz, DMSO-d ₆) δ 10.95 (s, 1H), 8.62 (t, <i>J</i> = 5.6 Hz, 1H), 7.65-7.57 (m, 2H), 7.53 (s, 1H), 7.46 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1H), 7.38-7.34 (m, 3H), 7.20-7.16 (m, 1H), 3.53 (q, <i>J</i> = 6.4 Hz, 2H), 2.95 (t, <i>J</i> = 7.2 Hz, 2H).
47	LCMS (ES) <i>m/z</i> calcd. for C ₁₈ H ₂₀ ClFN ₂ O ₃ S, 398.09; found, 399.2 (M+H). NMR (400 MHz, DMSO-d ₆) δ 12.14 (s, 1H), 11.42 (s, 1H), 8.34 (t, <i>J</i> = 10 Hz, 1H), 8.0 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.76 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.71 (s, 1H), 7.634 (d, <i>J</i> = 10.8 Hz, 1H), 3.28 (bs, 2H), 1.44 (t, <i>J</i> = 8.4 Hz, 2H), 0.92 (s, 9H).
48	LCMS (ES) <i>m/z</i> calcd. For C ₂₀ H ₁₇ ClN ₂ O ₄ S, 416.06; found, 417.2 (M). ¹ H NMR (400 MHz, DMSO-d ₆) δ 11.97 (s, 1H), 11.02 (s, 1H), 8.52 (d, <i>J</i> = 8 Hz 1H), 7.99 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz 1H), 7.75 (m, 2H), 7.63 (dd, <i>J</i> _a = 2.4 Hz, <i>J</i> _b = 2 Hz, 1H), 7.33 (d, <i>J</i> = 7.2 Hz, 2H), 7.25 (t, <i>J</i> = 7.2 Hz, 2H), 7.17 (d, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1 H), 7.05 (d, <i>J</i> = 8.8 Hz, 1 H), 5.08 (d, <i>J</i> = 5.6 Hz, 1 H), 4.9 (s, 1H), 3.64 (m, 2 H).
49	LCMS (ES) <i>m/z</i> calcd. For C ₂₀ H ₁₇ ClN ₂ O ₄ S, 416.06, found, 415.1 (M-H). ¹ H NMR (400 MHz, DMSO-d ₆) δ 12.05 (s, 1H), 11.08 (s, 1H), 8.59 (d, <i>J</i> = 8 Hz, 1H), 8.07 (d, <i>J</i> = 5.2 Hz, 1H), 7.84 - 7.82 (m, 2H), 7.68 (dd, <i>J</i> = 8), 7.41 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 2H), 7.34 (t, <i>J</i> = 7.2 Hz, 2H), 7.24 (m, <i>J</i> = 7.6 Hz, 1 H), 7.13 (d, <i>J</i> = 8.4 Hz, 1 H), 5.15 (m, 1 H), 4.94 (t, <i>J</i> = 6.0 Hz, 1 H), 3.72 (m, 2 H).

10

20

30

【 0 2 5 2 】

実施例 A : H S D 1 7 s 1 3 活性の評価と阻害剤の特定における N A D H 検出アッセイ

蛍光ベースのロイコトリエン B 3 (L T B 3) アッセイにおいて、基質 L T B 3 の脱水素反応中に N A D + から生成した N A D H の蛍光をモニタリングする。3 8 4 ウェルプレート (G r e i n e r ; # 6 5 5 0 7 6) 中、試薬として 2 5 μ M L T B 3 (C a y m a n ; # 2 0 1 0 9) 、 3 m M N A D + (S i g m a ; # N 0 6 2 3) 、 1 2 5 n M H S D 1 7 B 1 3 酵素 (院内 ; 大腸菌は H i s タグ付きの精製された可溶性タンパク質を発現した) 、 p H 7 . 4 1 M リン酸カリウム緩衝液、および 1 % D M S O を含有する 2 0 μ l 反応体積 (最終濃度) で、反応を行った。N A D + と酵素を同時添加することで反応を開始し、2 6 . 5 ° C で 1 時間モニタリングした。N A D H の生成は、1 時間での蛍光シグナル (励起 3 4 0 n m 、発光 4 4 5 n m) から t = 0 でのベースライン蛍光を減算したものと測定した。L T B 3 (陰性対照値) がいない状態での蛍光シグナルはすべての値から減算し、その結果、N A D H の基質依存性の産生が反映された。相対蛍光単位の酵素活性速度への変換を可能とするための N A D H 標準を含めた。被験化合物が存在する状態

40

50

での酵素活性は未阻害酵素活性の割合として表し、阻害剤濃度に対してプロットを行った。4つのパラメータ・ロジスティック・モデルとMicrosoft Excel Solver（登録商標）ソフトウェアを用いて、非線形回帰を行った。10個の阻害剤濃度に対し二通りに試験を行った（30 μM～2.5 nMの範囲）。2つの独立した濃度応答アッセイを行って幾何平均を報告し、=／－SEMであった。

【0253】

実施例B：HSD17s13活性の評価と阻害剤の特定におけるエストロン検出アッセイ
液体クロマトグラフィー／質量分析法（LC／MS）エストロン検出アッセイにより、HSD17B13によるエストラジオールからエストロンへの変換をモニタリングする。本アッセイは、96wpフォーマット（Eppendorf deep well Plate 96／500）で、4 μMエストラジオール（E2；Cayman；#10006315）、6 mM NAD⁺（Sigma；#N0623）、および30 nM HSD17B13酵素（院内；大腸菌はHisタグ付の精製された可溶性タンパク質を発現した）を含有する80 μl反応体積中、pH 7.4の1 Mリン酸カリウム緩衝液と0.5 %ビヒクル（DMSO）において実施した。反応物を26.5 °Cで2時間インキュベートし、エストラジオール（E2）からエストロン（E1）への変換を、LCMS等級の試薬を用いてE1に対しLC－MS／MSに基づく分析物検出により定量した。内部標準として重水素化（D4）－E1（Clear Synth；#CS－T－54273；500 ng／mLの最終濃度）を含有する2体積のアセトニトリル（MeCN；LCMS等級；CAS #75／05／8）を添加することで、反応を終了した。試料を事前に用意したBond Elut－C18抽出カートリッジ（3 mL；Agilent；#12102028）に適用し、洗浄し、MeCN中で溶出した。溶出物を窒素の下で乾燥させ、60 %メタノール（LCMS等級のメタノール；CAS #67／56／1）中で再懸濁させてから、解析に提出した。定量化にE1の標準曲線を含めた。試料の解析は、XBridge BEH C18カラム（Waters；#186003033）上、MeCN中の0.1 %ジエチルアミン（移動相A；DEA CAS #109－89－7）とmilli-Q水中の0.1 %ジエチルアミン（移動相B）を用いて、最大25 % Bで3分の勾配において行った。MRM解析を使用してネガティブモードで分析物を検出し、E2のRTは1.85分、E1のRTは2分であった。NAD⁺の不在下での酵素活性を試料から減算し、特異的酵素活性の値を得た。被験試料が存在する状態での酵素活性は未阻害酵素活性の割合として表し、阻害剤濃度に対してプロットを行った。GraphPad Prismソフトウェア（GraphPad Software, La Jolla, CA）上で厳格な結合阻害剤についてのモリソン方程式（以下を参照）を用いて、非線形回帰を行った。精査はすべて、抽出プロセス中にプールされた後にLC－MS／MS解析において複製として注入された複製評価で行った。

【0254】

モリソン方程式：
$$Y = V_o * (1 - (((E_t + X + Q) - (((E_t + X + Q)^2 - 4 * E_t * X)^{0.5})) / (2 * E_t)))$$

【0255】

Y = 阻害剤存在下での活性、V_o = 阻害剤不在下での活性、E_t = 合計酵素濃度、X = 阻害剤濃度、Q = (K_i * (1 + (S / K_m)))、式中、K_iは阻害定数であり、K_mはミハエリス定数であり、Sは基質濃度である。

【0256】

両実施例に関するデータを下記の表2に示す。

【0257】

10

20

30

40

50

【表 5 - 1】

表 2:

Ex.	LTB3 での IC ₅₀ (μM)	エストラジオールでの IC ₅₀ (μM)
1	A	A
2	A	A
3	A	A
4	A	A
5	A	B
6	A	A
7	A	B
8	A	A
9	A	A
10	D	D
11	D	NT
12	B	B
13	A	A
14	B	B
15	NT	B
16	A	A
17	A	A
18	A	A
19	D	B
20	D	B
21	D	NT
22	D	NT
23	D	NT
24	D	C
25	D	C
26	D	D
27	D	D
28	D	D
29	D	C
30	A	A
31	A	B
32	A	A
33	D	A
34	NT	B
35	NT	A
36	NT	A
37	NT	B
38	NT	A
39	NT	A
40	NT	A
41	NT	B
42	NT	C
43	NT	A
44	NT	A
45	NT	A
46	NT	A
47	NT	A
48	NT	B
49	NT	A

10

20

30

40

【 0 2 5 8 】

50

【表 5 - 2】

LTB3 での IC ₅₀	エストラジオールでの IC ₅₀
A は 1 μ M 以下。 B は 1 μ M 超で 5 μ M 以下。 C は 5 μ M 超で 10 μ M 以下。 D は 10 μ M 超。 NT: 試験せず	A は 0.1 μ M 以下。 B は 0.1 μ M 超で 1 μ M 以下。 C は 1 μ M 超で 10 μ M 以下。 D は 10 μ M 超。 NT: 試験せず

10

20

30

40

50

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US2021/042960
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER A61P 1/16 (2006.01) C07D 333/38 (2006.01) C07D 333/68 (2006.01) C07D 409/12 (2006.01) C07D 495/04 (2006.01)		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) STN - REGISTRY, CAPLUS, CASLINK: Structure search based on Formulas (I) and (IV), and (II) and (V) and key words: HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE or HSD17B13 APPLICANT/INVENTOR SEARCH: Internal databases and Espacenet		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	Documents are listed in the continuation of Box C	
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C ☒ See patent family annex		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "D" document cited by the applicant in the international application earlier application or patent but published on or after the international filing date "E" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "L" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "O" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 20 September 2021		Date of mailing of the international search report 20 September 2021
Name and mailing address of the ISA/AU AUSTRALIAN PATENT OFFICE PO BOX 200, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA Email address: pct@ipaaustralia.gov.au		Authorised officer Zalihe Hakki AUSTRALIAN PATENT OFFICE (ISO 9001 Quality Certified Service) Telephone No. +61262832888

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No.
C (Continuation).		PCT/US2021/042960
DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CAS Registry Number: 1797791-87-7; STN Entry Date: 09 Jul 2015; 2-[(3-Chloro-4-ethoxy-5-methoxybenzoyl)amino]-N-cyclopropyl-3-thiophenecarboxamide Whole document	56, 57, 60, 61, 64-69, 74-79
X	CAS Registry Number: 880868-41-7; STN Entry Date: 18 Apr 2006; 2-[[3,5-Dichloro-4-(heptyloxy)benzoyl]amino]-N-(3-ethoxypropyl)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxamide Whole document	56, 57, 60-62, 64, 71-79, 82-87
X	CAS Registry Number: 926767-04-6; STN Entry Date: 18 Mar 2007; 2-[(3-Chloro-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-N-(phenylmethyl)benzo[b]thiophene-3-carboxamide Whole document	56, 57, 60, 61, 64, 71-82
X	CAS Registry Number: 1301072-73-0; STN Entry Date: 26 May 2011; 2-[(3-Chloro-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-N-cyclopropyl-3-thiophenecarboxamide Whole document	56, 57, 60, 61, 64-69, 74-79
X	CAS Registry Number: 880864-93-7; STN Entry Date: 18 Apr 2006; 2-[(4-Butoxy-3,5-dichlorobenzoyl)amino]-5,6-dihydro-N-(2-phenylethyl)-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxamide Whole document	56, 57, 60-62, 64, 71-82
X	CAS Registry Number: 882395-05-3; STN Entry Date: 01 May 2006; 2-[(3-Chloro-4-methoxybenzoyl)amino]-5,6-dihydro-N-(3-pyridinylmethyl)-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxamide Whole document	56, 57, 60-63, 71-80, 82
X	CAS Registry Number: 880867-58-3; STN Entry Date: 18 Apr 2006; 2-[[3,5-Dichloro-4-(hexyloxy)benzoyl]amino]-N-(3-ethoxypropyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide Whole document	56, 57, 60-62, 64, 71-79, 82-87
X	CAS Registry Number: 880862-54-4; STN Entry Date: 18 Apr 2006; 2-[(3,5-Dichloro-4-methoxybenzoyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-N-[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]benzo[b]thiophene-3-carboxamide Whole document	56, 57, 60-62, 64, 71-79, 82
X	CAS Registry Number: 880862-64-6; STN Entry Date: 18 Apr 2006; 2-[(3,5-Dichloro-4-methoxybenzoyl)amino]-5,6-dihydro-N-(2-phenylethyl)-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxamide Whole document	56, 57, 60, 61, 64, 71-82
A	US 2009/0023710 A1 (Vicker et al.) 22 January 2009 [0014], page 2; claims 43-50	1-125
Form PCT/ISA/210 (fifth sheet) (July 2019)		

10

20

30

40

50

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US2021/042960

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
the subject matter listed in Rule 39 on which, under Article 17(2)(a)(i), an international search is not required to be carried out, including
2. ☒ Claims Nos.: **115**
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
See Supplemental Box
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a)

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT	International application No. PCT/US2021/042960
Supplemental Box	
Continuation of Box II Claim 115 does not comply with Rule 6.2(a) because it relies on references to the description and/or drawings. Form PCT/ISA/210 (Supplemental Box) (July 2019)	

10

20

30

40

50

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No.	
Information on patent family members		PCT/US2021/042960	
This Annex lists known patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The Australian Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.			
Patent Document/s Cited in Search Report		Patent Family Member/s	
Publication Number	Publication Date	Publication Number	Publication Date
US 2009/0023710 A1	22 January 2009	US 2009023710 A1	22 Jan 2009
		US 8119627 B2	21 Feb 2012
		CA 2613226 A1	11 Jan 2007
		EP 1960347 A2	27 Aug 2008
		EP 1960347 B1	20 Jun 2012
		WO 2007003934 A2	11 Jan 2007
End of Annex			
Due to data integration issues this family listing may not include 10 digit Australian applications filed since May 2001.			
Form PCT/ISA/210 (Family Annex)(July 2019)			

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)国際特許分類

F I

テーマコード (参考)

A 6 1 P	25/32	(2006.01)	A 6 1 P	25/32	
A 6 1 P	25/36	(2006.01)	A 6 1 P	25/36	
C 0 7 D	409/12	(2006.01)	C 0 7 D	409/12	
C 0 7 D	495/04	(2006.01)	C 0 7 D	495/04	1 0 5 Z
C 0 7 D	333/50	(2006.01)	C 0 7 D	333/50	
C 0 7 D	333/70	(2006.01)	C 0 7 D	495/04	1 0 5 A
A 6 1 K	31/381	(2006.01)	C 0 7 D	333/70	
A 6 1 K	31/4045	(2006.01)	A 6 1 K	31/381	
A 6 1 K	31/4436	(2006.01)	A 6 1 K	31/4045	
A 6 1 K	31/4985	(2006.01)	A 6 1 K	31/4436	
A 6 1 K	31/4365	(2006.01)	A 6 1 K	31/4985	
A 6 1 K	31/416	(2006.01)	A 6 1 K	31/4365	
A 6 1 K	31/4025	(2006.01)	A 6 1 K	31/416	
A 6 1 K	31/496	(2006.01)	A 6 1 K	31/4025	
A 6 1 K	31/5377	(2006.01)	A 6 1 K	31/496	
			A 6 1 K	31/5377	

,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,D
K,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),O
A(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,B
B,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD
,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,IT,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,
LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,
RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,WS,ZA,ZM,Z
W

(72)発明者 シュー, ヘザー ケイ ウェブ

アメリカ合衆国 9 8 0 0 4 ワシントン州 ベルビュー 1 0 8 番アベニュー・ノースイースト 5
0 0 スイート 1 1 0 0

(72)発明者 フローリオ, ヴィンセント

アメリカ合衆国 9 8 0 0 4 ワシントン州 ベルビュー 1 0 8 番アベニュー・ノースイースト 5
0 0 スイート 1 1 0 0

(72)発明者 タントリ, スブラマニラム ジャナルダン

インド 5 6 0 0 2 2 ベンガルール イェスワンスプール インダストリアル・サバール ナンバー
9 6 セカンド・ステージ

(72)発明者 デュライスワミ, アシサヤマニ ジェヤラージ

インド 5 6 0 0 2 2 ベンガルール イェスワンスプール インダストリアル・サバール ナンバー
9 6 セカンド・ステージ

F ターム (参考) 4C063 AA01 BB09 CC92 DD03 DD06 DD12 DD22 DD79 EE01

4C071 AA01 BB01 CC01 CC02 CC21 DD40 EE13 FF05 FF06 GG01
HH28 JJ01 KK14 LL01

4C086 AA01 AA02 AA03 BB02 BB03 BC07 BC13 BC17 BC37 BC50
BC73 CB26 GA13 GA16 MA01 MA04 NA05 NA14 ZA36 ZA75 ZC21
ZC33 ZC39