(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0121356
(43) 공개일자 2024년08월09일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A61K 38/17 (2006.01) *A23L 33/17* (2016.01)
A61K 47/64 (2017.01) *A61P 9/10* (2006.01)
(52) CPC특허분류
A61K 38/1709 (2020.05)
A23L 33/17 (2016.08)
(21) 출원번호 10-2023-0012477
(22) 출원일자 2023년01월31일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
한림대학교 산학협력단
강원도 춘천시 한림대학길 1, 한림대학교(옥천동)
(72) 발명자
최수영
강원도 춘천시 우석로101번길 86, 108동 1002호 (석사동, 석사대우아파트)
음원식
강원도 춘천시 후석로 325, 포스코더샵아파트 112동 802호 (후평동)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
강성혜

전체 청구항 수 : 총 10 항


(54) 발명의 명칭 **히포칼신 융합단백질을 포함하는 뇌허혈 치료용 약학 조성물**

(57) 요 약

과제: 부작용이 적거나 없으며, 효과가 우수한 뇌허혈 치료용 약제를 제공하 는 것.

해결수단: 본 발명은 세포투과성 히포칼신 융합단백질을 포함하는 뇌허혈 치료용 약학 조성물에 관한 것으로서, 세포 내로 투과 된 히포칼신 융합단백질은 과산화수소 독성에 대해 세포생존율을 증가시켰고, 세포 내 활성산소종 수준 및 과산화수소로 유도되는 DNA 단편화를 감소시켰다. 동물모델에서는 전뇌 해마 CA1 부분에 일시적 허혈을 유도했 을 때 일어나는 신경세포사멸에 대해 히포칼신 융합 단백질이 보호효과를 나타내었다. 이러한 결과들은 히포칼신 융합단백질이 세포사멸에 대해 보호효과가 있으며, 뇌허혈 손상으로부터 신경세포를 보호하는 치료효과가 있음을 말해준다.

대 표 도 - 도5



(52) CPC특허분류
A61K 38/1761 (2020.05)
A61K 47/64 (2017.08)
A61K 47/645 (2017.08)
A61P 9/10 (2018.01)
A23V 2002/00 (2023.08)
A23V 2200/326 (2013.01)

(72) 발명자
신민재
인천광역시 남구 낙섬중로 18, 1-1201 (용현동, 대림아파트)
윤기수
강원도 춘천시 지석로 64, 602동 1206호 (퇴계(6)주공아파트)
박정환
인천광역시 계양구 황어로 115번길 12, 7동 905호 (신동아 아파트)
여현지
서울특별시 성북구 보문사길 111, 103동 1301호
여은지
서울특별시 성북구 보문사길 111, 103동 1301호
권현정
강원도 강릉시 경강로2015번안길 7
조용준
강원도 춘천시 우석로101번길 86, 110동 802호 (석사동, 대우아파트)
정효영
서울특별시 관악구 남부순환로256길 21, 1층
황인구
서울특별시 관악구 낙성대동 산4-2 교수아파트 C동 402호
김대원
강원도 강릉시

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1345346900
과제번호	NRF-2019R1A6A1A11036849
부처명	교육부
과제관리(전문)기관명	한국연구재단
연구사업명	대학중점연구소 지원사업
연구과제명	단백질 침투기술 기반 퇴행성 뇌질환 치료용 융합단백질 실용화 연구
기 여 율	1/1
과제수행기관명	한림대학교
연구기간	2022.03.01 ~ 2023.02.28

명 세 서

청구범위

청구항 1

단백질 수송 도메인이 히포칼신 단백질의 N-말단 및 C-말단 중 어느 하나 이상에 결합되어 세포침투 효율이 향상된 히포칼신 융합단백질을 함유하는 뇌허혈 예방 또는 치료용 약학 조성물.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 단백질 수송 도메인은 HIV Tat 펩타이드, Pep-1 펩타이드, 아미노산 잔기 7~50개의 올리고라이신, 아미노산 잔기 7~50개의 올리고아르기닌 및 아미노산 잔기 7~50개의 올리고(라이신+아르기닌) 중 선택된 1종 이상이 단량체 또는 이량체 이상의 다량체를 이룬 것인, 히포칼신 융합단백질을 함유하는 뇌허혈 예방 또는 치료용 약학 조성물.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 히포칼신 단백질과 단백질 수송 도메인은 공유결합된 것인, 히포칼신 융합단백질을 함유하는 뇌허혈 예방 또는 치료용 약학 조성물.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 히포칼신 단백질과 단백질 수송 도메인 사이에 링커가 존재하는, 히포칼신 융합단백질을 함유하는 뇌허혈 예방 또는 치료용 약학 조성물.

청구항 5

청구항 1에 있어서,

상기 히포칼신 융합단백질은 아미노산 서열이 서열번호 2 또는 서열번호 4임을 특징으로 하는 히포칼신 융합단백질을 함유하는 뇌허혈 예방 또는 치료용 약학 조성물.

청구항 6

히포칼신 단백질을 코딩 cDNA의 최소한 일측 말단에 단백질 수송 도메인 코딩 올리고뉴클레오타이드 서열이 결합된 히포칼신 융합단백질 코딩 재조합 폴리뉴클레오타이드를 함유하는 뇌허혈 예방 또는 치료용 약학 조성물.

청구항 7

청구항 6에 있어서,

상기 재조합 폴리뉴클레오타이드는 염기 서열이 서열번호 1 또는 서열번호 3임을 특징으로 하는 뇌허혈 예방 또

는 치료용 약학 조성물.

청구항 8

히포칼신 코딩 cDNA의 최소한 일측 말단에 단백질 수송 도메인 코딩 올리고뉴클레오타이드 서열이 결합된 히포칼신 융합단백질 코딩 재조합 폴리뉴클레오타이드를 함유하는 뇌허혈 예방 또는 치료용 히포칼신 융합단백질 발현 벡터.

청구항 9

히포칼신 코딩 cDNA의 최소한 일측 말단에 단백질 수송 도메인 코딩 올리고뉴클레오타이드 서열이 결합된 히포칼신 융합단백질 코딩 재조합 폴리뉴클레오타이드를 함유하는 히포칼신 융합단백질 발현벡터를 포함하는 뇌허혈 예방 또는 치료용 약학 조성물.

청구항 10

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항의 히포칼신 융합단백질을 유효성분으로 하는 뇌허혈 예방 또는 개선용 건강기능식품 조성물.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 세포투과성 히포칼신 융합단백질을 포함하는 뇌허혈 치료용 약학 조성물에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 활성산소 화합물이라고 불리는 "자유 라디칼(free radicals)"은 산화 스트레스에 그 원인이 있으며, 활성산소종(reactive oxygen species, ROS)은 산소와의 상호작용을 포함하는 다양한 세포과정에서 피할 수 없는 부산물이다. 만약 세포가 상대적으로 좀 더 활성화된 화합물에 노출된다면 이들은 산화 스트레스에 놓이게 되고 그 결과 단백질, DNA, 지방과 같은 중요한 요소들이 산화되어 세포는 손상을 입게 된다. 산화 스트레스는 암, 알츠하이머 등과 같은 많은 병의 원인이 되고 있으며 이러한 질환들은 노화와도 관련이 있다.

[0003] 비정상적인 세포 과정에서 발생하는 과도한 활성산소종은 염증, 허혈, 당뇨 및 파킨슨병 등 다양한 인간의 질병을 초래하는 것으로 알려져 있다. 활성산소종은 세포의 대사과정 중 세포 안의 DNA뿐만 아니라 단백질, 지질과 같은 고분자들에 손상을 입히는 등 많은 영향을 미치게 되며 손상 시간이 점점 길어질수록 세포사멸을 일으켜 인간 질병에 많은 영향을 끼치게 된다. 그중에서도 뇌허혈은 뇌의 동맥이 차단될 때 뇌세포가 충분한 에너지를 만들지 못하고 그로 인해 세포사멸이 발생하는 질환으로, 활성산소종의 발생량이 해마 CA1 지역에서 급격히 증가하게 되면서 신경세포의 사멸이 일어나게 된다. 그러므로, 활성산소종에 대한 조절능력이 있는 물질이 밝혀진다면 뇌허혈 손상에 대해 보호효과를 나타낼 수 있을 것이라 예상한다.

[0004] 단백질 전달기술은 PTD (Protein Transduction Domain) 또는 CPP (Cell penetrating Peptide)라 불리며 대개 5~30개의 아미노산으로 구성된 펩타이드를 단백질이나 유전자 등의 고분자와 융합하여 포유류 세포 또는 조직 안으로 손쉽게 전달할 수 있는 새로운 개념의 전달 시스템이다. 비록 PTD 융합단백질의 구체적인 메커니즘은 아직 정확히 밝혀지지 않았지만, 치료용 단백질을 인 비트로와 인 비보로 전달하는데 많이 사용되어 왔으며 매우 다양한 PTDs가 알려져 있다. 그중 본 발명의 실시예에서 사용한 것은 세포투과성 Tat 펩타이드이며, HIV-1 Tat 단백질 (RKKRRQRRR)의 기본 도메인으로서 다양한 연구에 사용되고 있다.

[0005] 히포칼신 (Hippocalcin; 이하 "HPCA"와 혼용함)은 EF-hand 함유 NCS (neuronal calcium sensor) 단백질군에 속한다. Ca^{2+}/미리스토일 스위치를 가지고 있어 세포질 (Ca^{2+}) 증가에 반응하여 막으로의 전위를 가능하게 하고 칼슘 항상성 유지에 관여한다. NCS 단백질은 신경계에서 발현되며, 히포칼신은 해마 뉴런, 특히 덴드라이트와 축삭에서 고도로 발현된다.

[0006] 히포칼신은 신경세포 분화 및 세포사멸 억제에 관여하며, 그 기능 장애는 신경 사망과 신경학적 장애를 초래한다. 그러나, 히포칼신은 세포사멸에 있어 중요한 역할을 한다고 알려져 있을 뿐 뇌허혈에 대한 메커니즘 및 기능은 알려지지 않다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 뇌허혈 손상 및 뇌허혈 손상에 의한 신경세포 손상과 사멸을 치료하기 위한 효과적인 치료제를 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0008] 본 발명자들은 상기 과제를 해결하기 위하여 세포 침투 도메인을 히포칼신 단백질과 재조합하여 신경세포와 뇌허혈 동물 모델에서 산화 스트레스에 대하여 히포칼신 융합단백질의 보호 효과에 대해 연구하였다. 그 결과, HPCA 융합단백질이 신경세포와 뇌허혈 동물 모델에서 세포 내로 침투되는 것을 확인하였으며, 산화 스트레스로 인한 세포사멸에 대해 보호효과를 나타냄을 확인하여 뇌질환과 같은 산화 스트레스 관련 질환에 대한 치료에 유용하게 쓰일 수 있는 가능성을 탐색하였다.

[0010] 본 발명자들은 HPCA 융합단백질이 인 비트로에서 산화스트레스에 의해 유도된 신경세포사멸과 인 비보 허혈동물모델에서 보호 효과가 있는지를 밝히고자 하였다. 허혈성 신경세포사멸에 대해 HPCA 융합단백질의 잠재적인 효과를 연구하기 위해 본 발명자들은 세포 내로 투과할 수 있는 Tat-HPCA 융합단백질을 제작하였다. Tat-HPCA 융합단백질은 신경세포 내부로 농도 의존적 및 시간 의존적으로 효과적으로 투과하였다. 세포 내로 투과된 Tat-HPCA 융합단백질은 과산화수소 독성에 대한 세포 생존율을 증가시켰고, 세포 내 활성산소종 수준을 낮추었다. 그리고, 세포 내로 투과된 Tat-HPCA 융합단백질은 과산화수소에 의해 유도된 DNA 단편화 현상도 저하시켰다. 동물모델에서 Tat-HPCA 융합단백질은 전뇌의 해마 CA1 부분에서 일시적 허혈을 유도했을 때 일어나는 신경세포사멸로부터 세포를 보호하였다. 이러한 결과들은 Tat-HPCA 융합단백질이 인 비트로와 인 비보에서 일어나는 세포사멸에 대해 보호효과를 나타내며, 산화 스트레스와 관련된 뇌허혈 손상에 대해 치료제로 이용될 수 있음을 말해준다.

[0012] 본 발명은 단백질 수송 도메인이 히포칼신 단백질의 N-말단 및 C-말단 중 어느 하나 이상에 결합되어 세포침투 효율이 향상된 PFKFB3 융합단백질을 함유하는 뇌허혈 예방 또는 치료용 약학 조성물에 관한 것이다.

[0013] 상기 단백질 수송 도메인은 단백질과 결합하여 세포 침투 효율을 향상시키며, 세포 내로 침투한 상기 단백질의 활성에 큰 영향을 미치지 않는 것이면 특별한 제한은 없으며, 바람직하게는 HIV Tat 펩타이드, Pep-1 펩타이드, 아미노산 잔기 7~50개의 올리고라이신, 아미노산 잔기 7~50개의 올리고아르기닌 및 아미노산 잔기 7~50개의 올리고(라이신+아르기닌) 중 선택된 1종 이상이 단량체 또는 이량체 이상의 다량체를 이룬 것임을 특징으로 한다.

[0014] 또한, 상기 히포칼신 단백질과 단백질 수송 도메인은 이온 결합, 공유결합 등 다양한 결합 방법으로 결합될 수 있으며, 바람직하게는 공유결합으로 융합단백질을 형성할 수 있다.

[0015] 또한, 상기 히포칼신 단백질과 단백질 수송 도메인 사이에는 링커가 존재할 수 있다. 링커는 상기 화물분자 수송 도메인의 활성 및 상기 단백질의 활성이 유지되는 한 특별히 제한되지 않으나, 바람직하게는 글라이신, 알라닌, 루이신, 이소루이신, 프롤린, 세린, 트레오닌, 아스파라긴, 아스파르트산, 시스테인, 글루타민, 글루탐산, 리신, 아르기닌산 등의 아미노산을 사용하여 각 화물분자 수송 도메인 단량체를 연결할 수 있고, 좀 더 바람직하게는 아미노산이 여러 개 연결된 링커를 이용하여 연결할 수 있으며, 가장 바람직하게는 글라이신, 발린, 루이신, 아스파르트산 등의 아미노산을 1개 내지 5개씩 연결하여 링커로 사용할 수 있다. 위와 같은 아미노산 링커, 펩타이드 링커 외에도 상기 화물분자 수송 도메인의 활성이 유지되는 한 화학적 링커의 사용도 가능하다.

[0016] 세포 투과성 히포칼신 융합단백질 (이하 "Tat-HPCA", "HPCA 융합단백질", "Tat-HPCA 융합단백질"과 혼용함)을 유효성분으로 함유하는 약제학적 조성물은 약제학적 분야에서 통상적으로 허용되는 담체와 함께 배합하여 통상적인 방법에 의해 경구 또는 주사 형태 등으로 제형화할 수 있다. 경구용 조성물로는 예를 들면 정제 및 젤라틴 캡슐이 있으며, 이들은 활성 성분 이외에도 희석제 (예: 락토스, 덱스트로스, 수크로스, 만니톨, 솔비톨, 셀룰

로즈 및/또는 글리신), 활탁제 (예: 실리카, 탤크, 스테아르산 및 그의 마그네슘 또는 칼슘염 및/또는 폴리에틸렌 글리콜)를 함유하고, 정제는 또한 결합제 (예: 마그네슘 알루미늄 실리케이트, 전분 페이스트, 젤라틴, 메틸셀룰로스, 나트륨 카복시메틸셀룰로스 및/또는 폴리비닐 피롤리돈)를 함유하며, 경우에 따라서 붕해제 (예: 전분, 한천, 알긴산 또는 그의 나트륨염) 또는 비등 혼합물 및/또는 흡수제, 착색제, 향미제 및 감미제를 함유하는 것이 바람직하다. 주사용 조성물은 등장성 수용액 또는 현탁액이 바람직하고, 언급한 조성물은 멸균되고/되거나 보조제 (예: 방부제, 안정화제, 습윤제 또는 유화제 용액 촉진제, 삼투압 조절을 위함 염/또는 완충제)를 함유한다. 또한, 이들은 기타 치료에 유용한 물질을 함유할 수 있다.

[0017] 이와 같이 제조된 약제학적 제제는 목적하는 바에 따라 경구로 투여하거나, 비경구 방식 즉, 정맥 내, 피하, 복강 내 투여 또는 국소적용할 수 있다. 용량은 일일 투여량 0.0001~100㎎/㎏을 1 내지 수회에 나누어 투여할 수 있다. 특정 환자에 대한 투여용량 수준은 환자의 체중, 연령, 성별, 건강상태, 투여시간, 투여방법, 배설율, 질환의 중증도 등에 따라 변화될 수 있다.

[0018] 나아가, 본 발명은 상기 히포칼신 융합단백질을 유효성분으로 하고 약학적으로 허용되는 담체를 포함하는 것을 특징으로 하는, 뇌허혈 예방 또는 치료에 유용한 약제학적 조성물을 제공한다.

[0019] 본 발명은 또한 히포칼신 단백질을 세포 내로 효율적으로 전달하기 위한 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 히포칼신 단백질 분자의 세포 내 전달은 HIV Tat 펩타이드와 같은 단백질 수송 도메인이 공유결합된 형태의 융합단백질을 구성하여 수행된다. 본 발명의 상기 단백질 수송 도메인의 일례로는 HIV Tat 펩타이드를 들 수 있다. 그러나, 본 발명의 단백질 수송 도메인이 HIV Tat 펩타이드로만 한정되는 것은 아니며, HIV Tat 펩타이드의 아미노산 서열 일부 치환이나 부가, 결여로 HIV Tat 펩타이드와 유사한 기능을 하는 펩타이드를 제조하는 것이 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 당업자에게는 용이하므로, 7~50개의 아미노산으로 구성되고, 라이신 또는 아르기닌을 다수 포함하는 단백질 수송 도메인과 이로부터 아미노산 일부 치환으로 동일·유사한 단백질 수송기능을 수행하는 단백질 수송 도메인을 이용한 융합단백질도 본 발명의 범위에 속함은 자명하다고 할 것이다.

[0020] 구체적으로, 본 발명은 히포칼신 융합단백질, 히포칼신 융합단백질을 코딩하는 올리고뉴클레오타이드, 히포칼신 융합단백질을 코딩하는 올리고뉴클레오타이드를 포함하는 벡터, 이 융합단백질을 포함하는 뇌허혈 치료 또는 예방 목적의 약학 조성물 및 이 융합단백질을 포함하는 뇌허혈 예방 또는 개선 용도의 건강기능성 식품 조성물에 관한 것이다.

[0021] 상기 히포칼신 융합단백질을 코딩하는 폴리뉴클레오타이드는 구체적 예시로는 서열번호 1 또는 서열번호 3을 들 수 있다. 그러나, 이 서열에 한정되는 것이 아님은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다.

[0022] 본 발명의 상기 세포 투과성 히포칼신 융합단백질을 첨가할 수 있는 식품으로는, 각종 식품류, 예를 들어, 음료, 껌, 차, 비타민 복합제, 건강보조 식품류 등이 있으며, 환제, 분말, 과립, 침제, 정제, 캡슐 또는 음료 형태로 사용할 수 있다. 이때, 식품 또는 음료 중의 상기 히포칼신 융합단백질의 양은, 일반적으로 본 발명의 건강식품 조성물의 경우 전체 식품 중량의 0.01 내지 15 중량%, 바람직하게는 0.2 내지 10중량%로 가할 수 있으며, 건강 음료 조성물의 경우 100㎖를 기준으로 0.1 내지 30g, 바람직하게는 0.2 내지 5g의 비율로 가할 수 있다. 본 발명의 본 발명의 건강음료 조성물은 지시된 비율로 필수 성분으로서 상기 히포칼신 융합단백질을 함유하는 외에는 액체성분에는 특별한 제한점은 없으며 통상의 음료와 같이 여러 가지 향미제 또는 천연 탄수화물 등을 추가 성분으로서 함유할 수 있다. 상술한 천연 탄수화물의 예로는 모노사카라이드, 예를 들어, 포도당, 과당 등 디사카라이드, 예를 들어 말토스, 수크로스 등 폴리사카라이드, 예를 들어 덱스트린, 시클로덱스트린 등과 같은 통상적인 당 및 자일리톨, 소르비톨, 에리트리톨 등의 당알콜이다. 상술한 것 이외의 향미제로서 천연 향미제(타우마틴, 스테비아 추출물(예를 들어 레바우디오시드 A, 글리시리진등)) 및 합성 향미제(사카린, 아스파르탐 등)를 유리하게 사용할 수 있다. 상기 천연 탄수화물의 비율은 본 발명의 조성물 100㎖당 일반적으로 약 1 내지 20g, 바람직하게는 약 5 내지 12g이다. 상기 외에 본 발명의 조성물은 여러 가지 영양제, 비타민, 광물(전해질), 합성 풍미제 및 천연 풍미제 등의 풍미제, 착색제 및 중진제(치즈, 초콜릿 등), 펙트산 및 그의 염, 알긴산 및 그의 염, 유기산, 보호성 콜로이드 증점제, pH 조절제, 안정화제, 방부제, 글리세린, 알콜, 탄산 음료에 사용되는 탄산화제 등을 함유할 수 있다. 그밖에 본 발명의 조성물들은 천연 과일 쥬스 및 과일 쥬스 음료 및 야채 음료의 제조를 위한 과육을 함유할 수 있다. 이러한 성분은 독립적으로 또는 조합하여 사용할 수 있다. 이러한 첨가제의 비율은 중요하지는 않으나 본 발명의 조성물 100 중량부 당 0 내지 약 20 중량부의 범위에서 선택되는 것이 일반적이다.

[0023] 본 발명은 또한 히포칼신 단백질을 세포 내로 효율적으로 전달하기 위한 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 히포

칼신 단백질 분자의 세포 내 전달은 HIV Tat 단백질 수송 도메인을 비롯한 다양한 단백질 수송 도메인이 공유결합된 형태의 융합단백질을 구성하여 수행된다. 그러나, 본 발명의 단백질 수송 도메인이 실시예에 사용된 Tat 펩타이드로만 한정되는 것은 아니고, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 널리 알려진 단백질 수송 도메인 예컨대, Pep-1 펩타이드, 노나아르기닌, 노나라이신 등을 사용할 수 있으며, 그 외에도 Tat 펩타이드의 아미노산 서열 일부 치환이나 부가, 결여로 Tat 펩타이드와 유사한 기능을 하는 펩타이드를 제조하는 것이 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 당업자에게는 용이하므로, Tat 단백질 수송 도메인과 이로부터 아미노산 일부 치환으로 동일·유사한 단백질 수송기능을 수행하는 단백질 수송 도메인을 이용한 융합단백질도 본 발명의 범위에 속함은 자명하다고 할 것이다.

[0025] 본 발명의 상세한 설명 등에서 사용되는 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

[0026] "히포칼신 융합단백질"이란 단백질 수송 도메인과 HPCA를 포함하며, 수송 도메인과 목표 단백질 (즉, 본 발명에서는 히포칼신을 의미함)의 유전적 융합이나 화학 결합으로 형성된 공유결합 복합체를 의미한다. 본 명세서에서는 "Tat-HPCA", "Tat-HPCA 융합단백질", "HPCA 융합단백질"과 혼용하였다.

[0027] "목표 단백질"이란 본래 표적 세포로 들어갈 수 없거나, 본래 유용한 속도로 표적 세포로 들어갈 수 없는 수송 도메인 또는 이의 단편이 아닌 분자로서, 수송도메인과 융합되기 전의 분자 그 자체 또는 수송도메인-목표 단백질 복합체의 목표 단백질 부분을 의미한다. 목표 단백질로서는 폴리펩티드, 단백질, 펩타이드를 포함하며, 본 발명에서는 히포칼신을 의미한다.

[0028] "융합단백질"이란 수송도메인 및 한 개 이상의 목표 단백질 부분을 포함하며, 수송도메인과 목표 단백질의 유전적 융합이나 화학 결합으로 형성된 복합체를 의미한다.

[0029] 또한, 상기 "유전적 융합"이란 단백질을 코딩하는 DNA 서열의 유전적 발현을 통해서 형성된 선형, 공유결합으로 이루어진 연결을 의미한다.

[0030] 또한, "표적 세포"란 수송도메인에 의해 목표 단백질이 전달되는 세포를 의미하는 것으로서, 표적 세포는 체내 또는 체외의 세포를 말한다. 즉, 표적 세포는 체내 세포, 다시 말하여 살아있는 동물 또는 인간의 장기 또는 조직을 구성하는 세포 또는 살아있는 동물 또는 인간에서 발견되는 미생물을 포함하는 의미이다. 또한, 표적 세포는 체외 세포, 즉 배양된 동물세포, 인체 세포 또는 미생물을 포함하는 의미이다.

[0031] 본 발명에서의 "단백질 수송 도메인"은 고분자 유기화합물, 예컨대 펩타이드, 단백질 등과 공유결합을 이루어 별도의 수용체나 운반체, 에너지를 필요로 하지 않고 상기 유기화합물들을 세포 내로 도입시킬 수 있는 것을 말한다.

[0032] 또한, 본 명세서에서는 단백질, 펩타이드, 유기화합물을 세포 내로 "도입"하는 것에 대하여 "운반", "침투", "수송", "전달", "투과", "통과"한다는 표현들과 혼용하였다.

[0034] 본 발명은 단백질 수송 도메인이 히포칼신에 공유결합되어 세포침투 효율이 향상된 히포칼신 융합단백질을 유효성분으로 하는 뇌허혈 치료용 약학 조성물에 관한 것이다.

[0035] 또한, 본 발명에서 상기 수송도메인은 HIV Tat인 것을 특징으로 한다.

[0036] 또한, 본 발명은 상기 융합단백질의 그 아미노산 서열이 서열번호 2 또는 서열번호 4와 같은 것을 특징으로 한다.

[0037] 본 발명은 또한, silent change에 따라 서열 내에서 하나 이상의 아미노산이 기능적으로 동등하게 작용하는 유사한 극성의 다른 아미노산(들)로 치환될 수 있다. 서열 내 아미노산 치환은 그 아미노산이 속하는 클래스의 다른 구성원들로부터 선택될 수 있다.

[0038] 예컨대, 소수성 아미노산 분류는 알라닌, 발린, 류이신, 이소류이신, 페닐알라닌, 발린, 트립토판, 프롤린 및 메티오닌을 포함한다. 극성 중성 아미노산은 글리신, 세린, 트레오닌, 시스테인, 티로신, 아스파라긴 및 글루타민을 포함한다. 양성 염기성 아미노산은 아르기닌, 라이신 및 히스티딘을 포함한다. 음성 전하를 띤 산성 아미노산은 아스파르트산 및 글루탐산을 포함한다. 또한, 본 발명의 융합단백질과 아미노산 서열 간의 일정 범위의 상동성 예컨대 85-100% 범위 내의 동일 유사한 생물학적 활성을 갖는 절편 또는 이들의 유도체들도 본 발명의

권리범위에 포함된다.

발명의 효과

[0039] 본 발명에서 세포 내로 투과된 히포칼신 융합단백질은 과산화수소 독성에 대해 세포생존율을 증가시켰고, 세포 내 활성산소종 수준 및 과산화수소로 유도되는 DNA 단편화를 감소시켰으며, 동물모델에서는 전뇌 해마 CA1 부분에 일시적 허혈을 유도했을 때 일어나는 신경세포사멸에 대해 히포칼신 융합단백질이 보호효과를 나타내었다. 이러한 결과들은 히포칼신 융합단백질이 세포사멸에 대해 보호효과가 있으며, 뇌허혈 손상으로부터 신경세포를 보호하는 치료효과가 있음을 말해주며, 세포 투과성 히포칼신 융합단백질이 뇌허혈 예방 및 치료용 약학 조성물로 유용함을 말해준다.

도면의 간단한 설명

[0040] 도 1은 pET-15b 벡터 상에 Tat-HPCA 발현 벡터를 구축하는 것을 도시한 것이다. 합성 Tat 올리고머는 NdeI 및 XhoI 부위에 클로닝하였고, 사람 HPCA cDNA는 pET-15b의 XhoI 및 BamHI 부위에 클로닝하였다. (A)는 HPCA 단백질 및 HPCA 융합단백질의 발현 벡터를 구축하는 것을 도시한 것이다. HPCA 융합단백질은 여섯 개의 히스티딘 잔기를 포함한다. (B)는 IPTG를 첨가하여 각 단백질을 발현한 다음 정제된 HPCA 및 Tat-HPCA 융합단백질을 15% SDS-PAGE를 이용하여 정제하고 항 토끼 폴리히스티딘 항체로 웨스턴 블롯팅한 결과이다.

도 2a 내지 도 2d는 HT22 세포로의 Tat-HPCA 융합단백질의 투과를 나타낸다. 도 2a는 Tat-HPCA 융합단백질(0.5~3μM) 및 HPCA 단백질(0.5~3μM)을 1시간 동안 배양 배지에 처리하고, 도 2b는 Tat-HPCA 융합단백질 및 HPCA 단백질을 15~60분 동안 배양배지에 처리하여 웨스턴 블롯팅으로 분석한 결과이다. 도 2c는 Tat-HPCA 융합단백질의 세포 내 분포를 공촛점 형광 현미경으로 가시화한 것이다. 도 2d는 Tat-HPCA 융합단백질의 HT22 세포 내 안정성을 분석한 결과이다. Tat-HPCA 융합단백질 (3μM)로 형질 도입된 후 세포를 1~60 시간 동안 배양하고 웨스턴 블롯팅으로 분석하였다.

도 3a는 1시간 동안 각각 Tat-HPCA 융합단백질 또는 HPCA 단백질로 전처리한 HT22세포에 과산화수소(100μM)를 가하고 1시간 동안 둔 다음 MTT 분석법을 이용하여 세포생존율을 측정한 결과이다. 도 3b는 세포 내 활성산소종 수준을 5-CFDA, AM 염색으로 측정한 결과이다. 도 3c는 세포 내 활성산소종 수준을 DCF-DA 염색으로 측정한 결과이다. 도 3d는 TUNEL 염색으로 DNA 단편화를 측정한 결과이다.

도 4는 1시간 동안 각각 Tat-HPCA 융합단백질(0.5~3μM) 또는 HPCA 단백질로 전처리한 HT22세포에 과산화수소(100μM)를 가하였다. 도 4a는 JNK 발현 수준을, 도 4b는 캐스페이즈-3, 캐스페이즈-9, Bax, Bcl-2 및 PARP 발현 수준을 웨스턴 블롯팅으로 분석한 것이고, 밴드 강도는 농도계로 측청한 것이다.

도 5는 허혈성 손상 이후 세포로 투과된 Tat-HPCA 융합단백질의 신경보호 효과를 면역조직화학으로 분석한 결과를 나타낸다. 세포에 Tat-HPCA 융합단백질 (2mg/kg)을 1회 주입하였다. 도 5a는 히스티딘 항체를 사용하여 면역조직화학 분석으로 Tat-HPCA 융합단백질의 전이를 분석하였다. 도 5b는 허혈/재관류 7일 후 샴 군, 담체 처리군, HPCA 단백질 처리군 및 Tat- HPCA 융합단백질 처리군의 CA1 부위에서 CV, GFAP 및 Iba-1 면역조직화학 분석한 결과이다. 각각의 면역 반응성 뉴런의 수의 상대적인 분석 값은 담체 투여군과 현저하게 다르다. 크기 막대 = 50μm.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0041] 아래에서는 구체적인 실시예를 들어 본 발명의 구성을 좀 더 자세히 설명한다. 그러나, 본 발명의 범위가 실시예의 기재에 의하여 한정되는 것이 아님은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다.

[0043] **재료**

[0044] Ni^{2+}-니트릴로삼초산 세파로즈 수퍼플로우는 Qiagen에서 구매하였고, PD-10 컬럼 크로마토그래피 (Amersham, Brauncschweig, Germany)를 구매하였다. 마우스 운동 뉴런인 HT22 세포는 한국세포주연구재단 (KCLF)에서 제공받았다. DCF-DA (2',7'-Dichlorofluorescein diacetate)와 Bcl-2, Bax, β-액틴, 캐스페이즈-3, 캐스페이즈-9, PARP, p-JNK 및 JNK의 일차 항체는 Cell signaling Technology (Beverly, MA, USA)와 Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA)에서 구입하였다. 이밖의 모든 시약은 특급 제품을 이용하였다.

[0046] **Tat-HPCA 융합단백질의 발현 및 정제**

[0047] HPCA 단백질 및 Tat-HPCA 융합단백질의 발현 벡터를 구축하였다. 인간 HPCA 유전자를 cDNA와 함께 2개의 프라이머를 이용하여 중합효소 연쇄반응으로 증폭시켰다. 센스 프라이머는 5'-CTCGAGGGCAACGCGCAG-3' (SEQ ID No.5)이고, XhoI이라는 제한 효소 작용부위가 5' 쪽에 존재한다. 안티센스 프라이머는 5'-GGATCCTCAGGAATCTTCGGACTC-3' (SEQ ID No.6)이고, BamHI이라는 제한효소 작용부위가 5' 쪽에 존재한다. 중합효소 연쇄반응을 통하여 얻은 결과물을 TA 벡터에 연결하고 XhoI과 BamHI을 이용하여 자른 후에 발현 벡터에 연결하여 Tat-HPCA 융합단백질을 제조하였다. 이와 마찬가지로 대조군인 HPCA 단백질은 Tat 펩타이드가 결여된 벡터를 이용하여 제조하였다. 재조합된 Tat-HPCA 플라스미드를 대장균인 BL21로 형질변환시킨 후 0.5mM IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactoside)로 유도하여 18℃에서 하룻밤 배양하였다. 배양한 세포를 초음파로 분쇄하여 Tat-HPCA 융합단백질을 얻기 위해 Ni^{2+}-니트릴로삼초산 세파로즈 수퍼플로우 컬럼을 이용하여 정제하였다. 단백질 농도는 브래드포드 방법으로 우혈청 알부민을 표준물질로 이용하여 결정하였다.

[0049] **HT22 세포로 Tat-HPCA 융합단백질 도입**

[0050] 마우스 해마 신경세포인 HT22 세포는 37℃, 95% 공기 및 5% CO_2의 조건을 유지해주며, 10% 우태혈청 (FBS) 및 5 mM $NaHCO_3$, 항생제 (100㎍/ml 스트렙토마이신, 100U/ml 페니실린), 20 mM HEPES/NaOH (pH 7.4)를 포함하는 DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)을 이용하여 습한 조건에서 배양하였다.

[0051] Tat-HPCA 융합단백질 및 대조군 HPCA 단백질의 세포 내 도입에 대한 시간 의존성 및 농도 의존성을 평가하였다. 세포는 60㎜ 디쉬에서 시간 (15~60분) 및 각 단백질의 투여량 (0.5~3μM)을 달리하여 처리하였다. 트립신-EDTA (Gibco)를 처리하고 PBS를 이용하여 세척한 다음 세포 내로 투과된 융합단백질을 브래드포드 방법으로 정량하고, 웨스턴 블롯으로 분석하였다.

[0053] **웨스턴 블롯 분석**

[0054] 웨스턴 블롯 분석을 위해 세포 분쇄액 내의 단백질을 12% SDS 폴리아크릴아마이드 젤로 분리한 다음, 젤에 있는 단백질을 나이트로셀룰로스 막 (nitrocellulose membrane; Amersham, UK)으로 전기이동시켰다. 막은 TBS-T 완충액 (25 mM Tris-HCl, 140 mM NaCl, 0.1% Tween 20, pH 7.5)으로 블로킹하였다. 막은 제조업체에서 권장하는 일차 항체를 사용하여 웨스턴 블롯 분석하였다. 결합한 항체 복합체는 강화 화학 발광제를 이용하여 제조자 (Amersham, Franklin Lakes, NJ,USA)의 지시에 따라 탐지하였다.

[0056] **공촛점 현미경 관찰**

[0057] HT22 세포 내의 Tat-HPCA 융합단백질과 HPCA 단백질을 탐지하기 위해 세포를 유리 커버슬립 상에 시드하고 Tat-HPCA 융합단백질과 HPCA 단백질을 3μM 농도로 1시간 동안 처리하였다. 세포를 PBS로 두 번 세척한 다음 실온에서 5분간 4% 파라포름알데하이드로 고정하였다. HT22 세포는 실온에서 40분간 3% 우혈청 알부민과 0.1% Triton X-100이 함유된 PBS (PBS-BT)로 40분간 블로킹하고, PBSBT로 세척하였다. 일차 항체 (His-probe, Santa Cruz Biotechnology)는 1:10000 비율로 희석하고, 이차 항체 (Alexa fluor 488, Invitrogen)는 1:15000 비율로 희석한 후 어두운 곳에서 실온으로 1시간 동안 배양하였다. 세포핵은 DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole 1 mg/ml; Roche, Mannheim, Germnay)로 3분간 염색하였다. 염색된 HT22 세포는 Fv-300 공초점 형광현미경 (Olympus, Tokyo, Japan) 하에서 관찰하였다.

[0059] **세포 생존율 분석**

[0060] 과산화수소로 처리한 HT22 세포의 생존율을 MTT {3-(4,5-dimethylthiazol -2-yl)-2,5-dipheyltetrazolium bromide}를 이용하여 비색분석법으로 확인하였다. 세포에 0.5~3μM의 Tat-HPCA 융합단백질을 선처리하거나 또는 처리하지 않고, 세포를 100μM의 과산화수소에 1시간 동안 노출하여 세포사멸을 유도하였다. ELISA 마이크로플

레이트 판독기 (Labsystems Multiskan MCC/340)로 570㎚에서 흡광도를 측정하였다. 세포 생존율은 무처리 대조군에 대한 백분율로 나타내었다.

[0062] **세포 내 활성산소종 수준 측정**

[0063] DCF-DA (2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate)를 이용하여 세포 내 활성산소종 수준을 측정하였다. DCF-DA는 활성산소종에 의해 세포 내에서 DCF로 전환되어 형광을 발한다. HT22 세포에 Tat-HPCA 융합단백질을 처리하였을 때와 처리하지 않았을 때의 활성산소종 수준을 비교해 보았다. Tat-HPCA 융합단백질은 3μM로 1시간 동안 처리하였고 후에 과산화수소를 700μM의 농도로 30분 동안 처리하였다. 그리고 PBS로 두 번 씻어주고 DCF-DA를 20μM의 농도로 30분 처리하였다. 형광 강도는 Fluoroskan ELISA plate reader (Labsystems, Helsinki, Finland)를 이용하여 485㎚ 여기파장 (exitation), 538㎚ 방출파장 (emission)을 측정하였다.

[0065] **TUNEL 분석**

[0066] HT22 세포에 Tat-HPCA 융합단백질을 처리하지 않은 군과 3μM의 농도로 1시간 동안 처리한 군의 배양액에 과산화수소 (100μM)를 가하여 1시간 동안 처리하였다. 세포사멸을 측정하기 위해 TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated biotinylated dUTP nick end labeling staining) 기법은 세포사멸 탐지 킷트 (Roche Applied Science)를 사용하여 수행하였다. 형광현미경 (Nikon eclipse 80i, Japan)을 이용하여 결과를 분석하였다.

[0068] **실험동물**

[0069] 한림대학교 실험동물센터에서 제공되는 저빌쥐 (Mongolian gerbils; Meriones unguiculatus)를 사용하였다. 23℃, 습도 60% 그리고 고정적으로 12시간의 빛과 음식물이 제공되는 곳에서 사육하였다. 실험동물 취급 및 관리는 최근의 국제법과 정책에 따라 수행하였고 [NIH Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, NIH Publication No. 85-23, 1985, revised 1996], 서울대 연구동물 관리 및 사용에 관한 위원회 (IACUC)에서 승인받았다 (SNU-100611-1). 모든 실험에서는 이용되는 동물 수와 본 발명에서 사용되는 공정에 의한 고통을 최소화하기 위해 노력하였다.

[0071] **실험동물에서 전뇌 허혈 유도**

[0072] 실험동물에서 전뇌 허혈을 유도하였다. 온목동맥을 신경 섬유들로부터 격리시켜 폐색하고, 외상이 크게 남지 않게 하기 위해 동맥류 클립(aneurysm clips)을 이용하였다. 혈류를 폐색하였을 때, 검안경(ophthalmoscope)을 이용하여 혈압을 주의 깊게 관찰하였다. 그 후 5분 동안 폐색하고 동맥류 클립을 제거하였다. 그리고 폐색에 대해 혈압이 회복되는 것을 검안경으로 확인하였다. 또한, 샴 수술로 정상 경동맥을 폐색하지 않고, 외과적인 절차를 제외하고 얼마나 영향을 받는지 확인해 보았다. 허혈성 손상에 대한 Tat-HPCA 융합단백질의 보호효과를 실험하기 위해, 7일 후 허혈 재관류 (ischemia-reperfusion)하고 샴 수술군, 담체 처리군, Tat-HPCA 융합단백질 처리군 및 HPCA 단백질 처리군으로 4개군으로 나눠, 허혈-재관류 후 복강 내에 30분을 투여하여 실험을 수행했다.

[0073] 샴 수술군, 담체 처리군, Tat-HPCA 융합단백질 처리군 및 HPCA 단백질 처리군 (2㎎/㎏)을 7일 후에 마취를 수행하고, 뇌 조직을 적출하고 PBS (pH 7.4)로 처리하고, 4% 포름알데하이드를 포함한 0.1M PBS (pH 7.4)로 처리하였다. 뇌 조직은 30% 자당으로 침윤하여 하룻밤 사이에 동결보존하였다. 뇌 조직은 냉동한 다음 50㎛ 두께로 절편화하고, 연속되는 절편은 PBS를 함유하는 6-웰 플레이트에 수집하였다.

[0075] **결과 1: Tat-HPCA 융합단백질의 정제 및 세포 투과**

[0076] 본 발명자들은 세포 투과성 Tat-HPCA 융합단백질을 제조하기 위해 단백질 수송 도메인 (Protein Transduction Domain)의 일종인 Tat이 포함된 Tat-벡터와 HPCA 유전자를 재조합하였다 (도 1). 대장균에서 과대발현시켜 Ni^{2+}-나이트릴로삼초산 세파로즈 친화 크로마토그래피 컬럼과 PD-10 컬럼 크로마토그래피를 이용하여 정제하였고,

SDS-PAGE와 웨스턴 블롯 분석법을 이용하여 Tat-HPCA 융합단백질이 정제된 것을 확인하였다 (도 1).

[0078] **결과 2: HT22 세포 내로 Tat-HPCA 융합단백질의 투과**

[0079] Tat-HPCA 융합단백질의 시간 및 농도별로 HT22 세포 내 투과 정도를 측정하였다. 그 결과 시간 및 농도 의존적으로 세포 내 투과가 효과적으로 일어났으며, HPCA 단백질은 투과가 일어나지 않았다 (도 2a, 2b). 또한, 공초점 현미경을 이용하여 DAPI로 세포핵을 염색하고, Tat-HPCA 융합단백질을 녹색 형광으로 염색하여 효과적으로 세포 내로 투과되는 것을 확인하였다 (도 2c). Tat-HPCA 융합단백질의 HT22 세포 내 안정성을 확인하였다 (도 2d).

[0081] **결과 3: 산화 스트레스로 인한 세포생존율, 활성산소종 생성 및 DNA 단편화에 대한 Tat-HPCA 융합단백질의 세포보호효과**

[0082] 세포에 Tat-HPCA 융합단백질을 농도별로 전처리 후 과산화수소로 산화스트레스를 유도하였다. 세포 생존능력을 확인하기 위해 MTT 분석을 수행하였다. HT22 세포에 100μM 과산화수소를 단일 처리하였을 경우 생존한 세포 수가 약 40%로 감소하였으나, Tat-HPCA를 선처리한 경우 농도 의존적으로 세포생존율이 증가하였다 (도 3a).

[0083] 또한, 과산화수소를 처리할 때 유도되는 활성산소종을 Tat-HPCA 융합단백질이 효과적으로 억제하는지 확인하기 위해 8-OHdG 형광 염료를 사용하여 세포 내 산화 정도를 분석하였다. HT22 세포가 1시간 동안 100μM의 과산화수소에 노출되었을 때, 과산화수소에 의해 현저하게 8-OHdG 신호가 증가하였다. 그러나 과산화수소에 의해 유도된 활성산소종은 Tat-HPCA 융합단백질에 의해 감소하였다 (도 3b, 3c).

[0084] 산화 스트레스로 인해 발생되는 DNA 단편화에 대한 융합단백질의 보호효과는 DNA 단편화 부위에 특이적으로 붙는 형광 염료를 이용한 TUNEL 염색 방법으로 알아보았다. 앞선 실험과 동일한 상태에서 수행하였고, HT22 세포가 1시간 동안 100μM의 과산화수소에 노출되었을 때, Tat-HPCA 융합단백질이 DNA 단편화에 대해 보호효과가 있다는 결과를 확인하였다 (도 3d).

[0086] **결과 4: 산화 스트레스에 의한 세포사멸에 대한 Tat-HPCA 융합단백질의 보호기작**

[0087] 산화 스트레스는 신경세포 자기사멸 (neuronal apoptosis)을 유도한다. H2O2에 의해 유도된 신경세포 사멸이 일어났을 때 MAPK 신호전달이 활성화되는데, MAPK 활성화를 측정하기 위해서 웨스턴 블롯팅을 수행하였다. Tat-HPCA 융합단백질과 HPCA 단백질을 각각 3μM씩 처리하고 과산화수소를 700μM 농도로 처리하였다. Tat-HPCA 융합단백질 처리군에서는 JNK의 발현수준이 감소하였지만 HPCA 단백질 처리군은 과산화수소만 처리한 군과 유사하게 JNK의 발현수준이 감소하지 않은 것을 확인하였다 (도 4a, 도 4b).

[0088] 세포 생존 신호는 과산화수소와 같은 외부 스트레스와 성장 요인에 의해 활성화된다. 그 신호 가운데, MAPKs는 허혈성 손상에 매우 중요한 역할을 한다. 우리는 활성산소에 의한 MAPKs 활성화에 대한 Tat-HPCA 융합단백질의 효과를 확인하였다. 그러나, 대조군 HPCA 단백질은 캐스페이즈-3, 캐스페이즈-9, BAX, Bcl-2 및 PARP의 활성화 수준에 영향을 미치지 않았다. 따라서, 이러한 결과는 Tat-HPCA 융합단백질이 MAPKs 활성화 억제를 통해 활성산소종에 의한 세포사멸을 억제하는 것을 나타낸다.

[0089] 따라서, 본 발명은 Tat-HPCA 융합단백질이 산화 스트레스로 인한 뇌허혈 등의 신경퇴행성 질환 및 다양한 질환에 대하여 치료제로서 효과적으로 응용될 수 있는 가능성을 제시한다.

표 1


[0090]

	Sequence
Pep-1-HPCA coding polynucleotide (SEQ ID No.1)	aaagaaacctggtgggaaacctggtggaccgaatggtctcagccgaaaaaaaaacgtaaagtgtatatgctcgagatgggcaa gcagaacagcaagctgcggcccgagatgttgcaggacctgcgagagaacacagagttctcagagctggagctgcaggagtggt acaagggcttcctcaaggactgccccacaggaatcctcaatgtggatgagttcaagaagatctacgccaacttctttccctat ggtgacgcctccaagtttgccgagcacgtcttccgcacctttgacaccaacagcgatggcaccatagactttcgggagttcat cattgcgctgagcgtgacctcgcgcggccgcctggagcagaagctcatgtgggccttcagcatgtatgacctggacggcaacg gctacatcagccgggaggagatgctggagatcgtgcaggccatttacaagatggtttcgtccgtgatgaagatgccggaggac gagtcgaccccggaaaagaggactgagaaaatcttccgccaaatggacacaaacaacgacggcaagctgtccttggaggagtt catccgcggggccaaaagcgacccgtccatcgtgcgtctgctgcagtgcgaccccagcagcgcctcccagttctga


Pep-1-HPCA fusion protein (SEQ ID No.2)	KETWWETWWTEWSQPKKKRKVYMLEMGKQNSKLRPEMLQDLRENTEFSELELQEWYKGFLKDCPTGILNVDEFKKIYANFFPY GDASKFAEHVFRTFDTNSDGTIDFREFIIALSVTSRGRLEQKLMWAFSMYDLDGNGYISREEMLEIVQAIYKMVSSVMKMPED ESTPEKRTEKIFRQMDTNNDGKLSLEEFIRGAKSDPSIVRLLQCDPSSASQF
Tat-HPCA coding polynucleotide (SEQ ID No.3)	aggaagaagcggagacagcgacgaagactcgagatgggcaagcagaacagcaagctgcggcccgagatgttgcaggacctgcg agagaacacagagttctcagagctggagctgcaggagtggtacaagggcttcctcaaggactgccccacaggaatcctcaatg tggatgagttcaagaagatctacgccaacttctttccctatggtgacgcctccaagtttgccgagcacgtcttccgcaccttt gacaccaacagcgatggcaccatagactttcgggagttcatcattgcgctgagcgtgacctcgcgcggccgcctggagcagaa gctcatgtgggccttcagcatgtatgacctggacggcaacggctacatcagccgggaggagatgctggagatcgtgcaggcca tttacaagatggtttcgtccgtgatgaagatgccggaggacgagtcgaccccggaaaagaggactgagaaaatcttccgccaa atggacacaaacaacgacggcaagctgtccttggaggagttcatccgcggggccaaaagcgacccgtccatcgtgcgtctgct gcagtgcgaccccagcagcgcctcccagttctga
Tat-HPCA fusion protein (SEQ ID No.4)	RKKRRQRRRLEMGKQNSKLRPEMLQDLRENTEFSELELQEWYKGFLKDCPTGILNVDEFKKIYANFFPYGDASKFAEHVFRTF DTNSDGTIDFREFIIALSVTSRGRLEQKLMWAFSMYDLDGNGYISREEMLEIVQAIYKMVSSVMKMPEDESTPEKRTEKIFRQ MDTNNDGKLSLEEFIRGAKSDPSIVRLLQCDPSSASQF


도면

도면1





도면2a


HPCA
β-actin
Control 0.5 1 2 3 0.5 1 2 3 (μM)
HPCA
TAT-HPCA



HPCA
TAT-HPCA
Relative density(/β-acitn)
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Control
0.5
1
2
3
(μM)

도면2b



HPCA
β-actin
Control 15 30 45 60 15 30 45 60 (min)
HPCA
TAT-HPCA



HPCA
TAT-HPCA
Relative density(/β-acitn)
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Control
15
30
45
60
(min)

도면2c



Control
HPCA
TAT-HPCA
Alexa 488
DAPI
Merge

도면2d



HPCA
β-actin
Control 1 3 6 12 24 36 48 60 (h)
TAT-HPCA



Relative density(/β-acitn)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Control
1
3
6
12
24
36
48
60
(h)

도면3a



HPCA
TAT-HPCA
Cell viability (% of control)
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
*
control
H2O2
0.5 uM
1 uM
2 uM
3 uM
+H2O2

도면3b



DAPI
5-CFDA,AM
Merge
Control
H2O2
HPCA
TAT-HPCA
+ H2O2



Fluorescent intensity
(fold of control intensity)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
**
control
H2O2
HPCA
TAT-HPCA
+H2O2

도면3c



DAPI
DCF-DA
Merge
Control
H_2O_2
HPCA
TAT-HPCA
+ H_2O_2
Fluorescent intensity
(fold of control intensity)
12
10
8
6
4
2
0
**
control
H_2O_2
HPCA
TAT-HPCA
+H_2O_2


도면3d


DAPI
TUNEL
Merge
Control
H2O2
HPCA
TAT-HPCA
+ H2O2



Fluorescent intensity
(fold of control intensity)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
**
control
H2O2
HPCA
TAT-HPCA
+H2O2

도면4a



TAT-HPCA
Control HPCA 0.5 1 2 3 (μM)
p-JNK
JNK


p-JNK/JNK ratio
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Control
Control-HPCA
0.5
1
2
3
TAT-HPCA

도면4b


TAT-HPCA
Control HPCA 0.5 1 2 3 (μM)
Caspase3
Cleaved-Caspase3
Caspase9
Cleaved-Caspase9
Bax
Bcl-2
Cleaved-PARP
PARP
B-Actin
Cleaved-Caspase3 Cleaved-Caspase9 Bax
Bcl-2 Cleaved-PARP
Relative density(/β-acitn)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Control
Control-HPCA
0.5
1
2
3
TAT-HPCA

도면5


A)
Histidine
Control
HPCA
TAT-HPCA
B)
CV
Iba-1
GFAP
Sham
Vehicle
TAT-peptide
HPCA
TAT-HPCA

서 열 목 록 (첨부)



아이콘을 클릭하시면 서열목록 파일이 열립니다.

본 공보 PDF는 첨부파일을 가지고 있습니다. Acrobat Reader PDF뷰어를 제공하지 않는 브라우저(크롬, 파이어폭스, 사파리 등)의 경우 첨부파일 열기가 제한되어 있으므로 Acrobat Reader PDF뷰어 설치 후 공보 PDF를 다운로드 받아 해당 뷰어에서 조회해주시기 바랍니다.