



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103638422 B

(45) 授权公告日 2015. 10. 07

(21) 申请号 201310671048. 0

(22) 申请日 2013. 12. 12

(73) 专利权人 徐士杰

地址 236800 安徽省亳州市谯城区谯东镇竹园 26 号

(72) 发明人 徐士杰

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务所 34108

代理人 孟力

(51) Int. Cl.

A61K 36/9062(2006. 01)

A61P 13/00(2006. 01)

A61P 7/10(2006. 01)

A61K 35/64(2015. 01)

A61K 35/36(2015. 01)

A61K 33/00(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1626172 A, 2005. 06. 15, 全文.

刘忠信. 施汉章教授治疗前列腺肥大的经验. 《新中医》. 2001, 第 33 卷 (第 01 期), 10-11.

张磊等. 中医药治疗前列腺疾病临床应用近况. 《云南中医学院学报》. 1999, 第 22 卷 (第 01 期), 38-41.

审查员 江炜

权利要求书3页 说明书6页

(54) 发明名称

一种治疗尿潴留的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗尿潴留的药物及其制备方法,它主要是由玉竹、穿山甲、肉桂、王不留行、益母草、冬葵子、石韦、菟丝子、五味子、益智仁等药物按一定重量配比制备而成,本发明药物具有清热解毒,利尿消肿,降火通淋的功能,用于治疗尿潴留见效快,疗效好,治愈后不复发。

1. 一种治疗尿潴留的药物,其特征在于:它是由下列重量范围内的原料药制成:

玉竹 10-20 克 穿山甲 5-15 克 肉桂 10-20 克
王不留行 10-20 克 益母草 5-15 克 冬葵子 10-20 克
石韦 10-20 克 菟丝子 5-15 克 五味子 10-20 克
益智仁 10-20 克 垂盆草 5-15 克 刘寄奴 10-20 克
补骨脂 10-20 克 牛膝 5-15 克 凤眼草 10-20 克
海浮石 10-20 克 竹叶 5-15 克 天花粉 10-20 克
桑螵蛸 15-25 克 篇蓄 15-25 克 白头翁 25-35 克
白花蛇舌草 15-25 克 虻虫 15-25 克 桑寄生 10-20 克
灯心草 5-15 克 千里光 10-20 克 石榴花 15-25 克
牡丹皮 15-25 克 白果 25-35 克 桑叶 5-15 克
蒲黄 5-15 克 橘核 5-15 克 猪苓 10-20 克
胡桃仁 10-20 克 榧子 10-20 克 小茴香 15-25 克
虎杖 15-25 克 鱼腥草 25-35 克。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料药的用量为:

玉竹 15 克 穿山甲 10 克 肉桂 15 克
王不留行 15 克 益母草 10 克 冬葵子 15 克
石韦 15 克 菟丝子 10 克 五味子 15 克
益智仁 15 克 垂盆草 10 克 刘寄奴 15 克
补骨脂 15 克 牛膝 10 克 凤眼草 15 克
海浮石 15 克 竹叶 10 克 天花粉 15 克
桑螵蛸 20 克 篇蓄 20 克 白头翁 30 克
白花蛇舌草 20 克 虻虫 20 克 桑寄生 15 克
灯心草 10 克 千里光 15 克 石榴花 20 克
牡丹皮 20 克 白果 30 克 桑叶 10 克
蒲黄 10 克 橘核 10 克 猪苓 15 克
胡桃仁 15 克 榧子 15 克 小茴香 20 克
虎杖 20 克 鱼腥草 30 克。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法,其特征在于:它包括下列步骤:

(一) 备料

(1) 玉竹:除去杂质,洗净泥土,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干;

(2) 穿山甲:取拣净的穿山甲片,分开大小,另将砂子置锅内炒热,加入穿山甲片,炒至鼓起呈金黄色时,取出,筛去砂子,放凉;

(3) 肉桂:拣净杂质,刮去粗皮,用时打碎,或刮去粗皮,用温开水浸润片刻,切片,晾干;

(4) 王不留行:簸净杂质,置锅内,用文火炒至爆开白花六、七成时取出,放凉;

(5) 益母草:拣去杂质,洗净,润透,切段,晒干;

(6) 冬葵子:清水洗净,切片,晒干;

(7) 石韦:拣净杂质,洗去泥砂,刷净茸毛,切段,晒干;

- (8) 菟丝子 :过筛去净杂质,洗净,晒干 ;
- (9) 五味子 :筛去灰屑,除去杂质,置蒸笼内蒸透,取出晒干 ;
- (10) 益智仁 :取益智仁置锅内,炒至外壳焦黑,取出冷透,除去果壳,取仁捣碎用 ;
- (11) 垂盆草 :除去杂质、泥沙,洗净 ;
- (12) 刘寄奴 :拣净杂质,去根,用水洗净,稍浸,切段,晒干 ;
- (13) 补骨脂 :簸尽杂质,洗净,晒干 ;
- (14) 牛膝 :拣去杂质,洗净,润软,去芦,切段,晒干 ;
- (15) 凤眼草 :8-9 月果熟时采收,除去果柄,晒干 ;
- (16) 海浮石 :洗净晒干,碾碎 ;
- (17) 竹叶 :拣净杂质,除去梗叶,晾干 ;
- (18) 天花粉 :拣去杂质,大小块分开,用水泡约六成透,捞出,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干,或用水洗净,捞出,晒至极干,捣成小块 ;
- (19) 桑螵蛸 :将净桑螵蛸和麸皮同炒至老黄色,取出,筛去麸皮,放凉 ;
- (20) 篇蓄 :去净杂质及根,洗净,润软,切段晒干 ;
- (21) 白头翁 :拣净杂质,洗净,润透后切片,晒干 ;
- (22) 白花蛇舌草 :取原药材,除去杂质,抢水洗净,稍晾,切段,干燥,筛去灰屑 ;
- (23) 虻虫 :拣净杂质,除去翅、足,或用文火微炒用 ;
- (24) 桑寄生 :用水洗净,润透,切段,晒干 ;
- (25) 灯心草 :取灯心草置锅内,上覆一口径略小的锅,贴以白纸,两锅交接处,用盐泥封固,不使泄气,煨至白纸呈焦黄色停火,凉透后取出 ;
- (26) 千里光 :取原药材,除去杂质,洗净,稍晾,切段,干燥 ;
- (27) 石榴花 :拣净杂质,晒干 ;
- (28) 牡丹皮 :拣去杂质,除去木心,洗净,润透,切片,晾干 ;
- (29) 白果 :拣净杂质,除去硬壳 ;
- (30) 桑叶 :拣去杂质,搓碎,簸去梗,筛去泥屑 ;
- (31) 蒲黄 :揉碎结块,过筛,除去杂质 ;
- (32) 橘核 :筛去灰屑,拣净杂质,洗净,晒干 ;
- (33) 猪苓 :洗净泥砂,润软切片,晾干 ;
- (34) 胡桃仁 :取原药材,除去分离的木质隔膜及杂质,用时捣碎 ;
- (35) 栀子 :筛去灰屑,拣去杂质,碾碎过筛或剪去两端 ;
- (36) 小茴香 :取原药材,除去杂质 ;
- (37) 虎杖 :春、秋采挖,切断,晒干 ;
- (38) 鱼腥草 :去净杂质,除去残根,洗净切段,晒干 ;

(二) 制备

(1) 将所述重量的玉竹、穿山甲、肉桂、王不留行、益母草、冬葵子、石韦、菟丝子、五味子、益智仁、垂盆草、刘寄奴、补骨脂、牛膝、凤眼草、海浮石、竹叶、天花粉、桑螵蛸、篇蓄、白头翁、白花蛇舌草、虻虫、桑寄生、灯心草、千里光、石榴花、牡丹皮、白果、桑叶、蒲黄、橘核、猪苓、胡桃仁、栀子、小茴香、虎杖、鱼腥草加水煎煮二次,第一次加水 10 倍量,浸泡 100 分钟后,武火煎煮沸腾 10 分钟,再用文火煎煮 45 分钟,过滤得第一次煎煮液,将煎煮液倒入容器

内；

- (2) 将过滤的药渣加水 6 倍量, 武火煮沸, 文火煎煮 30 分钟, 过滤得第二次煎煮液；
- (3) 合并二次煎煮液, 武火煮沸, 再用文火煎煮 10 分钟即得, 分为 6 剂服用。

一种治疗尿潴留的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于治疗尿潴留的药物及其制备方法,属中药领域。

背景技术

[0002] 膀胱内积有大量尿液而不能排出,称为尿潴留。引起尿潴留的原因很多,一般可分为阻塞性和非阻塞性两类。阻塞性尿潴留的病因有前列腺增生、尿道狭窄、膀胱或尿道结石、肿瘤等疾病、阻塞了膀胱颈或尿道而发生尿潴留。非阻塞性尿潴留即膀胱和尿道并无器质性病变,多由神经或肌源性因素导致排尿功能障碍引起的。目前,西药治疗尿潴留效果不佳,且长期服用西药有较多副作用,因此,人们对有效治疗尿潴留的中药存在很大的需求。

发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究及临床反复的试验和验证,终于找到了有效治疗尿潴留的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种能够有效治疗尿潴留的组合药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选用玉竹、穿山甲、肉桂、王不留行、益母草、冬葵子、石韦、菟丝子、五味子、益智仁、垂盆草、刘寄奴、补骨脂、牛膝、凤眼草、海浮石、竹叶、天花粉、桑螵蛸、篇蓄、白头翁、白花蛇舌草、虻虫、桑寄生、灯心草、千里光、石榴花、牡丹皮、白果、桑叶、蒲黄、橘核、猪苓、胡桃仁、栀子、小茴香、虎杖、鱼腥草药物进行组合的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够快速治疗尿潴留的复发。其中选用玉竹是因为其性味甘,平,入肺,胃经,有养阴,润燥,除烦,止渴的功能,治热病阳伤,咳嗽,烦渴,虚劳发热,消谷易饥,小便频数。选用穿山甲是因为其性味咸,凉,入肝、胃经,有消肿溃痛,搜风活络,通经下乳的功能,治痈疽疮肿,风寒湿痹,月经停闭,乳汁不通,外用止血。选用肉桂是因为其性味辛甘,热,入肾、脾、膀胱经,有补元阳,暖脾胃,除积冷,通血脉的功能,治命门火衰,肢冷脉微,亡阳虚脱,腹痛泄泻,寒疝奔豚,腰膝冷痛,经闭癥瘕,阴疽,流注,及虚阳浮越,上热下寒。选用王不留行是因为其性味苦平,入肝、胃经,有行血通经,催生下乳,消肿敛疮的功能,治妇女经闭,乳汁不通,难产,血淋,痈肿,金疮出血。选用益母草是因为其性味辛苦,凉,入心包、肝经,有活血,祛瘀,调经,消水的功能,治月经不调,治漏难产,胞衣不下,产后血晕,瘀血腹痛,崩中漏下,尿血,泻血,痈肿疮疡。选用冬葵子是因其性味甘,寒。入大小肠、膀胱经。利水,滑肠,下乳。治二便不通,淋病,水肿,妇女乳汁不行,乳房肿痛。选用石韦是因为其性味苦甘,凉,入肺、膀胱经,有利水通淋,清肺泄热的功能,治淋痛,尿血,尿路结石,肾为,崩漏,痢疾,肺热咳嗽,慢性气管炎,金疮,痈疽。选用菟丝子是因为其性味辛甘,平,入肝、肾经,有补肝肾,益精髓,明目的功能,治腰膝酸痛,遗精,消渴,尿有余沥,目暗。选用五味子是因为其性味酸,温,入肺、肾经,有敛肺,滋肾,生津,收汗,涩精的功能,治肺虚喘咳,口干作渴,自汗,盗汗,劳伤羸瘦,梦遗滑精,久泻久痢。选用益智仁是因为其性味辛,温,入脾、肾经,有温脾,暖肾,固气,涩精的功能,治冷气腹痛,中寒吐泻,多唾,遗精,小便余沥,夜

多小便。选用垂盆草是因为其性味甘、淡，凉，归肝、胆、小肠经，有清利湿热，解毒的功能，治湿热黄疸，小便不利，痈肿疮疡。选用刘寄奴是因为其性味苦，温，入心、脾经，有破血通经，敛疮消肿的功能，治经闭癥瘕，胸腹胀痛，产后血瘀，跌打损伤，金疮出血，痈毒焮肿。补骨脂是因为其性味辛，温。入肾经。补肾助阳。治肾虚冷泻，遗尿，滑精，小便频数，阳痿，腰膝冷痛，虚寒喘嗽。选用牛膝是因为其性味甘苦酸，平，入肝、肾经，生用散瘀血，消痈肿的功能，治淋病，尿血，经闭，癥瘕，难产，胞衣不下，产后瘀血腹痛，喉痹，痈肿，跌打损伤，熟用补肝肾，强筋骨，治腰膝骨痛，四肢拘挛，痿痹。选用凤眼草是因为其性味苦涩，性寒，治痢疾，肠风便血，尿血，崩漏，白带。选用海浮石是因为其性味咸寒，入肺、胃经，有清肺火，化老痰，软坚，通淋的功能，治痰热喘嗽，老痰积块，癭瘤，瘰疬，疝气，疮肿，目翳。选用竹叶是因为其性味甘淡，寒，入心、肺、胆、胃经，有清热除烦，生津利尿的功能，治热病烦渴，小儿惊癇，咳逆吐衄，面赤，小便短赤，口糜舌疮。选用天花粉是因为其性味甘苦酸，凉，入肺、胃经，有生津，止渴，降火，润燥，排脓，消肿的功能，治热病口渴，消渴，黄疸，肺燥咳血，痈肿，痔瘕。选用桑螵蛸是因为其性味咸、甘、平，有补肾，固精的功能，治遗精，白浊，阳痿，早泄。选用篇蓄是因为其性味苦，寒，入膀胱经，有利尿，清热，杀虫的功能，治热淋、癃闭，黄疸，阴蚀，白带，蛔虫，疝积，痔肿，湿疮。选用白头翁是因为其性味苦，寒，入大肠、肝、胃经，有清热凉血，解毒的功能，治热毒血痢，温疟寒热，鼻衄，血痔。选用白花蛇舌草是因为其性味苦甘，寒，入心、肝、脾三经，有清热，利湿，解毒的功能，治肺热喘咳，扁桃体炎，咽喉炎，阑尾炎，痢疾，黄疸，盆腔炎，附件炎，痈肿疔疮，毒蛇咬伤。选用虻虫是因为其性味苦，凉，有毒，入肝经，有逐瘀，破积，通经的功能，治癥瘕，积聚，少腹蓄血，血滞经闭，扑损瘀血。选用桑寄生是因为其性味苦甘，平，入肝、肾经，有补肝肾，强筋骨，除风湿，通经络，益血，安胎的功能，治腰膝酸痛，筋骨痿弱，偏枯，脚气，风寒湿痹，胎漏血崩，产后乳汁不下。选用灯心草是因为其性味甘淡，寒，入心、肺、小肠经，有清心降火，利尿通淋的功能，治淋病，水肿，小便不利，湿热黄疸，心烦不寐，小儿夜啼，喉痹，创伤。选用千里光是因为其性味苦，寒，归肺、肝、大肠经，有清热解毒，明目，止痒的功能，治风热感冒，目赤肿痛，泄泻痢疾，皮肤湿疹，疮疖。选用石榴花是因为其性味酸涩，平，治鼻衄，中耳炎，创伤出血。选用牡丹皮是因为其性味辛苦，凉，入心、肝、肾经，有清热，凉血，和血，消瘀的功能，治热入血分，发斑，惊癇，吐、衄、便血，骨蒸劳热，经闭，癥瘕，痈疡，扑损。选用白果是因为其性味甘苦涩，平，有毒，入肺、肾经，有敛肺气，定喘嗽，止带浊，缩小便的功能，治哮喘，痰嗽，白带，白浊，遗精，淋病，小便频数。选用桑叶是因为其性味苦甘，寒，入肺、肝经，有祛风清热，凉血明目的功能，治风湿发热，头痛，目赤，口渴，肺热咳嗽，风痹，瘾疹，下肢象皮肿。选用蒲黄是因为其性味甘辛苦，凉，入肝、心经，有凉血止血，活血消瘀的功能，生用治经闭腹痛，产后瘀阻作痛，跌扑血闷，疮疖肿毒，炒黑止吐血，衄血，崩漏，泻血，尿血，血痢，带下，外治重舌，口疮，聾耳流脓，耳中出血，阴下湿痒。选用橘核是因为其性味苦，平，无毒，入肝、肾经，有理气，止痛的功能，治疝气，睾丸肿痛，乳痛，腰痛，膀胱气痛。选用猪苓是因为其性味甘淡，平，入脾、肾、膀胱经，有利尿渗湿的功能，治小便不利，水肿胀满，脚气，泄泻，淋、浊，带下。选用胡桃仁是因为其性味甘，温，入肾、肺经，有补肾固精，温肺定喘，润肠的功能，治肾虚喘嗽，腰痛脚弱，阳痿，遗精，小便频数，石淋，大便燥结。选用栀子是因为其性味苦，寒，入心、肝、肺、胃经，有清热，泻火，凉血的功能，治热病虚烦不眠，黄疸，淋病，消渴，目赤，咽痛，吐血，衄血，血痢，尿血，热毒疮疡，扭伤肿痛。选用小茴香是因为其性味辛，温，归肝、肾、脾、胃经，有散寒止痛，理气和胃的功能，

治寒疝腹痛, 睾丸偏坠, 痛经, 少腹冷痛, 脘腹胀满, 食少吐泻, 睾丸鞘膜积液。选用虎杖是因为其性味苦, 平, 有祛风, 利湿, 破瘀, 通经的功能, 治风湿筋骨疼痛, 湿热黄疸, 淋浊带下, 妇女经闭, 产后恶露不下, 癥瘕积聚, 痔漏下血, 跌扑损伤, 烫伤, 恶疮癬疾。选用鱼腥草是因为其性味辛, 寒, 入手太阴经, 有清热解毒, 利尿消肿的功能, 治肺炎, 肺脓疡, 热痢, 疟疾, 水肿, 淋病, 白带, 痈肿, 痔疮, 脱肛, 湿疹, 秃疮, 疥癬。

具体实施方式

[0007] 本发明组分的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的, 各组分的用量在上述重量范围内都具有较好疗效:

[0008]	玉竹	10-20 克	穿山甲	5-15 克	肉桂	10-20 克
[0009]	王不留行	10-20 克	益母草	5-15 克	冬葵子	10-20 克
[0010]	石韦	10-20 克	菟丝子	5-15 克	五味子	10-20 克
[0011]	益智仁	10-20 克	垂盆草	5-15 克	刘寄奴	10-20 克
[0012]	补骨脂	10-20 克	牛膝	5-15 克	凤眼草	10-20 克
[0013]	海浮石	10-20 克	竹叶	5-15 克	天花粉	10-20 克
[0014]	桑螵蛸	15-25 克	篇蓄	15-25 克	白头翁	25-35 克
[0015]	白花蛇舌草	15-25 克	虻虫	15-25 克	桑寄生	10-20 克
[0016]	灯心草	5-15 克	千里光	10-20 克	石榴花	15-25 克
[0017]	牡丹皮	15-25 克	白果	25-35 克	桑叶	5-15 克
[0018]	蒲黄	5-15 克	橘核	5-15 克	猪苓	10-20 克
[0019]	胡桃仁	10-20 克	梔子	10-20 克	小茴香	15-25 克
[0020]	虎杖	15-25 克	鱼腥草	25-35 克		

[0021] 优选用量为

[0022]	玉竹	15 克	穿山甲	10 克	肉桂	15 克
[0023]	王不留行	15 克	益母草	10 克	冬葵子	15 克
[0024]	石韦	15 克	菟丝子	10 克	五味子	15 克
[0025]	益智仁	15 克	垂盆草	10 克	刘寄奴	15 克
[0026]	补骨脂	15 克	牛膝	10 克	凤眼草	15 克
[0027]	海浮石	15 克	竹叶	10 克	天花粉	15 克
[0028]	桑螵蛸	20 克	篇蓄	20 克	白头翁	30 克
[0029]	白花蛇舌草	20 克	虻虫	20 克	桑寄生	15 克
[0030]	灯心草	10 克	千里光	15 克	石榴花	20 克
[0031]	牡丹皮	20 克	白果	30 克	桑叶	10 克
[0032]	蒲黄	10 克	橘核	10 克	猪苓	15 克
[0033]	胡桃仁	15 克	梔子	15 克	小茴香	20 克
[0034]	虎杖	20 克	鱼腥草	30 克		

[0035] 本发明药物的制备方法如下

[0036] 一、备料

[0037] 1、玉竹: 除去杂质, 洗净泥土, 闷润至内外湿度均匀, 切片, 晒干;

- [0038] 2、穿山甲：取拣净的穿山甲片，分开大小，另将砂子置锅内炒热，加入穿山甲片，炒至鼓起呈金黄色时，取出，筛去砂子，放凉；
- [0039] 3、肉桂：拣净杂质，刮去粗皮，用时打碎，或刮去粗皮，用温开水浸润片刻，切片，晾干；
- [0040] 4、王不留行：簸净杂质，置锅内，用文火炒至爆开白花六、七成时取出，放凉；
- [0041] 5、益母草：拣去杂质，洗净，润透，切段，晒干；
- [0042] 6、冬葵子：清水洗净，切片，晒干；
- [0043] 7、石韦：拣净杂质，洗去泥砂，刷净茸毛，切段，晒干；
- [0044] 8、菟丝子：过筛去净杂质，洗净，晒干；
- [0045] 9、五味子：筛去灰屑，除去杂质，置蒸笼内蒸透，取出晒干；
- [0046] 10、益智仁：取益智仁置锅内，炒至外壳焦黑，取出冷透，除去果壳，取仁捣碎用；
- [0047] 11、垂盆草：除去杂质、泥沙，洗净；
- [0048] 12、刘寄奴：拣净杂质，去根，用水洗净，稍浸，切段，晒干；
- [0049] 13、补骨脂：簸尽杂质，洗净，晒干；
- [0050] 14、牛膝：拣去杂质，洗净，润软，去芦，切段，晒干；
- [0051] 15、凤眼草：8-9 月果熟时采收，除去果柄，晒干；
- [0052] 16、海浮石：洗净晒干，碾碎；
- [0053] 17、竹叶：拣净杂质，除去梗叶，晾干；
- [0054] 18、天花粉：拣去杂质，大小块分开，用水泡约六成透，捞出，闷润至内外湿度均匀，切片，晒干，或用水洗净，捞出，晒至极干，捣成小块；
- [0055] 19、桑螵蛸：将净桑螵蛸和麸皮同炒至老黄色，取出，筛去麸皮，放凉；
- [0056] 20、篇蓄：去净杂质及根，洗净，润软，切段晒干；
- [0057] 21、白头翁：拣净杂质，洗净，润透后切片，晒干；
- [0058] 22、白花蛇舌草：取原药材，除去杂质，抢水洗净，稍晾，切段，干燥，筛去灰屑；
- [0059] 23、虻虫：拣净杂质，除去翅、足，或用文火微炒用；
- [0060] 24、桑寄生：用水洗净，润透，切段，晒干；
- [0061] 25、灯心草：取灯心草置锅内，上覆一口径略小的锅，贴以白纸，两锅交接处，用盐泥封固，不使泄气，煨至白纸呈焦黄色停火，凉透后取出；
- [0062] 26、千里光：取原药材，除去杂质，洗净，稍晾，切段，干燥；
- [0063] 27、石榴花：拣净杂质，晒干；
- [0064] 28、牡丹皮：拣去杂质，除去木心，洗净，润透，切片，晾干；
- [0065] 29、白果：拣净杂质，除去硬壳；
- [0066] 30、桑叶：拣去杂质，搓碎，簸去梗，筛去泥屑；
- [0067] 31、蒲黄：揉碎结块，过筛，除去杂质；
- [0068] 32、橘核：筛去灰屑，拣净杂质，洗净，晒干；
- [0069] 33、猪苓：洗净泥砂，润软切片，晾干；
- [0070] 34、胡桃仁：取原药材，除去分离的木质隔膜及杂质，用时捣碎；
- [0071] 35、栀子：筛去灰屑，拣去杂质，碾碎过筛或剪去两端；
- [0072] 36、小茴香：取原药材，除去杂质；

[0073] 37、虎杖：春、秋采挖，切断，晒干；

[0074] 38、鱼腥草：去净杂质，除去残根，洗净切段，晒干。

[0075] 二、制备

[0076] 1、将所述重量的玉竹、穿山甲、肉桂、王不留行、益母草、冬葵子、石韦、菟丝子、五味子、益智仁、垂盆草、刘寄奴、补骨脂、牛膝、凤眼草、海浮石、竹叶、天花粉、桑螵蛸、篇蓄、白头翁、白花蛇舌草、虻虫、桑寄生、灯心草、千里光、石榴花、牡丹皮、白果、桑叶、蒲黄、橘核、猪苓、胡桃仁、栀子、小茴香、虎杖、鱼腥草加水煎煮二次，第一次加水 10 倍量，浸泡 100 分钟后，武火煎煮沸腾 10 分钟，再用文火煎煮 45 分钟，过滤得第一次煎煮液，将煎煮液倒入容器内。

[0077] 2、将过滤的药渣加水 6 倍量，武火煮沸，文火煎煮 30 分钟，过滤得第二次煎煮液。

[0078] 3、合并二次煎煮液，武火煮沸，再用文火煎煮 10 分钟即得，分为 6 剂服用。

[0079] 本发明药物具有清热解毒，利尿消肿，降火通淋的功能，用于治疗尿潴留，疗程短、见效快、无毒副作用。

[0080] 以下通过试验例来进一步阐述本发明所述药物的有益效果，这些试验例包括了本发明药物的动物毒性试验报告和临床观察资料。

[0081] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验报告

[0082] 取家兔 30 只，雌雄兼用，体重 2.0-2.4kg，分两组，每组 15 只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超剂量组为 20ml/kg，正常量为 10ml/kg，给药方式为灌胃法给药，每天 2 次，连服 7 天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0083] [试验例 2] 本发明药物治疗尿潴留的观察资料

[0084] 1、一般资料

[0085] 收治尿潴留患者共 167 例。

[0086] 2、诊断标准

[0087] 按病程可分为急性尿潴留和慢性尿潴留。

[0088] 急性尿潴留：是指急性发生的膀胱胀满而无法排尿，常伴随由于明显尿意而引起的疼痛和焦虑，严重影响患者的生活质量。

[0089] 慢性尿潴留：慢性尿潴留是由膀胱颈以下梗阻性病变引起的排尿困难发展而来。由于持久而严重的梗阻，膀胱逼尿肌初期可增厚，后期可变薄，粘膜表面小梁增生，小室及假性憩室形成，膀胱代偿机能不全，残余尿量逐渐增加，可出现充溢性尿失禁。

[0090] 按病因可分为梗阻性、神经性和肌源性。

[0091] ①梗阻性因素：机械性梗阻（如尿道狭窄、血块或结石堵塞）或动力性梗阻（如 α - 肾上腺素能活性增加，前列腺炎）导致的尿流阻力增加。

[0092] ②神经性因素：膀胱感觉或运动神经受损（如盆腔手术，多发性硬化，脊髓损伤，糖尿病等引起）。

[0093] ③肌源性因素：膀胱过度充盈（如麻醉，饮酒过量）。

[0094] 3、治疗方法

[0095] 选用上述药剂，给患者服用，每次服用 1 剂，每天早、中、晚各服 1 次，10 天为一个疗程，连续服用 5 个疗程。

[0096] 4、疗效评定标准

[0097] 显效：尿潴留症状消失，观察半年无反弹者；

[0098] 好转：尿潴留症状明显改善，体质逐步增强；

[0099] 无效：尿潴留症状无改变，达不到好转标准者。

[0100] 5、治疗结果(见下表)

[0101]

类 型	病例 总数	治疗 时间	显 效		好 转		无 效		总有效 率%
			例 数	显效率 %	例 数	好转率 %	例 数	无效率 %	
尿潴留	167	50 天	158	94.61	6	3.59	3	1.8	98.2

[0102] 在上述的治疗中,用本发明药物治疗尿潴留患者 167 例,结果显效 158 例,显效率为 94.61%,好转 6 例,好转率为 3.59%,无效 3 例,总有效率为 98.2%。