

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年6月15日(15.06.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/105976 A1

(51) 国際特許分類:
G16H 10/40 (2018.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/040265

(22) 国際出願日: 2022年10月27日(27.10.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-199612 2021年12月8日(08.12.2021) JP
特願 2022-118300 2022年7月25日(25.07.2022) JP

(71) 出願人: 富士フイルム株式会社 (FUJIFILM CORPORATION) [JP/JP]; 〒1068620 東京都港区西麻布2丁目2番30号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 王 彩華(WANG, Caihua); 〒2588577 神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地 富士フイルム株式会社内 Kanagawa (JP).


(74) 代理人: 弁理士法人太陽国際特許事務所(TAIYO, NAKAJIMA & KATO); 〒1600022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,

(54) Title: CLINICAL TRIAL ASSISTANCE APPARATUS, METHOD FOR OPERATING CLINICAL TRIAL ASSISTANCE APPARATUS, AND PROGRAM FOR OPERATING CLINICAL TRIAL ASSISTANCE APPARATUS

(54) 発明の名称: 臨床試験支援装置、臨床試験支援装置の作動方法、および臨床試験支援装置の作動プログラム

【図5】



- 10 Clinical trial assistance server
- 11 Operator terminal
- 15 Sorting request
- 16G MRI image group
- 17 Sorting results
- 20 Storage
- 30 Operating program
- 31 Rate of progress prediction model
- 32 Sorting table
- 35 Reception unit
- 36 RW control unit
- 37 Prediction unit
- 38 Grouping unit
- 39 Sorting unit
- 40 Delivery control unit
- 45G Prediction result group
- 46 Grouping results

(57) Abstract: This clinical trial assistance apparatus is provided with a processor which: predicts the rate of progress of a disease of interest with respect to the subjects of a clinical trial; divides the subjects into a plurality of groups according to the result of prediction of the rate of progress of the disease of interest; and sorts the subjects, for each of the plurality

MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

of groups, into a test drug group for which a test drug is to be administered and a placebo group for which a placebo is to be administered.

- (57) 要約: プロセッサを備え、プロセッサは、臨床試験の対象者について対象疾患の進行の速さを予測し、対象疾患の進行の速さの予測結果に応じて対象者を複数のグループに分け、複数のグループ毎に、被験薬を投与する被験薬群と偽薬を投与する偽薬群とに対象者を振り分ける。

明 細 書

発明の名称：

臨床試験支援装置、臨床試験支援装置の作動方法、および臨床試験支援装置の作動プログラム

技術分野

[0001] 本開示の技術は、臨床試験支援装置、臨床試験支援装置の作動方法、および臨床試験支援装置の作動プログラムに関する。

背景技術

[0002] 本格的な高齢化社会の到来により、疾患、例えばアルツハイマー型認知症に代表される認知症の発症を予防したり、認知症の進行を遅らせる医薬（以下、抗認知症薬と表記する場合がある）の開発に力が入れている。抗認知症薬は、一定期間の臨床試験を経てその効能が評価される。抗認知症薬の臨床試験の対象者（被験者ともいう）としては、認知症の進行が比較的速い者が好ましい。というのは、認知症の進行が比較的遅い者であると、抗認知症薬の効能によって進行が抑えられているのか、その者特有の理由によって進行が遅れているのかが判然としないためである。

[0003] 臨床試験においては、被験薬を投与する被験薬群と、偽薬（プラセボともいう）を投与する偽薬群とに対象者を振り分け、被験薬群と偽薬群との比較により被験薬の効能を確かめるプラセボ対照試験が行われることがある。臨床試験は、少数の健康な成人を対象とした、主に被験薬の安全性およびその体内動態等を調べる臨床第1相試験（臨床薬理試験とも呼ばれる）、比較的小規模な臨床第2相試験（探索的試験とも呼ばれる）、および比較的大規模な臨床第3相試験（検証的試験とも呼ばれる）の3段階の試験に分けて行われる。

[0004] <S. Ostrowitzki, et al: A phase I
I I randomized trial of ganteneruma
b i n prodromal Alzheimer's disease

, Alzheimer's Research & Therapy, 2017. > (以下、文献1と表記する) には、プラセボ対照試験を用いた抗認知症薬の被験薬の臨床試験方法が記載されている。文献1では、臨床試験が終了した後に、回帰モデルを用いて対象者の認知症の進行の速さを予測している。そして、予測結果に応じて対象者を認知症の進行が比較的速いグループと遅いグループとに分け、それぞれのグループに対して被験薬群と偽薬群における認知能力の変化を比較している。

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] プラセボ対照試験では、試験の対象の疾患である対象疾患の進行が比較的速い対象者と遅い対象者の偏りが被験薬群と偽薬群との間にあると、以下のような問題が起こる。例えば臨床第2相試験において、被験薬群に対象疾患の進行が比較的遅い対象者が多く振り分けられ、偽薬群に対象疾患の進行が比較的速い対象者が多く振り分けられた場合を考える。この場合、被験薬の効能が実際には乏しかったとしても被験薬群においては偽薬群と比べて対象疾患の進行が抑えられたかのように見えるので、被験薬の効能が過大に評価される。このため、臨床第2相試験をクリアしたとして臨床第3相試験を行っても、実際は被験薬の効能が乏しいとの結果が出て、臨床第3相試験に掛けた時間と費用が無駄になるおそれがある。

[0006] 反対に、臨床第2相試験において、被験薬群に対象疾患の進行が比較的速い対象者が多く振り分けられ、偽薬群に対象疾患の進行が比較的遅い対象者が多く振り分けられた場合を考える。この場合、被験薬の効能が実際には高かったとしても被験薬群においては偽薬群と比べて対象疾患が進行するので、被験薬の効能が過小に評価される。このため、もし被験薬の効能が実際には高かったとしても、臨床第2相試験をクリアすることができず、臨床第3相試験に移行せずに開発が中止されるおそれがある。

[0007] 本開示の技術に係る1つの実施形態は、対象疾患の被験薬の効能の正当な評価に寄与することが可能な臨床試験支援装置、臨床試験支援装置の作動方

法、および臨床試験支援装置の作動プログラムを提供する。

課題を解決するための手段

- [0008] 本開示の臨床試験支援装置は、プロセッサを備え、プロセッサは、臨床試験の対象者について対象疾患の進行の速さを予測し、対象疾患の進行の速さの予測結果に応じて対象者を複数のグループに分け、複数のグループ毎に、被験薬を投与する被験薬群と偽薬を投与する偽薬群とに対象者を振り分ける。
- [0009] プロセッサは、予測結果に基づいて、対象疾患の進行が比較的速い対象者を選定し、選定した対象者に対してのみ、予測結果に応じたグループ分け、および被験薬群と偽薬群への振り分けを行うことが好ましい。
- [0010] プロセッサは、ブロックランダムイズ手法を用いて被験薬群と偽薬群とに対象者を振り分けることが好ましい。
- [0011] プロセッサは、学習済みモデルを用いて対象疾患の進行の速さの予測を行い、学習済みモデルは、第1時点における対象疾患患者の臓器を写した医用画像を学習用入力データとし、第1時点から臨床試験期間に相当する期間を経た第2時点における対象疾患患者の対象疾患の進行度合いを示す数値を正解データとして学習された学習済みモデルであり、プロセッサは、臨床試験の開始時点における対象者の臓器を写した医用画像を学習済みモデルに入力し、臨床試験の終了時点における対象者の対象疾患の進行度合いを示す数値を、予測結果として学習済みモデルから出力させることが好ましい。
- [0012] 学習済みモデルは、臨床試験の開始時点における医用画像から臓器の複数の解剖区域の画像である複数の解剖区域画像を抽出し、解剖区域毎に用意された特徴量導出モデルに解剖区域画像を入力し、特徴量導出モデルから解剖区域の特徴量を出力させることが好ましい。
- [0013] 学習用入力データは、第1時点における対象疾患患者の対象疾患に関する対象疾患関連データも含み、プロセッサは、臨床試験の開始時点における対象者の対象疾患に関する対象疾患関連データも学習済みモデルに入力することが好ましい。

- [0014] 対象疾患は認知症であり、数値は、認知機能検査のスコアの変化量、または対象疾患となる確率であることが好ましい。
- [0015] 対象疾患は脳神経疾患であることが好ましい。また、対象疾患は認知症であることが好ましい。
- [0016] 本開示の臨床試験支援装置の作動方法は、臨床試験の対象者について対象疾患の進行の速さを予測すること、対象疾患の進行の速さの予測結果に応じて対象者を複数のグループに分けること、並びに、複数のグループ毎に、被験薬を投与する被験薬群と偽薬を投与する偽薬群とに対象者を振り分けること、を含む。
- [0017] 本開示の臨床試験支援装置の作動プログラムは、臨床試験の対象者について対象疾患の進行の速さを予測すること、対象疾患の進行の速さの予測結果に応じて対象者を複数のグループに分けること、並びに、複数のグループ毎に、被験薬を投与する被験薬群と偽薬を投与する偽薬群とに対象者を振り分けること、を含む処理をコンピュータに実行させる。

発明の効果

- [0018] 本開示の技術によれば、対象疾患の被験薬の効能の正当な評価に寄与することが可能な臨床試験支援装置、臨床試験支援装置の作動方法、および臨床試験支援装置の作動プログラムを提供することができる。

図面の簡単な説明

- [0019] [図1]臨床第1相試験から臨床第2相試験への流れを示す図である。
- [図2]臨床第2相試験から臨床第3相試験への流れを示す図である。
- [図3]臨床試験支援サーバとオペレータ端末、および臨床試験支援サーバとオペレータ端末の間に送受信される各種データを示す図である。
- [図4]臨床試験支援サーバを構成するコンピュータを示すブロック図である。
- [図5]臨床試験支援サーバのCPUの処理部を示すブロック図である。
- [図6]予測部の処理、およびMRI画像と予測結果の時点を示す図である。
- [図7]進行速さ予測モデルおよび予測部の処理の詳細を示す図である。
- [図8]オートエンコーダの構成および特徴量導出モデルの成り立ちを示す図で

ある。

[図9]オートエンコーダの学習フェーズにおける処理の概要を示す図である。

[図10]変化量導出モデルの学習フェーズにおける処理の概要を示す図である。

。

[図11]学習用MRI画像と正解CDR-SOB変化量の時点を示す図である。

。

[図12]グループ分け部の処理を示す図である。

[図13]振り分けテーブルを示す図である。

[図14]振り分け部の処理を示す図である。

[図15]振り分け部の処理を示す図である。

[図16]臨床試験支援サーバの処理手順を示すフローチャートである。

[図17]本開示の技術の効果を確かめるためのシミュレーションの詳細を示す図である。

[図18]臨床第2相試験において被験薬の効能が過大に評価される確率を示すグラフである。

[図19]臨床第2相試験において被験薬の効能が過小に評価される確率を示すグラフである。

[図20]臨床試験成功確率を示すグラフである。

[図21]第2実施形態の処理部を示す図である。

[図22]選定部の処理を示す図である。

[図23]MRI画像に加えて認知症関連データを進行速さ予測モデルに入力する第3実施形態を示す図である。

[図24]認知症関連データを示す図である。

[図25]特徴量群に加えて認知症関連データを変化量導出モデルに入力する態様を示す図である。

[図26]第3実施形態の変化量導出モデルの詳細構成を示す図である。

[図27]第3実施形態の変化量導出モデルの学習フェーズにおける処理の概要を示す図である。

[図28]学習用MR I画像、学習用認知症関連データ、および正解CDR-SOB変化量の時点を示す図である。

[図29]MR I画像および認知症関連データに加えて、臨床試験期間を進行速さ予測モデルに入力する態様を示す図である。

[図30]予測結果として認知症となる確率を出力する態様を示す図である。

[図31]マルチタスクCNNの構成および特徴量導出モデルの成り立ちを示す図である。

発明を実施するための形態

[0020] [第1実施形態]

一例として図1に示すように、認知症の発症を予防したり、認知症の進行を遅らせる抗認知症薬の開発に係る臨床試験においては、まず、少数の健康な成人を対象として、主に抗認知症薬の被験薬の安全性およびその体内動態等を調べる臨床第1相試験Ph1が行われる。臨床第1相試験Ph1をクリアした場合、例えば数百人程度の対象者Sによる比較的小規模な臨床第2相試験Ph2が行われる。この臨床第2相試験Ph2に先立ち、被験薬を投与する被験薬群TG (Treatment Group) と、偽薬を投与する偽薬群PG (Placebo Group) とに対象者Sが振り分けられる。

[0021] 臨床第2相試験Ph2において被験薬の効能なしと判定した場合（図1では「NG」と表記）は、臨床試験が中止される。一方、臨床第2相試験Ph2において被験薬の効能ありと判定した場合（図1では「OK」と表記）は、一例として図2に示すように、例えば数千人程度の対象者Sによる比較的大規模な臨床第3相試験Ph3が行われる。臨床第2相試験Ph2の場合と同様に、臨床第3相試験Ph3においても、被験薬群TGと偽薬群PGとに対象者Sが振り分けられる。臨床第2相試験Ph2および臨床第3相試験Ph3の期間は、いずれも例えば18カ月間である。

[0022] 臨床第3相試験Ph3において被験薬の効能なしと判定した場合（図2では「NG」と表記）は、臨床試験が中止される。一方、臨床第3相試験Ph

3において被験薬の効能ありと判定した場合（図2では「OK」と表記）は、厚生労働省への薬事申請が行われる。このため、本例における臨床試験は、厚生労働省からの承認を得ることを目的として行われる「治験」である。もちろん、「治験」以外の臨床試験も本開示の技術に含まれる。

[0023] 認知症は、本開示の技術に係る「対象疾患」および「脳神経疾患」の一例である。認知症としては、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、および血管性認知症等が挙げられる。抗認知症薬は、アルツハイマー型認知症以外のアルツハイマー病に用いるものでもよい。具体的には、抗認知症薬は、アルツハイマー病の発症前段階（PAD: Preclinical Alzheimer's disease）から、アルツハイマー病による軽度認知障害（MCI (Mild Cognitive Impairment) due to Alzheimer's disease）への進行を遅らせるものであってもよいし、アルツハイマー病によるMCIからアルツハイマー病への進行を遅らせるものであってもよい。対象疾患としては、例示の認知症のような脳神経疾患が好ましい。

[0024] なお、認知症の診断基準としては、日本神経学会監修の「認知症疾患診療ガイドライン2017」、「国際疾病分類第11版（ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) -11)」、米国精神医学会による「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)）」、および「米国国立老化研究所／アルツハイマー病協会ワークグループ（National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroup (NIA-AA)）基準」に記載された診断基準がある。かかる診断基準は援用することができ、これらの内容は本願明細書に組み込まれる。

[0025] 認知症の診断基準に係るデータには、認知機能検査データ、形態画像検査データ、脳機能画像検査データ、血液・脳髄液検査データ、および遺伝子検査データ等がある。認知機能検査データには、臨床認知症評価法（以下、CDR-SOB (Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes) と略す) のスコア、ミニメンタルステート検査（以下、MMSE (Mini-Mental State Examination) と略す) のスコア、およびアルツハイマー病評価スケール（以下、ADAS-Cog (Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive subscale) と略す) のスコア等がある。形態画像検査データには、核磁気共鳴画像法 (MRI: Magnetic Resonance Imaging) による脳の断層画像（以下、MRI画像という）16（図3参照）、あるいはコンピュータ断層撮影 (CT: Computed Tomography) による脳の断層画像（以下、CT画像という）等がある。

[0026] 脳機能画像検査データには、ポジトロン断層法 (PET: Positron Emission Tomography) による脳の断層画像（以下、PET画像という）、単一光子放射断層撮影 (SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography) による脳の断層画像（以下、SPECT画像という）等がある。血液・脳髄液検査データには、脳脊髄液（以下、CSF (Cerebrospinal Fluid) と略す) 中の τ （リン酸化タウ蛋白）181の量等がある。遺伝子検査データには、ApoE遺伝子の遺伝子型の検査結果等がある。

[0027] 一例として図3に示すように、臨床試験支援サーバ10は、臨床第2相試験Ph2および臨床第3相試験Ph3における対象者Sの被験薬群TGと偽薬群PGへの振り分けを支援するサーバであり、オペレータ端末11にネットワーク12を介して接続されている。臨床試験支援サーバ10は、本開示の技術に係る「臨床試験支援装置」の一例である。オペレータ端末11は、

例えば医薬開発施設に設置され、医薬開発施設において臨床試験に携わるオペレータが操作する。オペレータ端末11は、ディスプレイ13、およびキーボード、マウスといった入力デバイス14を有する。ネットワーク12は、例えばインターネットあるいは公衆通信網等のWAN (Wide Area Network) である。なお、図3においては1台のオペレータ端末11しか臨床試験支援サーバ10に接続されていないが、実際には複数の医薬開発施設の複数台のオペレータ端末11が臨床試験支援サーバ10に接続されている。

[0028] オペレータ端末11は、臨床試験支援サーバ10に振り分け要求15を送信する。振り分け要求15は、臨床第2相試験Ph2または臨床第3相試験Ph3における対象者Sの被験薬群TGと偽薬群PGへの振り分けを、臨床試験支援サーバ10に行わせるための要求である。振り分け要求15は、各対象者Sの脳を写したMRI画像16の集合であるMRI画像群16Gを含む。MRI画像16には、対象者Sを一意に識別するための対象者ID (Identification Data) が付されている。MRI画像16は、本開示の技術に係る「医用画像」の一例である。また、脳は、本開示の技術に係る「臓器」の一例である。なお、図示は省略するが、振り分け要求15は、振り分け要求15の送信元のオペレータ端末11を一意に識別するための端末ID等も含む。

[0029] 振り分け要求15を受信した場合、臨床試験支援サーバ10は、振り分け結果17を導出する。振り分け結果17は、対象者ID毎に振り分けの結果である被験薬群TGまたは偽薬群PGが登録されたデータである。臨床試験支援サーバ10は、振り分け要求15の送信元のオペレータ端末11に振り分け結果17を配信する。振り分け結果17を受信した場合、オペレータ端末11は、振り分け結果17をディスプレイ13に表示し、振り分け結果17をオペレータの閲覧に供する。

[0030] 一例として図4に示すように、臨床試験支援サーバ10を構成するコンピュータは、ストレージ20、メモリ21、CPU (Central Pro

cessing Unit) 22、通信部 23、ディスプレイ 24、および入力デバイス 25 を備えている。これらはバスライン 26 を介して相互接続されている。

[0031] ストレージ 20 は、臨床試験支援サーバ 10 を構成するコンピュータに内蔵、またはケーブル、ネットワークを通じて接続されたハードディスクドライブである。もしくはストレージ 20 は、ハードディスクドライブを複数台連装したディスクアレイである。ストレージ 20 には、オペレーティングシステム等の制御プログラム、各種アプリケーションプログラム、およびこれらのプログラムに付随する各種データ等が記憶されている。なお、ハードディスクドライブに代えてソリッドステートドライブを用いてもよい。

[0032] メモリ 21 は、CPU 22 が処理を実行するためのワークメモリである。CPU 22 は、ストレージ 20 に記憶されたプログラムをメモリ 21 へロードして、プログラムにしたがった処理を実行する。これにより CPU 22 は、コンピュータの各部を統括的に制御する。CPU 22 は、本開示の技術に係る「プロセッサ」の一例である。なお、メモリ 21 は、CPU 22 に内蔵されていてもよい。

[0033] 通信部 23 は、オペレータ端末 11 等の外部装置との各種情報の伝送制御を行う。ディスプレイ 24 は各種画面を表示する。各種画面には GUI (Graphical User Interface) による操作機能が備えられる。臨床試験支援サーバ 10 を構成するコンピュータは、各種画面を通じて、入力デバイス 25 からの操作指示の入力を受け付ける。入力デバイス 25 は、キーボード、マウス、タッチパネル、および音声入力用のマイク等である。

[0034] 一例として図 5 に示すように、臨床試験支援サーバ 10 のストレージ 20 には、作動プログラム 30 が記憶されている。作動プログラム 30 は、コンピュータを臨床試験支援サーバ 10 として機能させるためのアプリケーションプログラムである。すなわち、作動プログラム 30 は、本開示の技術に係る「臨床試験支援装置の作動プログラム」の一例である。ストレージ 20 に

は、MR I 画像群 16 G も記憶される。また、ストレージ 20 には、進行速さ予測モデル 31 および振り分けテーブル 32 も記憶される。進行速さ予測モデル 31 は、本開示の技術に係る「学習済みモデル」の一例である。

[0035] 作動プログラム 30 が起動されると、臨床試験支援サーバ 10 を構成するコンピュータの CPU 22 は、メモリ 21 等と協働して、受付部 35、リードライト（以下、RW (Read Write) と略す) 制御部 36、予測部 37、グループ分け部 38、振り分け部 39、および配信制御部 40 として機能する。

[0036] 受付部 35 は、オペレータ端末 11 からの振り分け要求 15 を受け付ける。前述のように、振り分け要求 15 は MR I 画像群 16 G を含んでいる。このため、受付部 35 は、振り分け要求 15 を受け付けることで、MR I 画像群 16 G を取得していることになる。受付部 35 は、MR I 画像群 16 G を RW 制御部 36 に出力する。また、受付部 35 は、図示省略したオペレータ端末 11 の端末 ID を配信制御部 40 に出力する。

[0037] RW 制御部 36 は、ストレージ 20 への各種データの記憶、およびストレージ 20 内の各種データの読み出しを制御する。例えば RW 制御部 36 は、受付部 35 からの MR I 画像群 16 G をストレージ 20 に記憶する。また、RW 制御部 36 は、MR I 画像群 16 G をストレージ 20 から読み出し、MR I 画像群 16 G を予測部 37 に出力する。また、RW 制御部 36 は、進行速さ予測モデル 31 をストレージ 20 から読み出し、進行速さ予測モデル 31 を予測部 37 に出力する。さらに、RW 制御部 36 は、振り分けテーブル 32 をストレージ 20 から読み出し、振り分けテーブル 32 を振り分け部 39 に出力する。

[0038] 予測部 37 は、進行速さ予測モデル 31 を用いて、MR I 画像群 16 G を構成する全ての MR I 画像 16 から、各対象者 S の認知症の進行の速さを予測する。予測部 37 は、各対象者 S の認知症の進行の速さの予測結果 45（図 6 参照）の集合である予測結果群 45 G をグループ分け部 38 に出力する。

- [0039] グループ分け部38は、予測結果45に応じて対象者Sを複数のグループに分ける。グループ分け部38は、グループ分け結果46を振り分け部39に出力する。
- [0040] 振り分け部39は、振り分けテーブル32に基づいて、複数のグループ毎に、被験薬群TGと偽薬群PGとに対象者Sを振り分ける。振り分け部39は、振り分け結果17を配信制御部40に出力する。
- [0041] 配信制御部40は、振り分け要求15の送信元のオペレータ端末11に振り分け結果17を配信する制御を行う。この際、配信制御部40は、受付部35からの端末IDに基づいて、振り分け要求15の送信元のオペレータ端末11を特定する。
- [0042] 一例として図6に示すように、予測部37は、MRI画像16を進行速さ予測モデル31に入力する。そして、進行速さ予測モデル31から予測結果45を出力させる。予測結果45は、本例においては、CDR-SOBのスコアの変化量（以下、CDR-SOB変化量と表記する）である。
- [0043] 進行速さ予測モデル31に入力されるMRI画像16は、臨床試験の開始時点TSにおける対象者Sの脳を写した画像である。また、進行速さ予測モデル31から出力される予測結果45は、開始時点TSから臨床試験期間PDを経た、臨床試験の終了時点TEにおける対象者SのCDR-SOB変化量を予測したものである。CDR-SOB変化量が0以上であれば、臨床試験の終了時点において当該対象者Sは認知症が進行しているとの予測が立つ。また、CDR-SOB変化量が大きい程、当該対象者Sの認知症の進行が速いとの予測が立つ。なお、予測結果45には、MRI画像16と同じ対象者IDが付される。CDR-SOB変化量は、本開示の技術に係る「対象疾患の進行度合いを示す数値」、および「認知機能検査のスコアの変化量」の一例である。以下、説明の便宜上、CDR-SOB変化量を Δ と表記する場合がある。なお、開始時点TSは、厳密に臨床試験の開始日でもよいが、臨床試験の開始日の1週間前後等のマージンを設けてもよい。
- [0044] 一例として図7に示すように、進行速さ予測モデル31は、セグメンテー

ションモデル50、複数の特徴量導出モデル51、および変化量導出モデル52により構成される。セグメンテーションモデル50は、MRI画像16に写る脳の画素毎に、海馬、前側頭葉、扁桃体といった脳の各解剖区域を表すラベルを付与する、いわゆるセマンティックセグメンテーションを行う学習済みモデルである。予測部37は、セグメンテーションモデル50が付与したラベルに基づいて、MRI画像16から、脳の複数の解剖区域の画像（以下、解剖区域画像という）53を抽出する。図7においては、海馬の解剖区域画像53__1、前側頭葉の解剖区域画像53__2、および扁桃体の解剖区域画像53__3等を抽出した例を示している。前側頭葉とは、側頭葉の前部という意である。これら海馬、前側頭葉、および扁桃体の他にも、例えば、前頭葉、乳頭体、脳梁、脳弓、および側脳室等の解剖区域画像を抽出してもよい。解剖区域画像としては、さらに、海馬傍回、後頭葉、視床、および視床下部等の他の複数の解剖区域の画像を含むことが好ましい。海馬、前側頭葉といった脳の左右に存在する解剖区域については、左右のそれぞれの解剖区域の解剖区域画像を抽出することが好ましい。国際公開第2022/071158号に記載されているように、解剖区域画像としては、少なくとも海馬の画像を含むことが好ましく、少なくとも海馬の画像および前側頭葉の画像を含むことがより好ましい。

[0045] 特徴量導出モデル51は、脳の解剖区域毎に1つずつ用意されている。図7においては、海馬の特徴量導出モデル51__1、前側頭葉の特徴量導出モデル51__2、および扁桃体の特徴量導出モデル51__3を例示している。予測部37は、各解剖区域画像53を対応する特徴量導出モデル51に入力する。そして、特徴量導出モデル51から各解剖区域の特徴量54を出力させる。図7においては、海馬の特徴量54__1、前側頭葉の特徴量54__2、および扁桃体の特徴量54__3等を例示している。

[0046] 予測部37は、各解剖区域の特徴量54の集合である特徴量群54Gを変化量導出モデル52に入力する。そして、変化量導出モデル52から予測結果45を出力させる。変化量導出モデル52は、ニューラルネットワーク、

サポートベクターマシン、ブースティングのうちのいずれかの手法によって構築される。

[0047] 一例として図8に示すように、特徴量導出モデル51には、オートエンコーダ（以下、AE（Auto Encoder）と略す）60のエンコーダ部61が用いられる。AE60は、エンコーダ部61とデコーダ部62とを有する。エンコーダ部61には解剖区域画像53が入力される。エンコーダ部61は、周知の畳み込み演算およびプーリング処理等を行うことで、解剖区域画像53を特徴量54に変換する。こうして得られた特徴量54は、海馬の萎縮の程度、前側頭葉の血流代謝低下の有無といった、各解剖区域の形状およびテクスチャーの特徴を表している。エンコーダ部61は、特徴量54をデコーダ部62に受け渡す。デコーダ部62は、特徴量54から解剖区域画像53の復元画像63を生成する。

[0048] 一例として図9に示すように、AE60は、エンコーダ部61を特徴量導出モデル51に転用する前の学習フェーズにおいて、学習用解剖区域画像53Lが入力されて学習される。学習用解剖区域画像53Lは、セグメンテーションモデル50を用いて学習用MRI画像16Lから抽出された画像である。学習用MRI画像16Lは、ADNI（Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative）等のデータベースにMRI画像16等が登録された認知症患者のうち、臨床試験の参加条件を満たす認知症患者のMRI画像16である。臨床試験の参加条件は、例えば、CSF検査におけるアミロイド β が陽性で、かつMMSEのスコアが26点以下等である。学習用MRI画像16Lは、本開示の技術に係る「学習用入力データ」の一例である。また、認知症患者は、本開示の技術に係る「対象疾患患者」の一例である。

[0049] AE60は、学習用解剖区域画像53Lに対して学習用復元画像63Lを出力する。これら学習用解剖区域画像53Lおよび学習用復元画像63Lに基づいて、損失関数を用いたAE60の損失演算がなされる。そして、損失演算の結果に応じてAE60の各種係数（畳み込み演算のフィルタの係数等

)の更新設定がなされ、更新設定にしたがってAE60が更新される。

[0050] AE60の学習フェーズにおいては、学習用解剖区域画像53LのAE60への入力、AE60からの学習用復元画像63Lの出力、損失演算、更新設定、およびAE60の更新の上記一連の処理が、学習用解剖区域画像53Lが交換されつつ繰り返し行われる。上記一連の処理の繰り返しは、学習用解剖区域画像53Lから学習用復元画像63Lへの復元精度が、予め定められた設定レベルまで達した場合に終了される。こうして復元精度が設定レベルまで達したAE60のエンコーダ部61が、進行速さ予測モデル31の一部として予測部37において用いられる。なお、学習用解剖区域画像53Lから学習用復元画像63Lへの復元精度に関係なく、上記一連の処理を設定回数繰り返した場合に学習を終了してもよい。

[0051] 一例として図10に示すように、変化量導出モデル52は、学習データ70によって学習される。学習データ70は、学習用特徴量群54GLおよび正解CDR-SOB変化量45CAの組である。学習用特徴量群54GLは、学習用MRI画像16Lから抽出した各解剖区域の学習用解剖区域画像53Lを、学習済みの各特徴量導出モデル51に入力して得られたものである。正解CDR-SOB変化量45CAは、学習用特徴量群54GLを得た学習用MRI画像16Lの認知症患者の実際のCDR-SOB変化量である。正解CDR-SOB変化量45CAは、本開示の技術に係る「正解データ」の一例である。

[0052] 学習フェーズにおいて、変化量導出モデル52には、学習用特徴量群54GLが入力される。変化量導出モデル52は、学習用特徴量群54GLに対して学習用予測結果45Lを出力する。この学習用予測結果45Lおよび正解CDR-SOB変化量45CAに基づいて、損失関数を用いた変化量導出モデル52の損失演算がなされる。そして、損失演算の結果に応じて変化量導出モデル52の各種係数の更新設定がなされ、更新設定にしたがって変化量導出モデル52が更新される。

[0053] 変化量導出モデル52の学習フェーズにおいては、学習用特徴量群54G

Lの変化量導出モデル52への入力、変化量導出モデル52からの学習用予測結果45Lの出力、損失演算、更新設定、および変化量導出モデル52の更新の上記一連の処理が、学習データ70が交換されつつ繰り返行われる。上記一連の処理の繰り返しは、正解CDR-SOB変化量45CAに対する学習用予測結果45Lの予測精度が、予め定められた設定レベルまで達した場合に終了される。こうして予測精度が設定レベルまで達した変化量導出モデル52が、進行速さ予測モデル31の一部として予測部37において用いられる。なお、正解CDR-SOB変化量45CAに対する学習用予測結果45Lの予測精度に関係なく、上記一連の処理を設定回数繰り返した場合に学習を終了してもよい。

[0054] 一例として図11に示すように、学習用MRI画像16Lは、第1時点T1における認知症患者の脳を写した画像である。また、正解CDR-SOB変化量45CAは、第1時点T1から臨床試験期間PDに相当する期間PDEを経た、第2時点T2における認知症患者の実際のCDR-SOB変化量である。例えば認知症患者の第1時点T1におけるCDR-SOBのスコアが22で、第2時点T2におけるCDR-SOBのスコアが25であった場合、正解CDR-SOB変化量45CAは $25 - 22 = 3$ となる。臨床試験期間PDに相当する期間PDEは、臨床試験期間PDを含み、かつ臨床試験期間PDに適当なマージンを加えた期間である。例えば臨床試験期間PDが18カ月間であった場合、臨床試験期間PDに相当する期間PDEは、18カ月に ± 6 カ月した12カ月間～24カ月間である。

[0055] 一例として図12に示すように、グループ分け部38は、予測結果45のCDR-SOB変化量に応じて、対象者Sをグループ1～18のいずれかに分ける。グループ分け部38は、例えばグループ1にはCDR-SOB変化量が -3.0 より小さい($\Delta < -3.0$)対象者Sを配し、例えばグループ4にはCDR-SOB変化量が -2.0 以上で -1.5 より小さい($-2.0 \leq \Delta < -1.5$)対象者Sを配する。また、グループ分け部38は、例えばグループ15にはCDR-SOB変化量が 3.5 以上で 4.0 より小さい

(3. $5 \leq \Delta < 4.0$) 対象者 S を配し、例えばグループ 18 には CDR-SOB 変化量が 5.0 より大きい ($5.0 < \Delta$) 対象者 S を配する。このように、グループ 1~18 は、主として CDR-SOB 変化量が -3.0 から 5.0 の間において 0.5 刻みで設定した範囲により規定される。

[0056] グループ分け結果 46 は、対象者 S の対象者 ID がグループ毎に登録されたデータである。例えば対象者 ID が S0001 の対象者 S の CDR-SOB 変化量は 4.0 であるため、グループ分け部 38 は S0001 をグループ 16 に登録する。また、例えば対象者 ID が S0004 の対象者 S の CDR-SOB 変化量は -1.7 であるため、グループ分け部 38 は S0004 をグループ 4 に登録する。

[0057] 一例として図 13 に示すように、振り分けテーブル 32 は、グループ毎の振り分けルールが登録されたテーブルである。振り分けルールは、2人単位のブロックランダム化手法に基づく。例えばグループ 1 の振り分けルールは、第 1、第 2、および第 4 の 2 人の対象者 S のペアについて、1 番目の対象者 S を被験薬群 TG に振り分け、2 番目の対象者 S を偽薬群 PG に振り分ける、という内容である。また、第 3、第 5、および第 6 の 2 人の対象者 S のペアについて、1 番目の対象者 S を偽薬群 PG に振り分け、2 番目の対象者 S を被験薬群 TG に振り分ける、という内容である。例えばグループ 16 の振り分けルールは、第 1~第 4、および第 6 の 2 人の対象者 S のペアについて、1 番目の対象者 S を被験薬群 TG に振り分け、2 番目の対象者 S を偽薬群 PG に振り分ける、という内容である。また、第 5 の 2 人の対象者 S のペアについて、1 番目の対象者 S を偽薬群 PG に振り分け、2 番目の対象者 S を被験薬群 TG に振り分ける、という内容である。

[0058] 図 14 は、振り分けテーブル 32 の振り分けルールにしたがって、グループ 1 の対象者 S を被験薬群 TG と偽薬群 PG とに振り分ける様子の一例を示す。図 14 においては、対象者 ID が S0008、S0022、S0034、S0044、S0051、S0068、S0102、および S0116 の 8 人の対象者 S を振り分ける場合を例示している。この場合、振り分け部 3

9は、1番目の対象者Sを被験薬群TGに振り分け、2番目の対象者Sを偽薬群PGに振り分ける、という振り分けルールにしたがって、第1のペアであるS0008とS0022の2人の対象者SのうちのS0008の対象者Sを被験薬群TGに振り分け、S0022の対象者Sを偽薬群PGに振り分ける。同様に、第2のペアであるS0034とS0044の2人の対象者SのうちのS0034の対象者Sを被験薬群TGに振り分け、S0044の対象者Sを偽薬群PGに振り分ける。さらに、第4のペアであるS0102とS0116の2人の対象者SのうちのS0102の対象者Sを被験薬群TGに振り分け、S0116の対象者Sを偽薬群PGに振り分ける。また、振り分け部39は、1番目の対象者Sを偽薬群PGに振り分け、2番目の対象者Sを被験薬群TGに振り分ける、という振り分けルールにしたがって、第3のペアであるS0051とS0068の2人の対象者SのうちのS0051の対象者Sを偽薬群PGに振り分け、S0068の対象者Sを被験薬群TGに振り分ける。

[0059] 図15は、振り分けテーブル32の振り分けルールにしたがって、グループ16の対象者Sを被験薬群TGと偽薬群PGとに振り分ける様子の一例を示す。図15においては、対象者IDがS0001、S0024、S0029、S0056、S0072、S0081、S0105、S0124、S0133、S0148、S0172、およびS0181の12人の対象者Sを振り分ける場合を例示している。この場合、振り分け部39は、1番目の対象者Sを被験薬群TGに振り分け、2番目の対象者Sを偽薬群PGに振り分ける、という振り分けルールにしたがって、第1のペアであるS0001とS0024の2人の対象者SのうちのS0001の対象者Sを被験薬群TGに振り分け、S0024の対象者Sを偽薬群PGに振り分ける。同様に、第2のペアであるS0029とS0056の2人の対象者SのうちのS0029の対象者Sを被験薬群TGに振り分け、S0056の対象者Sを偽薬群PGに振り分ける。第3のペアであるS0072とS0081の2人の対象者SのうちのS0072の対象者Sを被験薬群TGに振り分け、S0081の

対象者Sを偽薬群PGに振り分ける。第4のペアであるS0105とS0124の2人の対象者SのうちのS0105の対象者Sを被験薬群TGに振り分け、S0124の対象者Sを偽薬群PGに振り分ける。さらに、第6のペアであるS0172とS0181の2人の対象者SのうちのS0172の対象者Sを被験薬群TGに振り分け、S0181の対象者Sを偽薬群PGに振り分ける。また、振り分け部39は、1番目の対象者Sを偽薬群PGに振り分け、2番目の対象者Sを被験薬群TGに振り分ける、という振り分けルールにしたがって、第5のペアであるS0133とS0148の2人の対象者SのうちのS0133の対象者Sを偽薬群PGに振り分け、S0148の対象者Sを被験薬群TGに振り分ける。このようにして、振り分け部39は、ブロックランダムイズ手法を用いて、各グループ1～18の対象者Sを被験薬群TGと偽薬群PGとに振り分ける。こうした振り分けの手法は、層別ランダムイズ手法と呼ばれている。

[0060] 次に、上記構成による作用について、図16のフローチャートを参照して説明する。まず、臨床試験支援サーバ10において作動プログラム30が起動されると、図5で示したように、臨床試験支援サーバ10のCPU22は、受付部35、RW制御部36、予測部37、グループ分け部38、振り分け部39、および配信制御部40として機能される。

[0061] オペレータは、オペレータ端末11の入力デバイス14を操作して、認知症の被験薬の対象者SのMRI画像16の集合であるMRI画像群16Gを含む振り分け要求15を臨床試験支援サーバ10に送信する。

[0062] 臨床試験支援サーバ10においては、オペレータ端末11からの振り分け要求15が受付部35にて受け付けられる（ステップST100）。振り分け要求15に含まれるMRI画像群16Gは、受付部35からRW制御部36に出力され、RW制御部36の制御の下、ストレージ20に記憶される（ステップST110）。

[0063] RW制御部36により、ストレージ20からMRI画像群16Gが読み出される（ステップST120）。MRI画像群16Gは、RW制御部36か

ら予測部37に出力される。

[0064] 図6で示したように、予測部37において、MRI画像16が進行速さ予測モデル31に入力され、これにより進行速さ予測モデル31から予測結果45が出力される（ステップST130）。ステップST130の処理は、全ての対象者Sについて予測結果45が出力されない（ステップST140でNO）うちは、繰り返し続けられる。

[0065] 全ての対象者Sについて予測結果45が出力された場合（ステップST140でYES）、複数の予測結果45の集合である予測結果群45Gが予測部37からグループ分け部38に出力される。そして、図12で示したように、グループ分け部38において、予測結果45に応じて対象者Sがグループ1～18のいずれかに分けられる（ステップST150）。グループ分け結果46は、グループ分け部38から振り分け部39に出力される。

[0066] 続いて、図14および図15で示したように、振り分け部39において、ブロックランダムイズ手法を用いて、グループ1～18毎に、被験薬群TGと偽薬群PGとに対象者Sが振り分けられる（ステップST160）。振り分け結果17は、振り分け部39から配信制御部40に出力される。振り分け結果17は、配信制御部40の制御の下、振り分け要求15の送信元のオペレータ端末11に配信される（ステップST170）。

[0067] オペレータ端末11のディスプレイ13には、振り分け結果17が表示される。オペレータは、振り分け結果17を閲覧し、その通りに対象者Sを被験薬群TGと偽薬群PGとに振り分け、臨床第2相試験Ph2または臨床第3相試験Ph3を行う。

[0068] 以上説明したように、臨床試験支援サーバ10のCPU22は、予測部37、グループ分け部38、および振り分け部39を備える。予測部37は、進行速さ予測モデル31を用いて、認知症の被験薬の対象者SについてCDR-SOB変化量を予測する。グループ分け部38は、CDR-SOB変化量の予測結果45に応じて対象者Sをグループ1～18のいずれかに分ける。振り分け部39は、グループ1～18毎に、被験薬群TGと偽薬群PGと

に対象者 S を振り分ける。

[0069] このため、被験薬群 T G と偽薬群 P G との間に認知症の進行が比較的速い対象者 S と遅い対象者 S の偏りが生じるおそれが少なくなる。これにより、被験薬群 T G に認知症の進行が比較的遅い対象者 S が多く振り分けられ、偽薬群 P G に認知症の進行が比較的速い対象者 S が多く振り分けられて、被験薬の効能が過大に評価されるおそれが少なくなる。また、被験薬群 T G に認知症の進行が比較的速い対象者 S が多く振り分けられ、偽薬群 P G に認知症の進行が比較的遅い対象者 S が多く振り分けられて、被験薬の効能が過小に評価されるおそれも少なくなる。したがって、認知症の被験薬の効能の正当な評価に寄与することが可能となる。

[0070] 被験薬群 T G と偽薬群 P G との間に認知症の進行が比較的速い対象者 S と遅い対象者 S の偏りが生じるおそれは、対象者 S が比較的少ない臨床第 2 相試験 P h 2 のほうが高い。このため、臨床第 2 相試験 P h 2 に本開示の技術を適用すれば、より顕著な効果を得ることができる。

[0071] 振り分け部 3 9 は、ブロックランダム化手法を用いて被験薬群 T G と偽薬群 P G とに対象者 S を振り分ける。このため、被験薬群 T G と偽薬群 P G との間に認知症の進行が比較的速い対象者と遅い対象者の偏りが生じるおそれがさらに少なくなり、結果として認知症の被験薬の効能の正当な評価にさらに寄与することが可能となる。

[0072] 図 9 ～ 図 1 1 で示したように、進行速さ予測モデル 3 1 は、第 1 時点 T 1 における認知症患者の学習用 M R I 画像 1 6 L を学習用入力データとし、第 1 時点 T 1 から臨床試験期間 P D に相当する期間 P D E を経た第 2 時点 T 2 における認知症患者の C D R - S O B 変化量である正解 C D R - S O B 変化量 4 5 C A を正解データとして学習されたモデルである。図 6 で示したように、予測部 3 7 は、臨床試験の開始時点 T S における対象者 S の M R I 画像 1 6 を進行速さ予測モデル 3 1 に入力し、臨床試験の終了時点 T E における対象者 S の C D R - S O B 変化量を、予測結果 4 5 として進行速さ予測モデル 3 1 から出力させる。

- [0073] 脳を写した医用画像であるMRI画像16は、認知症患者であればほぼ全員が撮影している。また、CDR-SOBも、認知症患者であればほぼ全員が受験している。このため、認知症患者の学習用MRI画像16Lを学習用入力データとし、正解CDR-SOB変化量45CAを正解データとすれば、進行速さ予測モデル31の学習データ70に事欠かず、進行速さ予測モデル31の学習が捗る。さらに、MRI画像16は、装置さえ空いていれば数分で撮影することができる。このため、比較的簡単に進行速さ予測モデル31から予測結果45を出力させることができる。
- [0074] 認知機能検査のスコアの変化量、特にCDR-SOB変化量は、臨床試験の成否を判定するために従前からよく用いられている。このため、臨床試験の終了時点TEにおける対象者Sの認知症の進行度合いを示す数値として、本例のようにCDR-SOB変化量を用いれば、従来と変わらぬ基準に基づいて臨床試験の成否を判定することができる。
- [0075] 進行速さ予測モデル31は、セグメンテーションモデル50によって、臨床試験の開始時点TSにおけるMRI画像16から脳の複数の解剖区域の画像である複数の解剖区域画像53を抽出する。そして、解剖区域毎に用意された特徴量導出モデル51に解剖区域画像53を入力し、特徴量導出モデル51から解剖区域の特徴量54を出力させる。このため、脳の複数の解剖区域から得られた特徴量を元に、認知症の進行の速さを予測することができ、予測結果45の予測精度を高めることができる。
- [0076] 本開示の技術の効果を確かめるため、ADNIに登録された認知症患者のうち、一般的な臨床試験の参加条件を満たす約500名の認知症患者を対象者Sとして選出した。そして、選出した対象者Sについて、臨床第2相試験Ph2および臨床第3相試験Ph3を10000回シミュレーションした。
- [0077] 一例として図17に示すように、まず、被験薬群TGに振り分けた対象者Sのうち、ADNIに登録された実際のCDR-SOB変化量（真値） Δc が0以下、つまり認知症が進行しなかった対象者Sについては、補正せずにCDR-SOB変化量（真値） Δc のままとする。同様に、偽薬群PGに振

り分けた対象者Sについても、補正せずにCDR-SOB変化量（真値） Δc のままとする。一方、被験薬群TGに振り分けた対象者Sのうち、実際のCDR-SOB変化量（真値） Δc が0より大きい、つまり認知症が進行した対象者Sについては、CDR-SOB変化量（真値） Δc を被験薬の効能Effで補正したCDR-SOB変化量（補正值） ΔcX とする。具体的には、CDR-SOB変化量（真値） Δc に $(1 - \text{Eff})$ を乗算することで、CDR-SOB変化量（補正值） ΔcX とする。

[0078] 被験薬群TGに振り分けた対象者Sの実際のCDR-SOB変化量（真値） Δc またはCDR-SOB変化量（補正值） ΔcX と、偽薬群PGに振り分けた対象者Sの実際のCDR-SOB変化量（真値） Δc とを用いてt検定を行った。そして、臨床第2相試験Ph2のP値であるP1、および臨床第3相試験Ph3のP値であるP2をそれぞれ算出した。P1が0.05よりも小さい場合（ $P1 < 0.05$ ）、被験薬の効能あり（臨床第2相試験Ph2をクリア、図17では「OK」と表記、図18～図20も同様）と判定し、P1が0.05以上の場合（ $P1 \geq 0.05$ ）、被験薬の効能なし（臨床第2相試験Ph2をクリアせず、図17では「NG」と表記、図18～図20も同様）と判定した。また、P2が0.01よりも小さい場合（ $P2 < 0.01$ ）、被験薬の効能あり（臨床第3相試験Ph3をクリア、図17では「OK」と表記、図18～図20も同様）と判定し、P2が0.01以上の場合（ $P2 \geq 0.01$ ）、被験薬の効能なし（臨床第3相試験Ph3をクリアせず、図17では「NG」と表記、図18～図20も同様）と判定した。

[0079] 図18は、比較例の手法、予測結果45に基づいて対象者Sを層別ランダム化された本開示の技術に係る手法、および実際のCDR-SOB変化量（真値） Δc に基づいて層別ランダム化された手法のそれぞれについて、被験薬の効能Effを0から0.4の間において0.05刻みで変化させた場合の、 $P1 < 0.05$ （臨床第2相試験Ph2をクリア）で $P2 \geq 0.01$ （臨床第3相試験Ph3をクリアせず）となる確率を示す。比較例の手法は、

本開示の技術に係る手法のように、予測結果45に応じて対象者Sをグループ分けし、グループ毎に被験薬群TGと偽薬群PGとに対象者Sを振り分けることをせず、グループ分けしていない全ての対象者Sをランダムに被験薬群TGと偽薬群PGとに振り分ける手法である。 $P_1 < 0.05$ で $P_2 \geq 0.01$ となる確率は、言い換えれば、臨床第2相試験Ph2において被験薬の効能が過大に評価される確率である。

[0080] 図18によれば、本開示の技術に係る手法において $P_1 < 0.05$ で $P_2 \geq 0.01$ となる確率は、比較例の手法において $P_1 < 0.05$ で $P_2 \geq 0.01$ となる確率よりも全体的に低いことが分かる。したがって、本開示の技術によれば、被験薬の効能が過大に評価されるおそれが少なくなることが確かめられた。

[0081] 図19は、比較例の手法、予測結果45に基づいて対象者Sを層別ランダム化させた本開示の技術に係る手法、および実際のCDR-SOB変化量（真値） Δc に基づいて層別ランダム化させた手法のそれぞれについて、被験薬の効能Effを0から0.4の間において0.05刻みで変化させた場合の、 $P_1 \geq 0.05$ （臨床第2相試験Ph2をクリアせず）で $P_2 < 0.01$ （臨床第3相試験Ph3をクリア）となる確率を示す。 $P_1 \geq 0.05$ で $P_2 < 0.01$ となる確率は、言い換えれば、臨床第2相試験Ph2において被験薬の効能が過小に評価される確率である。

[0082] 図19によれば、本開示の技術に係る手法において $P_1 \geq 0.05$ で $P_2 < 0.01$ となる確率は、比較例の手法において $P_1 \geq 0.05$ で $P_2 < 0.01$ となる確率よりも大体において低いことが分かる。したがって、本開示の技術によれば、被験薬の効能が過小に評価されるおそれが少なくなることが確かめられた。

[0083] 図20は、比較例の手法、予測結果45に基づいて対象者Sを層別ランダム化させた本開示の技術に係る手法、および実際のCDR-SOB変化量（真値） Δc に基づいて層別ランダム化させた手法のそれぞれについて、被験薬の効能Effを0から0.4の間において0.05刻みで変化させた場合

の、 $P_1 < 0.05$ （臨床第2相試験Ph2をクリア）で $P_2 < 0.01$ （臨床第3相試験Ph3をクリア）となる確率を示す。 $P_1 < 0.05$ で $P_2 < 0.01$ となる確率は、言い換えれば、臨床試験成功確率である。

[0084] 図20によれば、本開示の技術に係る手法において $P_1 < 0.05$ で $P_2 < 0.01$ となる確率は、比較例の手法において $P_1 < 0.05$ で $P_2 < 0.01$ となる確率よりも大体において高いことが分かる。したがって、本開示の技術によれば、被験薬の効能が正当に評価され、その分臨床試験成功確率が高まることが確かめられた。

[0085] なお、図19および図20の局所において、本開示の技術に係る手法よりも従来の手法のほうが効果ありとの結果が出た原因としては、予測結果45に少々の間違いがあったことが考えられる。このため、進行速さ予測モデル31の予測精度を高めていけば、本開示の技術に係る手法よりも従来の手法のほうが効果ありとの結果が出ると考えられる。

[0086] なお、本例においては、臨床第1相試験Ph1をクリアした場合に臨床第2相試験Ph2を行い、臨床第2相試験Ph2をクリアした場合に臨床第3相試験Ph3を行う例を説明したが、これに限らない。臨床第1相試験Ph1と臨床第2相試験Ph2、あるいは臨床第1相試験Ph2と臨床第3相試験Ph3を並行して行ってもよい。

[0087] AE60のエンコーダ部61を特徴量導出モデル51に転用する例を説明したが、これに限らない。シングルタスクの畳み込みニューラルネットワークの一部、あるいはマルチタスクの畳み込みニューラルネットワークの一部を、特徴量導出モデル51として用いてもよい（図31参照）。

[0088] ブロックランダム化手法の単位は例示の2人に限らない。例えば4人でもよい。また、ブロックランダム化手法を用いずに、単純にグループを構成する治験対象者Sの半分を被験薬群TGに振り分け、残り半分以上を偽薬群PGに振り分けてもよい。

[0089] [第2実施形態]

一例として図21に示すように、第2実施形態の臨床試験支援サーバのC

P Uは、上記第1実施形態の各処理部35～40（図21においては予測部37、グループ分け部38、および振り分け部39を図示、他は図示省略）に加えて、選定部75として機能する。選定部75は、予測部37とグループ分け部38との間に設けられている。選定部75には、予測部37からの予測結果群45Gが入力される。

[0090] 選定部75は、選定条件76にしたがって、認知症の進行が比較的速い対象者Sを選定する。選定条件76は、本例においては、CDR-SOB変化量が0より大きい（ $\Delta > 0$ ）、という内容である。選定部75は、予測結果群45Gを構成する複数の予測結果45のうち、選定条件76を満たす予測結果45だけを選定することで、選定予測結果群45GSを生成する。選定部75は、選定予測結果群45GSをグループ分け部38に出力する。

[0091] 図22は、選定部75の処理の一例を示す。図22においては、対象者IDがS0001およびS0003の対象者SのCDR-SOB変化量が0より大きく、対象者IDがS0002およびS0004の対象者SのCDR-SOB変化量が0以下である。このため、選定部75は、対象者IDがS0001およびS0003の予測結果45を選定し、対象者IDがS0002およびS0004の予測結果45を除外する等して、選定予測結果群45GSを生成する。

[0092] グループ分け部38は、選定予測結果群45GSに予測結果45が選定された対象者Sに対してグループ分けを行う。振り分け部39は、グループ分け結果46に基づいて、選定予測結果群45GSに予測結果45が選定された対象者Sを被験薬群TGと偽薬群PGとに振り分ける。

[0093] このように、第2実施形態では、選定部75は、予測結果45に基づいて、CDR-SOB変化量が0より大きい対象者Sといった、認知症の進行が比較的速い対象者Sを選定する。グループ分け部38は、選定した対象者Sに対してのみ、予測結果45に応じたグループ分けを行う。また、振り分け部39は、選定した対象者Sに対してのみ、被験薬群TGと偽薬群PGへの振り分けを行う。このため、認知症の被験薬の臨床試験により相応しい者を

対象者Sとすることができ、認知症の被験薬の効能の正当な評価にさらに寄与することができる。

[0094] 選定条件76は、例示の内容に限らない。例えば、CDR-SOB変化量が2より大きい($\Delta > 2$)、といった内容でもよい。あるいは、CDR-SOB変化量が0より大きく、かつ3以下($0 < \Delta \leq 3$)、といった内容でもよい。

[0095] [第3実施形態]

一例として図23に示すように、第3実施形態においては、予測部37は、MRI画像16に加えて認知症関連データ80を進行速さ予測モデル81に入力する。認知症関連データ80は、臨床試験の開始時点TSにおける対象者Sの認知症に関するデータであり、先に説明した認知症の診断基準に係るデータの一部を含む。より詳しくは、一例として図24に示すように、認知症関連データ80は、対象者Sの年齢、性別、遺伝子検査データ、および血液・脳髄液検査データであるCSF検査データを含む。遺伝子検査データは、例えば、ApoE遺伝子の遺伝子型の検査結果である。ApoE遺伝子の遺伝子型は、 $\epsilon 2$ 、 $\epsilon 3$ 、 $\epsilon 4$ の3種のApoE遺伝子のうちの2種の組み合わせ($\epsilon 2$ と $\epsilon 3$ 、 $\epsilon 3$ と $\epsilon 4$ 等)である。 $\epsilon 4$ を全くもたない遺伝子型($\epsilon 2$ と $\epsilon 3$ 、 $\epsilon 3$ と $\epsilon 3$ 等)の者に対して、 $\epsilon 4$ を1つないし2つもつ遺伝子型($\epsilon 2$ と $\epsilon 4$ 、 $\epsilon 4$ と $\epsilon 4$ 等)の者のアルツハイマー型認知症の発症リスクは、およそ3倍～12倍とされている。CSF検査データは、例えば、CSF中のp-tau(リン酸化タウ蛋白)181の量である。性別は、男性を00、女性を01等と数値化して表す。遺伝子検査データも同様に、ApoE遺伝子の組み合わせを数値化して表す。認知症関連データ80は、本開示の技術に係る「対象疾患関連データ」の一例である。

[0096] 一例として図25に示すように、認知症関連データ80は、特徴量群54Gとともに進行速さ予測モデル81の変化量導出モデル85に入力される。変化量導出モデル85は、特徴量群54Gだけでなく認知症関連データ80も参照して予測結果45を出力する。

- [0097] 一例として図26に示すように、本実施形態の変化量導出モデル85は、主成分分析（以下、PCA（Principal Component Analysis）と略す）層150、分位正規化部151、および線形判別分析部152を有する。PCA層150には特徴量群54Gが入力される。PCA層150は、特徴量群54Gを構成する複数の特徴量54の各々に対してPCAを行い、特徴量54を集約特徴量54Aとする。例えばPCA層150は、数百～数千の特徴量54を1つの集約特徴量54Aに集約する。PCA層150は、各特徴量54の集約特徴量54Aの集合である集約特徴量群54AGを分位正規化部151に出力する。
- [0098] 分位正規化部151には、集約特徴量群54AGと認知症関連データ80が入力される。分位正規化部151は、集約特徴量群54AGを構成する複数の集約特徴量54Aと、認知症関連データ80の対象者Sの年齢、性別、遺伝子検査データ、およびCSF検査データとを同列に扱うために、これらを正規分布にしたがうデータに変換する分位正規化（Quantile Normalization）を行う。線形判別分析部152は、分位正規化処理後の集約特徴量54Aと認知症関連データ80の対象者Sの年齢、性別、遺伝子検査データ、およびCSF検査データに対して、例えばサポートベクター回帰（SVR：Support Vector Regression）等を用いた線形判別分析（Linear Discriminant Analysis）を行い、その結果として予測結果45を出力する。
- [0099] 一例として図27に示すように、変化量導出モデル85は、学習データ90によって学習される。学習データ90は、学習用特徴量群54GL、学習用認知症関連データ80L、および正解CDR-SOB変化量45CAの組である。学習用特徴量群54GLおよび正解CDR-SOB変化量45CAの出自は、上記第1実施形態の学習データ70の場合と同じである。学習用認知症関連データ80Lは、学習用特徴量群54GLを得た学習用MRI画像16Lの認知症患者の年齢、性別、遺伝子検査データ、およびCSF検査データである。学習用認知症関連データ80Lは、本開示の技術に係る「学

習用入力データ」の一例である。

[0100] 学習フェーズにおいて、変化量導出モデル 85 には、学習用特徴量群 54 GL および学習用認知症関連データ 80 L が入力される。変化量導出モデル 85 は、学習用特徴量群 54 GL および学習用認知症関連データ 80 L に対して学習用予測結果 45 L を出力する。この学習用予測結果 45 L および正解 CDR-SOB 変化量 45 CA に基づいて、損失関数を用いた変化量導出モデル 85 の損失演算がなされる。そして、損失演算の結果に応じて変化量導出モデル 85 の各種係数の更新設定がなされ、更新設定にしたがって変化量導出モデル 85 が更新される。

[0101] 変化量導出モデル 85 の学習フェーズにおいては、学習用特徴量群 54 GL および学習用認知症関連データ 80 L の変化量導出モデル 85 への入力、変化量導出モデル 85 からの学習用予測結果 45 L の出力、損失演算、更新設定、および変化量導出モデル 85 の更新の上記一連の処理が、学習データ 90 が交換されつつ繰り返し行われる。上記一連の処理の繰り返しは、正解 CDR-SOB 変化量 45 CA に対する学習用予測結果 45 L の予測精度が、予め定められた設定レベルまで達した場合に終了される。こうして予測精度が設定レベルまで達した変化量導出モデル 85 が、進行速さ予測モデル 81 の一部として予測部 37 において用いられる。なお、正解 CDR-SOB 変化量 45 CA に対する学習用予測結果 45 L の予測精度に関係なく、上記一連の処理を設定回数繰り返した場合に学習を終了してもよい。

[0102] 一例として図 28 に示すように、学習用認知症関連データ 80 L は、学習用 MRI 画像 16 L と同じく、第 1 時点 T1 における認知症患者の認知症に関するデータである。

[0103] このように、第 3 実施形態においては、学習用入力データは、第 1 時点 T1 における認知症患者の認知症に関する認知症関連データである学習用認知症関連データ 80 L も含む。予測部 37 は、臨床試験の開始時点 TS における対象者 S の認知症に関する認知症関連データ 80 も進行速さ予測モデル 81 に入力する。認知症関連データ 80 という認知症の進行の速さの予測に役

立つ強力なデータが加わるので、特徴量群54Gだけで認知症の進行の速さを予測する場合と比べて、認知症の進行の速さの予測精度を飛躍的に向上させることができる。

[0104] なお、年齢、性別に加えて、病歴、あるいは認知症を発症した親類がいるか否か等を認知症関連データ80に含めてもよい。アポリポ蛋白質測定値、補体蛋白質測定値、およびトランスサイレチン測定値といった血液検査結果を認知症関連データ80に含めてもよい。長谷川式認知症スケールのスコア、MMSEのスコア、リバーミード行動記憶検査（RBMT：Rivermead Behavioural Memory Test）のスコア、日常生活動作（ADL：Activities of Daily Living）、およびADAS-Cogのスコア等を認知症関連データ80に含めてもよい。

[0105] 一例として図29に示すように、MRI画像16および認知症関連データ80に加えて、臨床試験期間PDを進行速さ予測モデル95に入力してもよい。この場合、図示は省略するが、学習フェーズにおいて、学習用MRI画像16Lおよび学習用認知症関連データ80Lに加えて、臨床試験期間PDに相当する期間PDEが学習用入力データとして進行速さ予測モデル95に入力される。

[0106] 上記各実施形態では、予測結果45として認知機能検査のスコアの変化量であるCDR-SOB変化量を例示したが、これに限らない。一例として図30に示す進行速さ予測モデル100のように、予測結果101として認知症となる確率を出力してもよい。この場合のグループは、例えば、認知症となる確率が0%以上25%未満のグループ1、25%以上50%未満のグループ2、50%以上75%未満のグループ3、および75%以上100%以下のグループ4等とすればよい。

[0107] 一例として図31に示すマルチタスク畳み込みニューラルネットワーク（以下、マルチタスクCNN（Convolutional Neural Network）と表記）200の一部を、特徴量導出モデル51として用

いてもよい。

- [0108] 図31において、マルチタスクCNN200は、エンコーダ部201、自己注意（以下、SA（Self-Attention）と表記）機構層202、デコーダ部203、全体平均プーリング（以下、GAP（Global Average Pooling）と表記）層204、第1全結合（以下、FC（Fully Connected）と表記）層205、第2FC層206、およびソフトマックス関数（以下、SMF（SoftMax Function）と表記）層207を有する。
- [0109] エンコーダ部201は、上記第1実施形態のAE60のエンコーダ部61と同様に、入力された解剖区域画像53を前段特徴量54Pに変換する。エンコーダ部201は、前段特徴量54PをSA機構層202に出力する。
- [0110] SA機構層202は、前段特徴量54Pに対して、畳み込み演算の対象の要素の値に応じて、畳み込み演算用のフィルタの係数を変更しつつ畳み込み演算を行う。SA機構層202は、畳み込み演算後の前段特徴量54Pを、デコーダ部203およびGAP層204に出力する。
- [0111] デコーダ部203は、上記第1実施形態のAE60のデコーダ部62と同様に、畳み込み演算後の前段特徴量54Pから解剖区域画像53の復元画像208を生成する。
- [0112] GAP層204は、畳み込み演算後の前段特徴量54Pに対して、全体平均プーリング処理を施す。全体平均プーリング処理は、前段特徴量54Pの複数のチャンネル毎に、その平均値を求める処理である。例えば前段特徴量54Pのチャンネル数が512であった場合、全体平均プーリング処理によって512個の前段特徴量54Pの平均値が求められる。GAP層204は、求めた前段特徴量54Pの平均値を、特徴量54として第1FC層205および第2FC層206に出力する。
- [0113] 第1FC層205は、特徴量54に基づいて第1予測結果209を出力する。第1予測結果209は、予測結果45と同じく、CDR-SOB変化量である。第1FC層205は、特徴量54の個数分のユニットをもつ入力層

と、第1予測結果209を出力するための1つの出力層とを有する。入力層の各ユニットと出力層とは、互いに全結合されていて、それぞれに重みが設定されている。入力層の各ユニットには、特徴量54が入力される。特徴量54と、各ユニット間に設定された重みとの積和が、出力層の出力値となる。この出力値がCDR-SOB変化量である。

[0114] 第2FC層206は、特徴量54をSMF層207のSMFで扱う変数に変換する。第2FC層206は、特徴量54の個数分のユニットをもつ入力層と、SMFで扱う変数の個数分のユニットをもつ出力層とを有する。入力層の各ユニットと出力層の各ユニットは、互いに全結合されていて、それぞれに重みが設定されている。入力層の各ユニットには、特徴量54が入力される。特徴量54と、各ユニット間に設定された重みとの積和が、出力層の各ユニットの出力値となる。この出力値がSMFで扱う変数である。第2FC層206は、SMFで扱う変数をSMF層207に出力する。SMF層207は、変数をSMFに適用することで第2予測結果210を出力する。第2予測結果210は、CDR-SOB変化量が0より大きい、または0以下である、のいずれかの内容である。

[0115] つまり、マルチタスクCNN200は、AE、連続量（CDR-SOB変化量）の予測、およびクラス分類（CDR-SOB変化量が0より大きい、または0以下であるか）の計3つのタスクを行う。特徴量導出モデル51には、エンコーダ部201、SA機構層202、およびGAP層204の部分が用いられる。

[0116] このように、マルチタスクCNN200の一部を特徴量導出モデル51として用いてもよい。マルチタスクCNN200は、AE60等と比べて、複数のタスクを担うためにより複雑な処理を行う。このため、マルチタスクCNN200の一部から出力される特徴量54は、解剖区域画像53の特徴をより網羅的に表したものとなる可能性が高い。したがって、マルチタスクCNN200の一部を特徴量導出モデル51として用いれば、より信頼性の置ける特徴量54に基づいた予測結果45が出力されるので、認知症の進行の

速さの予測の精度をより高めることができる。

- [0117] 文献 1 に記載の回帰モデルを用いて、対象者 S の認知症の進行の速さを予測してもよい。
- [0118] 医用画像は、例示の M R I 画像 1 6 に限らない。P E T 画像、または S P E C T 画像でもよい。
- [0119] 図 9 で示した A E 6 0 の学習、図 1 0 で示した変化量導出モデル 5 2 の学習、および図 2 7 で示した変化量導出モデル 8 5 の学習は、臨床試験支援サーバ 1 0 において行ってもよいし、臨床試験支援サーバ 1 0 とは別の装置で行ってもよい。また、これらの学習は、臨床試験支援サーバ 1 0 のストレージ 2 0 に各モデルを記憶した後に継続して行ってもよい。
- [0120] 臨床試験支援サーバ 1 0 は、各医薬開発施設に設置されていてもよいし、医薬開発施設からは独立したデータセンターに設置されていてもよい。また、オペレータ端末 1 1 が臨床試験支援サーバ 1 0 の各処理部の一部または全ての機能を担ってもよい。
- [0121] 対象疾患として認知症を例示したが、これに限らない。対象疾患は例えば脳梗塞であってもよい。この場合は、対象者の脳を写した C T 画像または M R I 画像を学習済みモデルに入力し、脳卒中評価スケール（N I H S S : N a t i o n a l I n s t i t u t e s o f H e a l t h S t r o k e S c a l e）のスコアの変化量、または日本脳卒中評価スケール（J S S : J a p a n S t r o k e S c a l e）のスコアの変化量を学習済みモデルから出力させる。対象疾患は、例示した認知症および脳梗塞、あるいはパーキンソン病といった神経変性疾患および脳血管疾患を含む脳神経疾患であることが好ましい。
- [0122] ただし、認知症は、昨今の高齢化社会の到来とともに社会問題化している。このため、対象疾患を認知症とした本例は、現状の社会問題にマッチした形態であるといえる。
- [0123] 対象疾患は脳神経疾患に限らず、したがって臓器も脳に限らない。
- [0124] 進行速さ予測モデル 3 1 といった学習済みモデルを用いることなく、対象

者Sの対象疾患の進行の速さを予測してもよい。

- [0125] 上記各実施形態において、例えば、受付部35、RW制御部36、予測部37、グループ分け部38、振り分け部39、配信制御部40、および選定部75といった各種の処理を実行する処理部（Processing Unit）のハードウェア的な構造としては、次に示す各種のプロセッサ（Processor）を用いることができる。各種のプロセッサには、上述したように、ソフトウェア（作動プログラム30）を実行して各種の処理部として機能する汎用的なプロセッサであるCPU22に加えて、FPGA（Field Programmable Gate Array）等の製造後に回路構成を変更可能なプロセッサであるプログラマブルロジックデバイス（Programmable Logic Device:PLD）、ASIC（Application Specific Integrated Circuit）等の特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有するプロセッサである専用電気回路等が含まれる。
- [0126] 1つの処理部は、これらの各種のプロセッサのうちの1つで構成されてもよいし、同種または異種の2つ以上のプロセッサの組み合わせ（例えば、複数のFPGAの組み合わせ、および／または、CPUとFPGAとの組み合わせ）で構成されてもよい。また、複数の処理部を1つのプロセッサで構成してもよい。
- [0127] 複数の処理部を1つのプロセッサで構成する例としては、第1に、クライアントおよびサーバ等のコンピュータに代表されるように、1つ以上のCPUとソフトウェアの組み合わせで1つのプロセッサを構成し、このプロセッサが複数の処理部として機能する形態がある。第2に、システムオンチップ（System On Chip:SoC）等に代表されるように、複数の処理部を含むシステム全体の機能を1つのIC（Integrated Circuit）チップで実現するプロセッサを使用する形態がある。このように、各種の処理部は、ハードウェア的な構造として、上記各種のプロセッサの1つ以上を用いて構成される。

[0128] さらに、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造としては、より具体的には、半導体素子等の回路素子を組み合わせた電気回路（c i r c u i t r y）を用いることができる。

[0129] 以上の記載から、下記の付記項に記載の技術を把握することができる。

[0130] [付記項 1]

プロセッサを備え、

前記プロセッサは、

臨床試験の対象者について対象疾患の進行の速さを予測し、

対象疾患の進行の速さの予測結果に応じて対象者を複数のグループに分け

、

複数の前記グループ毎に、被験薬を投与する被験薬群と偽薬を投与する偽薬群とに対象者を振り分ける、

臨床試験支援装置。

[付記項 2]

前記プロセッサは、

前記予測結果に基づいて、対象疾患の進行が比較的速い対象者を選定し、

選定した対象者に対してのみ、前記予測結果に応じたグループ分け、および被験薬群と偽薬群への振り分けを行う付記項 1 に記載の臨床試験支援装置。

[付記項 3]

前記プロセッサは、

ブロックランダムイズ手法を用いて被験薬群と偽薬群とに対象者を振り分ける付記項 1 または付記項 2 に記載の臨床試験支援装置。

[付記項 4]

前記プロセッサは、

学習済みモデルを用いて前記対象疾患の進行の速さの予測を行い、

前記学習済みモデルは、第 1 時点における対象疾患患者の臓器を写した医用画像を学習用入力データとし、前記第 1 時点から臨床試験期間に相当する

期間を経た第2時点における対象疾患患者の対象疾患の進行度合いを示す数値を正解データとして学習された学習済みモデルであり、

前記プロセッサは、

臨床試験の開始時点における対象者の臓器を写した医用画像を前記学習済みモデルに入力し、臨床試験の終了時点における対象者の対象疾患の進行度合いを示す数値を、前記予測結果として前記学習済みモデルから出力させる付記項1から付記項3のいずれか1項に記載の臨床試験支援装置。

[付記項5]

前記学習済みモデルは、

臨床試験の開始時点における前記医用画像から臓器の複数の解剖区域の画像である複数の解剖区域画像を抽出し、

前記解剖区域毎に用意された特徴量導出モデルに前記解剖区域画像を入力し、前記特徴量導出モデルから前記解剖区域の特徴量を出力させる付記項4に記載の臨床試験支援装置。

[付記項6]

前記学習用入力データは、前記第1時点における対象疾患患者の対象疾患に関する対象疾患関連データも含み、

前記プロセッサは、

臨床試験の開始時点における対象者の対象疾患に関する対象疾患関連データも前記学習済みモデルに入力する付記項4または付記項5に記載の臨床試験支援装置。

[付記項7]

前記対象疾患は認知症であり、

前記数値は、認知機能検査のスコアの変化量、または認知症となる確率である付記項4から付記項6のいずれか1項に記載の臨床試験支援装置。

[付記項8]

前記対象疾患は脳神経疾患である付記項1から付記項7のいずれか1項に記載の臨床試験支援装置。

[付記項 9]

前記対象疾患は認知症である付記項 1 から付記項 8 のいずれか 1 項に記載の臨床試験支援装置。

[0131] 本開示の技術は、上述の種々の実施形態および／または種々の変形例を適宜組み合わせることも可能である。また、上記各実施形態に限らず、要旨を逸脱しない限り種々の構成を採用し得ることはもちろんである。さらに、本開示の技術は、プログラムに加えて、プログラムを非一時的に記憶する記憶媒体にもおよぶ。

[0132] 以上に示した記載内容および図示内容は、本開示の技術に係る部分についての詳細な説明であり、本開示の技術の一例に過ぎない。例えば、上記の構成、機能、作用、および効果に関する説明は、本開示の技術に係る部分の構成、機能、作用、および効果の一例に関する説明である。よって、本開示の技術の主旨を逸脱しない範囲内において、以上に示した記載内容および図示内容に対して、不要な部分を削除したり、新たな要素を追加したり、置き換えたりしてもよいことはいうまでもない。また、錯綜を回避し、本開示の技術に係る部分の理解を容易にするために、以上に示した記載内容および図示内容では、本開示の技術の実施を可能にする上で特に説明を要しない技術常識等に関する説明は省略されている。

[0133] 本明細書において、「A および／または B」は、「A および B のうちの少なくとも 1 つ」と同義である。つまり、「A および／または B」は、A だけであってもよいし、B だけであってもよいし、A および B の組み合わせであってもよい、という意味である。また、本明細書において、3 つ以上の事柄を「および／または」で結び付けて表現する場合も、「A および／または B」と同様の考え方が適用される。

[0134] 本明細書に記載された全ての文献、特許出願および技術規格は、個々の文献、特許出願および技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。

請求の範囲

- [請求項1] プロセッサを備え、
 前記プロセッサは、
 臨床試験の対象者について対象疾患の進行の速さを予測し、
 対象疾患の進行の速さの予測結果に応じて対象者を複数のグループに分け、
 複数の前記グループ毎に、被験薬を投与する被験薬群と偽薬を投与する偽薬群とに対象者を振り分ける、
 臨床試験支援装置。
- [請求項2] 前記プロセッサは、
 前記予測結果に基づいて、対象疾患の進行が比較的速い対象者を選定し、
 選定した対象者に対してのみ、前記予測結果に応じたグループ分け、および被験薬群と偽薬群への振り分けを行う請求項1に記載の臨床試験支援装置。
- [請求項3] 前記プロセッサは、
 ブロックランダムイズ手法を用いて被験薬群と偽薬群とに対象者を振り分ける請求項1に記載の臨床試験支援装置。
- [請求項4] 前記プロセッサは、
 学習済みモデルを用いて前記対象疾患の進行の速さの予測を行い、
 前記学習済みモデルは、第1時点における対象疾患患者の臓器を写した医用画像を学習用入力データとし、前記第1時点から臨床試験期間に相当する期間を経た第2時点における対象疾患患者の対象疾患の進行度合いを示す数値を正解データとして学習された学習済みモデルであり、
 前記プロセッサは、
 臨床試験の開始時点における対象者の臓器を写した医用画像を前記学習済みモデルに入力し、臨床試験の終了時点における対象者の対象

疾患の進行度合いを示す数値を、前記予測結果として前記学習済みモデルから出力させる請求項 1 に記載の臨床試験支援装置。

[請求項5] 前記学習済みモデルは、
臨床試験の開始時点における前記医用画像から臓器の複数の解剖区域の画像である複数の解剖区域画像を抽出し、
前記解剖区域毎に用意された特徴量導出モデルに前記解剖区域画像を入力し、前記特徴量導出モデルから前記解剖区域の特徴量を出力させる請求項 4 に記載の臨床試験支援装置。

[請求項6] 前記学習用入力データは、前記第 1 時点における対象疾患患者の対象疾患に関する対象疾患関連データも含み、
前記プロセッサは、
臨床試験の開始時点における対象者の対象疾患に関する対象疾患関連データも前記学習済みモデルに入力する請求項 4 に記載の臨床試験支援装置。

[請求項7] 前記対象疾患は認知症であり、
前記数値は、認知機能検査のスコアの変化量、または認知症となる確率である請求項 4 に記載の臨床試験支援装置。

[請求項8] 前記対象疾患は脳神経疾患である請求項 1 に記載の臨床試験支援装置。

[請求項9] 前記対象疾患は認知症である請求項 1 に記載の臨床試験支援装置。


[請求項10] 臨床試験の対象者について対象疾患の進行の速さを予測すること、
対象疾患の進行の速さの予測結果に応じて対象者を複数のグループに分けること、並びに、
複数の前記グループ毎に、被験薬を投与する被験薬群と偽薬を投与する偽薬群とに対象者を振り分けること、
を含む臨床試験支援装置の作動方法。

[請求項11] 臨床試験の対象者について対象疾患の進行の速さを予測すること、
対象疾患の進行の速さの予測結果に応じて対象者を複数のグループ


に分けること、並びに、

複数の前記グループ毎に、被験薬を投与する被験薬群と偽薬を投与する偽薬群とに対象者を振り分けること、を含む処理をコンピュータに実行させる臨床試験支援装置の作動プログラム。


[図1]




[図2]




[図3]




[図4]




[図5]




[図6]




[図7]




[図8]




[図9]




[図10]



[図11]



[図12]




[図13]

32


グループ	振り分けルール(ブロックランダム化手法 2人単位)
1	[TG,PG] [TG,PG] [PG,TG] [TG,PG] [PG,TG] [PG,TG]
2	[TG,PG] [PG,TG] [PG,TG] [TG,PG] [PG,TG] [PG,TG]
3	[PG,TG] [TG,PG] [TG,PG] [TG,PG] [PG,TG] [TG,PG]
	⋮
16	[TG,PG] [TG,PG] [TG,PG] [TG,PG] [PG,TG] [TG,PG]
17	[PG,TG] [TG,PG] [PG,TG] [PG,TG] [PG,TG] [PG,TG]
18	[TG,PG] [TG,PG] [PG,TG] [TG,PG] [PG,TG] [PG,TG]

※ TG:被験薬群 PG:偽薬群


[図14]




[図16]




[図17]




[図18]




[図19]




[図20]




[図21]



[図22]




[図23]




[図24]




[図25]




[図26]




[図27]




[図28]




[図29]



[図30]



[図31]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2022/040265

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER*G16H 10/40*(2018.01)i

FI: G16H10/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G16H10/40

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2022

Registered utility model specifications of Japan 1996-2022

Published registered utility model applications of Japan 1994-2022

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2018-517781 A (MOLECULAR DEFENSES CORPORATION) 05 July 2018 (2018-07-05) entire text	1-11
A	JP 2016-516007 A (TRIACT THERAPEUTICS, INC.) 02 June 2016 (2016-06-02) entire text	1-11
A	JP 2007-524361 A (AGENSYS, INC.) 30 August 2007 (2007-08-30) entire text	1-11
A	WO 2021/020198 A1 (FUJIFILM CORPORATION) 04 February 2021 (2021-02-04) entire text	1-11
A	US 2010/0280975 A1 (WISTA LABORATORIES LTD.) 04 November 2010 (2010-11-04) entire text	1-11

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

05 December 2022

Date of mailing of the international search report

20 December 2022

Name and mailing address of the ISA/JP

Japan Patent Office (ISA/JP)
3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915
Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2022/040265

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
JP	2018-517781	A	05 July 2018	US	2016/0367621	A1	
				US	2016/0367620	A1	
				WO	2016/205804	A1	
				EP	3310374	A1	
				CN	108135964	A	
JP	2016-516007	A	02 June 2016	US	2014/0249099	A1	
				WO	2014/134202	A1	
				EP	2961412	A1	
				AU	2014223548	A1	
				CA	2941010	A1	
JP	2007-524361	A	30 August 2007	US	2005/0208039	A1	
				EP	1594892	A2	
				WO	2004/072263	A2	
				AU	2004210975	A1	
				CA	2860151	A1	
WO	2021/020198	A1	04 February 2021	IL	170080	A	
				US	2022/0122253	A1	
				EP	4005498	A1	
				CN	114080646	A	
US	2010/0280975	A1	04 November 2010	WO	2009/060191	A2	
				EP	2227766	A1	
				CN	101911081	A	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） G16H 10/40(2018.01)i FI: G16H10/40		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） G16H10/40		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2022年 日本国実用新案登録公報 1996-2022年 日本国登録実用新案公報 1994-2022年		
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2018-517781 A（モレキュラー ディフェンシズ コーポレイション）05.07.2018 (2018-07-05) 全文	1-11
A	JP 2016-516007 A（トリアクト セラピューティクス, インク.）02.06.2016 (2016-06-02) 全文	1-11
A	JP 2007-524361 A（アジェンシス, インコーポレイテッド）30.08.2007（2007-08-30） 全文	1-11
A	WO 2021/020198 A1（富士フイルム株式会社）04.02.2021（2021-02-04） 全文	1-11
A	US 2010/0280975 A1（WISTA LABORATORIES LTD.）04.11.2010（2010-11-04） 全文	1-11
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 05.12.2022		国際調査報告の発送日 20.12.2022
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		権限のある職員（特許庁審査官） 梅岡 信幸 5N 9075 電話番号 03-3581-1101 内線 3586

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2022/040265

引用文献			公表日	パテントファミリー文献			公表日
JP	2018-517781	A	05.07.2018	US	2016/0367621	A1	
				US	2016/0367620	A1	
				WO	2016/205804	A1	
				EP	3310374	A1	
				CN	108135964	A	
JP	2016-516007	A	02.06.2016	US	2014/0249099	A1	
				WO	2014/134202	A1	
				EP	2961412	A1	
				AU	2014223548	A1	
				CA	2941010	A1	
JP	2007-524361	A	30.08.2007	US	2005/0208039	A1	
				EP	1594892	A2	
				WO	2004/072263	A2	
				AU	2004210975	A1	
				CA	2860151	A1	
				IL	170080	A	
WO	2021/020198	A1	04.02.2021	US	2022/0122253	A1	
				EP	4005498	A1	
				CN	114080646	A	
US	2010/0280975	A1	04.11.2010	WO	2009/060191	A2	
				EP	2227766	A1	
				CN	101911081	A	