



CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) **CH** **707 354 A1**

(51) Int. Cl.: **A61K** **31/7048** (2006.01)
A61K **9/10** (2006.01)
A61P **9/14** (2006.01)

Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(12) **DEMANDE DE BREVET**

(21) Numéro de la demande: 02023/13

(22) Date de dépôt: 06.12.2013

(43) Demande publiée: 30.06.2014

(30) Priorité: 21.12.2012 FR 12/03579

(71) Requérant:
Les Laboratoires Servier, 35, rue de Verdun
92284 Suresnes Cedex (FR)

(72) Inventeur(s):
Stéphanie Marsas, 45430 Checy (FR)
Jean-Manuel Pean, 45000 Orleans (FR)

(74) Mandataire:
BOHEST AG, Postfach 160
4003 Basel (CH)

(54) **Composition pharmaceutique sous la forme d'une suspension orale comprenant une fraction flavonoïque et de la gomme xanthane.**

(57) Composition pharmaceutique sous la forme d'une suspension orale comprenant de la diosmine et de la gomme xanthane. Utilisation de la composition pharmaceutique selon l'invention dans le traitement de l'insuffisance veineuse.

Description

[0001] La présente invention concerne une suspension orale fortement dosée comprenant de la diosmine et optionnellement d'autres dérivés flavonoïques et comme excipient de la gomme xanthane, ainsi que son utilisation dans le traitement de l'insuffisance veineuse.

[0002] De préférence, la présente invention concerne une suspension fortement dosée d'une fraction flavonoïque et de gomme xanthane pour l'administration orale, ainsi que son utilisation dans le traitement de l'insuffisance veineuse.

[0003] La fraction flavonoïque est issue d'un extrait de rutacées. La fraction flavonoïque purifiée et micronisée utilisée dans l'invention contient de 87% à 93% de diosmine et d'autres flavonoïdes de manière concomitante. Ces autres flavonoïdes à hauteur environ de 10% comprennent de 2.5% à 5.0% d'héspéridine, de 0.9% à 2.8% d'isorhoifoline, de 0.9% à 2.8% de linarine et moins de 1% de diosmétine. La taille des particules de la fraction flavonoïque micronisée est strictement inférieure à 5 µm, voire inférieure à 4 µm, 3 µm, 2 µm et même 1.6 µm.

La fraction flavonoïque selon l'invention est administrée à des doses journalières allant de 1000 mg à 3000 mg afin de traiter les manifestations de l'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs. Du fait d'une importante métabolisation de la fraction flavonoïque dans le tractus gastrointestinal, ce principe actif doit être fortement dosé à chacune de ses administrations. Par ailleurs, les traitements à base de fraction flavonoïque sont des traitements au long cours imposants une prise facile afin de favoriser l'observance du traitement de la part des patients. En conséquence, il est préférable de développer des formes galéniques permettant une prise facile pour les personnes âgées et sans addition d'eau pour les patients ayant une consommation hors foyer.

[0004] L'utilisation en thérapeutique de la fraction flavonoïque extrait de rutacées selon l'invention a été décrite dans le brevet EP 0 711 560. Ce brevet décrit une composition de granulés effervescents fortement dosé à 1000 mg de fraction flavonoïque. Cependant ces granulés effervescents sont à disperser dans l'eau avant consommation.

[0005] Des solutions buvables contenant des flavonoïdes et de la gomme xanthane ont été décrites dans le brevet US 5 240 732. Ce brevet divulgue une solution dans laquelle les flavonoïdes ont été dissouts dans un alcool contrairement à la présente invention qui concerne une suspension aqueuse dans laquelle la fraction flavonoïque est dispersée de manière homogène.

[0006] Des suspensions buvables contenant des polyphénols et des stabilisants de la dispersion ont été décrites dans la demande de brevet US 2012/0 070 475. Les suspensions selon la demande US 2012/0 070 475 sont faiblement dosées en quercétine et utilisent exclusivement la gomme gellane en tant que stabilisant de la dispersion.

[0007] L'objet de la présente invention est composition pharmaceutique sous la forme d'une suspension orale fortement dosée comprenant comme principe actif de la diosmine et optionnellement d'autres dérivés flavonoïques et comme excipient de la gomme xanthane.

[0008] De préférence, l'objet de la présente invention est une composition pharmaceutique sous la forme d'une suspension orale fortement dosée comprenant comme principe actif une fraction flavonoïque et comme excipient de la gomme xanthane.

[0009] Le pourcentage de fraction flavonoïque dans la composition pharmaceutique est compris entre 7%*m/m* et 20%*m/m*. La quantité de fraction flavonoïque dans la composition pharmaceutique est comprise entre 1000 mg et 3000 mg, dont 2000 mg, 1500 mg, 2500 mg.

[0010] La suspension orale fortement dosée en principe actif de la présente invention doit avoir une viscosité adéquate pour permettre d'une part, à la suspension de s'écouler dans les machines de fabrication et hors du sachet lors de l'administration et pour permettre d'autre part, à la fraction flavonoïque de ne pas sédimenter dans le sachet et être stable au cours du temps.

[0011] Afin de répondre à la totalité de ces propriétés fonctionnelles, la suspension orale doit répondre à des propriétés rhéologiques spécifiques.

La viscosité de la suspension ne doit pas dépendre du temps pendant lequel elle subit des forces de cisaillement. Il est nécessaire que la suspension retrouve sa viscosité initiale après application d'une contrainte quelconque soit sa durée d'application. La viscosité de la suspension doit donc être réversible sur la gamme 0.01 et 1000 s⁻¹ de cisaillement. Cette propriété rhéologique, i.e. la suspension retrouve entièrement sa viscosité pendant les temps de repos, est essentielle dans les étapes de pompage, préemballage, en passant par le transport et le stockage jusqu'à l'utilisation par le consommateur final de la suspension orale en sachet.

Par ailleurs, il apparaît nécessaire que la viscosité de la suspension soit indépendante de la température sur l'intervalle 15 °C–60 °C, gamme de températures ad hoc à l'issue de la production et au cours des étapes de transport, traitement et emballage du produit final.

Les mesures de viscosité sont réalisées sur le rhéomètre Anton Paar ou sur le rhéomètre de Brookfield. Les résultats obtenus avec ces deux types de rhéomètres sont tout à fait comparables.

Les propriétés rhéologiques et la stabilité requises par la suspension orale selon l'invention sont obtenues à l'aide d'un épaississement de la composition pharmaceutique. L'épaississement de la composition pharmaceutique est obtenu grâce à l'utilisation d'un agent épaississant.

[0012] L'agent épaississant selon l'invention est la gomme xanthane. La gomme xanthane est un polysaccharide anionique de haut poids moléculaire constituée de D-glucoses et de D-mannoses comme hexoses dominants. En solution, les molécules de gomme xanthane s'associent entre elles pour former un réseau de molécules enchevêtrées.

[0013] La concentration de gomme xanthane dans la composition pharmaceutique selon l'invention est comprise entre 0.45% m/v et 0.55% m/v. La concentration de la gomme xanthane peut être de 0.50% m/v, 0.47% m/v, 0.53% m/v.

[0014] La quantité de gomme xanthane dans la composition pharmaceutique est comprise entre 0.30% m/m et 0.60% m/m,

[0015] La composition pharmaceutique sous la forme d'une suspension orale fortement chargée en fraction flavonoïque selon l'invention est sans tensioactifs. Les tensioactifs sont généralement utilisés dans les suspensions orales afin d'améliorer la dispersion et la mouillabilité des particules en suspension.

[0016] Outre la fraction flavonoïque et la gomme xanthane, la composition pharmaceutique selon l'invention contient un ou plusieurs excipients pharmaceutiquement acceptables tels que des conservateurs, des arômes, des édulcorants ou des correcteurs de pH.

[0017] A titre d'exemple d'excipients, on peut citer:

pour les conservateurs: benzoate de sodium, chlorure de benzalkonium, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle; pour les arômes: arôme orange, arôme citron, arôme caramel mou, arôme vanille/citron;

pour les édulcorants: maltitol, le sorbitol, l'aspartam, le xylitol, l'acésulfame de potassium, la saccharine sodique;

pour les correcteurs de pH: acide citrique, acide ascorbique, acide tartrique.

[0018] La composition pharmaceutique selon l'invention est sous la forme d'une suspension buvable en sachet. Le sachet ou stick a de préférence un volume unitaire de 10ml contenant la dose quotidienne de fraction flavonoïque. Pour une meilleure observance du patient le volume unitaire du sachet ne doit pas être trop important, par exemple 10 ml, 12 ml, 15 ml, 17 ml au plus 20 ml.

La présente invention concerne également l'utilisation des compositions pharmaceutiques selon l'invention dans le traitement de la maladie veineuse, plus particulièrement de l'insuffisance veineuse. Ces compositions pharmaceutiques sont utilisées comme veinotonique et vasculo-protecteur.

[0019] Les exemples ci-dessous illustrent l'invention de manière non limitative.

Exemple 1: Composition pharmaceutique pour sachet contenant une suspension de 1 g de flavonoïdes

[0020]

Benzoate de sodium	0.015g/10ml
Acide citrique	0.0125g/10ml
Arôme orange	0.015g/10ml
Maltitol	1.8g/10ml
Fraction flavonoïque	1.0g/10ml
Gomme xanthane	0.05g/10ml
Eau purifiée	qsp 10ml

[0021] Préparation de la suspension de l'exemple 1: Pour environ 100 000 sachets:

700 litres d'eau purifiée et 1.5 kg de benzoate de sodium sont soigneusement mélangés à 20 °C jusqu'à complète dissolution. 1.25 kg d'acide citrique et 1.5 kg d'arôme orange sont ajoutés à la solution. 180 kg de poudre de maltitol sont ajoutés à la solution et soigneusement mélangés. 100 kg de la fraction flavonoïque sont très lentement ajoutés au mélange jusqu'à la formation d'une suspension homogène. 5 kg de gomme xanthane est introduite très lentement directement dans la suspension. De l'eau purifiée est ajoutée qsp obtenir un volume final de 1100 litres.

Exemple 2: Stabilité de la suspension orale de l'exemple 1 (Batch LP02)

[0022] La stabilité de la composition pharmaceutique de l'Exemple 1 selon l'invention en sachet a été testée dans différentes conditions de température et d'humidité.

[0023] Les sachets sont constitués d'un complexe multicouche (polyéthylène PET12/aluminium AL12 /complexe de polyéthylène extrudé PE50).

[0024]

	Sachet			
T	Densité (Eur. Ph.)			
	25°C / 60% HR	30°C / 65% HR	30°C / 75% HR	40°C / 75% HR
T0	1.11			
T0 + 1 mois	1.10	1.10	1.10	1.10
T0 + 3 mois	1.10	1.10	1.10	1.10

[0025] Le tableau ci-dessus relatif à l'évolution de la densité de la suspension dans le sachet montre que la densité est totalement stable même dans des conditions de température et d'humidité élevées (40 °C/75% HR). Cette stabilité de la densité montre que la suspension ne déphase pas au cours du temps dans des conditions de température et d'humidité élevées.

[0026]

	Sachet			
T	Taille des particules de la fraction flavonoïque			
	25°C / 60% HR	30°C / 65% HR	30°C / 75% HR	40°C / 75% HR
T0	d10 0.658 d50 2.581 d90 6.642			
T0 + 1 mois	d10 0.723 d50 2.679 d90 6.969	d10 0.741 d50 2.692 d90 6.675	d10 0.739 d50 2.694 d90 6.698	d10 0.760 d50 2.726 d90 6.685
T0 + 3 mois	d10 0.726 d50 2.663 d90 6.670	d10 0.746 d50 2.779 d90 6.862	d10 0.751 d50 2.708 d90 6.690	d10 0.798 d50 2.818 d90 6.739

[0027] La distribution de taille des particules de la fraction flavonoïque est exprimée en diamètre d10, d50 et d90 où d10=d(v,0.1) correspond à la valeur à 10% de la courbe cumulée de la distribution granulométrique en volume; d50=d(v,0.5) correspond à la valeur à 50% de la courbe cumulée de la distribution granulométrique en volume; d90=d(v,0.9) correspond à la valeur à 90% de la courbe cumulée de la distribution granulométrique en volume.

[0028] Le tableau ci-dessus montre que la taille des particules de la fraction flavonoïque selon l'invention n'augmente pas au cours du temps dans des conditions de température et d'humidité élevées. Les particules de la fraction flavonoïque micronisée ne s'agglomèrent pas ni ne sédimentent dans la suspension orale selon l'invention.

[0029]

	Sachet			
T	Viscosité en CP			
	25°C / 60% HR	30°C / 65% HR	30°C / 75% HR	40°C / 75% HR
T0	321			
T0 + 1 mois	293	298	294	296
T0 + 3 mois	293	293	294	298

[0030] Le tableau ci-dessus relatif à la viscosité de la suspension dans le sachet montre que la viscosité est extrêmement stable au cours du temps dans des conditions de température et d'humidité élevées.

[0031] Enfin, un contrôle visuel de la suspension dans les différentes conditions de température et d'humidité après 1 mois et 3 mois d'évaluation montre une absence de grumeaux et de bulles dans les sachets.

Exemple 3: Uniformité de teneur de la composition pharmaceutique selon l'exemple 1

[0032] L'essai est effectué sur 10 sachets. Le contenu de chaque sachet est dosé; une solution de référence de diosmine est utilisée comme contrôle.

[0033] La teneur moyenne X_m est exprimée de la façon suivante:

$$X_m = (\sum X_i)/10$$

[0034] La valeur d'acceptation (AV), exprimée en pourcentage de la valeur théorique, est donnée par la formule suivante:
 $AV = (M - X_m) + k \times s$

où:

X_m est la teneur moyenne, exprimée en pourcentage de la valeur théorique; M est la valeur de référence, exprimée en pourcentage de la valeur théorique: $M=98.5$ si $X_m < 98.5$; $M=X_m$ si $98.5 \leq X_m \leq 101.5$; $M=101.5$ si $X_m > 101.5$;

k est la constante d'acceptabilité ($k=2.4$ pour 10 sachets);

s est l'écart type des teneurs X_i .

[0035]

Paramètres d'uniformité de teneur (diosmine)	Lot LP02 1000 litres (sachet) selon l'Exemple 1	
	Début ensachage	Fin ensachage
Teneur moyenne	100.5	102.1
Ecart-type	0.9	0.7
Valeur d'acceptation (AV)	2.2	2.3

[0036] Selon la Pharmacopée Européenne, article 2.9.40, une valeur d'acceptation inférieure à 15 signifie que l'uniformité de teneur est conforme (niveau L1). Le tableau ci-dessus montre donc que la diosmine contenue dans la formulation selon l'invention a une uniformité de teneur qui répond aux exigences réglementaires.

Revendications

1. Composition pharmaceutique sous la forme d'une suspension orale comprenant comme principe actif de la diosmine et optionnellement des dérivés flavonoïques et comme excipient de la gomme xanthane
2. Composition pharmaceutique selon la revendication 1, dans laquelle le principe actif est une fraction flavonoïque purifiée et micronisée.
3. Composition pharmaceutique selon la revendication 2, dans laquelle la fraction flavonoïque comprend de la diosmine, de l'héspéridine, de l'isorhoifoline, de la linarine et de la diosmétine.
4. Composition pharmaceutique selon la revendication 2, dans laquelle la quantité de la fraction flavonoïque est comprise entre 7%*m/m* et 20%*m/m*.
5. Composition pharmaceutique selon la revendication 1, dans laquelle la concentration de gomme xanthane est de 0.5% *m/v*.
6. Composition pharmaceutique selon la revendication 1, dans laquelle la quantité de gomme xanthane est comprise entre 0.30%*m/m* et 0.60%*m/m*.
7. Composition pharmaceutique selon la revendication 1, comprenant un ou plusieurs excipients pharmaceutiquement acceptables choisis parmi les édulcorants, les arômes, les conservateurs ou les correcteurs de pH.
8. Composition pharmaceutique selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, sous la forme de suspension buvable en sachet.
9. Composition pharmaceutique selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, pour son utilisation dans le traitement de l'insuffisance veineuse.

**RAPPORT DE RECHERCHE RELATIF À LA
DEMANDE DE BREVET SUISSE**

Numéro de la demande: CH02023/13

Classification de la demande (CIB):
A61K31/7048, A61K9/10, A61P9/14**Domaines recherchés (CIB):**
A61K**DOCUMENTS PERTINENTS:**

(référence du document, catégorie, revendications concernées, indications des parties significatives (*))

- 1 FR2781156 A1 (LAB LAFON SA [FR]) 21.01.2000
Catégorie: **X** Revendications: **1, 7-8**
* Page 4 lignes 9-10, page 6 lignes 25-28, page 10 lignes 1-9 *
- 2 FR6967M M (SCIENCE UNION ET CIE, SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RECHERCHE MÉDICALE [FR]) 19.05.1969
Catégorie: **Y** Revendications: **1, 3-6, 9**
* Page 1 colonne 1, exemple 4 *
- 3 FR2661610 A1 (RHONE-POULENC SANTÉ [FR]) 08.11.1991
Catégorie: **Y** Revendications: **1, 3-6, 9**
* Page 1 lignes 3-5, page 2 lignes 22-30, exemples 1-3 *
- 4 JP4202439B B2 (EZAKI GLICO CO LTD) 24.12.2008
Catégorie: **A** Revendications: **1, 3-6**
* [0006] - [0008], [0010], rev. 1, 3, 5 *
- 5 US2008193548 A1 (CEVA SANTÉ ANIMALE SA [FR]; ZANICHELLI CLAUDIO [IT]; BINACCHI SIMONA [IT]; LACOSTE SANDRINE [FR]; SACCHETTI CECILIA [IT]) 14.08.2008
Catégorie: **A** Revendications: **1, 2, 5-6, 8**
* Page 3 paragraphe [0024] colonne 2 lignes 9-11, exemple 2, rev. 1, 6-7 *
- 6 EP1707192 A2 (THERAPICON SRL [IT]) 04.10.2006
Catégorie: **Y** Revendications: **1-2, 9**
* [0002], [0006], [0007], [0031], [0052], exemple 7, rev. 1, 6, 13, 16 *
- 7 FR2668705 A1 (BOUCHARA SA [FR]) 07.05.1992
Catégorie: **Y** Revendications: **1-2, 9**
* Page 1 paragraphes 2-3, exemple 1 *
- 8 Johnston A M; Paul H J; Young C G, Effects of micronization on digestive absorption of diosmin, Phlebology 1994 gb, Vol. 9, No. SUPPL. 1, Pg. 4 - 6, 01.03.1994, ISSN 0268-3555 (print), [EMB-1995008483]
Catégorie: **A** Revendications: **1-2**
* Titre, abrégé *

CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS:

X:	remettent en question, à eux seuls, la nouveauté et/ou l'activité inventive	D:	ont été fournis par le demandeur avec la demande de brevet
Y:	remettent en question, à l'appui d'un document de la même catégorie, l'activité inventive	T:	théories et principes sur lesquels se fonde l'invention
A:	définissent l'état général de la technique sans avoir de pertinence particulière pour la nouveauté et l'activité inventive	E:	documents de brevets dont la date de dépôt ou de priorité se situe avant la date de dépôt de la demande de brevet objet de la recherche mais qui ont été publiés seulement après cette date
O:	divulgaration non écrite	L:	documents cités pour d'autres raisons
P:	ont été publiés entre la date de dépôt de la demande de brevet objet de la recherche et la date de priorité revendiquée	&:	membre de la même famille de brevets; document correspondant

La recherche se base sur la version des revendications déposée initialement. Une nouvelle version des revendications déposée ultérieurement (art. 51 al. 2 OBI) n'est pas prise en considération.

Le présent rapport de recherche a été établi pour les revendications, pour lesquelles les taxes requises ont été payées.

Recherche effectuée par:	François Loiseau
Autorité de recherche, lieu:	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne
Fin de la recherche:	06.02.2014

TABLEAU DES FAMILLES DES BREVETS CITÉS

Les membres de la famille sont mentionnés conformément à la base de données de l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ne garantissent pas ces données. Celles-ci sont fournies uniquement à titre d'information.

FR2781156 A1	21.01.2000	AT235226 T	15.04.2003
		AU4629699 A	14.02.2000
		CA2337152 A1	03.02.2000
		CA2337152 C	16.09.2008
		CN1310610 A	29.08.2001
		CN1149977 C	19.05.2004
		DE69906302 D1	30.04.2003
		DE69906302 T2	27.11.2003
		DK1098631 T3	21.07.2003
		EP1098631 A1	16.05.2001
		EP1098631 B1	26.03.2003
		ES2196823 T3	16.12.2003
		FR2781156 A1	21.01.2000
		FR2781156 B1	29.06.2001
		JP2002521321 A	16.07.2002
		PT1098631 E	30.06.2003
		US7033606 B1	25.04.2006
		WO0004878 A1	03.02.2000
		BE726774 A	10.07.1969
		FR6967 M	19.05.1969
FR6967M M	19.05.1969	FR2661610 A1	08.11.1991
FR2661610 A1	08.11.1991	FR2661610 B1	30.09.1994
JP4202439B B2	24.12.2008	JPH10101705 A	21.04.1998
US2008193548 A1	14.08.2008	JP4202439 B2	24.12.2008
		FR2911506 A1	25.07.2008
		FR2911506 B1	03.07.2009
		US2008193548 A1	14.08.2008
		WO2008090076 A1	31.07.2008

CH 707 354 A1

EP1707192 A2	04.10.2006	AT423548 T	15.03.2009
		DE602006005273 D1	09.04.2009
		EP1707192 A2	04.10.2006
		EP1707192 A3	18.10.2006
		EP1707192 B1	25.02.2009
		ES2322911 T3	01.07.2009
		ITMI20050517 A1	30.09.2006
FR2668705 A1	07.05.1992	FR2668705 A1	07.05.1992