

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2021-515541

(P2021-515541A)

(43) 公表日 令和3年6月24日 (2021.6.24)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 1 2 N 15/13 (2006.01)	C 1 2 N 15/13	4 B 0 6 4
C 0 7 K 16/28 (2006.01)	C 0 7 K 16/28 Z N A	4 B 0 6 5
C 0 7 K 16/46 (2006.01)	C 0 7 K 16/46	4 C 0 7 6
C 1 2 N 15/63 (2006.01)	C 1 2 N 15/63 Z	4 C 0 8 4
C 1 2 N 1/15 (2006.01)	C 1 2 N 1/15	4 C 0 8 5
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 76 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2020-542228 (P2020-542228)
 (86) (22) 出願日 平成31年3月8日 (2019.3.8)
 (85) 翻訳文提出日 令和2年9月14日 (2020.9.14)
 (86) 国際出願番号 PCT/EP2019/055927
 (87) 国際公開番号 W02019/170898
 (87) 国際公開日 令和1年9月12日 (2019.9.12)
 (31) 優先権主張番号 1803746.5
 (32) 優先日 平成30年3月8日 (2018.3.8)
 (33) 優先権主張国・地域又は機関
 英国 (GB)
 (31) 優先権主張番号 1813405.6
 (32) 優先日 平成30年8月16日 (2018.8.16)
 (33) 優先権主張国・地域又は機関
 英国 (GB)

(71) 出願人 520284104
 ウルトラヒューマン ナイン リミテッド
 イギリス国, ケント シーティー 1 3 9
 エフエフ サンドウィッチ, ラムスゲイト
 ロード, イノベーション ハウス, クレ
 ストン リーズ エルエルビー内
 (74) 代理人 100079108
 弁理士 稲葉 良幸
 (74) 代理人 100109346
 弁理士 大貫 敏史
 (74) 代理人 100117189
 弁理士 江口 昭彦
 (74) 代理人 100134120
 弁理士 内藤 和彦

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 PD 1 結合剤

(57) 【要約】



【課題】 C D R の生殖細胞系列化および開発クオリティの最適化は複雑で多因子的な課題である。

【解決手段】

本明細書において、プログラム細胞死 1 (PD 1) に特異的に結合する抗体分子、ならびにその関連する核酸分子、ベクターおよび宿主細胞が提供される。さらに本明細書において、当該抗体分子の医療用途が提供される。

。

【選択図】 図 1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

抗PD1抗体またはその抗原結合部分であって、当該抗体は、重鎖可変（VH）領域および軽鎖可変（VL）領域を含有し、

（a）VH領域のアミノ酸配列は、GFTFSSSYGMS（配列番号33）のHC DR 1、VANIWQDGSTKYVDSVKG（配列番号34）のHC DR 2、およびAY GNYWYIDR（配列番号35）のHC DR 3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQS SVTNDVA（配列番号36）のLC DR 1、YAYHRFT（配列番号37）のLC DR 2、およびHQA YSSSPYT（配列番号38）のLC DR 3を含み、

10

（b）VH領域のアミノ酸配列は、GFSLS SSYGMS（配列番号39）のHC DR 1、VAVIWQDGSTNYVDSVKG（配列番号40）のHC DR 2、およびAY GNYWYIDR（配列番号35）のHC DR 3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQS SVTNDVA（配列番号36）のLC DR 1、YAYHRFT（配列番号37）のLC DR 2、およびHQA YSSSPYT（配列番号38）のLC DR 3を含み、

（c）VH領域のアミノ酸配列は、GFTFSSSYGMS（配列番号33）のHC DR 1、VANIWQDGSEKYVDSVKG（配列番号41）のHC DR 2、およびAY GNYWYIDR（配列番号35）のHC DR 3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQS SVTNDVA（配列番号36）のLC DR 1、YAYHRFT（配列番号37）のLC DR 2、およびHQA YSSSPYT（配列番号38）のLC DR 3を含み、

20

（d）VH領域のアミノ酸配列は、GFSFSSSYGMH（配列番号42）のHC DR 1、VANIWQDGSTNYVDSVKG（配列番号43）のHC DR 2、およびAY GNYWYIDR（配列番号35）のHC DR 3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VSN DVA（配列番号44）のLC DR 1、YASHRFT（配列番号45）のLC DR 2、およびHQA YSTPYT（配列番号46）のLC DR 3を含み、

（e）VH領域のアミノ酸配列は、GFSF TSYGMS（配列番号47）のHC DR 1、LANIWQDGSTNYVDSVKG（配列番号48）のHC DR 2、およびAY GNYWYIDR（配列番号35）のHC DR 3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VSN DVA（配列番号44）のLC DR 1、YASHRFT（配列番号45）のLC DR 2、およびHQA YSTPYT（配列番号46）のLC DR 3を含み、

30

（f）VH領域のアミノ酸配列は、GFTFSSSYGVH（配列番号49）のHC DR 1、VGVIWQDGSENYVDSVKG（配列番号50）のHC DR 2、およびAY GNYWYIDR（配列番号35）のHC DR 3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VSN DLA（配列番号51）のLC DR 1、YASHRFT（配列番号45）のLC DR 2、およびQQA YSTPYT（配列番号52）のLC DR 3を含み、

40

（g）VH領域のアミノ酸配列は、GFSFSSSYGMH（配列番号42）のHC DR 1、VANIWQDGSTNYVDSVKG（配列番号43）のHC DR 2、およびAY GNYWYIDR（配列番号35）のHC DR 3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VSN DVA（配列番号44）のLC DR 1、YASHRFT（配列番号45）のLC DR 2、およびHQA YSTPYT（配列番号46）のLC DR 3を含み、

（h）VH領域のアミノ酸配列は、GFSFSSSYGMH（配列番号42）のHC DR 1、LANIWQDGSENYVDSVKG（配列番号53）のHC DR 2、およびAY GNYWYIDR（配列番号35）のHC DR 3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VSN DVA（配列番号44）のLC DR 1、YASHRFT（配列番号

50

号45)のLCDR2、およびQQAYSTPYT(配列番号52)のLCDR3を含み、

(i) VH領域のアミノ酸配列は、GFTLSSYGMH(配列番号54)のHCDR1、LAVIWADGSTNYVDSVKG(配列番号55)のHCDR2、およびAYGNMYIDV(配列番号56)のHCDR3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQSVSNDVA(配列番号44)のLCDR1、YASHRFT(配列番号45)のLCDR2、およびHQAYSTPYT(配列番号46)のLCDR3を含み、

(j) VH領域のアミノ酸配列は、GFTFSSYGMH(配列番号57)のHCDR1、VGVIKQDGSENYVDSVKG(配列番号58)のHCDR2、およびAYGNWYIDR(配列番号35)のHCDR3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQSVSNDVA(配列番号44)のLCDR1、YASHRFT(配列番号45)のLCDR2、およびHQAYSTPYT(配列番号46)のLCDR3を含み、または、

(k) VH領域のアミノ酸配列は、GFSFTSYGMH(配列番号59)のHCDR1、VGVIWQDGSTNYVDSVKG(配列番号60)のHCDR2、およびGYGNWYIDV(配列番号61)のHCDR3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQSVSNDLA(配列番号51)のLCDR1、YASHRFT(配列番号45)のLCDR2、およびQQAYSTPYT(配列番号52)のLCDR3を含む、抗PD1抗体またはその抗原結合部分。

【請求項2】

(a) 前記VH領域のアミノ酸配列は、配列番号1を含み、かつ、前記VL領域のアミノ酸配列は、配列番号2を含み、

(b) 前記VH領域のアミノ酸配列は、配列番号3を含み、かつ、前記VL領域のアミノ酸配列は、配列番号4を含み、

(c) 前記VH領域のアミノ酸配列は、配列番号5を含み、かつ、前記VL領域のアミノ酸配列は、配列番号6を含み、または

(d) 前記VH領域のアミノ酸配列は、配列番号7を含み、かつ、前記VL領域のアミノ酸配列は、配列番号8を含む、請求項1記載の抗体またはその抗原結合部分。

【請求項3】

抗PD1抗体またはその抗原結合部分であって、当該抗体は、HCDR1、HCDR2およびHCDR3を含有する重鎖可変(VH)領域、ならびにLCDR1、LCDR2およびLCDR3を含有する軽鎖可変(VL)領域を含有し、

(a) HCDR1は、アミノ酸配列G-F-X₁-X₂-X₃-S-Y-X₄-X₅-X₆を含み、式中、X₁はTまたはTの保存的置換であり、X₂はFまたはFの保存的置換であり、X₃はSまたはSの保存的置換であり、X₄はGまたは任意の他のアミノ酸であり、X₅はMまたはMの保存的置換であり、またX₆はSまたは任意の他のアミノ酸であり(配列番号20)、

(b) HCDR2は、アミノ酸配列X₁-X₂-X₃-I-X₄-X₅-X₆-G-S-X₇-X₈-Y-X₉-D-S-V-K-Gを含み、式中、X₁はVまたはVの保存的置換であり、X₂はAまたはAの保存的置換であり、X₃はVまたはNであり、X₄はWまたはKであり、X₅はQまたはAであり、X₆はDまたはGであり、X₇はTまたはEであり、X₈はN、KまたはSであり、またX₉はNまたはVであり(配列番号21)、

(c) HCDR3は、アミノ酸配列X₁-X₂-G-X₃-X₄-X₅-Y-X₆-X₇-X₈を含み、式中、X₁はAまたは任意の他のアミノ酸であり、X₂はYまたはYの保存的置換であり、X₃はNまたは任意の他のアミノ酸であり、X₄はYまたはYの保存的置換であり、X₅はWまたは任意の他のアミノ酸であり、X₆はIまたは任意の他のアミノ酸であり、X₇はDまたはDの保存的置換であり、またX₈はVまたは任意の他のアミノ酸であり(配列番号22)、

(d) LCDR1は、アミノ酸配列K-S-S-X₁-S-V-X₂-N-D-X₃-

Aを含み、式中、 X_1 はQまたはEであり、 X_2 はSまたはSの保存的置換であり、また X_3 はLまたはLの保存的置換であり（配列番号26）、

（e）LCDR2は、アミノ酸配列 $Y-A-X_1-X_2-R-F-X_3$ を含み、式中、 X_1 はFまたは任意の他のアミノ酸であり、 X_2 はHまたは任意の他のアミノ酸であり、また X_3 はSまたはSの保存的置換であり（配列番号27）、

（f）LCDR3は、アミノ酸配列 $X_1-Q-X_2-Y-S-X_3-P-X_4-T$ を含み、式中、 X_1 はQまたは任意の他のアミノ酸であり、 X_2 はAまたは任意の他のアミノ酸であり、 X_3 はTまたは任意の他のアミノ酸であり、また X_4 はYまたは任意の他のアミノ酸である（配列番号28）、抗PD1抗体またはその抗原結合部分。

【請求項4】

10

抗PD1抗体またはその抗原結合部分であって、当該抗体または抗原結合部分は、PD1への結合を、請求項1から3のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分と交差競合し、ならびに

（a）完全生殖細胞系列ヒトフレームワークアミノ酸配列を含有し、および／または

（b）ヒトPD1およびカニクイザルPD1に対して特異的に結合し、および／または

（c）LCDR2中に酸化部位を含有せず、および／または

（d）VHドメインのHCDR2／フレームワーク3領域中に、高いMHCクラスII結合アフィニティをもつヒト生殖細胞ペプチド配列を含有し、および／または

（e）VHドメインのHCDR1／フレームワーク2領域中にヒトT細胞エピトープ配列を含有せず、および／または

20

（f）VHドメインのHCDR3／フレームワーク4領域中にヒトT細胞エピトープ配列を含有せず、および／または

（g）IgG1エフェクターヌル抗体形式のときに、抗体Hu317と比較して、低い電荷種の不均一性を示す、抗PD1抗体またはその抗原結合部分。

【請求項5】

前記抗体が、ヒト抗体、ヒト化抗体またはキメラ抗体である、請求項1から4のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項6】

前記VH領域、前記VL領域、または前記VH領域と前記VL領域との両方は、1つまたは複数のヒトフレームワーク領域のアミノ酸配列を含有する、請求項1から5のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分。

30

【請求項7】

前記VH領域、前記VL領域、または前記VH領域と前記VL領域との両方は、前記CDRが挿入されたヒト可変領域フレームワークスキャホールドのアミノ酸配列を含有する、請求項1から6のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項8】

前記VH領域は、前記HCDR1、HCDR2、およびHCDR3のアミノ酸配列が挿入されたIGHV3-7ヒト生殖細胞系列スキャホールドのアミノ酸配列を含有する、請求項1または3に記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項9】

40

前記VL領域は、前記LCDR1、LCDR2、およびLCDR3のアミノ酸配列が挿入されたIGKV4-1ヒト生殖細胞系列スキャホールドのアミノ酸配列を含有する、請求項1、3および8のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項10】

前記抗体は、免疫グロブリン定常領域を含有する、請求項1から9のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項11】

前記免疫グロブリン定常領域は、IgG、IgE、IgM、IgD、IgAまたはIgYである、請求項10に記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項12】

50

前記免疫グロブリン定常領域は、I g G 1、I g G 2、I g G 3、I g G 4、I g A 1 または I g A 2 である、請求項 1 1 に記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項 1 3】

前記免疫グロブリン定常領域は、免疫学的に不活性である、請求項 1 0 記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項 1 4】

前記免疫グロブリン定常領域は、野生型ヒト I g G 4 定常領域、S 2 2 8 P のアミノ酸置換を含有するヒト I g G 4 定常領域、野生型ヒト I g G 1 定常領域、L 2 3 4 A、L 2 3 5 A および G 2 3 7 A のアミノ酸置換を含有するヒト I g G 1 定常領域である、または野生型ヒト I g G 2 定常領域である、請求項 1 0 記載の抗体または抗原結合部分。

10

【請求項 1 5】

前記免疫グロブリン定常領域は、配列番号 9 から 1 5 のいずれか 1 つを含有する、請求項 1 3 記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項 1 6】

前記抗体または抗原結合部分は、F a b、F a b'、F (a b')₂、F d、F v、s c F v、単ドメイン抗体 (d A b)、マキシボディ、ミニボディ、イントラボディ、ダイアボディ、トリアボディ、テトラボディ、v-N A R、または b i s-s c F v である、請求項 1 から 1 5 のいずれか一項に記載の抗原結合部分。

【請求項 1 7】

前記抗体は、モノクローナルである、請求項 1 から 1 6 のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分。

20

【請求項 1 8】

前記抗体は、四量体抗体、四価抗体、または多特異性抗体である、請求項 1 から 1 7 のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項 1 9】

前記抗体は、第一の抗原および第二の抗原に特異的に結合する二特異性抗体であり、前記第一の抗原は P D 1 であり、前記第二の抗原は P D 1 ではない、請求項 1 から 1 8 のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分。

【請求項 2 0】

前記抗体または抗原結合部分は、(a) ヒト P D 1 に特異的に結合する、または (b) ヒト P D 1 およびカニクイザル P D 1 に特異的に結合する、請求項 1 から 1 9 のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分。

30

【請求項 2 1】

治療剤に結合された請求項 1 から 2 0 のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分を含有する免疫結合体。

【請求項 2 2】

前記治療剤が、細胞毒素、放射性同位体、化学療法剤、免疫調節剤、抗血管新生剤、抗増殖剤、アポトーシス促進剤、細胞増殖抑制酵素、細胞溶解性酵素、治療用核酸、抗血管新生剤、抗増殖剤、またはアポトーシス促進剤である、請求項 2 1 記載の免疫結合体。

【請求項 2 3】

請求項 1 から 2 0 のいずれか一項に記載の抗体もしくは抗原結合部分、または請求項 2 1 もしくは 2 2 に記載の免疫結合体、および薬学的に許容可能な担体、希釈剤または賦形剤を含有する、医薬組成物。

40

【請求項 2 4】

核酸分子であって、請求項 1 から 2 0 のいずれか一項に記載の抗体または抗原結合部分の

(a) V H 領域のアミノ酸配列、

(b) V L 領域のアミノ酸配列、または

(c) V H 領域および V L 領域の両方のアミノ酸配列、をコードする核酸分子。

【請求項 2 5】

50

請求項 24 に記載の核酸分子を含有する発現ベクター。

【請求項 26】

請求項 24 に記載の核酸分子、または請求項 25 に記載の発現ベクターを含有する組換え宿主細胞。

【請求項 27】

抗 PD1 抗体またはその抗原結合部分を作製する方法であって、

前記核酸分子が発現される条件下で、請求項 25 に記載の発現ベクターを含有する組換え宿主細胞を培養し、それにより抗体または抗原結合部分を作製することと、および

当該宿主細胞または培養物から、前記抗体または抗原結合部分を単離することと、を含む、方法。

10

【請求項 28】

対象において、免疫反応を強化する方法であって、請求項 1 から 20 のいずれか一項に記載の抗体もしくは抗原結合部分の、請求項 21 もしくは 22 に記載の免疫結合体の、または請求項 23 に記載の医薬組成物の治療有効量を前記対象に投与することを含む、方法。

【請求項 29】

対象において、癌、感染症もしくは免疫性疾患を治療または予防する方法であって、請求項 1 から 20 のいずれか一項に記載の抗体もしくは抗原結合部分の、請求項 21 もしくは 22 に記載の免疫結合体の、または請求項 23 に記載の医薬組成物の治療有効量を前記対象に投与することを含む、方法。

20

【請求項 30】

前記癌が、膵臓癌、メラノーマ、乳癌、肺癌、気管支癌、結腸直腸癌、前立腺癌、胃癌、卵巣癌、膀胱癌、脳腫瘍または中枢神経系の癌、末梢神経系の癌、食道癌、子宮頸癌、子宮癌または子宮内膜癌、口腔または咽頭の癌、肝癌、腎癌、精巣癌、胆管癌、小腸癌または虫垂癌、唾液腺癌、甲状腺癌、副腎癌、骨肉腫、軟骨肉腫、または血液組織の癌である、請求項 29 記載の方法。

【請求項 31】

前記感染症が、ウイルス性、細菌性、真菌性、または寄生虫性である、請求項 29 記載の方法。

【請求項 32】

前記感染症が、ヒト免疫不全ウイルス (HIV) 感染症である、請求項 29 記載の方法。

30

【請求項 33】

癌、感染症、または免疫性疾患の治療における使用のための、請求項 1 から 20 のいずれか一項に記載の抗体もしくは抗原結合部分、請求項 21 もしくは 22 に記載の免疫結合体、または請求項 23 に記載の医薬組成物。

【請求項 34】

前記癌が、膵臓癌、メラノーマ、乳癌、肺癌、気管支癌、結腸直腸癌、前立腺癌、胃癌、卵巣癌、膀胱癌、脳腫瘍または中枢神経系の癌、末梢神経系の癌、食道癌、子宮頸癌、子宮癌または子宮内膜癌、口腔または咽頭の癌、肝癌、腎癌、精巣癌、胆管癌、小腸癌または虫垂癌、唾液腺癌、甲状腺癌、副腎癌、骨肉腫、軟骨肉腫、または血液組織の癌である、請求項 33 に記載の使用のための抗体もしくは抗原結合部分、免疫結合体、または医薬組成物。

40

【請求項 35】

前記感染症が、ウイルス性、細菌性、真菌性、または寄生虫性である、請求項 33 に記載の使用のための抗体もしくは抗原結合部分、免疫結合体、または医薬組成物。

【請求項 36】

前記感染症が、ヒト免疫不全ウイルス (HIV) 感染症である、請求項 33 に記載の使用のための抗体もしくは抗原結合部分、免疫結合体、または医薬組成物。

【請求項 37】

50

医薬品としての使用のための、請求項 1 から 20 のいずれか一項に記載の抗体もしくは抗原結合部分、請求項 21 または 22 に記載の免疫結合体、または請求項 23 に記載の医薬組成物。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願の相互参照

本出願は、2018年8月16日に出願された英国特許出願第1813405.6号明細書、および2018年3月8日に出願された英国特許出願第1803746.5号明細書の利益を主張するものであり、それら各開示内容は、その全体で参照により本明細書に援用される。

10

【0002】

電子的に提出されるテキストファイルに関する説明

本明細書とともに電子的に提出される以下のテキストファイルの内容は、その全体で参照により本明細書に援用される：コンピューター読み取り可能な形式の配列表のコピー（ファイルの名称：ULNL_001_00WO_Seqlist_ST25.txt、データ記録日：2019年3月7日、ファイルサイズは153,562バイト）。

【0003】

本発明は、PD1（プログラム細胞死1、PDCD1、CD279、PD-1、SLEB2、PD-1、SLE1としても知られる）に特異的に結合する抗体分子およびその医療用途に関する。

20

【背景技術】

【0004】

PD1は免疫グロブリンスーパーファミリーのメンバーである細胞表面受容体であり、主にT細胞上で発現するが、プロB細胞上では観察されない、細胞表面受容体である。PD1は2つの公知のリガンド、PD-L1およびPD-L2を結合する。これらリガンドとT細胞上のPD1との相互作用により、T細胞炎症活性が下方制御されるが、これが免疫自己寛容を促進する。したがって、PD1は免疫「チェックポイント」であると説明されている。このチェックポイント活性は、自己抗原に反応するリンパ節常在性T細胞においてアポトーシス（プログラム細胞死）を促進することによって、自己免疫リスクを最小化することが実証されている。重要なことには、PD1ライゲーションもまた、制御性（抗炎症性）T細胞の生存を促進する。

30

【0005】

非病的状態におけるPD1/PD-L1（2）結合の役割は、自己寛容に重要であるが、それはまた、それによって腫瘍細胞が免疫監視の間に「外来性」として特定されることを免れる重要な機序でもある。実際にPD-L1は、数種の癌において高度に発現されることが示されている。したがってPD1を標的とし、またその機能に拮抗するモノクローナル抗体は、高PD-L1発現を伴うおよび／または高レベルの変異が現れる、悪性細胞に対する免疫反応を後押しすることによって、癌治療の際に有意な潜在的価値があるものとなり得る。数多くの前臨床のエビデンスおよび臨床のエビデンスが、PD1/PD-L1結合を遮断することが、T細胞の抗腫瘍活性を促進して、また血液悪性腫瘍および固形悪性腫瘍の両方の成長を阻害することが可能であるということを示唆する。PD1/PD-L1活性はまた、例えばHIV等である慢性疾患で誘導され得るため、抗PD1アンタゴニスト抗体もまた、感染症環境において治療的価値を有し得る。ゆえに、アンタゴニスト性の抗PD1 mAbは、癌、免疫疾患および感染症の環境において免疫治療剤として作用し、現在確立されている治療法の有効性を増幅させる可能性を有している。

40

【0006】

現在承認されている抗体治療剤の大部分は、免疫化されたげっ歯類に由来する。そうした抗体の多くが、マウスCDRのヒトV-遺伝子フレームワーク配列への「移植」を介し

50

た、「ヒト化」として知られるプロセスを経ている (Nelson et al., 2010, Nat Rev Drug Discov 9:767-774を参照のこと)。このプロセスは多くの場合、不正確であり、得られた抗体の標的結合アフィニティの低下が生じる。元の抗体の結合アフィニティに戻すために、通常、移植されたvドメインの可変ドメインフレームワーク中の重要な位置にマウス残基が導入される(「復帰突然変異(back-mutation)」としても知られる)。

【0007】

CDR移植および復帰突然変異によりヒト化された抗体は臨床において、完全マウスvドメインによるものと比較して低い免疫反応率を誘導することが示されているが、この基礎的な移植法を使用してヒト化された抗体は、物理的に不安定である可能性があり、移植CDRループ内に免疫原性モチーフがまだ保存されていることから、いまだ重大な臨床開発リスクを負っている。免疫細胞上の受容体を標的とし、その薬理学的な機能によって免疫反応が刺激される、例えばPD1阻害剤などの抗体は、抗薬剤抗体反応を誘発するリスクを高める。患者のそうした抗薬剤抗体反応は、臨床使用における薬剤の半減期、有効性および安全性も低下させ得る。タンパク質の免疫原性に関する動物実験は、ヒトでの免疫反応の予測とはならないことが多く、治療用途の抗体操作は、予測されるヒトT細胞エピトープ含量、非ヒト生殖細胞系列アミノ酸含量、および精製タンパク質が凝集してしまう可能性を最小化することに焦点が置かれている。

【0008】

ゆえに理想的なヒト化アゴニスト性抗PD1抗体は、vドメイン中に、詳細に特徴解析されたヒト生殖細胞系列配列のフレームワークとCDRの両方に存在する残基と同一の残基を可能な限り多く有している抗体である。Townsendら(2015; PNAS 112:15354-15359)は、抗体の作製方法を記載しており、当該方法においてラット抗体、ウサギ抗体およびマウス抗体に由来するCDRは、好ましいヒトフレームワーク内に移植され、次いで「拡張バイナリー置換(augmented binary substitution)」と呼ばれるヒト生殖細胞系列化(human germ-lining)方法が行われた。この方法は、元の抗体のパラトープにおいては基礎的な柔軟性を示したが、研究者らが正確性の高い抗体-抗原の共結晶構造データを有している場合であっても、任意の所与の抗体のCDRループ中のどの個々の残基がどの組み合わせでヒト生殖細胞系列に転換され得るかを確実に予測することは未だ不可能である。さらにTownsendらの研究では、ヒト生殖細胞系列中に存在する残基を超えた、開発リスクモチーフの除去が有益となる可能性がある位置に突然変異誘導を加えることには対処していない。これは技術の限界であり、この限界によってプロセスが本質的に非効率となり、開始抗体配列を改変する余剰な段階が必要となる。さらに現時点では、個々のvドメインのタンパク質配列で離れた位置にある改変のいずれが、リスクモチーフを排除しながら、抗原結合のアフィニティと特異性の維持を促進し得るのかは、たとえパートナーvドメイン上であったとしても正確に予測することはできない。

【0009】

このようにCDRの生殖細胞系列化および開発クオリティの最適化は複雑で多因子的な課題であるため、本例においては以下をはじめとする複合的な分子の機能特性が維持されるまたは改善されることが好ましい：標的結合特異性、PD1/PD-L1シグナル伝達アンタゴニズム、高い正確性の前臨床安全性試験を容易にする限り類似する必要があるヒトおよび実験動物種(例えば cynomolgus monkey、すなわち Macaca fascicularis)の両方に由来するPD1に対するアフィニティ、vドメインの生物物理的安定性、ならびに/または製造目的に最適である必要があるIgG発現収率。抗体操作実験から、重要なCDR中のたった1つの残基位置での突然変異であっても、これら望ましい分子特性のすべてに対し劇的な負の影響を与え得ることが示されている。

【0010】

国際公開第2015/035606A1号は、「Mu317」と名づけられたアンタゴ

10

20

30

40

50

ニスト性マウス抗PD1 IgG分子、ならびに「Mu317(hu317と表す)」のヒト化型の調製を記載している。そのMu317のヒト化型は、古典的なヒト化技術、すなわちKabatt規定のマウスCDRをヒトの重鎖および軽鎖のフレームワーク配列に移植することにより作製されており、ヒトフレームワーク残基の一部は、対応する位置のMu317マウス残基に復帰突然変異されている可能性がある。上述の理由によって、国際公開第2015/035606A1号に記載されるMu317のヒト化型は理想的ではない。

【発明の概要】

【0011】

本発明は、多くの抗PD1抗体、およびその医療用途を提供する。

10

【0012】

本発明の1つの態様によると、ヒトPD1に、および任意でカニクイザルPD1にも特異的に結合する抗体分子、またはその抗原結合部分が提供され、当該抗体分子または抗原結合部分は、

以下の順序で配列中にアミノ酸を有するHCDR1：G-F-TまたはT（例えばS）-Fの保存的置換またはF（例えばL）-Sの保存的置換またはS（例えばT）-S-Y-Gの保存的置換または任意のアミノ酸（例えばW）-MまたはM（例えばV）-Sの保存的置換または任意のアミノ酸（例えばH）（配列番号20）と、

以下の順序で配列中にアミノ酸を有するHCDR2：VまたはV（例えばL）-Aの保存的置換またはA（例えばG）-V/N-I-W/K-Q/A-D/G-G-S-T/E-N/K/S-Y-N/V-D-S-V-K-Gの保存的置換（配列番号21）と、

20

以下の順序で配列中にアミノ酸を有するHCDR3：Aまたは任意のアミノ酸（例えばD/E/G/H/I/K/L/H/Q/S/V/W）-YもしくはY（例えばF/W）-G-Nの保存的置換または任意のアミノ酸（例えばA/E/F/G/H/I/Q/R/S/T/V/W/Y）-YまたはY（例えばV/W）-Wの保存的置換または任意のアミノ酸（例えばF/H/M/P/Q/S/V）-Y-Iまたは任意のアミノ酸（例えばL/M/S/T/V/Y）-DまたはD（例えばE）-Vの保存的置換または任意のアミノ酸（例えばA/E/F/G/H/I/K/L/M/R/S/T/W/Y）（配列番号22）と、を伴う重鎖可変領域を含む。

【0013】

30

本発明の態様において、抗体分子もしくは抗原結合部分のHCDR1は、配列GFSLTSYGVH（配列番号23、国際公開第2015/035606A1号、米国特許出願公開第2015/079109A1号に開示されるMu317マウス/ヒト化抗体のHCDR1）、VIWAGGSTNYNSALMS（配列番号24、国際公開第2015/035606A1号、米国特許出願公開第2015/079109A1号に開示されるMu317マウス/ヒト化抗体のHCDR2）を除外してもよく、および/または抗体分子もしくは抗原結合部分のHCDR3は、配列AYGNYWYIDV（配列番号25、国際公開第2015/035606A1号、米国特許出願公開第2015/079109A1号に開示されるMu317マウス/ヒト化抗体のHCDR3）を除外してもよい。

【0014】

40

抗体分子または抗原結合部分は、

以下の順序で配列中にアミノ酸を有するLCDR1：K-S-S-Q/E-S-V-SまたはS（G/T等）-N-D-Lの保存的置換またはL（V等）-Aの保存的置換（配列番号26）と、

以下の順序で配列中にアミノ酸を有するLCDR2：Y-A-Fまたは任意のアミノ酸（例えばS）-Hまたは任意のアミノ酸（例えばP/T）-R-F-SまたはS（A/T等）の保存的置換（配列番号27）と、

以下の順序で配列中にアミノ酸を有するLCDR3：Qまたは任意のアミノ酸（例えば、H）-Q-Aまたは任意のアミノ酸（例えば、S）-Y-S-Tまたは任意のアミノ酸（例えば、N/S）-P-Yまたは任意のアミノ酸（例えば、W）-T（配列番号28）と

50

、を伴う軽鎖可変領域をさらに含んでもよい。

【0015】

本発明の態様において、抗体分子もしくは抗原結合部分のLCDR1は、配列KASQS
SVSNDVA/KSSQEVSNDA（配列番号29／配列番号30、国際公開第2
015／035606A1号、米国特許出願公開第2015／079109A1号に開示
されるMu317マウス／ヒト化抗体のLCDR1）を除外してもよく、および／または
、抗体分子もしくは抗原結合部分のLCDR2は、配列YAFHRFT（配列番号31、
国際公開第2015／035606A1号、米国特許出願公開第2015／079109
A1号に開示されるMu317マウス／ヒト化抗体のLCDR2）を除外してもよく、お
よび／または抗体分子もしくは抗原結合部分のLCDR3は、配列HQA YSSPYT（
配列番号32、国際公開第2015／035606A1号、米国特許出願公開第2015
／079109A1号に開示されるMu317マウス／ヒト化抗体のLCDR3）を除外
してもよい。

10

【0016】

一部の態様において、本明細書は、抗PD1抗体またはその抗原結合部分を開示するも
のであり、当該抗体は、HC DR1、HC DR2およびHC DR3を含有する重鎖可変（
VH）領域、ならびにLC DR1、LC DR2およびLC DR3を含有する軽鎖可変（V
L）領域を含有し、この場合において、

（a）HC DR1は、アミノ酸配列G－F－X₁－X₂－X₃－S－Y－X₄－X₅－
X₆を含み、式中、X₁はTまたはTの保存的置換であり、X₂はFまたはFの保存的置
換であり、X₃はSまたはSの保存的置換であり、X₄はGまたは任意の他のアミノ酸で
あり、X₅はMまたはMの保存的置換であり、またX₆はSまたは任意の他のアミノ酸で
あり（配列番号20）、

20

（b）HC DR2は、アミノ酸配列X₁－X₂－X₃－I－X₄－X₅－X₆－G－S
－X₇－X₈－Y－X₉－D－S－V－K－Gを含み、式中、X₁はVまたはVの保存的置
換であり、X₂はAまたはAの保存的置換であり、X₃はVまたはNであり、X₄はW
またはKであり、X₅はQまたはAであり、X₆はDまたはGであり、X₇はTまたはE
であり、X₈はN、KまたはSであり、またX₉はNまたはVであり（配列番号21）、

（c）HC DR3は、アミノ酸配列X₁－X₂－G－X₃－X₄－X₅－Y－X₆－X
₇－X₈を含み、式中、X₁はAまたは任意の他のアミノ酸であり、X₂はYまたはYの
保存的置換であり、X₃はNまたは任意の他のアミノ酸であり、X₄はYまたはYの保
存的置換であり、X₅はWまたは任意の他のアミノ酸であり、X₆はIまたは任意の他のア
ミノ酸であり、X₇はDまたはDの保存的置換であり、またX₈はVまたは任意の他のア
ミノ酸であり（配列番号22）、

30

（d）LC DR1は、アミノ酸配列K－S－S－X₁－S－V－X₂－N－D－X₃－
Aを含み、式中、X₁はQまたはEであり、X₂はSまたはSの保存的置換であり、また
X₃はLまたはLの保存的置換であり（配列番号26）、

（e）LC DR2は、アミノ酸配列Y－A－X₁－X₂－R－F－X₃を含み、式中、
X₁はFまたは任意の他のアミノ酸であり、X₂はHまたは任意の他のアミノ酸であり、
またX₃はSまたはSの保存的置換であり（配列番号27）、

40

（f）LC DR3は、アミノ酸配列X₁－Q－X₂－Y－S－X₃－P－X₄－Tを含
み、式中、X₁はQまたは任意の他のアミノ酸であり、X₂はAまたは任意の他のアミノ
酸であり、X₃はTまたは任意の他のアミノ酸であり、またX₄はYまたは任意の他のア
ミノ酸である（配列番号28）。

【0017】

一部の態様において、本発明は、抗PD1抗体またはその抗原結合部分を提供するもの
であり、当該抗体は、重鎖可変（VH）領域および軽鎖可変（VL）領域を含有し、この
場合において、

（a）VH領域のアミノ酸配列は、GFTFSSYGMS（配列番号33）のHC DR
1、VANIWQDGSTKYVDSVKG（配列番号34）のHC DR2、およびAY

50

G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V T N D V A (配列番号 36) の L C D R 1、Y A Y H R F T (配列番号 37) の L C D R 2、および H Q A Y S S P Y T (配列番号 38) の L C D R 3 を含み、

(b) V H 領域のアミノ酸配列は、G F S L S S Y G M S (配列番号 39) の H C D R 1、V A V I W Q D G S T N Y V D S V K G (配列番号 40) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V T N D V A (配列番号 36) の L C D R 1、Y A Y H R F T (配列番号 37) の L C D R 2、および H Q A Y S S P Y T (配列番号 38) の L C D R 3 を含み、

(c) V H 領域のアミノ酸配列は、G F T F S S Y G M S (配列番号 33) の H C D R 1、V A N I W Q D G S E K Y V D S V K G (配列番号 41) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V T N D V A (配列番号 36) の L C D R 1、Y A Y H R F T (配列番号 37) の L C D R 2、および H Q A Y S S P Y T (配列番号 38) の L C D R 3 を含み、

(d) V H 領域のアミノ酸配列は、G F S F S S Y G M H (配列番号 42) の H C D R 1、V A N I W Q D G S T N Y V D S V K G (配列番号 43) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V S N D V A (配列番号 44) の L C D R 1、Y A S H R F T (配列番号 45) の L C D R 2、および H Q A Y S T P Y T (配列番号 46) の L C D R 3 を含み、

(e) V H 領域のアミノ酸配列は、G F S F T S Y G M S (配列番号 47) の H C D R 1、L A N I W Q D G S T N Y V D S V K G (配列番号 48) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V S N D V A (配列番号 44) の L C D R 1、Y A S H R F T (配列番号 45) の L C D R 2、および H Q A Y S T P Y T (配列番号 46) の L C D R 3 を含み、

(f) V H 領域のアミノ酸配列は、G F T F S S Y G V H (配列番号 49) の H C D R 1、V G V I W Q D G S E N Y V D S V K G (配列番号 50) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V S N D L A (配列番号 51) の L C D R 1、Y A S H R F T (配列番号 45) の L C D R 2、および Q Q A Y S T P Y T (配列番号 52) の L C D R 3 を含み、

(g) V H 領域のアミノ酸配列は、G F S F S S Y G M H (配列番号 42) の H C D R 1、V A N I W Q D G S T N Y V D S V K G (配列番号 43) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V S N D V A (配列番号 44) の L C D R 1、Y A S H R F T (配列番号 45) の L C D R 2、および H Q A Y S T P Y T (配列番号 46) の L C D R 3 を含み、

(h) V H 領域のアミノ酸配列は、G F S F S S Y G M H (配列番号 42) の H C D R 1、L A N I W Q D G S E N Y V D S V K G (配列番号 53) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V S N D V A (配列番号 44) の L C D R 1、Y A S H R F T (配列番号 45) の L C D R 2、および Q Q A Y S T P Y T (配列番号 52) の L C D R 3 を含み、

(i) V H 領域のアミノ酸配列は、G F T L S S Y G M H (配列番号 54) の H C D R 1、L A V I W A D G S T N Y V D S V K G (配列番号 55) の H C D R 2、および A Y G N Y M Y I D V (配列番号 56) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V S N D V A (配列番号 44) の L C D R 1、Y A S H R F T (配列番号

10

20

30

40

50

号45)のLCDR2、およびHQAYSTPYT(配列番号46)のLCDR3を含み、

(j) VH領域のアミノ酸配列は、GFTFSSYGMH(配列番号57)のHCDR1、VGVIKQDGSSENYVDSVKG(配列番号58)のHCDR2、およびAYGNYWYIDR(配列番号35)のHCDR3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQSVSNDVA(配列番号44)のLCDR1、YASHRFT(配列番号45)のLCDR2、およびHQAYSTPYT(配列番号46)のLCDR3を含み、または、

(k) VH領域のアミノ酸配列は、GFSFTSYGMH(配列番号59)のHCDR1、VGVIWQDGSTNYVDSVKG(配列番号60)のHCDR2、およびGYGNYWYIDV(配列番号61)のHCDR3を含み、ならびにVL領域のアミノ酸配列は、KSSQSVSNDLA(配列番号51)のLCDR1、YASHRFT(配列番号45)のLCDR2、およびQQAYSTPYT(配列番号52)のLCDR3を含む。

10

【0018】

一部の態様において、本明細書は、抗PD1抗体またはその抗原結合部分を開示するものであり、当該抗体は、重鎖可変(VH)領域および軽鎖可変(VL)領域を含有し、この場合において、

当該VH領域のアミノ酸配列は、

(a) 配列番号33、配列番号39、配列番号42、配列番号47、配列番号49、配列番号54、配列番号57、または配列番号59のHCDR1と、

20

(b) 配列番号34、配列番号40、配列番号41、配列番号43、配列番号48、配列番号50、配列番号53、配列番号55、配列番号58、または配列番号60のHCDR2と、

(c) 配列番号35、配列番号56、または配列番号61のHCDR3とを含み、
当該VL領域のアミノ酸配列は、

(a') 配列番号36、配列番号44、または配列番号51のLCDR1と、

(b') 配列番号37または配列番号45のLCDR2と、

(c') 配列番号38、配列番号46、または配列番号52のLCDR3とを含む。

【0019】

30

一部の態様において、本発明は、抗PD1抗体またはその抗原結合部分を提供するものであり、当該抗体は、重鎖可変(VH)領域および軽鎖可変(VL)領域を含有し、この場合において、

(a) 当該VH領域のアミノ酸配列は、配列番号1を含み、かつ、当該VL領域のアミノ酸配列は、配列番号2を含み、

(b) 上記VH領域のアミノ酸配列は、配列番号3を含み、かつ、上記VL領域のアミノ酸配列は、配列番号4を含み、

(c) 上記VH領域のアミノ酸配列は、配列番号5を含み、かつ、上記VL領域のアミノ酸配列は、配列番号6を含み、または

(d) 上記VH領域のアミノ酸配列は、配列番号7を含み、かつ、上記VL領域のアミノ酸配列は、配列番号8を含む。

40

【0020】

さらに本発明により、治療剤に連結された、融合された、または結合された、本明細書に規定される抗体分子またはその抗原結合部分を含有する免疫結合体が提供される。

【0021】

別の態様において、本発明は、本明細書に規定される抗体分子またはその抗原結合部分をコードする核酸分子を提供する。

【0022】

さらに、本発明の核酸分子を含有するベクターが提供される。

【0023】

50

また、本明細書に規定される本発明の核酸分子またはベクターを含有する宿主細胞も提供される。

【0024】

さらなる態様において、抗PD1抗体および／またはその抗原結合部分を作製する方法も提供され、当該方法は、当該抗体および／もしくはその抗原結合部分の発現ならびに／または産生が生じる条件下で、本発明の宿主細胞を培養することと、当該宿主細胞または培養物から、当該抗体および／またはその抗原結合部分を単離することと、を含む。

【0025】

本発明の別の態様において、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分、または本明細書に規定される本発明の核酸分子、または本明細書に規定される本発明のベクターを含有する医薬組成物が提供される。

10

【0026】

さらに、対象において免疫反応を強化する方法が提供され、当該方法は、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分の有効量、または本明細書に規定される本発明の免疫結合体の有効量、または本明細書に規定される本発明の核酸分子の有効量、または本明細書に規定される本発明のベクターの有効量、または本明細書に規定される本発明の医薬組成物の有効量を投与することを含む。

【0027】

さらなる態様において、対象において癌を治療または予防する方法が提供され、当該方法は、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分の有効量、または本明細書に規定される本発明の免疫結合体の有効量、または本明細書に規定される本発明の核酸分子の有効量、または本明細書に規定される本発明のベクターの有効量、または本明細書に規定される本発明の医薬組成物の有効量を投与することを含む。

20

【0028】

さらに、医薬品としての使用のための、本明細書に規定される抗体分子もしくはその抗原結合部分、または本明細書に規定される免疫結合体、または本明細書に規定される核酸分子、または本明細書に規定されるベクター、または本明細書に規定される医薬組成物が提供される。本発明はさらに、癌の治療における使用のための、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分、または本明細書に規定される本発明の免疫結合体、または本明細書に規定される本発明の核酸分子、または本明細書に規定される本発明のベクター、または本明細書に規定される本発明の医薬組成物を提供する。

30

【0029】

別の態様において、本発明は、例えば抗癌剤などの第二の治療剤と組み合わせられる併用において、別個に使用する、連続して使用する、または同時に使用するための、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分、または免疫結合体、または核酸分子、またはベクター、または治療方法を提供する。

【0030】

さらなる態様において、癌の治療のための医薬品の製造における、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分の使用、または本明細書に規定される本発明の免疫結合体の使用、または本明細書に規定される本発明の核酸分子の使用、または本明細書に規定される本発明のベクターの使用、または本明細書に規定される本発明の医薬組成物の使用が提供される。

40

【0031】

本発明はさらに、対象において感染性疾患を治療または予防する方法を提供するものであり、当該方法は、本明細書に規定される抗体分子もしくはその抗原結合部分の有効量、または本明細書に規定される免疫結合体の有効量、または本明細書に規定される核酸分子の有効量、または本明細書に規定されるベクターの有効量、または本明細書に規定される医薬組成物の有効量を投与することを含む。

【0032】

感染症は、すべての態様において、ウイルス性、細菌性、真菌性、または寄生虫性から

50

なる群から選択されてもよい。一実施形態において、感染症は、ヒト免疫不全ウイルス（H I V）感染症である。

【0033】

また、感染症の治療における使用のための、本明細書に規定される抗体分子もしくはその抗原結合部分、または本明細書に規定される免疫結合体、または本明細書に規定される核酸分子、または本明細書に規定されるベクター、または本明細書に規定される医薬組成物が提供される。

【0034】

さらに、感染症の治療のための医薬品の製造における、本明細書に規定される抗体分子もしくはその抗原結合部分の使用、または本明細書に規定される免疫結合体の使用、または本明細書に規定される核酸分子の使用、または本明細書に規定されるベクターの使用、または本明細書に規定される医薬組成物の使用が提供される。

【0035】

本発明はさらに、対象において感染症を治療または予防する方法を提供するものであり、当該方法は、本明細書に規定される抗体分子もしくはその抗原結合部分の有効量、または本明細書に規定される免疫結合体の有効量、または本明細書に規定される核酸分子の有効量、または本明細書に規定されるベクターの有効量、または本明細書に規定される医薬組成物の有効量を投与することを含む。

【0036】

本発明はさらに、ヒトPD1に特異的に結合し、および任意でカニクイザルのPD1にも特異的に結合する抗体分子、またはその抗原結合部分を作製する方法を提供するものであり、当該方法は、

（1）非ヒト源由来の抗PD1 CDRをヒトvドメインフレームワーク内に移植し、ヒト化抗PD1抗体分子またはその抗原結合部分を作製する工程、

（2）CDR中に1つまたは複数の変異を含有する当該ヒト化抗PD1抗体分子またはその抗原結合部分のクローンのライブラリーを作製する工程、

（3）ヒトPD1への結合について、および任意でカニクイザルのPD1への結合についても当該ライブラリーをスクリーニングする工程、

（4）スクリーニングする工程（3）から、ヒトPD1に特異的に結合する、および任意でカニクイザルPD1にも特異的に結合するクローンを選択する工程、ならびに

（5）ヒトPD1に特異的に結合し、および任意でカニクイザルPD1にも特異的に結合する抗体分子、またはその抗原結合部分を、工程（4）から選択されたクローンから作製する工程、を含む。

【0037】

当該方法は、工程（4）で選択されたクローンに基づき、例えば工程（4）で選択されたクローンのCDR中の特定の位置でのさらなる探索的な突然変異誘導に基づき、追加のクローンを作製して、ヒト化を強化し、および／またはヒトT細胞エпитープ含量を最小化し、および／または工程（5）で作製された抗体分子もしくはその抗原結合部分の製造特性を改善するさらなる工程を含んでもよい。

【図面の簡単な説明】

【0038】

【図1A】図1A～図1B。ヒトおよびカニクイザルのPD1－Fcタンパク質に対するライブラリー由来抗PD1 Fabの直接結合ELISAならびにHTRF競合アッセイ。複数のファージ選択ブランチからクローンが誘導された。選択ブランチにおいて、ファージ群は、ビオチン化されたヒトまたはカニクイザルのPD1タンパク質に対し各ラウンドで選択された。標準選択は、RI～RIVと番号付けされた。各選択ラウンドの後に、ライブラリー由来クローンは、ELISA（図1A）において、ヒト（huPD1）およびカニクイザル（cyPD1）の両方に対して、ペリプラズム発現したFabタンパク質としてスクリーニングされた。Fabサンプルはまた、HTRFによって、ヒトPD1上のmu317の結合エピトープに対する競合能について並行して試験した（図1B）。各

ラウンドの平均±SD値は、灰色の棒で表されている。

【図1B】同上。

【図2A】図2A～図2B。生殖細胞系列への変異に関する、CDR残基の寛容の分析。ELISA陽性の712個の固有scFvクローン群のCDRにおける、マウスアミノ酸保持頻度の図をそれぞれV_L（配列番号409～411）（図2A）ドメインおよびV_H（配列番号412～414）（図2B）ドメインについて示す。HCDR3以外では、ヒト／マウス残基の突然変異誘導の標的とされた残基のみプロットされている。X軸上のカッコ内に記載されるCDR残基は、移植に使用されたヒト生殖細胞系列（IGKV4-1およびIGHV3-7）中に存在する残基と同一である。両方の図において、75%での灰色の破線は、ヒト生殖細胞系列によるマウス残基の置換の寛容性に対するカットオフを表している。

10

【図2B】同上。

【図3A】図3A～図3B。ヒトおよびカニクイザルのPD1-Fcタンパク質への、ライブラリー由来IgG1ヌルクロンの結合に関する、直接的力価測定ELISA。Mu317、およびライブラリー由来のIgGが、ヒト（図3A）およびカニクイザル（図3B）のPD1-Fcタンパク質に対する直接結合ELISAにおいて力価測定（単位nM）された。

【図3B】同上。

【図4】図4A～図4B。ヒトPD1+CHO細胞に対するフローサイトメトリー結合。ヒトPD1を発現する、ヒト（図4A）およびカニクイザル（図4B）のCHO細胞に対する特異的な結合に関して、Mu317、リードライブラリー由来およびデザインのIgGを検証した。すべてのクローンについてヒトPD1に対して濃度依存性の結合が観察されるとともに、アイソタイプコントロールIgG1では結合は観察されなかった。非トランスフェクトCHO細胞に対して、いずれのクローンでも結合シグナルは観察されなかった。

20

【図5】図5。細胞系PD1/PD-L1アンタゴニズムアッセイ。ヒトIgG1ヌル形式での複数のリードクローンに関する、細胞表面におけるヒトPD1機能のアンタゴニズムの解析では、新規クローンすべてが、強い、濃度依存性拮抗作用を呈したことが示された。

【図6】図6A～図6C。最大限にヒト化したリードクローンMH4、MH8およびMH12対mu317およびhu317に関する、細胞形PD1/PD-L1アンタゴニズムアッセイヒトIgG1ヌル形式の複数のリードクローンに関する、ヒトPD1機能のアンタゴニズムの解析。これら解析により、showed that クローンMH4（図6A）、MH8（図6B）およびMH12（図6C）が、mu317およびhu317の両方と重複する拮抗能を呈することが示された。値は、平均±SDの誘導倍率（fold induction）として表した。

30

【図7-1】図7A～図7H。リード抗体vドメインにおける、T細胞エピトープペプチド含量。Hu317および複数のリード抗体のvドメインを、生殖細胞系列（GE）、高アフィニティ外来物（HAF）、低アフィニティ外来物（LAF）およびTCED+T細胞受容体エピトープの存在について検証した。Hu317のVHドメインおよびVLドメインの両方とも、複数の高リスクなヒトT細胞エピトープを含有し、生殖細胞系列エピトープは殆ど含有しないことが判明した。すべてのリードクローンでは、高リスクエピトープ含量は大幅に減少され、生殖細胞系列エピトープ含量は大幅に改善されていた。

40

【図7-2】同上。

【図8A】図8A～図8C。MLR細胞系PD1/PD-L1アンタゴニズムアッセイ。同種異系MLRアッセイにおけるIFN-γ産生に対する抗PD1 IgGの効果。コントロール解析（図8A）、リードクローン09C06、MH4、MH8、MH12の3点での解析（図8B）、ならびにクローンMH4、MH8およびHu317に関する複数点での解析（図8C）を示している。各場合において、アイソタイプコントロールを用いた（ヒトIgG4またはIgG1）。

50

【図 8 B】同上。

【図 8 C】同上。

【図 9】図 9。精製 I g G の電荷バリエーションプロファイル。(1) 09C06、(2) MH4、(3) MH8、(4) MH12 および (5) Hu317 を示している。Y 軸はのシグナルは、発光単位で測定した。

【図 10】図 10。精製した I g G の D S C サーモグラム。(1) 09C06、(2) MH4、(3) MH8、(4) MH12 および (5) Hu317 を示している。

【図 11】図 11。PD1 または可能性のある非特異的 (off-target) 結合タンパク質でトランスフェクトした HEK293 細胞に対する Hu317、リード、およびコントロールの I g G のフローサイトメトリー結合結合特異性の解析は、ヒト PD1、ヒト BTN2A1、ヒト LSAMP、ヒト CD20 または ZS グリーンマーカーのみのいずれかをコードしたプラスミドで一過性トランスフェクトした HEK293 細胞で行った。各抗体は $2 \mu\text{g}/\text{ml}$ 濃度で染色して用い、この図において抗体ごとにヒストグラムを示した。この図の各パネルにおいて、標的結合事象を観察して (より高い AF647 シグナルに向かう不可欠なヒストグラムの全てまたは主要な部分の動きで示した)、関心のピークに名前をつけた (PD1、CD20、LSAMP)。BTN2A1 に対してはいずれの I g G でも結合シグナルは観察されなかった。

【発明を実施するための形態】

【0039】

本発明の第一の態様によると、ヒト PD1 に、およびカニクイザル PD1 にも特異的に結合する抗体分子、またはその抗原結合部分が提供され、当該抗体分子または抗原結合部分は、

以下の順序で配列中にアミノ酸を有する HCDR1 : G-F-T または T (例えば S) - F の保存的置換または F (例えば L) - S の保存的置換または S (例えば T) - S-Y-G の保存的置換または任意のアミノ酸 (例えば W) - M または M (例えば V) - S の保存的置換または任意のアミノ酸 (例えば H) (配列番号 20) と、

以下の順序で配列中にアミノ酸を有する HCDR2 : V または V (例えば L) - A の保存的置換または A (例えば G) - V/N-I-W/K-Q/A-D/G-G-S-T/E-N/K/S-Y-N/V-D-S-V-K-G の保存的置換 (配列番号 21) と、

以下の順序で配列中にアミノ酸を有する HCDR3 : A または任意のアミノ酸 (例えば D/E/G/H/I/K/L/H/Q/S/V/W) - Y もしくは Y (例えば F/W) - G-N の保存的置換または任意のアミノ酸 (例えば A/E/F/G/H/I/Q/R/S/T/V/W/Y) - Y または Y (例えば V/W) - W の保存的置換または任意のアミノ酸 (例えば F/H/M/P/Q/S/V) - Y-I または任意のアミノ酸 (例えば L/M/S/T/V/Y) - D または D (例えば E) - V の保存的置換または任意のアミノ酸 (例えば A/E/F/G/H/I/K/L/M/R/S/T/W/Y) (配列番号 22) と、を伴う重鎖可変領域を含む。

【0040】

一部の態様では、本明細書に提供される抗 PD1 抗体または抗原結合部分は、配列番号 16 または配列番号 17 を含有する、または配列番号 16 または配列番号 17 からなる、PD1 タンパク質に特異的に結合する。一部の態様では、本明細書に提供される抗 PD1 抗体または抗原結合部分は、配列番号 16 または配列番号 17 に対して、少なくとも約 90%、少なくとも約 91%、少なくとも約 92%、少なくとも約 93%、少なくとも約 94%、少なくとも約 95%、少なくとも約 96%、少なくとも約 97%、少なくとも約 98%、または少なくとも約 99% 同一であるアミノ酸配列を有する PD1 タンパク質に特異的に結合する。

【0041】

本発明の態様において、抗体分子もしくは抗原結合部分の HCDR1 は、配列 GFSLT SYGVH (配列番号 23、国際公開第 2015/035606 A1 号、米国特許出願公開第 2015/079109 A1 号) に開示される Mu317 マウス/ヒト化抗体の HC

DR1)、VIWAGGSTNYNSALMS (配列番号24、国際公開第2015/035606A1号、米国特許出願公開第2015/079109A1号に開示されるMu317マウス/ヒト化抗体のHCDR2)を除外してもよく、および/または抗体分子もしくは抗原結合部分のHCDR3は、配列AYGNYYWYIDV (配列番号25、国際公開第2015/035606A1号、米国特許出願公開第2015/079109A1号に開示されるMu317マウス/ヒト化抗体のHCDR3)を除外してもよい。

【0042】

本発明による抗体分子またはその抗原結合部分は、以下の順序で配列中にアミノ酸を有するLCDR1: K-S-S-Q/E-S-V-SまたはS(G/T等)-N-D-Lの保存的置換またはL(V等)-Aの保存的置換 (配列番号26)と、

以下の順序で配列中にアミノ酸を有するLCDR2: Y-A-Fまたは任意のアミノ酸 (例えばS/Y)-Hまたは任意のアミノ酸 (例えばP/T)-R-F-SまたはS(A/T等)の保存的置換 (配列番号27)と、

以下の順序で配列中にアミノ酸を有するLCDR3: Qまたは任意のアミノ酸 (例えば、H)-Q-Aまたは任意のアミノ酸 (例えば、S)-Y-S-Tまたは任意のアミノ酸 (例えば、N/S)-P-Yまたは任意のアミノ酸 (例えば、W)-T (配列番号28)と、を伴う軽鎖可変領域をさらに含んでもよい。

【0043】

本発明の態様において、抗体分子もしくは抗原結合部分のLCDR1は、配列KASQSVSNDVA/KSSQEVSNDA (配列番号29/配列番号30、国際公開第2015/035606A1号、米国特許出願公開第2015/079109A1号に開示されるMu317マウス/ヒト化抗体のLCDR1)を除外してもよく、および/または、抗体分子もしくは抗原結合部分のLCDR2は、配列YAFHRFT (配列番号31、国際公開第2015/035606A1号、米国特許出願公開第2015/079109A1号に開示されるMu317マウス/ヒト化抗体のLCDR2)を除外してもよく、および/または抗体分子もしくは抗原結合部分のLCDR3は、配列HQAYSSTPYT (配列番号32、国際公開第2015/035606A1号、米国特許出願公開第2015/079109A1号に開示されるMu317マウス/ヒト化抗体のLCDR3)を除外してもよい。

【0044】

一部の態様において、本明細書は、抗PD1抗体またはその抗原結合部分を開示するものであり、当該抗体は、HCDR1、HCDR2およびHCDR3を含有する重鎖可変(VH)領域、ならびにLCDR1、LCDR2およびLCDR3を含有する軽鎖可変(VL)領域を含有し、この場合において、

(a) HCDR1は、アミノ酸配列G-F-X₁-X₂-X₃-S-Y-X₄-X₅-X₆を含み、式中、X₁はTまたはTの保存的置換 (例えばS)であり、X₂はFまたはFの保存的置換 (例えばL)であり、X₃はSまたはSの保存的置換 (例えばT)であり、X₄はGまたは任意の他のアミノ酸 (例えばW)であり、X₅はMまたはMの保存的置換 (例えばV)であり、またX₆はSまたは任意の他のアミノ酸 (例えばH)であり (配列番号20)、

(b) HCDR2は、アミノ酸配列X₁-X₂-X₃-I-X₄-X₅-X₆-G-S-X₇-X₈-Y-X₉-D-S-V-K-Gを含み、式中、X₁はVまたはVの保存的置換 (例えばL)であり、X₂はAまたはAの保存的置換 (例えばG)であり、X₃はVまたはNであり、X₄はWまたはKであり、X₅はQまたはAであり、X₆はDまたはGであり、X₇はTまたはEであり、X₈はN、KまたはSであり、またX₉はNまたはVであり (配列番号21)、

(c) HCDR3は、アミノ酸配列X₁-X₂-G-X₃-X₄-X₅-Y-X₆-X₇-X₈を含み、式中、X₁はAまたは任意の他のアミノ酸 (例えばD、E、G、H、I、K、L、H、Q、S、VまたはW)であり、X₂はYまたはYの保存的置換 (例えばF

10

20

30

40

50

またはW)であり、X₃はNまたは任意の他のアミノ酸(例えばA、E、F、G、H、I、Q、R、S、T、V、WまたはY)であり、X₄はYまたはYの保存的置換(例えばVまたはW)であり、X₅はWまたは任意の他のアミノ酸(例えばF、H、M、P、Q、SまたはV)であり、X₆はIまたは任意の他のアミノ酸(例えばL、M、S、T、VまたはY)であり、X₇はDまたはDの保存的置換(例えばE)であり、またX₈はVまたは任意の他のアミノ酸(例えばA、E、F、G、H、I、K、L、M、R、S、T、WまたはY)であり(配列番号22)、

(d) L C D R 1は、アミノ酸配列K-S-S-X₁-S-V-X₂-N-D-X₃-Aを含み、式中、X₁はQまたはEであり、X₂はSまたはSの保存的置換(例えばGまたはT)であり、またX₃はLまたはLの保存的置換(例えばV)であり(配列番号26)

10

(e) L C D R 2は、アミノ酸配列Y-A-X₁-X₂-R-F-X₃を含み、式中、X₁はFまたは任意の他のアミノ酸(例えばS)であり、X₂はHまたは任意の他のアミノ酸(例えばPまたはT)であり、またX₃はSまたはSの保存的置換(例えばAまたはT)であり(配列番号27)、

(f) L C D R 3は、アミノ酸配列X₁-Q-X₂-Y-S-X₃-P-X₄-Tを含み、式中、X₁はQまたは任意の他のアミノ酸(例えばH)であり、X₂はAまたは任意の他のアミノ酸(例えばS)であり、X₃はTまたは任意の他のアミノ酸(例えばNまたはS)であり、またX₄はYまたは任意のアミノ酸(例えばW)である(配列番号28)

20

【0045】

一部の態様において、本明細書は、抗PD1抗体またはその抗原結合部分を開示するものであり、この場合において当該抗体は、アミノ末端からカルボキシ末端に向かって、FR1-HCDR1-FR2-HCDR2-FR3-HCDR3-FR4を含有する重鎖可変(VH)領域、およびアミノ末端からカルボキシ末端に向かって、FR1-LCDR1-FR2-LCDR2-FR3-LCDR3-FR4を含有する軽鎖可変(VL)領域を含有し、この場合において、HCDR1は、配列番号20であり、HCDR2は、配列番号32であり、HCDR3は、配列番号33であり、LCDR1は、配列番号26であり、LCDR2は、配列番号27であり、そしてLCDR3は、配列番号28であり、この場合において当該重鎖のFR1、FR2、FR3およびFR4のアミノ酸配列は、配列番号116(表2を参照のこと)内の重鎖のFR1、FR2、FR3およびFR4のアミノ酸配列であり、またこの場合において当該軽鎖のFR1、FR2、FR3およびFR4のアミノ酸配列は、配列番号119(表2を参照のこと)内の軽鎖のFR1、FR2、FR3およびFR4のアミノ酸配列である。

30

【0046】

本明細書に詳述されるように、本発明者らは、国際公開第2015/035606A1号、米国特許出願公開第2015/079109A1号に開示されるマウス抗PD1抗体Mu317から誘導されたCDR配列を使用し、多数の最適化された抗PD1抗体分子を作製することに初めて成功した。本明細書に記載される最適化抗体分子に改善を行うことによって、PD1アンタゴニズムアッセイにおける、ヒトPD1およびカニクイザルPD1の両方への結合特異性(最大限に正確な霊長類の毒性試験およびpk試験を容易にするため)と薬理学的効能とを妥協することなく、可変ドメインの安定性の改善、高い発現率、および/または免疫原性の可能性の低下が提供される。

40

【0047】

一部の態様において、本発明の最適化抗PD1抗体分子は、対応するマウスCDRまたはその他(例えばフレームワーク)のアミノ酸の位置で、必ずしも最大数のヒト生殖細胞系列の置換を有するとは限らない。以下の実施例の項に詳述されるように、本発明者らは、「最大限にヒト化された」抗体分子は、抗PD1結合特性および/または他の望ましい性質に関して、必ずしも「最大限に最適化」されているとは限らないことを見出した。

【0048】

50

本発明は、本明細書に記載される抗体分子またはその抗原結合部分のアミノ酸配列に対する改変を包含する。例えば本発明は、その性質に大きな影響を与えない、機能的に同等の可変領域およびCDRを含有する抗体分子およびその対応する抗原結合部分、ならびに活性および／もしくはアフィニティが強化された、および／または低下したバリエーションを包含する。例えばアミノ酸配列は、PD1に対し所望の結合アフィニティを有する抗体が得られるように変異されてもよい。1残基から数百以上の残基を含有するポリペプチドの長さの範囲のアミノ末端融合および／またはカルボキシル末端融合を含み、ならびに単一アミノ酸残基または複数のアミノ酸残基の配列間挿入を含む挿入が予期される。末端挿入の例としては、N末端メチオニル残基を有する抗体分子、またはエピトープタグに融合された抗体分子が挙げられる。抗体分子のその他の挿入バリエーションとしては、酵素またはポリペプチドの、抗体N末端または抗体C末端への融合が挙げられ、それにより血液循環中の抗体の半減期が延長される。

10

【0049】

本発明の抗体分子または抗原結合部分は、グリコシル化ポリペプチドおよび非グリコシル化ポリペプチド、ならびに他の翻訳後修飾を有するポリペプチド、例えば異なる糖類でのグリコシル化、アセチル化およびリン酸化を有するポリペプチドを含んでもよい。例えば1つまたは複数のアミノ酸残基を付加、除去または置換させ、グリコシル化部位を形成または除去させることにより、本発明の抗体分子または抗原結合部分を変異させて、当該翻訳後修飾を変化させてもよい。

【0050】

20

本発明の抗体分子または抗原結合部分は、例えば抗体中の潜在的なタンパク質分解部位を除去するアミノ酸置換により改変されてもよい。

【0051】

抗体分子またはその抗原結合部分において、HCDR1は、以下のアミノ酸配列を有してもよい：G-F-T-F-S-S-Y-G-M/V-S/H（配列番号62）；HCDR2は、以下のアミノ酸配列を有してもよい：V-A-V/N-I-W/K-Q-D-G-S-E/T-N/K-Y-V/N-D-S-V-K-G（配列番号63）；またHCDR3は、以下のアミノ酸配列を有してもよい：A/D/E/G/H/I/K/L/H/Q/S/V/W-Y/F/W-G-N/A/E/F/G/H/I/Q/R/S/T/V/W/Y-Y/V/W-W/F/H/M/P/Q/S/V-Y-I/L/M/S/T/V/Y-D/E-V/A/E/F/G/H/I/Q/R/S/T/W/Y（配列番号64）。

30

【0052】

例えば、HCDR1は、以下のアミノ酸配列を有してもよい：G-F-T-F-S-S-Y-G-M-S/H（配列番号65）；HCDR2は、以下のアミノ酸配列を有してもよい：V-A-V/N-I-W-Q-D-G-S-E/T-N/K-Y-V-D-S-V-K-G（配列番号66）；またHCDR3は、以下のアミノ酸配列を有してもよい：A/G-Y-G-N-Y-W/M-Y-I-D-R/V（配列番号67）。

【0053】

抗体分子またはその抗原結合部分において、LCDR1は、以下のアミノ酸配列を有してもよい：K-S-S-Q/E-S-V-S/G/T-N-D-L/V-A（配列番号68）；LCDR2は、アミノ酸配列Y-A-F/S/Y-H/P/T-R-F-S/T（配列番号69）を有してもよい；またLCDR3は、以下のアミノ酸配列を有してもよい：Q/H-Q-A/S-Y-S-T/N/S-P-Y-T（配列番号70）。

40

【0054】

例えば、LCDR1は、以下のアミノ酸配列を有してもよい：K-S-S-Q-S-V-S/G/T-N-D-L/V-A（配列番号71）；LCDR2は、アミノ酸配列Y-A-S/Y-H-R-F-S/T（配列番号72）を有してもよい；またLCDR3は、以下のアミノ酸配列を有してもよい：Q/H-Q-A-Y-S-T/S-P-Y-T（配列番号73）。

【0055】

50

本発明の特定の実施形態において、抗体分子または抗原結合部分は、以下を含有してもよい：

(a) アミノ酸配列

G F S F T S Y G M S (配列番号 47 ; H C D R 1)、L A N I W Q D G S T N Y V D S
V K G (配列番号 48 ; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35 ; H C D R
3)、K S S Q S V S N D V A (配列番号 44 ; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45 ; L C D R 2) および H Q A Y S T P Y T (配列番号 46 ; L C D R 3) [クロ
ン 20 C 07]、または

(b) アミノ酸配列

G F T F S S Y G V H (配列番号 49 ; H C D R 1)、V G V I W Q D G S E N Y V D S
V K G (配列番号 50 ; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35 ; H C D R
3)、K S S Q S V S N D L A (配列番号 51 ; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45 ; L C D R 2) および Q Q A Y S T P Y T (配列番号 52 ; L C D R 3) [クロ
ン 11 C 08]、

(c) アミノ酸配列

G F S F S S Y G M H (配列番号 42 ; H C D R 1)、V A N I W Q D G S T N Y V D S
V K G (配列番号 43 ; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35 ; H C D R
3)、K S S Q S V S N D V A (配列番号 44 ; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45 ; L C D R 2) および H Q A Y S T P Y T (配列番号 46 ; L C D R 3) [クロ
ン 09 C 06]、

(d) アミノ酸配列

G F S F S S Y G M H (配列番号 42 ; H C D R 1)、L A N I W Q D G S E N Y V D S
V K G (配列番号 53 ; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35 ; H C D R
3)、K S S Q S V S N D V A (配列番号 44 ; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45 ; L C D R 2) および Q Q A Y S T P Y T (配列番号 52 ; L C D R 3) [クロ
ン 17 A 12]、

(e) アミノ酸配列

G F T L S S Y G M H (配列番号 54 ; H C D R 1)、L A V I W A D G S T N Y V D S
V K G (配列番号 55 ; H C D R 2)、A Y G N Y M Y I D V (配列番号 56 ; H C D R
3)、K S S Q S V S N D V A (配列番号 44 ; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45 ; L C D R 2) および H Q A Y S T P Y T (配列番号 46 ; L C D R 3) [クロ
ン 17 D 08]、

(f) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M H (配列番号 57 ; H C D R 1)、V G V I K Q D G S E N Y V D S
V K G (配列番号 58 ; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35 ; H C D R
3)、K S S Q S V S N D V A (配列番号 44 ; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45 ; L C D R 2) および H Q A Y S T P Y T (配列番号 46 ; L C D R 3) [クロ
ン 17 G 08]、

(g) アミノ酸配列

G F S F T S Y G M H (配列番号 59 ; H C D R 1)、V G V I W Q D G S T N Y V D S
V K G (配列番号 60 ; H C D R 2)、G Y G N Y W Y I D V (配列番号 61 ; H C D R
3)、K S S Q S V S N D L A (配列番号 51 ; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45 ; L C D R 2) および Q Q A Y S T P Y T (配列番号 52 ; L C D R 3) [クロ
ン 15 D 07]、

(h) アミノ酸配列

G F S L S S Y G M S (配列番号 39 ; H C D R 1)、V A V I W Q D G S T N Y V D S
V K G (配列番号 40 ; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35 ; H C D R
3)、K S S Q S V G N D V A (配列番号 74 ; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45 ; L C D R 2) および Q Q A Y S S P Y T (配列番号 75 ; L C D R 3) [クロ
ン M H 1]、

10

20

30

40

50

(i) アミノ酸配列

G F S L S S Y G M S (配列番号 39; H C D R 1)、V A V I W Q D G S T N Y V D S
V K G (配列番号 40; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35; H C D R
3)、K S S Q S V T N D L A (配列番号 76; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45; L C D R 2) および Q Q A Y S S P Y T (配列番号 75; L C D R 3) [クロ
ンMH2]、

(j) アミノ酸配列

G F S L S S Y G M S (配列番号 39; H C D R 1)、V A V I W Q D G S T N Y V D S
V K G (配列番号 40; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35; H C D R
3)、K S S Q S V G N D L A (配列番号 77; L C D R 1)、Y A Y H R F S (配列番
号 78; L C D R 2) および Q Q A Y S S P Y T (配列番号 75; L C D R 3) [クロ
ンMH3]、

10

(k) アミノ酸配列

G F S L S S Y G M S (配列番号 39; H C D R 1)、V A V I W Q D G S T N Y V D S
V K G (配列番号 40; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35; H C D R
3)、K S S Q S V T N D V A (配列番号 36; L C D R 1)、Y A Y H R F T (配列番
号 37; L C D R 2) および H Q A Y S S P Y T (配列番号 38; L C D R 3) [クロ
ンMH4]、

(l) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 33; H C D R 1)、V A N I W Q D G S T K Y V D S
V K G (配列番号 34; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35; H C D R
3)、K S S Q S V G N D V A (配列番号 74; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45; L C D R 2) および Q Q A Y S S P Y T (配列番号 75; L C D R 3) [クロ
ンMH5]、

20

(m) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 33; H C D R 1)、V A N I W Q D G S T K Y V D S
V K G (配列番号 34; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35; H C D R
3)、K S S Q S V T N D L A (配列番号 76; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45; L C D R 2) および Q Q A Y S S P Y T (配列番号 75; L C D R 3) [クロ
ンMH6]、

30

(n) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 33; H C D R 1)、V A N I W Q D G S T K Y V D S
V K G (配列番号 34; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35; H C D R
3)、K S S Q S V G N D L A (配列番号 77; L C D R 1)、Y A Y H R F S (配列番
号 78; L C D R 2) および Q Q A Y S S P Y T (配列番号 75; L C D R 3) [クロ
ンMH7]、

(o) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 33; H C D R 1)、V A N I W Q D G S T K Y V D S
V K G (配列番号 34; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35; H C D R
3)、K S S Q S V T N D V A (配列番号 36; L C D R 1)、Y A Y H R F T (配列番
号 37; L C D R 2) および H Q A Y S S P Y T (配列番号 38; L C D R 3) [クロ
ンMH8]、

40

(p) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 33; H C D R 1)、V A N I W Q D G S E K Y V D S
V K G (配列番号 41; H C D R 2)、A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35; H C D R
3)、K S S Q S V G N D V A (配列番号 74; L C D R 1)、Y A S H R F T (配列番
号 45; L C D R 2) および Q Q A Y S S P Y T (配列番号 75; L C D R 3) [クロ
ンMH9]、

(q) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 33; H C D R 1)、V A N I W Q D G S E K Y V D S

50

V K G (配列番号 4 1 ; H C D R 2) 、 A Y G N Y W Y I D R (配列番号 3 5 ; H C D R 3) 、 K S S Q S V T N D L A (配列番号 7 6 ; L C D R 1) 、 Y A S H R F T (配列番号 4 5 ; L C D R 2) および Q Q A Y S S P Y T (配列番号 7 5 ; L C D R 3) [クローンMH10]、

(r) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 3 3 ; H C D R 1) 、 V A N I W Q D G S E K Y V D S V K G (配列番号 4 1 ; H C D R 2) 、 A Y G N Y W Y I D R (配列番号 3 5 ; H C D R 3) 、 K S S Q S V G N D L A (配列番号 7 7 ; L C D R 1) 、 Y A Y H R F S (配列番号 7 8 ; L C D R 2) および Q Q A Y S S P Y T (配列番号 7 5 ; L C D R 3) [クローンMH11]、

10

(s) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 3 3 ; H C D R 1) 、 V A N I W Q D G S E K Y V D S V K G (配列番号 4 1 ; H C D R 2) 、 A Y G N Y W Y I D R (配列番号 3 5 ; H C D R 3) 、 K S S Q S V T N D V A (配列番号 3 6 ; L C D R 1) 、 Y A Y H R F T (配列番号 3 7 ; L C D R 2) および H Q A Y S S P Y T (配列番号 3 8 ; L C D R 3) [クローンMH12]、

(t) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 3 3 ; H C D R 1) 、 V A N I W Q D G S T K Y V D S V K G (配列番号 3 4 ; H C D R 2) 、 A Y G N Y W Y I D R (配列番号 3 5 ; H C D R 3) 、 K S S Q S V T N D L A (配列番号 7 6 ; L C D R 1) 、 Y A Y H R F T (配列番号 3 7 ; L C D R 2) および H Q A Y S S P Y T (配列番号 3 8 ; L C D R 3) [クローンMH13]、

20

(u) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 3 3 ; H C D R 1) 、 V A N I W Q D G S T K Y V D S V K G (配列番号 3 4 ; H C D R 2) 、 A Y G N Y W Y I D R (配列番号 3 5 ; H C D R 3) 、 K S S Q S V T N D L A (配列番号 7 6 ; L C D R 1) 、 Y A Y H R F S (配列番号 7 8 ; L C D R 2) および H Q A Y S S P Y T (配列番号 3 8 ; L C D R 3) [クローンMH14]、

(v) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 3 3 ; H C D R 1) 、 V A N I W Q D G S T K Y V D S V K G (配列番号 3 4 ; H C D R 2) 、 A Y G N Y W Y I D R (配列番号 3 5 ; H C D R 3) 、 K S S Q S V T N D L A (配列番号 7 6 ; L C D R 1) 、 Y A S H R F S (配列番号 7 9 ; L C D R 2) および H Q A Y S S P Y T (配列番号 3 8 ; L C D R 3) [クローンMH15]、

30

(w) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 3 3 ; H C D R 1) 、 V A N I W Q D G S E K Y V D S V K G (配列番号 4 1 ; H C D R 2) 、 A Y G N Y W Y I D R (配列番号 3 5 ; H C D R 3) 、 K S S Q S V T N D L A (配列番号 7 6 ; L C D R 1) 、 Y A Y H R F T (配列番号 3 7 ; L C D R 2) および H Q A Y S S P Y T (配列番号 3 8 ; L C D R 3) [クローンMH16]、

40

(x) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 3 3 ; H C D R 1) 、 V A N I W Q D G S E K Y V D S V K G (配列番号 4 1 ; H C D R 2) 、 A Y G N Y W Y I D R (配列番号 3 5 ; H C D R 3) 、 K S S Q S V T N D L A (配列番号 7 6 ; L C D R 1) 、 Y A Y H R F S (配列番号 7 8 ; L C D R 2) および H Q A Y S S P Y T (配列番号 3 8 ; L C D R 3) [クローンMH17]、

(y) アミノ酸配列

G F T F S S Y G M S (配列番号 3 3 ; H C D R 1) 、 V A N I W Q D G S E K Y V D S V K G (配列番号 4 1 ; H C D R 2) 、 A Y G N Y W Y I D R (配列番号 3 5 ; H C D R 3) 、 K S S Q S V T N D L A (配列番号 7 6 ; L C D R 1) 、 Y A S H R F S (配列番号

50

号 79 ; L C D R 2) および H Q A Y S S P Y T (配列番号 38 ; L C D R 3) [クローン M H 18] 。

【 0056 】

一部の態様において、本発明は、抗 P D 1 抗体またはその抗原結合部分を提供するものであり、当該抗体は、重鎖可変 (V H) 領域および軽鎖可変 (V L) 領域を含有し、この場合において、

(a) V H 領域のアミノ酸配列は、 G F T F S S Y G M S (配列番号 33) の H C D R 1、 V A N I W Q D G S T K Y V D S V K G (配列番号 34) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、 K S S Q S V T N D V A (配列番号 36) の L C D R 1、 Y A Y H R F T (配列番号 37) の L C D R 2、および H Q A Y S S P Y T (配列番号 38) の L C D R 3 を含み、

10

(b) V H 領域のアミノ酸配列は、 G F S L S S Y G M S (配列番号 39) の H C D R 1、 V A V I W Q D G S T N Y V D S V K G (配列番号 40) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、 K S S Q S V T N D V A (配列番号 36) の L C D R 1、 Y A Y H R F T (配列番号 37) の L C D R 2、および H Q A Y S S P Y T (配列番号 38) の L C D R 3 を含み、

(c) V H 領域のアミノ酸配列は、 G F T F S S Y G M S (配列番号 33) の H C D R 1、 V A N I W Q D G S E K Y V D S V K G (配列番号 41) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、 K S S Q S V T N D V A (配列番号 36) の L C D R 1、 Y A Y H R F T (配列番号 37) の L C D R 2、および H Q A Y S S P Y T (配列番号 38) の L C D R 3 を含み、

20

(d) V H 領域のアミノ酸配列は、 G F S F S S Y G M H (配列番号 42) の H C D R 1、 V A N I W Q D G S T N Y V D S V K G (配列番号 43) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、 K S S Q S V S N D V A (配列番号 44) の L C D R 1、 Y A S H R F T (配列番号 45) の L C D R 2、および H Q A Y S T P Y T (配列番号 46) の L C D R 3 を含み、

30

(e) V H 領域のアミノ酸配列は、 G F S F T S Y G M S (配列番号 47) の H C D R 1、 L A N I W Q D G S T N Y V D S V K G (配列番号 48) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、 K S S Q S V S N D V A (配列番号 44) の L C D R 1、 Y A S H R F T (配列番号 45) の L C D R 2、および H Q A Y S T P Y T (配列番号 46) の L C D R 3 を含み、

(f) V H 領域のアミノ酸配列は、 G F T F S S Y G V H (配列番号 49) の H C D R 1、 V G V I W Q D G S E N Y V D S V K G (配列番号 50) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、 K S S Q S V S N D L A (配列番号 51) の L C D R 1、 Y A S H R F T (配列番号 45) の L C D R 2、および Q Q A Y S T P Y T (配列番号 52) の L C D R 3 を含み、

40

(g) V H 領域のアミノ酸配列は、 G F S F S S Y G M H (配列番号 42) の H C D R 1、 V A N I W Q D G S T N Y V D S V K G (配列番号 43) の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R (配列番号 35) の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、 K S S Q S V S N D V A (配列番号 44) の L C D R 1、 Y A S H R F T (配列番号 45) の L C D R 2、および H Q A Y S T P Y T (配列番号 46) の L C D R 3 を含み、

(h) V H 領域のアミノ酸配列は、 G F S F S S Y G M H (配列番号 42) の H C D R 1、 L A N I W Q D G S E N Y V D S V K G (配列番号 53) の H C D R 2、および A Y

50

G N Y W Y I D R（配列番号 35）の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V S N D V A（配列番号 44）の L C D R 1、Y A S H R F T（配列番号 45）の L C D R 2、および Q Q A Y S T P Y T（配列番号 52）の L C D R 3 を含み、

（i）V H 領域のアミノ酸配列は、G F T L S S Y G M H（配列番号 54）の H C D R 1、L A V I W A D G S T N Y V D S V K G（配列番号 55）の H C D R 2、および A Y G N Y M Y I D V（配列番号 56）の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V S N D V A（配列番号 44）の L C D R 1、Y A S H R F T（配列番号 45）の L C D R 2、および H Q A Y S T P Y T（配列番号 46）の L C D R 3 を含み、

（j）V H 領域のアミノ酸配列は、G F T F S S Y G M H（配列番号 57）の H C D R 1、V G V I K Q D G S E N Y V D S V K G（配列番号 58）の H C D R 2、および A Y G N Y W Y I D R（配列番号 35）の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V S N D V A（配列番号 44）の L C D R 1、Y A S H R F T（配列番号 45）の L C D R 2、および H Q A Y S T P Y T（配列番号 46）の L C D R 3 を含み、または、

（k）V H 領域のアミノ酸配列は、G F S F T S Y G M H（配列番号 59）の H C D R 1、V G V I W Q D G S T N Y V D S V K G（配列番号 60）の H C D R 2、および G Y G N Y W Y I D V（配列番号 61）の H C D R 3 を含み、ならびに V L 領域のアミノ酸配列は、K S S Q S V S N D L A（配列番号 51）の L C D R 1、Y A S H R F T（配列番号 45）の L C D R 2、および Q Q A Y S T P Y T（配列番号 52）の L C D R 3 を含む。

【0057】

一部の態様において、本明細書は、抗 P D 1 抗体またはその抗原結合部分を開示するものであり、この場合において当該抗体は、重鎖可変（V H）領域および軽鎖可変（V L）領域を含有し、この場合において当該 V H 領域は、表 9 の V H 領域アミノ酸配列のうちのいずれか 1 つを含有し、当該 V L 領域は、表 9 の V L 領域アミノ酸配列のいずれか 1 つを含有する。

【0058】

一部の態様において、本発明は、抗 P D 1 抗体またはその抗原結合部分を提供するものであり、当該抗体は、重鎖可変（V H）領域および軽鎖可変（V L）領域を含有し、この場合において、

（a）V H 領域のアミノ酸配列は、配列番号 1 を含み、かつ、V L 領域のアミノ酸配列は、配列番号 2 を含み、

（b）V H 領域のアミノ酸配列は、配列番号 3 を含み、かつ、V L 領域のアミノ酸配列は、配列番号 4 を含み、

（c）V H 領域のアミノ酸配列は、配列番号 5 を含み、かつ、V L 領域のアミノ酸配列は、配列番号 6 を含み、または

（d）V H 領域のアミノ酸配列は、配列番号 7 を含み、かつ、V L 領域のアミノ酸配列は、配列番号 8 を含む。

【0059】

一部の態様において、本明細書は、抗 P D 1 抗体またはその抗原結合部分を開示するものであり、当該抗体は、重鎖可変（V H）領域および軽鎖可変（V L）領域を含有し、この場合において、

（a）V H 領域アミノ酸配列は、配列番号 1 に対し、少なくとも約 90 %、少なくとも約 91 %、少なくとも約 92 %、少なくとも約 93 %、少なくとも約 94 %、少なくとも約 95 %、少なくとも約 96 %、少なくとも約 97 %、少なくとも約 98 %、または少なくとも約 99 % 同一であり、V L 領域アミノ酸配列は、配列番号 2 に対し、少なくとも約 90 %、少なくとも約 91 %、少なくとも約 92 %、少なくとも約 93 %、少なくとも約 94 %、少なくとも約 95 %、少なくとも約 96 %、少なくとも約 97 %、少なくとも約

10

20

30

40

50

98%、または少なくとも約99%同一である；

(b) VH領域アミノ酸配列は、配列番号3に対し、少なくとも約90%、少なくとも約91%、少なくとも約92%、少なくとも約93%、少なくとも約94%、少なくとも約95%、少なくとも約96%、少なくとも約97%、少なくとも約98%、または少なくとも約99%同一であり、VL領域アミノ酸配列は、配列番号4に対し、少なくとも約90%、少なくとも約91%、少なくとも約92%、少なくとも約93%、少なくとも約94%、少なくとも約95%、少なくとも約96%、少なくとも約97%、少なくとも約98%、または少なくとも約99%同一である；

(c) VH領域アミノ酸配列は、配列番号5に対し、少なくとも約90%、少なくとも約91%、少なくとも約92%、少なくとも約93%、少なくとも約94%、少なくとも約95%、少なくとも約96%、少なくとも約97%、少なくとも約98%、または少なくとも約99%同一であり、VL領域アミノ酸配列は、配列番号6に対し、少なくとも約90%、少なくとも約91%、少なくとも約92%、少なくとも約93%、少なくとも約94%、少なくとも約95%、少なくとも約96%、少なくとも約97%、少なくとも約98%、または少なくとも約99%同一である；または

(d) VH領域アミノ酸配列は、配列番号7に対し、少なくとも約90%、少なくとも約91%、少なくとも約92%、少なくとも約93%、少なくとも約94%、少なくとも約95%、少なくとも約96%、少なくとも約97%、少なくとも約98%、または少なくとも約99%同一であり、VL領域アミノ酸配列は、配列番号8に対し、少なくとも約90%、少なくとも約91%、少なくとも約92%、少なくとも約93%、少なくとも約94%、少なくとも約95%、少なくとも約96%、少なくとも約97%、少なくとも約98%、または少なくとも約99%同一である。一部の態様において、抗PD1抗体のCDRアミノ酸配列は、列挙される配列中のCDRアミノ酸配列に対して100%同一であるが、FRアミノ酸配列は、列挙される配列中のFRアミノ酸配列に対し、100%未満の同一性である。

【0060】

一部の態様において、本明細書に規定される抗体または抗原結合部分は、単離されてもよい。

【0061】

本明細書に規定される抗体分子または抗原結合部分は、PD1への結合を、本明細書に開示されるCDRセットを含有する抗体またはその抗原結合部分と交差競合できる。一部の実施形態において、本発明は、抗PD1抗体またはその抗原結合部分を提供するものであって、当該抗体または抗原結合部分は、本明細書に開示するCDRのセットを含む抗体または抗原結合部分と、PD1との結合に関して交差競合し、また(a)完全なヒト生殖細胞系列フレームワークのアミノ酸配列を含み、および/または(b)ヒトPD1およびカニクイザルPD1に特異的に結合し、および/または(c)LCDR2に酸化部位を含まず、および/または(d)VHドメインのHCDR2/フレームワーク3領域内に高いMHCクラスII結合アフィニティをもつヒト生殖細胞系列ペプチド配列を含み(例えばVKGRFTISR(配列番号81))、および/または(e)VHドメインのHCDR1/フレームワーク2領域内にヒトT細胞エピトープ配列を含まず、および/または(f)VHドメインのHCDR3/フレームワーク4領域内にヒトT細胞エピトープ配列を含まず、および/または(g)IgG1エフェクターヌル抗体形式であるときに、抗体Hu317と比較して低い電荷種の不均一性を示す。一部の実施形態では、抗体または抗原結合部分のKD値は、ピアコア解析により決定できる。一部の実施形態では、抗体または抗原結合部分のEC50値は、PD-1発現細胞(例えば、CHO細胞)のフローサイトメトリー染色により決定できる。

【0062】

「交差競合する」、「交差競合」、「交差遮断する」、「交差遮断される」、および「交差遮断すること」という用語は本明細書において相互交換可能に使用され、抗体またはその部分がもつ、標的PD1(例えば、ヒトPD1)に対する直接結合または本発明の抗

P D 1 抗体のアロステリック調節を介した間接的結合を干渉する能力を意味する。抗体またはその部分が、別物質による標的結合に干渉することができる度合、つまり本発明により交差遮断する、または交差競合すると言えるかどうかは、競合結合アッセイを使用して決定され得る。結合競合アッセイの一例は、H T R F 法 (H o m o g e n e o u s T i m e R e s o l v e d F l u o r e s c e n c e) である。1つの特に適した定量的交差競合アッセイは、F A C S 系またはA l p h a S c r e e n 系の方法を使用して、標識 (例えばH i s タグ化、ビオチン化、または放射性標識) された抗体またはその部分と、他の抗体またはその部分の間の、標的への結合に関する競合を測定する。概して、交差競合抗体またはその部分は、例えば、アッセイの間に、および第二の抗体またはその部分の存在下で、本発明の免疫グロブリン単一可変ドメインまたはポリペプチドの記録される変位が、所与の量で存在する潜在的に交差遮断する抗体またはその断片による、(例えばF A C S 系競合アッセイにおける) 理論上の最大変位 (例えばコールド (例えば非標識) 抗体または交差遮断されるために必要なその断片による変位) の100%以下となるように、交差競合アッセイにおいて標的に結合することとなるものである。交差競合抗体またはその部分は、10%~100%、または50%~100%の記録される変位を有することが好ましい。

10

【0063】

本明細書に規定される抗体分子または抗原結合部分は、1つまたは複数の置換、欠失および/または挿入を含んでもよく、それらにより例えばグリコシル化部位 (N結合型またはO結合型)、脱アミノ部位、リン酸化部位または異性化/断片化部位などの翻訳後修飾 (P T M : p o s t - t r a n s l a t i o n a l m o d i f i c a t i o n) 部位が除去される。

20

【0064】

350を超えるタイプのP T Mが公知である。重要なP T Mの型としては、リン酸化、グリコシル化 (N結合型およびO結合型)、S U M O 化、パルミトイル化、アセチル化、硫酸化、ミリストイル化、プレニル化、および (K 残基およびR 残基の) メチル化が挙げられる。特定のP T Mの原因となる推定アミノ酸部位を特定するための統計的手法は、当分野に周知である (Z h o u e t a l . , 2016, N a t u r e P r o t o c o l s 1 : 1318-1321を参照のこと)。例えば置換、欠失および/または挿入によりそうした部位を除去し、次いで任意で (a) 結合活性、および/または (b) P T M の消失を検証 (実験的に、および/または理論的に) することが予期される。

30

【0065】

例えば、M u 3 1 7 マウスL C D R 2 (本明細書に規定される、すなわちアミノ酸配列Y A F H R F T (配列番号31)) は、3位の残基 (F) で推定酸化部位を有すると特定されている。本発明のL C D R 2 中の同等の位置にあるこの部位を、例えば保存的置換または非保存的置換 (例えば、S またはY への) により除去することが予期される (例えばクローン09C06、ならびに表3および4の他のクローンと同様に)。

【0066】

抗体分子またはその抗原結合部分は、ヒト、ヒト化またはキメラであってもよい。

【0067】

抗体分子またはその抗原結合部分は、1つまたは複数のヒト可変ドメインフレームワークスキャホールドを含有してもよく、その中にはC D R が挿入されている。例えば、V H 領域、V L 領域、またはV H 領域およびV L 領域の両方が、1つまたは複数のヒトフレームワーク領域のアミノ酸配列を含有してもよい。

40

【0068】

抗体分子またはその抗原結合部分は、I G H V 3-7 ヒト生殖細胞系列スキャホールドを含有してもよく、その中には対応するH C D R 配列が挿入されている。抗体分子またはその抗原結合部分は、I G H V 3-7 ヒト生殖細胞系列スキャホールドのアミノ酸配列を含有するV H 領域を含有してもよく、その中には対応するH C D R 1、H C D R 2、およびH C D R 3 のアミノ酸配列のセットが挿入されている。

50

【0069】

抗体分子またはその抗原結合部分は、I G K V 4-1 ヒト生殖細胞系列スキャホールドを含有してもよく、その中には対応するL C D R配列が挿入されている。抗体分子またはその抗原結合部分は、I G K V 4-1 ヒト生殖細胞系列スキャホールドのアミノ酸配列を含有するV L領域を含有してもよく、その中には対応するL C D R 1、L C D R 2、およびL C D R 3のアミノ酸配列のセットが挿入されている。

【0070】

抗体分子またはその抗原結合部分は、中に対応するH C D R配列が挿入されているI G H V 3-7 ヒト生殖細胞系列スキャホールドと、中に対応するL C D R配列が挿入されているI G K V 4-1 ヒト生殖細胞系列スキャホールドとを含有してもよい。抗体分子またはその抗原結合部分は、中に対応するH C D R 1、H C D R 2、およびH C D R 3のアミノ酸配列のセットが挿入されているI G H V 3-7 ヒト生殖細胞系列スキャホールドのアミノ酸配列を含有するV H領域と、中に対応するL C D R 1、L C D R 2、およびL C D R 3のアミノ酸配列のセットが挿入されているI G K V 4-1 ヒト生殖細胞系列スキャホールドのアミノ酸配列を含有するV L領域とを含有してもよい。H C D R 1、H C D R 2、H C D R 3、L C D R 1、L C D R 2およびL C D R 3のアミノ酸配列は、表4のクローンのいずれか1つのH C D R 1、H C D R 2、H C D R 3、L C D R 1、L C D R 2およびL C D R 3のアミノ酸配列であってもよい（6つすべてのC D R配列が、同じクローン由来である）。

【0071】

一部の態様では、抗体分子またはその抗原結合部分は、免疫グロブリン定常領域を含有してもよい。一部の実施形態では、免疫グロブリン定常領域は、I g G 1、I g G 2、I g G 3、I g G 4、I g A 1またはI g A 2である。追加的な実施形態では、免疫グロブリン定常領域は、I g G 1、I g G 2、I g G 3、I g G 4、I g A 1またはI g A 2である。抗体分子またはその抗原結合部分は、免疫学的に不活性な定常領域を含有してもよい。一部の態様では、抗P D 1抗体またはその抗原結合部分は、野生型ヒトI g G 1定常領域か、L 2 3 4 A、L 2 3 5 A、およびG 2 3 7 Aのアミノ酸置換を含有するヒトI g G 1定常領域か、またはL 2 3 4 A、L 2 3 5 A、G 2 3 7 AおよびP 3 3 1 Sのアミノ酸置換を含有するヒトI g G 1定常領域かを含有する免疫グロブリン定常領域を含有してもよい。一部の態様では、抗P D 1抗体またはその抗原結合部分は、野生型ヒトI g G 2定常領域または野生型ヒトI g G 4定常領域を含有する、免疫グロブリン定常領域を含有してもよい。一部の態様では、抗P D 1抗体は、表10のアミノ酸配列のうちのいずれか1つを含有する免疫グロブリン定常領域を含有してもよい。表10のF c領域配列は、C H 1ドメインから始まる。一部の態様では、抗P D 1抗体は、ヒトI g G 4、ヒトI g G 4（S 2 2 8 P）、ヒトI g G 2、ヒトI g G 1、ヒトI g G 1-3 MまたはヒトI g G 1-4 MのF c領域のアミノ酸配列を含有する免疫グロブリン定常領域を含有してもよい。例えば、ヒトI g G 4（S 2 2 8 P）のF c領域は、野生型のヒトI g G 4のF c領域と比較して以下の置換を含有する：S 2 2 8 P。例えば、ヒトI g G 1-3 MのF c領域は、野生型のヒトI g G 1のF c領域と比較して以下の置換を含有する：L 2 3 4 A、L 2 3 5 AおよびG 2 3 7 A。一方で、ヒトI g G 1-4 MのF c領域は、野生型のヒトI g G 1のF c領域と比較して以下の置換を含有する：L 2 3 4 A、L 2 3 5 A、G 2 3 7 AおよびP 3 3 1 S。一部の態様では、免疫グロブリン分子の定常領域中のアミノ酸残基の位置は、E Uの命名法（W a r d e t a l . , 1 9 9 5 T h e r a p . I m m u n o l . 2 : 7 7 - 9 4）に従って番号付けされる。一部の態様では、免疫グロブリン定常領域は、R D E L T（配列番号18）モチーフ、またはR E E M（配列番号19）モチーフ（表18の下線部分）を含有してもよい。R E E M（配列番号19）アロタイプは、R D E L T（配列番号18）アロタイプよりも少ないヒト集団に存在する。一部の態様では、抗P D 1抗体は、配列番号9~15のいずれか1つを含有する免疫グロブリン定常領域を含有してもよい。一部の態様では、抗P D 1抗体は、表4のクローンのいずれか1つの6つのC D Rアミノ酸配列、および表10のF c領域アミノ酸配列のいずれか1つを含有

10

20

30

40

50

有してもよい。一部の態様では、抗PD1抗体は、表10のFc領域アミノ酸配列のいずれか1つを含有する免疫グロブリン重鎖定常領域、およびカッパ軽鎖定常領域またはラムダ軽鎖定常領域である免疫グロブリン軽鎖定常領域を含有してもよい。

【0072】

一部の態様において、本明細書は、抗PD1抗体またはその抗原結合部分を開示するものであり、当該抗体は、重鎖可変(VH)領域、軽鎖可変(VL)領域、および重鎖定常領域を含有し、この場合において、

(a) VH領域のアミノ酸配列は、GFTFS SYGMS (配列番号33)のHC DR 1、VANI WQD GST KY VDS VKG (配列番号34)のHC DR 2、およびAY GNYWY IDR (配列番号35)のHC DR 3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VTNDVA (配列番号36)のLC DR 1、YAYHRFT (配列番号37)のLC DR 2、およびHQA YSSPYT (配列番号38)のLC DR 3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9~15のいずれか1つを含み；

(b) VH領域のアミノ酸配列は、GFSLS SYGMS (配列番号39)のHC DR 1、VAVI WQD GST NY VDS VKG (配列番号40)のHC DR 2、およびAY GNYWY IDR (配列番号35)のHC DR 3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VTNDVA (配列番号36)のLC DR 1、YAYHRFT (配列番号37)のLC DR 2、およびHQA YSSPYT (配列番号38)のLC DR 3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9~15のいずれか1つを含み；

(c) VH領域のアミノ酸配列は、GFTFS SYGMS (配列番号33)のHC DR 1、VANI WQD GSE KY VDS VKG (配列番号41)のHC DR 2、およびAY GNYWY IDR (配列番号35)のHC DR 3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VTNDVA (配列番号36)のLC DR 1、YAYHRFT (配列番号37)のLC DR 2、およびHQA YSSPYT (配列番号38)のLC DR 3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9~15のいずれか1つを含み；

(d) VH領域のアミノ酸配列は、GFSFS SYGMH (配列番号42)のHC DR 1、VANI WQD GST NY VDS VKG (配列番号43)のHC DR 2、およびAY GNYWY IDR (配列番号35)のHC DR 3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VSN DVA (配列番号44)のLC DR 1、YASHRFT (配列番号45)のLC DR 2、およびHQA YSTPYT (配列番号46)のLC DR 3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9~15のいずれか1つを含み；

(e) VH領域のアミノ酸配列は、GFSFT SYGMS (配列番号47)のHC DR 1、LANI WQD GST NY VDS VKG (配列番号48)のHC DR 2、およびAY GNYWY IDR (配列番号35)のHC DR 3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VSN DVA (配列番号44)のLC DR 1、YASHRFT (配列番号45)のLC DR 2、およびHQA YSTPYT (配列番号46)のLC DR 3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9~15のいずれか1つを含み；

(f) VH領域のアミノ酸配列は、GFTFS SYGVH (配列番号49)のHC DR 1、VGVI WQD GSE NY VDS VKG (配列番号50)のHC DR 2、およびAY GNYWY IDR (配列番号35)のHC DR 3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VSN DLA (配列番号51)のLC DR 1、YASHRFT (配列番号45)のLC DR 2、およびQQA YSTPYT (配列番号52)のLC DR 3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9~15のいずれか1つを含み；

(g) VH領域のアミノ酸配列は、GFSFS SYGMH (配列番号42)のHC DR 1、VANI WQD GST NY VDS VKG (配列番号43)のHC DR 2、およびAY GNYWY IDR (配列番号35)のHC DR 3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQS VSN DVA (配列番号44)のLC DR 1、YASHRFT (配列番号45)のLC DR 2、およびHQA YSTPYT (配列番号46)のLC DR 3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9~15のいずれか1つを含み；

(h) VH領域のアミノ酸配列は、GFSFS SYGMH (配列番号42)のHC DR

10

20

30

40

50

1、LANIWQDGSSENYVDSVKG（配列番号53）のHCDR2、およびAGNYWYIDR（配列番号35）のHCDR3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQSVSNDVA（配列番号44）のLCDR1、YASHRFT（配列番号45）のLCDR2、およびQQAYSTPYT（配列番号52）のLCDR3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9～15のいずれか1つを含み；

（i）VH領域のアミノ酸配列は、GFTLSSYGMH（配列番号54）のHCDR1、LAVIWADGSTNYVDSVKG（配列番号55）のHCDR2、およびAGNYMYIDV（配列番号56）のHCDR3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQSVSNDVA（配列番号44）のLCDR1、YASHRFT（配列番号45）のLCDR2、およびHQAYSTPYT（配列番号46）のLCDR3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9～15のいずれか1つを含み；

10

（j）VH領域のアミノ酸配列は、GFTFSSYGMH（配列番号57）のHCDR1、VGVIKQDGSSENYVDSVKG（配列番号58）のHCDR2、およびAGNYWYIDR（配列番号35）のHCDR3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQSVSNDVA（配列番号44）のLCDR1、YASHRFT（配列番号45）のLCDR2、およびHQAYSTPYT（配列番号46）のLCDR3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9～15のいずれか1つを含み；または

（k）VH領域のアミノ酸配列は、GFSFTSYGMH（配列番号59）のHCDR1、VGVIWQDGSTNYVDSVKG（配列番号60）のHCDR2、およびGYNWYIDV（配列番号61）のHCDR3を含み、VL領域のアミノ酸配列は、KSSQSVSNDLA（配列番号51）のLCDR1、YASHRFT（配列番号45）のLCDR2、およびQQAYSTPYT（配列番号52）のLCDR3を含み、ならびに重鎖定常領域は、配列番号9～15のいずれか1つを含む。

20

【0073】

一部の態様において、本明細書は、抗PD1抗体またはその抗原結合部分を開示するものであり、当該抗体は、重鎖可変（VH）領域、軽鎖可変（VL）領域、および重鎖定常領域を含有し、この場合において、

（a）VH領域のアミノ酸配列は、配列番号1を含有し、または配列番号1からなり、VL領域のアミノ酸配列は、配列番号2を含有し、または配列番号2からなり、および重鎖定常領域は、野生型ヒトIgG4定常領域、S228Pのアミノ酸置換を含有するヒトIgG4定常領域、野生型ヒトIgG2定常領域、野生型ヒトIgG1定常領域、またはL234A、L235A、およびG237Aのアミノ酸置換を含有するヒトIgG1定常領域を含有し、

30

（b）VH領域のアミノ酸配列は、配列番号3を含有し、または配列番号3からなり、VL領域のアミノ酸配列は、配列番号4を含有し、または配列番号4からなり、および重鎖定常領域は、野生型ヒトIgG4定常領域、S228Pのアミノ酸置換を含有するヒトIgG4定常領域、野生型ヒトIgG2定常領域、野生型ヒトIgG1定常領域、またはL234A、L235A、およびG237Aのアミノ酸置換を含有するヒトIgG1定常領域を含有し、

（c）VH領域のアミノ酸配列は、配列番号5を含有し、または配列番号5からなり、VL領域のアミノ酸配列は、配列番号6を含有し、または配列番号6からなり、および重鎖定常領域は、野生型ヒトIgG4定常領域、S228Pのアミノ酸置換を含有するヒトIgG4定常領域、野生型ヒトIgG2定常領域、野生型ヒトIgG1定常領域、またはL234A、L235A、およびG237Aのアミノ酸置換を含有するヒトIgG1定常領域を含有し、または

40

（d）VH領域のアミノ酸配列は、配列番号7を含有し、または配列番号7からなり、VL領域のアミノ酸配列は、配列番号8を含有し、または配列番号8からなり、および重鎖定常領域は、野生型ヒトIgG4定常領域、S228Pのアミノ酸置換を含有するヒトIgG4定常領域、野生型ヒトIgG2定常領域、野生型ヒトIgG1定常領域、またはL234A、L235A、およびG237Aのアミノ酸置換を含有するヒトIgG1定常

50

領域を含有する。

【0074】

一部の態様において、本明細書は、抗PD1抗体またはその抗原結合部分を開示するものであり、当該抗体は、重鎖可変（VH）領域、軽鎖可変（VL）領域、および重鎖定常領域を含有し、この場合において、

（a）VH領域のアミノ酸配列は、配列番号1を含有し、または配列番号1からなり、VL領域のアミノ酸配列は、配列番号2を含有し、または配列番号2からなり、および重鎖定常領域は、配列番号9～15のいずれか1つを含有する；

（b）VH領域のアミノ酸配列は、配列番号3を含有し、または配列番号3からなり、VL領域のアミノ酸配列は、配列番号4を含有し、または配列番号4からなり、および重鎖定常領域は、配列番号9～15のいずれか1つを含有する；

（c）VH領域のアミノ酸配列は、配列番号5を含有し、または配列番号5からなり、VL領域のアミノ酸配列は、配列番号6を含有し、または配列番号6からなり、および重鎖定常領域は、配列番号9～15のいずれか1つを含有する；または

（d）VH領域のアミノ酸配列は、配列番号7を含有し、または配列番号7からなり、当該VL領域のアミノ酸配列は、配列番号8を含有し、または配列番号8からなり、および重鎖定常領域は、配列番号9～15のいずれか1つを含有する。

【0075】

一部の態様では、抗PD1抗体は、免疫エフェクターが無効であってもよい。一部の態様では、抗PD1抗体またはその抗原結合部分は、免疫エフェクター機能を誘導せず、任意で免疫エフェクター機能を抑制する。一部の態様では、抗PD1抗体は、ヒトFcγRI受容体、FcγRIIa受容体、FcγRIIIa受容体、およびFcγRIIIb受容体への測定可能な結合を欠いてもよいが、ヒトFcγRIIIb受容体への結合は維持し、任意で、ヒトFcRn受容体への結合も維持する。FcγRI、FcγRIIa、FcγRIIIa、およびFcγRIIIbは、活性化受容体の例示である。FcγRIIIbは、阻害性受容体の例示である。FcRnは、リサイクル受容体の例示である。一部の態様では、抗PD1抗体またはその抗原結合部分のヒトFc受容体への結合アフィニティは、ピアコア（BIACORE（登録商標））解析により測定されてもよい。一部の態様では、HTRF法（Homogeneous Time Resolved Fluorescence）を使用して、ヒトFc受容体への抗PD1抗体の結合を試験することができる。HTRF法の1つの例において、ヒトIgG1（野生型）が標識され、一揃いのFcガンマ受容体も同様にされ、次いで組換えFc断片を含む抗体が、力価測定競合に使用される。一部の態様では、PD1陽性細胞と、ヒト白血球および抗PD1抗体とが混合されてもよく、そしてCDC、ADCCおよび／またはADCPによる細胞殺傷が測定されてもよい。一部の態様では、ヒトIgG1-3M（表10を参照）のFc領域のアミノ酸配列を含有する抗PD1抗体は、エフェクターが無効である。一部の態様では、ヒトIgG1-3M（表10を参照）のFc領域のアミノ酸配列を含有する抗PD1抗体は、エフェクターが無効でない。

【0076】

抗体分子またはその抗原結合部分は、Fab断片、F(ab)₂断片、Fv断片、四量体抗体、四価抗体、多特異性抗体（例えば二価抗体）、ドメイン特異的抗体、単一ドメイン抗体、モノクローナル抗体、または融合タンパク質であってもよい。1つの実施形態では、抗体は、第一の抗原と第二の抗原とに特異的に結合する二特異性抗体であってもよく、この場合において第一の抗原はPD1であり、第二の抗原はPD1ではない。抗体分子、ならびにその構築方法および使用方法は、例えばHolliger & Hudson（2005, Nature Biotechnol. 23（9）：1126-1136）に記載されている。

【0077】

本発明の別の態様では、治療剤を結合した、本明細書に規定される本発明の抗体分子またはその抗原結合部分を含有する免疫結合体が提供される。

【0078】

適切な治療剤の例示としては、細胞毒素、放射性同位体、化学療法剤、免疫調節剤、抗血管新生剤、抗増殖剤、アポトーシス促進剤、ならびに細胞増殖抑制酵素および細胞溶解性酵素（例えば、RNAse）が挙げられる。さらなる治療剤としては、例えば免疫調節剤、抗血管新生剤、抗増殖剤またはアポトーシス促進剤をコードする遺伝子などの治療用核酸が挙げられる。これらの薬剤の記述子は、相互排他的ではなく、ゆえに治療剤は、上述の用語の1つまたは複数を使用して記載されてもよい。

【0079】

免疫結合体における使用に適した治療剤の例としては、タキサン、メイタンシン、CC-1065、およびデュオカルマイシン、カリケアミシンおよび他のエンジイン、ならびにオーリスタチン（auristatin）が挙げられる。他の例としては、抗葉酸剤、ビンアルカロイド、およびアントラサイクリンが挙げられる。植物毒素、他の生物活性タンパク質、酵素（すなわちADEPT）、放射性同位体、光増感剤が、免疫結合体において使用されてもよい。さらに結合体は、細胞毒性剤として二次的な担体、例えばリポソームまたはポリマーなどを使用して作製され得る。適切な細胞毒素としては、細胞の機能を阻害または妨害し、および／または細胞の破壊をもたらす薬剤が挙げられる。代表的な細胞毒素としては、抗生物質、チューブリン重合の阻害剤、DNAに結合し、破壊するアルキル化剤、そしてタンパク質合成を破壊する、または例えばタンパク質キナーゼ、ホスファターゼ、トポイソメラーゼ、酵素およびサイクリンなどの必須の細胞タンパク質の機能を破壊する薬剤が挙げられる。

【0080】

代表的な細胞毒素としては、以下に限定されないが、ドキソルビシン、ダウノルビシン、イダルビシン、アクリルビシン、ゾルビシン、ミトキサントロン、エピルビシン、カルビシン、ノガラマイシン、メノガリル、ピタルビシン（pitarrubicin）、バルルビシン、シタラビン、ゲムシタビン、トリフルリジン、アンシタビン、エノシタビン、アザシチジン、ドキシフルジン（doxifluhdine）、ペントスタチン、ブロクスジン（broxuhdine）、カペシタビン、クラドビン（cladhbine）、デシタビン、フロクスジン（floxuhdine）、フルダラビン、グーゲロチン、ピューロマイシン、テガフル、チアゾフン（tiazofohn）、アダマイシン（adhamycin）、シスプラチン、カルボプラチン、シクロフォスファミド、ダカルバジン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ミトキサントロン、ブレオマイシン、メクロレタミン、プレドニゾン、プロカルバジン、メトトレキサート、フルロウラシル（flurouracil）、エトポシド、タキソール、タキソールアナログ、例えばシスプラチンおよびカルボプラチンなどのプラチン類、マイトマイシン、チオテパ、タキサン、ビンクリスチン、ダウノルビシン、エピルビシン、アクチノマイシン、オースラマイシン（authramycin）、アザセリン、ブレオマイシン、タモキシフェン、イダルビシン、ドラスタチン／オーリスタチン（auristatin）、ヘミアステリン（hemiassterlin）、エスベラミシン、ならびにマイタンシノイドが挙げられる。

【0081】

適切な免疫調節剤としては、腫瘍に対するホルモンの作用を遮断する抗ホルモン剤、およびサイトカイン産生を抑制する、自己抗原発現を下方制御する、またはMHC抗原をマスクする免疫抑制剤が挙げられる。

【0082】

さらに、本明細書に規定される本発明の抗体分子またはその抗原結合部分をコードする核酸分子も提供される。核酸分子は、本明細書に記載される抗PD1抗体またはその抗原結合部分の、（a）VH領域のアミノ酸配列、（b）VL領域のアミノ酸配列、または（c）VH領域とVL領域の両方のアミノ酸配列をコードしてもよい。一部の態様では、本明細書に規定される核酸分子が単離されてもよい。

【0083】

さらに、本明細書に規定される本発明の核酸分子を含有するベクターが提供される。ベ

10

20

30

40

50

クターは、発現ベクターであってもよい。

【0084】

また、本明細書に規定される本発明の核酸分子またはベクターを含有する宿主細胞も提供される。宿主細胞は、組換え宿主細胞であってもよい。

【0085】

さらなる態様において、抗PD1抗体および／またはその抗原結合部分を作製する方法も提供され、当該方法は、当該抗体および／もしくはその抗原結合部分の発現ならびに／または産生が生じる条件下で、本発明の宿主細胞を培養することと、当該宿主細胞または培養物から、当該抗体および／またはその抗原結合部分を単離することと、を含む。

【0086】

本発明の別の態様において、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分、または本明細書に規定される本発明の核酸分子、または本明細書に規定される本発明のベクターを含有する医薬組成物が提供される。

【0087】

さらに、対象において免疫反応を強化する方法が提供され、当該方法は、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分の有効量、または本明細書に規定される本発明の免疫結合体の有効量、または本明細書に規定される本発明の核酸分子の有効量、または本明細書に規定される本発明のベクターの有効量、または本明細書に規定される本発明の医薬組成物の有効量を当該対象に投与することを含む。

【0088】

さらなる態様において、対象において癌を治療または予防する方法が提供され、当該方法は、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分の有効量、または本明細書に規定される本発明の免疫結合体の有効量、または本明細書に規定される本発明の核酸分子の有効量、または本明細書に規定される本発明のベクターの有効量、または本明細書に規定される本発明の医薬組成物の有効量を当該対象に投与することを含む。

【0089】

例えば、癌は、膵臓癌、メラノーマ、乳癌、肺癌、気管支癌、結腸直腸癌、前立腺癌、胃癌、卵巣癌、膀胱癌、脳腫瘍または中枢神経系の癌、末梢神経系の癌、食道癌、子宮頸癌、子宮癌または子宮内膜癌、口腔または咽頭の癌、肝癌、腎癌、精巣癌、胆管癌、小腸癌または虫垂癌、唾液腺癌、甲状腺癌、副腎癌、骨肉腫、軟骨肉腫、または血液組織の癌であり得る。

【0090】

本発明はさらに、癌の治療における使用のための、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分、または本明細書に規定される本発明の免疫結合体、または本明細書に規定される本発明の核酸分子、または本明細書に規定される本発明のベクター、または本明細書に規定される本発明の医薬組成物を提供する。

【0091】

別の態様において、本発明は、例えば抗癌剤などの第二の治療剤と組み合わせた併用において、別個に使用する、連続して使用する、または同時に使用するための、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分、または免疫結合体、または核酸分子、または使用のためのベクター、または治療方法を提供する。

【0092】

さらなる態様において、癌の治療のための医薬品の製造における、本明細書に規定される本発明の抗体分子もしくはその抗原結合部分の使用、または本明細書に規定される本発明の免疫結合体の使用、または本明細書に規定される本発明の核酸分子の使用、または本明細書に規定される本発明のベクターの使用、または本明細書に規定される本発明の医薬組成物の使用が提供される。

【0093】

本発明はさらに、対象において感染症もしくは免疫疾患を治療または予防する方法を提供するものであり、当該方法は、本明細書に規定される抗体分子もしくはその抗原結合部

10

20

30

40

50

分の有効量、または本明細書に規定される免疫結合体の有効量、または本明細書に規定される核酸分子の有効量、または本明細書に規定されるベクターの有効量、または本明細書に規定される医薬組成物の有効量を当該対象に投与することを含む。

【0094】

一実施形態において、本発明は、治療における使用のための本明細書に開示されるアミノ酸配列を含有する抗PD1抗体またはその抗原結合部分を提供する。

【0095】

本発明の医薬組成物は、薬学的に許容可能な賦形剤、担体または希釈剤を含有してもよい。薬学的に許容可能な賦形剤は、二次的な反応を引き起こさない医薬組成物に入れられる化合物または化合物の組み合わせであってもよく、例えば、抗PD1抗体分子の投与の促進、その持続期間の延長、および／もしくは体内におけるその有効性の増加、または溶液中の可溶性の上昇を可能にする。これら薬学的に許容可能なビヒクルは周知であり、抗PD1抗体分子の投与形態の効果に応じて当業者により適合される。

【0096】

一部の実施形態では、抗PD1抗体分子は、凍結乾燥されて提供され、投与前に再構成されてもよい。例えば凍結乾燥された抗体分子は、滅菌水で再構成され、個体への投与前に生理食塩水と混合される。

【0097】

抗PD1抗体分子は通常、医薬組成物の形態で投与され、当該医薬組成物は、抗体分子に加えて少なくとも1つの構成要素を含有してもよい。したがって医薬組成物は、抗PD1抗体分子に加えて、薬学的に許容可能な賦形剤、担体、緩衝剤、安定剤、または当業者に周知の他の物質を含有してもよい。そうした物質は、非毒性でなければならず、そして抗PD1抗体分子の効能に干渉してはならない。担体または他の物質の正確な性質は、投与経路に依存することとなり、これは、以下に検討されるように、ボラス、点滴、注射または任意の他の適切な経路によるものであってもよい。

【0098】

例えば注射などによる皮下投与または静脈内投与などの非経口投与に関しては、抗PD1抗体分子を含有する医薬組成物は、発熱物質を含まず、そして適切なpH、等張性および安定性の非経口に受容可能な水溶液の形態であってもよい。当業者であれば、例えば塩化ナトリウム注射溶液、リンゲル注射溶液、乳酸リンゲル注射溶液などの等張ビヒクルを使用して適切な溶液を調製することができる。保存剤、安定剤、緩衝剤、抗酸化剤、および／または他の添加剤を必要に応じて採用してもよく、例えばリン酸塩、クエン酸塩および他の有機酸などの緩衝剤；アスコルビン酸およびメチオニンなどの抗酸化剤；保存剤（例えばオクタデシルジメチルベンジル塩化アンモニウム；塩化ヘキサメトニウム；塩化ベンザルコニウム；塩化ベンゼトニウム；フェノール、ブチルアルコールまたはベンジルアルコール；例えばメチルパラベンまたはプロピルパラベンなどのアルキルパラベン；カテコール；レソルシノール；シクロヘキサノール；3'-ペンタノール；およびm-クレゾール）；低分子量ポリペプチド；例えば血清アルブミン、ゼラチンまたは免疫グロブリンなどのタンパク質；例えばポリビニルピロリドンなどの親水性ポリマー；例えばグリシン、グルタミン、アスパラギン、ヒスチジン、アルギニンまたはリシンなどのアミノ酸；グルコース、マンノースまたはデキストリンなどの単糖、二糖および他の炭水化物；例えばEDTAなどのキレート剤；例えばショ糖、マンニトール、トレハロースまたはソルビトールなどの糖類；例えばナトリウムなどの塩形成対イオン；金属錯体（例えばZn-タンパク質錯体）；および／または例えばTWEEN（登録商標）、PLURONICS（登録商標）、またはポリエチレングリコール（PEG）などの非イオン性界面活性剤が挙げられる。

【0099】

抗PD1抗体分子を含有する医薬組成物は、治療される状態に応じて、単独で投与されてもよく、または他の治療と併用されて、同時に、または連続のいずれかで投与されてもよい。

10

20

30

40

50

【0100】

本明細書に記載の抗PD1抗体分子は、ヒトまたは動物の身体の治療方法に使用されてもよく、治療には、予防的または防止的な治療が含まれる（例えば、個体において症状が発生する前に、当該個体において当該症状が発生するリスクを低下させるため、その発生を遅延させるため、または発生後の重症度を低下させるための治療）。治療方法は、抗PD1抗体分子を、その必要のある個体に投与することを含んでもよい。

【0101】

投与は通常、「治療有効量」でされ、これは、患者に対し有益性を示すのに十分な量である。そうした有益性は、少なくとも1つの症状の少なくとも改善であってもよい。投与される実際の量、投与速度、および投与の経時変化は、治療されるものの、特に治療される哺乳動物の、性質および重症度、個々の患者の臨床状態、障害の原因、組成物の送達部位、投与方法、投与スケジュール、および医療従事者がわかっている他の因子に依存することとなる。例えば用量の決定などの治療の指示は、一般開業医および他の医師の責の範囲内にあり、治療される疾患の症状の重症度、および／または治療される疾患の進行に依存し得る。抗体分子の適切な投与量は、当分野に周知である（Ledermann J. A. et al., 1991, Int. J. Cancer 47: 659-664; Bagshawe K. D. et al., 1991, Antibody, Immunoc conjugates and Radiopharmaceuticals 4: 915-922）。具体的な用量は、本明細書において、またはPhysician's Desk Reference（2003）において示され、投与される薬剤のタイプに応じた用量が、使用され得る。抗体分子の治療有効量または適切な用量は、そのインビトロ活性と、動物モデルにおけるインビボ活性とを比較することにより決定され得る。マウスおよび他の被験動物における有効用量を、ヒトに外挿する方法は公知である。正確な投与量は、抗体が予防用であるかまたは治療用であるか、治療される領域の大きさおよび位置、抗体の正確な性質（例えば全抗体、断片）および抗体に付加された任意の検出可能な標識または他の分子の性質をはじめとする多くの因子に依存することとなる。

【0102】

典型的な抗体投与量は、全身投与に対しては100 μ g～1g、局所投与に対しては1 μ g～1mgの範囲である。初回に高い負荷投与量で、その後は1回または複数回の低投与量が投与されてもよい。典型的には、抗体は、例えばIgG1アイソタイプまたはIgG4アイソタイプなどの全抗体である。これは成人患者の単回治療用の投与量であり、小児および幼児に対しては相対的に調整され得、そして分子量に比例して他の抗体形式にも調整され得る。治療は、医師の裁量で毎日、週2回、毎週、または毎月の間隔で繰り返され得る。個々の治療スケジュールは、抗体組成物の薬物動態および薬力学的性質、投与経路、ならびに治療される状態の性質に依存し得る。

【0103】

治療は定期的であってもよく、投与の間の期間は、約2週間またはそれ以上であってもよく、例えば約3週間以上、約4週間以上、約1カ月に1回以上、約5週間以上、または約6週間以上であってもよい。例えば、治療は、2週～4週ごと、または4週～8週ごとであってもよい。治療は、外科手術の前、および／もしくは後に行われてもよく、ならびに／または外科的治療もしくは浸潤的手順の解剖学的位置に直接投与または適用されてもよい。適切な製剤および投与経路は、上記に記載される。

【0104】

一部の実施形態では、本明細書に記載の抗PD1抗体分子は、皮下注射として投与されてもよい。皮下注射は、例えば長期間の予防用／治療用の自己注射器を使用して投与されてもよい。

【0105】

一部の好ましい実施形態では、抗PD1抗体分子の治療効果は、いくつかの半減期の間、持続し得、投与量に依存する。例えば抗PD1抗体分子の単回投与の治療効果は、個体において、1カ月以上、2カ月以上、3カ月以上、4カ月以上、5カ月以上、または6カ

月以上、持続し得る。

【0106】

本発明はさらに、ヒトPD1に特異的に結合し、および任意でカニクイザルのPD1にも特異的に結合する抗体分子、またはその抗原結合部分を作製する方法を提供するものであり、当該方法は、

(1) 非ヒト源由来の抗PD1 CDRをヒトvドメインフレームワーク内に移植し、ヒト化抗PD1抗体分子またはその抗原結合部分を作製する工程、

(2) CDR中に1つまたは複数の変異を含有する当該ヒト化抗PD1抗体分子またはその抗原結合部分のクローンのライブラリーを作製する工程、

(3) ヒトPD1への結合について、および任意でカニクイザルのPD1への結合についても当該ライブラリーをスクリーニングする工程、

(4) スクリーニングする工程(3)から、ヒトPD1に特異的に結合する、および任意でカニクイザルPD1にも特異的に結合するクローンを選択する工程、ならびに

(5) ヒトPD1に特異的に結合し、および任意でカニクイザルPD1にも特異的に結合する抗体分子、またはその抗原結合部分を、工程(4)から選択されたクローンから作製する工程、を含む。

【0107】

当該方法は、工程(4)で選択されたクローンに基づき、例えば工程(4)で選択されたクローンのCDR中の特定の位置でのさらなる探索的な突然変異誘導に基づき、追加のクローンを作製して、ヒト化を強化し、および／またはヒトT細胞エпитープ含量を最小化し、および／または工程(5)で作製された抗体分子もしくはその抗原結合部分の製造特性を改善するさらなる工程を含んでもよい。

【0108】

上述の方法に適用可能な改善は、以下の実施例1に記載されるとおりである。

【0109】

本明細書で用いる場合、“PD1”の語は、PD1の生物学的活性の少なくとも一部を保持する、プログラム細胞死タンパク質1およびそのバリエーションを指す。本明細書において使用される場合、PD1は、ヒト、ラット、マウスおよびニワトリを含むすべての種の天然配列PD1を含む。“PD1”の語は、ヒトPD1のバリエーション、アイソフォームおよび種のホモログを含むために使用される。本発明の抗体は、ヒト以外の種に由来するPD1、特にカニクイザル(*Macaca fascicularis*)由来のPD1と交差反応し得る。ヒトおよびカニクイザルのPD1アミノ酸配列の例を、表11に提供する。ある実施形態では、抗体は、完全にヒトPD1に特異的であってもよく、非ヒトとの交差反応性を呈さなくてもよい。

【0110】

本明細書において使用される場合、本発明の抗体の文脈において使用される場合の「アンタゴニスト」、または「抗PD1アンタゴニスト抗体」(「抗PD1抗体」と相互交換可能に称される)とは、PD1に結合することができる、ならびにPD1の生物学的活性を阻害することができる、および／またはPD1シグナル伝達により介在される下流経路を阻害することができる抗体を指す。抗PD1アンタゴニスト抗体には、例えばPD1に対する受容体結合および／または細胞反応の惹起など、PD1シグナル伝達により介在される下流経路を含めた、(有意に)PD1の生物学的活性(を含めた)を遮断する、拮抗する、抑制する、または低下させることができる抗体を包含する。本発明の目的に対し、「抗PD1アンタゴニスト抗体」という用語は、PD1それ自体、およびPD1の生物学的活性(限定されないが、T細胞の抗腫瘍細胞活性の活性化を抑制する能力を含む)、または活性もしくは生物学的活性の結果が、任意の意義のある程度に実質的に無効化される、減少される、または中和されるすべての用語、タイトル、ならびに機能的状態および機能的特性を包含することが明示的に理解されるであろう。

【0111】

他の受容体よりも高いアフィニティ、高いアビディティ、より容易に、および／または

より長い期間、PD1と結合する場合、当該抗体は、PD1に「特異的に結合する」、「特異的に相互作用する」、「優先的に結合する」、「結合する」または「相互作用する」。

【0112】

「抗体分子」は、例えば炭水化物、ポリヌクレオチド、脂質、ポリペプチドなどの標的に、免疫グロブリン分子の可変領域中に位置する少なくとも1つの抗原認識部位を介して特異的に結合することができる免疫グロブリン分子である。本明細書において使用される場合、「抗体分子」という用語は、インタクトなポリクローナル抗体またはモノクローナル抗体のみならず、任意の抗原結合断片（例えば「抗原結合部分」）またはその一本鎖、抗体を含む融合タンパク質、ならびに例えば限定されないが、scFv、単ドメイン抗体（例えばサメ抗体およびラクダ科抗体）、マキシボディ、ミニボディ、イントラボディ、ダイアボディ、トリアボディ、テトラボディ、v-NAR、およびbis-scFvを含む抗原認識部位を含有する免疫グロブリン分子の任意の他の改変構造体も包含する。

10

【0113】

「抗体分子」は、例えばIgG、IgA、またはIgM（またはそのサブクラス）などの任意のクラスの抗体を包含するが、抗体はいずれか特定のクラスのものである必要はない。その重鎖の定常領域の抗体アミノ酸配列に応じて、免疫グロブリンは、様々なクラスに割り当てられ得る。免疫グロブリンにはIgA、IgD、IgE、IgGおよびIgMの5種類の主要なクラスがある。これらのうちのいくつかは、さらにサブクラス（アイソタイプ）に分けられる場合があり、例えば、IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1およびIgA2がある。異なるクラスの免疫グロブリンに対応する重鎖定常領域はそれぞれアルファ、デルタ、イプシロン、ガンマ、およびミューと呼ばれる。このサブユニットの構造、および様々なクラスの免疫グロブリンの三次元構造は周知である。

20

【0114】

抗体分子の「抗原結合部分」という用語は、本明細書において使用される場合、PD1に特異的に結合する能力を保持する、インタクトな抗体の1つまたは複数の断片を指す。抗体分子の抗原結合機能は、インタクトな抗体の断片により実現され得る。抗体分子の「抗原結合部分」という用語に包含される結合断片の例示としては、Fab; Fab'; F(ab')₂; VHドメインとCH1ドメインからなるFd断片; 抗体の1つのアームのVLドメインおよびVHドメインからなるFv断片; 単ドメイン抗体(dAb)断片、および単離された相補性決定領域(CDR)が挙げられる。

30

【0115】

「Fc領域」という用語は、免疫グロブリン重鎖のC末端領域を規定するために使用される。「Fc領域」は、天然配列のFc領域またはバリエーションのFc領域であってもよい。免疫グロブリン重鎖のFc領域の境界は変化し得るが、ヒトIgG重鎖のFc領域は通常、Cys226の位置のアミノ酸残基、またはPro230の位置のアミノ酸残基から、そのカルボキシル末端に及ぶと規定される。Fc領域中の残基の番号付けは、KabataにあるEUインデックスの番号である。免疫グロブリンのFc領域は通常、CH2とCH3の2つの定常ドメインを含有する。当分野に知られているように、Fc領域は、二量体型または単量体型で存在し得る。

40

【0116】

抗体の「可変領域」とは、抗体軽鎖の可変領域または抗体重鎖の可変領域の、いずれか単独または組み合わせを指す。当分野に知られているように、重鎖および軽鎖の可変領域は各々、超可変領域としても知られている3つの相補性決定領域(CDR)に繋がる4つのフレームワーク領域(FR)からなり、抗体の抗原結合部位の形成に寄与する。CDRに隣接するFRを選択するとき、例えば抗体のヒト化または最適化を行うとき、同じ基準クラスのCDR配列を含有する抗体由来のFRが好ましい。

【0117】

本出願において使用されるCDRの定義は、当分野で創出された多くの異質的な、しばしば矛盾するスキームにおいて使用されるドメインを組み合わせており、免疫グロブリン

50

レパートリー分析と、遊離状態および抗原との共結晶状態の抗体の構造分析との組み合わせに基づいている (Swindells et al., 2016, abYsis: Integrated Antibody Sequence and Structure-Management, Analysis, and Prediction. J Mol Biol. [PMID: 27561707; Epub 22 August 2016] によるレビューを参照のこと)。本明細書において使用されるCDRの定義(「統合(Unified)」定義)は、そうしたすべての過去の洞察の教示を組み込んでおり、潜在的に標的-結合の相補性を介在する完全な残基の状況を抽出するために必要なすべての適切なループ位置を含む。

【0118】

表1は、本明細書に規定されるMu317マウス抗PD1抗体のCDRのアミノ酸配列(「統合」スキーム)を、同じCDRを規定する周知の代替的な系と比較して示している。

【0119】

本明細書において使用される場合、「保存的置換」という用語は、アミノ酸を、機能活性を大きく有害には変化させない別のアミノ酸で置換することを指す。「保存的置換」の好ましい例は、1つのアミノ酸を、以下のBLOSUM 62置換マトリクス(Henikoff & Henikoff, 1992, PNAS 89:10915-10919を参照のこと)において0以上の値(≥ 0)を有する別のアミノ酸で置換することである。

【0120】

【化1】

	A	R	N	D	C	Q	E	G	H	I	L	K	M	F	P	S	T	W	Y	V
A	4	-1	-2	-2	0	-1	-1	0	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	1	0	-3	-2	0
R	-1	5	0	-2	-3	1	0	-2	0	-3	-2	2	-1	-3	-2	-1	-1	-3	-2	-3
N	-2	0	6	1	-3	0	0	0	1	-3	-3	0	-2	-3	-2	1	0	-4	-2	-3
D	-2	-2	1	6	-3	0	2	-1	-1	-3	-4	-1	-3	-3	-1	0	-1	-4	-3	-3
C	0	-3	-3	-3	9	-3	-4	-3	-3	-1	-1	-3	-1	-2	-3	-1	-1	-2	-2	-1
Q	-1	1	0	0	-3	5	2	-2	0	-3	-2	1	0	-3	-1	0	-1	-2	-1	-2
E	-1	0	0	2	-4	2	5	-2	0	-3	-3	1	-2	-3	-1	0	-1	-3	-2	-2
G	0	-2	0	-1	-3	-2	-2	6	-2	-4	-4	-2	-3	-3	-2	0	-2	-2	-3	-3
H	-2	0	1	-1	-3	0	0	-2	8	-3	-3	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-2	2	-3
I	-1	-3	-3	-3	-1	-3	-3	-4	-3	4	2	-3	1	0	-3	-2	-1	-3	-1	3
L	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-3	-4	-3	2	4	-2	2	0	-3	-2	-1	-2	-1	1
K	-1	2	0	-1	-3	1	1	-2	-1	-3	-2	5	-1	-3	-1	0	-1	-3	-2	-2
M	-1	-1	-2	-3	-1	0	-2	-3	-2	1	2	-1	5	0	-2	-1	-1	-1	-1	1
F	-2	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-3	-1	0	0	-3	0	6	-4	-2	-2	1	3	-1
P	-1	-2	-2	-1	-3	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-1	-2	-4	7	-1	-1	-4	-3	-2
S	1	-1	1	0	-1	0	0	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-1	4	1	-3	-2	-2
T	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	1	5	-2	-2	0
W	-3	-3	-4	-4	-2	-2	-3	-2	-2	-3	-2	-3	-1	1	-4	-3	-2	11	2	-3
Y	-2	-2	-2	-3	-2	-1	-2	-3	2	-1	-1	-2	-1	3	-3	-2	2	7	-1	
V	0	-3	-3	-3	-1	-2	-2	-3	-3	3	1	-2	1	-1	-2	0	-3	-1	4	

【0121】

「モノクローナル抗体」(Mab)という用語は、例えば任意の真核細胞クローン、原核細胞クローンもしくはファージクローンなどの1つのコピーまたはクローンから誘導された抗体またはその抗原結合部分を指し、それが作製された方法ではない。本発明のモノクローナル抗体は、均質、または実質的に均質な集団で存在することが好ましい。

【0122】

「ヒト化」抗体分子とは、非ヒト免疫グロブリンに由来する配列を最小限に含有するキメラ免疫グロブリン、免疫グロブリン鎖、またはその断片(例えば、Fv、Fab、Fab'、F(ab')₂、または他の抗原結合性の抗体下位配列)である、非ヒト(例えばマウス)抗体分子またはその抗原結合部分の形態を指す。ヒト化抗体は、レシピエントのCDR由来の残基が、所望の特異性、アフィニティおよび能力を有する例えばマウス、ラットまたはウサギなどの非ヒト種(ドナー抗体)のCDR由来の残基で置き換えられているヒト免疫グロブリン(レシピエント抗体)であってもよい。

【0123】

10

20

30

40

50

「ヒト抗体または完全ヒト抗体」とは、ヒト抗体遺伝子を担持するトランスジェニックマウスから誘導された、またはヒト細胞から誘導された抗体分子またはその抗原結合部分を指す。

【0124】

「キメラ抗体」という用語は、可変領域配列が1つの種に由来し、定常領域配列は別の種に由来する抗体分子またはその抗原結合部分を指すことが意図され、例えば、可変領域配列はマウス抗体に由来し、定常領域配列はヒト抗体に由来する抗体分子などである。

【0125】

「抗体－薬剤結合体」および「免疫結合体」とは、PD1に結合し、ならびに細胞傷害剤、細胞増殖抑制剤、および／または治療剤と結合される抗体分子またはその抗原結合部分を指し、抗体誘導体を含む。

10

【0126】

本発明の抗体分子、またはその抗原結合部分は、例えば組換え技術、ファージディスプレイ技術、合成技術、またはそうした技術もしくは当分野に既に公知である他の技術との組み合わせなどの当分野に周知の技術を使用して作製され得る。

【0127】

「単離された分子」（分子が、例えばポリペプチド、ポリヌクレオチドまたは抗体である場合）という用語は、その起源または誘導の源によって、（1）自然状態では付随する天然の関連構成要素と関連していない分子、（2）同じ種由来の他の分子を実質的に含まない分子、（3）異なる種由来の細胞により発現された分子、または（4）自然に発生しない分子である。したがって、化学的に合成された分子、または天然での起源である細胞とは異なる細胞系で発現された分子は、その天然の関連構成要素から「単離される」。さらに分子は、当分野に周知の精製技術を使用した単離によって、天然の関連構成要素を実質的に含まない状態となり得る。分子純度または均質性は、当分野に周知の多くの手段により解析され得る。例えばポリペプチドサンプルの純度は、当分野に周知の技術を使用してポリアクリルアミドゲル電気泳動を使用し、ゲルを染色してポリペプチドを可視化して解析されてもよい。ある目的に対し、HPLC、または精製分野で周知の他の手段を使用することにより、さらに高い分解能が提供される場合がある。

20

【0128】

「エピトープ」という用語は、抗体分子の抗原結合領域のうちの1つまたは複数で抗体分子に認識され、結合されることができ分子の部分、またはその抗原結合部分を指す。エピトープは、一次、二次または三次のタンパク質構造の規定領域からなる場合があり、抗体またはその抗原結合部分の抗原結合領域に認識される標的の二次構造単位または二次構造ドメインの組み合わせを含む。同じくエピトープは、例えばアミノ酸または糖側鎖などの規定の化学的に活性な分子の表面群からなる場合があり、特定の三次元構造特性ならびに特定の電荷特性を有する場合がある。本明細書において使用される場合、「抗原性エピトープ」という用語は、当分野に周知の任意の方法、例えば従来的な免疫アッセイ法、抗体競合結合アッセイ、またはX線結晶法もしくは関連する構造決定法（例えばNMR）により決定されたときに、抗体分子が特異的に結合することができるポリペプチドの部分と規定される。

30

40

【0129】

「結合アフィニティ」または「KD」という用語は、特定の抗原－抗体の相互作用の解離速度を指す。KDは、「 $off-rate (k_{off})$ 」とも呼ばれる解離速度の、「 $on-rate (k_{on})$ 」、すなわち会合速度に対する比率である。ゆえに K_D は、 k_{off} / k_{on} に等しく、モル濃度(M)として表される。従って、 K_D が小さくなると、結合アフィニティは強くなる。ゆえに K_D が $1 \mu M$ であれば、 K_D が $1 nM$ の場合と比較して結合アフィニティが弱いことを示す。抗体のKD値は、当分野に確立された方法を使用して決定され得る。抗体のKDの決定方法の1つは、表面プラズモン共鳴(SPR)を使用するものであり、典型的には、例えばピアコア(Biacore (登録商標))システムなどのバイオセンサーシステムを使用する。

50

【0130】

「有効性」という用語は、生物活性の測定値であり、本明細書に記載のPD1活性アッセイにおいて測定される活性の50%を阻害する、抗原PD1に対する抗体または抗体薬剤結合体のIC₅₀すなわち有効濃度として表す場合もある。

【0131】

本明細書において使用される場合、「有効量」または「治療有効量」という文言は、所望の治療結果を実現するために必要な（用量での、および期間に対する、および投与手段に対する）量を指す。有効量は、活性剤の、対象に治療上有益な影響を与えるために必要な少なくとも最小量であるが、対象に毒性のある量よりは少ない量である。

【0132】

本発明の抗体分子の生物活性に関して本明細書において使用される場合、「阻害する」または「中和する」という用語は、限定されないが、PD1に対する抗体分子の生物活性、または抗体分子とPD1の結合相互作用を含む、阻害されるものの例えば進行または重症度を実質的に拮抗する、妨げる、予防する、抑える、減速させる、破壊する、除去する、停止させる、低下させる、または反転させる抗体の能力を意味する。

【0133】

「宿主細胞」には、ポリヌクレオチド挿入物の組み込みのためのベクターに対するレシピエントであってもよく、またはレシピエントである個々の細胞または細胞培養物を含む。宿主細胞は、単一宿主細胞の子孫物を含み、当該子孫物は、自然の、偶発的な、または意図的な変異により、元の親細胞と完全に同一（形態において、またはゲノムDNAの相補体において）であるとは限らない場合がある。宿主細胞には、本発明のポリヌクレオチドをインビボでトランスフェクトされた細胞が含まれる。

【0134】

本明細書において使用される場合、「ベクター」とは、宿主細胞において、関心の1つまたは複数の遺伝子または配列を送達することができる、そして好ましくは発現することができる構築物を意味する。ベクターの例としては限定されないが、ウイルスベクター、ネイキッドDNAまたはRNAの発現ベクター、プラスミド、コスミドまたはファージベクター、カチオン縮合剤と会合したDNAまたはRNAの発現ベクター、リポソーム中に封入されたDNAまたはRNAの発現ベクター、および例えば産生細胞などの特定の真核細胞が挙げられる。

【0135】

本明細書において使用される場合、別段が示唆されない限り、「治療すること」という用語は、そうした用語が適用される障害もしくは症状、またはそうした障害もしくは症状の1つまたは複数症状を反転させる、改善させる、進行を阻害する、進行を遅延させる、発症を遅延させる、または予防することを意味する。本明細書において使用される場合、別段の示唆が無い限り、「治療」という用語は、上述に規定される治療の行為を指す。「治療すること」という用語は、対象のアジュバント療法およびネオアジュバント療法も含む。誤解を避けるために、本明細書において「治療」という言及は、治癒的、緩和的、および予防的な治療に対する言及を含む。誤解を避けるために、本明細書において「治療」という言及は、治癒的、緩和的、および予防的な治療に対する言及もさらに含む。

【0136】

本明細書において、実施形態は、「含む、含有する」という文言で記載されているか、さもなければ「～からなる」および／または「本質的に～からなる」として記載される類似した実施形態も提供されることを理解されたい。

【0137】

本発明の態様または実施形態が、マーカッシュ群または他の択一的な群で記載されている場合、本発明は、概して列挙される群全体のみならず、当該群の各メンバーを個々に、および当該主要群のうちの可能性のあるすべての亜群、そして当該群メンバーの1つまたは複数に欠いた主要群も包含する。本発明はさらに、請求される本発明の群メンバーのいずれかの1つまたは複数の明白な除外を予期するものである。

【0138】

別段の規定がない限り、本明細書において使用される全ての技術用語および科学用語は、本発明が属する分野の当業者によって普遍的に理解される意味と同じ意味を有する。矛盾が生じる場合、本明細書が定義を含めて主導をとるものとする。本明細書および特許請求の範囲の全体を通じて、「含む、含有する」という文言、または例えば「含む、含有する」または「含むこと、含有すること」といった変化形は、記述される整数値の含有、または整数値の群の含有を示唆するが、任意の他の整数値または整数値の群の除外は示唆しないと理解される。文脈により別段であることを要しない限り、単数形の用語は複数を含むものとし、複数形は単数を含むものとする。「例えば」という用語の後に続くあらゆる例示は、包括的または限定であることは意味しない。

10

【0139】

本発明の実施は、別段の示唆が無い限り、分子生物学（組換え技術を含む）、微生物学、細胞生物学、生化学、および免疫学の従来的な技術を採用し、それら技術は当分野の技術範囲内にある。

【0140】

本発明の特定の非限定的な実施形態を、添付の図面を参照しながら記載することとする。

【実施例】

【0141】

実施例1．最適化抗PD1治療用抗体の作製

20

イントロダクション

本実施例において、本発明者らは、アゴニスト性の最適化抗PD1抗体のパネルの作製に成功した。これら抗PD1抗体は良好に発現され、生物物理的に安定であり、溶解度が高く、そして好ましいヒト生殖細胞系列に対し最大の同一性を有している。

【0142】

材料及び方法

PD1ライブラリーの作製および選択

PD1 Fabライブラリーは、大量オリゴ合成およびPCRにより組み立てられた。次いで増幅されたFabレパートリーを制限酵素－ライゲーションを介してファージミドベクター内にクローニングし、大腸菌TG-1細胞内に形質転換した。ファージレパートリーは、原則として過去に詳述されるようにレスキューされた（Finlay et al., 2011, Methods Mol Biol 681:383-401）。

30

【0143】

ファージ選択は、ストレプトアビジン磁気マイクロビーズをビオチン化PD1標的タンパク質（ヒトまたはカニクイザルのいずれか）でコーティングし、ビーズをPBSで3回洗浄して、5%スキムミルクタンパク質を加えたPBS pH7.4中に再懸濁させることにより実施された。これらビーズは、選択のラウンド1では100nMの標的タンパク質でコーティングされており、その後の3回の連続ラウンドでは抗原濃度は減少した。各ラウンドにおいて、ファージはトリプシンを使用して溶出され、その後、TG1細胞内に再感染された。

40

【0144】

ペリプラズム抽出物の作製（小スケール）

個々の大腸菌クローンにおいて、可溶性Fabの産生が行われた。対数増殖期の大腸菌TG1細胞は、1-チオ-β-D-ガラクトピラノシドイソプロピルを用いて誘導された。可溶性Fabを含有するペリプラズム抽出物は、以下の凍結／融解サイクルにより作製された：細菌細胞沈殿物を一晩、-20℃で凍結させ、その後室温で融解させ、PBS pH7.4中に再懸濁させた。室温で振とうし、遠心分離を行った後に、可溶性Fabを含有する上清を収集した。

【0145】

IgGの発現および精製

50

Mu 3 1 7 および h u 3 1 7 を合わせたリードパネル抗PD1抗体の重鎖ならびに軽鎖の可変ドメインをコードする哺乳動物コドン最適化合成遺伝子を、エフェクター機能を無効化したヒトIgG1（「IgG1ヌル（IgG1null）」；正常免疫グロブリンFcγR相互作用を無効にする、下方ヒンジ内にL234A、L235A、G237A変異を含有するヒトIgG1）およびヒトCκドメインをそれぞれ含有する、哺乳動物発現ベクターにクローン化した。哺乳動物発現系において、重鎖および軽鎖を含有するベクターの共トランスフェクションを実施し、次いでプロテインA系のIgG精製、定量、ならびに変性SDS-PAGEおよび非変性SDS-PAGE上でQCを行った。

【0146】

FabおよびIgGに対する直接結合ELISA

10

組換えタンパク質に対するリードパネルの結合および交差反応性は、最初に結合ELISAにより評価された。ヒトPD1のヒトFcタグ化組換えタンパク質、およびカニクイザルPD1のヒトFcタグ化組換えタンパク質で、MaxiSorp（商標）平底96ウェルプレートの表面上を1μg/mlでコーティングした。Fabサンプルは、1%スキムミルク/1×PBS中で1:5希釈で、室温で1時間、100μl/ウェルで加えた。IgGは、500nMから始まり0.98nMまでの2倍連続希釈で漸増して、コーティングされた抗原に結合できるようにした。Fabは、マウス抗c-myc抗体、次いで西洋ワサビペルオキシダーゼに結合したロバ抗マウスIgGを使用して検出された。IgGは、西洋ワサビペルオキシダーゼに結合したマウス抗ヒトIgGを使用して検出した。結合シグナルは、3, 3', 5, 5'-テトラメチルベンジジン基質溶液（TMB）を用いて可視化され、吸光度は450nmで測定した。

20

【0147】

IgG1ヌル抗体に対する、AlphaScreenエピトープ競合アッセイ

AlphaScreenアッセイ（パーキンエルマー社）は、384ウェルの白色マイクロタイタープレート（グライナー社）において25μlの最終量で実施した。反応緩衝液は、1×PBS pH7.3（Oxoid社、カタログ番号BR0014G）および0.05%（v/v）のTween（登録商標）20（シグマ社、カタログ番号P9416）を含有した。精製したIgGサンプルは、500nMの最終濃度で始まる3倍連続希釈で漸増され、室温で20分間、0.6nMの最終濃度でビオチン化ヒトPD1-His/Aviタグとともにインキュベートした。0.3nMでの親IgGおよび20μg/ml（最終濃度）での抗ヒトIgG1アクセプタービーズを添加し、混合物を室温で1時間インキュベートした。次いで、ストレプトアビジンドナービーズを20μg/ml（最終濃度）で添加し、室温で30分間インキュベートした。発光は、EnVisionマルチラベルプレートリーダー（パーキンエルマー社）において測定され、EnVisionマネージャーソフトウェアを使用して解析した。値は、1秒当たりのカウント数（CPS: Counts Per Second）として報告され、クロストークに対して補正された。

30

【0148】

IgGのフローサイトメトリー

精製したIgGを、ヒト（Genscript社、カタログ番号M00529）およびカニクイザル（Genscript社、カタログ番号M00572）のPD1を発現するCHO-K1安定発現株およびCHO-K1野生型細胞に対する結合に関して、FACにおいて試験した。IgGサンプルは、500nMに始まり0.98nMまでの3倍連続希釈で漸増した。IgGの結合は、FITCに結合したマウス抗ヒトIgGを用いて検出された。結果は、フローサイトメーターのBL-1チャンネル検出器（Attune（商標）NxT Acoustic Focusing Cytometer、Invitrogen/ThermoFisher Scientific社）において、1サンプル当たり10000個の細胞の平均蛍光強度（MFI）を検証することにより解析した。EC50値は、GraphPad Prismソフトウェア（GraphPad Software社、カリフォルニア州ラホヤ）においてMFI値と、4つのパラメータとを使

40

50

用して算出した。

【0149】

PD1 / PD-L1 細胞に基づくアンタゴニズムアッセイ

PD1 / PD-L1 遮断細胞系バイオアッセイ（プロメガ社）を用いて、抗体のPD1 / PD-L1 相互作用遮断能を測定した。アッセイ前日に、PD-L1 aAPC / CHO-K1 細胞を融解して、細胞回復培地（90%のハムF12 / 10%のFBS）に移した。96ウェル白色平底アッセイプレート2枚の60個の内側ウェルそれぞれに、1ウェル当たり100 μ lで、細胞懸濁液を注入した。外側ウェルとアッセイプレートとのそれぞれに細胞回復培地を加えて、37℃ / 5%のCO₂で一晩インキュベートした。アッセイの当日、サンプルIgGを、アッセイ緩衝液（99%のRPMI 1640 / 1%のFBS）中で300 nMから0.04 nMに4倍希釈し、希釈当たり40 μ lを、PD-L1 aAPC / CHO-K1 細胞を含有するアッセイプレートに添加した。陽性阻害対照には、ヒトPD1抗体AF1086（R&Dシステムズ社）、IgG1ヌル形式でのmu317およびIgG1ヌル形式でのペムプロリズマブma bアナログを含めた。陰性阻害対照としては、無関係のIgGを含めた。次いでアッセイ緩衝液（99%のRPMI 1640 / 1%のFBS）中で、PD1エフェクター細胞を融解して、細胞懸濁液を、PD-L1 aAPC / CHO-K1 細胞およびIgG用量設定サンプルを含有するアッセイプレートのウェルに添加した。アッセイプレートを、37℃ / 5%CO₂のインキュベーター内で6時間インキュベートし、5～10分間周囲温度と平衡にし、次いで80 μ lのBio-Glo（商標）試薬（プロメガ社）を添加した。アッセイプレートを、さらに5～30分間周囲温度でインキュベートし、次いで10分、20分、および30分において発光シグナルを測定した。

【0150】

同種異系混合白血球反応（MLR）アッセイ

健常なドナーよりのヒトPBMCを、バフィーコートから調製した。未発達単核球由来の樹状細胞（Mo-DC）を、磁気活性化細胞選別（MAC、Stemcell社）を用いたCD14+細胞の単離により調製し、7日間、分化培地（ミルテニー社（Miltenyi））で培養した。この7日間の期間の終了後、Mo-DCを、「未成熟（immature）」として分類し、未成熟MLRで使用できる状態にした。レスポンダーT細胞（低温保存したPBMCを用いることによる）を、T細胞単離キット（Stemcell社）を用いて、Mo-DCに用いられるのと異なるドナーから、必要な日に調製した。それぞれの実験条件下で（未成熟およびMoDC）、6つの別個のMLRを、生物学的変化を与えるように実施し、全ての条件を、技術的に3つ組で調製した。細胞を以下のとおり共培養した：1ウェル当たり、1 x 10⁴個のMo-DCおよび1 x 10⁵個のCD4+ T細胞+ / - 試験IgG抗体で、4日間。単一の細胞型（T細胞 / Mo-DC）コントロールを、各アッセイに含めた。培養期間終了後、上清を回収し、ELISAでIFN- γ を評価した。

【0151】

電荷バリエーション解析

被験物の電荷バリエーションのプロファイリングは、LabChip GXII Touch HT（パーキンエルマー社、英国ベコンズフィールド）において、製造元のプロトコルに従って、タンパク質電荷バリエーションアッセイにより決定した。

【0152】

DSC解析

被験物質のT_mは、MicroCal PEAQ-DSC（Malvern Instruments社、英国モルバーン）ランニングバージョン1.22ソフトウェアを使用して解析した。20～110℃の範囲にわたり200℃ / 時（hour）の速さでサンプルを加熱した。温度データは、タンパク質濃度に基づき正規化された。タンパク質のT_mは、加熱スキュンデータから決定された。

【0153】

強制酸化解析

強制酸化解析のために、PBS中の被験物を、以下に詳述するとおり、室温で2時間、0.5%のH₂O₂で処理し、次いでDionex Ultimate 3000RS HPLCシステム(ThermoFisher Scientific社、英国ヘルムステッド)でのSEC、HICおよびRP解析(インタクトな抗体およびサブユニット)前に-80℃で保存した。インタクトな抗体の還元に関して、DTTを最終濃度0.33Mまで添加して、サンプルを室温で1時間インキュベートし、RPで直ちに解析した。

【0154】

インタクトな抗体およびサブユニットのRP解析ークロマトグラフィー分離は、Dionex Ultimate 3000RS HPLCシステム(ThermoFisher Scientific社、英国ヘルムステッド)に接続されたPLRP-S 1000、5μm、2.1mm×50mmのカラム(Agilent Technologies社、英国ストックポート)を使用して実施した。この方法は、24分間にわたる、75%緩衝液A(0.075%のTFA、7.5%のアセトニトリルの水溶液)から、mAb1~4については50%緩衝液B(0.075%のTFA、7.5%のH₂Oのアセトニトリル溶液)またはmAb5については90%緩衝液Bまでの直線勾配で構成された。流速は、0.5mL/分、温度は解析中、70℃で維持された。検出は、280nmのUV吸収により実施された。

【0155】

SEC解析ークロマトグラフィーによる分離は、Dionex Ultimate 3000RS HPLCシステム(ThermoFisher Scientific社、英国ヘルムステッド)に接続された、Acquity UPLC Protein BEH SECカラム、200Å、1.7μm、4.6mm×150mm(Waters社、英国エルスツリー)およびAcquity UPLC Protein BEH SECガードカラム30×4.6mm、1.7μm、200Å(Waters社、英国エルスツリー)を使用して実施した。この方法は、15分にわたる定組成溶離から構成され、移動相は、0.2Mリン酸カリウム、pH6.8、0.2M塩化カリウムとした。流速は、0.25mL/分であった。検出は、280nmのUV吸収により実施された。

HIC解析ークロマトグラフィーによる分離は、Dionex Ultimate 3000RS HPLCシステム(ThermoFisher Scientific社、英国ヘルムステッド)に接続されたTSKgel Butyl-NPR 4.6mm×35mm HICカラム(TOSOH Bioscience Ltd.社、英国レディング)を使用して実施した。この方法は、9分間にわたる60%緩衝液A(100mMのリン酸ナトリウム、pH7.0、2M硫酸アンモニウム)から90%緩衝液B(100mMリン酸ナトリウム、pH7.0)までの直線勾配で構成された。流速は、1.2mL/分であった。検出は、280nmのUV吸収により実施された。

【0156】

抗体vドメインの特異性検証：ヒト受容体アレイ解析

ヒト細胞膜受容体プロテオームアレイを、Retrogenix社(Retrogenix Ltd.)で実施した。プライマリスクリーン：2μg/mlの各抗体を、5528個のヒト原形質膜タンパク質およびテザー分泌型タンパク質(tethered secreted protein)を個々に発現する、1スライド当たりの固定HEK293細胞に対する結合についてスクリーニングした。すべてのトランスフェクション効率が、最小閾値を超えていた。抗体結合は、AF647蛍光二次抗ヒトIgG1抗体を使用して検出した。プライマリーヒット(デュプリケートスポット)は、ImageQuant上で蛍光(AF647およびZsGreen1)を解析することにより特定した。確認/特異性スクリーニング：ZsGreen1のみをコードする発現ベクター、またはZsGreen1と、CD20、PD1、BTN2A1またはLSAMPとを、ヒトHEK293細胞にトランスフェクトした。各生存形質移入体を、被験抗体および陽性対照抗体リツキシマブまたは一次抗体なしのそれぞれを2μg/mlと共にインキュベートした。細胞

10

20

30

40

50

を洗浄し、細胞マイクロアレイスクリーニングで用いられるのと同じ A F 6 4 7 抗ヒト I g G F c 検出抗体と共にインキュベートした。細胞を再び洗浄し、A c c u r i フローサイトメーター（B D 社）を用いてフローサイトメトリーで解析した。7 A A D の L I V E / D E A D 染色を用いて、死細胞を除外して、Z s G r e e n 1 - 陽性細胞（すなわち、トランスフェクト細胞）を解析のために選択した。

【0157】

結果および考察

好ましいヒト生殖細胞系列 v - 遺伝子への C D R 移植

アゴニストマウス抗 P D 1 I g G M u 3 1 7 の C D R （国際公開第 2 0 1 5 / 0 3 5 6 0 6 A 1 号および表 2）を、C D R 移植法を使用して、ヒト生殖細胞系列免疫グロブリンの v - ドメインフレームワーク配列スキャホールドに最初に導入した。最適な薬剤様性能を有する最終リード治療用 I g G 化合物に向けて、遺伝子操作の努力を傾けるために、親抗体の C D R を、「好ましい」生殖細胞系列スキャホールドの I G H V 3 - 7 および I G K V 4 - 1 に移植することを選択した。それらスキャホールドは、良好な溶解性および薬剤開発クオリティを有することが知られており、発現されたヒト抗体レパートリーにおいて高頻度で使用されている。

【0158】

これらスキャホールドおよび移植された C D R の定義は、表 2 に概要を掲載した。h u 3 1 7 抗 P D 1 抗体の重鎖配列と軽鎖配列とについても表 2 に示す。この C D R 移植のプロセスは周知であるが、ヒト v - ドメイン配列の所与のセットが非ヒト C D R 移植にとって適切なアクセプターフレームワークとして機能するかどうかを予測するのは未だ困難である。不適切なフレームワークの使用は、標的結合機能の消失、タンパク質安定性の問題、さらには最終 I g G の発現の低下につながり得る。そこで C D R 突然変異誘導の鋳型として I G H V 3 - 7 / I G K V 4 - 1 移植が採用され、改善クローンを選択が行われた。

【0159】

ライブラリー作製およびスクリーニング

C D R が移植された I G H V 3 - 7 / I G K V 4 - 1 の v - ドメイン配列を、F a b ファージディスプレイ形式に組み込み、突然変異誘導ライブラリーカセットは、オリゴ合成およびアセンブリにより作製した。2つの別個の F a b ライブラリーが最初に構築されたことを意味しており、それぞれ、重鎖または軽鎖の v - ドメイン配列のいずれかにおいて、同系の対形成移植 v - ドメインと組み合わせられて変異多様性をサンプリングした。V H ライブラリーと V L ライブラリーの両方を別個にファージディスプレイベクター内にライゲートし、エレクトロポレーション法を介して大腸菌に形質転換して、それぞれ 3.15×10^9 および 2.27×10^9 個の独立したクローンを生成した。ライブラリーの構造品質は、1 ライブラリー当たり 96 個のクローンを配列解析することにより検証された。この配列解析データにより、マウスまたはヒトいずれかの生殖細胞系列の各相違位置の残基をコードする位置が、効率的におよそ 50 % の頻度でサンプリングされて、その位置は、意図するアミノ酸のくだんの位置でサンプリングされた非バイナリーのアミノ酸含量とともにサンプリングしたことが示された。ライブラリーは、ヘルパーファージ M 1 3 を使用してレスキューされ、選択はビオチン化されたヒトおよびカニクイザルの P D 1 - F c タンパク質に対して実施された。選択の初回ラウンド後、変異した V H ドメインおよび V L ドメインの 2 つのプールを第二のライブラリー内に再度組み込み、さらに 3 ラウンドの標準的な選択を、2 回の「ハンマーハグ」ラウンドを加えて実施した。

【0160】

選択後スクリーニング（図 1 A、1 B）および D N A シーケンシングにより、E L I S A においてヒトおよびカニクイザル P D 1 に強い結合と、A l p h a s c r e e n アッセイにおいてヒトおよびカニクイザル P D 1 への M u 3 1 7 I g G 1 の結合の > 50 % の阻害とを示した、712 個の F a b クローンが存在が明らかになった。これら 712 個のクローンで、すべての C D R 中における生殖細胞系列化変異が観察された（表 3）。リードクローンは、ヒトおよびカニクイザルの P D 1 - F c の両方への結合に対する E L I S

A シグナルと比較した C D R 生殖細胞系列化のレベルに基づき格付けされた。次いでこの格付けの上位 7 個のクローンの V ドメインを I g G 発現ベクターにサブクロニングし、以下のさらなる検証を行った (表 4)。

【0161】

生殖細胞系列化変異は、ライブラリー選択から直接誘導されたリードクローンのすべての C D R において観察されたが、配列解析を行うことで、ヒト化が最大となるようクローンをさらに設計することが可能となる可能性がある。ヒトおよびカニクイザルのタンパク質に対する結合シグナルを有する 712 個の配列-固有ヒットを使用して、この機能的に特徴解析された集団の C D R におけるマウスアミノ酸の保持頻度を解析した。位置的なアミノ酸保持頻度は、V_H ドメインおよび V_L ドメインでの百分率として表されている (図 2 A、2 B)。R F < 75 % を有するマウス残基は、一連のコンビナトリアルデザインにおいて、標的-結合パラトープに必須ではない可能性がある位置とみなされ、生殖細胞系列化に対し開かれている可能性がある (表 4)。V_H ドメイン (C D R-H3 を除く) において、C D R-H1 および H2 中の 15 個のマウス残基のうちの 5 個のみが、75 % を超える保持頻度を呈した (図 2 B)。V_L ドメインにおいて、Mu317 配列由来の 12 個のマウス C D R 残基のうち 6 個のみが、> 75 % の頻度で保持されていた (図 2 A)。この解析は、L C D R1 および L C D R3 配列が、I G K V4-1 に対して生殖系列同一性に近接させる可能性があることを強く示唆した。

【0162】

R F > 75 % のそれらマウス残基の組合せを含有するデザインには、「MH」という接頭辞 (MH = 最大限にヒト化 (Maximally Humanized)) をつけた。トータルで、以下の 12 個の初回デザイン V_H ドメインおよび V_L ドメインの組合せが生成された: MH1-MH12 (表 4)。MH クローンは、遺伝子合成により生成され、(上述の 7 個のライブラリー由来クローン、ならびに陽性対照の Mu317 および hu317 とともに) ヒト発現ベクターにクロニングされ、I g G1 ヌル形式で作製された。すべての I g G が、哺乳動物細胞の一過性トランスフェクションから容易に発現され、精製された。

【0163】

リード I g G の特異性および有効性の特徴解析

次いで上述の精製 I g G を、直接力価測定 E L I S A 形式において、ヒトおよびカニクイザルの P D 1-Fc への結合に関して試験した。この解析により、全てのライブラリー由来クローンと、デザインクローンの選択サブセット (MH4、MH8、MH12) とが、Mu317 と類似したまたは Mu317 よりも改善した、ヒトおよびカニクイザルの P D 1 結合プロファイルを示した (図 3 A、3 B)。デザインクローンの大部分 (MH1、MH2、MH3、MH5、MH6、MH7、MH9、MH19、MH11) が、一方または両方の P D 1 オルソログへの結合の減少を示して、これらクローンに存在する変異は、組み合わせで用いた場合に結合が崩壊することを示した。この知見は、図 2 A および 2 B に概要を示した変異マップを所有していたとしても、どの変異の組合せが最適な結果につながるかということを正確に予測することはできないということを強調した。

【0164】

ビオチン化単量体型ヒト P D 1 に対する mu317 I g G 結合との、P D 1 結合アフィニティおよびエピトープ競合に関するデザイン I g G の試験が可能である AlphaScreen アッセイを確立した。このアッセイにおいて、3 つのクローン全てが Mu317 との完全なエピトープ競合を示し、クローン MH8 が mu317 (mu317-0.37 nM、MH8-0.39 nM、MH12 0.624 nM、MH4、0.630 nM) に最も近い I C50 値を示した。

【0165】

細胞膜でのリード I g G 結合特異性のフローサイトメトリー解析

P D 1 に対する抗体を、フローサイトメトリーを介して、細胞表面での濃度依存性結合

に関して分析した。最初の解析は、ヒトまたはカニクイザルPD1で安定的にトランスフェクトしたCHO細胞で行った。これら解析では、リードライブラリー由来のクローンおよびデザインクローンは、hu317と類似のまたはhu317よりも改善された有効性で、膜に存在するヒトまたはカニクイザルPD1（図4A、4B）に対する濃度依存性結合を呈することが示された。非トランスフェクトCHO細胞においては、最も高い濃度であっても、いずれのクローンでも結合シグナルは観察されなかった。

【0166】

PD1-PDL1遮断アッセイにおけるリードIgG解析

細胞系PD1/PDL1遮断レポーターアッセイでは、全ての被験クローンは、PD1の濃度依存性アンタゴニズムを呈した。リードクローンMH4、MH8、MH12、09C06、17A12および20C07は、fold induction（誘導倍率）曲線と、mu317に高度に類似した最大シグナル値とを示した（図5）。次いで最大限にヒト化されたクローンMH4、MH8およびMH12（それぞれ図6A、6B、6C）を、このアッセイで再度検証し、mu317およびhu317 IgG1の両方と並行して実施した。これら解析により、これら3つのクローンは、重複する濃度依存性のfold induction（誘導倍率）曲線をもってmu317およびhu317の両方の有効性を完全に維持したことを示した。

【0167】

抗体vドメインT細胞エピトープ解析

インシリコ技術（Abzena, Ltd. 社）は、治療用抗体および治療用タンパク質中のT細胞エピトープの位置の特定に基づいており、Hu317およびリード抗体のvドメインの両方の免疫原性の評価に使用した。vドメイン配列の解析は、重複する9merペプチド（各々が最後のペプチドと8残基重複する）を用いて実施され、34種のMHCクラスIIアロタイプの各々に対して試験した。各9merを、MHCクラスII分子との潜在的な「適合」および相互作用に基づいてスコア化した。ソフトウェアにより算出されるペプチドスコアは、0～1の間である。高い平均結合スコアを出したペプチド（iTope（商標）スコアリング機能において>0.55）が強調された。MHCクラスII結合ペプチドの>50%（すなわち34種のアレルのうちの17種）が高い結合アフィニティ（スコア>0.6）を有する場合、そうしたペプチドは、「高アフィニティ」MHCクラスII結合ペプチドとして規定され、CD4+T細胞エピトープを含有するリスクが高いとみなされる。低アフィニティMHCクラスII結合ペプチドは、多くのアレル（>50%）に、>0.55の結合スコア（しかし大部分は>0.6ではない）で結合する。配列のさらなる解析は、TCED（商標）を使用して実施された。この配列を使用して、BLASTサーチによりTCED（商標）をデータ検索し、過去にAbzena Ltd. 社で実施されたインビトロT細胞エピトープマッピング研究でT細胞反応を刺激した非関連タンパク質/抗体由来のペプチド（T細胞エピトープ）間で任意の高い配列相同性を特定した。

【0168】

ペプチドを、以下の4つのクラスに分類した：高アフィニティ外来物（「HAF」－高免疫原性リスク）、低アフィニティ外来物（「LAF」－低免疫原性リスク）、TCED+（過去にTCEDデータベースにおいて特定されたエピトープ）、および生殖細胞系列エピトープ（「GE」－高いMHCクラスII結合アフィニティを有するヒト生殖細胞系列ペプチド配列）。生殖細胞系列エピトープの9merペプチドは、広範な生殖細胞系列ペプチドを用いた過去の研究により立証されたように、T細胞寛容によって免疫原性である可能性は低い。重要なことは、そうした生殖細胞系列のvドメインエピトープ（ヒト抗体定常領域中の類似配列によりさらに補助される）は、抗原提示細胞の細胞膜でのMHCクラスII占有に関して競合するため、T細胞刺激に必要とされる「活性化閾値」を達成するのに十分な外来性ペプチド提示のリスクを低下させることである。ゆえにGE含量が高いことは、抗体治療剤の臨床開発において有益な性質である。

【0169】

図7および表5に示されるように、重要なリードvドメインは、Hu317と比較してペプチドエпитープ含量において有意に有益な変化を示した。本明細書において採用したvドメインの操作プロセスは、Hu317のCDR中に含有される相当数のマウス残基(表2)をヒト化しつつ、抗PD1の有効性を維持した抗体の選択に成功した。そのため、Hu317のvドメインにある複数のHAFおよびLAFのエпитープ(図7A)は、ライブラリー由来リードおよびデザインリードにおいて存在しなかった(表5)。予期せずに、GEエпитープ含量が、特にリードクローン(図7B~H)のVH領域内で有意に増加しており(全てのリードにおいて5から ≥ 14)、またTCED+エпитープは、全てのリードにおいて減少した(表5)。VHドメインにおける免疫原性リスクの顕著な改善は、特にIGHV3-7生殖細胞系列に合わせるようにHu317のCDRを適合することによって介在されたが、これは本発明者らが、そのフレームワーク内に、IGHV4-4 VHを移植したHu317フレームワーク内に存在したよりも多くのGEエпитープを含有していることが、ここで(はじめて)示すことである。例えば、HC DR2配列の最後の7残基をIGHV3-7(全てのリードクローン内のYVDSVKG(配列番号80)、表4)に適合するように生殖細胞系列化することにより、GEが、C末端のHC DR2とN末端のフレームワークの3領域(VKGRFTISR(配列番号81))とにわたるものとなるように保持することが可能になる。さらに、HC DR1配列の「GFSLTSYGVH」(配列番号82)から配列「GFTFSSSYGMH」(配列番号57)への変異(クローン09C06、17A12、17D08、17G08および15D07に存在する)が、HC DR1とHu317のフレームワーク2領域とにわたるLAF配列「LTSYGVHWI」(配列番号83)を除去するだけでなく、このCDRの完全な生殖細胞系列のヒトv-遺伝子IGHV3-33およびIGHV3-30-5に対する同一性も与える。HC DR1配列「GFTFSSSYGMS」(配列番号33)(クローン20C07および全てのデザインクローンMH1-MH18に存在、表4)がまた、LAF配列「LTSYGVHWI」(配列番号83)を除去する。両ヒト化CDR1配列が、Hu317またはライブラリー由来クローン11C08のいずれにも存在しないGEペプチド配列「YGM(H/S)WVRQA」(配列番号84)をコードしたが、これは9位におけるそれらのHC DR1におけるバリン残基(例えばGFSLTSYGVH(配列番号82))の存在に起因する。

【0170】

重要なことは、複数の外来性エпитープも、リードクロンの他のCDR中に存在する生殖細胞系列化変異によって除去された。例えば、HC DR3とHu317のフレームワーク4とにわたる、TCED+とLAFのペプチド「YWYIDVWGQ」(配列番号85)が、6位のVからRへの変異により、大部分のリードクローンにおいて除去された(表4)。同様に、クローンMH1-MH18および09C06において、HAFペプチド「LEWIGV IYA」(配列番号86)およびLAFペプチド「IGV IYADGS」(配列番号87)であっていずれもHu317に存在するこれらペプチドが、残基「IGV」から「VAN」への変異によって同時に除去された(表4、表5)。HAFペプチド「LEWVGVIWQ」(配列番号88)は、Hu317からの「LEWIGV IYA」(配列番号86)HAFと重複する、クローン11C08のVHドメインに存在したが、一方でLAFペプチドは、「IGV IYADGS」(配列番号87)は除去された。クローン17A12では、Hu317よりの「LEWIGV IYA」(配列番号86)HAFは、LAFペプチド「LEWLANIWQ」への変異によって一部除去された。

【0171】

Hu317のVL領域および全てのリードにおいて、上記で概説した、LC DR2の3位のFの変異(YAFHRT(配列番号31))によってLC DR2における酸化リスクを除去する変異を導入したにもかかわらず、外来性エпитープに対するGEの全体的なバランスは増加しなかった(図7、表5)。総合して、上記に概説した免疫原性についての知見は、VHドメイン内の複数のCDR位置の広範囲のいまだ予測できない生殖細胞系列化(特に、IGHV3-7フレームワーク内への)を通じて、リード抗体がいくつかの

有意な高リスクなヒト T 細胞エピトープペプチド配列を達成し、またいくつかの免疫原性を減少させる可能性のある G E を獲得し、これにより外来性エピトープに対する G E の割合を大きく向上させるということを示した。

【0172】

M L R アッセイにおけるリード I g G 有効性

この試験では、培養液の上清中の I F N - γ を測定することによって、ヒト同種異系 M L R におけるリード P D - 1 標的抗体の有効性を特徴決定することを目指した。コントロール条件下で (図 8 A)、サイトカイン濃度より、ニボルマブアナログが、アイソタイプコントロールヒト I g G 4 と比較して I F N - γ 濃度を有意に増大させることが示された。アイソタイプは、細胞のみと比較して何も差異を示さなかったが、単一細胞条件では、測定可能でないサイトカインとほとんど差がなかった。

10

【0173】

全てのコントロールが、予測されたシグナルを示したため、アッセイにおいてクローン 0 9 C 0 6、M H 4、M H 8 および M H 1 2 の活性について検証した。4 つの被験抗体を、3 つの濃度 (0. 1、1 および 1 0 μ g / m L) で用いて、適切なアイソタイプコントロール、ヒト I g G 1 と比較した。全ての 4 つの被験抗体で、細胞培養液上清内での I F N - γ 産生が、用量依存的に、有意に増加した (図 8 B)。このデータは、与えられた全ての 4 つの被験抗体が、h I g G 1 と比較したときに、同種異系 M L R において I F N - γ 産生を促進することが可能であることを示している。最後に、クローン H u 3 1 7、M H 4 および M H 8 を、幅広い濃度範囲にわたってアッセイで試験した (図 8 C)。この解析により、クローン M H 4 および M H 8 の両方が、関連するヒト生体外有効性アッセイにおいて、H u 3 1 7 と完全に重複する濃度依存性活性を保持することが示された。

20

【0174】

電荷バリエーション解析

電荷の不均一性解析は、産物の品質および均一性についての重要な情報を提供することから、モノクローナル抗体の特徴解析で広く用いられる。不均一性は、例えばグリコシル化、リジン切断、酸化または脱アミド化等である酵素的な翻訳後修飾により生じる可能性がある。I g G における不均一性は、製造上のリスクであり、またバイオプロセスプロトコルにおいて複雑さを増大させる可能性がある。

【0175】

タンパク質電荷バリエーションアッセイは、優勢な産物のピークと比較して塩基性および酸性のタンパク質バリエーションの特徴解析を可能にする。このマイクロ流体チップ技術は、蛍光標識後のタンパク質電荷バリエーションを分離する。0 9 C 0 6、M H 4、M H 8 M H 1 2 および h u 3 1 7 の I g G の電荷バリエーションプロファイルを示す。図 9 に示す。0 9 C 0 6、M H 4、M H 8 および M H 1 2 の全ての m A b が、高度に均一なプロファイルを示し、主要なアイソフォームは、タンパク質全体に対して 7 7. 4 ~ 8 2. 8 % を含有している (表 6)。しかしながら対照的に、H u 3 1 7 では、予期せずに、4 つの別個のピークをもつより複雑なプロファイルを示し、塩基性アイソフォームはより高い割合 (2 3. 1 %) であり、また主要なアイソフォームは全体に対して < 6 9 % を示した。クローン 0 9 C 0 6、M H 4、M H 8 および M H 1 2 の電荷均一性の、H u 3 1 7 に対するこれら有意な改善は、C D R 中のあらゆる可能性のある o - 結合グリコシル化、脱アミド化または異性化部位は維持され、かつ n - 結合グリコシル化部位は何も導入されていないことから、リード I g G の C D R における可能性のある翻訳後修飾部位の除去によって即座に説明されるものではない (表 2 および 4)。このように改善された均一性は、熱安定性の改善、または酸化に対する抵抗性の改善により引き起こされている可能性もあるため、そうした特性を調べた。

30

40

【0176】

D S C を用いた熱安定性評価

タンパク質の D S C プロファイルは、その熱安定性を介した、その全体的な構造安定性についての情報を与えるが、構造的な改変を評価するための構造的な「フィンガープリン

50

ト」を表すことも可能である。インタクトな抗体のサーモグラムは、2または3のピークを呈し得るが、最大のピークはF a bフラグメントからの寄与を含有している。通常、最初の遷移は、C H 2ドメインの変性（u n f o l d i n g）をカバーしており、一方で最後の遷移はC H 3ドメインの変性を含むことがある。F a bの変性は、C H 2およびC H 3ドメインの変性と比較して別の温度で発生し得るが、F a bフラグメントの変性がC H 2またはC H 3ドメインのいずれの変性を「埋め込み」、ピークの重なりを招く可能性もある。定常ドメインは、同一のサブクラスの抗体に対して事実上同一であるため、C H 2およびC H 3ドメインは、匹敵するT mを有するはずであるが、F a bのT mは、抗体ごとに変動することとなる。

【0177】

試験された5つのI g Gすべて（09C06、MH4、MH8、MH12およびHu317）が、D S C解析に完全に匹敵し、そして良好な解析データ（図10）を与え、匹敵するサンプル均一性および協同性を示した。図10Aにおいて（09C06 I g G）、最初の遷移は、C H 2ドメインの変性を表し、第二の遷移はF a bフラグメントの変性を表し、そして第三の遷移はC H 3ドメインの変性を表す。クローンMH4、MH8およびMH12に関しては、主要なF a b遷移はより低く、C H 2ドメインと重なっている（図10B～D）。クローンHu317に関しては、F a bドメインの遷移は、実際により高いが、C H 3と重なっている（図10E）。全体として、F a b変性のT m値は、リードクローン09C06、MH4、MH8およびMH12のvドメインが、比較的安定したままで、Hu317のそれと比較して全体的な安定性が実際に低いということを示した（表7）。

【0178】

強制酸化解析

例えばトリプトファンおよびメチオニン等の露出アミノ酸残基の酸化は、m A bにとってのよくある分解経路であり、それらの生物学的活性および不均一性に影響を及ぼす可能性があることにより、それらの構造的完全性を変えるものである。この実験において、0.5%のH2O2を用いて、2時間、室温での強制酸化を、09C06、MH4、MH8、MH12およびHu317であるI g Gに行った。酸化は、酸化型の極性を上昇させることかまたはコンホメーション変化を通じてかのいずれかでの、抗体全体の疎水性を変化させる場合があるため、強制酸化により誘導された潜在的な変化を、分子ふるい（S E C）、逆相（R P）および疎水性相互作用（H I C）のクロマトグラフィー法により解析した。

S E C解析—強制酸化により誘導される、S E Cプロファイルにおける有意な変化は、5つのI g Gのいずれにおいても観察されず、より高分子量のアイソフォームでは、タンパク質全体のうちの0.6%未満のままであった（表8）。

R P解析—H2O2処理により、インタクトなm A b（非還元および還元）の保持時間の有意な変化は観察されなかったが、露出アミノ酸の最小限の酸化が示唆された（表8）。

H I C解析—H2O2での処理により、5つ全ての被験体に関して、H I Cにおける保持時間がわずかな分（0.4～0.6分）での減少のみが誘導されたが、露出アミノ酸の限定的な酸化が示唆された（表8）。

【0179】

まとめると、これらデータにより、リードI g Gの09C06、MH4、MH8およびMH12は、Hu317と比較して、安定性の改善または可能性のある酸化分解の軽減を示さないこと、および安定性変化も翻訳後のC D R改変モチーフの変化もいずれも、観察される電荷均一性の改善の原因とならないことが確認された。

【0180】

抗体結合特異性解析

Hu317およびクローンMH4、MH8およびMH12のプロテオーム選択性を調べるために、5528個の固有のヒト細胞膜受容体およびテザー分泌型タンパク質を発現する細胞の高密度アレイを用いることに基づくインビトロ技術（R e t r o g e n i x, L

t d. 社)を用いて、精製した I g G 形式での非特異的 (o f f - t a r g e t) な結合特異性をスクリーニングした。この受容体アレイ結合スクリーニングにより、H u 3 1 7 が、その他のタンパク質への測定可能な結合をせずに、独占的に膜発現 P D 1 への強い結合を示すことが特定された (表 1 2)。対照的に、クローン M H 4、M H 8 および M H 1 2 はまた、P D 1 に関しては最も強いシグナルを示した状態で、非常に限定的なシグナルを示したが、以下の可能性のある新規の 2 つの結合特異性も有していた: B N T 2 A 1 (寄託番号 N M _ 0 0 7 0 4 9) および L S A M P (B C 0 3 3 8 0 3)。M H 1 2 は、B N T 2 A 1 に対する任意の結合シグナルを見せる唯一のクローンであった。直交性の、高感度アッセイによりこの知見を調べるために、C D 2 0、P D 1、B T N 2 A 1、L S A M P および Z S グリーンのみ (陰性対照) をコードするプラスミドを用いて、ヒト細胞株 H E K 2 9 3 の一過性トランスフェクションを実行した。次いで、トランスフェクト細胞は、H u 3 1 7、M H 4、M H 8、M H 1 2 およびリツキシマブの I g G を用いて染色した。P D 1 トランスフェクト細胞の $2 \mu\text{g}/\text{ml}$ での染色において、リツキシマブおよび二次のみのコントロール以外の全ての被験抗体が、P D 1 トランスフェクト細胞で予測された強力で特異的な染色を示したが、Z S グリーントランスフェクト細胞では示さなかった (図 1 1)。H u 3 1 7 I g G は、P D 1 トランスフェクト細胞以外のいずれの細胞に対しても結合を示さなかったが、この I g G は完全に P D 1 選択的であるというチップ解析の知見が確認された。リツキシマブ陽性対照では、C D 2 0 トランスフェクト細胞の強力で特異的な染色が示され、また陰性対照 (二次標識抗体のみ) では、いずれの細胞に対しても結合を示さなかった (図 1 1)。対照的に、クローン M H 8 および M H 1 2 のみは、P D 1 および L S A M P の両方に対して明確な結合シグナルを示したが、B T N 2 A 1 に対しての結合は示さず、これはヒストグラム解析 (図 1 1) においても、Z S グリーンのみでトランスフェクトした細胞に対する平均経口測定 (f o l d - c h a n g e (変化倍率)) (表 1 3) においてもいずれでもであった。クローン M H 8 および M H 1 2 に関するヒト受容体プロテオームにおける、この予期せぬ、新規に得られた、単一の新規タンパク質に対する反応性は、治療に有益である可能性があるものであり得、これは L S A M P が、細胞表面受容体であってその発現が例えば急性骨髄性白血病等の特定の腫瘍の種類において発現上昇することが示されているような細胞表面受容体であり (C o c c a r o, N. e t a l. C a n c e r G e n e t i c s 2 0 1 5, 2 0 8 (1 0) : 5 1 7 - 5 2 2)、そのために P D 1 に加えて共に標的とする際に重要なものであるからである。

【0181】

本発明は好ましい実施形態または例示的实施形態を参照して記載されているが、当業者であれば、本発明の主旨および範囲を逸脱することなくそれらに対する様々な改変および変動を行うことが可能であること、およびそうした改変は本明細書において予期されることが明白であると認識するであろう。本明細書に開示される、および添付の特許請求の範囲に記載される特定の実施形態に関し、限定は意図されておらず、何らの示唆もないものとする。

【0182】

限定されないが特許、特許出願、記事、書誌、および論文を含む本明細書に引用されるすべての書面、または書面の一部は、その全体ですべての目的に対し、参照により明示的に本明細書に組み込まれる。組み込まれた書面、または書面の一部の 1 つまたは複数が、本出願の用語定義と矛盾する用語を定義する場合、本出願にある定義が優先される。しかしながら、本明細書に引用されるすべての参考文献、記事、公表文献、特許、公表特許、および特許出願に関する言及は、それらが正当な先行技術を構成する、または世界の任意の国における普遍的で一般的な知識の一部を形成するという承認、または任意の形態の示唆として見なされず、または見なされるべきではない。

【表 1】

表 1. 本明細書に規定されるマウス抗PD1 CDRのアミノ酸配列（「統合」スキーム）の代替的定義との比較。

スキーム	<u>HCDR1</u>	<u>HCDR2</u>	<u>HCDR3</u>	<u>LCDR1</u>	<u>LCDR2</u>	<u>LCDR3</u>
統合	GFSLTSYGVH (配列番号 89)	LGV IWAGGSTNYNSALMS (配列番号 94)	AYGNYWYIDV (配列番号 101)	KASQSVSNDVA (配列番号 105)	YAFHRFT (配列番号 109)	HQAYSSPYT (配列番号 111)
Kabat	SYGVH (配列番号 90)	VIWAGGSTNYNSALMS (配列番号 95)	AYGNYWYIDV (配列番号 101)	KASQSVSNDVA (配列番号 105)	YAFHRFT (配列番号 109)	HQAYSSPYT (配列番号 111)
Chotia	GFSLTSY (配列番号 91)	WAGGST (配列番号 96)	AYGNYWYIDV (配列番号 101)	KASQSVSNDVA (配列番号 105)	YAFHRFT (配列番号 109)	HQAYSSPYT (配列番号 111)
IMGT	GFSLTSYG (配列番号 92)	IWAGGSTN (配列番号 97)	ARAYGNYWYIDV (配列番号 102)	QSVSND (配列番号 106)	YAF (配列番号 111)	HQAYSSPYT (配列番号 111)
AHo	GFSLTSYGVH (配列番号 89)	IWAGGSTNYNSALMS (配列番号 98)	AYGNYWYID (配列番号 103)	ASQSVSND (配列番号 107)	YAFHRFT (配列番号 109)	AYSSPY (配列番号 112)
AbM	GFSLTSYGVH (配列番号 89)	VIWAGGSTNY (配列番号 99)	AYGNYWYIDV (配列番号 101)	KASQSVSNDVA (配列番号 105)	YAFHRFT (配列番号 109)	HQAYSSPYT (配列番号 111)
Contact	TSYGVH (配列番号 93)	LGV IWAGGSTNY (配列番号 100)	ARAYGNYWYID (配列番号 104)	SNDVAWY (配列番号 108)	LLIYYAFHRF (配列番号 110)	HQAYSSPY (配列番号 113)

10

20

30

40

表 2. MU317マウス抗PD1 v-ドメイン (mVH/mVL) およびヒト生殖細胞系列CDR移植 (VH1/VL1) のアミノ酸配列

Vドメイン		ヒト生殖細胞	
シ	系列 ¹	アミノ酸配列 ²	
Mu317 VH	n/a	<u>QVQLKESGPGLVAPSKNLSITCTVSGFSLTSYGVHWIRQPPGKGLEWLGVIWAGGSTNNSALMSRLSISKDNRSQVFLRMNSLQTD</u> <u>DDTAMYYCARAYGNY</u> <u>WYIDVWGAGTTVTVSS</u> (配列番号114)	
Hu317 VH	IGHV4-4	<u>QVQLQESGPGLVKFPSETLSLTCTVSGFSLTSYGVHWIRQPPGKGLEWIGVIYADGSTNPNPSLKSRVTISKDTSKNQVSLKLSSTAA</u> <u>DTAVYYCARAYGNY</u> <u>WYIDVWGAGTTVTVSS</u> (配列番号115)	
VH移植	IGHV3-7 ³	<u>EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFSLTSYGVHWVVRQAPGKGLEWLGVIWAGGSTNNDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCARAYGNY</u> <u>WYIDVWGAGTTVTVSS</u> (配列番号116)	
Mu317 VL	n/a	<u>DIVMTQTPKFLLVSAGDRVITITCKASQSVSNDVAWYQQKPGQSPKLLIN</u> <u>YAFHRT</u> <u>GVDPDRFTGSGYGTDFIFTTSTVQAEDLAVYFC</u> <u>HQAYSSPYTFGGGT</u> KLEMK (配列番号117)	
Hu317 VL	IGKV4-1	<u>DIVMTQSPDSLAVSLGERATINC</u> <u>KSSESVSNDVAWYQQKPGQPPKLLIN</u> <u>YAFHRT</u> <u>GVDPDRFSGSGYGTFTLTITSSLQAEDVAVYYC</u> <u>HQAYSSPYTFGGGT</u> KLEIK (配列番号118)	
VL移植	IGKV4-1 ³	<u>DIVMTQSPDSLAVSLGERATINC</u> <u>KSSQSVSNDVAWYQQKPGQPPKLLIN</u> <u>YAFHRT</u> <u>GVDPDRFSGSGYGTFTLTITSSLQAEDVAVYYC</u> <u>HQAYSSPYTFGGGT</u> KLEIK (配列番号119)	

¹IMGTシステムに基づく、移植に使用されたヒト生殖細胞系列の定義。²CDR残基は、太字および下線を施して示されている。上述のように、本明細書で使用される「統合」CDR定義は、古典的なKabat定義と比較すると拡張された定義である。上述の各配列は、以下の順序でフレームワーク領域 (FR) およびCDRを示している：FR1-CDR1-FR2-CDR2-FR3-CDR3-FR4。³ライブラリー構成に用いた移植

【表 3 - 1】

表 3. ヒトおよびカニクイザルのPD1タンパク質への結合を示したFabクローンの固有CDR.

<u>HCDR1</u>	<u>HCDR2</u>	<u>HCDR2 contd</u>	<u>HCDR2 contd</u>	<u>HCDR3</u>	<u>LCDR1</u>	<u>LCDR2</u>	<u>LCDR3</u>
GFNFSSYGWH (配列番号 120)	LANIKADGSEKYVDSVKG (配列番号 147)	LGNIKQGGSENYVDSVKG (配列番号 210)	VANIWDGSGTKYVDSVKG (配列番号 233)	AFGNYWYIDV (配列番号 337)	KSSSEYGNDLA (配列番号 397)	YAFHRES (配列番号 400)	HQAYSNPYT (配列番号 407)
GFNFSSYGWH (配列番号 42)	LANIKADGSENYVDSVKG (配列番号 148)	LGNIKQGGSTKYVDSVKG (配列番号 211)	VANIWDGSGSEKYVDSVKG (配列番号 275)	AWGNYWYIDV (配列番号 338)	KSSSEYGNDA (配列番号 398)	YAFHRET (配列番号 401)	HQAYSTPYT (配列番号 406)
GFNFSSYGMS (配列番号 121)	LANIKADGSTKYVDSVKG (配列番号 149)	LGNIKQGGSTNYVDSVKG (配列番号 212)	VANIWDGSGTKYVDSVKG (配列番号 276)	AYGAYWYIDV (配列番号 339)	KSSSEYGNDLA (配列番号 399)	YAFHFA (配列番号 402)	QQAYSSPYT (配列番号 408)
GFNFSSYGWH (配列番号 122)	LANIKADGSTNYVDSVKG (配列番号 150)	LGNIKQGGSEKYVDSVKG (配列番号 213)	VAVIKADGSGTKYVDSVKG (配列番号 277)	AYGEYWYIDV (配列番号 340)	KSSQSVGNDA (配列番号 397)	YAFHRS (配列番号 403)	QQAYSTPYT (配列番号 408)
GFNFSSYGVS (配列番号 123)	LANIKAGSEKYVDSVKG (配列番号 151)	LGNIKQGGSEKYVDSVKG (配列番号 214)	VAVIKQDGSSENYVDSVKG (配列番号 278)	AYGFYWYIDV (配列番号 341)	KSSQSVGNDA (配列番号 397)	YAFPRFT (配列番号 404)	QQSYSTPYT (配列番号 408)
GFNFSSYWH (配列番号 124)	LANIKAGSEKYVDSVKG (配列番号 152)	LGNIKQGGSENYVDSVKG (配列番号 215)	VAVIKQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 279)	AYGGYWYIDV (配列番号 342)	KSSQSVGNDA (配列番号 397)	YAFTRFS (配列番号 405)	
GFNFSSYGWH (配列番号 59)	LANIKAGSENYVDSVKG (配列番号 153)	LGNIKQGGSENYVDSVKG (配列番号 216)	VAVIKQDGSSTNYVDSVKG (配列番号 280)	AYGHWYIDV (配列番号 343)	KSSQSVGNDA (配列番号 397)	YAFTRFT (配列番号 406)	
GFNFSSYGMS (配列番号 47)	LANIKQDGSSEKYVDSVKG (配列番号 154)	LGNIKQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 217)	VAVIKQDGSSTNYVDSVKG (配列番号 281)	AYGIYWYIDN (配列番号 344)	KSSQSVGNDA (配列番号 397)	YASHRFS (配列番号 79)	
GFNFSSYGWH (配列番号 125)	LANIKQDGSSENYVDSVKG (配列番号 155)	LGNIKQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 218)	VAVIKQDGSSEKYVDSVKG (配列番号 282)	AYGNVWYIDV (配列番号 345)		YASHRFT (配列番号 45)	
GFNFSSYGVS (配列番号 126)	LANIKQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 156)	LGNIKQDGSSTNYVDSVKG (配列番号 219)	VAVIKQDGSSENYVDSVKG (配列番号 283)	AYGNVWYIDV (配列番号 345)		YAVHFT (配列番号 37)	
GFNFSSYWH (配列番号 127)	LANIKQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 157)	LGNIKQDGSSTNYVDSVKG (配列番号 220)	VAVIKQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 284)	AYGNFYIDV (配列番号 346)		YAVHRS (配列番号 78)	

【表 3 - 2】

GFSLSSYGIS (配列番号 128)	LANIWADGSEKYNDVSVKG (配列番号 158)	LGNIWAGGSENYVDVSVKG (配列番号 221)	VAVIWADGSTKYVDVSVKG (配列番号 285)	AYGNYFYIDV (配列番号 347)			
GFSLSSYGWH (配列番号 129)	LANIWADGSEKYVDVSVKG (配列番号 159)	LGNIWQDGSEKYNDVSVKG (配列番号 222)	VAVIWADGSTNYNDVSVKG (配列番号 286)	AYGNYHYIDV (配列番号 348)			
GFSLSSYGWS (配列番号 39)	LANIWADGSENYNDVSVKG (配列番号 160)	LGNIWQDGSEKYVDVSVKG (配列番号 223)	VAVIWQDGSEKYNDVSVKG (配列番号 287)	AYGNYMYIDV (配列番号 349)			
GFSLSSYGVH (配列番号 130)	LANIWADGSENYVDVSVKG (配列番号 161)	LGNIWQDGSENYNDVSVKG (配列番号 224)	VAVIWQDGSENYNDVSVKG (配列番号 288)	AYGNYPYIDV (配列番号 349)			
GFSLSSYGVV (配列番号 131)	LANIWADGSTKYNDVSVKG (配列番号 162)	LGNIWQDGSENYVDVSVKG (配列番号 225)	VAVIWQDGSENYVDVSVKG (配列番号 289)	AYGNYQYIDV (配列番号 350)			
GFSLSSYWMH (配列番号 132)	LANIWADGSTKYVDVSVKG (配列番号 163)	LGNIWQDGSTKYNDVSVKG (配列番号 226)	VAVIWQDGSTKYNDVSVKG (配列番号 290)	AYGNSYVYIDV (配列番号 351)			
GFSLTSYWMH (配列番号 133)	LANIWADGSTNYNDVSVKG (配列番号 164)	LGNIWQDGSTKYVDVSVKG (配列番号 227)	VAVIWQDGSTKYVDVSVKG (配列番号 291)	AYGNYVYIDV (配列番号 352)			
GFTFSSYGWH (配列番号 57)	LANIWADGSTNYVDVSVKG (配列番号 165)	LGNIWQDGSTNYNDVSVKG (配列番号 228)	VAVIWQDGSTNYNDVSVKG (配列番号 292)	AYGNYWYADV (配列番号 353)			
GFTFSSYGWS (配列番号 33)	LANIWAGGSTNYNDVSVKG (配列番号 166)	LGNIWQDGSTNYVDVSVKG (配列番号 229)	VAVIWQDGSTNYVDVSVKG (配列番号 40)	AYGNYWYGDV (配列番号 354)			
GFTFSSYGVH (配列番号 49)	LANIWQDGSEKYNDVSVKG (配列番号 167)	LGNIWQGGSTNYNDVSVKG (配列番号 230)	VAVIWQGGSTKYNDVSVKG (配列番号 293)	AYGNYWYIDA (配列番号 355)			
GFTFSSYGVV (配列番号 134)	LANIWQDGSEKYVDVSVKG (配列番号 168)	LGVIKADGSENYNDVSVKG (配列番号 231)	VGNIKADGSENYNDVSVKG (配列番号 294)	AYGNYWYIDE (配列番号 356)			
GFTFTSYGWH (配列番号 135)	LANIWQDGSENYNDVSVKG (配列番号 169)	LGVIKADGSTKYNDVSVKG (配列番号 232)	VGNIKADGSTKYNDVSVKG (配列番号 295)	AYGNYWYIDF (配列番号 357)			
GFTFTSYGWS (配列番号 136)	LANIWQDGSENYVDVSVKG (配列番号 53)	LGVIKADGSTNYNDVSVKG (配列番号 234)	VGNIKADGSTNYNDVSVKG (配列番号 296)	AYGNYWYIDG (配列番号 358)			

10

20

30

40

【表 3 - 3】

GFFTSYGVH (配列番号 137)	LANIWDGSGTKYNDSVKG (配列番号 170)	LGVTKQDGSSEYNDSVKG (配列番号 235)	VGNIKAGGSTNYVDSVKG (配列番号 297)	AYGNYWYIDH (配列番号 359)			
GFFTSYGVS (配列番号 138)	LANIWDGSGTKYVDSVKG (配列番号 171)	LGVTKQDGSSTKYNDVKG (配列番号 236)	VGNIKQDGSSEYNDSVKG (配列番号 298)	AYGNYWYIDI (配列番号 360)			
GFTLSSYGWH (配列番号 54)	LANIWDGSGTNNVDSVKG (配列番号 172)	LGVTKQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 237)	VGNIKQDGSSEYNDSVKG (配列番号 299)	AYGNYWYIDK (配列番号 361)			
GFTLSSYGMS (配列番号 139)	LANIWDGSGTNNVDSVKG (配列番号 48)	LGVTKQDGSSTNNVDSVKG (配列番号 238)	VGNIKQDGSSTNNVDSVKG (配列番号 300)	AYGNYWYIDL (配列番号 362)			
GFTLSSYGWH (配列番号 140)	LANIWDGGSSEYNVDSVKG (配列番号 173)	LGVTKQDGSSEYNDSVKG (配列番号 239)	VGNIKQDGSSTNNVDSVKG (配列番号 301)	AYGNYWYIDM (配列番号 363)			
GFTLSSYGVS (配列番号 141)	LAVIKADGSEKYNDSVKG (配列番号 174)	LGVTWADGSEKYNDSVKG (配列番号 240)	VGNIKQDGSSTNYVDSVKG (配列番号 302)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)			
GFTLSSYGWH (配列番号 142)	LAVIKADGSEYNVDSVKG (配列番号 175)	LGVTWADGSEYNVDSVKG (配列番号 241)	VGNIKQDGSSTKYNDVKG (配列番号 303)	AYGNYWYIDS (配列番号 364)			
GFTLTSYGWH (配列番号 143)	LAVIKADGSGTKYVDSVKG (配列番号 176)	LGVTWADGSGTKYNDSVKG (配列番号 242)	VGNIWADGSEYNDSVKG (配列番号 304)	AYGNYWYIDT (配列番号 365)			
GFTLTSYGMS (配列番号 144)	LAVIKADGSGTNNVDSVKG (配列番号 177)	LGVTWADGSGTKYVDSVKG (配列番号 243)	VGNIWADGSGTKYVDSVKG (配列番号 305)	AYGNYWYIDW (配列番号 366)			
GFTLTSYGWH (配列番号 145)	LAVIKAGGSTNNVDSVKG (配列番号 178)	LGVTWADGSGTNNVDSVKG (配列番号 244)	VGNIWADGSGTNNVDSVKG (配列番号 306)	AYGNYWYIDY (配列番号 367)			
GFTLTSYGVS (配列番号 146)	LAVIKQDGSSEKYNDSVKG (配列番号 179)	LGVTWADGSGTNNVDSVKG (配列番号 245)	VGNIWADGSGTNNVDSVKG (配列番号 307)	AYGNYWYIEV (配列番号 368)			
	LAVIKQDGSSTNNVDSVKG (配列番号 180)	LGVTWADGSGTNNVDSVKG (配列番号 246)	VGNIWQDGSSEKYNDSVKG (配列番号 308)	AYGNYWYLDV (配列番号 369)			
	LAVIKQDGSSTNNVDSVKG (配列番号 181)	LGVTWAGSGTNNVDSVKG (配列番号 247)	VGNIWQDGSSEKYNDSVKG (配列番号 309)	AYGNYWYMDV (配列番号 370)			

10

20

30

40

【表 3 - 4】

	LAVIWADGSEKYNDVSVKG (配列番号 182)	LGVIWPDGSTNYNDVSVKG (配列番号 248)	VGNIWQDGSSENVVDSVKG (配列番号 310)	AYGNYWYSDV (配列番号 371)			
	LAVIWADGSENVVDSVKG (配列番号 183)	LGVIWQDGSSEKYNDVSVKG (配列番号 249)	VGNIWQDGSSTKYNDVSVKG (配列番号 311)	AYGNYWYTDV (配列番号 372)			
	LAVIWADGSENVVDSVKG (配列番号 184)	LGVIWQDGSSEKYNDVSVKG (配列番号 250)	VGNIWQDGSSTKYNDVSVKG (配列番号 312)	AYGNYWYVDV (配列番号 373)			
	LAVIWADGSENVVDSVKG (配列番号 185)	LGVIWQDGSSENVVDSVKG (配列番号 251)	VGNIWQDGSSTNYNDVSVKG (配列番号 313)	AYGNYWYVDV (配列番号 374)			
	LAVIWADGSENVVDSVKG (配列番号 186)	LGVIWQDGSSENVVDSVKG (配列番号 252)	VGNIWQDGSSTNYNDVSVKG (配列番号 314)	AYGQYWYIDV (配列番号 375)			
	LAVIWADGSENVVDSVKG (配列番号 187)	LGVIWQDGSSTKYNDVSVKG (配列番号 253)	VGNIWQDGSSEKYNDVSVKG (配列番号 315)	AYGRYWYIDV (配列番号 376)			
	LAVIWADGSENVVDSVKG (配列番号 55)	LGVIWQDGSSTNYNDVSVKG (配列番号 254)	VGVIKADGSTKYNDVSVKG (配列番号 316)	AYGSYWYIDV (配列番号 377)			
	LAVIWAGGSEKYNDVSVKG (配列番号 188)	LGVIWQDGSSTNYNDVSVKG (配列番号 255)	VGVIKADGSTNYNDVSVKG (配列番号 317)	AYGTYWYIDV (配列番号 378)			
	LAVIWAGGSENVVDSVKG (配列番号 189)	LGVIWQDGSSTNYNDVSVKG (配列番号 256)	VGVIKADGSTNYNDVSVKG (配列番号 318)	AYGVYWYIDR (配列番号 379)			
	LAVIWAGGSENVVDSVKG (配列番号 190)	LGVIWQDGSSTKYNDVSVKG (配列番号 257)	VGVIKQDGSSENVVDSVKG (配列番号 319)	AYGVYWYIDV (配列番号 380)			
	LAVIWQDGSSEKYNDVSVKG (配列番号 191)	LGVIWQDGSSTNYNDVSVKG (配列番号 258)	VGVIKQDGSSTKYNDVSVKG (配列番号 320)	AYGWYWYIDV (配列番号 381)			
	LAVIWQDGSSEKYNDVSVKG (配列番号 192)	VANIKADGSEKYNDVSVKG (配列番号 259)	VGVIKQDGSSTNYNDVSVKG (配列番号 321)	AYGVYWYIDV (配列番号 382)			
	LAVIWQDGSSENVVDSVKG (配列番号 193)	VANIKADGSENVVDSVKG (配列番号 260)	VGVIWADGSEKYNDVSVKG (配列番号 322)	DYGNWYIDV (配列番号 383)			

10

20

30

40

【表 3 - 5】

	LAVIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 194)	VANIKADGSTKYVDSVKG (配列番号 261)	VGVIWADGSENVDSVKG (配列番号 323)	EYGNWYIDR (配列番号 384)			
	LAVIWQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 195)	VANIKQDGSSENVDSVKG (配列番号 262)	VGVIWADGSENVDSVKG (配列番号 324)	EYGNWYIDV (配列番号 385)			
	LAVIWQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 196)	VANIKQDGSSENVDSVKG (配列番号 263)	VGVIWADGSENVDSVKG (配列番号 325)	GYGNWYIDV (配列番号 61)			
	LAVIWQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 197)	VANIKQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 264)	VGVIWADGSENVDSVKG (配列番号 326)	HYGNWYIDV (配列番号 386)			
	LAVIWQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 198)	VANIKQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 265)	VGVIWADGSENVDSVKG (配列番号 327)	IYGNWYIDR (配列番号 387)			
	LAVIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 199)	VANIWADGSENVDSVKG (配列番号 266)	VGVIWADGSENVDSVKG (配列番号 328)	IYGNWYIDV (配列番号 388)			
	LAVIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 200)	VANIWADGSENVDSVKG (配列番号 267)	VGVIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 329)	LYGNWYIDV (配列番号 389)			
	LGNIKADGSENVDSVKG (配列番号 201)	VANIWADGSENVDSVKG (配列番号 268)	VGVIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 330)	MYGNWYIDV (配列番号 390)			
	LGNIKADGSENVDSVKG (配列番号 202)	VANIWADGSENVDSVKG (配列番号 269)	VGVIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 331)	QYGNWYIDR (配列番号 391)			
	LGNIKADGSENVDSVKG (配列番号 203)	VANIWAGSENVDSVKG (配列番号 270)	VGVIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 50)	QYGNWYIDV (配列番号 392)			
	LGNIKADGSENVDSVKG (配列番号 204)	VANIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 271)	VGVIWQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 332)	SYGNWYIDV (配列番号 393)			
	LGNIKAGGSENVDSVKG (配列番号 205)	VANIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 41)	VGVIWQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 333)	VYGNWYIDV (配列番号 394)			
	LGNIKAGGSENVDSVKG (配列番号 206)	VANIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 272)	VGVIWQDGSSTKYVDSVKG (配列番号 334)	WYGNWYIDV (配列番号 395)			

10

20

30

40

【表 3－6】

	LGNIKQDGSNNVDSVKG (配列番号 207)	VANIWQDGSNNVDSVKG (配列番号 273)	VGVIWQDGSNNVDSVKG (配列番号 60)				
	LGNIKQDGSNNVDSVKG (配列番号 208)	VANIWQDGSNNVDSVKG (配列番号 274)	VGVIWQDGSNNVDSVKG (配列番号 335)				
	LGNIKQDGSNNVDSVKG (配列番号 209)		VGVIWQDGSNNVDSVKG (配列番号 336)				

【表 4 - 1】

表 4. 固有のライブラリー由来PD1アンタゴニスト性IgG、およびデザインPD1アンタゴニスト性IgGのCDR配列。

クローンの名 称	<u>LCDR1</u>	<u>LCDR2</u>	<u>LCDR3</u>	<u>HCDR1</u>	<u>HCDR2</u>	<u>HCDR3</u>
20C07	KSSQSVSNDVA (配列番号 44)	YASHRFT (配列番号 45)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFSTSYGMS (配列番号 47)	LANIWDGSGTNVDSVKG (配列番号 48)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
11C08	KSSQSVSNDLA (配列番号 51)	YASHRFT (配列番号 45)	QQAYSTPVT (配列番号 52)	GFTFSSYGVH (配列番号 49)	VGVTIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 50)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
09C06	KSSQSVSNDVA (配列番号 44)	YASHRFT (配列番号 45)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFSPSSYGMH (配列番号 42)	VANIWDGSGTNVDSVKG (配列番号 43)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
17A12	KSSQSVSNDVA (配列番号 44)	YASHRFT (配列番号 45)	QQAYSTPVT (配列番号 52)	GFSPSSYGMH (配列番号 42)	LANIWDGSGSENVDSVKG (配列番号 53)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
17D08	KSSQSVSNDVA (配列番号 44)	YASHRFT (配列番号 45)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFTLSSYGMH (配列番号 54)	LAVIWDGSGTNVDSVKG (配列番号 55)	AYGNYWYIDV (配列番号 56)
17G08	KSSQSVSNDVA (配列番号 44)	YASHRFT (配列番号 45)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFTFSSYGMH (配列番号 57)	VGVTIWQDGSSENVDSVKG (配列番号 58)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
15D07	KSSQSVSNDLA (配列番号 51)	YASHRFT (配列番号 45)	QQAYSTPVT (配列番号 52)	GFSTSYGMI (配列番号 59)	VGVTIWQDGS TNVDSVKG (配列番号 60)	GYGNYWYIDV (配列番号 61)
MH1	KSSQSVGNDVA (配列番号 74)	YASHRFT (配列番号 45)	QQAYSSPVT (配列番号 75)	GFSLSSYGMS (配列番号 39)	VAVIWDGSGTNVDSVKG (配列番号 40)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH2	KSSQSVTNDLA (配列番号 76)	YASHRFT (配列番号 45)	QQAYSTPVT (配列番号 52)	GFSLSSYGMS (配列番号 39)	VAVIWDGSGTNVDSVKG (配列番号 40)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH3	KSSQSVGNDLA (配列番号 77)	YAYHRFS (配列番号 78)	QQAYSTPVT (配列番号 52)	GFSLSSYGMS (配列番号 39)	VAVIWDGSGTNVDSVKG (配列番号 40)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH4	KSSQSVTNDLA (配列番号 36)	YAYHRFT (配列番号 37)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFSLSSYGMS (配列番号 39)	VAVIWDGSGTNVDSVKG (配列番号 40)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH5	KSSQSVGNDVA (配列番号 74)	YASHRFT (配列番号 45)	QQAYSSPVT (配列番号 75)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSGTKYVDSVKG (配列番号 34)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH6	KSSQSVTNDLA (配列番号 76)	YASHRFT (配列番号 45)	QQAYSTPVT (配列番号 52)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSGTKYVDSVKG (配列番号 34)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH7	KSSQSVGNDLA (配列番号 77)	YAYHRFS (配列番号 78)	QQAYSTPVT (配列番号 52)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSGTKYVDSVKG (配列番号 34)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)

10

20

30

40

【表 4 - 2】

(60)

JP 2021-515541 A 2021.6.24

MH8	KSSQSVTNDVA (配列番号 36)	YAYHRFT (配列番号 37)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSKYVDSVKG (配列番号 34)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH9	KSSQSVGNDVA (配列番号 74)	YASHRFT (配列番号 45)	QQAYSSPVT (配列番号 75)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSEKYVDSVKG (配列番号 41)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH10	KSSQSVTNDLA (配列番号 76)	YASHRFT (配列番号 45)	QQAYSTPVT (配列番号 52)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSEKYVDSVKG (配列番号 41)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH11	KSSQSVGNDLA (配列番号 77)	YAYHRFS (配列番号 78)	QQAYSTPVT (配列番号 52)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSEKYVDSVKG (配列番号 41)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH12	KSSQSVTNDVA (配列番号 36)	YAYHRFT (配列番号 37)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSEKYVDSVKG (配列番号 41)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH13	KSSQSVTNDLA (配列番号 76)	YAYHRFT (配列番号 37)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSKYVDSVKG (配列番号 34)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH14	KSSQSVTNDLA (配列番号 76)	YAYHRFS (配列番号 78)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSKYVDSVKG (配列番号 34)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH15	KSSQSVTNDLA (配列番号 76)	YASHRFS (配列番号 79)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSKYVDSVKG (配列番号 34)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH16	KSSQSVTNDLA (配列番号 76)	YAYHRFT (配列番号 37)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSEKYVDSVKG (配列番号 41)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH17	KSSQSVTNDLA (配列番号 76)	YAYHRFS (配列番号 78)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSEKYVDSVKG (配列番号 41)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)
MH18	KSSQSVTNDLA (配列番号 76)	YASHRFS (配列番号 79)	HQAYSTPVT (配列番号 46)	GFTFSSYGMS (配列番号 33)	VANIWDGSEKYVDSVKG (配列番号 41)	AYGNYWYIDR (配列番号 35)

10

20

30

40

【表 5】

表 5. Hu317 および例示のリードクローンに関する予測されたT細胞エピトープ含量スコア

<u>クローンの名称</u>	<u>GE</u>	<u>HAF</u>	<u>LAF</u>	<u>TCED+</u>
Hu317	9	4	7	2
09C06	15	4	2	1
20C07	15	4	3	1
11C08	14	4	5	1
17A12	15	4	3	1
MH4	15	4	3	1
MH8	15	3	3	1
MH12	15	3	3	1

10

【表 6】

表 6. Hu317 および例示のリードクローンに関する電荷アイソフォーム分布

<u>クローンの名称</u>	<u>塩基性アイソ フォーム %</u>	<u>主要ピーク %</u>	<u>酸性アイソフ ォーム %</u>
Hu317	23.1	68.9	8
09C06	3.5	82.8	13.7
MH4	7	81.6	11.4
MH8	6	77.4	16.6
MH12	7.4	80.4	12.2

20

【表 7】

表 7. Hu317 および例示のリードクローンに関する温度遷移中点

<u>クローン</u>	<u>Tm1 °C</u>	<u>Tm2 °C</u>	<u>Tm3 °C</u>
Hu317	72.3	79.4*	86.1
09C06	76.6*		86.5
MH4	75.3*		86.2
MH8	74.2*		86.2
MH12	71.9	86.5*	

30

40

* Fab Tm

【表 8】

表 8. IgGは、0.5%のH2O2での強制酸化の前後で高い完全性を示し、これは分子ふるい (SEC)、逆相 (RP) および疎水性相互作用 (HIC) のクロマトグラフィー法で測定された。

クローン	SECによる HMW%		RP 保持 (mins (分))		RP 重鎖 (mins (分))		RP 軽鎖 (mins (分))		HIC 保持 (Mins (分))	
	0分	120分	0分	120分	0分	120分	0分	120分	0分	120分
	H2O2	H2O2	H2O2	H2O2	H2O2	H2O2	H2O2	H2O2	H2O2	H2O2
Hu317	0.13	0.17	8.3	8.2	7.7	7.7	6.5	6.5	7.2	6.9
09C06	0.27	0.27	12.8	12.7	11.7	11.6	8.6	8.6	6.3	5.7
MH4	0.28	0.41	13.7	13.7	12.8	12.5	8.9	8.8	7.2	6.8
MH8	0.3	0.25	13.2	13.1	12	11.9	8.8	8.8	6.9	6.5
MH12	0.52	0.31	13.2	13.2	12	12	8.9	8.8	7	6.9

10

20

30

40

【表 9】

表 9. 抗体可変領域アミノ酸配列の例。

抗体 MH8 重鎖可変 (VH) 領域

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYGMSWVRQAPGKGLEWVANIWQDGSTKYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQM
NSLRAEDTAVYYCARAYGNYWYIDRWGQGTTVTSS (配列番号 1)

抗体 MH8 軽鎖可変 (VL) 領域

DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCKSSQSVTNDVAWYQQKPGQPPKLLINAYHRFTGVPDRFSGSGYGTDFTLTISSLQAED
VAVYYCHQAYSTPYTFGQGTKLEIK (配列番号 2)

抗体 MH4 重鎖可変 (VH) 領域

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYGMSWVRQAPGKGLEWVAVIWQDGSTNYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQM
NSLRAEDTAVYYCARAYGNYWYIDRWGQGTTVTSS (配列番号 3)

抗体 MH4 軽鎖可変 (VL) 領域

DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCKSSQSVTNDVAWYQQKPGQPPKLLINAYHRFTGVPDRFSGSGYGTDFTLTISSLQAED
VAVYYCHQAYSTPYTFGQGTKLEIK (配列番号 4)

抗体 MH12 重鎖可変 (VH) 領域

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYGMSWVRQAPGKGLEWVANIWQDGSEKYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQM
NSLRAEDTAVYYCARAYGNYWYIDRWGQGTTVTSS (配列番号 5)

抗体 MH12 軽鎖可変 (VL) 領域

DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCKSSQSVTNDVAWYQQKPGQPPKLLINAYHRFTGVPDRFSGSGYGTDFTLTISSLQAED
VAVYYCHQAYSTPYTFGQGTKLEIK (配列番号 6)

抗体 09C06 重鎖可変 (VH) 領域

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYGMHWVRQAPGKGLEWVANIWQDGSTNYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQM
NSLRAEDTAVYYCARAYGNYWYIDRWGQGTTVTSS (配列番号 7)

抗体 09C06 軽鎖可変 (VL) 領域

DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCKSSQSVSNDVAWYQQKPGQPPKLLINAYASHRFTGVPDRFSGSGYGTDFTLTISSLQAED
VAVYYCHQAYSTPYTFGQGTKLEIK (配列番号 8)

10

20

【表 10】

表 10. 抗体 Fc 領域アミノ酸配列の例。

ヒト IgG4 野生型

ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYT
 CNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPSCPAEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQED PEVQFNWYVDGVE
 VHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSL
 TCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMEALHNHYTQKS

LSLSLGK (配列番号 9)

ヒト IgG4 (S228P)

ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYT
 CNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPSCPAEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQED PEVQFNWYVDGVE
 VHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSL
 TCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMEALHNHYTQKS

LSLSLGK (配列番号 10)

ヒト IgG1 野生型

ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYI
 CNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDG
 VEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQV
 SLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSP
 GK (配列番号 11)

ヒト IgG1-3M

ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYI
 CNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPEAAGAPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDG
 VEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQV
 SLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSP
 GK (配列番号 12)

ヒト IgG2 野生型

ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYT
 CNVDHKPSNTKVDKTKVERKCCVEPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVH
 NAKTKPREEQFNSTFRVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTC
 LVKGFYPSDISVEWESNGQPENNYKTTPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK

(配列番号 13)

ヒト IgG1 野生型「REEM」アロタイプ

ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYI
 CNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDG
 VEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQV
 SLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSP
 GK (配列番号 14)

ヒト IgG1-3M「REEM」アロタイプ

ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYI
 CNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPEAAGAPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDG
 VEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEMKNQVS
 LTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
 K (配列番号 15)

10

20

30

40

【表 1 1】

表 1 1. 標的タンパク質アミノ酸配列の例。

ヒト PD1 配列

MQIPQAPWPVVWAVLQLGWRPGWFLDSPDRPWNPTFSPALLVTEGDNATFTCSFSNTSESVFLNWYRMSPSNQTDKLAAP
 PEDRSQPGQDCRFRVTQLPNGRDFHMSVVRARRNDSGTLYLCAISLAPKAQIKESLRAELRVTEERRAEVPTAHPSPSPRPAG
 QFQTLVVGVVGGLLGSLVLLVWVLAVICSRAARGTIGARRTGQPLKEDPSAVPVFSVDYGELDFQWREKTPEPPVPCVPEQT
 EYATIVFPSPMGTTSSPARRGSADGPRSAQPLRPEDGHCSWPL (配列番号 16)

カニクイザル PD1 配列

MQIPQAPWPVVWAVLQLGWRPGWFLESPDRPWNPTFSPALLVTEGDNATFTCSFSNASESVFLNWYRMSPSNQTDKLAAP
 PEDRSQPGQDCRFRVTRLPNGRDFHMSVVRARRNDSGTLYLCAISLAPKAQIKESLRAELRVTEERRAEVPTAHPSPSPRPAG
 QFQALVVGVVGGLLGSLVLLVWVLAVICSRAAQGTIEARRTGQPLKEDPSAVPVFSVDYGELDFQWREKTPEPPAPCVPEQT
 EYATIVFPSGLTSSPARRGSADGPRSPRPLRPEDGHCSWPL (配列番号 17)

10

ヒト LSAMP 配列

MVRRVQPDRKQLPLVLLRLLCCLPTGLPVRSVDFNRGTDNITVRQGDTAILRCVVEDKNSKVAWLNRSIGIFAGHDKWSLDP
 RVELEKRHSLEYSRLRIQKVDVYDEGSYTCVQTQHEPKTSQVYLIVQVPPKISNISSDVTVNEGSNVTLCMANGRPEPVIT
 WRHLTPTGREFEGEEYEILGITREQSGKYECKAANEVSSADVQVKVTVNYPPTITESKSNEATTGRQASLKCEASAVPA
 PDFEWYRDDTRINSANGLEIKSTEGQSSLTVTNVTEEYHGYTCVAANKLGVTNASLVLFPGSVRGINGSISLAVPLWLLA
 ASLLCLLSKC (配列番号 415)

ヒト BTN2A1 配列

MESAAALHFSRPASLLLLLSLCALVSAQFIVVGPTDPILATVGENTTLRCHLSPEKNAEDMEVRWFRSQFSPAVFVYKGGR
 ERTEEQMEEYRGRTTFVSKDISRGSVALVIHNITAQENGTYRCYFQEGRSYDEAILHLVVAGLGSKPLISMGRHEDGGIRLE
 CISRGWYPKPLTVWRDPYGGVAPALKEVSMPDADGLFMVTTAVIIRDKSVRNMSCSINNTLLGQKKESVIFIPESFMPSPVSP
 CAVALPIIVVILMPIAVCIYWINKLQKEKKILSGEKEFERETREIALKELEKERVQKEELQVKEKLQEELRWRTFLHAV
 DVVLDPDTAHPDLFLSEDRRSVRRCPPFRHLGESVPDNPERFDSQPCVLGRESFASGKHWEVEENVIEWTVGVCRDVERK
 GEVLLIPQNGFWTLEMHGQYRAVSSPDRILPLKESLCRVGVFLDYEAGDVSFYNMRDRSHIYTCPRSAFVSVPRPFFRLGC
 EDSPIFICPALTGANGVTVP EEGTLHRVGTHQSL (配列番号 416)

20

【表 1 2】

表 1 2. プロテオームアレイの IgG スクリーニングを介して特定された標的タンパク質。

IgG クローン	チップスクリーニング におけるヒット数	PD1 (PDCD1)	BTN2A1	LSAMP
		NM_005018	NM_007049	BC033803
MH4 (2µg/ml)	2	強		弱
MH8 (2ug/ml)	2	強		弱
MH12 (2ug/ml)	3	強	弱／中	弱
Hu317 (2ug/ml)	1	強		
抗フルオロセイン(4-4-20e)ヒト IgG4 カップス、Ab00102-13.0 陰性対照(2ug/ml)	0			
PBS (二次のみ)	0			

10

20

30

40

表 1 3. IgG の非標的タンパク質をトランスフェクトした細胞への結合対擬似細胞 (ZS グリーンのみ) への結合についての発光の fold Change (変化倍率)

<u>I g G クローン</u>	<u>BTN2A1</u>	<u>LSAMP</u>	<u>CD20</u>
Hu317	1.2	1.5	1.4
MH4	1.2	1.9	1.1
MH8	1.1	7.1	0.9
MH12	1.3	4.1	1.1
<u>二次のみ</u>	1.1	1.5	0.9

10

Figure 1A is a scatter plot showing the optical density (OD) at 450 nm for six conditions. The y-axis is labeled 'OD 450nm' and ranges from 0.0 to 4.5. The x-axis labels are: RII huPD-1, RII cyPD-1, RIII huPD-1, RIII cyPD-1, RIV huPD-1, and RIV cyPD-1. Each plot shows individual data points and a horizontal mean line. RII huPD-1, RIII huPD-1, and RIV huPD-1 show high OD values (mean ~2.3, ~2.6, and ~2.6 respectively). RII cyPD-1, RIII cyPD-1, and RIV cyPD-1 show lower OD values (mean ~1.5, ~1.8, and ~1.7 respectively).

CDR Residue	Maintenance Percentage (%)
K (S)	0
Q (S)	50
S (V)	0
V (S)	64
D (N)	100
V (A)	64
Y (A)	100
A (R)	84
F (H)	96
H (R)	100
F (T)	59
T (H)	68
H (Q)	0
A (A)	100
S (S)	0
S (P)	72
T (T)	0

CDR 残基	マウス残基の保持率 %
(D)(F)	75
S	72
L	50
T	100
(S)(T)	50
G	85
V	68
H	65
L	65
G	85
V	12
(H)W	75
A	65
G	78
(D)(S)	65
T	78
N	90
(Y)N	100
(D)(S)(V)(P)(G)	95
A	100
Y	95
G	100
N	100
Y	98
W	98
Y	95
I	100
D	100
V	58

圖 2 B

【図 3 A】




図 3 A

【図 3 B】




図 3 B

【図 4】




図 4

【図 5】




図 5

【図 7 - 1】




図 7 A ~ 7 D

【図 6】




図 6

【図 7 - 2】




図 7 E ~ 7 H

【図 8 A】




図 8 A

【図 8 B】




図 8 B

【図 8 C】




図 8 C

【図 9】




図 9

【図 10】




図 10

【図 11】




図 11

【配列表】

2021515541000001.app

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2019/055927

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. C07K16/28 A61P35/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C07K A61K A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 8 735 553 B1 (LI K; LIU Q; PENG A; PENG H; SONG J; XU L; ZHANG T; ZHNG T) 27 May 2014 (2014-05-27) claims 1-35; examples 1-12 -----	1,3-37
X	WO 2006/121168 A1 (ONO PHARMACEUTICAL CO [JP]; MEDAREX INC [US] ET AL.) 16 November 2006 (2006-11-16) claims 1-105; examples 1-25 -----	1,3-37
A	EP 3 081 576 A1 (SHANGHAI HENGRUI PHARM CO LTD [CN]; JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO [CN]) 19 October 2016 (2016-10-19) claims 1-27; examples 1-11 ----- -/--	1-37

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"Z" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 May 2019

Date of mailing of the international search report

11/06/2019

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Le Flao, Katell

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2019/055927

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2017/055404 A1 (F HOFFMANN-LA ROCHE AG [CH]; HOFFMANN-LA ROCHE INC [US]) 6 April 2017 (2017-04-06) page 1, line 27 - page 3, line 29; claims 1-30 -----	1-37
T	FINLAY WILLIAM J J ET AL: "Anti-PD1 'SHR-1210' aberrantly targets pro-angiogenic receptors and this polyspecificity can be ablated by paratope refinement.", MABS 01 2019, vol. 11, no. 1, January 2019 (2019-01), pages 26-44, XP002791570, ISSN: 1942-0870 the whole document -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2019/055927

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 8735553	B1	27-05-2014	AU 2013400609 A1
			05-05-2016
			BR 112016005408 A2
			16-01-2018
			CA 2924172 A1
			19-03-2015
			CN 105531288 A
			27-04-2016
			CN 107011441 A
			04-08-2017
			CN 107090041 A
			25-08-2017
			CN 108715615 A
			30-10-2018
			EA 201690567 A1
			31-08-2016
			EP 3044234 A1
			20-07-2016
			HK 1217501 A1
			13-01-2017
			JP 2016533763 A
			04-11-2016
			KR 20160044063 A
			22-04-2016
WO 2006121168	A1	16-11-2006	SG 11201601844T A
			28-04-2016
			TW 201538525 A
			16-10-2015
			US 8735553 B1
			27-05-2014
			US 2015079109 A1
			19-03-2015
			US 2015315274 A1
			05-11-2015
			US 2018111995 A1
			26-04-2018
			US 2018251551 A1
			06-09-2018
			WO 2015035606 A1
			19-03-2015
			ZA 201601953 B
			28-06-2017
			AU 2006244885 A1
			16-11-2006
			BR P10610235 A2
			08-06-2010
			CA 2607147 A1
			16-11-2006
			CA 2970873 A1
			16-11-2006
			CN 101213297 A
			02-07-2008
			CN 103059138 A
			24-04-2013
			CN 105315373 A
			10-02-2016
			CN 109485727 A
			19-03-2019
			DK 2161336 T3
			28-10-2013
			EP 1896582 A1
			12-03-2008
			EP 2161336 A1
			10-03-2010
			EP 2418278 A2
			15-02-2012
			EP 2439272 A2
			11-04-2012
			EP 2439273 A2
			11-04-2012
			ES 2427646 T3
			31-10-2013
			HK 1140793 A1
			27-06-2014
			HU S1500067 I1
			29-02-2016
			IL 187108 A
			30-06-2011
			IL 208642 A
			30-08-2012
			JP 4361545 B2
			11-11-2009
			JP 5028700 B2
			19-09-2012
			JP 5872377 B2
			01-03-2016
			JP 6185971 B2
			23-08-2017
			JP 2006340714 A
			21-12-2006
			JP 2009155338 A
			16-07-2009
			JP 2012158605 A
			23-08-2012
			JP 2014077015 A
			01-05-2014
			JP 2016033135 A
			10-03-2016
			JP 2017052784 A
			16-03-2017
			KR 20080011428 A
			04-02-2008
			KR 20130032908 A
			02-04-2013
			KR 20130114226 A
			16-10-2013
			LT 2439273 T
			10-05-2019
			LU 92904 I2
			10-02-2016
			NO 341219 B1
			18-09-2017
			NO 2018008 I1
			26-02-2018

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2019/055927

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
		NZ 563193 A	28-05-2010	
		PT 2161336 E	03-10-2013	
		RU 2010135087 A	27-02-2012	
		RU 2013133714 A	27-01-2015	
		SI 2161336 T1	29-11-2013	
		TW I379898 B	21-12-2012	
		US 2009217401 A1	27-08-2009	
		US 2013133091 A1	23-05-2013	
		US 2014212422 A1	31-07-2014	
		US 2014294852 A1	02-10-2014	
		US 2014328833 A1	06-11-2014	
		US 2014348743 A1	27-11-2014	
		US 2015165025 A1	18-06-2015	
		US 2017088615 A1	30-03-2017	
		WO 2006121168 A1	16-11-2006	

EP 3081576	A1	19-10-2016	AU 2014361473 A1	07-07-2016
			BR 112016013338 A2	26-09-2017
			CA 2932966 A1	18-06-2015
			CL 2016001460 A1	20-01-2017
			CN 105026428 A	04-11-2015
			CR 20160319 A	08-11-2016
			DO P2016000133 A	30-11-2016
			EA 201691225 A1	30-09-2016
			EP 3081576 A1	19-10-2016
			HK 1213910 A1	15-07-2016
			JP 6502959 B2	17-04-2019
			JP 2017500889 A	12-01-2017
			KR 20160113113 A	28-09-2016
			PE 09532016 A1	26-09-2016
			PH 12016501120 A1	15-08-2016
			SG 10201804945W A	30-07-2018
			SG 11201604738T A	28-07-2016
			TW 201605901 A	16-02-2016
			US 2016376367 A1	29-12-2016
			WO 2015085847 A1	18-06-2015

WO 2017055404	A1	06-04-2017	AU 2016329126 A1	15-02-2018
			BR 112018001530 A2	06-11-2018
			CA 2992853 A1	06-04-2017
			CL 2018000502 A1	27-07-2018
			CN 108137699 A	08-06-2018
			CO 2018000886 A2	19-04-2018
			CR 20180161 A	25-05-2018
			EP 3356411 A1	08-08-2018
			JP 2018537950 A	27-12-2018
			KR 20180042417 A	25-04-2018
			PE 7732018 A1	07-05-2018
			PH 12018500635 A1	24-09-2018
			TW 201718660 A	01-06-2017
			US 2017114135 A1	27-04-2017
			WO 2017055404 A1	06-04-2017

フロントページの続き

(51)Int.Cl.			F I	テーマコード (参考)	
C 1 2 N	1/19	(2006.01)	C 1 2 N	1/19	4 H 0 4 5
C 1 2 N	1/21	(2006.01)	C 1 2 N	1/21	
C 1 2 N	5/10	(2006.01)	C 1 2 N	5/10	
C 1 2 P	21/08	(2006.01)	C 1 2 P	21/08	
A 6 1 K	39/395	(2006.01)	A 6 1 K	39/395	N
A 6 1 K	45/00	(2006.01)	A 6 1 K	45/00	
A 6 1 K	47/68	(2017.01)	A 6 1 K	47/68	
A 6 1 P	37/04	(2006.01)	A 6 1 P	37/04	
A 6 1 P	35/00	(2006.01)	A 6 1 P	35/00	
A 6 1 P	31/00	(2006.01)	A 6 1 P	31/00	
A 6 1 P	37/02	(2006.01)	A 6 1 P	37/02	
A 6 1 P	31/12	(2006.01)	A 6 1 P	31/12	
A 6 1 P	31/04	(2006.01)	A 6 1 P	31/04	
A 6 1 P	31/10	(2006.01)	A 6 1 P	31/10	
A 6 1 P	33/00	(2006.01)	A 6 1 P	33/00	
A 6 1 P	31/18	(2006.01)	A 6 1 P	31/18	
A 6 1 P	35/02	(2006.01)	A 6 1 K	39/395	T
			A 6 1 P	35/02	

(81)指定国・地域 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT

(72)発明者 フィンレー, ウィリアム ジェームズ ジョナサン
イギリス国, シーティー 1 3 9 エフエフ サンドウィッチ, ラムスゲイト ロード, イノベーシ
ョン ハウス, クレストン リーズ エルエルピー内

Fターム(参考) 4B064 AG27 CA19 CC24 DA01

4B065 AA01X AA57X AA72X AA87X AA94Y AB01 AC14 BA02 CA25 CA44

4C076 AA95 BB11 CC07 CC27 CC31 CC32 CC34 CC35 CC41 EE41

EE59

4C084 AA17 MA65 MA66 NA05 NA14 ZB07 ZB09 ZB26 ZB27 ZB31

ZB32 ZB33 ZB35 ZB37 ZC55

4C085 AA14 AA21 BB31 BB33 BB34 BB35 BB36 BB37 CC23 DD62

EE01 GG01 GG02 GG04

4H045 AA11 AA20 AA30 DA76 EA20 EA22 EA28 FA74