

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2021-512094

(P2021-512094A)

(43) 公表日 令和3年5月13日 (2021.5.13)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 K 31/352 (2006.01)	A 6 1 K 31/352	4 C 0 7 6
A 6 1 P 3/10 (2006.01)	A 6 1 P 3/10	4 C 0 8 6
A 6 1 K 9/20 (2006.01)	A 6 1 K 9/20	
A 6 1 K 9/14 (2006.01)	A 6 1 K 9/14	
A 6 1 K 9/48 (2006.01)	A 6 1 K 9/48	
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 18 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2020-541647 (P2020-541647)
 (86) (22) 出願日 平成31年1月28日 (2019.1.28)
 (85) 翻訳文提出日 令和2年9月8日 (2020.9.8)
 (86) 国際出願番号 PCT/KR2019/001158
 (87) 国際公開番号 W02019/151732
 (87) 国際公開日 令和1年8月8日 (2019.8.8)
 (31) 優先権主張番号 10-2018-0012511
 (32) 優先日 平成30年1月31日 (2018.1.31)
 (33) 優先権主張国・地域又は機関 韓国 (KR)

(71) 出願人 519100468
 フロントバイオ インコーポレーテッド
 FrontBio Inc.
 大韓民国 カンウォンード 24232、
 チュンチョン-シ、ソヤンカン-ロ、32
 、#1-405
 (74) 代理人 110000729
 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所
 (72) 発明者 イム、スン ソン
 大韓民国 24278 カンウォンード、
 チュンチョン-シ、フソク-ロ、325、
 105-ドン 301-ホ、(フピョン-
 ドン、チュンチョン ザ シャープ アパ
 ートメント)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 新規なクリシン誘導体化合物を有効成分として含む糖尿病合併症の予防または治療用薬学組成物

(57) 【要約】

本発明は、クリシン誘導体化合物を有効成分として含む糖尿病合併症の予防または治療用薬学組成物に関するものであり、より詳しくは、最終糖化産物 (AGE) の形成抑制効果を有して糖尿病合併症を予防または治療することができるクリシン誘導体化合物を有効成分として含む、糖尿病合併症の予防または治療用薬学組成物に関するものである。

【選択図】 図 1




【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記化学式 1 のクリシン誘導体化合物を有効成分として含む糖尿病合併症の予防または治療用薬学組成物：

【化 1】



化学式 1

10

上記化学式 1 において、

R_1 は C_{1-4} アルキル、 C_{1-6} アルケニルおよび $-COR_3$ からなる群より選ばれ；

R_2 は H、ハロゲン、 C_{1-4} アルキルおよび $-COR_4$ からなる群より選ばれ；

R_3 および R_4 はそれぞれ独立して C_{1-4} アルキルである。

【請求項 2】

R_1 は $-COR_3$ であり、 R_2 は H、 $-CH_3$ および $-C(=O)CH_3$ からなる群より選ばれ、 R_3 は C_{1-4} アルキルであることを特徴とする、請求項 1 に記載の薬学組成物。

20

【請求項 3】

R_1 は $-C(=O)CH_3$ であることを特徴とする、請求項 2 に記載の薬学組成物。

【請求項 4】

上記化学式 1 の化合物が、下記化合物からなる群より選ばれることを特徴とする、請求項 1 に記載の薬学組成物：

7-*O*-アセチルクリシン；

5, 7-ジ-*O*-アセチルクリシン；

7-*O*-プレニルクリシン；

7-*O*-メトキシクリシン；および

5, 7-ジ-*O*-メトキシクリシン。

30

【請求項 5】

上記薬学組成物が、最終糖化産物 (Advanced Glycation End products ; AGE) の形成を抑制させることを特徴とする、請求項 1 に記載の薬学組成物。

【請求項 6】

上記糖尿病合併症が、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎臓病、糖尿病性心筋梗塞、糖尿病性網膜症、糖尿病性白内障及び糖尿病性足部潰瘍からなる群より選ばれる 1 種以上であることを特徴とする、請求項 1 に記載の薬学組成物。

【請求項 7】

請求項 1 に記載の薬学組成物を含む、薬学的製剤。

40

【請求項 8】

上記薬学的製剤が、錠剤、丸剤、散剤、カプセル剤、シロップまたはエマルジョン状であることを特徴とする、請求項 7 に記載の薬学的製剤。

【請求項 9】

上記薬学的製剤が、薬学的に許容可能な担体、補強剤および賦形剤からなる群より選ばれる 1 種以上を更に含むことを特徴とする、請求項 7 に記載の薬学的製剤。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、新規なクリシン誘導体化合物を有効成分として含む糖尿病合併症の予防また

50

は治療用薬学組成物に関するものであり、より詳しくは、優れた最終糖化産物（AGE）の形成抑制効能を有して糖尿病合併症を予防または治療することができるクリシン誘導体化合物を有効成分として含む、糖尿病合併症の予防または治療用薬学組成物に関するものである。

【背景技術】

【0002】

糖尿病（Diabetes Mellitus；DM）は、インスリン欠乏およびインスリン抵抗性又はこれらを両方とも特徴とし多くは肥満に関わる進行性疾患（progressive disease）である。空腹および食後の血糖上昇のため、失明、腎不全、心臓疾患、卒中（stroke）および切断（amputation）を引き起こす急性および慢性合併症（微細血管および大血管（micro-and macro-vascular））に患者がさらされる。血糖調節の改善がかかる糖尿病合併症の危険性を低めることが立証された。

10

【0003】

このような疾患の進行的属性のため、血糖調節を維持するには進化した治療戦略が必要となる。2つの形態の糖尿病：第1型糖尿病、つまり小児糖尿病又はインスリン依存性糖尿病（IDDM）、および第2型糖尿病、つまり成人型糖尿病又はインスリン非依存性糖尿病（NIDDM）がある。第1型糖尿病患者はインスリンを合成および分泌する膵臓β細胞の免疫学的破壊によりインスリンが絶対的に不足している。第2型糖尿病は病因がより複合的であり、相対的なインスリン欠乏、インスリン作用減少、およびインスリン抵抗性を特徴とする。早期発生NIDDM又は若年発症成人型糖尿病（Maturity-Onset Diabetes of the Young；MODY）は、中年に発病する最も一般的な形態のNIDDMと多くの特性を共有する（Rotterら、1990）。明確なタイプの遺伝（常染色体優性）がMODYで観察された。少なくとも、3つの全く相異なる突然変異がMODY家族から確認された（Bellら、1996）。

20

【0004】

一方、糖尿病合併症は、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎臓病、糖尿病性心筋梗塞、糖尿病性網膜症、糖尿病性白内障、糖尿病性血管合併症又は糖尿病性足部潰瘍を含み、主要原因はポリオール経路のアルドース還元酵素（aldose reductase）活性による過剰なソルビトール蓄積であると知られている。よって、アルドース還元酵素の抑制が糖尿病合併症の治療および予防において重要な役割を果たすことと知られている。今まで開発されたアルドース還元酵素抑制剤であるゾボルレスタット（zopolrestat）、ボナルレスタット（ponalrestat）、ソルビニル（sorbinil）、トルレスタット（tolrestat）、フィダレスタット（fidarestat）、ラニレスタット（ranirestat）及びエパルレスタット（epalrestat）等が様々な動物実験で糖尿病合併症を予防、遅延させると報告されている。

30

【0005】

しかし、臨床でゾボルレスタット（zopolrestat）及びボナルレスタット（ponalrestat）の効能が低く、ソルビニル（sorbinil）の過敏反応、トルレスタット（tolrestat）の肝機能障害のような副作用により開発過程で中断された。現在日本と米国ではラニレスタット（ranirestat）及びフィダレスタット（fidarestat）の臨床実験が進んでいる。エパルレスタット（epalrestat）は米国食品医薬品局（FDA）には承認されていないが、日本では1992年に承認されて市販されている。

40

【0006】

また、ソルビトール蓄積はソルビトール脱水素酵素によって果糖に転換され、高濃度の果糖がタンパク質と結合して結局は最終糖化産物（Advanced Glycation End products；AGE）の形成を加速化する。ここで、最終糖化産物は、生体組織と細胞を攻撃して老化を促進するだけでなく、糖尿、心臓疾患、癌などを含めて様々な疾患を誘発するに参与すると知られている。また、最終糖化産物が形成されると、血管壁やリンパ球などの細胞膜に最終糖化産物と結合可能な受容体（RAGE；Receptor of AGEs）が作られるが、最終糖化産物が受容体に結合すると、炎症に関連する各種免疫因子が活性化して慢性疾患を誘発又は悪化するようになる。

50

【0007】

一方、クリシン (Chrysin) は、ポプラ (*Populus nigra* L.) の若葉、姫子松 (五葉松) (*Pinus parviflora* Sieb. et Zucc.) の芯材又は配糖体トリンギンとして *Cormus Tschonoski* Maxim. (バラ科) の樹皮その他に含まれる。クリシンは通常抗酸化効果を有すると知られており、鎮痛剤などに使われる。

【0008】

しかし、従来開示された技術では、本発明の新規なクリシン誘導体化合物を糖尿病合併症の予防又は治療に用いたことについて報告されたことがない。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

10

【0009】

よって、本発明では糖尿病合併症の予防又は治療に有効な活性物質に対する研究を進めてきた。その結果、新規なクリシン誘導体化合物の場合に最終糖化産物の形成に対して抑制効果があることを確認した。従って、本発明の目的は、最終糖化産物の形成を抑制させることにより、糖尿病合併症の予防又は治療に使用可能な新規なクリシン誘導体化合物を含有する糖尿病合併症の予防または治療用薬学組成物を提供することにある。

【課題を解決するための手段】


【0010】

上記目的を達成するために、本発明は下記化学式1のクリシン誘導体化合物を有効成分として含む糖尿病合併症の予防または治療用薬学組成物を提供する：

20

【0011】

【化1】



化学式 1

【0012】

30

上記化学式1において、

R_1 は C_{1-4} アルキル、 C_{1-6} アルケニルおよび $-COR_3$ からなる群より選ばれ；

R_2 は H、ハロゲン、 C_{1-4} アルキルおよび $-COR_4$ からなる群より選ばれ；

R_3 および R_4 はそれぞれ独立して C_{1-4} アルキルである。

【0013】

本発明の他の具現例によると、上記の薬学組成物を含む薬学的製剤を提供する。

【発明の効果】

【0014】

本発明で提供する新規なクリシン誘導体化合物は、最終糖化産物形成抑制効果を有し、糖尿病合併症の予防または治療用薬学組成物に有用である。

40

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】本発明の一実施例であって RAW 264.7 細胞でクリシンとその誘導体が NO 生成 (A) と細胞生存 (B) に及ぼす影響に関する結果である。

【発明を実施するための形態】

【0016】

以下に列挙する定義は、本発明を記述するために用いられた様々な用語の定義である。これら定義は特に制限しない限り、個別的に又はこれらを含む用語の一部として本明細書全体に適用される。

50

【0017】

本明細書に用いられる用語「ハロゲン」は、他の言及がない限り、フッ素、塩素、臭素又はヨードを意味する。

【0018】

本明細書に用いられる用語「アルキル」は、他の言及がない限り、 C_nH_{2n+1} で表される飽和された、直鎖状又は分枝状の炭化水素基を示し、具体的にそれぞれ1乃至4つの炭素原子を含む飽和された、直鎖状又は分枝状の炭化水素基を示す。これらの基の例には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*t*-ブチル基が挙げられるが、これらに限らない。例えば、本明細書に用いられる用語「 C_{1-4} アルキル」は、他の言及がない限り、炭素数1乃至4の直鎖状又は分枝状の炭化水素基を意味する。その例には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*sec*-ブチル基、*t*-ブチル基などがあるが、これらに限らない。

10

【0019】

本明細書に用いられる用語「アルケニル」は、他の言及がない限り、少なくとも1つの炭素-炭素二重結合を有する不飽和された、直鎖状又は分枝状の炭化水素残基 (moiety) に由来する1価基を示し、具体的にそれぞれ2乃至6つの炭素原子を含む不飽和された、直鎖状又は分枝状の1価基を示す。これらの例にはエテニル基、プロペニル基、ブテニル基、1-メチル-2-ブテン-1-イル基が含まれるが、これらに限らない。

【0020】

以下、本発明をより詳しく説明する。

20

【0021】


本発明は、下記化学式1の新規なクリシン誘導体化合物およびその用途に関し、より詳しくは、クリシン誘導体化合物を活性成分として含有する糖尿病合併症の予防または治療用薬学組成物に関する。本発明の新規なクリシン誘導体化合物は、優れた血糖調節および最終糖化産物 (AGE) の形成抑制効果を有し、糖尿病合併症を予防又は治療することができる。

【0022】

具体的に、本発明の一具現例によると、下記化学式1のクリシン誘導体化合物を有効成分として含む糖尿病合併症の予防または治療用薬学組成物を提供する：

【化2】

30



化学式1

【0023】

上記化学式1において、

R_1 は C_{1-4} アルキル、 C_{1-6} アルケニルおよび $-COR_3$ からなる群より選ばれ；

40

R_2 は H、ハロゲン、 C_{1-4} アルキルおよび $-COR_4$ からなる群より選ばれ；

R_3 および R_4 はそれぞれ独立して C_{1-4} アルキルである。

【0024】

本発明の他の具現例によると、上記化学式1で表される化合物において R_1 は $-COR_3$ であり、 R_2 は H、 $-CH_3$ および $-COCH_3$ からなる群より選ばれ、 R_3 は C_{1-4} アルキルであることを特徴とする薬学組成物を提供する。

【0025】

本発明のまた他の具現例によると、上記化学式1で表される化合物において R_1 は $-COCH_3$ であることを特徴とする薬学組成物を提供する。

50

【0026】

本発明による上記化学式1の化合物の好ましい例は次の通りであるが、これに限るものではない：

【0027】

7-*O*-アセチルクリシン；
5, 7-ジ-*O*-アセチルクリシン；
7-*O*-プレニルクリシン；
7-*O*-メトキシクリシン；および
5, 7-ジ-*O*-メトキシクリシン。

【0028】

本発明の薬学組成物は、これに含まれる化学式1で表される化合物が最終糖化産物（AGE）の形成を抑制することにより、これに関連する様々な疾患の予防又は治療にも有用である。

【0029】

本発明の一具体例において、上記化合物が5, 7-ジ-*O*-アセチルクリシンである場合、最終糖化産物の形成に対して優れた抑制効果を有する点で好ましいが、これに限るものではない。

【0030】

本発明の一具体例において、上記糖尿病合併症は、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎臓病、糖尿病性心筋梗塞、糖尿病性網膜症、糖尿病性白内障及び糖尿病性足部潰瘍からなる群より選ばれた1種以上であるが、これらに限らない。

【0031】

本明細書で使われる用語「予防」とは、本発明の薬学組成物の投与によって糖尿病合併症を抑制したり発病を遅延させたりする行為のすべてを意味する。

【0032】

本明細書で使われる用語「治療」とは、本発明の薬学組成物の投与によって糖尿病合併症による症状を好転又は改善させる行為のすべてを意味する。

【0033】

本発明の他の具現例によると、上記の薬学組成物を含む薬学的製剤を提供する。

【0034】

本発明の薬学的製剤は、錠剤、丸剤、散剤、カプセル剤、シロップまたはエマルジョンなどの様々な経口投与形態、または注射剤などの筋肉内、静脈内あるいは皮下投与のような非経口投与形態であってもよいが、好ましくは経口投与形態である。

【0035】

また、上記薬学的製剤には、有効成分の他に通常は無毒性の薬学的に許容可能な添加剤として、具体的には担体、補強剤および賦形剤からなる群より選ばれた1種以上が添加され、通常の方法によって製剤化することができる。

【0036】

本発明の薬学的製剤に使用可能な賦形剤としては、甘味剤、結合剤、溶解剤、溶解補助剤、湿潤剤、乳化剤、等張化剤、吸着剤、崩壊剤、酸化防止剤、防腐剤、滑沢剤、充填剤、芳香剤などが含まれるが、これらに限らない。例えば賦形剤として、ラクトース、デキストロース、スクロース、マンニトール、ソルビトール、セルロース、グリシン、シリカ、マグネシウムアルミノケイ酸塩、澱粉、ゼラチン、トラガカントゴム、アルギン酸、アルギン酸ナトリウム（Sodium alginate）、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、水、エタノール、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン、塩化ナトリウム、塩化カルシウム、オレンジエッセンス、ストロベリーエッセンス、バニラ香などが使用可能である。

【0037】

本発明の薬学的製剤が経口投与形態である場合、使用される担体の例にはセルロース、ケイ酸カルシウム、トウモロコシ澱粉、ラクトース、スクロース、デキストロース、リン

10

20

30

40

50

酸カルシウム、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ゼラチン、タルクなどが挙げられるが、これらに限らない。

【0038】

本発明の薬学的製剤が注射剤形態である場合、上記担体としては、水、食塩水、ブドウ糖水溶液、類似糖水溶液、アルコール、グリコール、エーテル、オイル、脂肪酸、脂肪酸エステル、グリセリドなどが挙げられるが、これらに限らない。

【0039】

本発明による化合物を薬剤として使用するために、後者を製薬製剤の形態に製造し、これは経口又は非経口投与用活性成分以外に、適した製薬上有機または無機の不活性担体物質、例えば、水、ゼラチン、アラビアゴム、ラクトース、澱粉、植物性オイル、ポリアルキレングリコールなどを含有する。製薬製剤は、固体状、例えば錠剤、糖衣錠、坐剤あるいはカプセル剤、または液体状、例えば液剤、懸濁剤あるいは乳剤として存在し得る。また、これらは任意に補助剤、例えば、防腐剤、安定化剤、湿潤剤あるいは乳化剤；浸透圧変更用塩または緩衝剤を含有する。

10

【0040】

非経口投与用としては、特に注射液剤または懸濁剤が好ましい。

【0041】

担体システムとして、界面活性補助剤、例えば、胆汁酸塩又は動物あるいは植物リン脂質、又はこれらの混合物、およびリポソームやその成分を使用することができる。

【0042】

経口投与用としては、特に滑石および／又は炭化水素ビヒクルあるいは結合剤、例えば、ラクトース、トウモロコシ又はジャガイモ澱粉を含有する錠剤、糖衣錠またはカプセル剤が好適である。また、液体状、例えば、甘味剤を加えたジュースを投与してもよい。

20

【0043】

また、本発明による上記化学式1の化合物の人体投与用量は一般的に体重70kgの成人患者を基準とする場合、0.1mg/日乃至2,000mg/日の範囲であるのが好ましい。本発明による化合物は1日1回から数回に分割投与できる。但し、上記の投与容量は患者の健康状態、年齢、体重および性別や、投与形態と疾患程度に応じて異なり、これゆえ本発明の範疇は上記提示した投与容量に限定するものではない。

【実施例】







30

【0044】

以下、本発明を下記の製造例および実施例に基づいてより詳しく説明するが、これは本発明を例示するものであり、本発明の範囲を限定するものではない。

【0045】

【表 1】

区分	化学構造	一般名
		IUPAC 名
比較例 1		クリシン
		5,7-ジヒドロキシ-2-フェニル-4H-クロメン-4-オン
合成例 1		7- <i>O</i> -アセチルクリシン
		5-ヒドロキシ-4-オキソ-2-フェニル-4H-クロメン-7-イル アセテート
合成例 2		5,7-ジ- <i>O</i> -アセチルクリシン
		4-オキソ-2-フェニル-4H-クロメン-5,7-ジイル ジアセテート
合成例 3		7- <i>O</i> -プレニルクリシン
		5-ヒドロキシ-7-((3-メチル-2-ブテン-1-イル) オキシ) -2-フェニル-4H-クロメン-4-オン
合成例 4		7- <i>O</i> -メトキシクリシン
		5-ヒドロキシ-7-メトキシ-2-フェニル-4H-クロメン-4-オン
合成例 5		5,7-ジ- <i>O</i> -メトキシクリシン
		5,7-ジメトキシ-2-フェニル-4H-クロメン-4-オン

10

20

30

【0046】

〔合成例 1 及び 2〕 7-*O*-アセチルクリシンおよび 5, 7-ジ-*O*-アセチルクリシンの合成

40

無水酢酸 (10 mM) をピリジン 50 mL 及びクリシン (10 mM) を含む溶液に滴下した。室温で攪拌しながら 2 時間反応させた後、40 °C で溶媒をロータリーエバポレーターで除去した。

【0047】

残留物を塩化メチレン (MC) に溶解させ 1 M HCl で 3 回洗浄した後、飽和重炭酸ナトリウム溶液および水で中和した。有機相を分離し、MgSO₄ 上で乾燥した上で真空中で濃縮した。残留物を MC/MeOH (10:0 乃至 9.5:1.5, v/v) で溶出させて 7-*O*-アセチルクリシン (7-*O*A) および 5, 7-ジ-*O*-アセチルクリシンを得た。

【0048】

〔合成例 3〕 7-*O*-プレニルクリシンの合成

50

無水アセトン（70 mL）にクリシン（10 mM）、プレニルブロミド（2.2 mM）および無水 K_2CO_3 （3.7 mM）を添加した後、混合物を65℃で8時間還流させた。

【0049】

＊混合物溶媒をロータリーエバポレーターで40℃で除去した。残留物をエチルアセテートに溶解させた後、ヘキサン／エチルアセテート（9：1：2：1、v／v）でシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製して7-O-プレニルクリシンを得た。

【0050】

〔合成例4及び5〕7-O-メトキシクリシンおよび5, 7-ジ-O-メトキシクリシンの合成

80 mLのDMC（Dimethyl Carbonate）中に2.54 gのクリシン（0.5 mmol）と1.84 gの1, 8-ジアザビシクロ（5.4.0）ウンデカー7-エン（1,8-Diazabicyclo（5.4.0）undec-7-ene）を混合し90℃で19時間反応を進めた。

【0051】

反応物にメタノール（240 mL）を入れて濃縮した後、その濃縮物にエチルアセテート（200 mL）と1N HCl（100 mL）を入れて分画を実施した。

【0052】

有機分画層（Ethyl acetate）を濃縮してNaClで中和した上、 Na_2SO_4 で脱水してシリカゲルカラムを行い、7-O-メトキシクリシンと5, 7-ジ-O-メトキシクリシンを分離した。

【0053】

〔実験例1〕

（1）アマドリ化合物（amadori compound）形成に対するヘモグロビン- δ -グルコノラクトン分析（初期段階）

タンパク質糖化の初期段階の評価は、 δ -グルコノラクトン分析法（Rahbar et al., 1999）によって決定された。簡単に言えば、37℃で7日間滅菌された暗条件の下で0.2 g/L NaN_3 を含有するリン酸塩緩衝液（pH 7.4）で新しいヒト血液（50 mg/mL）をブドウ糖（144 mg/mL）とともに培養した。

【0054】

いくつかの実験で、指示されたサンプルを0.01～1 mM濃度範囲でモデルシステムに添加した。サンプルの蛍光は355 nmおよび460 nmの励起および蛍光極大でそれぞれ測定された。アミノグアニジン（Aminoguanidine）は陽性対照群で公知の抑制剤として試験した。

【0055】

（2）AGE形成に対するウシ血清アルブミン-メチルグリオキサール分析（中間段階）

様々な濃度の化合物（対照群を含む）の存在下でウシ血清アルブミン（50 mg/mL）をリン酸ナトリウム緩衝液（0.1 M、pH 7.4）中メチルグリオキサール（100 mM）とともに37℃で24時間恒温培養した。

【0056】

サンプルを溶解させるために用いられたジメチルスルホキシドは反応に影響を及ぼさないことと判明された。全ての試薬およびサンプルを0.2 mMメンブレンフィルターを通してろ過し滅菌した。蛍光強度はルミネセンススペクトロメータ（Luminescence spectrometer）LS50B（Perkin-Elmer Ltd., Buckinghamshire, England）（Wu & Yen, 2005）を用いて355 nmの励起波長および460 nmの放出波長で測定した。アミノグアニジンは陽性対照群で試験した。50%阻害活性（ IC_{50} ）を示す各試験試料の濃度は、残留活性に対してプロットされた対数濃度の最小2乗回帰線から推定された。

【0057】

（3）AGEs 架橋結合に対するN-アセチル-グリシル-リシン-メチルエステルD-リボース検定（後期段階）

10

20

30

40

50

この試験はRahbar等（1999）によって記述された方法を用いてD-リボースの存在下でGKペプチドの架橋結合を阻害するサンプルの能力を評価するに使われた。GKペプチド（26.7 mg/mL）をリン酸ナトリウム緩衝液（0.5 M、pH 7.4）中D-リボース（200 mg/mL）と37℃で24時間無菌条件の下で培養した。合成された化合物を10 mMおよび50 mMで使われたアミノグアニジンを除いて1 mMの最終濃度でモデルシステムに添加した。培養期間の終期に、蛍光強度は335 nmの励起波長および460 nmの放出波長で測定された。

【0058】

〔実験例1の結果〕

各段階におけるクリシン誘導体の最終糖化産物の形成抑制効果は〔表2〕の通りである。

10

【0059】

【表2】

区分	IC ₅₀ (μM)		
	初期段階	中間段階	後期段階
比較例1	17.41	24.96	NI
合成例1	23.54	21.61	> 200
合成例2	0.26	0.91	22.33
合成例3	NI	> 200	> 200
合成例4	NI	> 200	NI
合成例5	7.88	41.78	39.88
陽性対照群（アミノグアニジン）	109.74	136.79	1902.67

20

【0060】

（1）初期段階の結果：アマドリ化合物形成に対するクリシン誘導体の抑制効果

アマドリ化合物形成を抑制するためにクリシンとその誘導体の能力を比較した結果、合成例1と合成例5の初期抑制活性は陽性対照群に比べてそれぞれ4.66倍、13.92倍高かった。合成例2はアマドリ化合物形成に対する最も強力な抑制活性を示したが、これはクリシンおよび陽性対照群よりも66.96倍および422.07倍も高かった。合成例2は0.0025～0.05 μg/mLで1.76～55.13%の容量依存的阻

30

【0061】

（2）中間段階の結果：クリシン誘導体のAGE形成抑制効果

クリシンおよび誘導体の抑制活性をAGE形成に対して分析しその結果を表2に示した。AGE抑制剤アミノグアニジン（IC₅₀ = 136.79 μM）を陽性対照群に用い、クリシンは陽性対照群より5.48倍高い活性を示した。

【0062】

試験化合物のうち合成例1、合成例2及び合成例5はIC₅₀値がそれぞれ21.61、0.91及び41.78 μMの強い活性を示した。特に合成例2は0.05～0.5 μg/mLの低濃度で6.79～93.42%の阻害活性を示した。

40

【0063】

（3）後期段階の結果：クリシン誘導体のAGE架橋結合抑制効果

表2に示されているように、合成例2および合成例5はAGE架橋結合に対して有意の抑制活性を示した。合成例2および合成例5はそれぞれ22.33および39.88 μMのIC₅₀値を示したが、陽性対照群は低いIC₅₀値（1902.67 μM）を示した。

【0064】

同様に、合成例2および合成例5はAGE形成の3段階でIC₅₀値が低いために潜在的なAGE抑制剤としてみなされ得る。一方、クリシンは10.0 mg/mLの濃度で抑制活性を示さなかった。

50

【0065】

[実験例2：RAW264.7細胞でNO生成および細胞生存率の測定]

RAW264.7細胞でクリシンおよび誘導体の細胞毒性をMTS分析キットを用いて調べた。細胞(1.6×10^4 ／ウェル)を96-ウェルプレートで培養し、サンプル(10、25および100 μ M)を12、24、48および72時間処理した。培養後、MTS溶液20 μ L／ウェルを加湿5%CO₂大気で37℃で90分間培養した。EL-800ユニバーサルマイクロプレートリーダー(Universal microplate reader)(Bio-Tek Instrument Inc., Winooski, USA)を用いて490nmでの光学密度を3回測定した。治療されていないグループの細胞生存率は100%と設定された。RAW264.7細胞を 4×10^5 細胞／ウェルで12-ウェルプレートに播種(seeding)し、LPS(1 μ g/mL)および24時間様々な濃度のサンプルに培養した。培地中の酸化窒素(NO)濃度は、製造者が記述したグリスト試薬システムを用いて測定した。EL-800ユニバーサルマイクロプレートリーダー(Bio-Tek Instrument Inc., Winooski, USA)を用いて570nmでNOの生成を測定し亜硝酸塩標準検量線[21]と比較した。

【0066】

[実験例2の結果]

RAW264.7細胞に対するクリシン誘導体の抗炎症効果の結果は図1の通りである。

【0067】

RAW264.7細胞でLPS-誘導された炎症に対するクリシンおよびその誘導体の影響を調べ、細胞炎症の程度を示すバイオマーカーとしてNO濃度を用いた。図1の(A)はLPS-誘導されたRAW264.7細胞でNO生成に対する比較例1、合成例1、合成例2、合成例4および合成例5の効果を示す。また、合成例2の処理はLPS-誘発RAW264.7細胞で濃度依存的にNOを抑制し、その効果は比較例1と類似していた。RAW264.7細胞でのクリシンおよび誘導体の細胞生存力効果はMTS分析によって観察された。上層液でNOの濃度はLPS処理後に増加し24時間後に25-100 μ M濃度で化合物が細胞毒性を示しなかった(図1(B))。

【0068】

図1はRAW264.7細胞でクリシンとその誘導体がNO生成(A)と細胞生存(B)に及ぼす影響を示す。*印はLPS群に比べて有意な差を見せた(* $p < 0.05$ 、** $p < 0.01$ 、*** $p < 0.001$)。提示されたデータは平均±標準誤差(SEM)($n = 3$)である。

【0069】

[実験例3：溶解度分析]

クリシンおよび誘導体を蒸留水に溶解させ溶解度を最大化するために1時間超音波処理して37℃で培養した。超音波処理後、遠心分離(7000g、37℃、5分)で溶解されていないサンプルを除去した。上層液をメタノールで希釈し0.45 μ m1回用シリンジフィルター(Advantec, Dublin, CA, USA)でろ過しHPLC分析を通してサンプルの濃度を分析した。

【0070】

[実験例3の結果]

クリシン誘導体の溶解度を比較すると[表3]の通りである。

【0071】


【表 3】

区分	水への溶解度 (mM、37℃)	相対的溶解度
比較例 1	0.030	1.00
合成例 1	0.086	2.87
合成例 2	0.265	8.83
陽性対照群	0.030	1.00

【0072】

水への溶解度は、合成例 1 及び合成例 2 がそれぞれ 0.086 および 0.265 で、比較例 1 より 2.87 倍、8.83 倍高かった。 10

【図 1】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2019/001158

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER <i>A61K 31/353(2006.01)i, A61K 9/00(2006.01)i, A61P 3/10(2006.01)i</i> According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61K 31/353; A23L 33/00; A23L 33/10; A61K 31/122; A61K 31/35; A61K 31/37; A61K 9/00; A61P 3/10 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Korean utility models and applications for utility models: IPC as above Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: chrysin derivative, diabetic complication, advanced glycation end products, pharmaceutical composition, pharmaceutical substances		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KR 10-2017-0002565 A (SUNTORY HOLDINGS LIMITED) 06 January 2017 See claims 1-5; paragraphs [0080]-[0084].	1-9
X	SHIN, J. -S. et al. Synthesis and hypoglycemic effect of chrysin derivatives. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 1999, vol. 9, pages 869-874 See abstract; page 873; table 1; formula 2.	1-9
X	SHIMADA, T. et al. Preventive effect of Kaempferia parviflora ethyl acetate extract and its major components polymethoxyflavonoid on metabolic diseases. Fitoterapia. 2011, vol. 82, pages 1272-1278 See abstract; pages 1272, 1276; figure 4.	1-9
X	WO 2008-008033 A1 (GLUCOX BIOTECH AB.) 17 January 2008 See claims 7-10; compound GLX 17.	1-9
A	KR 10-1742096 B1 (INDUSTRY ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION, HALLYM UNIVERSITY) 15 June 2017 See the entire document.	1-9
A	KR 10-1510257 B1 (INDUSTRY ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION, HALLYM UNIVERSITY) 09 April 2015 See the entire document.	1-9
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "I" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 25 APRIL 2019 (25.04.2019)		Date of mailing of the international search report 25 APRIL 2019 (25.04.2019)
Name and mailing address of the ISA/KR  Korean Intellectual Property Office Government Complex Daejeon Building 4, 189, Cheongsu-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, Republic of Korea Facsimile No. +82-42-481-8578		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/KR2019/001158

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2017-0002565 A	06/01/2017	AU 2015-256997 A1	24/11/2016
		CA 2948127 A1	12/11/2015
		CN 106456597 A	22/02/2017
		JP 2015-227329 A	17/12/2015
		SG 10201808940 A	29/11/2018
		SG 11201609248 A	29/12/2016
		TW 201625574 A	16/07/2016
		US 2017-0071902 A1	16/03/2017
		WO 2015-170683 A1	12/11/2015
WO 2008-008033 A1	17/01/2008	EP 2046313 A1	15/04/2009
KR 10-1742096 B1	15/06/2017	None	
KR 10-1510257 B1	09/04/2015	None	

국제조사보고서		국제출원번호 PCT/KR2019/001158
A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) A61K 31/353(2006.01)i, A61K 9/00(2006.01)i, A61P 3/10(2006.01)i		
B. 조사된 분야 조사된 최소문헌(국제특허분류틀 기재) A61K 31/353; A23L 33/00; A23L 33/10; A61K 31/122; A61K 31/35; A61K 31/37; A61K 9/00; A61P 3/10 조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 크리신 유도체, 당뇨병병증, 최종당화산물, 약학 조성물, 약학적 제제		
C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	KR 10-2017-0002565 A (산토리 홀딩스 가부시키키가이샤) 2017.01.06 청구항 1-5; 단락 [0080]-[0084] 참조.	1-9
X	SHIN, J. -S. 등, "Synthesis and hypoglycemic effect of chrysin derivatives", Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 1999, 9권, 페이지 869-874 초록; 페이지 873; 표 1; 도식 2 참조.	1-9
X	SHIMADA, T. 등, "Preventive effect of Kaempferia parviflora ethyl acetate extract and its major components polymethoxyflavonoid on metabolic diseases", Fitoterapia, 2011, 82권, 페이지 1272-1278 초록; 페이지 1272, 1276; 도면 4 참조.	1-9
X	WO 2008-068033 A1 (GLUCOX BIOTECH AB) 2008.01.17 청구항 7-10; 화합물 GLX 17 참조.	1-9
A	KR 10-1742096 B1 (한림대학교 산학협력단) 2017.06.15 전체 문헌 참조.	1-9
A	KR 10-1510257 B1 (한림대학교 산학협력단) 2015.04.09 전체 문헌 참조.	1-9
☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.		
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: "A" 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 "T" 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 "E" 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 "X" 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. "L" 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 "Y" 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. "O" 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 "&" 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌 "P" 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌		
국제조사의 실제 완료일 2019년 04월 25일 (25.04.2019)		국제조사보고서 발송일 2019년 04월 25일 (25.04.2019)
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-481-8578		심사관 이기철 전화번호 +82-42-481-3353

서식 PCT/ISA/210 (두 번째 용지) (2015년 1월)

국제조사보고서
대응특허에 관한 정보

국제출원번호

PCT/KR2019/001158

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2017-0002565 A	2017/01/06	AU 2015-256997 A1 CA 2948127 A1 CN 106456597 A JP 2015-227329 A SG 10201808940 A SG 11201609248 A TW 201625574 A US 2017-0071902 A1 WO 2015-170683 A1	2016/11/24 2015/11/12 2017/02/22 2015/12/17 2018/11/29 2016/12/29 2016/07/16 2017/03/16 2015/11/12
WO 2008-008033 A1	2008/01/17	EP 2046313 A1	2009/04/15
KR 10-1742096 B1	2017/06/15	없음	
KR 10-1510257 B1	2015/04/09	없음	

서식 PCT/ISA/210 (대응특허 추가용지) (2015년 1월)

フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 K 9/10 (2006.01)	A 6 1 K 9/10	
A 6 1 K 9/107 (2006.01)	A 6 1 K 9/107	
A 6 1 P 9/10 (2006.01)	A 6 1 P 9/10	
A 6 1 P 13/12 (2006.01)	A 6 1 P 13/12	
A 6 1 P 25/00 (2006.01)	A 6 1 P 25/00	
A 6 1 P 27/02 (2006.01)	A 6 1 P 27/02	
A 6 1 P 27/12 (2006.01)	A 6 1 P 27/12	
A 6 1 P 17/02 (2006.01)	A 6 1 P 17/02	

(81)指定国・地域 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ

- (72)発明者 ファン、スン ファン
大韓民国 1 2 2 3 9 キョンギード、ナミャンジューシ、ホンユルンロー 2 4 8 ボンイーギル、4 2、1 0 4ードン 1 1 0 3ーホ、(クムゴクードン、シンソン プルンソル アパートメント)
- (72)発明者 イ、ス ギョン
大韓民国 2 4 3 2 0 カンウォンード、チュンチョンーシ、ウソクロー 8 5 ボンイーギル、1、(ソクサードン)
- (72)発明者 チョ、グァン レ
大韓民国 2 4 2 5 2 カンウォンード、チュンチョンーシ、ハルリムテハクイーギル、1、(オクチョンードン)
- (72)発明者 クォン、ジョン ハン
大韓民国 1 0 3 5 9 キョンギード、コヤンーシ、イルサンドンーグ、イルサンーロ 4 6 3 ボンイーギル、3 3ー1、2 0 1ーホ、(チョンバルサンードン)
- (72)発明者 ハン、ジョン ウ
大韓民国 1 2 9 4 7 キョンギード、ハナムーシ、ハナムーデロ 8 0 2 ボンイーギル、1 1 1、3 0 6ードン、1 3 0 4ーホ、(シンジャンードン、エコタウン)
- (72)発明者 ハン、ボク ナム
大韓民国 2 4 3 3 6 カンウォンード、チュンチョンーシ、ミョンジューギル、3ー2、(ヒョジャードン)
- (72)発明者 イ、ジ ヨン
大韓民国 1 5 5 9 1 キョンギード、アンサンーシ、サンノクーグ、ソッコロー、2 0 4、1 1 0 6ーホ、(サードン、エリジウム)
- (72)発明者 バク、キョン ヒ
大韓民国 2 4 3 9 5 カンウォンード、チュンチョンーシ、チュンチョンスナナーロ、4 2、1 0 1ードン、1 5 0 4ーホ、(ソクサードン、サミックセラミック アpartment)
- (72)発明者 イ、ヒョン ギョン
大韓民国 0 5 2 3 3 ソウル、カンドンーグ、コドクロー 6 1ーギル、3 4、8 1 0ードン、2 0 1ーホ、(コドクードン、コドク コンムウォン アpartment)
- (72)発明者 サ、ユン ジ
大韓民国 1 1 9 3 1 キョンギード、クリーシ、ステクチョンロー、6 0、1 0 2ードン、1 2

０３ーホ、（ステクードン）

(72)発明者 イ、ジ ヒョン

大韓民国 ０２５７５ ソウル、トンデムシーグ、ワンサンーロ ２３ーギル、８９、１０２ード
ン、１４０３ーホ、（チェギードン、イスブラウンストーン アpartment）

Fターム(参考) 4C076 AA17 AA22 AA30 AA36 AA53 BB01 CC21

4C086 AA01 AA02 BA08 MA01 MA04 MA22 MA23 MA35 MA37 MA43

MA52 NA14 ZA01 ZA33 ZA36 ZA81 ZA89 ZC35 ZC41