




MD 38 Z5 2010.03.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **38** (13) **Z5**
(51) Int.Cl: *A61F 9/00* (2006.01)
G02C 7/02 (2006.01)
G02C 7/08 (2006.01)
G02C 7/10 (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE
DE SCURTĂ DURATĂ PRELUNGIT**

(21) Nr. depozit: s 2009 0021 (22) Data depozit: 2009.02.20 (45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2009.06.30, BOPI nr. 6/2009	Data publicării hotărârii de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului: 2015.04.30
(71) Solicitanți: GHIDIRIMSCI Tatiana, MD; BILBA Rodica, MD (72) Inventatori: GHIDIRIMSCI Tatiana, MD; BÎLBA Rodica, MD; CUȘNIR Valeriu, MD (73) Titulari: GHIDIRIMSCI Tatiana, MD; BILBA Rodica, MD	

(54) **Metodă de corecție a vederii la slab văzători**

(57) **Rezumat:**

1

Invenția se referă la medicină, și anume la oftalmologie și este destinată pentru corecția vederii la slab văzători.

Metoda de corecție a vederii la slab văzători constă în aceea că se efectuează examinarea pacientului și dacă se determină vicii de refracție de grad înalt asociate cu cataractă complicată nematură, și/sau cu afachie postoperatorie, și/sau cu retinopatie diabetică pre- sau proliferativă, și/sau cu degenerescența maculară senilă, și/sau cu distrofie centrală a retinei, și/sau cu atrofia parțială a nervului optic, și/sau cu glaucom, se determină gradul de dereglare a vederii și în cazul în care acuitatea vizuală este de 0,05...0,3 la cel mai bun ochi și câmpurile

2

vizuale sunt mai mici de 10 grade de la punctul de fixare, se prescriu pentru vedere în depărtare ochelari telescopici sau monoculare cu o mărire de 2,5x...20x a câmpului vizual, iar pentru vedere în apropiere la distanța de până la 33 cm se prescriu ochelari hiperoculari, și anume: pentru citire cu puterea optică de până la +20,0 D, pentru realizarea activităților la distanța de 8...20 cm cu puterea optică de +5,0...+12,0 D, iar la distanța de 18...25 cm cu puterea optică de până la +6,0 D, totodată ochelarii prescriși se combină cu filtre spectrale pentru vedere în depărtare O2, iar pentru vedere în apropiere J1 sau J2.

Revendicări: 2

MD 38 Z5 2010.03.31

(54) Method for vision correction to weak-eyed patients

(57) Abstract:

1

The invention refers to medicine, particularly ophthalmology and is meant for vision correction to weak-eyed patients.

The method for vision correction to weak-eyed patients consists in that it is examined the patient and if there are determined high-degree refraction anomalies associated with immature complicated cataract, and/or with postoperative aphakia, and/or with pre- or proliferative diabetic retinopathy, and/or with senile macular degeneration, and/or with central degeneration of retina, and/or with partial optic atrophy, and/or with glaucoma, it is determined the visual impairment degree and where the visual acuity is of 0,05...0,3 to the best eye and the visual fields are smaller than 10 degrees

2

from the fixation point, then for hyperopia are prescribed telescopic spectacles or monoculars with an increase of 2,5x...20x of the visual field, and for myopia at the distance of up to 33 cm are prescribed hyperocular spectacles, namely: for reading with the optical power of up to +20,0 D, for carrying out activities at the distance of 8...20 cm with the optical power of +5,0...+12,0 D, and at the distance of 18...25 cm with the optical power of up to +6,0 D, at the same time the prescribed spectacles are combined with spectral filters for hyperopia O2, and for myopia J1 or J2.

Claims: 2

Claims: 2

(54) Метод коррекции зрения у слабовидящих

(57) Реферат:

1

Изобретение относится к медицине, в частности к офтальмологии и предназначено для коррекции зрения у слабовидящих.

Метод коррекции зрения у слабовидящих состоит в том, что обследуют пациента и если определяют anomalies рефракции высокой степени, ассоциированные с незрелой осложнённой катарактой, и/или с послеоперационной афакией, и/или с пред- или пролиферативной диабетической ретинопатией, и/или с сенильной дегенерацией макулы, и/или с центральной дистрофией сетчатки, и/или с частичной атрофией зрительного нерва, и/или с глаукомой, определяют степень нарушения зрения и в случае, если острота зрения 0,05...0,3 у

2

лучшего глаза и поля зрения меньше 10 градусов от точки фиксации, то для дальнозоркости назначают телескопические очки или монокуляры с увеличением 2,5x...20x кратным поля зрения, а при близорукости на расстоянии до 33 см назначают гиперокулярные очки, а именно: для чтения с оптической силой до +20,0 D, для выполнения работ на расстоянии 8...20 см с оптической силой +5,0 ... +12,0 D, а на расстоянии 18...25 см с оптической силой до +6,0 D, причем назначенные очки комбинируют со спектральными фильтрами для дальнозоркости O2, а при близорукости J1 или J2.

П. формулы: 2

Descriere:

Invenția se referă la medicină, și anume la oftalmologie și este destinată pentru corecția vederii la slab văzători.

5 Se cunosc diferite metode de corecție și îmbunătățire a acuității vizuale.

Prescrierea de ochelari sferici și sferocilindrici este indicată în corectarea diverselor ametropii/vicii de refracție, cum ar fi miopiile, hipermetropiile, astigmatismele [1].

10 Din păcate, în caz de ametropii/ deficiențe de vedere severe, cum ar fi viciile de refracție de grad înalt, precum și asocierea acestora cu alte deficiențe, cum ar fi cataractele complicate nemature, afachia postoperatorie, retinopatia diabetică pre- și proliferativă, degenerescența maculară senilă, abiotrofia tapeto-retiniană, atrofia parțială a nervului optic, glaucomul etc., sau asocierile dintre aceste patologii, corecția vederii prin prescrierea ochelarilor sferici și sferocilindrici nu este suficientă, iar uneori este chiar inefficientă.

15 Pentru corecția vederii la slab văzători sunt cunoscute metodele de aplicare a ochelarilor sferoprismatici de mărit, destinați de asemenea pentru descărcarea completă a acomodării și parțială a convergenței. Valoarea componentei sferice suplimentare pentru mărirea imaginii pe retină se calculează după acuitatea vizuală a pacientului. Efectul prismatic se atinge din contul decentrării lentilei în interior, totodată la fiecare sferă suplimentară se efectuează deplasarea lentilei cu 1 mm [2].

20 Cu toate acestea, pacienții slab văzători în vârstă de 40...45 de ani utilizează în timpul citirii acomodarea lor, drept rezultat citesc cu ochelarii sus-menționați la o distanță mai mică decât este necesar, distanță care, la rândul său, necesită cheltuieli mari pentru convergență și dioptrii prismatice mari pentru descărcarea ei.

25 Mai este cunoscută o metodă de corecție optică a vederii pacienților cu vederea slabă, care constă în utilizarea ochelarilor cu lentile sferoprismatice binoculare pentru citirea caracterelor tipărite, caracterizată prin aceea că se evaluează volumul acomodării, se determină ținând cont de 1/2 din volumul acomodării puterea componentei sferice a lentilei la atingerea cu ea a vitezei maxime de citire, iar puterea componentei prismatice se stabilește după valoarea exoforiei cu lentilele sferice date la distanța corespunzătoare [3].

30 Dezavantajele acestor metode constau în aceea că ele nu pot îmbunătăți acuitatea vizuală și reda confortul vizual pacienților slab văzători, iar aceasta, la rândul său, afectează profund calitatea vieții acestor persoane. De asemenea, ele nu permit de a corecta maxim vederea în apropiere și la depărtare, ceea ce se reflectă negativ asupra calității vieții pentru pacienții slab văzători cu diverse patologii.

35 Problema pe care o rezolvă invenția propusă este obținerea posibilității de a realiza activități vizuale la diverse distanțe pentru slab văzători, ameliorând astfel calitatea vieții prin redarea independenței acestor oameni datorită posibilității realizării activităților atât în apropiere (scrisul, cititul, etc.), cât și la depărtare (efectuarea cumpărăturilor, mersul de unul singur în afara casei etc.).

40 Problema se soluționează prin aceea că se efectuează examinarea pacientului și dacă se determină vicii de refracție de grad înalt asociate cu cataractă complicată nematură, și/sau cu afachie postoperatorie, și/sau cu retinopatie diabetică pre- sau proliferativă, și/sau cu degenerescența maculară senilă, și/sau cu distrofie centrală a retinei, și/sau cu atrofia parțială a nervului optic, și/sau cu glaucom, se determină gradul de dereglare a vederii și în cazul în care
45 acuitatea vizuală este de 0,05...0,3 la cel mai bun ochi și câmpurile vizuale sunt mai mici de 10 grade de la punctul de fixare, se prescriu pentru vedere în depărtare ochelari telescopici sau monoculare cu o mărire de 2,5x...20x a campului vizual, iar pentru vedere în apropiere la distanța de până la 33 cm se prescriu ochelari hiperoculari, și anume: pentru citire cu puterea optică de până la +20,0 D, pentru realizarea activităților la distanța de 8...20 cm cu puterea optică de +5,0...+12,0 D, iar la distanța de 18...25 cm cu puterea optică de până la +6,0 D,
50 totodată ochelarii prescriși se combină cu filtre spectrale pentru vedere în depărtare O2, iar pentru vedere în apropiere J1 sau J2.

55 Este cunoscut că vederea la persoanele cu deficiențe de vedere poate fi îmbunătățită cu ajutorul ochelarilor, lentilelor de contact, medicamentelor sau intervențiilor chirurgicale (extracția cataractei, lasercoagularea retinei, intervenții antiglaucomatoase etc.). Însă există o categorie aparte de pacienți cu deficiențe de vedere, și anume slab văzători.

Prin slab văzător se subînțelege o persoană a cărei acuitate vizuală (AV) este de 0,3...0,2 ori mai slabă și până la 0,05 și nu poate fi îmbunătățită cu ajutorul ochelarilor, lentilelor de

contact, medicamentelor sau intervențiilor chirurgicale. Cu această vedere restantă pacienții sunt considerați orbi social, ei având posibilitate redusă de orientare, funcția vizuală fiind insuficientă pentru o activitate utilă, în care trebuie implicată vederea centrală. În această situație cititul, scrisul, privitul la televizor, gătitul, efectuarea cumpărăturilor etc. pot deveni

5

lucruri extrem de greu de realizat.

Metoda propusă este îndreptată spre corecția optică pentru pacienții slab văzători cu deficiențe de vedere ca: vicii de refracție de grad înalt, precum și asocierea acestora cu alte deficiențe, cum ar fi cataractele complicate nemature, afachia postoperatorie, retinopatia diabetică pre- și proliferativă, degenerescența maculară senilă, abiotrofia tapeto-retiniană, atrofia parțială a nervului optic, glaucomul etc. sau asocieri între aceste patologii prin

10

prescrierea combinată a dispozitivelor de ajutor vizual (DAV) (mecanismul de acțiune al cărora se explică prin mărirea imaginii pe retină).

Examinarea vederii la slab văzători este mult mai complicată decât verificarea vederii la cei sănătoși și urmărește două scopuri:

15

1) de a determina procentul vederii restante a pacientului,

2) de a îmbunătăți această vedere cu ajutorul lentilelor speciale, prismelor, dispozitivelor speciale, filtrelor etc., pentru ca pacientul să se poată ocupa de afacerile sale zilnice sau să lucreze.

20

Dispozitivele de ajutor vizual pentru slab văzători au menirea de a încerca să ușureze viața și de a reda independența acestor oameni și sunt indicate în aceeași măsură adulților și copiilor. Pentru copii sunt utile, deoarece permit o mai bună dezvoltare intelectuală a acestora prin intermediul analizatorului vizual.

Metoda se efectuează în felul următor:

25

Se examinează pacientul și se culege anamneza. Se determină ce deficiențe are, de exemplu: vicii de refracție de grad înalt și/sau asociate cu cataracte complicate nemature, sau afachie postoperatorie, sau retinopatie diabetică pre- și proliferativă, sau degenerescența maculară senilă, sau abiotrofia tapeto-retiniană, sau atrofie parțială a nervului optic, glaucom etc. și se efectuează vizometria la depărtare și în apropiere fără și cu corecție, perimetria, autorefractometria, schiascopia, testul Amsler, testul Flash, testarea vederii binoculare, sensibilitatea la contrast, tonometria etc.

30

Deoarece majoritatea slab văzătorilor au dereglări de refracție, este necesar de efectuat în primul rând corecția ametropiilor conform metodelor de bază (Rozenblium Iu. Z. Optometria, 1996).

Astfel, pacienților le-au fost prescrise următoarele dispozitive de ajutor vizual (DAV):

35

1. Pentru depărtare s-au prescris ochelari telescopici și monoculare care au diverse metode de fixare ce contribuie la îmbunătățirea orientării și mobilității, deci asigură independența în timpul mersului, care este un factor important în reabilitarea slab văzătorilor.

Metoda prescrierii ochelarilor telescopici include:

40

a. Conform unui tabel special se determină AV pentru fiecare ochi în parte mono- și binocular cu corecția optică a pacientului;

b. Medicul, sub controlul vederii proprii (la fel cu corecția ametropiei în cazul în care aceasta există) focalizează monocularul la obiectul testat;

c. Se apreciază acuitatea vizuală cu fiecare telescop/monocular în parte;

d. Medicul aduce la cunoștința pacientului tehnica folosirii dispozitivului, și anume:

45

- se determină hotarele câmpului vizual prin dispozitiv,
- se instruează pacientul cum să-l ajusteze pe o anumită claritate de la diferite distanțe.

Ochelarii telescopici se indică pentru orientare, și anume în scopul de a vedea obiectele mici pe o perioadă de timp mai scurtă, iar monocularele – telescoapele portabile se pot combina ușor cu corecția sferică sau sfero-cilindrică a ametropiilor și astigmatismului. Dacă pacientul are nevoie să-l folosească o perioadă de timp mai scurtă, atunci monocularul poate fi susținut cu mâna la ochiul care vede mai bine. Dacă are nevoie să-l folosească mai mult timp, atunci se prescriu monoculare care se fixează de rama ochelarilor.

50

2. Pentru apropiere se prescriu următoarele dispozitive de ajutor vizual: ochelari-hiperoculari și diverse lupe.

55

Metoda prescrierii hiperocularilor constă în aceea că:

a. Conform unui tabel special se determină AV pentru apropiere mono- și binocular cu corecția optică a pacientului;

b. Conform altui tabel se determină pragul de citire și mărimea caracterelor pe care le citește liber pacientul;

c. Se determină adaosul dioptric pentru aceste caractere.

- 5 e. În fața ochilor se pune lentila corespunzătoare, puterea căreia se determină din puterea lentilei optice care corijează ametropia și adaosul dioptric. Magnificarea necesară reprezintă raportul acuității vizuale necesare la acuitatea vizuală prezentă. De exemplu: dacă pacientul are necesitatea să citească caracterele cu AV 0,4, iar AV a lui este 0,1, atunci magnificarea va fi de 4x.

f. Se examinează posibilitatea monoculară a cititului caracterelor de ziar.

- 10 Ochelarii-hiperoculari sunt indicați pentru lucrul în apropiere, la distanțe mai mici de 33 cm. Pentru activitățile, cum ar fi: scrisul, desenatul - se prescriu hiperoculari cu adaosul dioptric al puterii optice de + 5,0 până la + 12,0 D; pentru citit – hiperoculari până la + 20,0 D; pentru pregătirea bucatelor și alte activități realizate la distanța de 25...18 cm – hiperoculari cu puterea de până la + 6,0 D.

- 15 Diverse lupe (de mână, de buzunar, ce se fixează, cu și fără iluminare, cu putere diversă de magnificare) sunt indicate în cazul scăderii progresive a vederii, precum și pentru lucrul efectuat la distanțe mai mici de 33 cm. Unul dintre avantaje este că lupele pot fi ușor combinate cu ochelarii-hiperoculari mono- și binoculari, măbind astfel amplificarea.

- 20 Metoda prescrierii lupelor este aceeași ca și în cazul hiperocularilor, doar că adaosul dioptric se transformă în multiplu și se împarte la 4.

Rezultatele studiului au devenit mai bune în cazul când au fost combinate lupele cu ochelarii-hiperoculari, în așa fel asigurându-se o redare a capacității de scris și citit în 70% cazuri.

- 25 3. Prescrierea filtrelor curative spectrale reprezintă o direcție nouă în reabilitarea medico-socială a slab văzătorilor.

Lentilele cu filtre spectrale au fost prescrise ținând cont de condițiile lucrului optic: pentru lucrul în apropiere, pentru depărtare, precum și de gradul de luminozitate.

Metoda prescrierii filtrelor spectrale constă în:

- 30 a. Conform tabelului special se determină AV pentru apropiere mono- și binocular fără corecția optică;

b. Se determină refracția;

c. Se efectuează corecția optică maximală;

- 35 d. În rama de probă se aplică diverse filtre spectrale (1. galben-deschise J1 care sunt permeabile pentru lumină 50%, au lungimea de undă a luminozității de 460 nm; 2. galben intens J2 care sunt permeabile pentru lumină 50%, au lungimea de undă a luminozității de 420 nm; 3. oranj O2 care sunt permeabile pentru lumină 50%, au lungimea de undă a luminozității mai mare de 520 nm; 4. galben-cafenii K4-K6 5...30%, cu permeabilitatea luminii mai mare de 560 nm), dar mai frecvent s-au utilizat pentru depărtare filtrele O2, iar pentru apropiere J1, J2.

- 40 Așadar, la pacienții slab văzători care au acuitatea vizuală corespunzător cu indicii 0,3...0,05 la cel mai bun ochi, având campurile vizuale < 10 grade de la punctul de fixare, se prescriu ochelari telescopici sau monoculari cu mărirea multiplu cu 2,5...20 a campului vizual, care se combină cu ochelari cu corecția sferică sau sfero-cilindrică a ametropiilor, iar pentru activitatea în apropiere, la o distanță mai mică de 33 cm, se prescriu ochelari-hiperoculari: pentru citire - până la + 20,0 D, pentru realizarea activităților la distanța de 8...20 cm, așa ca
45 scrisul, lucrul manual - cu puterea optică de la +5,0 până la + 12,0 D, iar pentru distanța de 25...18 cm – până la 6,0 D și lupe cu diversă putere de magnificare ce se combină cu filtrele spectrale la depărtare O2, iar în apropiere J1, J2.

Aceste metode de reabilitare a pacienților cu deficiențe de vedere – a slab văzătorilor sunt prescrise în cadrul Societății Orbilor din Moldova și în unele instituții medico-sanitare, cum ar fi Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Em. Coșaga”, Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime” etc.

- 50 În urma prescrierii și întrebuințării combinate a DAV se poate constata că pacienții au căpătat abilitatea de a citi și scrie de la 1,5 la 92%, capacitatea de a vedea la depărtare (a privi TV, a se deplasa independent etc.) de la 0,8 la 71%, pe când în grupul de control acești indici nu au depășit 5...7%.

Rezultatul invenției constă în optimizarea corecției optice a vederii pacienților slab văzători atât la depărtare, cât și în apropiere, și în apărarea de degradare-foto.

Rezultatul se obține prin prescrierea combinată a dispozitivelor de ajutor vizual - DAV (ochelari telescopici și monoculari, ochelari-hiperoculari, lupe cu diversă putere de magnificare) și a filtrelor curative spectrale.

- 5 Avantajul acestei invenții este ameliorarea calității vieții pacientului cu reinsertia lui în viața socială, datorită prescrierii combinate a DAV având loc: crearea posibilității de a realiza activități vizuale la diverse distanțe (de a se deplasa, a merge de sine stătător, a scrie, a citi, a face studii etc.), precum și de a reda confortul vizual și psihologic.

Exemple de realizare a invenției

Exemplul 1

- 10 Pacienta A., în vârstă de 50 ani, cu acuze la vedere scăzută, fotofobie, imposibilitatea de a realiza activitățile zilnice necesare – a citi, a scrie, a merge la cumpărături, policlinică.

D-cul: OU Retinopatie diabetică proliferativă, cataractă complicată nematură, hipermetropie gr. mic, presbiopie.

- 15 Din anamneză suferă de DZ tip II timp de 16 ani. Timp de 3...4 ani a scăzut foarte mult vederea. A urmat cure de lasercoagulare a retinei, picură sol. Taufon 4%, dar vederea nu s-a îmbunătățit semnificativ. Până la momentul examinării nu a purtat ochelari.

Obiectiv: AV pentru depărtare OD - 0,07 c.c.sph + 1,5 D = 0,09

OS - 0,09 c.c.sph + 1,0 D = 0,1

AV pentru apropiere OD - 0,08

- 20 OS - 0,1

Testul Amsler: OD - metamorfopsii

OS - metamorfopsii

CV: OD - îngustat cu 25...30 grade

OS - îngustat cu 25...30 grade

- 25 Tonometria: OD - 19,0 mm/Hg

OS - 20, 0 mm/Hg

OU - motilitatea globilor oculari în volum deplin, dar încetinită;

corneea – netedă, transparentă,

- 30 pupila – sferică, reflexivă;

cristalinul - opacifiat neomogen;

F.O. - multiple exsudate și proliferări, microanevrisme.

S-au prescris următoarele dispozitive de ajutor vizual / mijloace optice speciale (DAV/MOS):

- 35 - pentru distanță – monocularul 4x care ușor se fixează de rama ochelarilor, cu filtre spectrale 02, AV s-a mărit până la 0,3 la OS (corecția se face după ochiul mai bun);

- pentru apropiere – s-au ales ochelari hiperoculari, OD + 15,0 D, OS + 13,0 D Dpp = 66 mm. S-a instruit pacientul ca să citească cu fiecare ochi în parte (celălalt fiind acoperit, și să citească cu fiecare ochi nu mai mult de 10...15 minute).

- 40 În urma prescrierii combinate a DAV/MOS la pacient s-a îmbunătățit vederea atât la distanță, cât și în apropiere, a căpătat și confort vizual în urma prescrierii filtrelor spectrale.

Exemplul 2

- 45 Pacientul X., în vârstă de 27 ani, prezintă plângeri la OD - lipsa vederii și la OS - vedere scăzută, fotofobie pronunțată. Din anamneză: se consideră bolnav din copilărie, iar la OD a pierdut vederea și ochiul în urma unui accident.

Diagnosticul: OD - anoftalm protezat, OS – distrofie centrală a retinei.

Obiectiv s-au constatat următoarele: AV la distanță: OD - 0

OS - 0,07 n.c.

AV pentru apropiere: OD - 0

- 50 OS - 0,09

Testul Amsler: OS - metamorfopsii,

CV: OS - scotom central masiv,

OS - corneea – netedă, transparentă; cristalinul - transparent,

F.O. - în regiunea centrală a retinei focar degenerativ masiv vechi (d = 1,5 CNO)

- 55 S-au prescris următoarele DAV/MOS:

1. Pentru depărtare – telescopul de focusare monocular 6x și filtrele spectrale + 527 (02)

AV s-a mărit până la 0,1.

2. Pentru apropiere – ochelari monoculari + 11,0 D care pot fi înlocuiți periodic cu lupa 8x.

În urma prescrierii combinate a DAV/MOS la pacient s-a îmbunătățit vederea atât la distanță, cât și în apropiere, de asemenea s-a redus fotofobia în urma prescrierii filtrelor spectrale.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. Аветисов Э.С. Близорукость. Москва, 2002, с. 203-226
2. Faye E.E. Clinical Low Vision. Boston. Toronto, 1984, p.118
3. RU 2175222 C2 2001.10.27

(57) Revendicări:

1. Metodă de corecție a vederii la slab văzători, ce constă în aceea că se efectuează examinarea pacientului și dacă se determină vicii de refracție de grad înalt asociate cu cataractă complicată nematură, și/sau cu afachie postoperatorie, și/sau cu retinopatie diabetică pre- sau proliferativă, și/sau cu degenerescenta maculară senilă, și/sau cu distrofie centrală a retinei, și/sau cu atrofia parțială a nervului optic, și/sau cu glaucom, se determină gradul de dereglare a vederii și în cazul în care acuitatea vizuală este de 0,05...0,3 la cel mai bun ochi și câmpurile vizuale sunt mai mici de 10 grade de la punctul de fixare, se prescriu pentru vedere în depărtare ochelari telescopici sau monoculare cu o mărire de 2,5x...20x a câmpului vizual, iar pentru vedere în apropiere la distanța de până la 33 cm se prescriu ochelari hiperoculari, și anume: pentru citire cu puterea optică de până la +20,0 D, pentru realizarea activităților la distanța de 8...20 cm cu puterea optică de +5,0...+12,0 D, iar la distanța de 18...25 cm cu puterea optică de până la +6,0 D, totodată ochelarii prescriși se combină cu filtre spectrale pentru vedere în depărtare O2, iar pentru vedere în apropiere J1 sau J2.

2. Metodă, conform revendicării 1, în care pentru vedere la distanța de până la 33 cm se folosesc suplimentar lupe cu diverse puteri de amplificare.

Director adjunct Departament:

GROSU Petru

Examinator:

IUSTIN Viorel

RAPORT DE DOCUMENTARE

pentru cerere de brevet de invenție de scurtă durată conform art.52(2) a Legii nr. 50/2008

(21) Nr. depozit: s 2009 0021																							
(22) Data depozit: 2009.02.20																							
(51) IPC: Int. Cl.: A61F 9/00 (2006.01) G02C 7/02 (2006.01) G02C 7/08 (2006.01) G02C 7/10 (2006.01) Alți indici de clasificare: Titlul: Metodă de corecție a vederii la slab văzători (71) Solicitantul: GHIDIRIMSCI Tatiana, MD; BILBA Rodica, MD																							
I. Condiția de unitate a invenției ☒ satisface ☐ nu satisface. Notă:																							
II. Minimul de documente consultate: MD, EA MD 1994-2009 EA 1995-2009																							
III. Domeniul de documentare: Indicii IPC (ultima redacție): Int. Cl.: A61F 9/00 (2006.01) G02C 7/02 (2006.01) G02C 7/08 (2006.01) a) G02C 7/10 (2006.01) b) Termeni caracteristici, cuvinte-cheie, sinonime: miopie, hipermetropie, slab văzător, ochelari telescopici, monoculare, filtru spectral																							
IV. Documente considerate a fi relevante <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente</th> <th>Relevant față de revendicarea nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A,D</td> <td>Аветисов Э.С. Близорукость. Москва, 2002, с. 203-226</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A,D</td> <td>Faye E.E. Clinical Low Vision. Boston. Toronto, 1984, p.118</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A,D</td> <td>RU 2175222 C2 2001.10.27</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>MD 3803 F1 2009.01.31</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>EA200200191A1 26.06.2003</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>EA200801173A2 30.10.2008</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Categoria	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Relevant față de revendicarea nr.	A,D	Аветисов Э.С. Близорукость. Москва, 2002, с. 203-226	1	A,D	Faye E.E. Clinical Low Vision. Boston. Toronto, 1984, p.118	1	A,D	RU 2175222 C2 2001.10.27	1	A	MD 3803 F1 2009.01.31	1	A	EA200200191A1 26.06.2003	1	A	EA200801173A2 30.10.2008	1
Categoria	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Relevant față de revendicarea nr.																					
A,D	Аветисов Э.С. Близорукость. Москва, 2002, с. 203-226	1																					
A,D	Faye E.E. Clinical Low Vision. Boston. Toronto, 1984, p.118	1																					
A,D	RU 2175222 C2 2001.10.27	1																					
A	MD 3803 F1 2009.01.31	1																					
A	EA200200191A1 26.06.2003	1																					
A	EA200801173A2 30.10.2008	1																					
Categorii de documente citate <table border="1"> <tr> <td>A - document care definește stadiul anterior în general</td> <td>O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere etc.</td> </tr> <tr> <td>X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă</td> <td>P - document publicat înainte de data de depozit dar după data priorității invocate</td> </tr> <tr> <td>Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură</td> <td>T - document publicat după data de depozit sau a priorității invocate, citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria care fundamentează invenția</td> </tr> <tr> <td>E - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după această dată</td> <td>D – Document menționat în descrierea cererii de brevet</td> </tr> </table>			A - document care definește stadiul anterior în general	O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere etc.	X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă	P - document publicat înainte de data de depozit dar după data priorității invocate	Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură	T - document publicat după data de depozit sau a priorității invocate, citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria care fundamentează invenția	E - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după această dată	D – Document menționat în descrierea cererii de brevet													
A - document care definește stadiul anterior în general	O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere etc.																						
X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă	P - document publicat înainte de data de depozit dar după data priorității invocate																						
Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură	T - document publicat după data de depozit sau a priorității invocate, citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria care fundamentează invenția																						
E - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după această dată	D – Document menționat în descrierea cererii de brevet																						

Data finalizării documentării	2009-04-28
Examinatorul	GROSU Petru

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: s 2009 0021 (32) Data de prioritate recunoscută: (22) Data depozit: 2009.02.20 Raport de documentare internațională: ☐ da (67)* Nr. și data transformării cererii: , (71) Solicitant: GHIDIRIMSKI Tatiana, MD; BILBA Rodica, MD (54) Titlul: Metodă de corecție a vederii la slab văzători		
II. Clasificarea obiectului invenției:		
(51) Int.Cl: <i>A61F 9/00</i> (2006.01) <i>G02C 7/02</i> (2006.01) <i>G02C 7/08</i> (2006.01) <i>G02C 7/10</i> (2006.01)		
III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)		
MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta): Int.Cl: <i>A61F 9/00, G02C 7/02, G02C 7/08, G02C 7/10</i> Miopie, hipermetropie, „ochelari telescopici” "Worldwide" (Espacenet): Int.Cl: <i>A61F 9/00, G02C 7/02, G02C 7/08, G02C 7/10</i> Myopia, hyperopia, "telescopic glasses" EA, CIS (Eapatis): Int.Cl: <i>A61F 9/00, G02C 7/02, G02C 7/08, G02C 7/10</i> Миопия, гиперметропия, "телескопические очки" SU (nonpublic): Int.Cl: <i>A61F 9/00, G02C 7/02, G02C 7/08, G02C 7/10</i> Миопия, гиперметропия, "телескопические очки"		
IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
V. Documente considerate a fi relevante		
Categorie*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	EA 200200191 A1 2003.06.26	1
A	EA 200801173 A2 2008.10.30	1
A	ВОЛКОВА Е.М. Влияние тонуса вегетативной нервной системы на функциональное состояние аккомодации при миопии. автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук, 2007, с.1-15.	1
A	ТАРУТТА Е.П. Возможности профилактики прогрессирующей и осложненной миопии в свете современных знаний о ее патогенезе. - Вестник офтальмологии, 2006, т.122	1

A	EP 647445 A1 1995.04.12	1
A	RU 96121450 A 1999.01.20	1
A	RU 94017956 A1 1996.04.27	1
A	RU 940166912 A1 1997.04.10	1
A	RU 2010558 C1 1994.06.15	1
A	RU 2144808 C1 2000.01.27	1
A	WO 0207626 A1 2002.01.31	1
A	UA 8921 U 2005.08.15	1
A	SU 1599003 A1 1990.10.15	1
A	SU 1071300 A 1984.02.07	1
A	RU 2200029 C2 2003.03.10	1
A	CA 2416320 A1 2002.01.31	1
A, D	Аветисов Э.С. Близорукость. Москва, 2002, с. 203-226	1
A, D	Faye E.E. Clinical Low Vision. Boston. Toronto, 1984, p.118	1
A, D, C	RU 2175222 C2 2001.10.27	1
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția	
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată	
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet	
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție	
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete	
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri	
Data finalizării documentării		2015.03.10
Examinator		IUSTIN Viorel