




СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **940377** **A**

3(51) А 61 Н 39/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 3225302/28-13

(22) 26.12.80

(46) 15.08.83. Бюл. № 30

(72) Н. Н. Осилова и М. Н. Мельникова

(71) Центральный научно-исследовательский институт рефлексотерапии

(53) 613.647 (088.8)

(56) 1. Рогова Д. А. Игло-рефлексотерапия в лечении больных язвенной болезнью. В сб.: "Игло-рефлексотерапия", 1974, с. 93.

(54)(57) СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, предусматривающий воздействие на точки акупунктуры, расположенные в области эпигастрия, спины и конечностей, введение лекарственных средств и проведение диетотерапии, отличающийся тем, что, с целью ускорения заживления язвы, дополнительно воздействуют иглоукапыванием на точки акупунктуры Gi-11, AP-83, AP-87, AP-88, AP-55, AP-29 в течение 20-30 мин.

(19) **SU** (11) **940377** **A**

Изобретение относится к медицине, а именно к рефлексотерапии.

Известен способ лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, предусматривающий воздействие на точки акупунктуры, расположенные в области эпигастрия, спины и конечностей, введение лекарственных средств и проведение диетотерапии [1].

Однако известный способ требует длительного времени для заживления язвы, при этом способ недостаточно эффективен.

Целью изобретения является ускорение заживления язвы.

Это достигается тем, что при осуществлении способа лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, предусматривающего воздействие на точки акупунктуры, расположенные в области эпигастрия, спины и конечностей, введение лекарственных средств и проведение диетотерапии, дополнительно воздействуют иглоукалыванием на точки акупунктуры G1-11, AP-83, AP-87, AP-88, AP-55, AP-29 в течение 20-30 мин.

Способ осуществляют следующим образом.

Больные с обострением язвенной болезни поступают в стационар, где с первых дней пребывания назначают диету (стол № 1а, 1б, 1) и лекарственную терапию, содержащую препараты из групп спазмолитиков антагонистов, биостимуляторов. В эти дни больной проходит полное обследование с целью установления клинического диагноза, что позволяет исключить возможные противопоказания к рефлексотерапии. С 6-7 дня пребывания в стационаре назначают рефлексотерапию. Если больной госпитализирован обследованным в амбулаторных условиях, возможно назначение рефлексотерапии с первых дней. Сеансы проводят ежедневно в утренние часы после приема пищи (завтрака). Продолжительность сеанса 20-30 мин. Иглы вводят в точки акупунктуры до появления специфических ощущений, при этом используют следующие точки акупунктуры:

- 1 сеанс - G1-11
- 2 сеанс - MC6, J 12, AP-55
- 3 сеанс - RP4, E25, AP-29, AP-87
- 4 сеанс - G1-11, V 17, Y21, AP-83
- 5 сеанс - E36, J 12, R19, AP-87, AP-29
- 6 сеанс - G1-11, J 12, J 15, AP-88
- 7 сеанс - Y60, T14, Y21

- 8 сеанс - MC6, RP-4, AP-87, AP-29
- 9 сеанс - G1-11, E19, AP-55
- 10 сеанс - V B 39, E25, J 12
- 11 сеанс - TR5, Y11, Y20, AP-83, AP-88
- 12 сеанс - G1-11 E21, J 15
- 13 сеанс - RP4, R21, AP-55
- 14 сеанс - E36, J 12, AP-83, AP-87
- 15 сеанс - G1-11, AP-88.

**Пример.** Больной 51 год, диагноз: язвенная болезнь с локализацией в луковице двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Назначено комплексное лечение: диета (стол № 1), платифиллин 0,2% -ный 1 мл внутримышечно 2 раза в день, викалин 2 таблетки 3 раза в день, витамин B<sub>1</sub> 6% 1 мл подкожно. Начат курс рефлексотерапии, при котором применялись следующие сочетания точек:

- 1 сеанс - G1-11
- 2 сеанс - MC6, J 12, AP-55,
- 3 сеанс - RP4, E25, AP-29
- 4 сеанс - G1-11, T14, Y21, AP-83, AP-29
- 5 сеанс - E36, R19, AP-87
- 6 сеанс - Y60, Y11, V 17
- 7 сеанс - G1-11, E19, AP-83, AP-29
- 8 сеанс - MC6, RP4, J 12
- 9 сеанс - YB39, E25, J 15, AP-55, AP-88
- 10 сеанс - G1-11, V 20, AP-87, AP-29
- 11 сеанс - MC6, J 15, AP-88.

При обследовании на гастродуоденоскопии обнаружена свежая грубая рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки с налетом фибрина. Лечение длилось 27 дней.

Предложенный способ применен при лечении 107 больных в возрасте от 17 до 68 лет. Мужчин - 88, женщин - 19; давность заболевания от 1 года до 36 лет. Локализация язвы в желудке отмечалась у 23 человек, в двенадцатиперстной кишке - у 84 человек. Все больные поступали в стационар в период выраженного обострения заболевания, подтвержденного рентгенологическим или эндоскопическим методами исследования. Результаты лечения по основному критерию эффективности (заживлению язвы) составили: 73,9% (с использованием корпоральных точек) и 81,6% (с использованием корпоральных и аурикулярных точек), в среднем 76,6%. Общий положительный эффект (заживление и улучшение) составил 95,7% при применении комплексного пе-

чения с использованием корпоральных точек акупунктуры, а при дополнительном воздействии на точки ушной раковины положительный эффект наблюдался у всех больных. Средний срок пребывания больных в стационаре при лечении предложенным способом составил 31 день при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и 34 дня при язвенной болезни

желудка, в то время как при лечении без рефлексотерапии требовалось 34 и 40 дней соответственно.

Таким образом, предложенный способ позволяет ускорить сроки заживления язвы, что сокращает время пребывания больных в стационаре на 9% при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и на 15% при язвенной болезни желудка.

Составитель Ю. Азмазов  
Редактор Е. Миронова      Техред М.Наць      Корректор А. Тяско

---

Заказ 7980/1      Тираж 713      Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

---

филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4