



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104398786 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 11

(21) 申请号 201410630290. 8

(22) 申请日 2014. 11. 11

(71) 申请人 济南新起点医药科技有限公司

地址 250001 山东省济南市市中区 288 号恒
昌大厦 2303

(72) 发明人 孙波 孙倩 穆柯晓 郝爱华
王蒙蒙

(51) Int. Cl.

A61K 36/8968(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

A61K 31/045(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种用于治疗白痢的痢子水

(57) 摘要

本发明涉及中药组合物领域,更具体的讲是一种用于治疗白痢的痢子水,其由下述组分组成:冰片、金银花、地骨皮、荷叶、马齿苋、茯苓、翻白草、穿心莲、泽泻、陆英、甘草、麦冬,本发明的有益效果是:本发明的痢子水见效快,当天能够止痒,3-7天痊愈,其中3天治愈者78.89%、显效者20.37%,7天治愈者达到98.89%,总有效率100%。

1. 一种用于治疗白痢的痢子水,由下述组分组成:冰片、金银花、地骨皮、荷叶、马齿苋、茯苓、翻白草、穿心莲、泽泻、陆英、甘草、麦冬门。

2. 根据权利要求1所述的一种用于治疗白痢的痢子水,其特征在于:由下述按重量份计的组分组成:冰片1-5份、金银花5-10份、地骨皮5-10份、荷叶5-10份、马齿苋5-10份、茯苓1-5份、翻白草1-5份、穿心莲1-5份、泽泻1-5份、陆英1-5份、甘草1-5份、麦冬门1-5份。

3. 根据权利要求2所述的一种用于治疗白痢的痢子水,其特征在于:由下述按重量份计的组分组成:冰片2份、金银花6份、地骨皮6份、荷叶6份、马齿苋6份、茯苓2份、翻白草2份、穿心莲2份、泽泻2份、陆英2份、甘草2份、麦冬门2份。

4. 根据权利要求2所述的一种用于治疗白痢的痢子水,其特征在于:由下述按重量份计的组分组成:冰片3份、金银花8份、地骨皮8份、荷叶8份、马齿苋8份、茯苓3份、翻白草3份、穿心莲3份、泽泻3份、陆英3份、甘草3份、麦冬门3份。

5. 根据权利要求1所述的一种用于治疗白痢的痢子水的制备方法,包括如下步骤:将冰片、金银花、地骨皮、荷叶、马齿苋、茯苓、翻白草、穿心莲、泽泻、陆英、甘草、麦冬门加水煎煮提取三次,第一次加中药组分总质量5倍的水煎煮提取2小时,第二次加中药组分总质量3倍量水煎煮提取1.5小时,第三次加中药组分总质量2倍量水煎煮提取1小时,将3次煎煮提取的煎液合并;向合并后的煎液中加入上述蒸馏后的水溶液,过滤,滤液浓缩至在60℃时相对密度为1.07~1.10,放冷至室温,加入乙醇至含醇量达到60%,搅匀,在6~9℃下静置24小时,过滤;滤液浓缩至在60℃时相对密度为1.07~1.10,并在浓缩过程中回收乙醇,再加入与浓缩后的滤液等体积的水稀释,搅匀,在6~9℃静置下24小时,过滤;即可。

一种用于治疗白痱的痱子水

技术领域

[0001] 本发明涉及中药组合物领域,更具体的讲是一种用于治疗白痱的痱子水。

背景技术

[0002] 痱子是夏季或炎热环境下常见的表浅性、炎症性皮肤病,由于环境中气温高、湿度大,出汗过多,不易蒸发,汗液使表皮角质层浸渍,致使汗腺导管口变窄或阻塞,汗腺导管内汗液潴留后因内压增高而发生破裂,外溢的汗液渗入并刺激周围组织而于汗孔处出现丘疹、丘疱疹和小水疱。细菌繁殖、产生毒素,可加重炎症反应。有人认为,汗孔的闭塞是由于原发性葡萄球菌感染,也有人认为痱子的发生与出汗过多无关,而与皮肤表面大量繁殖的微球菌有关。

[0003] 根据汗腺导管损伤和汗液溢出部位的不同,临床上分为以下几种类型:

1. 晶形粟粒疹

又称白痱,由于汗液在角质层内或角质层下汗管溢出引起。常见于高热大量出汗、长期卧床、过度衰弱的患者。皮损为针尖至针头大小的浅表性小水疱,壁薄,清亮,周围无红晕,轻擦易破,干涸后留有细小鳞屑。有自限性,一般无自觉症状。

[0004] 2. 红色粟粒疹

又称红痱,由于汗液在棘层处汗管溢出引起。急性发病,皮损为成批出现圆而尖形的针头大小的密集丘疹或丘疱疹,周围有轻度红晕。皮损消退后有轻度脱屑。自觉轻度烧灼、刺痒感。

[0005] 3. 脓疱性粟粒疹

又称脓痱。多由红色粟粒疹发展而来。皮损为密集的丘疹顶端有针头大小浅表脓疱。脓疱内容常为无菌性或非致病性球菌。

[0006] 4. 深部粟粒疹

又称深痱,由于汗液在真皮上层特别是在真皮—表皮交界处汗管溢出引起。常见于严重和反复发生红色粟粒疹的患者。皮损为密集的皮肤色小水疱,内容清亮,不易擦破,出汗时增大,不出汗时缩小。当皮疹泛发时,全身皮肤出汗减少或无汗,面部、腋窝、手足可有代偿性出汗增加,可造成热带性汗闭性衰竭或热衰竭,患者可出现无力、困倦、眩晕、头痛等全身症状。

[0007] 而且儿童得痱子的几率大于成人,由于痱子奇痒难耐,导致患者食欲等下降,严重影响患者的生活,目前最方便的治疗方法即向患处涂布痱子粉或痱子水,但是目前痱子的种类多样,而且痱子粉或痱子水的种类更是繁杂,因此患者如何选择合适的痱子粉或痱子水成为困难,以上即现有技术中的不足之处。

发明内容

[0008] 本发明的发明目的在于针对现有技术中的不足,提供一种见效快、治疗效果好的治疗白痱的痱子水。

[0009] 本发明是通过以下技术方案实现的：

一种用于治疗白痒的痒子水，由下述组分组成：冰片、金银花、地骨皮、荷叶、马齿苋、茯苓、翻白草、穿心莲、泽泻、陆英、甘草、麦冬门。

[0010] 上述的一种用于治疗白痒的痒子水，由下述按重量份计的组分组成：冰片 1-5 份、金银花 5-10 份、地骨皮 5-10 份、荷叶 5-10 份、马齿苋 5-10 份、茯苓 1-5 份、翻白草 1-5 份、穿心莲 1-5 份、泽泻 1-5 份、陆英 1-5 份、甘草 1-5 份、麦冬门 1-5 份。

[0011] 上述的一种用于治疗白痒的痒子水，由下述按重量份计的组分组成：冰片 2 份、金银花 6 份、地骨皮 6 份、荷叶 6 份、马齿苋 6 份、茯苓 2 份、翻白草 2 份、穿心莲 2 份、泽泻 2 份、陆英 2 份、甘草 2 份、麦冬门 2 份。

[0012] 上述的一种用于治疗白痒的痒子水，由下述按重量份计的组分组成：冰片 3 份、金银花 8 份、地骨皮 8 份、荷叶 8 份、马齿苋 8 份、茯苓 3 份、翻白草 3 份、穿心莲 3 份、泽泻 3 份、陆英 3 份、甘草 3 份、麦冬门 3 份。

[0013] 上述的一种痒子水的制备方法，包括如下步骤：将冰片、金银花、地骨皮、荷叶、马齿苋、茯苓、翻白草、穿心莲、泽泻、陆英、甘草、麦冬门加水煎煮提取三次，第一次加中药组分总质量 5 倍的水煎煮提取 2 小时，第二次加中药组分总质量 3 倍量水煎煮提取 1.5 小时，第三次加中药组分总质量 2 倍量水煎煮提取 1 小时，将 3 次煎煮提取的煎液合并；向合并后的煎液中加入上述蒸馏后的水溶液，过滤，滤液浓缩至在 60℃时相对密度为 1.07 ~ 1.10，放冷至室温，加入乙醇至含醇量达到 60%，搅匀，在 6 ~ 9℃下静置 24 小时，过滤；滤液浓缩至在 60℃时相对密度为 1.07 ~ 1.10，并在浓缩过程中回收乙醇，再加入与浓缩后的滤液等体积的水稀释，搅匀，在 6 ~ 9℃静置下 24 小时，过滤；即可。

[0014] 临床试验

使用方法

使用棉棒或其他干净卫生的物品将本发明痒子水涂抹到患处，均匀覆盖即可，每日 1-2 次。

[0015] 治疗效果

治愈：止痒，皮肤恢复正常；显效：基本止痒，皮肤得到一定恢复；无效：皮肤瘙痒等症状无改善。

[0016] 治疗效果

病例 270 人，其中 10 岁以下 70 人，11-20 岁 84 人，21-30 岁 44 人，31-40 岁 42 人，41-50 岁 18 人、51 岁以上 12 人。治疗当天止痒者 233 人，治疗 3 天治愈者 213 人，占 78.89%，显效者 55 人，占 20.37%，无效者 2 人，7 天治愈者 267 人，占 98.89%，显效者 3 人，无效者 0 人。

[0017] 典型病例

1, 杨某，男，18 岁，前胸、前额、脖子有较多痒子，为明显的白痒，治疗当天止痒，3 天治愈；

2, 邱某，女，48 岁，腋窝、脖子处痒子较多，为明显的白痒，治疗当天止痒，7 天治愈；

本发明的有益效果是：本发明的痒子水见效快，当天能够止痒，3-7 天痊愈，其中 3 天治愈者 78.89%、显效者 20.37%，7 天治愈者达到 98.89%，总有效率 100%。

具体实施方式

[0018] 下面结合具体实施例对本发明做进一步说明,以便本领域技术人员可以更好的了解本发明,但并不因此限制本发明。

[0019] 实施例 1

一种用于治疗白痢的痢子水,由下述按重量份计的组分组成:冰片 1 份、金银花 5 份、地骨皮 5 份、荷叶 5 份、马齿苋 5 份、茯苓 1 份、翻白草 1 份、穿心莲 1 份、泽泻 1 份、陆英 1 份、甘草 1 份、麦冬门 1 份。

[0020] 实施例 2

一种用于治疗白痢的痢子水,由下述按重量份计的组分组成:冰片 2 份、金银花 6 份、地骨皮 6 份、荷叶 6 份、马齿苋 6 份、茯苓 2 份、翻白草 2 份、穿心莲 2 份、泽泻 2 份、陆英 2 份、甘草 2 份、麦冬门 2 份。

[0021] 实施例 3

一种用于治疗白痢的痢子水,由下述按重量份计的组分组成:冰片 3 份、金银花 8 份、地骨皮 8 份、荷叶 8 份、马齿苋 8 份、茯苓 3 份、翻白草 3 份、穿心莲 3 份、泽泻 3 份、陆英 3 份、甘草 3 份、麦冬门 3 份。

[0022] 实施例 4

一种用于治疗白痢的痢子水,由下述按重量份计的组分组成:冰片 5 份、金银花 10 份、地骨皮 10 份、荷叶 10 份、马齿苋 10 份、茯苓 5 份、翻白草 5 份、穿心莲 5 份、泽泻 5 份、陆英 5 份、甘草 5 份、麦冬门 5 份。