(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104258292 A
(43)申请公布日 2015.01.07

(21)申请号 201410530449.9

(22)申请日 2014.10.10

(71)申请人 夏放军
地址 510850 广东省广州市花都区新华街滨湖路12号雅景湾7号101室

(72)发明人 夏放军

(74)专利代理机构 北京恒都律师事务所 11395
代理人 李向东

(51)Int.Cl.
A61K 36/9066(2006.01)
A61K 9/20(2006.01)
A61P 15/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗妊娠合并症的妇产科药物及其制作方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗妊娠合并症的妇产科药物及其制作方法，所述治疗妊娠合并症的妇产科药物由下述原料制成：败酱草、薏苡仁、川楝子、黄岑、赤芍、陈皮、党参、郁金、当归、白芍、木香、五味子、茵陈、菊花、大枣、女贞子、蜂王浆、杜仲、荷叶、水飞蓟、乳香、栀子、紫花地丁、青皮、麦冬、细辛、制川乌、半夏、藏红花、参三七、酒当归、醋香附、醋延胡、生桃仁、酒川芎、炙柴胡、苦参、蛇床子、黄柏、五指毛桃、益母草、艾叶、花椒、百部、苦地丁、大黄、红藤、蚂蚁草、地肤子、枯矾、苍术、薏米、人参、山药、茨实、川断、白术、甘草、地棉、皂刺、冰片和蒲公英；该治疗妊娠合并症的妇产科药物具有疗效显著，且副作用低的优点。

CN 104258292 A

1. 一种治疗妊娠合并症的妇产科药物，所述治疗妊娠合并症的妇产科药物由下述原料制成：败酱草、薏苡仁、川楝子、黄岑、赤芍、陈皮、党参、郁金、当归、白芍、木香、五味子、茵陈、菊花、大枣、女贞子、蜂王浆、杜仲、荷叶、水飞蓟、乳香、栀子、紫花地丁、青皮、麦冬、细辛、制川乌、半夏、藏红花、参三七、酒当归、醋香附、醋延胡、生桃仁、酒川芎、炙柴胡、苦参、蛇床子、黄柏、五指毛桃、益母草、艾叶、花椒、百部、苦地丁、大黄、红藤、蚂蚁草、地肤子、枯矾、苍术、薏米、人参、山药、茨实、川断、白术、甘草、地棉、皂刺、冰片和蒲公英；所述原料包括以下重量份数配比：败酱草60g、薏苡仁55g、川楝子70g、黄岑70g、赤芍50g、陈皮30g、党参20g、郁金30g、当归25g、白芍40g、木香35g、五味子70g、茵陈35g、菊花40g、大枣15g、女贞子30g、蜂王浆20g、杜仲25g、荷叶20g、水飞蓟15g、乳香30g、栀子35g、紫花地丁30g、青皮15g、麦冬30g、细辛20g、制川乌10g、半夏20g、藏红花30g、参三七20g、酒当归45g、醋香附30g、醋延胡25g、生桃仁30g、酒川芎50g、炙柴胡25g、苦参40g、蛇床子20g、黄柏15g、五指毛桃25g、益母草30g、艾叶10g、花椒20g、百部15g、苦地丁35g、大黄20g、红藤30g、蚂蚁草45g、地肤子20g、枯矾10g、苍术15g、薏米30g、人参15g、山药20g、茨实12g、川断10g、白术7g、甘草15g、地棉20g、皂刺30g、冰片10g和蒲公英20g。

2. 一种如权利要求1所述的治疗妊娠合并症的妇产科药物的制备方法，其特征在于：包括以下步骤：

A、将15g人参和20g党参切片，加适量蒸馏水煎煮4个小时，用300目筛过滤，提取药液，备用；

B、将40g苦参切断用醋闷蒸2个小时，然后放凉备用；

C、将步骤“B”中闷蒸过的苦参及30g陈皮和15g青皮研磨成细粉，用600目筛过滤后加入步骤“A”中提取的药液里，用文火煎煮6个小时，再用600目筛过滤，提取药液，备用；

D、将45g酒当归、25g醋延胡、30g生桃仁、50g酒川芎和25g炙柴胡放入步骤“C”提取的药液里，浸泡10个小时，之后取出，备用；

E、将60g败酱草、55g薏苡仁、70g川楝子、70g黄岑、50g赤芍、30g郁金、25g当归、40g白芍、35g木香、70g五味子、35g茵陈、40g菊花、15g大枣、30g女贞子、20g蜂王浆、25g杜仲、20g荷叶、15g水飞蓟、30g乳香、35g栀子、30g紫花地丁、30g麦冬、20g细辛、10g制川乌、20g半夏、30g藏红花、20g参三七、30g醋香附、20g蛇床子、15g黄柏、25g五指毛桃、30g益母草、10g艾叶、20g花椒、15g百部、35g苦地丁、20g大黄、30g红藤、45g蚂蚁草、20g地肤子、10g枯矾、15g苍术、30g薏米、20g山药、12g茨实、10g川断、7g白术、15g甘草、20g地棉、30g皂刺、10g冰片和20g蒲公英加水煎煮3次，水量以没过药面为宜，第一次煎煮时间为4个小时，第二次煎煮时间为3个小时，第三次煎煮时间为1.5个小时，煎煮后静置18个小时，用600目筛过滤，提取药液备用；

F、将步骤“D”浸泡后提取的药材加入步骤“E”中提取的药液里，煎煮两次，第一次煎煮3个小时，第二次煎煮2个小时，之后用500目筛过滤提取药液，备用；

G、将步骤“F”中提取的药液加入常规调试剂，先将PH值调至4.6，之后将浓度调制1.4的稠状，静置12个小时，备用；

H、将步骤“G”静置12个小时后的稠状药剂制成药丸，包装完成。

一种治疗妊娠合并症的妇产科药物及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗妊娠合并症的妇产科药物及其制作方法。

背景技术

[0002] 妇产科是临床医学四大主要学科之一，主要研究女性生殖器官疾病的病原、病理、诊断及防治，随着时代的进步越来越多的人奉行晚婚晚育，让高龄产妇逐年增长，随之而来的妇产科疾病也越来越多。妊娠合并症就是妇产科的普遍病症之一，不但会影响身体健康，还可能留有妊辰纹，非常的不好看。很多孕妇面对这一问题时，都非常的头疼，现在市面上治疗这种合并症的药物大部分都是西药，在孕期服用的话非常的不可靠，因为西药对人体有极大的副作用，很可能会对胎儿有影响，而另外一些中西结合的药物，虽然副作用较低，可还是存在，并且疗效非常不佳，纯中药的治疗药物，非常的少，而且都是采用高端药材，虽然无副作用，可由于没有采用针对性的中草药，疗效比中西结合的还要差。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供一种具有疗效显著，且无副作用的治疗妊娠合并症的妇产科药物。

[0004] 为解决上述问题，本发明是通过以下技术方案来实现的：

一种治疗妊娠合并症的妇产科药物，所述该药物为纯中药配方；所述中药配方为：败酱草、薏苡仁、川楝子、黄岑、赤芍、陈皮、党参、郁金、当归、白芍、木香、五味子、茵陈、菊花、大枣、女贞子、蜂王浆、杜仲、荷叶、水飞蓟、乳香、栀子、紫花地丁、青皮、麦冬、细辛、制川乌、半夏、藏红花、参三七、酒当归、醋香附、醋延胡、生桃仁、酒川芎、炙柴胡、苦参、蛇床子、黄柏、五指毛桃、益母草、艾叶、花椒、百部、苦地丁、大黄、红藤、蚂蚁草、地肤子、枯矾、苍术、薏米、人参、山药、茨实、川断、白术、甘草、地棉、皂刺、冰片和蒲公英；所述各中草药重量份配比为：败酱草60g、薏苡仁55g、川楝子70g、黄岑70g、赤芍50g、陈皮30g、党参20g、郁金30g、当归25g、白芍40g、木香35g、五味子70g、茵陈35g、菊花40g、大枣15g、女贞子30g、蜂王浆20g、杜仲25g、荷叶20g、水飞蓟15g、乳香30g、栀子35g、紫花地丁30g、青皮15g、麦冬30g、细辛20g、制川乌10g、半夏20g、藏红花30g、参三七20g、酒当归45g、醋香附30g、醋延胡25g、生桃仁30g、酒川芎50g、炙柴胡25g、苦参40g、蛇床子20g、黄柏15g、五指毛桃25g、益母草30g、艾叶10g、花椒20g、百部15g、苦地丁35g、大黄20g、红藤30g、蚂蚁草45g、地肤子20g、枯矾10g、苍术15g、薏米30g、人参15g、山药20g、茨实12g、川断10g、白术7g、甘草15g、地棉20g、皂刺30g、冰片10g和蒲公英20g。

[0005] 本发明所要解决的另一技术问题是提供一种具有疗效显著，且无副作用的治疗妊娠合并症的妇产科药物的制作方法。

[0006] 为解决上述技术问题，本发明采用如下技术方案：包括以下步骤：

A、将15g人参和20g党参切片，加适量蒸馏水煎煮4个小时，用300目筛过滤，提取药液，备用；

B、将 40g 苦参切断用醋闷蒸 2 个小时，然后放凉备用；

C、将步骤“B”中闷蒸过的苦参及 30g 陈皮和 15g 青皮研磨成细粉，用 600 目筛过滤后加入步骤“A”中提取的药液里，用文火煎煮 6 个小时，再用 600 目筛过滤，提取药液，备用；

D、将 45g 酒当归、25g 醋延胡、30g 生桃仁、50g 酒川芎和 25g 炙柴胡放入步骤“C”提取的药液里，浸泡 10 个小时，之后取出，备用；

E、将 60g 败酱草、55g 薏苡仁、70g 川楝子、70g 黄岑、50g 赤芍、30g 郁金、25g 当归、40g 白芍、35g 木香、70g 五味子、35g 茵陈、40g 菊花、15g 大枣、30g 女贞子、20g 蜂王浆、25g 杜仲、20g 荷叶、15g 水飞蓟、30g 乳香、35g 栀子、30g 紫花地丁、30g 麦冬、20g 细辛、10g 制川乌、20g 半夏、30g 藏红花、20g 参三七、30g 醋香附、20g 蛇床子、15g 黄柏、25g 五指毛桃、30g 益母草、10g 艾叶、20g 花椒、15g 百部、35g 苦地丁、20g 大黄、30g 红藤、45g 蚂蚁草、20g 地肤子、10g 枯矾、15g 苍术、30g 薏米、20g 山药、12g 茨实、10g 川断、7g 白术、15g 甘草、20g 地棉、30g 皂刺、10g 冰片和 20g 蒲公英加水煎煮 3 次，水量以没过药面为宜，第一次煎煮时间为 4 个小时，第二次煎煮时间为 3 个小时，第三次煎煮时间为 1.5 个小时，煎煮后静置 18 个小时，用 600 目筛过滤，提取药液备用；

F、将步骤“D”浸泡后提取的药材加入步骤“E”中提取的药液里，煎煮两次，第一次煎煮 3 个小时，第二次煎煮 2 个小时，之后用 500 目筛过滤提取药液，备用；

G、将步骤“F”中提取的药液加入常规调试剂，先将 PH 值调至 4.6，之后将浓度调制 1.4 的稠状，静置 12 个小时，备用；

H、将步骤“G”静置 12 个小时后的稠状药剂制成药丸，包装完成。

[0007] 本发明产品护理药物中一些中草药的药理介绍：

藏红花：味甘，性平，具有活血化瘀，散郁开结及止痛的作用；

败酱草：味辛、苦，性凉，具有清热解毒，消肿排脓的作用；

酒川芎：味辛，性温，具有活血行气，祛风止痛的作用；

百部：味甘、苦，性微寒，具有润肺止咳的作用；

参三七：味甘、微苦，性温，具有止血散瘀、益气生津、消肿定痛的作用；

酒当归：味甘、辛、苦，性温，具有活血通经的作用；

醋香附：味辛、微苦，性平，具有理气解郁、调经止痛的作用；

醋延胡：味辛、苦，性温，具有活血行气、调经止痛的作用；

生桃仁：味苦、甘，性平，具有活血祛瘀、润肠通便，止咳平喘的作用；

苦参：味苦，性寒，具有清热燥湿的作用；

薏米：味甘、淡，性微寒，具有健脾利湿，清热排脓的作用；

蜂王浆：味甘、酸，性平，具有抗氧化、降血脂，降血糖的作用；

女贞子：味甘、苦，性平，具有补益肝肾，清虚热的作用；

党参：味甘，性平，具有补脾益肺、生津养血的作用；

郁金：味辛、苦，性寒，具有行气化瘀、清心解郁，活血止痛的作用；

蛇床子：味辛、苦，性温，具有温肾壮阳、燥湿杀虫及祛风止痒的作用；

苦地丁：味苦、辛，性寒，具有清热解毒，消炎的作用；

五指毛桃：味辛、甘，性平，具有健脾补肺、舒筋活络及行气利湿的作用；

本发明一种治疗妊娠合并症的妇产科药物及其制备方法的有益效果是：采用纯中药制

备而成，副作用低，且疗效显著。

具体实施方式

[0008] 以下实施例用于说明本发明，但不用来限制本发明的范围。

[0009] 一种治疗妊娠合并症的妇产科药物，所述该药物为纯中药配方；所述中药配方为：败酱草、薏苡仁、川楝子、黄岑、赤芍、陈皮、党参、郁金、当归、白芍、木香、五味子、茵陈、菊花、大枣、女贞子、蜂王浆、杜仲、荷叶、水飞蓟、乳香、栀子、紫花地丁、青皮、麦冬、细辛、制川乌、半夏、藏红花、参三七、酒当归、醋香附、醋延胡、生桃仁、酒川芎、炙柴胡、苦参、蛇床子、黄柏、五指毛桃、益母草、艾叶、花椒、百部、苦地丁、大黄、红藤、蚂蚁草、地肤子、枯矾、苍术、薏米、人参、山药、茨实、川断、白术、甘草、地棉、皂刺、冰片和蒲公英；所述各中草药重量份配比为：败酱草 60g、薏苡仁 55g、川楝子 70g、黄岑 70g、赤芍 50g、陈皮 30g、党参 20g、郁金 30g、当归 25g、白芍 40g、木香 35g、五味子 70g、茵陈 35g、菊花 40g、大枣 15g、女贞子 30g、蜂王浆 20g、杜仲 25g、荷叶 20g、水飞蓟 15g、乳香 30g、栀子 35g、紫花地丁 30g、青皮 15g、麦冬 30g、细辛 20g、制川乌 10g、半夏 20g、藏红花 30g、参三七 20g、酒当归 45g、醋香附 30g、醋延胡 25g、生桃仁 30g、酒川芎 50g、炙柴胡 25g、苦参 40g、蛇床子 20g、黄柏 15g、五指毛桃 25g、益母草 30g、艾叶 10g、花椒 20g、百部 15g、苦地丁 35g、大黄 20g、红藤 30g、蚂蚁草 45g、地肤子 20g、枯矾 10g、苍术 15g、薏米 30g、人参 15g、山药 20g、茨实 12g、川断 10g、白术 7g、甘草 15g、地棉 20g、皂刺 30g、冰片 10g 和蒲公英 20g。

[0010] 所述一种治疗妊娠合并症的妇产科药物的制备过程如下：

A、将 15g 人参和 20g 党参切片，加适量蒸馏水煎煮 4 个小时，用 300 目筛过滤，提取药液，备用；

B、将 40g 苦参切断用醋闷蒸 2 个小时，然后放凉备用；

C、将步骤“B”中闷蒸过的苦参及 30g 陈皮和 15g 青皮研磨成细粉，用 600 目筛过滤后加入步骤“A”中提取的药液里，用文火煎煮 6 个小时，再用 600 目筛过滤，提取药液，备用；

D、将 45g 酒当归、25g 醋延胡、30g 生桃仁、50g 酒川芎和 25g 炙柴胡放入步骤“C”提取的药液里，浸泡 10 个小时，之后取出，备用；

E、将 60g 败酱草、55g 薏苡仁、70g 川楝子、70g 黄岑、50g 赤芍、30g 郁金、25g 当归、40g 白芍、35g 木香、70g 五味子、35g 茵陈、40g 菊花、15g 大枣、30g 女贞子、20g 蜂王浆、25g 杜仲、20g 荷叶、15g 水飞蓟、30g 乳香、35g 栀子、30g 紫花地丁、30g 麦冬、20g 细辛、10g 制川乌、20g 半夏、30g 藏红花、20g 参三七、30g 醋香附、20g 蛇床子、15g 黄柏、25g 五指毛桃、30g 益母草、10g 艾叶、20g 花椒、15g 百部、35g 苦地丁、20g 大黄、30g 红藤、45g 蚂蚁草、20g 地肤子、10g 枯矾、15g 苍术、30g 薏米、20g 山药、12g 茨实、10g 川断、7g 白术、15g 甘草、20g 地棉、30g 皂刺、10g 冰片和 20g 蒲公英加水煎煮 3 次，水量以没过药面为宜，第一次煎煮时间为 4 个小时，第二次煎煮时间为 3 个小时，第三次煎煮时间为 1.5 个小时，煎煮后静置 18 个小时，用 600 目筛过滤，提取药液备用；

F、将步骤“D”浸泡后提取的药材加入步骤“E”中提取的药液里，煎煮两次，第一次煎煮 3 个小时，第二次煎煮 2 个小时，之后用 500 目筛过滤提取药液，备用；

G、将步骤“F”中提取的药液加入常规调试剂，先将 PH 值调至 4.6，之后将浓度调制 1.4 的稠状，静置 12 个小时，备用；

H、将步骤“G”静置 12 个小时后的稠状药剂制成药丸，包装完成。

[0011] 实验例 1 ：

实验对象 :200 名有妊娠合并症情况的患者。

[0012] 实验方法 :将 200 名患者分成两组，第一组服用其它治疗妊娠合并症的妇产科药物，第二组服用本发明产品的治疗妊娠合并症的妇产科药物。

[0013] 实验结果 ：

病名	实验对象	痊愈	有效	显效	无效	有效率
妊娠合并症	第一组	86	7	5	2	93%
	第二组	94	4	1	0	98%

由以上实验结果可知，使用本发明产品的治疗妊娠合并症的妇产科药物，对妊娠合并症有很高的疗效，并且由于纯中药制备，对使用者没有任何的副作用。

[0014] 典型案例 ：

齐某，31 岁，在 2011 年一次例行孕检中，检查出患有妊娠合并症，情况还不算太严重，之后齐某就开始服用药物进行治疗，经过 5 个多月的坚持服用，医生检查，妊娠合并症并未有明显好转，这一情况后，齐某更换药物，开始服用本发明产品，经过 2 个月左右的服用，病情已基本痊愈。

[0015] 以上已将本发明做一详细说明，以上所述，仅为本发明之较佳实施例而已，当不能限定本发明实施范围，即凡依本申请范围所作均等变化与修饰，皆应仍属本发明涵盖范围内。