

(12) **Ausschließungspatent**

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz

PATENTSCHRIFT(19) **DD** (11) **220 214 A5**4(51) **A 01 N 29/04**
A 01 N 43/56
A 01 N 43/64**AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN**

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21) AP A 01 N / 261 331 8
(31) P3311702.0(22) 28.03.84
(32) 30.03.83(44) 27.03.85
(33) DE


(71) siehe (73)

(72) Regel, Erik, Dipl.-Ing.; Büchel, Karl H., Prof. Dr.; Reinecke, Paul, Dr.; Brandes, Wilhelm, Dr., DE

(73) Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, DE

(54) **Fungizide Mittel**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von noch nicht beschriebenen substituierten tert.-Butanol-Derivaten als fungizide Mittel. Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I), in welcher R¹, R² und R³ die in der Beschreibung angegebene Bedeutung besitzen, sind für den Gebrauch als Pflanzenschutzmittel geeignet und können mit besonders gutem Erfolg zur Bekämpfung von Getreidekrankheiten und von Reiskrankheiten eingesetzt werden. Darüber hinaus weisen die erfindungsgemäßen Wirkstoffe ein breites fungizides in-vitro-Wirkungsspektrum auf. Formel (I)



Berlin, den 21.3.1984

63 584/11

Fungizide Mittel

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von noch nicht beschriebenen substituierten tert.-Butanol-Derivaten als fungizide Mittel.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Es ist bereits bekannt geworden, daß bestimmte Diazolyl-Derivate, wie beispielsweise 2-(4-Chlorphenyl)- oder -(2-Chlorphenyl)-1,3-di(1,2,4-triazol-1-yl)-2-propanol bzw. 2-(4-Chlorphenyl)-1,3-di(imidazol-1-yl)-2-propanol, gute fungizide Eigenschaften aufweisen (vergleiche EP-OS O 044 605). Die Wirkung dieser Verbindungen ist jedoch, insbesondere bei niedrigen Aufwandmengen und -konzentrationen, nicht immer ganz befriedigend.


Ziel der Erfindung

Überraschenderweise zeigen die erfindungsgemäß zu verwenden- den substituierten tert.-Butanol-Derivate der Formel (I) eine bessere fungizide Wirksamkeit als die aus dem Stand der Technik bereits bekannten Diazolyl-Derivate 2-(4-Chlorphenyl)- oder -(2-Chlorphenyl)-1,3-di(1,2,4-triazol-1-yl)-2-propanol und 2-(4-Chlorphenyl)-1,3-di(imidazol-1-yl)-2-propanol, welche konstitutionell und wirkungsmäßig naheliegende Verbindungen sind. Die erfindungsgemäße Verwendung der neuen Stoffe stellt somit eine Bereicherung der Technik dar.

28.03.1984*160386

Darlegung des Wesens der Erfindung

Es wurde gefunden, daß die substituierten tert.-Butanol-Derivate der allgemeinen Formel



in welcher

R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für Azolyl, gegebenenfalls substituiertes Phenoxy, gegebenenfalls substituiertes Phenylthio, Alkylthio, Alkenyl, Alkinyl, gegebenenfalls substituiertes Phenylacetylenyl, Alkylamino, Dialkylamino, gegebenenfalls substituiertes Phenylamino, gegebenenfalls substituiertes Phenyl-N-alkyl-amino, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylamino, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl-N-alkyl-amino, Aminoethoxy, Alkylaminoethoxy oder Dialkylaminoethoxy stehen,

sowie deren Säureadditionssalze und Metallsalzkomplexe gute fungizide Eigenschaften aufweisen.

Die erfindungsgemäß zu verwendenden substituierten tert.-Butanol-Derivate sind durch die Formel (I) allgemein definiert.

Bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in denen

A) R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind und für Imidazol-1-yl, 1,2,4-Triazol-1-yl, 1,2,4-Triazol-4-yl oder Pyrazol-1-yl stehen und

R^3 für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiertes Phenoxy, Phenylthio, Phenylamino oder Phenyl-N-alkyl-amino mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylteil steht, wobei als Phenylsubstituenten jeweils in Frage kommen: Halogen, Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, Alkoxy und Alkylthio mit jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, Halogenalkyl, Halogenalkoxy und Halogenalkylthio mit jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und 1 bis 5 gleichen oder verschiedenen Halogenatomen, wie Fluor- und Chloratomen, Cycloalkyl mit 5 bis 6 Kohlenstoffatomen, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, Alkylcarbonyl oder Alkoxycarbonyl

5 mit jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkyl-
teil, gegebenenfalls einfach oder mehrfach,
gleich oder verschieden durch Halogen, Nitro,
Trifluormethyl und Alkyl mit 1 bis 2 Kohlen-
stoffatomen substituiertes Phenyl oder Phenoxy,
die Aldehydgruppe sowie der Oxim- bzw. Oxim-
ether-Rest.

Bevorzugt sind außerdem Verbindungen der allgemeinen Formel
(I), in denen

10 B) R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind und für Imidazol-
1-yl; 1,2,4-Triazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-4-yl
oder Pyrazol-1-yl stehen und

R^3
15 für Alkylthio mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen,
für Alkylamino oder Dialkylamino mit jeweils
1 bis 4 Kohlenstoffatomen in jedem Alkylteil,
für Aminoethoxy, Alkylaminoethoxy und Di-
alkylaminoethoxy mit jeweils 1 bis 4 Kohlen-
stoffatomen in jedem Alkylteil, sowie für
jeweils gegebenenfalls im Cycloalkylteil
20 einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden
substituiertes Cycloalkylamino und Cycloalkyl-
N-alkylamino mit jeweils 3 bis 7 Kohlenstoff-
atomen im Cycloalkylteil und 1 bis 4 Kohlen-
stoffatomen im Alkylteil steht, wobei als Sub-
25 stituenten infrage kommen: Halogen, Alkyl mit
1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Alkoxy mit 1 bis
2 Kohlenstoffatomen.

Bevorzugt sind ferner Verbindungen der Formel (I),
in denen

C) R^1 für Imidazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-4-yl oder Pyrazol-1-yl steht und

5 R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für die oben unter Punkt A) genannten Substituenten für R^3 stehen.

Bevorzugt sind weiterhin Verbindungen der Formel (I),
in denen

10 D) R^1 für Imidazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-4-yl oder Pyrazol-1-yl steht und

R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für die oben unter Punkt B) benannten Bedeutungen für R^3 stehen.

15 Bevorzugt sind ebenfalls Verbindungen der Formel (I), in denen

E) R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für die oben unter den Punkten A) und B) genannten Bedeutungen für R^3 stehen.

20 Bevorzugt sind schließlich auch Verbindungen der Formel (I), in denen

F) R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für die oben unter Punkt A) genannten Bedeutungen für R^1 stehen.

Besonders bevorzugt sind diejenigen Verbindungen der Formel (I), in denen

- 5 A) R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind und für Imidazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-4-yl oder Pyrazol-1-yl stehen und
R³ für jeweils gegebenenfalls einfach bis dreifach, gleich oder verschieden substituiertes Phenoxy, Phenylthio, Phenylamino oder Phenyl-N-alkyl-amino mit 1 bis 2 Kohlenstoffatomen im Alkylteil steht, wobei als Phenylsubstituenten jeweils infrage kommen: Fluor, Chlor,
10 Brom, Methyl, Ethyl, Isopropyl, tert.-Butyl, 2-Methyl-but-2-yl, Methoxy, Ethoxy, Methylthio, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethylthio, Cyclohexyl, Nitro, Cyano,
15 Hydroxycarbonyl, Methylcarbonyl, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, jeweils gegebenenfalls einfach bis dreifach, gleich oder verschieden durch Chlor, Nitro, Trifluormethyl oder Methyl substituiertes Phenyl oder Phenoxy, die Aldehydgruppe, Hydroxyiminomethyl
20 und Methoximinomethyl.

Besonders bevorzugt sind außerdem diejenigen Verbindungen der Formel (I), in denen

- 25 B) R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind und für Imidazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-4-yl oder Pyrazol-1-yl stehen und

R³ für Methylthio, Ethylthio, Butylthio und Dodecylthio steht, ferner für Alkylamino und Dialkylamino mit jeweils 1 bis 2 Kohlenstoffatomen in jedem Alkylteil steht, ferner für Aminoethoxy, Alkylaminoethoxy und Dialkylaminoethoxy mit jeweils 1 bis 2 Kohlenstoffatomen in jedem Alkylteil steht sowie für jeweils gegebenenfalls im Cycloalkylteil einfach bis dreifach, gleich oder verschieden substituiertes Cyclopropylamino, Cyclopentylamino, Cyclohexylamino, Cyclopropyl-N-methyl-amino, Cyclopentyl-N-methyl-amino und Cyclohexyl-N-methyl-amino steht, wobei als Substituenten infrage kommen: Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Isopropyl und Methoxy.

Besonders bevorzugt sind ferner diejenigen Verbindungen der Formel (I), in denen

C) R¹ für Imidazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-4-yl oder Pyrazol-1-yl steht und

20 R² und R³ gleich oder verschieden sind und für die oben unter Punkt A) genannten Bedeutungen für R³ stehen.

Besonders bevorzugt sind weiterhin diejenigen Verbindungen der Formel (I), in denen

D) R^1 für Imidazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-4-yl oder Pyrazol-1-yl steht und

5 R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für die oben unter Punkt B) genannten Bedeutungen für R^3 stehen.

Besonders bevorzugt sind ebenfalls diejenigen Verbindungen der Formel (I), in denen

10 E) R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für die oben unter den Punkten A) und B) genannten Bedeutungen für R^3 stehen.

Besonders bevorzugt sind schließlich auch diejenigen Verbindungen der Formel (I), in denen

15 F) R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für die oben unter Punkt A) genannten Bedeutungen für R^1 stehen.

20 Bevorzugte erfindungsgemäße Verbindungen sind auch Additionsprodukte aus Säuren und denjenigen substituierten tert.-Butanol-Derivaten der Formel (I), in denen die Substituenten R^1 , R^2 und R^3 die Bedeutungen haben, die bereits vorzugsweise für diese Substituenten genannt wurden.


Zu den Säuren die addiert werden können, gehören vorzugsweise Halogenwasserstoffsäuren, wie z.B. Chlorwasserstoffsäure und die Bromwasserstoffsäure, insbesondere die Chlorwasserstoffsäure, ferner Phosphorsäure, Salpetersäure,

mono- und bifunktionelle Carbonsäuren und Hydroxycarbon-
säuren, wie z.B. Essigsäure, Maleinsäure, Bernsteinsäure,
Fumarsäure, Weinsäure, Zitronensäure, Salizylsäure, Sorbin-
säure und Milchsäure, sowie Sulfonsäuren, wie p-Toluolsul-
fonsäure und 1,5-Naphthalindisulfonsäure.

Außerdem bevorzugte erfindungsgemäße Verbindungen sind
Additionsprodukte aus Salzen von Metallen der II. bis IV.
Haupt- und der I. und II. sowie IV. bis VIII. Nebengruppe
und denjenigen substituierten tert.-Butanol-Derivaten
der Formel (I), in denen die Substituenten R¹, R² und R³
die Bedeutungen haben, die bereits vorzugsweise für
diese Substituenten genannt wurden.

Hierbei sind die Salze des Kupfers, Zinks, Mangans, Mag-
nesiums, Zinns, Eisens und des Nickels besonders bevor-
zugt. Als Anionen dieser Salze kommen solche in Betracht,
die sich von solchen Säuren ableiten, die zu physiologisch
verträglichen Additionsprodukten führen. Besonders bevorzugte
derartige Säuren sind in diesem Zusammenhang die Halogen-
wasserstoffsäuren, wie z.B. die Chlorwasserstoffsäure und
die Bromwasserstoffsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure.































Im einzelnen seien außer den bei den Herstellungsbeispielen
genannten Verbindungen die folgenden Verbindungen der all-
gemeinen Formel (I) genannt:



R¹

R²

R³




Die erfindungsgemäß zu verwendenden Wirkstoffe sind noch nicht bekannt. Sie sind jedoch Gegenstand einer eigenen älteren Patentanmeldung, die noch nicht veröffentlicht ist (vergleiche die Deutsche Patentanmeldung P 32 32 647 [LeA 21 916] vom 2.9.1982) und werden erhalten, wenn man ein Nucleophil der Formel



in welcher

R^1 die oben angegebene Bedeutung hat,

10 a) mit 2,2-Dihalogenmethyloxiranen der Formel




in welcher

Hal für Halogen steht,

15 in Gegenwart eines inerten organischen Lösungsmittels, wie beispielsweise Aceton, und in Gegenwart eines Säurebindemittels, wie beispielsweise Kaliumcarbonat, bei Temperaturen zwischen 20 und 120°C umgesetzt, oder

b) mit 2-Halogenmethyloxiranen der Formel




in welcher

R^2 und Hal die oben angegebene Bedeutung haben,

in Gegenwart eines inerten organischen Lösungsmittels, wie beispielsweise Aceton, und in Gegenwart eines Säurebindemittels, wie beispielsweise Kaliumcarbonat, bei Temperaturen zwischen 20 und 120°C umgesetzt, oder

- 5 c) mit substituierten Oxiranen der Formel



in welcher


R² und R³ die oben angegebene Bedeutung haben,

- 10 in Gegenwart eines inerten organischen Lösungsmittels, wie beispielsweise Aceton, und in Gegenwart eines Säurebindemittels, wie beispielsweise Kaliumcarbonat, bei Temperaturen zwischen 20 und 120°C umgesetzt.

- 15 Die Nucleophile der Formel (II) sind allgemein bekannte Verbindungen der organischen Chemie.

Die 2,2-Dihalogenmethyloxirane der Formel (III) sind bekannt (vgl. Beilstein, E III (1), S. 1587-1588), bzw. können sie in bekannter Art und Weise erhalten werden, indem man 3-Halogen-2-halogenmethylpropene der Formel


20



in welcher

Hal die oben angegebene Bedeutung hat,

entweder zunächst mit tert.-Butyloxy-halogenid zu 1,3-Dihalogen-2-halogenmethyl-2-propanolen der Formel



in welcher

5 Hal die oben angegebene Bedeutung hat,


umsetzt und diese anschließend in Gegenwart von Calciumhydroxid zu den gewünschten 2,2-Dihalogenmethyloxiranen der Formel (III) epoxidiert (vgl. hierzu auch Beilstein, E III (1), S. 1587-1588);

10 oder direkt in Gegenwart von Persäuren, wie z.B. Peressigsäure oder m-Chlorperbenzoesäure, zu den gewünschten 2,2-Dihalogenmethyloxiranen der Formel (III) epoxidiert.

15 Die 2-Halogenmethyloxirane der Formel (IV) sind noch nicht bekannt. Sie können jedoch in allgemein üblicher Art und Weise erhalten werden, indem man

entweder 2,2-Dihalogenmethyloxirane der Formel (III) mit einem Nucleophil der Formel (II) umsetzt;

oder 3-Halogen-2-halogenmethyl-propene der Formel (VI)
zunächst mit einem Nucleophil der Formel (II), gege-
benenfalls in Form eines Alkalimetallsalzes, zu Propenen
der Formel



5

in welcher

Hal und R¹ die oben angegebene Bedeutung
haben,

10


umsetzt und diese dann in Gegenwart von Persäuren zu den
gewünschten 2-Halogenmethyloxirane der Formel (IV) ep-
oxidiert.

Die substituierten Oxirane der Formel (V) sind noch nicht
bekannt. Sie können jedoch in allgemein üblicher Art und
Weise erhalten werden, indem man

15

entweder 2,2-Dihalogenmethyloxirane der Formel (III) mit
einem Nucleophil der Formel (II) umsetzt;

oder 3-Halogen-2-halogenmethyl-propene der Formel (VI)
mit einem Nucleophil der Formel (II), gegebenenfalls in
Form eines Alkalimetallsalzes, zu Propenen der Formel




in welcher

R¹ die oben angegebene Bedeutung hat,

umsetzt und diese dann in Gegenwart von Persäuren zu den gewünschten Oxiranen der Formel (V) epoxidiert;

oder Ketone der Formel



5


in welcher

R¹ und R² die oben angegebene Bedeutung haben,

in an sich bekannter Art und Weise mit Dimethylsulfonium-methylid epoxidiert.

10

Bestimmte Verbindungen der Formel (I) können auch erhalten werden, indem man Di(halogenmethyl)-carbinole der Formel (XI)



in welcher

15

Hal die oben angegebene Bedeutung hat und

5 R¹ für gegebenenfalls substituiertes Phenylthio, Alkylthio, Alkylamino, Dialkylamino, gegebenenfalls substituiertes Phenylamino, gegebenenfalls substituiertes Phenyl-N-alkylamino, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkylamino oder gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl-N-alkyl-amino steht,

10 gemäß den Bedingungen des Verfahrens (a) umgesetzt.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe weisen eine starke mikrobizide Wirkung auf und können zur Bekämpfung von unerwünschten Mikroorganismen praktisch eingesetzt werden. Die Wirkstoffe sind für den Gebrauch als Pflanzenschutzmittel geeignet.

15 Fungizide Mittel im Pflanzenschutz werden eingesetzt zur Bekämpfung von Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes.

20 Die gute Pflanzenverträglichkeit der Wirkstoffe in den zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten notwendigen Konzentrationen erlaubt eine Behandlung von oberirdischen Pflanzenteilen, von Pflanz- und Saatgut, und des Bodens.

Als Pflanzenschutzmittel können die erfindungsgemäßen Wirkstoffe mit besonders gutem Erfolg zur Bekämpfung von Getreidekrankheiten, wie Erysiphe graminis, Leptosphaeria

nodorum, Puccinia sp., Cochliobolus sativus und Pyrenophora teres; von Sphaerotheca-Arten, wie Sphaerotheca fuliginea sowie von Reiskrankheiten, wie Pyricularia und Pellicularia eingesetzt werden. Darüber hinaus weisen
5- die erfindungsgemäßen Wirkstoffe ein breites fungizides in-vitro-Wirkungsspektrum auf.

In entsprechenden Aufwandmengen zeigen die erfindungsgemäßen Verbindungen auch pflanzenwachstumsregulierende Wirkung.

10 Die Wirkstoffe können in die üblichen Formulierungen übergeführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Spritzpulver, Suspensionen, Pulver, Stäubemittel, Schäume, Pasten, lösliche Pulver, Granulate, Aerosole, Suspensions-Emulsionskonzentrate, Saatgutpuder, Wirkstoff-imprägnierte Natur-
15 und synthetische Stoffe, Feinstverkapselungen in polymeren Stoffen und in Hüllmassen für Saatgut, ferner in Formulierungen mit Brennsätzen, wie Räucherpatronen, -dosen, -spiralen u.ä. sowie ULV-Kalt- und Warmnebel-Formulierungen.

Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, z.B. durch Vermischen der Wirkstoffe mit Streckmitteln, also flüssigen Lösungsmitteln, unter Druck stehenden verflüssigten Gasen und/oder festen Trägerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung von oberflächenaktiven Mitteln, also Emulgiermitteln und /oder Dispergiermitteln und/oder
20 schaumerzeugenden Mitteln. Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z.B. auch organische Lösungsmittel als Hilfs lösungsmittel verwendet werden. Als flüssige
25 Lösungsmittel kommen im wesentlichen infrage: Aromaten,

wie Xylol, Toluol, oder Alkyl-naphthaline, chlorierte Aromaten oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Methylenchlorid, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z.B. Erdölfraktionen, Alkohole, wie Butanol oder Glycol sowie deren Ether und Ester, Ketone, wie Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, starke polare Lösungsmittel, wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid, sowie Wasser; mit verflüssigten gasförmigen Streckmitteln oder Trägerstoffen sind solche Flüssigkeiten gemeint, welche bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasförmig sind, z.B. Aerosol-Treibgase, wie Halogenkohlenwasserstoffe sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid; als feste Trägerstoffe kommen in Frage: z.B. natürliche Gesteinsmehle, wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und Silikate; als feste Trägerstoffe für Granulate kommen in Frage: z.B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material, wie Sägemehl, Kokosnußschalen, Maiskolben und Tabakstengeln; als Emulgier- und/oder schaumzeugende Mittel kommen in Frage: z.B. nichtionogene und anionische Emulgatoren, wie Polyoxyethylen-Fettsäureester, Polyoxyethylen-Fettalkohol-ether, z.B. Alkylaryl-polyglykol-ether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate sowie Eiweißhydrolysate; als Dispergiermittel kommen in Frage: z.B. Lignin-Sulfitablaugen und Methylcellulose.

Es können in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulverige, körnige oder latexförmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabicum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat.

5 Es können Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z.B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyanblau und organische Farbstoffe, wie Alizarin-, Azo- u. Metallphthalocyaninfarbstoffe und Spurennährstoffe wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink verwendet werden.

10 Die Formulierungen enthalten im allgemeinen zwischen 0,1 und 95 Gewichtsprozent Wirkstoff, vorzugsweise zwischen 0,5 und 90 %.

15 Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können in den Formulierungen oder in den verschiedenen Anwendungsformen in Mischung mit anderen bekannten Wirkstoffen vorliegen, wie Fungiziden, Bakteriziden, Insektiziden, Akariziden, Nematiziden, Herbiziden, Schutzstoffen gegen Vogelfraß, Wuchsstoffen, Pflanzennährstoffen und Bodenstrukturverbesserungsmitteln.

20 Die Wirkstoffe können als solche, in Form ihrer Formulierungen oder der daraus durch weiteres Verdünnen bereiteten Anwendungsformen, wie gebrauchsfertige Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Pasten und Granulate
25 angewendet werden. Die Anwendung geschieht in üblicher Weise, z.B. durch Gießen, Tauchen, Spritzen, Sprühen, Vernebeln, Verdampfen, Injizieren, Verschlämmen, Verstreichen, Stäuben, Streuen, Trockenbeizen, Feuchtbeizen, Naßbeizen, Schlämmbeizen oder Inkrustieren.


Bei der Behandlung von Pflanzenteilen können die Wirkstoffkonzentrationen in den Anwendungsformen in einem größeren Bereich variiert werden. Sie liegen im allgemeinen zwischen 1 und 0,0001 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0,5 und 0,001 %.

Bei der Saatgutbehandlung werden im allgemeinen Wirkstoffmengen von 0,001 bis 50 g je Kilogramm Saatgut, vorzugsweise 0,01 bis 10 g, benötigt.


Bei Behandlung des Bodens sind Wirkstoffkonzentrationen von 0,00001 bis 0,1 Gew.-%, vorzugsweise von 0,0001 bis 0,02 Gew.-% am Wirkungsort erforderlich.

Herstellungsbeispiele :

Beispiel 1 und 2



(Beispiel 1)




(Beispiel 2)

(Verfahren b)

Zu einem Gemisch von 13,6 g (0,2 Mol) 1,2,4-Triazol und 13,8 g (0,1 Mol) Kaliumcarbonat in 200 ml Aceton werden unter Rühren 9,4 g (0,04 Mol) 2-Chlormethyl-2-(4-chlorphenoxy)methyl-oxiran getropft. Man läßt 15 Stunden bei Raumtemperatur und anschließend 22 Stunden unter Rückfluß rühren. Das Reaktionsgemisch wird danach kalt filtriert und das Filtrat im Vakuum eingeeengt. Der ölige Rückstand wird in Chloroform gelöst, mit Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und chromatographisch (Kieselgel 60 Merck, Chloroform/Methanol = 20 / 1) gereinigt. Man erhält 5,8 g (43 % der Theorie) 2-(4-Chlorphenoxy)methyl-1,3-di(1,2,4-triazol-1-yl)-2-hydroxypropan vom Schmelzpunkt 99°C (Beispiel 1) und 2,0 g (15 % der Theorie) 2-(4-Chlorphenoxy)methyl-2-hydroxy-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-(1,2,4-triazol-4-yl)-propan (Beispiel 2) vom Schmelzpunkt 160°C.

Herstellung des Ausgangsproduktes



(1. Variante)

12,85 g (0,1 Mol) 4-Chlorphenol in 50 ml Aceton werden zu einem Gemisch von 14,1 g (0,1 Mol) 2,2-Di(chlormethyl)-oxiran, 13,8 g (0,1 Mol) Kaliumcarbonat in 200 ml Aceton getropft. Man erhitzt 18 Stunden unter Rückfluß, läßt abkühlen und filtriert. Das Filtrat wird im Vakuum eingeeengt, der Rückstand in Chloroform gelöst, mit Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt.

Nach destillativer Reinigung erhält man 7,6 g (32,5 % der Theorie) 2-Chlormethyl-2-(4-chlorphenoxy-methyl)-oxiran vom Siedepunkt 150°C/0,5 mbar.


(2. Variante)

5 0,5 Mol 4-Chlorphenol-natrium in Acetonitril werden zu einer Lösung von 125 g (1 Mol) 3-Chlor-2-chlormethylpropen in 50 ml Acetonitril getropft. Nach Zusatz von 0,5 g Natriumjodid wird das Reaktionsgemisch 12 Stunden unter Rückfluß erhitzt und anschließend kalt
10 filtriert. Das Filtrat wird im Vakuum eingeengt. Der Rückstand wird in Methylenchlorid gelöst, mit Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeengt. Man erhält 58,6 g ca. 60 %-iges 2-Chlormethyl-3-(4-chlorphenoxy)-propen, was in 500 ml Methylenchlorid gelöst und mit 43 g (0,25 Mol) 3-Chlorperbenzoesäure versetzt wird.


15 Man läßt 24 Stunden bei Raumtemperatur rühren und filtriert. Das Filtrat wird mit wässriger, 10 %-iger Natriumthiosulfatlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeengt.

Nach destillativer Reinigung erhält man 30 g (12,9 % der Theorie) 2-Chlormethyl-2-(4-chlorphenoxy-methyl)-oxiran vom Brechungsindex $n_D^{20} = 1,5465$.


Beispiel 3, 4 und 5



(Beispiel 3)



(Beispiel 4)



(Beispiel 5)

(Verfahren b und c)


23,5 g eines Gemisches aus 2-Chlormethyl-2-(2,4-dichlorphenoxy-methyl)-oxiran und 2,2-Bis(2,4-dichlorphenoxy-methyl)-oxiran werden zu einer Lösung von 20,7 g (0,3 Mol) 1,2,4-Triazol und 13,8 g (0,1 Mol) Kaliumcarbonat in 200 ml Aceton getropft. Man läßt das Reaktionsgemisch 20 Stunden unter Rückfluß rühren. Danach wird kalt
5 filtriert und das Filtrat im Vakuum eingeeengt. Der Rückstand wird

in Chloroform gelöst, mit Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und chromatographisch (Kieselgel 60 Merck) gereinigt und getrennt. Zuerst wird mit Chloroform eluiert. Das dabei erhaltene Eluat wird durch Abdestillieren des Lösungsmittels eingeengt und der Rückstand mit Diethylether verrührt. Man erhält 4,8 g 1,3-Bis-(2,4-dichlorphenoxy)-2-hydroxy-2-(1,2,4-triazol-1-yl-methyl)-propan (Beispiel 5) vom Schmelzpunkt 136°C.


Anschließend wird mit Chloroform/Methanol : 40/1 eluiert. Das dabei erhaltene Eluat wird durch Abdestillieren des Lösungsmittels eingeengt und der Rückstand mit Acetonitril verrührt. Man erhält 3,9 g 2-(2,4-Dichlorphenoxy-methyl)-1,3-di(1,2,4-triazol-1-yl)-2-hydroxy-propan (Beispiel 3) vom Schmelzpunkt 138°C.

Zum Schluß wird mit Chloroform/Methanol : 20/1 eluiert. Das dabei erhaltene Eluat wird durch Abdestillieren des Lösungsmittels eingeengt und der Rückstand mit Acetonitril verrührt. Man erhält 3,7 g 2-(2,4-Dichlorphenoxy-methyl)-2-hydroxy-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-(1,2,4-triazol-4-yl)-propan (Beispiel 4) vom Schmelzpunkt 182°C.

Herstellung der Ausgangsprodukte



(IV - 2)




(V - 1)

Ein Gemisch von 14,1 g (0,1 Mol) 2,2-Di(chlormethyl)-oxiran,
 13,8 g (0,1 Mol) Kaliumcarbonat und 16,3 g (0,1 Mol) 2,4-Dichlor-
 5 phenol in 150 ml Aceton wird 15 Stunden auf 60°C erhitzt, anschlie-
 ßend kalt filtriert und das Filtrat im Vakuum eingeeengt. Der Rück-
 stand wird in Methylenchlorid aufgenommen, mit Wasser gewaschen,
 über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt. Man erhält 23,5 g
 eines öligen Gemisches, das aufgrund gaschromatographischer Ermitt-
 10 lung neben 14,9 % unumgesetztem 2,2-Di(chlormethyl)-oxiran 47 %
 2-Chlormethyl-2-(2,4-dichlorphenoxy)methyl-oxiran (Beisp. IV-2)
 und 24,9 % 2,2-Bis(2,4-dichlorphenoxy)methyl-oxiran (Beisp. V-1)
 enthält.

Dieses Gemisch kann gegebenenfalls chromatographisch getrennt wer-
 15 den, wobei 2-Chlormethyl-2-(2,4-dichlorphenoxy)methyl-oxiran
 (Beisp. IV-2) mit einem Brechungsindex $n_D^{20} = 1,5568$ und 2,2-Bis-
 (2,4-dichlorphenoxy)methyl-oxiran (Beisp. V-1) vom Schmelzpunkt
 64°C erhalten werden.


Beispiel 6



(Verfahren b)


Entsprechend Beispiel 1/2 erhält man aus 8,9 g (0,038 Mol) 2-Chlor-
 methyl-2-(2-chlorphenoxy-methyl)-oxiran, 5 g (0,038 Mol) Kalium-
 carbonat und 6,9 g (0,1 Mol) 1,2,4-Triazol in 200 ml Aceton nach
 chromatographischer Reinigung des Reaktionsproduktes (Kieselgel 60,
 Merck, Chloroform/Methanol = 40/1) 7,1 g (55 % der Theorie)
 2-(2-Chlorphenoxy-methyl)-1,3-di(1,2,4-triazol-1-yl)-2-hydroxy-
 propan vom Schmelzpunkt 95°C.

Herstellung des Ausgangsproduktes



Entsprechend Beispiel 1/2 (Herstellung des Ausgangsproduktes,
 1. Variante) erhält man aus 12,85 g (0,1 Mol) 2-Chlorphenol in
 50 ml Aceton und 14,1 g (0,1 Mol) 2,2-Di(chlormethyl)-oxiran sowie
 13,8 g (0,1 Mol) Kaliumcarbonat in 200 ml Aceton 9,1 g (39 % der
 Theorie) 2-Chlormethyl-2-(2-chlorphenoxy-methyl)-oxiran vom Bre-
 chungindex $n_D^{20} = 1,5463$.


Beispiel 7




(Verfahren a)

- 28,2 g (0,2 Mol) 2,2-Di(chlormethyl)-oxiran werden unter Rühren zu
 einem Gemisch von 82,5 g (1,2 Mol) 1,2,4-Triazol und 82,5 g
 (0,6 Mol) Kaliumcarbonat in 400 ml Aceton getropft. Man läßt das
 Reaktionsgemisch 50 Stunden unter Rückfluß rühren, filtriert und
 engt das Filtrat im Vakuum ein. Der ölige Rückstand wird chromato-
 graphiert (Kieselgel 60, Merck, Chloroform/Methanol = 20/1). Man
 erhält 5,9 g (10,7 % der Theorie) 1,3-Di(1,2,4-triazol-1-yl)-2-
 hydroxy-2-(1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-propan vom Schmelzpunkt 220°C.

Beispiel 8 und 9



(Beispiel 8)




(Beispiel 9)

Verfahren b)

- Entsprechend Beispiel 1/2 erhält man aus 14,8 g (0,06 Mol) 2-Chlor-
 methyl-2-(4-chlorphenylthiomethyl)-oxiran, 8,3 g (0,12 Mol)


- 1,2,4-Triazol und 8,3 g (0,06 Mol) Kaliumcarbonat in 200 ml Aceton 12,1 g (57,5 % der Theorie) 2-(4-Chlorphenylthiomethyl)-1,3-di-(1,2,4-triazol-1-yl)-2-hydroxy-propan (Beispiel 8) vom Schmelzpunkt 150°C und 4,6 g (22 % der Theorie) 2-(4-Chlorphenylthiomethyl)-2-hydroxy-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-(1,2,4-triazol-4-yl)-propan (Beispiel 9) vom Schmelzpunkt 186°C.

Herstellung des Ausgangsproduktes



- 5,4 g (0,1 Mol) Natriummethylat werden portionsweise in ein Gemisch von 16,9 g (0,12 Mol) 2,2-Di(chlormethyl)-oxiran und 14,5 g (0,1 Mol) 4-Chlorthiophenol in 200 ml Acetonitril eingetragen. Man läßt das Reaktionsgemisch 4 Stunden nachrühren, filtriert und engt das Filtrat im Vakuum ein. Der Rückstand wird in Methylenchlorid gelöst, mit Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt. Das verbleibende Öl wird destilliert. Man erhält 18,2 g (73 % der Theorie) 2-Chlormethyl-2-(4-chlorphenylthiomethyl)-oxiran vom Brechungsindex $n_D^{20} = 1,5895$.

In entsprechender Weise und gemäß den erfindungsgemäßen Verfahren werden die folgenden Endprodukte der allgemeinen Formel (I)



in Tabelle 1 erhalten :

Tabelle 1







Beisp.- Nr.	R ¹	R ²	R ³	Schmp. (°C) oder n _D ²⁰
10				166
11	"	"		90
12	"	"		140
13	"	"		179
14	"	"		130
15	"			146
16	"	"		150
17	"	"		204
18	"	"		166

Tabelle 1 - Fortsetzung

Beisp.- Nr.	R ¹	R ²	R ³	Schmp. (°C) oder n _D ²⁰
19				120
20				130
21				77
22				95
23				92
24				130
25				100
26				108
27				72
28				84
29				158

Tabelle 1 - Fortsetzung

















Beisp.- Nr.	R ¹	R ²	R ³	Schmp. (°C) oder n _D ²⁰
30				112
31	"			118
32	"			162
33	"	"		188
34	"			110
35	"	"		70
36	"			138
37	"			162
38	"			174

Tabelle 1 - Fortsetzung

















Beisp. Nr.	R ¹	R ²	R ³	Schmp. (°C) oder n _D ²⁰
39				134
40	"			84
41	"			120
42	"	"		74
43	"			95
44	"			75
45	"			93
46	"			46

Tabelle 1 - Fortsetzung

Bsisp.- Nr.	R ¹	R ²	R ³	Smp. (°C) oder n _D ²⁰
47				75
48	"	"		70
49	"			90
50	"			116
51	"			128
52	"			142
53	"			186
54	"			149
55	"			155
56	"			1,5820
57	"			45
58	"			130

Tabelle 1 - Fortsetzung

Bsp. Nr.	R ¹	R ²	3	Schmp. (°C) oder n _D ²⁰
59				150
60	"			126
61	"			95
62	"			170
63	"			142
64	"			177
65	"			90
66	"			70
67	"			1,5620
68	"			1,5698
69	"	"		1,5600
70	"	"		80
71	"			108
72	"			1,5608
73	"	"		126

Tabelle 1 - Fortsetzung














Bsp. Nr.	R ¹	R ²	R ³	Smp. (°C) oder n _D ²⁰
74				142
75	"	"		144
76	"	"		zähes Öl
77	"			168
78	"			146
79	"			108
80	"			150
81	"			188
82	"			98
83	"			164
84	"			166
85	"			194
86	"			128
87	"			141
88	"			115










Tabelle 1 - Fortsetzung

Bsp. Nr.	R ¹	R ²	R ³	Smp. (°C) bzw. N ₂₀ D
89				96
90	"			159
91	"			160
92	"			184
93	"			186
94	"			1,5750
95	"			142
96	"			190
97	"			120
98	"			130
99	"			154
100	"			80


Tabelle 1 - Fortsetzung

Bsp. Nr.	R ¹	R ²	R ³	Smp. (°C) bzw. n _D ²⁰
101				114
102	"			169
103	"			140
104	"			154
105	"			50
106	"			75
107	"			70
108				169
109	"			84
110	"			82
111				51
112	"			96
113	"			92
114	"			130

Tabelle 1 - Fortsetzung

Bsp. Nr.	R ¹	R ²	R ³	Smp. (°C) bzw. n _D ²⁰
115			-S-C(CH ₃) ₃	70
116	"		-S-C(CH ₃) ₃	91
117	"		-O-C ₆ H ₄ -CF ₃	97
118	"		-O-C ₆ H ₄ -CF ₃	110
119	"		-O-C ₆ H ₄ -Cl	100
120			-O-C ₆ H ₄ -C ₆ H ₅	275
121		-S-C ₆ H ₃ (Cl)(CF ₃)	-S-C ₆ H ₃ (Cl)(CF ₃)	1.5674

Entsprechend den Herstellungsbeispielen und den allgemeinen Verfahrensangaben werden die folgenden Zwischenprodukte der allgemeinen Formel (IV)



in Tabelle 2 erhalten:

Tabelle 2









Bsp. Nr.	R ²	Hal	Siedepunkt(°C) /mbar bzw. n _D ²⁰
(IV-5)		Cl	100/0,2
(IV-6)		Cl	145/0,1
(IV-7)		Cl	155/0,3
(IV-8)		Cl	1,5842
(IV-9)		Cl	190/0,2
(IV-10)		Cl	100/0,1
(IV-11)		Cl	1,6270
(IV-12)		Cl	1,5442
(IV-13)		Cl	140/0,5
(IV-14)		Cl	122/0,1

Tabelle 2 - Fortsetzung














Bsp. Nr.	R ²	Hal	Siedepunkt (°C) /mmbar bzw. n _D ²⁰
(IV-15)		Cl	110/0,1
(IV-16)		Cl	120/0,2
(IV-17)		Cl	140/0,2
(IV-18)		Cl	140/0,2
(IV-19)		Cl	160/0,2
(IV-20)		Cl	120/0,3
(IV-21)		Cl	138/0,1
(IV-22)	-S-C ₂ H ₅	Cl	1,4968
(IV-23)	-N(C ₂ H ₅)- 	Cl	130/0,3
(IV-24)	-NH- 	Cl	1,5843
(IV-25)	-S- 	Cl	160/0,3
(IV-26)	-S- 	Cl	158/0,3
(IV-27)	-S- 	Cl	155/0,3
(IV-28)	-S- 	Cl	1,5575
(IV-29)	-S-(CH ₂) ₁₁ -CH ₃	Cl	1,4775









Tabelle 2 - Fortsetzung

Bsp. Nr.	R ²	Hal	Siedepunkt (°C) /mbar bzw. n _D ²⁰
(IV-30)		Cl	1,6065
(IV-31)		Cl	1,5951
(IV-32)		Cl	1,5514
(IV-33)		Cl	1,5408
(IV-34)		Cl	1,5748
(IV-35)		Cl	1,5613
(IV-36)		Cl	1,5738
(IV-37)		Cl	1,5805
(IV-38)		Cl	1,5858
(IV-39)		Cl	1,5940
(IV-40)		Cl	1,5840
(IV-41)		Cl	1,5531
(IV-42)		Cl	1,4871
(IV-43)		Cl	1,4880

Entsprechend den Herstellungsbeispielen und den allgemeinen Verfahrensangaben werden die folgenden Zwischenprodukte der allgemeinen Formel (V)




in Tabelle 3 erhalten:


<u>Tabelle 3</u>			
Bsp.	R ²	R ³	Schmelzpunkt(°C) bzw. n _D ²⁰
(V-2)			1,6347
(V-3)			84
(V-4)			176
(V-5)			1,5612
(V-6)			100
(V-7)			1,5590
(V-8)			50
(V-9)			96

Die Herstellung der gegebenenfalls als Vorprodukte zu verwendenden Propen-Derivate der Formeln (VIII) und (IX) sei anhand der folgenden Beispiele erläutert:

Beispiel α



(Beispiel VIII-1)




(Beispiel IX-1)

5 Eine Lösung von 64,25 g (0,5 Mol) 4-Chlorphenol in 100 ml Aceton wird bei 60°C zu einem Gemisch von 125 g (1 Mol) 3-Chlor-2-chlor-methyl-propen und 34,5 g (0,25 Mol) Kaliumcarbonat in 500 ml Aceton getropft. Man läßt 18 Stunden bei dieser Temperatur nach-
rühren, filtriert und engt das Filtrat ein. Der ölige Rückstand
10 wird in Methylenchlorid gelöst, einmal mit 200 ml 10 %-iger Natronlauge und danach zweimal mit je 500 ml Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt. Der ölige Rückstand wird destilliert. Man erhält 43,2 g (41,5 % der Theorie) 2-Chlor-methyl-3-(4-chlorphenoxy)-propen (Beispiel VIII-1) vom Siede-
punkt 80 bis 90°C/0,05 mbar.

15 Aus dem Destillationsrückstand erhält man nach Verrühren mit Di-isopropylether 10,7 g 3-(4-Chlorphenoxy)-2-(4-chlorphenoxy-methyl)-propen (Beispiel IX-1) vom Schmelzpunkt 72°C.

Beispiel β



(Beispiel VIII-2)




Ein Gemisch von 25 g (0,2 Mol) 3-Chlor-2-chlormethyl-propen, 27,6 g (0,4 Mol) 1,2,4-Triazol und 27,6 g (0,2 Mol) Kaliumcarbonat

in 200 ml Aceton wird 15 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen wird filtriert und das Filtrat im Vakuum eingeeengt. Der ölige Rückstand wird chromatographiert (Kieselgel 60, Merck; Chloroform).

- 5 Man erhält 23 g (63 % der Theorie) 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl-methyl)-propen vom Schmelzpunkt 52°C.

Verwendungsbeispiele

In den nachfolgenden Beispielen werden die nachstehend angegebenen Verbindungen als Vergleichssubstanzen eingesetzt:



Beispiel A

Erysiphe-Test (Gerste) / protektiv

Lösungsmittel: 100 Gewichtsteile Dimethylformamid

Emulgator: 0,25 Gewichtsteile Alkylarylpolglykoether

5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung taufeucht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit Sporen von Erysiphe graminis f.sp.hordei bestäubt.





15 Die Pflanzen werden in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 80 % aufgestellt, um die Entwicklung von Mehltaupusteln zu begünstigen.

7 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung.

20 Eine deutliche Überlegenheit in der Wirksamkeit gegenüber dem Stand der Technik zeigen in diesem Test z.B. die Verbindungen gemäß folgender Herstellungsbeispiele: 5,3,11,14,23,31,8,29,60,65,88 und 92.




T a b e l l e: A

Erysiphe-Test (Gerste) / protektiv

W i r k s t o f f	Wirkstoff- konzentration in der Spritz- brühe in Gew.-%	Krankheits- befall in % der unbehan- delten Kon- trolle
 (A) (bekannt)	0,0025	100
 (5)	0,0025	33,7
 (3)	0,0025	0,0
 (11)	0,0025	25,0

T a b e l l e: A (Fortsetzung)


Erysiphe-Test (Gerste) / protektiv

Wirkstoff	Wirkstoff- konzentration in der Spritz- brühe in Gew.-%	Krankheits- befall in % der unbehan- delten Kon- trolle
(14) 	0,0025	25,0
(23) 	0,0025	12,5
(31) 	0,0025	16,2

T a b e l l e: A (Fortsetzung)


Erysiphe-Test (Gerste) / protektiv

W i r k s t o f f	Wirkstoff- konzentration in der Spritz- brühe in Gew.-%	Krankheits- befall in % der unbehan- delten Kon- trolle
-------------------	--	---




0,0025

25,0



0,0025

25,0






0,0025

16,2

T a b e l l e: A (Fortsetzung)

Erysiphe-Test (Gerste) / protektiv

W i r k s t o f f	Wirkstoff- konzentration in der Spritz- brühe in Gew.-%	Krankheits- befall in % der unbehan- delten Kon- trolle
 (65)	0,0025	3,7
 (88)	0,0025	12,5
 (92)	0,0025	25,0

Beispiel B

Leptosphaeria nodorum-Test (Weizen) / protektiv

Lösungsmittel: 100 Gewichtsteile Dimethylformamid

Emulgator : 0,25 Gewichtsteile Alkylarylpolglykolether

5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung taufeucht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit einer Konidiensuspension von Leptosphaeria nodorum besprüht. Die Pflanzen verbleiben 48 Stunden bei 20°C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine.



15 Die Pflanzen werden im Gewächshaus bei einer Temperatur von ca. 15°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 80% aufgestellt.

10 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung.

20 Eine deutliche Ueberlegenheit in der Wirksamkeit gegenüber dem Stand der Technik zeigen bei diesem Test z.B. die Verbindungen gemäß folgendem Herstellungsbeispiel : 5.

T a b e l l e : B

Leptosphaeria nodorum - Test (Weizen) / protektiv

W i r k s t o f f	Wirkstoff- konzentration in der Spritzebrühe in Gew. %	Krankheits- befall in % der unbehandelten Kontrolle
 (B) (bekannt)	0,025	100
 (5)	0,025	33,3

Beispiel C

Sphaerotheca-Test (Gurke) / protektiv

Lösungsmittel: 4,7 Gewichtsteile Aceton

Emulgator: 0,3 Gewichtsteile Alkylarylpolglykolether

- 5 Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.
- 10 Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit bespritzt man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung bis zur Tropfnässe. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit Konidien des Pilzes Sphaerotheca fuliginea bestäubt.
- 15 Die Pflanzen werden anschließend bei 23 bis 24°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 75 % im Gewächshaus aufgestellt.
- 10 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung.
- 20 Eine deutliche Überlegenheit in der Wirksamkeit gegenüber dem Stand der Technik zeigen in diesem Test z.B. die Verbindungen gemäß folgender Herstellungsbeispiele: 6,3,8,12 und 29.

Tabelle c

Sphaerotheca-Test (Gurke) / protektiv

Wirkstoff	Befall in % bei einer Wirkstoffkonzentration von
	5 ppm
	100
(C) (bekannt)	
	43
(A) (bekannt)	
	10
(6)	
	10
(3)	


T a b e l l e C (Fortsetzung)

Sphaerotheca-Test (Gurke) / protektiv


Wirkstoff

Befall in % bei einer Wirkstoffkonzentration von


5 ppm



20



30



13

Beispiel D

Cochliobolus sativus-Test (Gerste) /protektiv

Lösungsmittel: 100 Gewichtsteile Dimethylformamid

Emulgator: 0,25 Gewichtsteile Alkylarylpolglykolether

Zur Herstellung einer zweckmäßigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff mit den angegebenen Mengen Lösungsmittel und Emulgator und verdünnt das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration.

Zur Prüfung auf protektive Wirksamkeit besprüht man junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung taufeucht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit einer Konidiensuspension von Cochliobolus sativus besprüht. Die Pflanzen verbleiben 48 Stunden bei 20°C und 100 % rel. Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine.

Die Pflanzen werden in einem Gewächshaus bei einer Temperatur von ca. 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 80 % aufgestellt.





7 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung.

Eine deutliche Überlegenheit in der Wirksamkeit gegenüber den Stand der Technik zeigen bei diesem Test z.B. die Verbindungen gemäß folgender Herstellungsbeispiele: 12,52,54,69,72,82,86,89,91,94,95,96,97,98,99,100,101,103.

T a b e l l e D

Cochliobolus sativus-Test (Gerste) /protektiv




Wirkstoff	Wirkstoff- konzentration in der Spritzbrühe in Gew.-%	Krankheits- befall in % der unbehan- delten Kon- trolle
-----------	---	---



T a b e l l e D (Forts.)

Cochliobolus sativus-Test (Gerste) /protektiv




Wirkstoff	Wirkstoff- konzentration in der Spritzbrühe in Gew.-%	Krankheits- befall in % der unbehan- delten Kon- trolle
-----------	---	---



T a b e l l e D (Forts).

Cochliobolus sativus-Test (Gerste) /protektiv




Wirkstoff	Wirkstoff- konzentration in der Spritzbrühe in Gew.-%	Krankheits- befall in % der unbehan- delten Kon- trolle
-----------	---	---



T a b e l l e D (Forts.)

Cochliobolus sativus-Test (Gerste) /protektiv


Wirkstoff	Wirkstoff- konzentration in der Spritzbrühe in Gew.-%	Krankheits- befall in % der unbehan- delten Kon- trolle
-----------	---	---



T a b e l l e D (Forts.)


Cochliobolus sativus-Test (Gerste) /protektiv

Wirkstoff	Wirkstoff- konzentration in der Spritzbrühe in Gew.-%	Krankheits- befall in % der unbehan- delten Kon- trolle
-----------	---	---




0,025

50,0



0,025

25,0




0,025

25,0

T a b e l l e D (Forts.)


Cochliobolus sativus-Test (Gerste) /protektiv

Wirkstoff	Wirkstoff- konzentration in der Spritzbrühe in Gew.-%	Krankheits- befall in % der unbehan- delten Kon- trolle
-----------	---	---




0,025

33,7



0,025

50,0




0,025

50,0

Erfindungsanspruch

1. Fungizide Mittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einem substituierten tert.-Butanol-Derivat der Formel



in welcher

R^1 , R^2 und R^3 gleich oder verschieden sind und für Azolyl, gegebenenfalls substituiertes Phenoxy, gegebenenfalls substituiertes Phenylthio, Alkylthio, Alkenyl, Alkinyl, gegebenenfalls substituiertes Phenylacetyl- enyl, Alkylamino, Dialkylamino, gegebenenfalls substituiertes Phenylamino, gegebenenfalls substituiertes Phenyl-N-alkyl-amino, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl-amino, gegebenenfalls substituiertes Cycloalkyl-N-alkyl-amino, Aminoethoxy, Alkyl-aminoethoxy oder Dialkylaminoethoxy stehen,

sowie deren Säureadditionssalze und Metallsalzkomplexe, neben Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Mitteln.

2. Fungizide Mittel nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß in der allgemeinen Formel I

R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind und für Imidazol-1-yl, 1,2,4-Triazol-1-yl, 1,2,4-Triazol-4-yl oder Pyrazol-1-yl stehen und

R^3 für jeweils gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden substituiertes Phenoxy, Phenylthio, Phenylamino oder Phenyl-N-alkyl-amino mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylteil steht, wobei die genannten Gruppen im Phenylteil substituiert sein können durch Halogen, Alkyl mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, Alkoxy und Alkylthio mit jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatomen; durch Halogenalkyl, Halogenalkoxy und Halogenalkylthio mit jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und 1 bis 5 gleichen oder verschiedenen Halogenatomen, wie Fluor- und Chloratomen, Cycloalkyl mit 5 bis 6 Kohlenstoffatomen; ferner durch Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, Alkylcarbonyl oder Alkoxycarbonyl mit jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylteil, gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen, Nitro, Trifluormethyl und Alkyl mit 1 bis 2 Kohlenstoffatomen substituiertes Phenyl oder Phenoxy, durch die Aldehydgruppe sowie den Oxim- bzw. Oximether-Rest.

21.3.1984

- 65 -

63 584/11

3. Fungizide Mittel nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß in der allgemeinen Formel I

R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind und für Imidazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-1-yl; 1,2,4-Triazol-4-yl oder Pyrazol-1-yl stehen und

R^3 für jeweils gegebenenfalls einfach bis dreifach, gleich oder verschieden substituiertes Phenoxy, Phenylthio, Phenylamino oder Phenyl-N-alkyl-amino mit 1 bis 2 Kohlenstoffatomen im Alkylteil steht, wobei die genannten Gruppen im Phenylteil substituiert sein können durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Isopropyl, tert.-Butyl, 2-Methyl-but-2-yl, Methoxy, Ethoxy, Methylthio, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethylthio, Cyclohexyl, Nitro, Cyano, Hydroxycarbonyl, Methylcarbonyl, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, durch jeweils gegebenenfalls einfach bis dreifach, gleich oder verschieden durch Chlor, Nitro, Trifluormethyl oder Methyl substituiertes Phenyl oder Phenoxy, die Aldehydgruppe, die Hydroxyiminomethyl- und Methoximinomethyl-Gruppe.

4. Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen, gekennzeichnet dadurch, daß man substituierte tert.-Butanol-Derivate der Formel I in Punkt 1 auf Pilze oder ihren Lebensraum einwirken läßt.

5. Verwendung von substituierten tert.-Butanol-Derivaten der Formel I in Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß sie als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.
6. Verwendung von substituierten tert.-Butanol-Derivaten der Formel I in Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß sie zur Bekämpfung von Pilzen eingesetzt werden.
7. Verfahren zur Herstellung von fungiziden Mitteln, gekennzeichnet dadurch, daß man substituierte tert.-Butanol-Derivate der Formel I in Punkt 1 mit Streckmitteln und/oder oberflächenaktiven Mitteln vermischt.