

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A61K 35/78
A61K 35/56
A61P 17/02

[12] 发 明 专 利 说 明 书

[21] ZL 专利号 98108659.4

[45] 授权公告日 2001 年 2 月 14 日

[11] 授权公告号 CN 1061888C

[22] 申请日 1998.5.25 [24] 颁证日 2001.1.13
[21] 申请号 98108659.4
[73] 专利权人 耿振江
地址 471000 河南省洛阳市九都路计划生育科
研所家属楼乔秀兰转耿振江
[72] 发明人 耿振江 耿 乔 耿 源 胡庆九
审查员 穆森昌

[74] 专利代理机构 洛阳市专利事务所
代理人 陆 军

权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图页数 0 页

[54] 发明名称 治疗顽固性溃疡的红药的制作方法
[57] 摘要

一种治疗顽固性溃疡的红药及其制作方法,其由蜈蚣、全蝎、蟾酥、煅石膏、血竭和蓖麻子组成,将各药粉碎成粉,过筛 200 目,即成散剂;以凡士林为基质,与红药混合、拌匀制成膏剂;红药散剂加蒸馏水制成外用液体等。经 33 年,9926 名病人临床应用证明,其有效率为 100%,治愈率为 99%。安全可靠,无毒副作用,尤其是对需要植皮的大面积溃疡比临床常用的呋喃西林、生理盐水或其它抗生素药物治疗溃疡可缩短一半时间。

I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

权 利 要 求 书

1. 一种治疗顽固性溃疡的红药的制作方法,其特征在于:所述红药的制作方法,取蜈蚣 40—45% (重量比,以下同)、全蝎 40—45%、蟾酥 5—8%、煅石膏 1—3%、血竭 2—4%、蓖麻子 2—4%,其可制成散剂、膏剂、液体或膜剂。

2. 如权利要求 1 所述的治疗顽固性溃疡的红药的制作方法,其特征在于:所述红药的制作中可将粉状的散剂红药,以凡士林为基质,每 100 克凡士林加入 10 克红药散剂,拌匀成 10% 的红药软膏剂。

3. 如权利要求 1 所述的治疗顽固性溃疡的红药的制作方法,其特征在于:所述红药制作中,可将散剂红药 20 克,蒸馏水加至 100ml,混匀、消毒成 20% 的液体备用。

4. 如权利要求 1 所述的治疗顽固性溃疡的红药的制作方法,其特征在于:所述红药的制作中将粉状的散剂红药 30 克,竣甲基纤维钠 3 克,蒸馏水加至 100ml 拌成糊状,倒在 400 平方厘米的玻璃板上成 1mm 厚薄膜,晾干或烘干,切成一定大小备用。

5. 如权利要求 1、2、3、4 任何一项所述的治疗顽固性溃疡的红药的制作方法,其特征在于:所述红药制作中,可取蜈蚣 40 克、全蝎 40 克、蟾酥 5 克、煅石膏 1 克、血竭 2 克和蓖麻子 2 克,将其研磨成粉状,过筛 200 目,装瓶制成红药散剂。

治疗顽固性溃疡的红药的制作方法

本发明涉及医用药品的配制，一种治疗顽固性溃疡的红药的制作方法。

人在工作和生活中，因外伤、烧伤等各种原因导致的创伤及其感染后所形成的溃疡，以及在口腔科经常碰到的令口腔医生头痛的难治性口腔粘膜溃疡，无不严重地影响着人们的生活和工作。红药提供了一种全中药制剂、疗效甚佳的治疗方法。顽固性溃疡的治疗，常令西医医生束手无策。有时不得不行植皮手术。结果疗程延长，又加重了病人的痛苦。

本发明的目的是提供一种治疗顽固性溃疡的红药的制作方法。采用全中药制剂，治疗时间短、见效快，特别是对大面积溃疡或其它创面，在某种程度上可替代外科的植皮手术。且安全可靠，无任何毒副作用。

为实现上述目的，本发明采取如下技术方案：

所述治疗顽固性溃疡的红药的制作方法中，该红药组分中由蜈蚣 40-45%（重量比，以下同）、全蝎 40-45%、蟾酥 5-8%、煅石膏 1-3%、血竭 2-4%、蓖麻子 2-4% 中药组成。

主要药物及药理作用：

蜈蚣：为蜈蚣科节足动物少棘巨蜈蚣的全体。主产于四川、湖北、浙江、贵州、江苏、安徽等地。性辛、温、有毒、归肝经。

功效：熄风止痛，解热散结，用于治疗疮肿毒溃烂等，有通络止痛作用。蜈蚣有两种类似蜂毒的有效成分，组织胺样物质，溶血性蛋白质等。临床运用证明，能使溃疡迅速愈合。

全蝎：为钳蝎科节足动物。主产于河南、河北、山东、湖北、安徽等地。性辛、平、有毒，归肝经。

功效：熄风镇静，通络止痛，解毒医疮，扩张血管作用。

蟾酥：为脊椎动物蟾蜍科蟾蜍，耳下腺及皮肤腺所分泌的白色浆液干燥制品。主产在山东、河北、江苏等地。性甘、辛、温、有毒，归心，胃经。

功效主治：攻毒消肿、开窍醒神，并有类似可卡因的局麻作用和类似激素的抗炎作用。

煅石膏：清热泻火，生肌敛疮，外用对溃疡愈合和烧伤等有良效。

血竭：棕榈科常绿藤木植物麒麟竭及同属植物的果实和树干渗出的红色树脂。性甘、咸、平、归心、肝经。主产广东、台湾、印度、马来亚等地。

功效主治：化瘀止痛，生肌敛疮，止血。

蓖麻子：大戟科一年生草本植物，蓖麻的种子。全国均栽培。性甘、辛、平。有毒。归肝、脾经。

功效主治：拔毒、排脓，祛腐止痛，通络除痹，润肠通便。

采用该方法生产的所述治疗顽固性溃疡的红药的积极效果如下：

河南红药属祖传秘方，为主治顽固性溃疡的外用药。从1965年至今，经30多年9926人的临床运用，其有效率为100%，治愈率为99%。安全可靠，无副作用。对胫前和内外踝等难愈合的溃疡有特效。治疗最大面积可达40×20平方厘米的溃疡（如褥疮等）。该药可部分替代植皮术。因此，在大面积烧伤和止血等治疗中也有独特作用。临床运用证明，该药有促进上皮生长作用。该药治疗溃疡所需时间比一般医院用呋喃西林等药物治疗时间缩短一半，特别是对其它办法都无效时可使创面迅速愈合。

实施例一：

制作治疗溃疡的红药时，取蜈蚣40克、全蝎40克、蟾酥5克、煅石膏1克、血竭2克和蓖麻子2克，将其研磨成粉状，过筛200目，装瓶制成红药散剂。

实施例二：

将粉状的散剂红药，以凡士林为基质，每100克凡士林加入10克红药散剂，拌匀成10%的红药软膏剂。

实施例三:

将散剂红药 20 克, 蒸馏水加至 100ml , 混匀、消毒, 制成 20% 的液体备用。

实施例四:

将粉状的散剂红药 30 克, 羧甲基纤维素钠 3 克, 蒸馏水加至 100ml , 拌成糊状, 倒在 400 平方厘米的玻璃板上成 1mm 厚薄膜, 晾干或烘干, 切成一定大小备用。

典型病例:

1. 患者刘某, 男, 50 岁。1969 年 4 月 1 日“以背部长疮一月, 伴剧痛”为主诉入院治疗。诊断为“背痛”, 经手术切开清创后形成 40×20 平方厘米的溃疡, 注射青霉素、链霉素, 并以呋喃西林、生理盐水等换药, 治疗一个月, 创面不能愈合, 拟行手术植皮。5 月 2 日停用一切西药, 每日或隔日撒红药散剂 3 克于创面, 以消毒辅料覆盖。经 12 次换药后, 创面完全愈合, 5 月 18 日痊愈出院。
2. 患者周某, 男, 60 岁。1970 年 6 月 9 日“以项部长疮半月, 伴剧痛”为主诉入院治疗。诊断为“颈痛”, 经手术切开清创后形成 10×6 平方厘米的溃疡, 静脉滴注红霉素等药, 并以呋喃西林、生理盐水等换药, 治疗一个月, 创面不能愈合, 拟行手术植皮。7 月 12 日

停用一切西药，每日或隔日撒红药散剂 2 克于创面，以消毒辅料覆盖。经 8 次换药后，创面完全愈合，5 月 25 日痊愈出院。

- 3、患者李某，女，10 岁。1982 年 10 月 6 日“以右腿开水烧伤后形成溃疡，两个月未愈”为主诉门诊治疗。查右胫前有 5×3 平方厘米的溃疡，诊断为“右胫前溃疡”。曾在洛阳医专附属医院治疗两个月，曾口服抗生素药物，肌肉注射青霉素、链霉素等，并以呋喃西林、生理盐水换药，创面不能愈合，接诊后仅每日撒红药散剂 1 克于创面，以消毒辅料覆盖。经 3 次换药后，创面完全愈合。