(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104958558 A
(43)申请公布日 2015.10.07

(21)申请号 201510412839.0

(22)申请日 2015.07.15

(71)申请人 上海资医堂生物科技有限公司
地址 201206 上海市浦东新区新金桥路1088号

(72)发明人 张作峰

(51)Int.Cl.
A61K 36/898(2006.01)
A61P 17/02(2006.01)
A61K 31/045(2006.01)
A61K 35/36(2015.01)
A61K 35/57(2015.01)
A61K 35/02(2015.01)

权利要求书2页 说明书17页

(54)发明名称

一种治疗烧伤的药物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗烧伤药物，所述药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含以下组分：蛋黄油、当归、紫草、降真香、黄连、川朴、三七、苏木、红花、地榆、川芎、甘松、元胡、桔梗、白芨、没药、乳香、甘草、血竭、冰片、生地黄、血余、龙骨、交藤、地丁、荆芥、苦楝皮；所述内服药物包含以下组分：当归、紫草、降真香、黄连、黄岑、黄芪、川朴、三七、苏木、红花、地榆、马齿苋、仙鹤草、川芎、元胡、桔梗、白芨、没药、乳香、甘草、甘松、金银花、鱼腥草、蒲公英、防风、穿心莲、白芍、薄荷。本发明所述的药物能够消炎镇痛，抗菌止血，去腐生肌，从内部修复皮肤炎性组织，有效治疗烧伤疤痕，提高对一、二度烧伤的治愈速度。

CN 104958558 A

1. 一种治疗烧伤的药物，其特征在于，所述药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含以下组分：蛋黄油、当归、紫草、降真香、黄连、川朴、三七、苏木、红花、地榆、川芎、甘松、元胡、桔梗、白芨、没药、乳香、甘草、血竭、冰片、生地黄、血余、龙骨、交藤、地丁、荆芥、苦楝皮；

所述内服药物包含以下组分：当归、紫草、降真香、黄连、黄岑、黄芪、川朴、三七、苏木、红花、地榆、马齿苋、仙鹤草、川芎、元胡、桔梗、白芨、没药、乳香、甘草、甘松、金银花、鱼腥草、蒲公英、防风、穿心莲、白芍、薄荷。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗烧伤的药物，其特征在于，所述药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含如下重量份的组分：蛋黄油 60 ～ 160、当归 20 ～ 25、紫草 26 ～ 37、降真香 12 ～ 18、黄连 20 ～ 25、川朴 9 ～ 13、三七 25 ～ 32、苏木 10 ～ 14、红花 18 ～ 26、地榆 15 ～ 25、川芎 12 ～ 18、甘松 4 ～ 12、元胡 7 ～ 16、桔梗 3 ～ 6、白芨 25 ～ 30、没药 27 ～ 35、乳香 10 ～ 18、甘草 5 ～ 10、血竭 10 ～ 16、冰片 7 ～ 12、生地黄 8 ～ 12、血余 7 ～ 12、龙骨 6 ～ 15、交藤 5 ～ 9、地丁 6 ～ 12、荆芥 4 ～ 8、苦楝皮 7 ～ 12；

所述内服药物包含如下重量份的组分：当归 25 ～ 30、紫草 27 ～ 35、降真香 12 ～ 15、黄连 13 ～ 17、黄岑 17 ～ 24、黄芪 7 ～ 12、川朴 14 ～ 20、三七 20 ～ 27、苏木 5 ～ 10、红花 15 ～ 20、地榆 15 ～ 25、马齿苋 6 ～ 12、仙鹤草 5 ～ 12、川芎 12 ～ 18、元胡 5 ～ 10、桔梗 7 ～ 12、白芨 27 ～ 35、没药 20 ～ 30、乳香 20 ～ 28、甘草 4 ～ 8、甘松 8 ～ 16、金银花 5 ～ 10、鱼腥草 5 ～ 10、蒲公英 3 ～ 8、防风 10 ～ 15、穿心莲 10 ～ 13、白芍 16 ～ 25、薄荷 5 ～ 10。

3. 根据权利要求 2 所述的一种治疗烧伤的药物，其特征在于，所述药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含如下重量份的组分：蛋黄油 80 ～ 140、当归 22 ～ 24、紫草 28 ～ 34、降真香 14 ～ 16、黄连 21 ～ 23、川朴 10 ～ 12、三七 27 ～ 30、苏木 11 ～ 13、红花 22 ～ 24、地榆 18 ～ 22、川芎 15 ～ 17、甘松 7 ～ 10、元胡 9 ～ 14、桔梗 4 ～ 6、白芨 27 ～ 29、没药 29 ～ 33、乳香 13 ～ 14、甘草 7 ～ 9、血竭 12 ～ 14、冰片 8 ～ 11、生地黄 9 ～ 11、血余 9 ～ 11、龙骨 8 ～ 13、交藤 6 ～ 8、地丁 7 ～ 11、荆芥 6 ～ 8、苦楝皮 8 ～ 11；

所述内服药物包含如下重量份的组分：当归 27 ～ 29、紫草 29 ～ 32、降真香 13 ～ 15、黄连 14 ～ 16、黄岑 19 ～ 22、黄芪 9 ～ 11、川朴 16 ～ 19、三七 22 ～ 24、苏木 6 ～ 8、红花 17 ～ 19、地榆 18 ～ 23、马齿苋 7 ～ 11、仙鹤草 7 ～ 10、川芎 15 ～ 17、元胡 6 ～ 9、桔梗 8 ～ 11、白芨 29 ～ 33、没药 24 ～ 28、乳香 22 ～ 26、甘草 5 ～ 7、甘松 9 ～ 12、金银花 7 ～ 9、鱼腥草 6 ～ 9、蒲公英 4 ～ 7、防风 11 ～ 13、穿心莲 10 ～ 12、白芍 18 ～ 23、薄荷 6 ～ 9。

4. 根据权利要求 3 所述的一种治疗烧伤的药物，其特征在于，所述药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含如下重量份的组分：蛋黄油 110、当归 23、紫草 30、降真香 15、黄连 22、川朴 11、三七 28、苏木 12、红花 23、地榆 20、川芎 16、甘松 8、元胡 12、桔梗 5、白芨 28、没药 31、乳香 14、甘草 8、血竭 13、冰片 10、生地黄 10、血余 10、龙骨 11、交藤 7、地丁 9、荆芥 7、苦楝皮 10；

所述内服药物包含如下重量份的组分：当归 28、紫草 31、降真香 14、黄连 15、黄岑 20、黄芪 10、川朴 18、三七 23、苏木 7、红花 18、地榆 20、马齿苋 10、仙鹤草 8、川芎 16、元胡 8、桔梗 10、白芨 31、没药 26、乳香 24、甘草 6、甘松 11、金银花 8、鱼腥草 8、蒲公英 6、防风 12、穿心莲 11、白芍 21、薄荷 7。

5. 根据权利要求 1 ～ 4 任一项所述的治疗烧伤的药物，其特征在于，所述药物由外敷药

物和内服药物组成，所述外敷药物还包含 15 ～ 20 重量份的香薷。

6. 根据权利要求 5 所述的治疗烧伤的药物，其特征在于，所述药物由外敷药物和内服药物组成，所述内服药物还包含 10 ～ 15 重量份的菌陈。

7. 一种外敷软膏剂，其特征在于，由权利要求 1 ～ 6 任一项所述的外敷药物制备而成。

8. 一种内服口服液，其特征在于，由权利要求 1 ～ 6 任一项所述的内服药物制备而成。

9. 一种内服胶囊，其特征在于，由权利要求 1 ～ 6 任一项所述的内服药物制备而成。

10. 一种内服蜜丸，其特征在于，由权利要求 1 ～ 6 任一项所述的内服药物制备而成。

一种治疗烧伤的药物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种药物。更具体地，本发明涉及一种治疗烧伤的药物。

背景技术

[0002] 烧伤是指由于热力、化学物质、电或放射线导致的皮肤组织损伤，烫伤是热力烧伤的一种。热力烧伤包括火焰、蒸汽、高温液体、金属等引起的烧伤。化学烧伤包括酸、碱、磷等化学物质引起的烧伤。电烧伤是由于电流通过人体或者电弧引起的烧伤。放射性烧伤由放射线照射或放射性核素沾染导致的烧伤，如原子弹、氢弹、核爆炸、意外事故、平时防护等不当造成的烧伤。根据严重程度不同，烧伤可分为一度烧伤，二度烧伤和三度烧伤。一度烧伤仅伤及表皮；二度烧伤可分为浅二度烧伤和深二度烧伤，浅二度烧伤伤及全层表皮和真皮浅层，深二度烧伤伤及真皮深层；三度烧伤伤及皮肤全层，甚至可达皮下、肌肉和骨骼等，一般需要手术治疗。烧伤患者皮肤等组织受到损害，疼痛不适，容易感染，易留疤痕。目前，西药治疗治疗一、二度烧伤时，多使用止痛剂止痛，抗生素防止感染，副作用大，而且抗生素的大量使用会使许多细菌产生耐药性，使得药物抗炎难度增加，愈后容易留有疤痕。中医治疗一、二烧伤存在治疗周期长，生肌速度慢的缺点。

发明内容

[0003] 为解决上述技术问题，本发明提供一种能够治疗烧伤的药物，所述药物由外敷药物和内服药物组成，能够有效消炎镇痛，抗菌止血，去腐生肌，对烧伤疤痕有显著的治愈效果，无毒副作用，尤其针对一、二度烧伤治疗速度较快。

[0004] 本发明的一个方面涉及一种治疗烧伤的药物，所述药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含以下组分：蛋黄油、当归、紫草、降真香、黄连、川朴、三七、苏木、红花、地榆、川芎、甘松、元胡、桔梗、白芨、没药、乳香、甘草、血竭、冰片、生地黄、血余、龙骨、交藤、地丁、荆芥、苦楝皮；

所述内服药物包含以下组分：当归、紫草、降真香、黄连、黄岑、黄芪、川朴、三七、苏木、红花、地榆、马齿苋、仙鹤草、川芎、元胡、桔梗、白芨、没药、乳香、甘草、甘松、金银花、鱼腥草、蒲公英、防风、穿心莲、白芍、薄荷。

[0005] 在一种实施方式中，本发明所述的药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含如下重量份的组分：蛋黄油 60 ～ 160、当归 20 ～ 25、紫草 26 ～ 37、降真香 12 ～ 18、黄连 20 ～ 25、川朴 9 ～ 13、三七 25 ～ 32、苏木 10 ～ 14、红花 18 ～ 26、地榆 15 ～ 25、川芎 12 ～ 18、甘松 4 ～ 12、元胡 7 ～ 16、桔梗 3 ～ 6、白芨 25 ～ 30、没药 27 ～ 35、乳香 10 ～ 18、甘草 5 ～ 10、血竭 10 ～ 16、冰片 7 ～ 12、生地黄 8 ～ 12、血余 7 ～ 12、龙骨 6 ～ 15、交藤 5 ～ 9、地丁 6 ～ 12、荆芥 4 ～ 8、苦楝皮 7 ～ 12；

所述内服药物包含如下重量份的组分：当归 25 ～ 30、紫草 27 ～ 35、降真香 12 ～ 15、黄连 13 ～ 17、黄岑 17 ～ 24、黄芪 7 ～ 12、川朴 14 ～ 20、三七 20 ～ 27、苏木 5 ～ 10、红花 15 ～ 20、地榆 15 ～ 25、马齿苋 6 ～ 12、仙鹤草 5 ～ 12、川芎 12 ～ 18、元胡 5 ～ 10、桔梗 7 ～

12、白芨 27 ～ 35、没药 20 ～ 30、乳香 20 ～ 28、甘草 4 ～ 8、甘松 8 ～ 16、金银花 5 ～ 10、鱼腥草 5 ～ 10、蒲公英 3 ～ 8、防风 10 ～ 15、穿心莲 10 ～ 13、白芍 16 ～ 25、薄荷 5 ～ 10。

[0006] 在一种实施方式中，本发明所述的药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含如下重量份的组分：蛋黄油 80 ～ 140、当归 22 ～ 24、紫草 28 ～ 34、降真香 14 ～ 16、黄连 21 ～ 23、川朴 10 ～ 12、三七 27 ～ 30、苏木 11 ～ 13、红花 22 ～ 24、地榆 18 ～ 22、川芎 15 ～ 17、甘松 7 ～ 10、元胡 9 ～ 14、桔梗 4 ～ 6、白芨 27 ～ 29、没药 29 ～ 33、乳香 13 ～ 14、甘草 7 ～ 9、血竭 12 ～ 14、冰片 8 ～ 11、生地黄 9 ～ 11、血余 9 ～ 11、龙骨 8 ～ 13、交藤 6 ～ 8、地丁 7 ～ 11、荆芥 6 ～ 8、苦楝皮 8 ～ 11；

所述内服药物包含如下重量份的组分：当归 27 ～ 29、紫草 29 ～ 32、降真香 13 ～ 15、黄连 14 ～ 16、黄岑 19 ～ 22、黄芪 9 ～ 11、川朴 16 ～ 19、三七 22 ～ 24、苏木 6 ～ 8、红花 17 ～ 19、地榆 18 ～ 23、马齿苋 7 ～ 11、仙鹤草 7 ～ 10、川芎 15 ～ 17、元胡 6 ～ 9、桔梗 8 ～ 11、白芨 29 ～ 33、没药 24 ～ 28、乳香 22 ～ 26、甘草 5 ～ 7、甘松 9 ～ 12、金银花 7 ～ 9、鱼腥草 6 ～ 9、蒲公英 4 ～ 7、防风 11 ～ 13、穿心莲 10 ～ 12、白芍 18 ～ 23、薄荷 6 ～ 9。

[0007] 在一种实施方式中，本发明所述的药物由外敷药物和内服药物组成，优选地，所述外敷药物包含如下重量份的组分：蛋黄油 110、当归 23、紫草 30、降真香 15、黄连 22、川朴 11、三七 28、苏木 12、红花 23、地榆 20、川芎 16、甘松 8、元胡 12、桔梗 5、白芨 28、没药 31、乳香 14、甘草 8、血竭 13、冰片 10、生地黄 10、血余 10、龙骨 11、交藤 7、地丁 9、荆芥 7、苦楝皮 10；

所述内服药物包含如下重量份的组分：当归 28、紫草 31、降真香 14、黄连 15、黄岑 20、黄芪 10、川朴 18、三七 23、苏木 7、红花 18、地榆 20、马齿苋 10、仙鹤草 8、川芎 16、元胡 8、桔梗 10、白芨 31、没药 26、乳香 24、甘草 6、甘松 11、金银花 8、鱼腥草 8、蒲公英 6、防风 12、穿心莲 11、白芍 21、薄荷 7。

[0008] 在一种实施方式中，本发明所述的药物由外敷药物和内服药物组成，优选地，所述外敷药物还包含 15 ～ 20 重量份的香薷。

[0009] 在一种实施方式中，本发明所述的药物由外敷药物和内服药物组成，更加优选地，所述内服药物还包含 10 ～ 15 重量份的菌陈。

[0010] 本发明的另一方面涉及一种外敷软膏剂，其制作方法为：

步骤一：取生鸡蛋煮熟，弃去蛋白，将蛋黄放入锅内，碾碎，用火干煎并翻炒，30 ～ 40 分钟后，关火冷却，挤压过滤，将分离出的油液保留备用；

步骤二：按比例取当归、紫草、降真香、黄连、川朴、三七、苏木、红花、地榆、川芎、甘松、元胡、桔梗、白芨、甘草、生地黄、血余、龙骨、交藤、地丁、荆芥、苦楝皮、香薷混合，用 40% ～ 60% 的乙醇浸泡 1 ～ 2 个小时，乙醇用量为药材体积的 2 ～ 3 倍；然后，置于多功能提取罐中，加入 40% ～ 60% 的乙醇，乙醇总加入量为药材体积的 6 ～ 8 倍，加热至 85℃，保持该温度 2 ～ 3 个小时，自下料口放出药液，将所得药液在外加热式三效浓缩罐中浓缩成相对密度为 1.25 ～ 1.35 浸膏，冷却备用；

步骤三：将没药、乳香、血竭和冰片碾碎成细粉，过 150 ～ 200 目筛；

步骤四：将蛋黄油和第二步中所得浸膏，加入 30 ～ 40 份蜂蜡，混合加热至 80 ～ 100℃，待蜂蜡全溶，混合均匀后，冷却至 50 ～ 70℃，加入第三步所得的细粉，搅拌混合均匀，冷却至室温，装入软膏盒分装备用。

[0011] 本发明的另一方面涉及一种内服口服液，其制作方法为：

步骤一：按比例取当归、紫草、降真香、黄连、黄岑、黄芪、川朴、桔梗混合，放在瓦罐中，加入1800～2800份的水，浸泡30～40分钟，加热至沸腾，保持20～25分钟，在20～25分钟内搅拌3次；

步骤二：按比例取三七、地榆、川芎、白芨、甘草、甘松、白芍，继续加热至沸腾，保持15～20分钟，在15～20分钟内搅拌3次；

步骤三：按比例加入剩余药材，加热至沸腾，保持25～30分钟，在25～30分钟内搅拌3次，过滤取药液。

[0012] 本发明的另一方面涉及一种内服胶囊，其制作方法为：

步骤一：按比例取当归、紫草、降真香、黄连、黄岑、黄芪、川朴、桔梗混合，加入900～1300份的水，浸泡2～3小时，放入多功能提取罐，加热至90～100℃，保持3～4小时，在下料口取出药液；再次用同样的步骤提取第二次，将所得药液合并，三效浓缩罐中浓缩至温度为60℃时相对密度为1.25～1.30的膏体；将所得膏体在60℃～80℃时减压真空干燥，得干膏粉；

步骤二：按比例取三七、苏木、红花、地榆、马齿苋、仙鹤草、川芎、元胡、白芨、甘草、甘松、白芍、金银花、鱼腥草、防风、穿心莲、白芍、菌陈混合，用50%～70%的乙醇浸泡1～2个小时，乙醇用量为药材体积的2～3倍；然后，置于多功能提取罐中，加入50%～70%的乙醇，乙醇总加入量为药材体积的6～8倍，加热至85℃，保持该温度2～3个小时，自下料口放出药液，将所得药液在外加热式三效浓缩罐中浓缩成温度在50～60℃时相对密度为1.30～1.35膏体；将所得膏体在60℃～80℃时减压真空干燥，得干膏粉；

步骤三：按比例取没药、乳香、蒲公英、薄荷混合，利用外能粉碎机粉碎成药物粉末，过200目筛。

[0013] 步骤四：将步骤一、二所得的干膏粉和步骤三中的药物粉末混合成混合物，加入相对于100重量份上述混合物的以下物质：5～10份滑石粉，3～4份羧甲基淀粉钠，5～7份二氧化硅，加入80～120份浓度为60%～80%的乙醇，干燥制粒，随后加入1～2份硬脂酸镁，装入胶囊即可。

[0014] 本发明的另一方面涉及一种内服蜜丸，其制作方法为：

步骤一：按比例取当归、紫草、降真香、黄连、黄岑、黄芪、川朴、桔梗混合，加入900～1300份的水，浸泡2～3小时，放入多功能提取罐，加热至90～100℃，保持3～4小时，在下料口取出药液；再次用同样的步骤提取第二次，将所得药液合并，三效浓缩罐中浓缩至温度为60℃时相对密度为1.25～1.30的膏体；

步骤二：按比例取三七、苏木、红花、地榆、马齿苋、仙鹤草、川芎、元胡、白芨、甘草、甘松、白芍、金银花、鱼腥草、防风、穿心莲、白芍、菌陈混合，用50%～70%的乙醇浸泡1～2个小时，乙醇用量为药材体积的2～3倍；然后，置于多功能提取罐中，加入50%～70%的乙醇，乙醇总加入量为药材体积的6～8倍，加热至85℃，保持该温度2～3个小时，自下料口放出药液，将所得药液在外加热式三效浓缩罐中浓缩成温度在50～60℃时相对密度为1.30～1.35膏体，将所得膏体在60℃～80℃时减压真空干燥，得干膏粉；

步骤三：按比例取没药、乳香、蒲公英、薄荷混合，利用外能粉碎机粉碎成药物粉末，过200目筛。

[0015] 步骤四：将步骤一所得膏体、步骤二的干膏粉和步骤三的药物粉末混合，加入相对于混合物中药 1.5 倍的蜂蜜，所述蜂蜜为炼蜜温度在 118 ～ 122℃的老蜜，调药制成丸剂即可。

[0016] 参考一下详细说明更易于理解本申请的上述以及其他特征、方面和优点。

具体实施方式

[0017] 参考本发明的具体实施方式的详述以及实施例可更容易地理解本发明的内容。本发明所述的药物含有大量组分，这些组分具有以下的性质。

[0018] 蛋黄油：鸡蛋蛋黄中煎取出来的油，其含有维生素 A、D、E，胆固醇、卵黄素、胆碱、海尔满、吡啶类衍生物等。可用于治疗水火烫伤、湿疹、皮炎、冻疮以及各种炎症。具有清热润肤、消炎止痛、收敛生肌和保护疮面等功效。

[0019] 当归：伞形科，当归根可入药。药性甘，辛，温。其化学成分含挥发油、有机酸和尿嘌呤等成分，有机酸包括阿魏酸、烟酸、丁二酸、香草酸、二十四烷酸、棕榈酸等。可用于治疗跌扑损伤，经闭，痛经，症瘕结聚，崩漏，肌肤麻木，赤痢后重，痈疽疮疡等。具有补血活血，调经止痛，润燥滑肠、抗炎镇痛、免疫等功效。

[0020] 紫草，紫草科，紫草根茎入药，药性苦，寒。其化学成分含去氧紫草素，β，β－二甲基丙烯酰紫草素，乙酰紫草素，紫草素，β－谷甾醇，β－乙酰氧基戊酰紫草素等。紫草可用于凉血，活血，透疹，解毒。可用于血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透，疮疡，湿疹，水火烫伤。其有抗菌、抗炎等功效。

[0021] 降真香：豆科亚种，降香的树干和根的干燥心材入药。药性辛，温，无毒。其化学成分含挥发油，油中有 β－没药烯、反式－β－金合欢烯、反式－苦橙油醇等。可用于刀伤、出血、痈疽恶毒等症。其具有理气、镇痛、止血、抗菌、消炎、生肌等功效。

[0022] 黄连：属毛茛科、黄连干燥根茎入药。药性苦，寒。其化学成分含小檗碱、黄连碱、表小檗碱、小檗红碱 、掌叶防己碱、非洲防己碱、药根碱、甲基黄连碱、木兰花碱、阿魏酸、黄柏酮、黄柏内酯等。其可用于清热燥湿，泻火解毒，湿热痞满，黄疸，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮，湿疹，湿疮等。其有抗菌、抗病毒、抗炎、解热、降血脂、抗氧化、抗溃疡等作用。

[0023] 川朴：木兰科植物，厚朴的树皮、根皮和枝皮入药。药性苦，辛，性温。其化学成分含厚朴酚、厚朴新酚、厚朴醛、厚朴木脂体、台湾檫木醛、台湾檫木酚、厚朴三酚、木兰箭毒碱、柳叶木兰碱、β－桉叶醇、荜澄茄醇、、对－聚伞花素、1,4-桉叶素、丁香烯、芳樟醇、α－松油烯、 α－葎草烯、4-松油烯醇、蓝桉醇、α－柠檬烯、芥子醛、丁香树脂酚、松脂酚二甲醚、β－桉叶醇、α－桉叶醇等。可用于治疗：食积气滞；腹胀便秘；湿阻中焦，脘痞吐泻；痰壅气逆；胸满喘咳等。具有行气消积；燥湿除满；降逆平喘等、抗菌等功效。

[0024] 三七：五加科植物，三七根部入药。药性甘，微苦，温。其化学成分含皂苷、黄酮、挥发油、氨基酸、多糖、淀粉、蛋白质等。可用于治疗跌扑瘀肿，胸痹绞痛，癥瘕，血瘀经闭，痛经，产后瘀阴腹痛，疮痈肿痛等。具有止血、定痛等功效。

[0025] 苏木：苏木科植物，干燥心材入药。药性甘，咸，平，无毒。其化学成分含 1-羟基-7-甲氧基呫吨酮、2-羟基呫吨酮、1,5-二羟基呫吨酮、1,7-二羟基呫吨酮、大黄酚、木栓酮、熊果酸、β－谷甾醇棕榈酸酯、豆甾醇、β－谷甾醇等。可用于治疗跌打损伤，破伤风痛经，产后瘀阻，心腹痛，产后血晕，痈肿等。其具有祛痰、消肿止痛、活血祛瘀、散风等功效。

[0026] 红花：菊科植物，红花的干燥花入药，药性辛，温。其化学成分包括红色的和黄色的色素、多酚类、十八种挥发性成分、多种糖类和酸类物质。可用于治经闭、痛经、恶露不行、胸痹心痛、瘀滞腹痛、胸胁刺痛、跌打损伤、疮疡肿痛。具有活血通经，散瘀止痛等功效。

[0027] 地榆：蔷薇科植物，地榆根部入药，药性苦，酸，寒，无毒。其化学成分含大黄酚、大黄素甲醚、β-谷甾醇、阿魏酸、熊果酸、没食子酸、山柰酚、儿茶素等。可用于治疗吐血衄血，尿血便血，崩漏，肠风血痢，痔漏，赤白带下，痈疮肿痛，湿疹阴痒，水火烫伤，虫蛇咬伤等。具有凉血，止血，清热解毒，消肿，敛疮、抗炎、抗菌等功效。

[0028] 川芎：伞形科植物，川芎根茎入药。药性辛，温。其化学成分含挥发油、阿魏酸、4-羟基-3-丁基酞内酯、川芎酞内酯、藁本内酯、川芎嗪、川芎酚、瑟丹酸等。常用于月经不调、经闭痛经、症瘕腹痛、胸胁刺痛、跌扑肿痛、头痛、风湿痹痛等。具有活血行气，祛风止痛、抗菌、镇静、补血等功效。

[0029] 甘松：败酱科植物，甘松干燥根茎入药，药性辛，甘，温。其化学成分含半半萜类成分，如缬草萜酮，甘松新酮，9-马兜铃烯，甘松酮，9-马兜铃烯醇，1,2,9,10—四去氢马兜铃烷，青木香酮，广藿香醇，β-广藿香烯，甘松香醇，β-橄榄烯，甘松环氧化物等，还含三萜成分，如齐墩果酸，熊果酸，乙基-β-D-吡喃葡萄糖苷，β-谷甾醇等。主治脘腹胀满，食欲不振，呕吐，牙痛，脚气肿毒等。具有行气散寒，缓急止痛，收湿拔毒等功效。

[0030] 元胡：罂粟科，元胡块茎入药。药性辛，苦，温。其化学成分含d-紫堇碱、原鸦片碱、l-四氢非洲防己碱、l-四氢黄连碱、紫堇鳞茎碱、β-高白屈菜碱、黄连碱、去氢紫堇碱、紫堇单酚碱、去氢延胡索胺、非洲防己碱，以及d-海罂粟碱等。可用于治疗血瘀之痛，痛经，经闭，症瘕，产后瘀阻，跌扑损伤，疝气作痛等。具有理气，止痛，活血散瘀、抗溃疡、抑菌等功效。

[0031] 桔梗：桔梗科植物桔梗的干燥根入药。药性苦、辛，平。其化学成分含三萜皂甙，如桔梗皂甙，去芹菜糖基桔梗皂甙、远志皂甙、桔梗皂甙元、远志酸、桔梗酸、远志酸、白桦脂醇、α-菠菜菜甾醇、α-菠菜甾醇-β-D-葡萄糖甙等。可用于治疗咳嗽痰多，打伤淤血咳痰不爽，胸膈痞闷，咽喉肿痛，肺痈咳吐脓血等。具有祛痰镇咳、降血糖、抗炎、解热镇痛等功效。

[0032] 白芨：兰科植物白芨，其根茎入药。药性苦、甘、涩，微寒。其化学成分包含联苄类化合物、二氧菲类化合物、联菲类化合物、双菲醚类化合物、二氢菲并吡喃类化合物、菲类糖甙化合物、苄类化合物、蒽类化合物、酸类成分等。可用于治疗心气疼痛、疔疮、肿疮、跌打骨折、刀伤、肺、胃出血、烫伤等。其有收敛止血，消肿生肌等功效。

[0033] 没药：橄榄科植物，没药树的干燥树脂。药性苦、辛、平。其化学成分含树脂，如α及β罕没药酸，α、β及γ没药酸，没药尼酸，α-及β罕没药酚，没药萜醇等。挥发油丁香油酚，间甲苯酚，枯醛，蒎烯，柠檬烯，桂皮醛，罕没药烯等；并含多种呋喃倍半萜类化合物，如8α-甲氧基莪术呋喃二烯，8α-乙酸基莪术呋喃二烯，莪术呋喃烯，乌药根烯，呋喃桉-1,3-二烯，莪术呋喃二烯等。可用于治疗痈疽肿痛，心腹、筋骨诸痛，损伤血等。具有敛疮生肌、活血散瘀、镇痛、收敛、消炎、抑菌等功效。

[0034] 乳香：橄榄科植物，乳香树树脂入药。药性辛，苦，温。其化学成分含游离α-乳香脂酸、β-乳香脂酸、结合乳香脂酸、乳香树脂烃、树胶为阿糖酸的钙盐和镁盐、西黄芪胶黏素、蒎烯、莰烯、香桧烯、橄香烯、消旋-柠檬烯、α-水芹烯、β-水芹烯、1-壬烯、己醛、庚

醛、辛醛、壬醛、2,4-壬二烯醛、间-异丙基甲苯、桉树脑、异辛醇、1-辛醇、1-壬醇、乙酸正辛酯、乙酸龙脑酯等。可用于治疗痈肿疮疡，跌打损伤，胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，症瘕腹痛，风湿痹痛，筋脉拘挛等。具有活血行气止痛，消肿生肌等功效。

[0035] 甘草：豆科植物，甘草的根及根茎入药。药性甘，平。其化学成分含 β-粘霉烯醇，α 香树脂醇，白桦脂酸，依弗酸，野甘草种酸，，野甘草属醇，野甘草种醇，苯并噁唑啉酮，5,7-二羟基-3′，4′，6,8-四甲氧基黄酮，木犀草素，6,8-二-C-葡萄糖基芹菜素，蒙花甙，牡荆素，异牡荆素，高山黄芩甙，高山黄芩甙甲指，木犀草素-7-葡萄糖甙，刺槐素，对-香豆酸，野甘草醇，阿迈灵，野甘草醇，野甘草属二醇，叶含野甘草醇，β-粘霉烯醇，6-甲氧基苯并噁唑啉酮，刺槐素，β-谷甾醇，二十六醇，D-甘露醇，6-甲氧基苯并噁唑啉酮，依弗酸，白桦脂酸及薏苡素等。可用于治疗痈疮肿痛，肌瘦面黄，心悸气短，腹痛便溏，四肢挛急疼痛，脏躁，咽喉肿痛等。具有益气补中，缓急止痛，泻火解毒，调和诸药等功效。

[0036] 血竭：棕榈科植物麒麟竭果实及树干中的树脂。药性甘，咸，平。其化学成分含血竭红素，血竭素，去甲基血竭红素，去甲基血竭素，2,4-二羟基-5-甲基-6-甲氧基耳酮，血竭黄烷，血竭二氧杂庚醚，海松酸，异海松酸，松香酸，去氢松香酸，山达海松酸等。可用于治疗跌打损伤，心腹瘀痛，外伤出血，疮疡不敛等。具有活血定痛，化瘀止血，生肌敛疮的功效等功效。

[0037] 冰片：采用天然冰片，由樟科植物枝叶提取而成。药性，辛，苦，凉。主要成分为龙脑。可用于治疗烫、烧伤，惊厥，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，胸痹心痛，目赤，口疮，咽喉肿痛，耳道流脓等。具有消热消肿，止痛，开窍醒神等功效。

[0038] 生地黄：玄科植物，地黄的块根入药。药性甘，苦，凉。可用于治疗阴虚发热，消渴，吐血，衄血，血崩，月经不调，胎动不安，阴伤便秘等。具有清热生津，滋阴养血等功效。

[0039] 血余：即人的头发入药。药性苦，微温。其化学成分含一种优角蛋白，水分，灰分，脂肪，黑色素等。可用于治疗多种出血病症，溃疡不敛等症。具有止血消淤，利尿生肌等功效。

[0040] 龙骨：古代哺乳动物的骨骼化石入药。药性甘，涩，平。其化学成分含碳酸钙，磷酸钙，铁，钾，钠，硫酸根等。可用于敛疮口，治疗遗，滑精，肠风下血，泻痢，吐衄血，崩带等。具有敛气逐湿，止盗汗，安神和涩精止血等功效。

[0041] 交藤：蓼科植物，何首乌干燥块根入药。药性苦、甘、涩，温。其化学成分含卵磷脂、大黄素、大黄酚、大黄酸、大黄素甲醚等。可用于治疗精血亏虚，头晕眼花，须发早白，腰酸脚软，遗精，崩带等症。具有补肝肾，益精血，乌须发，生发，强筋骨之功效。

[0042] 地丁：罂粟科植物，地丁草的干燥全草入药。药性苦，辛，寒。其化学成分含甙类、黄酮类、蜡酸，不饱和酸，酯类，醇类，烃类等。可用于治疗疔疮，化脓性感染，高热烦躁，流感，传染性肝炎，肾炎，瘰疬，腮腺炎等。具有消炎，清热，解毒等功效。

[0043] 荆芥：唇形科植物，荆芥干燥地上部分入药。药性辛，苦，微温。其化学成分含胡薄荷酮，薄荷酮，异薄荷酮，异胡薄荷酮，乙基戊基醚，3-甲基环戊酮，3-甲基环己酮，苯甲醛，3-辛酮，3-辛醇，聚伞花素，柠檬烯，新薄荷醇，薄荷醇，辣薄荷酮，辣薄荷烯酮，葎草烯，丁香烯，β-蒎烯，乙烯基二甲苯，桉叶素，葛缕酮，二氢荀缕酮，马革命草烯酮，香叶木素，木犀草素，咖啡酸，迷迭香酸，迷迭香酸单甲酯等。可用于治疗头痛，咳嗽，咽喉肿痛，麻疹，痈肿，疮疥，衄血，吐血等症。具有祛风，解表，透疹，止血等功效。

[0044] 苦楝皮：楝科植物，川楝的干燥树皮和根皮入药。药性苦，寒。其化学成分含苦楝素、印楝波灵 A、印楝波灵 B、楝皮酮、葛杜宁、苦里酮、苦内酯、苦洛内酯，以及苦楝子三醇等。可用于治蛔虫，蛲虫，风疹，疥癣等。具有清热，燥湿，杀虫等功效。

[0045] 黄岑：唇形科植物，黄芩根入药。药性苦，寒。其化学成分含黄酮苷元及苷、挥发油类、 萜类、14 种氨基酸、苯乙醇苷、葡萄糖、蔗糖、β－谷甾醇、苯甲酸、油菜甾醇、黄芩细淀粉、淀粉等。可用于治疗疔疮，排脓，黄疸，热淋，吐、衄、崩、漏，目赤肿痛，胎动不安，痈肿疔疮等。具有抗炎、清热燥湿、泻火解毒、止血、安胎等功效。

[0046] 黄芪：豆科植物黄芪根部入药，药性。其化学成分含黄芪苷、胡萝卜苷、β－谷甾醇、棕榈酸、膜荚黄芪皂苷、熊竹素、胆碱、甜菜碱、叶酸、毛蕊异黄酮、刺芒柄花素、 L-3- 羟基 -9- 甲氧基紫檀烷、蒙古黄芪、大豆皂苷Ⅰ、黄芪苷Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、胡萝卜苷、多糖类、黄酮类、异黄酮苷类及黄烷苷类化合物、21 种氨基酸、亚油酸、亚麻酸、甜菜碱等。可用于治疗痈疽难溃，久溃不敛，血虚萎黄，内热消渴，慢性肾炎，虚乏力，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗等。具有生肌收口、补气固表、抗菌、止汗脱毒、生肌、利尿、增强机体免疫功能、退肿等功效。

[0047] 马齿苋：马齿苋科植物，马齿苋干燥地上部分入药。药性酸，寒。其化学成分含去甲肾上腺素、多量钾盐、多巴、多巴胺、甜菜素、异甜菜素、甜菜式、异甜菜甙、草酸、苹果酸、柠檬酸、谷氨酸、天冬氨酸、丙氨酸、葡萄糖、果糖、蔗糖等。可用于治疗热毒血痢，痈肿疔疮，湿疹，丹毒，蛇虫咬伤，便血，痔血，崩漏下血等。具有清热解毒、消肿、止血凉血等功效。

[0048] 仙鹤草：蔷薇科植物，龙芽草地上部分入药。药性苦，凉。其化学成分含仙鹤草酚、仙鹤草内酯、木犀草甙、仙鹤草甲、乙、丙素、赛仙鹤草酚、鞣质、甾醇、皂甙及挥发油等。可用于治疗咯血、衄血、崩漏、血痢、疟疾、消渴病等。具有收敛止血，解毒疗疮、抗炎等功效。

[0049] 金银花：忍冬科植物，金银花干燥花蕾入药。药性甘，寒。其化学成分含有木犀草素、肌醇、皂甙、绿原酸、异绿原酸， 、芳樟醇、蒎烯、1- 己烯、顺 -3- 己烯醇 -1、顺 -2- 甲基 -2- 乙烯基 -5、反 -2- 甲基 -2- 乙烯基 -5、香叶醇、α－松油醇、苯甲醇、苯乙醇、香荆芥酚、丁香油酚等。可用于治疗肠炎、菌痢、麻疹、肺炎、乙脑、流脑、急性乳腺炎、败血症、阑尾炎、皮肤感染、皮肤瘙痒、痈疽疔疮、丹毒、腮腺炎、化脓性扁桃体炎等。具有抗炎、清热解毒、部虚疗风等功效。

[0050] 鱼腥草：三白草科植物，蕺菜干燥地上部分入药。药性辛，寒凉。其化学成分含癸酰乙醛，月桂醛，α－蒎烯和芳樟醇，甲基正壬基甲酮，樟烯，月桂烯，柠檬烯，乙酸龙脑酯，丁香烯，阿福甙，金丝桃甙，芸香甙，绿原酸，β－谷甾醇，硬脂酸，油酸，亚油酸，槲皮甙，异槲皮甙等。可用于治疗肺痈吐脓，痰热喘咳，热痢，痈肿疮毒，热淋等。具有清热解毒、消肿疔疮、利尿除湿、清热止痢、健胃消等功效。

[0051] 蒲公英：菊科植物，蒲公英的干燥全草入药。药性甘，微苦，寒。其化学成分含蒲公英甾醇、蒲公英素、蒲公英苦素、菊糖、果胶、胆碱蒲公英甾醇、β－香树脂醇、豆甾醇、β－谷甾醇、胆碱、有机酸、果糖、蔗糖、葡萄糖、葡萄糖甙、叶黄素、蝴蝶梅黄索、叶绿醌等。可用于治疗疮肿毒，乳痈，咽痛，肺痈，湿热黄疸，热淋涩痛等。具有清热解毒；消痈散结等功效。

[0052] 防风：伞形科植物，防风根入药。药性辛，甘，微温。其化学成分含：防风色酮醇，，亥茅酚，亥茅酚甙，升麻素，升麻素甙，，香柑内酯，补骨脂素，欧前胡内酯，珊瑚菜素，德尔妥因，花椒毒素，川白芷内酯，东莨菪素，人参炔醇，镰叶芹二醇，辛醛， β－甜没药烯，壬醛，

7- 辛烯 -4- 醇，已醛，侧析烯和 β - 桉叶醇，β - 谷甾醇，甘露醇，香草酸等。可用于治疗风寒湿痹、肠风便血、皮肤病、破伤风、疮痈等。具有祛风解表，胜湿止痛，止痉、止血等功效。

[0053] 穿心莲：爵床科植物，穿心莲的干燥地上部分入药。药性苦，寒。其化学成分含去氧穿心莲内酯、穿心莲内酯、、新穿心莲内酯、高穿心莲内酯、潘尼内酯、穿心莲烷、穿心莲酮、穿心莲甾醇、5- 羟基 -7,8,2',3'- 四甲氧基黄酮、α - 谷甾醇、甾醇皂甙、糖类、缩合鞣质、倍半萜内酯化合物等。可用于治疗痢，胃肠炎，感冒，流脑，气管炎，肺炎，百日咳，肺结核，肺脓疡，胆囊炎，高血压，鼻衄，口咽肿痛，疮疖痈肿，水火烫伤等。具有清热解毒、消炎、消肿止痛等功效。

[0054] 白芍：毛茛科植物，芍药的干燥根入药。药性苦，酸，微寒。其化学成分含芍药甙、牡丹酚、芍药花甙、芍药内脂甙、氧化芍药甙、苯甲酰芍药甙、芍药吉酮、羟基芍药甙、苯甲酸、β - 谷甾醇、倍单宁、没食子酸、漠食子酸乙酯、儿茶素、挥发油、脂肪油、树脂、糖、淀粉、粘液质、蛋白质和三萜类物质等。可用于治疗血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，胁痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕等。具有养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳等功效。

[0055] 薄荷：唇形科植物，薄荷的全草或叶入药。药性辛，凉。其化学成分含薄荷醇、薄荷酮、乙酸薄荷脂、莰烯、柠檬烯、异薄荷酮、蒎烯、薄荷烯酮、树脂、鞣质、迷迭香酸等。可用于治疗风热表证，咽喉肿痛，麻疹不透，陷疹瘙痒，肝郁胁痛等。具有散风热，清头目，利咽喉，透疹，解郁等功效。

[0056] 香薷：唇形科植物，香薷带根全草或地上部分入药。药性辛，微温。其化学成分含香薷酮、苯乙酮、6- 甲基三十三烷、13- 环已基二十六烷、β - 谷甾醇、棕榈酸、亚油酸、亚麻酸、熊果酸、5- 羟基 -6,7- 二甲氧基黄酮、5- 羟基 -7,8- 二甲氧基黄酮、5,7- 二羟基 -4- 甲氧基双氢黄酮等。可用于治疗外感风寒，内伤于湿，恶寒发热，头痛无汗，脘腹疼痛，呕吐腹泻，小便不利，水肿，瘀血肿痛，痈疮疔疖等。具有发汗解暑，和中结湿，行水消肿，抗菌杀菌等功效。

[0057] 茵陈：菊科，茵陈地上部分入药。药性微苦，微辛，寒。其化学成份含挥发油，丁醛，桉叶素，葛缕酮，侧柏酮，侧柏醇，丁香油酚，异丁香油酚，糠醇，对 - 聚伞花素，月桂烯，α、β - 蒎烯，毕澄茄烯，乙酸牻牛儿醇酯，α - 姜黄烯，茵陈二炔，茵陈二炔酮，绿原酸，对 - 羟基苯乙酮，大黄素等。可用于清热解毒，祛瘀凉血，利湿退黄等。其具有抗菌、消炎、著利胆作用，并有解热、保肝、抗肿瘤和降压等作用。

[0058] 本发明的第一方面涉及一种治疗烧伤的药物，所述药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含以下组分：蛋黄油、当归、紫草、降真香、黄连、川朴、三七、苏木、红花、地榆、川芎、甘松、元胡、桔梗、白芨、没药、乳香、甘草、血竭、冰片、生地黄、血余、龙骨、交藤、地丁、荆芥、苦楝皮；

所述内服药物包含以下组分：当归、紫草、降真香、黄连、黄岑、黄芪、川朴、三七、苏木、红花、地榆、马齿苋、仙鹤草、川芎、元胡、桔梗、白芨、没药、乳香、甘草、甘松、金银花、鱼腥草、蒲公英、防风、穿心莲、白芍、薄荷。

[0059] 本发明所述的药物中所包含的组分中，蛋黄油、当归、紫草、降真香、黄连等组分一起具有抗炎、抗菌等功效，三七、苏木、红花、地榆、马齿苋、仙鹤草等组分一起具有止血等功效，元胡、没药、乳香等组分一起具有镇痛等作用，白芨、乳香等组分一起具有祛腐生肌等功效，所述药物中各组分相互作用后，药物组分还可发挥多种功效，相互配合提升药物整体的

消炎镇痛，抗菌止血，去腐生肌之功效，尤其能有效治疗烧伤疤痕，并对一、二度烧伤治疗效果明显，且无毒副作用。所述药物外敷药物采用多个步骤制成软膏剂，所述内服药物均采用独特的步骤分别可制成口服液、胶囊、蜜丸，独特的制药步骤能使得各药物组分在最大程度上发挥功效，外敷药物与内服药物相互配合，内外兼治，从内部修复皮肤炎性组织，并加速外部疤痕皮肤愈合，愈后不易留疤，尤其能提高针对一、二度烧伤的治愈速度。

[0060] 在一种实施方式中，本发明所述的药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含如下重量份的组分：蛋黄油 60 ～ 160、当归 20 ～ 25、紫草 26 ～ 37、降真香 12 ～ 18、黄连 20 ～ 25、川朴 9 ～ 13、三七 25 ～ 32、苏木 10 ～ 14、红花 18 ～ 26、地榆 15 ～ 25、川芎 12 ～ 18、甘松 4 ～ 12、元胡 7 ～ 16、桔梗 3 ～ 6、白芨 25 ～ 30、没药 27 ～ 35、乳香 10 ～ 18、甘草 5 ～ 10、血竭 10 ～ 16、冰片 7 ～ 12、生地黄 8 ～ 12、血余 7 ～ 12、龙骨 6 ～ 15、交藤 5 ～ 9、地丁 6 ～ 12、荆芥 4 ～ 8、苦楝皮 7 ～ 12；

所述内服药物包含如下重量份的组分：当归 25 ～ 30、紫草 27 ～ 35、降真香 12 ～ 15、黄连 13 ～ 17、黄岑 17 ～ 24、黄芪 7 ～ 12、川朴 14 ～ 20、三七 20 ～ 27、苏木 5 ～ 10、红花 15 ～ 20、地榆 15 ～ 25、马齿苋 6 ～ 12、仙鹤草 5 ～ 12、川芎 12 ～ 18、元胡 5 ～ 10、桔梗 7 ～ 12、白芨 27 ～ 35、没药 20 ～ 30、乳香 20 ～ 28、甘草 4 ～ 8、甘松 8 ～ 16、金银花 5 ～ 10、鱼腥草 5 ～ 10、蒲公英 3 ～ 8、防风 10 ～ 15、穿心莲 10 ～ 13、白芍 16 ～ 25、薄荷 5 ～ 10。

[0061] 在一种实施方式中，本发明所述的药物由外敷药物和内服药物组成，所述外敷药物包含如下重量份的组分：蛋黄油 80 ～ 140、当归 22 ～ 24、紫草 28 ～ 34、降真香 14 ～ 16、黄连 21 ～ 23、川朴 10 ～ 12、三七 27 ～ 30、苏木 11 ～ 13、红花 22 ～ 24、地榆 18 ～ 22、川芎 15 ～ 17、甘松 7 ～ 10、元胡 9 ～ 14、桔梗 4 ～ 6、白芨 27 ～ 29、没药 29 ～ 33、乳香 13 ～ 14、甘草 7 ～ 9、血竭 12 ～ 14、冰片 8 ～ 11、生地黄 9 ～ 11、血余 9 ～ 11、龙骨 8 ～ 13、交藤 6 ～ 8、地丁 7 ～ 11、荆芥 6 ～ 8、苦楝皮 8 ～ 11；

所述内服药物包含如下重量份的组分：当归 27 ～ 29、紫草 29 ～ 32、降真香 13 ～ 15、黄连 14 ～ 16、黄岑 19 ～ 22、黄芪 9 ～ 11、川朴 16 ～ 19、三七 22 ～ 24、苏木 6 ～ 8、红花 17 ～ 19、地榆 18 ～ 23、马齿苋 7 ～ 11、仙鹤草 7 ～ 10、川芎 15 ～ 17、元胡 6 ～ 9、桔梗 8 ～ 11、白芨 29 ～ 33、没药 24 ～ 28、乳香 22 ～ 26、甘草 5 ～ 7、甘松 9 ～ 12、金银花 7 ～ 9、鱼腥草 6 ～ 9、蒲公英 4 ～ 7、防风 11 ～ 13、穿心莲 10 ～ 12、白芍 18 ～ 23、薄荷 6 ～ 9。

[0062] 在一种实施方式中，本发明所述的药物由外敷药物和内服药物组成，优选地，所述外敷药物包含如下重量份的组分：蛋黄油 110、当归 23、紫草 30、降真香 15、黄连 22、川朴 11、三七 28、苏木 12、红花 23、地榆 20、川芎 16、甘松 8、元胡 12、桔梗 5、白芨 28、没药 31、乳香 14、甘草 8、血竭 13、冰片 10、生地黄 10、血余 10、龙骨 11、交藤 7、地丁 9、荆芥 7、苦楝皮 10；

所述内服药物包含如下重量份的组分：当归 28、紫草 31、降真香 14、黄连 15、黄岑 20、黄芪 10、川朴 18、三七 23、苏木 7、红花 18、地榆 20、马齿苋 10、仙鹤草 8、川芎 16、元胡 8、桔梗 10、白芨 31、没药 26、乳香 24、甘草 6、甘松 11、金银花 8、鱼腥草 8、蒲公英 6、防风 12、穿心莲 11、白芍 21、薄荷 7。

[0063] 在一种实施方式中，优选地，本发明所述的药物由外敷药物和内服药物组成，优选地，所述外敷药物还包含 15 ～ 20 重量份的香薷。

[0064] 在一种实施方式中，更加优选地，本发明所述的药物由外敷药物和内服药物组成，

最佳的优选方案为，所述内服药物还包含 10 ～ 15 重量份的菌陈。

[0065] 在本发明所述药物的外敷药物中加入香薷，内服药物中加入菌陈之后，药物的抗炎止血功效明显提升，能加快修复炎性组织速度，并提高皮肤愈合速度，愈后不易留疤，尤其是针对一、二度烧伤的治疗效果得到提高。

[0066] 本发明的第二方面涉及一种外敷软膏剂，其制作方法为：

步骤一：取生鸡蛋煮熟，弃去蛋白，将蛋黄放入锅内，碾碎，用火干煎并翻炒，30 ～ 40 分钟后，关火冷却，挤压过滤，将分离出的油液保留备用，需用时按比例取用适量；

步骤二：按比例取当归、紫草、降真香、黄连、川朴、三七、苏木、红花、地榆、川芎、甘松、元胡、桔梗、白芨、甘草、生地黄、血余、龙骨、交藤、地丁、荆芥、苦楝皮、香薷混合，用 40% ～ 60% 的乙醇浸泡 1 ～ 2 个小时，乙醇用量为药材体积的 2 ～ 3 倍；然后，置于多功能提取罐中，加入 40% ～ 60% 的乙醇，乙醇总加入量为药材体积的 6 ～ 8 倍，加热至 85℃，保持该温度 2 ～ 3 个小时，自下料口放出药液，将所得药液在外加热式三效浓缩罐中浓缩成相对密度为 1.25 ～ 1.35 浸膏，冷却备用；

步骤三：按比例取没药、乳香、血竭和冰片碾碎成细粉，过 150 ～ 200 目筛；

步骤四：取蛋黄油、第二步中所得浸膏，加入 30 ～ 40 份蜂蜡，混合加热至 80 ～ 100℃，待蜂蜡全溶，混合均匀后，冷却至 50 ～ 70℃，加入第三步所得的细粉，搅拌混合均匀，冷却至室温，装入软膏盒分装备用。

[0067] 在一种实施方式中，步骤二中所述乙醇的浓度为 50%。

[0068] 本发明所述软膏剂的制备方法中的各步骤均对药物效果有有益影响，采用上述步骤对不同药物组分采用不同的处理方法，对当归等组分采用醇提方法，对蛋黄油和没药等药物组分分步处理，然后最终混合，才能保证各药物组分中有效成分充分溶出，并有效地与其他相关药物组分充分相互作用，提升药物整体的治疗效果。

[0069] 上述外敷软膏剂的使用方法为：在清理好的伤口上，直接外敷上述软膏剂，并用无菌纱布包扎，每天换药一次；对于不方便包扎处，直接涂抹上述软膏剂，并注意按需清理创面，每天涂抹三次。

[0070] 本发明第三方面涉及一种内服口服液，其制作方法为：

步骤一：按比例取当归、紫草、降真香、黄连、黄岑、黄芪、川朴、桔梗混合，放在瓦罐中，加入 1800 ～ 2800 份的水，浸泡 30 ～ 40 分钟，加热至沸腾，保持 20 ～ 25 分钟，在 20 ～ 25 分钟内搅拌 3 次；

步骤二：按比例取三七、地榆、川芎、白芨、甘草、甘松、白芍，继续加热至沸腾，保持 15 ～ 20 分钟，在 15 ～ 20 分钟内搅拌 3 次；

步骤三：按比例加入剩余药材，加热至沸腾，保持 25 ～ 30 分钟，在 25 ～ 30 分钟内搅拌 3 次，过滤取药液。

[0071] 上述口服液制备方法，分布加入不同的药物组分，药物组分的加入时机不同，能保证充分溶出不同的药物组分中的有效成分，并使不同的药物间相互作用时机不同，所得到的口服液药效最佳。

[0072] 成人每次取上述药液 200 ～ 300 毫升饮用，每日两次；儿童每次取上述药液 100 ～ 200 毫升饮用，每日两次。口服液跳过了药物在人体内的崩解和溶出阶段，吸收速度快，药物起效快，且吸收方便。

[0073] 本发明的第四方面涉及一种内服胶囊，其制作方法为：

步骤一：按比例取当归、紫草、降真香、黄连、黄岑、黄芪、川朴、桔梗、茵陈混合，加入900～1300份的水，浸泡2～3小时，放入多功能提取罐，加热至90～100℃，保持3～4小时，在下料口取出药液；再次用同样的步骤提取第二次，将所得药液合并，三效浓缩罐中浓缩至温度为60℃时相对密度为1.25～1.30的膏体；将所得膏体在60℃～80℃时减压真空干燥，得干膏粉；

步骤二：按比例取三七、苏木、红花、地榆、马齿苋、仙鹤草、川芎、元胡、白芨、甘草、甘松、白芍、金银花、鱼腥草、防风、穿心莲、白芍、茵陈混合，用50%～70%的乙醇浸泡1～2个小时，乙醇用量为药材体积的2～3倍；然后，置于多功能提取罐中，加入50%～70%的乙醇，乙醇总加入量为药材体积的6～8倍，加热至85℃，保持该温度2～3个小时，自下料口放出药液，将所得药液在外加热式三效浓缩罐中浓缩成温度在50～60℃时相对密度为1.30～1.35膏体；将所得膏体在60℃～80℃时减压真空干燥，得干膏粉；

步骤三：按比例取没药、乳香、蒲公英、薄荷混合，利用外能粉碎机粉碎成药物粉末，过200目筛。

[0074] 步骤四：将步骤一、二的干膏粉和步骤三中的药物粉末混合成混合物，加入相对于100重量份上述混合物的以下物质：5～10份滑石粉，3～4份羧甲基淀粉钠，5～7份二氧化硅，加入80～120份浓度为60%～80%的乙醇，干燥制粒，随后加入1～2份硬脂酸镁，装入胶囊即可。

[0075] 在一种实施方式中，步骤二中所述的乙醇浓度为60%。

[0076] 上述胶囊制备方法中，对当归等药物采用水提方法，对三七等药物采用醇提方法，对没药等药物采用药物粉末形态，对不同药物组分采用不同的处理方法，最终混合制得的药物治疗效果最佳。

[0077] 成人每次取上述胶囊2～4粒服用，每日三次；儿童每次取上述胶囊1～3粒服用，每日三次。所制备胶囊工艺能有效发挥各组分功效，保持部分药物化学成分稳定，保质期长。

[0078] 本发明的另一方面涉及一种内服蜜丸，其制作方法为：

步骤一：按比例取当归、紫草、降真香、黄连、黄岑、黄芪、川朴、桔梗混合，加入900～1300份的水，浸泡2～3小时，放入多功能提取罐，加热至90～100℃，保持3～4小时，在下料口取出药液；再次用同样的步骤提取第二次，将所得药液合并，三效浓缩罐中浓缩至温度为60℃时相对密度为1.25～1.30的膏体；

步骤二：按比例取三七、苏木、红花、地榆、马齿苋、仙鹤草、川芎、元胡、白芨、甘草、甘松、白芍、金银花、鱼腥草、防风、穿心莲、白芍、茵陈混合，用50%～70%的乙醇浸泡1～2个小时，乙醇用量为药材体积的2～3倍；然后，置于多功能提取罐中，加入50%～70%的乙醇，乙醇总加入量为药材体积的6～8倍，加热至85℃，保持该温度2～3个小时，自下料口放出药液，将所得药液在外加热式三效浓缩罐中浓缩成温度在50～60℃时相对密度为1.30～1.35膏体，将所得膏体在60℃～80℃时减压真空干燥，得干膏粉；

步骤三：按比例取没药、乳香、蒲公英、薄荷混合，利用外能粉碎机粉碎成药物粉末，过200目筛。

[0079] 步骤四：将步骤一所得膏体、步骤二所得干膏粉和步骤三所得药物粉末混合，加入

相对于混合物中药 1.5 倍的蜂蜜，所述蜂蜜为炼蜜温度在 118 ～ 122℃的老蜜，调药制成丸剂即可。

[0080] 在一种实施方式中，步骤二中所述的乙醇浓度为 60%。

[0081] 在上述蜜丸的制备方法中，对当归等药物采用水提方法，对三七等药物采用醇提方法，对没药等药物直接采用药物粉末，能在最大程度提取出各药物组分中有效成分，用老蜜制成丸剂，所得药物疗效最佳。

[0082] 成人每次取上述蜜丸 3 ～ 5 粒，每日三次服用；儿童每次取上述蜜丸 1 ～ 2 粒服用，每日三次。

[0083] 采用本发明所述的药物，患者同时使用所述外敷药物和内服药物，共治愈一、二度烧伤患者 110 例，年龄为 1 ～ 60 岁之间，其中男性 61 人，女性 49 人。

[0084] 下面通过实施例和对比例对本发明进行具体描述，有必要在此指出的是，以下实施例只用于对本发明作进一步说明，不能理解为对本发明保护范围的限制，该领域的专业技术人员根据上述本发明的内容做出的一些非本质的改进和调整，仍属于本发明的保护范围。

[0085] 实施例 1

按如下步骤制备本发明所述药物中的外敷软膏剂：

步骤一：取 150 个生鸡蛋煮熟，弃去蛋白，将蛋黄放入锅内，碾碎，用火干煎并翻炒，40 分钟后，关火冷却，挤压过滤，分离出蛋黄油，取其中 110g 使用；

步骤二：取当归 23g、紫草 30g、降真香 15g、黄连 22g、川朴 11g、三七 28g、苏木 12g、红花 23g、地榆 20g、川芎 16g、甘松 8g、元胡 12g、桔梗 5g、白芨 28g、甘草 8g、生地黄 10g、血余 10g、龙骨 11g、交藤 7g、地丁 9g、荆芥 7g、苦楝皮 10g、香薷 17g 混合，用 50% 的乙醇浸泡 1.5 个小时，乙醇用量为药材体积的 3 倍；然后，置于多功能提取罐中，加入 50% 的乙醇，乙醇总加入量为药材体积的 7 倍，加热至 85℃，保持该温度 2.5 个小时，自下料口放出药液，将所得药液在外加热式三效浓缩罐中浓缩成相对密度为 1.30 浸膏，冷却备用；

步骤三：取没药 31g、乳香 14g、血竭 13g 和冰片 10g 碾碎成细粉，过 200 目筛；

步骤四：取蛋黄油 110g、第二步中所得浸膏，加入 35g 份蜂蜡，混合加热至 100℃，待蜂蜡全溶，混合均匀后，冷却至 60℃，加入第三步所得的细粉，搅拌混合均匀，冷却至室温，装入软膏盒，即制备成软膏剂。

[0086] 在清理好的伤口上，直接外敷上述软膏剂，并用无菌纱布包扎，每天换药一次；对于不方便包扎处，直接涂抹上述软膏剂，并注意按需清理创面，每天涂抹三次。

[0087] 按如下步骤制备本发明所述药物中的内服口服液：

步骤一：取当归 28g、紫草 31g、降真香 14g、黄连 15g、黄岑 20g、黄芪 10g、川朴 18g、桔梗 10g，混合，放在瓦罐中，加入 2000 份的水，浸泡 35 分钟，加热至沸腾，保持 22 分钟，在 22 分钟内搅拌 3 次；

步骤二：取三七 23g、地榆 20g、川芎 16g、白芨 31g、甘草 6g、甘松 11g、白芍 21g，菌陈 13g，继续加热至沸腾，保持 17 分钟，在 17 分钟内搅拌 3 次；

步骤三：取苏木 7g、红花 18g、马齿苋 10g、仙鹤草 8g、元胡 8g、没药 26g、乳香 24g、金银花 8g、鱼腥草 8g、蒲公英 6g、防风 12g、穿心莲 11g、薄荷 7g，加热至沸腾，保持 27 分钟，在 27 分钟内搅拌 3 次，过滤取药液。

[0088] 成人每次取上述药液 200 ～ 300 毫升饮用，每日两次；儿童每次取上述药液 100 ～ 200 毫升饮用。

[0089] 采用上述方法制备的外敷软膏剂配合内服口服液的方法共治疗一、二度烧伤患者 45 例，其中男性患者 25 例，女性患者 20 例，患者年龄在 1 ～ 55 岁之间。其中一度烧伤患者 30 例，治愈时间为 2.5 ～ 3.0 天；二度烧伤患者 15 例，治愈时间为 5 ～ 15 天，治愈所需时间短，治愈后没有疤痕或疤痕面积小，为本发明最佳优选方案。

[0090] 实施例 2

采用实施例 1 中的方法制备外敷软膏剂和内服药物，但是，所述外敷软膏剂中不加入香薷，所述内服口服液中不加入菌陈，采用此方法共治疗一、二度烧伤患者 6 例，其中男性患者 3 例，女性患者 3 例，患者年龄在 10 ～ 45 岁之间。其中一度烧伤患者 3 例，二度烧伤患者 3 例。其中一度烧伤患者治愈时间为 3.0 ～ 3.5 天，二度烧伤患者治愈时间为 6 ～ 16 天。

[0091] 实施例 2 与实施例 1 相比，药物组分中外敷药物组分没有加入香薷，药物组分中内服药物没有加入菌陈，可有效的快速治愈一、二度烧伤，但是治疗速度比实施例 1 略低，治愈后没有疤痕或疤痕面积小。

[0092] 实施例 3

取本发明所述药物组分，各组分重量份数与优选方案不同，具体实施例如下所述。

[0093] 按如下步骤制备本发明所述药物中的外敷软膏剂：

步骤一：取 100 个生鸡蛋煮熟，弃去蛋白，将蛋黄放入锅内，碾碎，用火干煎并翻炒，40 分钟后，关火冷却，挤压过滤，分离出的蛋黄油，取 60g 使用。

[0094] 步骤二：取当归 20g、紫草 26g、降真香 12g、黄连 20g、川朴 12g、三七 25g、苏木 10g、红花 18g、地榆 15g、川芎 12g、甘松 4g、元胡 7g、桔梗 3g、白芨 25g、甘草 5g、生地黄 8g、血余 7g、龙骨 6g、交藤 5g、地丁 6g、荆芥 4g、苦楝皮 7g、香薷 15g 混合，用 40% 的乙醇浸泡 2 个小时，乙醇用量为药材体积的 3 倍；然后，置于多功能提取罐中，加入 40% 的乙醇，乙醇总加入量为药材体积的 7 倍，加热至 85℃，保持该温度 3 个小时，自下料口放出药液，将所得药液在外加热式三效浓缩罐中浓缩成相对密度为 1.30 浸膏，冷却备用；

步骤三：取没药 27g、乳香 10g、血竭 10g 和冰片 7g 碾碎成细粉，过 200 目筛；

步骤四：取蛋黄油 60g、第二步中所得浸膏，加入 30g 份蜂蜡，混合加热至 90℃，待蜂蜡全溶，混合均匀后，冷却至 50℃，加入第三步所得的细粉，搅拌混合均匀，冷却至室温，装入软膏盒，即制备成软膏剂。

[0095] 在清理好的伤口上，直接外敷上述软膏剂，并用无菌纱布包扎，每天换药一次；对于不方便包扎处，直接涂抹上述软膏剂，并注意按需清理创面，每天涂抹三次。

[0096] 按如下步骤制备本发明所述药物中的内服口服液：

步骤一：取当归 30g、紫草 35g、降真香 15g、黄连 17g、黄岑 24g、黄芪 12g、川朴 20g、桔梗 12g，混合，放在瓦罐中，加入 2000 份的水，浸泡 40 分钟，加热至沸腾，保持 25 分钟，在 25 分钟内搅拌 3 次；

步骤二：取三七 27g、地榆 25g、川芎 18g、白芨 35g、甘草 8g、甘松 16g、白芍 25g，菌陈 15g，继续加热至沸腾，保持 17 分钟，在 17 分钟内搅拌 3 次；

步骤三：取苏木 10g、红花 20g、马齿苋 12g、仙鹤草 12g、元胡 10g、没药 30g、乳香 28g、

金银花 10g、鱼腥草 10g、蒲公英 8g、防风 15g、穿心莲 13g、薄荷 10g，加热至沸腾，保持 30 分钟，在 30 分钟内搅拌 3 次，过滤取药液。

[0097] 成人每次取上述药液 200 ～ 300 毫升饮用，每日两次；儿童每次取上述药液 100 ～ 200 毫升饮用。

[0098] 采用上述方法制备的外敷软膏剂配合内服口服液的方法共治疗一、二度烧伤患者 6 例，其中男性患者 3 例，女性患者 3 例，患者年龄在 6 ～ 45 岁之间。其中一度烧伤患者 2 例，治愈时间为 3.0 ～ 3.5 天；二度烧伤患者 4 例，治愈时间为 6 ～ 16 天。

[0099] 实施例 3 与实施例 1 相比，采用了与最佳的优选方案不同的药物组分配比，所得的外敷药物和内服药物能有效的快速治疗一、二度烧伤，但是治愈速度与实施例 1 相比略慢，治愈后没有疤痕或疤痕面积小。

[0100] 对比例 1

采用常用外用药物京万红外敷伤口，配合实施例 1 中所制备的内服口服液，共治疗一、二度烧伤患者 6 例，其中男性患者 3 例，女性患者 3 例，患者年龄在 25 ～ 60 岁之间。其中一度烧伤患者 3 例，治愈时间为 4 ～ 5 天；二度烧伤患者 3 例，治愈时间为 10 ～ 25 天，愈后留有疤痕。

[0101] 对比例 1 与实施例 1 相比，均采用了本发明所述的内服口服液，但是对比例 1 没有采用本发明所制备的外敷药物，患者治愈时间较长，药物效果相对较差，愈后疤痕面积与实施例 1 相比要大 20% ～ 30%。与实施例 2 和 3 相比，药物效果也明显较差。

[0102] 对比例 2

只采用实施例 1 中所制备的外敷软膏剂，不使用任何内服药物，共治疗一、二度患者 8 例，其中男性患者 4 例，女性患者 4 例，患者年龄在 4 ～ 40 岁之间。其中一度烧伤患者 5 例，治愈时间为 4 ～ 5 天，二度烧伤患者 3 例，治愈时间为 10 ～ 25 天。

[0103] 对比例 2 与实施例 1 相比，均采用了本发明所制备的软膏剂，但对比例 2 没有采用本发明所制备的内服口服液，治疗速度明显减慢，且愈后疤痕面积比实施例 1 大 15% ～ 20%。

[0104] 对比例 3

采用实施例 1 中所制备的外敷软膏剂，利用如下方法制备内服口服液：取当归 28g、紫草 31 g、降真香 14 g、黄连 15 g、黄岑 20 g、黄芪 10 g、川朴 18 g、三七 23g、苏木 7 g、红花 18 g、地榆 20 g、马齿苋 10 g、仙鹤草 8 g、川芎 16 g、元胡 8 g、桔梗 10 g、白芨 31 g、没药 26 g、乳香 24 g、甘草 6 g、甘松 11 g、金银花 8 g、鱼腥草 8 g、蒲公英 6 g、防风 12 g、穿心莲 11 g、白芍 21 g、薄荷 7 g，菌陈 13g，加入 2000g 的水，升温至沸腾，煮 40 分钟，过滤取药液，成人每次取上述药液 200 ～ 300 毫升饮用，每日两次；儿童每次取上述药液 100 ～ 200 毫升饮用。

[0105] 采用上述方法共治疗一、二度烧伤患者 5 例，其中男性患者 2 例，女性患者 3 例，患者年龄在 30 ～ 60 岁之间。其中一度烧伤患者 2 例，二度烧伤患者 3 例。其中一度烧伤患者治愈时间为 4 ～ 6 天，二度烧伤患者治愈时间为 8 ～ 20 天。

[0106] 与实施例 1 相比，本对比例采用了相同的外敷软膏剂，本实施例中内服药物与实施例 1 中的内服药物包含相同的中药组分，但是没有采用实施例 1 所述的内服口服液的制备方法，所得的药物的治愈速度明显减慢。

[0107] 对比例 4

采用实施例 1 中所制备的内服口服液，使用如下方法制备外敷药物：取蛋黄油 110g，麻油 200g 混合煮沸，加入当归 23g、紫草 30 g、降真香 15 g、黄连 22 g、川朴 11 g、三七 28 g、苏木 12 g、红花 23 g、地榆 20 g、川芎 16 g、甘松 8g、元胡 12g、桔梗 5g、白芨 28g、没药 31g、乳香 14g、甘草 8g、血竭 13g、冰片 10g、生地黄 10g、血余 10g、龙骨 11g、交藤 7g、地丁 9g、荆芥 7g、苦楝皮 10g、香薷 17g，过滤除渣得外敷药物。

[0108] 采用上述方法共治疗一、二度烧伤患者 6 例，其中男性患者 4 例，女性患者 2 例，患者年龄在 25 ～ 40 岁之间。其中一度烧伤患者 10 例，二度烧伤患者 15 例。其中一度烧伤患者治愈时间为 4 ～ 5 天，二度烧伤患者治愈时间为 9 ～ 26 天。

[0109] 与实施例 1 相比，虽然本实施例中外敷药物包含了相同的中药组分，但是没有采用本发明所述的软膏剂的制备方法，所得的药物治愈时间明显变长。

[0110] 实施例 4

采用实施例 1 中所制备的外敷软膏剂，并采用如下方法制备内服胶囊：

步骤一：取当归 28g、紫草 31g、降真香 14g、黄连 15g、黄岑 20g、黄芪 10g、川朴 18g、桔梗 10g、茵陈 13g，混合，加入 1100g 的水，浸泡 2.5 小时，放入多功能提取罐，加热至 100℃，保持 3.5 小时，在下料口取出药液；再次用同样的步骤提取第二次，将所得药液合并，三效浓缩罐中浓缩至温度为 60℃时相对密度为 1.28 的膏体；将所得膏体在 70℃时减压真空干燥，得干膏粉；

步骤二：取三七 23g、苏木 7g、红花 18g、地榆 20g、马齿苋 10g、仙鹤草 8g、川芎 16g、元胡 8g、白芨 31、甘草 6、甘松 11、白芍 21、金银花 8g、鱼腥草 8g、防风 12g、穿心莲 11g、白芍 21g、茵陈 13g 混合，用 60% 的乙醇浸泡 1.5 个小时，乙醇用量为药材体积的 2.5 倍；然后，置于多功能提取罐中，加入 60% 的乙醇，乙醇总加入量为药材体积的 7 倍，加热至 85℃，保持该温度 2.5 个小时，自下料口放出药液，将所得药液在外加热式三效浓缩罐中浓缩成温度在 55℃时相对密度为 1.32 膏体；将所得膏体在 70℃时减压真空干燥，得干膏粉；

步骤三：取没药 26g，乳香 24g，蒲公英 6g，薄荷 7g，混合，利用外能粉碎机粉碎成药物粉末，过 200 目筛。

[0111] 步骤四：将步骤一、二所得的干膏粉和步骤三中的药物粉末混合成混合物，加入相对于 100 重量份上述混合物的以下物质：7 份滑石粉，3.5 份羧甲基淀粉钠，6 份二氧化硅，加入 100 份浓度为 60% 的乙醇，干燥制粒，随后加入 1.5 份硬脂酸镁，装入胶囊即可。

[0112] 成人每次取上述胶囊 2 ～ 4 粒服用，每日三次；儿童每次取上述胶囊 1 ～ 3 粒服用，每日三次。

[0113] 利用此方法共治疗一、二度烧伤患者 25 例，其中男性患者 15 例，女性患者 10 例，患者年龄在 15 ～ 60 岁之间。其中一度烧伤患者 10 例，二度烧伤患者 15 例。其中一度烧伤患者治愈时间为 2.5 ～ 3.0 天，二度烧伤患者治愈时间为 5 ～ 15 天。

[0114] 对比例 5

采用实施例 1 中所制备的外敷药物，使用如下方法制备胶囊：取当归 28 g、紫草 31 g、降真香 14 g、黄连 15 g、黄岑 20 g、黄芪 10 g、川朴 18 g、三七 23 g、苏木 7 g、红花 18 g、地榆 20 g、马齿苋 10 g、仙鹤草 8 g、川芎 16 g、元胡 8 g、桔梗 10 g、白芨 31 g、没药 26 g、乳香 24 g、甘草 6 g、甘松 11 g、金银花 8 g、鱼腥草 8 g、蒲公英 6 g、防风 12 g、穿心莲 11 g、白芍 21 g、薄荷 7 g、茵陈 12g，将所取药物组分混合，用万能粉碎机碾磨成中药微粉，中药

微粉用筛分机过 200 目筛，灭菌后装入胶囊即可，成人每次取上述胶囊 2 ～ 4 粒服用，每日三次；儿童每次取上述胶囊 1 ～ 3 粒服用，每日三次。

[0115] 采用上述方法共治疗烧伤患者 5 例，其中男性患者 2 例，女性患者 3 例，患者年龄在 30 ～ 60 岁之间。其中一度烧伤患者 2 例，二度烧伤患者 3 例。其中一度烧伤患者治愈时间为 5 ～ 6 天，二度烧伤患者治愈时间为 10 ～ 26 天。

[0116] 与实施例 4 相比，本对比例采用相同的外敷药物，内服药物胶囊的制备工艺不同，针对一、二度烧伤患者的治愈速度明显减慢。

[0117] 实施例 5

采用实施例 1 中所制备的外敷软膏剂，采用如下方法制备内服蜜丸：

步骤一：取当归 28g、紫草 31g、降真香 14g、黄连 15g、黄岑 20g、黄芪 10g、川朴 18g、桔梗 10g，混合，加入 900 ～ 1300 份的水，浸泡 2.5 小时，放入多功能提取罐，加热至 100℃，保持 3.5 小时，在下料口取出药液；再次用同样的步骤提取第二次，将所得药液合并，三效浓缩罐中浓缩至温度为 60℃时相对密度为 1.30 的膏体；

步骤二：取三七 23g、苏木 7g、红花 18g、地榆 20g、马齿苋 10g、仙鹤草 8g、川芎 16g、元胡 8g、白芨 31、甘草 6、甘松 11、白芍 21、金银花 8g、鱼腥草 8g、防风 12g、穿心莲 11g、白芍 21g、茵陈 13g 混合，用 60% 的乙醇浸泡 1.5 个小时，乙醇用量为药材体积的 2.5 倍；然后，置于多功能提取罐中，加入 60% 的乙醇，乙醇总加入量为药材体积的 7 倍，加热至 85℃，保持该温度 2.5 个小时，自下料口放出药液，将所得药液在外加热式三效浓缩罐中浓缩成温度在 60℃时相对密度为 1.32 膏体，将所得膏体在 70℃时减压真空干燥，得干膏粉；

步骤三：取没药 26g，乳香 24g，蒲公英 6g，薄荷 7g 混合，利用外能粉碎机粉碎成药物粉末，过 200 目筛。

[0118] 步骤四：将步骤一的膏体、步骤二的干膏粉和步骤三的药物粉末混合，加入相对于混合物 1.5 倍重量的蜂蜜，所述蜂蜜为炼蜜温度在 120℃老蜜，调药制成丸剂即可。

[0119] 成人每次取上述蜜丸 3 ～ 5 粒，每日三次服用；儿童每次取上述蜜丸 1 ～ 2 粒服用，每日三次。

[0120] 采用此方法共治疗一、二度烧伤患者 28 例，其中男性患者 15 例，女性患者 13 例，患者年龄在 6 ～ 50 岁之间。其中一度烧伤患者 10 例，二度烧伤患者 18 例。其中一度烧伤患者治愈时间为 2.5 ～ 3.0 天，二度烧伤患者治愈时间为 4 ～ 16 天。

[0121] 对比例 6

采用本发明所制备的外敷药物，使用如下方法制备内服蜜丸：取当归 28 g、紫草 31 g、降真香 14 g、黄连 15 g、黄岑 20 g、黄芪 10 g、川朴 18 g、三七 23 g、苏木 7 g、红花 18 g、地榆 20 g、马齿苋 10 g、仙鹤草 8 g、川芎 16 g、元胡 8 g、桔梗 10 g、白芨 31 g、没药 26 g、乳香 24 g、甘草 6 g、甘松 11 g、金银花 8 g、鱼腥草 8 g、蒲公英 6 g、防风 12 g、穿心莲 11 g、白芍 21 g、薄荷 7 g、茵陈 12g，将所取药物组分混合，用万能粉碎机碾磨成中药微粉，中药微粉用筛分机过 200 目筛，灭菌后加入蜂蜜制成蜜丸。

[0122] 采用上述方法共治疗烧伤患者 5 例，其中男性患者 2 例，女性患者 3 例，患者年龄在 30 ～ 60 岁之间。其中一度烧伤患者 2 例，二度烧伤患者 3 例。其中一度烧伤患者治愈时间为 5 ～ 6 天，二度烧伤患者治愈时间为 10 ～ 26 天。

[0123] 与实施例 5 相比，虽然本对比例中内服蜜丸包含了相同的中药组分，但是没有采

用本发明所述的内服蜜丸的制备方法，所得的药物的治愈时间明显变长。

[0124] 上述实施例仅是说明性的，用于解释本发明药物的一些特征和应用方式，并不能用来限制本发明，所附的权利要求旨在要求可以设想到的尽可能广的范围，如在权利要求中使用的术语“包括”和其语意的变体在理论上也包括不同的表达方式，例如但不限于“其组成为”。本文所述的实施例仅是部分可能的实施方式。因此，本发明所附的权利要求并不被所述的示例限制。在权利要求中所用的一些数值范围也包括了在其之内的子范围，这些范围中的变化也应在可能的情况下解释为被所附的权利要求覆盖。