




DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁵ : A61K	A2	(11) Numéro de publication internationale: WO 94/12143 (43) Date de publication internationale: 9 juin 1994 (09.06.94)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/EP93/03164 (22) Date de dépôt international: 11 novembre 1993 (11.11.93) (30) Données relatives à la priorité: 3533/92-5 18 novembre 1992 (18.11.92) CH (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): FIRMENICH SA [CH/CH]; Case Postale 239, 1, route des Jeunes, CH-1211 Genève 8 (CH). (72) Inventeur; et (75) Inventeur/Déposant (US seulement): GAUDIN, Jean-Marc [FR/FR]; 12D, rue du Parc, F-74100 Annemasse (FR). (74) Mandataires: SALVADORI, Giuseppe etc.; Firmenich SA, Case Postale 239, CH-1211 Genève 8 (CH).	(81) Etats désignés: JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Publiée Sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport.	
(54) Title: USE OF FURANONES AS SCENTING INGREDIENTS (54) Titre: UTILISATION DE FURANONES A TITRE D'INGREDIENTS PARFUMANTS (57) Abstract Furanones of formula (I), wherein R¹ and R² are the same and each represents a methyl radical, or R¹ and R² are different and each represents a hydrogen atom or a methyl radical, or else R¹ and R² together represent a methylene radical, are useful as scenting ingredients for the preparation of scenting compositions and scented articles in that they impart coumarin and balsamtype fragrances. (57) Abrégé Les furanones de formule (I) dans laquelle les symboles R¹ et R², pris séparément, sont identiques et représentent chacun un radical méthyle, ou sont différents et représentent chacun un atome d'hydrogène ou un radical méthyle, ou, pris ensemble, représentent un radical méthylène, sont utiles à titre d'ingrédients parfumants pour la préparation de compositions parfumantes et d'articles parfumés, auxquels elles confèrent des odeurs de type coumariné et balsamique.  (I)		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION


Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	GB	Royaume-Uni	MR	Mauritanie
AU	Australie	GE	Géorgie	MW	Malawi
BB	Barbade	GN	Guinée	NE	Niger
BE	Belgique	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BF	Burkina Faso	HU	Hongrie	NO	Norvège
BG	Bulgarie	IE	Irlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BJ	Bénin	IT	Italie	PL	Pologne
BR	Brésil	JP	Japon	PT	Portugal
BY	Bélarus	KE	Kenya	RO	Roumanie
CA	Canada	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CF	République centrafricaine	KP	République populaire démocratique de Corée	SD	Soudan
CG	Congo	KR	République de Corée	SE	Suède
CH	Suisse	KZ	Kazakhstan	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	SN	Sénégal
CN	Chine	LU	Luxembourg	TD	Tchad
CS	Tchécoslovaquie	LV	Lettonie	TG	Togo
CZ	République tchèque	MC	Monaco	TJ	Tadjikistan
DE	Allemagne	MD	République de Moldova	TT	Trinité-et-Tobago
DK	Danemark	MG	Madagascar	UA	Ukraine
ES	Espagne	ML	Mali	US	Etats-Unis d'Amérique
FI	Finlande	MN	Mongolie	UZ	Ouzbékistan
FR	France			VN	Viet Nam
GA	Gabon				

Utilisation de furanones à titre d'ingrédients parfumants

Domaine technique

- 5 La présente invention a trait au domaine de la parfumerie. Plus particulièrement, elle concerne l'utilisation d'une furanone de formule




- 10 dans laquelle les symboles R^1 et R^2 , pris séparément, sont identiques et représentent chacun un radical méthyle, ou sont différents et représentent chacun un atome d'hydrogène ou un radical méthyle, ou, pris ensemble, représentent un radical méthylène.

15 Technique antérieure

- Les furanones de formule (I) sont des homologues de la 5,6,7,7a-tétrahydro-7a-méthoxy-3,6-diméthyl-2(4H)-benzo[b]furanone, aussi connue sous le nom de menthalactone, un composant naturel de l'huile essentielle
- 20 de la menthe poivrée et dont l'utilisation en parfumerie et dans l'industrie des arômes est décrite dans l'art antérieur [voir le brevet US 4,407,740].

D'autre part, le brevet US 5,114,493 décrit l'utilisation pour l'aromatisation du tabac de lactones de formule



25

dans laquelle R est un radical alkyle de C_1 à C_6 , un radical C_1 - C_4 alkylphényle ou un radical C_1 - C_4 alkoxyphényle.

- Les structures des furanones (I) sont également connues de l'art
- 30 antérieur. Par exemple, la synthèse de la perhydro-6-méthyl-3-méthylène-2-

benzo[b]furanone a fait l'objet de plusieurs publications [voir, par exemple, J. M. Fang et al., Proc. Nat. Sci. Coun. ROC(A) 9, 95 (1985)], tandis que la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone a été décrite dans le brevet EP 219 199, ayant trait à un procédé pour la préparation de lactones. Bien que
5 ce brevet ne contienne aucune référence à des propriétés particulières de cette furanone, on connaît toutefois l'utilité de ce composé à titre de produit insectifuge - voir la demande de brevet européen EP 167 265 -.

La synthèse de la perhydro-3,3,6-triméthyl-2-benzo[b]furanone a aussi été décrite par I. Yoshihiko et al. dans le J. Org. Chem. 47, 741 (1982).

10 D'autre part, plusieurs isomères optiquement actifs des composés (I), dont les structures comportent plusieurs centres chiraux, ont été décrits dans la littérature, leur caractérisation étant toutefois souvent déficiente [voir, par exemple, J. M. Fang et al., réf. citée ; M. Carda et al., Tetrahedron Lett. 32, 5191 (1991) ; I. Kitagawa et al., Chem. Pharm. Bull. 31,
15 2639 (1983) ; E. J. Corey et al., J. Am. Chem. Soc. 111, 5472 (1989) ; C. W. Jefford et al., J. Chem. Soc. Chem. Comm. 1988, 634].

Malgré cette abondance de descriptions de nature synthétique et structurelle et la similarité chimique entre les furanones (I) et leurs homologues connus de US 4,407,740 et 5,114,493, à notre connaissance les
20 propriétés odorantes de ces furanones (I) sont passées jusqu'ici complètement inaperçues. Nous n'avons trouvé dans l'art antérieur cité aucune référence, ni même suggestion, de l'éventuelle utilité de ces furanones, ou de l'un de leurs isomères, à titre d'ingrédient parfumant.

25 Exposé de l'invention

Or, nous avons maintenant découvert que ces composés possèdent des propriétés olfactives tout à fait surprenantes au vu de l'art antérieur et qui rendent leur utilisation en parfumerie très intéressante.

30 Par exemple, la perhydro-6-méthyl-3-méthylène-2-benzo[b]furanone possède une odeur très puissante de type coumariné, gras, lactonique, avec une note de fond balsamique rappelant la jonquille. Il s'agit d'une note odorante très proche de celle de la coumarine et qui se trouve représentée à son mieux chez la (+)-(3aS,6R,7aR)-perhydro-6-méthyl-3-méthylène-2-
35 benzo[b]furanone, citée ici à titre préférentiel.

Pour sa part, la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone possède elle une note odorante de type coumariné très puissante, avec un côté foin rappelant l'odeur de la flouve et du Florex® [5 et 6-éthylidèneoctahydro-5,8-

méthano-2H-1-benzopyran-2-one ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse], ainsi qu'une sous-note fruitée-balsamique évoquant l'odeur du tonka et de la réglisse.

Nous avons découvert avec surprise que l'odeur de ce composé se révèle particulièrement intéressante, car, de l'avis des parfumeurs, il s'agit de la note la plus proche olfactivement de celle de la coumarine que l'on connaît actuellement. Ceci ressort clairement des essais de comparaison, présentés plus loin, entre cette furanone et les composés actuellement disponibles sur le marché dont les odeurs sont apparentées à celle de la coumarine.

Les propriétés odorantes des furanones (I) apparaissent comme tout à fait surprenantes au vu de l'art antérieur. En effet, leur odeur est complètement différente, en qualité et intensité, de celle de leur homologue connu mentionné plus haut, la menthalactone. Comme il ressort des exemples de comparaison présentés plus loin, cette dernière possède une note odorante dont la puissance est de plusieurs ordres de grandeur inférieure à celle des furanones (I) mentionnées plus haut. Sa note est moins coumarinée et plus lactonique que celle de ces dernières et ne possède pas le caractère de type foin qui est typique de la coumarine et que l'on retrouve également dans l'odeur des furanones (I), particulièrement chez la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone. En plus, cette dernière possède également une note fraîche-aromatique, rappelant la lévo-carvone, note qui est totalement absente chez la menthalactone, qui exhale elle une odeur beaucoup plus fruitée.

D'autre part, la menthalactone n'est pas du tout substantive, contrairement aux furanones (I). Ceci ressort clairement du test comparatif de substantivité présenté plus loin.

Nous avons également découvert, de façon inattendue, que les nombreux isomères optiquement actifs de la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone possèdent tous, de façon plus ou moins marquée, la note coumarinique recherchée, accompagnée de nuances olfactives variées qui rendent tous ces composés utiles pour la préparation de compositions et articles parfumés.

Parmi ces isomères, on citera à titre préférentiel les (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone et (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone. Ces deux composés possèdent des notes odorantes coumarinées puissantes, l'odeur du premier étant moins lactonique mais plus douce que celle du deuxième, avec un caractère de type caramel. La note du second composé cité, qui possède au mieux les caractères de type tonka, fèves, foin, flouve mentionnés plus haut,

est aussi plus coumarinée et plus puissante que celle du premier, dont le caractère de type coumarine est plus marqué en fond qu'en tête et accompagné d'un côté métallique. Des mélanges parfumants contenant des quantités prépondérantes de l'un ou l'autre de ces composés, ont également
5 été jugés des ingrédients parfumants fort utiles selon l'invention.

Par ailleurs, nous avons été surpris de constater que des mélanges de ces isomères optiquement actifs pouvaient parfois avoir des performances olfactives égales, ou même supérieures à celles de leurs ingrédients individuels et se révéler des ingrédients parfumants de choix. Nous avons
10 notamment observé un effet d'exaltation des qualités odorantes des deux composés préférés cités ci-dessus lorsqu'on mélangeait ces composés entre eux, ou qu'on employait leur mélange avec d'autres isomères dans des compositions contenant des quantités prépondérantes dudit mélange des (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone et (+)-
15 (3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone. Ces compositions, contenant 50% ou plus de ce mélange, possédaient les notes odorantes caractéristiques de la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone citées plus haut, mais leur odeur apparaissait comme plus intense et plus riche dans le caractère coumarinique et lactonique recherché que celles des isomères
20 individuels composant le mélange. Il s'agit de compositions nouvelles, possédant des propriétés inattendues par rapport à l'art antérieur, et qui constituent ainsi l'un des objets de l'invention.

D'autre part, lorsque de tels mélanges résultent directement de certains procédés de synthèse, ils présentent en plus un avantage économique
25 par rapport aux formes optiquement actives pures dont la synthèse est plus onéreuse.

Parmi les isomères de la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, on peut encore citer à titre préférentiel la (-)-(3S,3aR,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone qui possède une odeur coumarinée, flouve,
30 foin, vaguement soufrée.

Lorsqu'on fait référence à la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone dans les exemples d'application, on entend se référer aussi bien au mélange racémique qu'à l'un des isomères optiquement actifs, notamment à ceux qui sont des composés préférés, ou encore à des compositions contenant
35 au moins 50% en poids de l'un des isomères (+)-(3R,3aS,6R,7aR) et (+)-(3S,3aS,6R,7aR), ou de leur mélange.

De par leurs qualités olfactives, les furanones (I), leurs isomères optiquement actifs, ainsi que les mélanges de ces isomères, sont des

ingrédients parfumants qui se prêtent tout aussi bien pour des applications en parfumerie fine qu'en parfumerie fonctionnelle. Ils conviennent pour la préparation de bases et compositions parfumantes, parfums et eaux de toilette, ainsi que pour le parfumage d'articles divers tels des savons, des gels de bain ou douche, des shampoings et autres produits d'hygiène capillaire, des désodorisants corporels ou d'air ambiant et des préparations cosmétiques. Leur note odorante étant d'une excellente tenacité, on peut les utiliser avantageusement pour le parfumage de détergents et d'adoucissants textiles. Ils trouvent également un emploi heureux dans des produits d'entretien.


Dans ces applications, ils seront utilisés soit seuls, soit, comme il est plus courant dans l'art, en mélange avec d'autres ingrédients parfumants, des solvants ou des adjuvants usuels en parfumerie.

Les concentrations dans lesquelles ils peuvent être utilisés dépendent de l'effet olfactif recherché, ainsi que de la nature des coingrédients avec lesquels ils sont mélangés dans les compositions parfumantes et articles parfumés les contenant. Ces concentrations peuvent donc varier dans une gamme de valeurs très large. A titre d'exemple, on peut citer des concentrations de l'ordre de 1 à 10%, voire même 20% ou plus, en poids, par rapport au poids de la composition dans laquelle ils sont incorporés, ceci lors de leur usage dans la préparation de bases et compositions parfumantes. Des valeurs bien inférieures à celles-ci seront généralement utilisées lors de l'emploi de ces composés dans le parfumage des divers articles de consommation cités précédemment.

25 Manières de réaliser l'invention

Les composés (I) ont été préparés à partir de produits commerciaux ou qui peuvent être facilement obtenus de façon connue en soi. Les schémas suivants illustrent les procédés utilisés pour chaque cas particulier.

SCHEMA I




Le produit de départ (Fluka) dans ce schéma est un mélange de (-)-isopulégol (72%) et de (+)-néoisopulégol (20%). L'époxydation de ce mélange par l'acide metachloroperbenzoïque dans le dichlorométhane [voir T.-L. Ho et al., Synth. Comm. 19, 813 (1989) et T. G. Waddell et al., J. Org. Chem. 52, 4802 (1987) pour des réactions analogues] et traitement avec 2,5 éq. de lithium diisopropylamine (LDA) dans le THF [voir, par exemple, K.-H. Schulte-Elte, Helv. Chim. Acta 50, 153 (1967) pour des réactions analogues] fournissent un mélange des diols indiqués, lesquels peuvent ensuite être séparés par chromatographie préparative et oxydés à l'aide d'oxyde d'argent pour fournir les deux lactones indiquées à l'état pur.

D'autres méthodes de préparation de ces lactones sont décrites, par exemple, par S. B. Balkrishna et al., Heterocycles 16, 2091 (1981) et T. J. Brocksom et al., Synth. Comm. 18, 1403 (1988).

Lorsqu'on part du (-)-isopulégol pur (Fluka) et qu'on soumet le diol intermédiaire à une hydrogénation catalytique, comme illustré au schéma suivant :

SCHEMA II




20

on obtient le mélange des diols indiqués. Ces diols sont séparés par cristallisation dans l'héxane et ensuite oxydés à l'aide de permanganate de potassium [voir C. W. Jefford et al., J. Chem. Soc., Chem. Comm. 1988, 634] pour fournir les deux lactones indiquées à l'état pur.

25

Le schéma III ci-après illustre la préparation de deux autres isomères de la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, à partir du (+)-néoisopulégol pur (obtenu par séparation chromatographique à partir du mélange technique cité au schéma I), par hydroboration de ce dernier dans le THF [procédé analogue à celui décrit par K.-H. Schulte-Elte, référence citée], suivie d'oxydation du mélange de diols obtenu.

SCHEMA III




10

On obtient un mélange des deux lactones désirées, dont on sépare l'isomère majoritaire par cristallisation dans l'hexane, et l'isomère minoritaire par chromatographie préparative en phase gazeuse des eaux mères.

15

Comme il est illustré au schéma IV ci-après

SCHEMA IV




20

la réduction catalytique de la (-)-menthalactone donne la lactone de configuration (3S,3aR,6R,7aR), alors que la réduction du même produit de départ par le magnésium dans le méthanol [voir T. Hudlicky et al., Tetrahedron Lett. 28, 5287 (1987) et H. Yoda et al., Chem. Lett. 1989, 1391, pour

des réactions analogues] produit la lactone de configuration (3R,3aR,6R,7aR). Cette dernière peut également être préparée par épimérisation à l'aide de méthylate de sodium de son épimère indiqué.


- La réduction de la (+)-(3S,3aR,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone préparée ci-dessus à l'aide de LiAlH_4 dans le diéthyléther a fourni le diol indiqué au schéma V ci-après :

SCHEMA V



- L'acétylation de ce diol avec un équivalent d'anhydride acétique dans la pyridine, suivie d'oxydation à l'aide du réactif de Jones a fourni la cétone intermédiaire, dont la réduction a permis d'obtenir le diol indiqué. Ce diol possédait la configuration appropriée pour fournir, par oxydation au permanganate de potassium, la lactone de configuration (3S,3aR,6R,7aS), comme indiqué au schéma VI :

SCHEMA VI



L'épimérisation de cette lactone dans des conditions basiques ($\text{CH}_3\text{ONa}/\text{THF}$) a fourni son épimère indiqué.

- Toutes les lactones (I) dont la préparation est décrite ci-dessus possèdent un groupe méthyle de configuration R à la position 6. L'utilisation de produits de départ appropriés, ayant le méthyle concerné avec une configuration énantiomère de celle indiquée dans les schémas, a permis d'obtenir, bien entendu, les lactones (I) de configuration 6S correspondantes.

Les composés (I) ainsi obtenus ont été exhaustivement caractérisés à l'aide de techniques spectroscopiques (SM, RMN-COSY, nOe, etc ...) et leurs données analytiques sont présentées plus loin.

Lorsqu'on a utilisé, en tant que produits de départ, des mélanges d'isomères optiquement actifs, on a obtenu des mélanges correspondants de lactones (I), qui se sont révélés d'excellents ingrédients parfumants. Par exemple, lorsqu'on a appliqué au mélange technique de (-)-isopulégol et (+)-néoisopulégol cité au schéma I, la séquence de réactions décrite au schéma II, à l'exclusion de la séparation des diols par cristallisation, on a obtenu un mélange de lactones contenant environ 50% en poids de (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, 30% en poids de (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, 11% en poids de (-)-(3S,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone et 7% en poids de (-)-(3R,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone. Ce mélange possédait des propriétés olfactives qui le rendaient un ingrédient parfumant préféré pour les applications selon l'invention. Par ailleurs, ce mélange s'est révélé également utile en tant que produit de départ pour la synthèse de la (-)-(3aS,6R,7aS)-perhydro-3,3,6-triméthyl-2-benzo[b]furanone, décrite plus loin.

D'autres mélanges ont été obtenus à partir du même isopulégol de qualité technique de départ, mais en variant légèrement les conditions de synthèse. Par exemple, l'hydroboration de ce produit, suivie de l'oxydation avec KMnO_4 , de façon analogue à celle illustrée au schéma III, a fourni un mélange contenant environ 13% en poids de (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, 61% en poids de (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, 20% en poids de (-)-(3S,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone et 6% en poids de (-)-(3R,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone qui s'est aussi révélé un ingrédient parfumant intéressant.

Ces mélanges possédant une quantité prépondérante des deux isomères préférés de la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, à savoir le (+)-(3S,3aS,6R,7aR) et le (+)-(3R,3aS,6R,7aR), développaient en effet des odeurs coumarinées très puissantes, avec les caractères foin, flouve typiques déjà mentionnés auparavant.

Pour ce qui est des produits (I) racémiques, ils peuvent être préparés selon les méthodes décrites dans l'art antérieur cité plus haut, ou bien, selon les méthodes décrites, par exemple, aux schémas I et II, mais en partant de produits de départ racémiques.

Les méthodes de préparation des composés (I) sont décrites en détail ci-après.

A. Préparation de la (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone et de la (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone

A 40,7 g (264 mmole) de (-)-(1R,3R,4S)-8-p-menthén-3-ol ($[\alpha]_D^{20} = -7,74^\circ$) dans le dichlorométhane (130 ml) on a ajouté 64,5 g (317 mmole) d'acide m-chloroperbenzoïque. Le mélange a été agité pendant 4 h à température ambiante, ensuite filtré, lavé avec NaHCO₃, de l'eau et de la saumure. On a séché la phase organique, concentré et distillé le produit brut. Une solution de 16,15 g (95 mmole) de produit ainsi distillé dans le THF (30 ml) a été ajoutée lentement, à 0°C, à 295 mmole de LDA dans le THF (170 ml). Le mélange a été chauffé à 45°C pendant 1 h et ensuite refroidi à température ambiante. Le mélange réactionnel a été versé sur glace et extrait à l'éther. La phase organique a été lavée à la saumure, séchée et concentrée pour fournir 14 g de produit brut. Ce dernier a été recristallisé dans l'hexane pour fournir 11,96 g de (1R,3R,4S)-8(10)-p-menthène-3,9-diol à l'état pur.

15 G (88 mmole) de ce diol ont été hydrogénés avec 0,15 g de Pd/C à 10%, dans l'acétate d'éthyle (150 ml), à une pression atmosphérique de H₂. Le produit brut (15,7 g) a été distillé pour fournir 10,6 g (rend. 70%) d'un mélange de (1R,3R,4S,8S)-3,9-p-menthanediol et (1R,3R,4S,8R)-3,9-p-menthanediol. Ces deux diols ont ensuite été séparés par cristallisation dans l'hexane.

(1R,3R,4S,8S)-3,9-p-menthanediol

RMN(¹H, 360MHz, CDCl₃) : 0,85(d, J=7Hz, 3H) ; 0,89(m, 1H) ; 0,92(d, J=6Hz, 3H) ; 0,98(m, 2H) ; 1,35(m, 1H) ; 1,41(m, 1H) ; 1,63(m, 2H) ; 1,99(dxm, J=13Hz, 1H) ; 2,07(m, 1H) ; 3,42(dx dx d, J₁=11, J₂=4, J₃=4Hz, 1H) ; 3,48(dx d, J₁=11, J₂=7Hz, 1H) ; 3,56(dx d, J₁=11, J₂=5Hz, 1H) δ ppm.

RMN(¹³C, 360MHz, CDCl₃) : 12,6(q) ; 22,2(q) ; 25,3(t) ; 31,6(d) ; 34,4(t) ; 35,6(d) ; 45,2(t) ; 45,6(d) ; 66,6(t) ; 71,7(d) δ ppm.

SM : 172(1, M⁺), 154(3), 139(6), 123(16), 112(16), 95(38), 81(100), 71(63), 55(57), 41(32).

(-)-(1R,3R,4S,8R)-3,9-p-menthanediol

$[\alpha]_D^{20} = -22,5^\circ$; c = 1,2%, dans le CHCl_3

P.f. 100-101°C

- 5 RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 0,93(d, J=7Hz, 3H) ; 0,97(d, J=7Hz, 3H) ;
 0,8-1,0(m, 2H) ; 1,24(dx dx dx d, $J_1=11$, $J_2=11$, $J_3=11$, $J_4=3\text{Hz}$, 1H) ;
 1,35(dx m, J=11Hz, 1H) ; 1,42(m, 1H) ; 1,56(dx m, J=13Hz, 1H) ;
 1,64(dx m, J=13Hz, 1H) ; 1,84(m, 1H) ; 1,97(dx m, J=13Hz, 1H) ;
 3,44(dx dx d, $J_1=10$, $J_2=10$, $J_3=4\text{Hz}$, 1H) ; 3,58(dx d, $J_1=11$, $J_2=3\text{Hz}$, 1H) ;
 3,65(dx d, $J_1=11$, $J_2=5\text{Hz}$, 1H) δ ppm.
 10 RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 12,0(q) ; 22,1(q) ; 29,5(t) ; 31,5(d) ; 34,7(t) ;
 38,6(d) ; 44,6(t) ; 48,6(d) ; 67,0(t) ; 70,1(d) δ ppm.
 SM : 172(1, M^+), 154(3), 139(7), 124(18), 112(28), 95(33), 81(100), 71(62),
 55(65), 41(35).

- 15 Ces deux diols ont ensuite été oxydés séparément, à l'aide de permanganate de potassium, de façon analogue à celle décrite sous B ci-après, pour fournir les lactones désirées à l'état pur.

(+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzofurane

20 (pure à 94%)

$[\alpha]_D^{20} = +85,0^\circ$; c = 0,7%, dans le CHCl_3

IR : 2940, 2883, 1808, 1158, 962 cm^{-1}

- 25 RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 1,02(d, J=7Hz, 3H) ; 1,11(m, 1H) ; 1,15(d, J=7Hz, 3H) ;
 1,24(dx dx dx d, $J_1=11$, $J_2=11$, $J_3=11\text{Hz}$, 1H) ; 1,34(m, 1H) ;
 1,60(m, 1H) ; 1,77(m, 1H) ; 1,82(m, 1H) ; 1,93(m, 1H) ; 2,25(dx dx d, $J_1=11$, $J_2=4$, $J_3=4\text{Hz}$, 1H) ;
 2,64(dx q, $J_1=7$, $J_2=7\text{Hz}$, 1H) ; 4,00(dx dx d, $J_1=11$, $J_2=11$, $J_3=4\text{Hz}$, 1H) δ ppm.
 RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 9,6(q) ; 22,0(q) ; 23,8(t) ; 31,3(d) ; 34,2(t) ;
 38,8(t) ; 38,8(d) ; 47,2(d) ; 81,5(d) ; 180,4(s) δ ppm.
 30 SM : 167(1), 139(1), 124(4), 109(18), 95(27), 81(100), 67(73), 55(24), 41(30).
 Odeur : décrite dans l'introduction.

(+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzofurane

35 (pure à 97%)

$[\alpha]_D^{20} = +19,5^\circ$; c = 1,25%, dans le CHCl_3

IR : 2939, 2884, 1809, 1175, 1093, 1006 cm^{-1}

- RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 1,02(d, J=7Hz, 3H) ; 1,03(m, 1H) ; 1,22(d, J=7Hz, 3H) ;
 1,22(m, 1H) ; 1,26(m, 1H) ; 1,47(dx dx dx d, $J_1=13$, $J_2=13$,

$J_3=13$, $J_4=4\text{Hz}$, 1H) ; 1,63(m, 1H) ; 1,82(dxm, $J_1=13\text{Hz}$, 1H) ;
1,94(dxdxd, $J_1=13$, $J_2=5$, $J_3=3\text{Hz}$, 1H) ; 2,22(m, 1H) ; 2,24(m, 1H) ;
3,76(dxdxd, $J_1=13$, $J_2=13$, $J_3=4\text{Hz}$, 1H) δ ppm.

RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 12,6(q) ; 22,0(q) ; 26,7(t) ; 31,4(d) ; 34,2(t) ;
38,2(t) ; 41,4(d) ; 51,5(d) ; 82,5(d) ; 179,5(s) δ ppm.

SM : 167(1), 139(1), 124(6), 109(16), 95(27), 81(100), 67(62), 55(18), 41(17).

Odeur : décrite dans l'introduction.

B. Préparation de la (-)-(3S,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-
benzo[b]furanone et de la (-)-(3R,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-
benzo[b]furanone

A une solution refroidie de (+)-(1R,3S,4S)-8-p-menthén-3-ol
($[\alpha]_{\text{D}}^{20} = +9,75^\circ$; 30,8 g ; 200 mmole) et de borohydrure de sodium (4,18 g ;
110 mmole) dans le THF (80 ml), maintenue sous azote, on a ajouté
goutte à goutte, pendant 1 h, à une température comprise entre -10° et
 0°C , 21,3 g (150 mmole) d'éthyl étherate de trifluorure de bore. Une fois
l'addition complétée, on a agité le mélange pendant 3 h à 0°C . 30 Ml
d'eau ont alors été ajoutés lentement (15 min) et on a agité pendant
encore 15 min. Toujours à 0°C , on a ajouté 80 g d'une solution à 12% de
KOH dans l'éthanol, suivie, 20 min plus tard, de 22 g (460 mmole) de
peroxyde d'hydrogène (solution à 70% dans l'eau). Une fois l'addition
terminée, le mélange réactionnel a été agité à 20°C pendant encore 2 h.
On a enlevé le THF, extrait le produit brut à l'éther et lavé à la saumure.
Le mélange organique a été séché et concentré pour fournir 32 g d'une
matière brute huileuse constituée par un mélange des diols
(1R,3S,4S,8S)-3,9-p-menthanediol et (1R,3S,4S,8R)-3,9-p-menthanediol.
Ce mélange de diols a ensuite été oxydé comme suit : 6,88 g (40 mmole)
de cette huile, en solution dans 20 ml d'acétate d'éthyle, ont été ajoutés
goutte à goutte pendant 10 min à $15,15^\circ\text{C}$ (96 mmole) de permanganate de
potassium dans 50 ml d'acétate d'éthyle. Le mélange a été agité pendant
la nuit à température ambiante et ensuite hydrolysé par addition d'une
solution saturée de bisulfite de sodium jusqu'à décoloration complète.
Le précipité blanc a été filtré et la phase organique lavée à la saumure
pour apporter son pH à 7, séchée et concentrée pour fournir 6,34 g d'un
mélange des lactones désirées. La (-)-(3R,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-
diméthyl-2-benzo[b]furanone a été obtenue à partir de ce mélange par
recristallisation dans l'hexane, alors que la (-)-(3S,3aS,6R,7aS)-perhydro-

3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone a été isolée des liqueurs mères par chromatographie préparative en phase gazeuse.

(-)-(3S,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone

5 (pure à 98%)

$[\alpha]_D^{20} = -67,9^\circ$; c = 1,07%, dans le CHCl_3

P. f. 52-53°C

IR : 2937, 1804, 1161, 969 cm^{-1}

10 RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 0,93(d, J=7Hz, 3H) ; 0,94(m, 1H) ; 1,25(m, 2H) ;
1,27(d, J=7Hz, 3H) ; 1,80(m, 3H) ; 1,95(m, 1H) ; 2,17(dxm, $J_1=14\text{Hz}$,
1H) ; 2,36(q, J=7Hz, 1H) ; 4,69(dxd, $J_1=4$, $J_2=4\text{Hz}$, 1H) δ ppm.

RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 14,1(q) ; 21,5(q) ; 26,0(d) ; 27,3(t) ; 31,6(t) ;
36,0(t) ; 41,3(d) ; 44,1(d) ; 77,4(d) ; 180,5(s) δ ppm.

SM : 167(1), 139(1), 124(13), 109(19), 95(100), 81(55), 67(72), 55(30), 41(38).

15 Odeur : coumarinée, lactonique, côté tabac froid.

(-)-(3R,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone

(pure à 88%)

$[\alpha]_D^{20} = -31,3^\circ$; c = 0,95%, dans le CHCl_3

20 P. f. 47-48°C

IR : 2938, 1806, 1158, 962 cm^{-1}

RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 0,90(m, 1H) ; 0,92(d, J=7Hz, 3H) ; 1,11(m, 1H) ;
1,16(d, J=7Hz, 3H) ; 1,21(m, 1H) ; 1,57(m, 1H) ; 1,67(m, 2H) ; 2,22(m,
2H) ; 2,79(dxq, $J_1=7$, $J_2=7\text{Hz}$, 1H) ; 4,44(m, 1H) δ ppm.

25 RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 9,1(q) ; 22,0(q) ; 23,2(t) ; 26,2(d) ; 32,1(t) ;
36,2(t) ; 39,1(t) ; 42,3(d) ; 78,2(d) ; 179,8(s) δ ppm.

SM : 167(1), 139(1), 124(12), 109(18), 95(100), 81(38), 67(70), 55(27), 41(35).

Odeur : coumarinée, grasse.

30 C. Préparation de la (+)-(3R,3aR,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone

35 On a ajouté 1,70 g (70 mmole) de magnésium, par portions, à une solution de la (-)-(6R,7aR)-5,6,7,7a-tétrahydro-3,6-diméthyl-2(4H)-benzo[b]furanone (0,83 g ; 5 mmole) dans le THF (50 ml). La réaction exothermique a été maintenue sous agitation à une température proche de la température ambiante à l'aide d'un bain d'eau, pendant la nuit. Le mélange de la réaction a été hydrolysé avec une solution à 10% de HCl et

extrait à l'éther. La phase organique a été lavée à la saumure, séchée et concentrée. La purification par "flash chromatography" a fourni 743 mg (rend. 88%) de la furanone en titre, pure à 99%.

- 5 $[\alpha]_D^{20} = +45,7^\circ$; c = 0,9%, dans le CHCl_3
 IR : 2939, 1802, 1169, 1007 cm^{-1}
 RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 0,96(d, J=7Hz, 3H) ; 0,98(m, 2H) ; 1,21(d, J=7Hz, 3H) ; 1,40(m, 1H) ; 1,56(dxm, $J_1=13\text{Hz}$, 1H) ; 1,67(m, 1H) ; 1,86(dxm, $J_1=14\text{Hz}$, 1H) ; 2,08(m, 1H) ; 2,22(m, 1H) ; 2,48(dxq, $J_1=14$,
 10 $J_2=7\text{Hz}$, 1H) ; 4,49(dx dx d, $J_1=12$, $J_2=7$, $J_3=7\text{Hz}$, 1H) δ ppm.
 RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 13,3(q) ; 22,0(q) ; 24,0(t) ; 28,7(t) ; 29,5(d) ; 35,3(d) ; 37,8(t) ; 41,7(d) ; 77,5(d) ; 179,6(s) δ ppm.
 SM : 169(1), 139(1), 124(3), 109(19), 95(44), 81(100), 67(65), 55(27), 41(32).

15 D. Préparation de la (+)-(3S,3aR,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone

On a hydrogéné 10 g (60 mmole) de (-)-(6R,7aR)-5,6,7a-tétrahydro-3,6-diméthyl-2(4H)-benzo[b]furanone dans le méthanol (40 ml) avec du Ni de Raney (3 g), sous 50 atmosphères de H_2 , pendant 3 jours, à température ambiante. L'extraction à l'éther du produit de la réaction a
 20 fourni 9,7 g (rend. 96%) de la furanone désirée, que l'on a purifiée pour obtenir un produit pur à 98%.

- 25 $[\alpha]_D^{20} = +9,2^\circ$; c = 1,1%, dans le CHCl_3
 IR : 2943, 1803, 1156, 972 cm^{-1}
 RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 1,02(d, J=7Hz, 3H) ; 1,18(d, J=7Hz, 3H) ; 1,33(m, 1H) ; 1,50(m, 3H) ; 1,89(m, 3H) ; 2,32(m, 1H) ; 2,77(dxq, $J_1=7$,
 $J_2=7\text{Hz}$, 1H) ; 4,52(dx d, $J_1=5$, $J_2=5\text{Hz}$, 1H) δ ppm.
 30 RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 9,7(q) ; 17,4(t) ; 19,8(q) ; 25,3(d) ; 28,9(t) ; 33,1(t) ; 38,8(d) ; 41,3(d) ; 77,9(d) ; 179,7(s) δ ppm.
 SM : 167(1), 139(1), 124(10), 109(21), 95(100), 81(55), 67(76), 55(35), 41(44).
 Odeur : lactonique.

35 E. Préparation de la (-)-(3S,3aR,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone

On a ajouté lentement 9,7 g (57,7 mmole) de (+)-(3S,3aR,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone (préparée sous D) à 2,2 g

(57 mmole) de LiAlH_4 dans l'éther (200 ml). La réaction exothermique a été maintenue à environ 0°C à l'aide d'un bain de glace. Une fois la réaction terminée, on a dilué à l'éther et hydrolysé le mélange avec une faible quantité de saumure. Le solide granulaire blanc a été enlevé par filtration et lavé à l'éther. La phase organique a été filtrée et évaporée pour fournir 7,5 g (rend. 76%) de (1R,3R,4R,8S)-3,9-p-menthanediol, dont les données analytiques étaient les suivantes :

RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 0,89(m, 2H) ; 0,95(d, $J=7\text{Hz}$, 3H) ; 1,15(d, $J=7\text{Hz}$, 3H) ; 1,30(dxdxd, $J_1=13$, $J_2=9$, $J_3=4\text{Hz}$, 1H) ; 1,44(m, 1H) ; 1,53(m, 1H) ; 1,68(m, 2H) ; 1,85(m, 2H) ; 3,40(dxd, $J_1=8$, $J_2=4\text{Hz}$, 1H) ; 3,50(dxd, $J_1=11$, $J_2=8\text{Hz}$, 1H) ; 3,94(m, 1H) δ ppm.
RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 17,3(t) ; 17,6(q) ; 21,4(q) ; 27,4(d) ; 32,1(t) ; 38,5(d) ; 39,1(t) ; 46,4(d) ; 64,7(t) ; 71,3(d) δ ppm.
SM : 172(1, M^+), 154(4), 139(8), 123(28), 112(32), 95(69), 81(100), 71(80), 55(73), 41(44).

On a ajouté, à -5°C , à une solution du diol préparé ci-dessus (8 g ; 46,7 mmole) dans la pyridine (50 ml) 4,8 g d'anhydride acétique. Le mélange de la réaction a ensuite été agité pendant la nuit à température ambiante. Après extraction à l'éther, la phase étherée a été lavée successivement avec une solution à 10% de HCl, de l'eau et de la saumure. On a séché sur sulfate de magnésium et concentré. Le mélange a été soumis à une "flash chromatography" (éluant : pentane/éther = 5/1) pour fournir 7,8 g (rend. 78%) d'acétate de (1R,3R,4R,8S)-3-hydroxy-9-p-menthanyle dont les données analytiques étaient les suivantes :

RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 1,27(d, $J=7\text{Hz}$, 3H) ; 1,30(d, $J=7\text{Hz}$, 3H) ; 1,40(m, 3H) ; 1,50(m, 1H) ; 1,55-1,75(m, 3H) ; 1,82(m, 1H) ; 1,91(m, 1H) ; 2,07(s, 3H) ; 3,94(dxd, $J_1=11$, $J_2=7\text{Hz}$, 1H) ; 4,03(m, 1H) ; 4,20(dxd, $J_1=11$, $J_2=4\text{Hz}$, 1H) δ ppm.
RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 16,5(q) ; 21,0(q) ; 21,2(t) ; 21,4(q) ; 28,0(d) ; 31,1(t) ; 33,0(d) ; 39,2(t) ; 43,3(d) ; 68,3(t) ; 70,2(d) ; 171,5(s) δ ppm.
SM : 171(1), 154(9), 136(15), 121(13), 112(58), 97(52), 81(57), 69(58), 55(53), 43(100).

Du réactif de Jones a été ajouté goutte à goutte à une solution de 7,44 g (34,8 mmole) de l'acétate susmentionné dans l'acétone (100 ml) jusqu'à

ce que l'oxydation, suivie par chromatographie en couche mince, soit complète. On a filtré le mélange réactionnel sur Celite® et évaporé, extrait à l'éther et lavé la solution étherée trois fois à l'eau. L'évaporation de l'éther a fourni 7,29 g (rend. 99%) d'acétate de
5 (1R,4R,8S)-3-oxo-9-p-menthanyle ayant les données suivantes :

RMN(¹H, 360MHz, benzène) : 0,70(d, J=7Hz, 3H) ; 0,87(d, J=7Hz, 3H) ;
1,15(m, 1H) ; 1,31(m, 1H) ; 1,43(m, 1H) ; 1,54(m, 1H) ; 1,72(m, 1H) ;
1,72(s, 3H) ; 1,87(dxd, J₁=13, J₂=8Hz, 1H) ; 2,03(m, 2H) ; 2,11(dxd,
10 J₁=13, J₂=5Hz, 1H) ; 3,93(dxd, J₁=10, J₂=5Hz, 1H) ; 4,02(dxd, J₁=10,
J₂=4Hz, 1H) δ ppm.
RMN(¹³C, 360MHz, CDCl₃) : 15,5(q) ; 20,6(q) ; 20,9(q) ; 26,3(t) ; 29,9(t) ;
31,6(d) ; 33,4(d) ; 48,3(t) ; 52,7(d) ; 66,8(t) ; 171,1(s) ; 212,6(s) δ ppm.
SM : 212(1, M⁺), 169(1), 152(6), 137(11), 123(8), 112(100), 97(17), 69(29),
15 43(33).

On a ajouté en petites portions, à -60°C et pendant 2 h, 2,9 g (415 mmole)
de lithium à une solution contenant 5,78 g (27,3 mmole) de l'acétate
préparé ci-dessus, 33 g (620 mmole) de chlorure d'ammonium dans
20 300 ml de NH₃ liquide et 100 ml d'éther. Le NH₃ liquide a été évaporé et
100 ml d'éther et 100 ml d'eau ajoutés. On a extrait la phase organique
avec de la saumure pour obtenir 4,7 g de produit brut. La purification par
"flash chromatography" de ce dernier (éluant : pentane/éther = 1/2) a
fourni le (+)(1R,3S,4R,8S)-3,9-p-menthanediol, avec les données
25 suivantes :

[α]_D²⁰ = +8,7° ; c = 1,9%, dans le CHCl₃
RMN(¹H, 360MHz, CDCl₃) : 0,95(d, J=7Hz, 3H) ; 0,98(d, J=7Hz, 3H) ; 1,33-
1,51(m, 6H) ; 1,78(m, 2H) ; 2,07(m, 1H) ; 3,57(dxd, J₁=11, J₂=4Hz, 1H) ;
30 3,65(dxd, J₁=11, J₂=5Hz, 1H) ; 3,70(dxdxd, J₁=9, J₂=4, J₃=4Hz, 1H)
δ ppm.
RMN(¹³C, 360MHz, CDCl₃) : 12,4(q) ; 18,7(q) ; 24,3(t) ; 28,1(d) ; 31,1(t) ;
38,4(d) ; 41,0(t) ; 48,8(d) ; 66,3(d) ; 66,9(t) δ ppm.
SM : 154(6), 137(11), 123(25), 95(55), 81(100), 67(60), 55(65), 41(45).

35

3,09 G (18 mmole) de ce diol, en solution dans 8 ml d'acétate d'éthyle,
ont été ajoutés à 6,92 g (44 mmole) de permanganate de potassium dans
25 ml d'acétate d'éthyle. Le mélange de la réaction a été agité à

température ambiante pendant la nuit et ensuite hydrolysé par addition de solution de bisulfite de sodium jusqu'à décoloration complète. On a filtré le précipité blanc et lavé la phase organique avec de la saumure jusqu'à pH 7. Après séchage et concentration on a obtenu 1,97 g de
 5 (-)(3S,3aR,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone pure à 95%.
 Les données de cette furanone sont présentées ci-après :

$[\alpha]_D^{20} = -71,7^\circ$; c = 0,8%, dans le CHCl_3

IR : 2943, 1807, 1186, 989 cm^{-1}

10 RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 1,07(d, J=7Hz, 3H) ; 1,17(d, J=7Hz, 3H) ; 1,4-
 1,7(m, 4H) ; 1,72(dxd, $J_1=12$, $J_2=5\text{Hz}$, 1H) ; 1,94(m, 1H) ; 2,10(dxdxd,
 $J_1=12$, $J_2=3$, $J_3=3\text{Hz}$, 1H) ; 2,30(m, 1H) ; 2,65(dxq, $J_1=7$, $J_2=7\text{Hz}$, 1H) ;
 4,23(dxdxd, $J_1=12$, $J_2=12$, $J_3=4\text{Hz}$, 1H) δ ppm.

RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 9,6(q) ; 19,2(q) ; 20,2(t) ; 28,1(d) ; 31,0(t) ;
 15 36,1(t) ; 38,9(d) ; 48,1(d) ; 78,2(d) ; 180,3(s) δ ppm.

SM : 167(1), 124(3), 109(15), 95(22), 81(100), 67(57), 55(20), 41(15).

Odeur : décrite dans l'introduction.

20 F. Préparation de la (-)-(3R,3aR,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone

Une solution de 0,33 g (2 mmole) de la furanone obtenue sous E et 0,064 g (1,2 mmole) de méthylate de sodium anhydre dans le THF (6 ml) a été agitée pendant 4 h à température ambiante. La réaction a été arrêtée
 25 avec une solution à 10% de HCl et le mélange réactionnel extrait à l'éther. On a lavé la phase organique à la saumure, séché et concentré pour obtenir un mélange de lactones. La furanone désirée a été séparée de ce mélange par chromatographie préparative en phase gazeuse.

30 $[\alpha]_D^{20} = -9,8^\circ$; c = 0,92%, dans le CHCl_3

IR : 2940, 1809, 1171, 999 cm^{-1}

RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 1,07(d, J=7Hz, 3H) ; 1,23(d, J=7Hz, 3H) ;
 1,48(m, 2H) ; 1,62(m, 2H) ; 1,70(dxd, $J_1=12$, $J_2=5\text{Hz}$, 1H) ; 1,80(m, 1H) ;
 2,16(dxdxd, $J_1=12$, $J_2=3$, $J_3=3\text{Hz}$, 1H) ; 2,30(m, 2H) ; 3,99(dxdxd, $J_1=11$,
 35 $J_2=9$, $J_3=4\text{Hz}$, 1H) δ ppm.

RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 12,5(q) ; 19,2(q) ; 23,0(t) ; 28,2(d) ; 31,0(t) ;
 35,7(t) ; 41,5(d) ; 52,5(d) ; 79,3(d) ; 179,5(s) δ ppm.

SM : 147(1), 140(2), 133(1), 124(3), 109(12), 95(22), 81(100), 67(52), 55(23), 41(18).

Odeur : coumarinée, flouve, foin, soufrée, caoutchouc.

5 G. Préparation de (+)-(3aS,6R,7aR)-perhydro-6-méthyl-3-méthylène-2-benzo[b]furanone et de (3aS,6R,7aS)-perhydro-6-méthyl-3-méthylène-2-benzo[b]furanone

10 Ces deux lactones, préparées selon le schéma I, ou comme il est décrit dans l'art antérieur cité auparavant, avaient les données suivantes :

(+)-(3aS,6R,7aR)-perhydro-6-méthyl-3-méthylène-2-benzo[b]furanone
 $[\alpha]_D^{20} = +55,22^\circ$

15 RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 1,04(d, J=6Hz, 3H) ; 1,05-1,20(m, 1H) ; 1,25-1,45(m, 2H) ; 1,64(m, 1H) ; 1,84(dxm, J=14Hz, 1H) ; 2,13(dxm, J=14Hz, 1H) ; 2,26(dxdxd, J₁=13, J₂=2, J₃=2Hz, 1H) ; 2,37(m, 1H) ; 3,73(dxdxd, J₁=12, J₂=12, J₃=4Hz, 1H) ; 5,40(d, J=4Hz, 1H) ; 6,07(d, J=4Hz, 1H) δ ppm.

20 RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 22,0(q) ; 25,0(t) ; 31,4(d) ; 33,8(t) ; 38,6(t) ; 48,7(d) ; 82,6(d) ; 116,9(t) ; 139,8(s) ; 170,7(s) δ ppm.

SM : 166(4, M⁺), 138(40), 109(36), 94(100), 81(73), 67(65), 55(47), 41(25).

Odeur : coumarinée, lactonique, tonka, jonquille, très puissante.

25 (3aS,6R,7aS)-perhydro-6-méthyl-3-méthylène-2-benzo[b]furanone
 RMN(^1H , 360MHz, CDCl_3) : 0,94(d, J=6Hz, 3H) ; 1,00(m, 1H) ; 1,25-1,40(m, 2H) ; 1,45-1,70(m, 2H) ; 1,85(m, 1H) ; 2,20(dxm, J=14Hz, 1H) ; 2,84(m, 1H) ; 2,52(m, 1H) ; 5,54(d, J=1Hz, 1H) ; 6,10(d, J=1Hz, 1H) δ ppm

RMN(^{13}C , 360MHz, CDCl_3) : 21,7(q) ; 25,6(d) ; 28,3(t) ; 31,2(t) ; 35,8(t) ; 39,5(d) ; 77,2(d) ; 119,5(t) ; 142,4(s) ; 170,9(s) δ ppm.

30 Odeur : coumarinée, lactonique, tonka.

H. Préparation de (-)-(3aS,6R,7aS)-perhydro-3,3,6-triméthyl-2-benzo[b]furanone

35 On a placé 2,54 g (35,8 mmole) de pyrrolidine dans un ballon à -40°, puis ajouté 14,3 ml de butyllithium 2,5 M dans l'hexane. On a laissé remonter la température à 0° puis de nouveau refroidi à -40° et introduit 5 g (29,8 mmole) de perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone (mélange de

4 diastéréomères). On a laissé remonter la température à 0° et ajouté 12,8 g (90,3 mmole) d'iodure de méthyle avant de revenir à température ambiante. Après 1 h, le mélange de la réaction a été hydrolysé et extrait à l'éther. La phase organique a été lavée à l'eau, puis séchée sur MgSO₄ et concentrée. Le produit brut a été chromatographié sur silice (éluant : Et₂O/pentane = 3/7) pour fournir ainsi la lactone désirée (rend. ~10%).

$[\alpha]_D^{20} = -35,5^\circ$; c = 0,65% dans le CHCl₃

RMN(¹H, 360MHz, CDCl₃) : 0,8-0,95(m, 1H) ; 0,92(d, J=7Hz, 3H) ; 1,16(s, 3H) ; 1,29(s, 3H) ; 1,1-1,25(m, 2H) ; 1,53(m, 1H) ; 1,62-1,75(m, 2H) ; 1,88(m, 1H) ; 2,24(m, 1H) ; 4,69(m, 1H) δ ppm.

RMN(¹³C, 360MHz, CDCl₃) : 19,16(q) ; 21,93(q) ; 23,27(q) ; 24,89(t) ; 26,27(d) ; 32,32(t) ; 36,41(t) ; 44,80(d) ; 45,66(s) ; 76,21(d) ; 182,11(s) δ ppm.

SM : 182(12), 132(2), 123(24), 95(100), 81(87), 67(38), 19(55), 41(7).

Odeur : lactonique, fruitée, coumarinée.

Les énantiomères suivants des furanones décrites dans les alinéas A à F présentaient les propriétés citées ci-après :

(3S,3aR,6S,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
(pure à 87%)

Odeur : butyrique, rance, coumarinée, lactonique, soufrée, puissante.

(+)-(3R,3aR,6S,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone

$[\alpha]_D^{20} = +69,9^\circ$

Odeur : coumarinée, foin, terreuse, lactonique.

(+)-(3S,3aR,6S,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone

$[\alpha]_D^{20} = +45,8^\circ$

Odeur : coumarinée, noix, huile de noix.

Les (3S,3aS,6S,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, (3S,3aS,6S,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, (3R,3aR,6S,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone et (3R,3aS,6S,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone ont également été préparées.

Les applications en parfumerie selon l'invention seront maintenant décrites plus en détail à l'aide des exemples suivants.

Exemple 1

5

Préparation d'une composition parfumante

On a préparé une composition parfumante de base, destinée à un parfum de type masculin, oriental, en mélangeant les ingrédients suivants :

10

	Ingrédients	Parties en poids
	Acétate de linalyle	210
	Ambrox® DL 1) à 10%*	350
	Anthranilate de méthyle dist.	25
15	4-(4-Hydroxyphényl)-2-butanone à 10%*	15
	Essence de bergamote synth.	135
	Essence de cannelle de Ceylan à 10%*	70
	Eugénol à 10%*	40
	Essence de citron	110
20	Héliotropine ord.	120
	Hydroxycitronellal	35
	Indol purif. à 10%*	15
	Polywood® 2)	190
	Dihydromyrcénol 3)	180
25	Linalol	50
	Lyal® 4)	400
	Essence de mandarine synth.	30
	Iralia® 5)	90
	Méthylnaphtylcétone cryst.	20
30	Jasmonate de méthyle	300
	Essence de patchouli	120
	Sandalore® 6)	50
	Tonalid® 7)	500
	Exaltolide® 8)	200
35	Vanilline	95
	Vertofix coeur 9)	250
	TOTAL	3600

- * dans le dipropylèneglycol
- 1) tétraméthyl perhydronaphtofurane, origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
 - 5 2) acétate de perhydro-5,5,8a-triméthyl-2-naphtyle ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
 - 3) origine : International Flavors and Fragrances Inc., U.S.A.
 - 4) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl)-3-cyclohexène-1-carboxaldéhyde ; origine : International Flavors and Fragrances Inc., U.S.A.
 - 10 5) méthylionone ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
 - 6) 5-(2,2,3-triméthylcyclopent-3-ényl)-3-méthylpentan-2-ol ; origine : L. Givaudan, Vernier, Suisse
 - 7) 7-acétyl-1,1,3,4,4,6-hexaméthyltétraline ; origine : PFW, Hollande
 - 8) pentadécanolide ; origine : Firmenich SA, Genève, Suisse
 - 15 9) origine : International Flavors and Fragrances Inc., U.S.A.

A cette composition de base de type balsamique-floral, boisé, musqué, on a
20 ajouté 400 parties en poids de coumarine pour obtenir une composition A, respectivement 400 parties en poids de perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone pour obtenir une composition B nouvelle.

Ces deux compositions A et B ont été comparées à l'aveugle par un panel d'experts parfumeurs. De l'avis de ces derniers la composition B nouvelle
25 développait une odeur beaucoup plus balsamique que celle de la composition A, odeur qui rappelait celle des fèves de tonka. Par ailleurs, le caractère floral de la composition B semblait complètement étouffé à cette concentration de furanone.

Lorsqu'on a réduit de moitié la quantité de perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone ajoutée à la composition de base, on a obtenu une
30 composition nouvelle dont l'odeur se rapprochait beaucoup plus de celle de la composition A, avec toutefois un caractère moins vanillé.

Lorsqu'on a ajouté à la composition de base 100 parties en poids de perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone on a obtenu un effet olfactif encore plus
35 semblable à celui qu'on obtenait avec 400 parties en poids de coumarine, c'est-à-dire, on a obtenu une composition nouvelle dont l'odeur était très proche de celle de la composition A, quoique globalement plus boisée et moins vanillée.

On a également comparé la performance de cette furanone avec celle de son homologue insaturé, la 5,6,7,7a-tétrahydro-7a-méthoxy-3,6-diméthyl-2(4H)-benzo[b]furanone ou menthalactone.

- 5 Lorsqu'on a ajouté à deux échantillons distincts de la composition de base susmentionnée 200 parties en poids de la furanone selon la présente invention et 200 parties en poids de menthalactone, on a obtenu deux compositions, respectivement C et D, possédant des odeurs tout à fait différentes. Alors que l'odeur de la composition nouvelle C, contenant la
- 10 perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, avait comme caractère dominant la note orientale, vanillée-coumarinée, celle de la composition D, qui contenait la menthalactone, était vaguement poudrée-vanillée, avec un caractère de type "alimentaire", la note vanillée étouffant toute la fragrance de la composition D. Contrairement à cette dernière, la composition C avait
- 15 une odeur clairement parfumistique, riche, avec beaucoup plus de volume et une note élégante de type oriental-coumariné.
- D'autre part, la composition D semblait beaucoup moins "concentrée" que la composition C.

20

Exemple 2

Test de substantivité sur du linge

25

- On a préparé des échantillons d'une base adoucissante parfumée en ajoutant à des échantillons distincts d'un adoucissant textile standard non parfumé respectivement de la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, de la coumarine, de la 8-oxatricyclo[5.3.1.0^{2,6}]undécan-9-one (origine : Firmenich
- 30 SA ; voir brevet US 3,981,892), de la cis-10,10-diméthyl-tricyclo[7.1.1.0^{2,7}]undéc-2-én-4-one (origine : Firmenich SA ; voir brevet US 4,226,745), de la 1-oxaspiro[4.5]décan-2-one (origine : Firmenich SA ; voir brevet US 5,057,239), et de la menthalactone dans les quantités indiquées dans le Tableau (parties en poids) ci-après.

35

Tableau


Ingrédients	Echantillon					
	1	2	3	4	5	6
adouçissant non-parfumé	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone	0,1	-	-	-	-	-
coumarine	-	0,1	-	-	-	-
8-oxatricyclo[5.3.1.0 ^{2,6}]undécan-9-one	-	-	0,1	-	-	-
cis-10,10-diméthyl-tricyclo[7.1.1.0 ^{2,7}]undéc-2-én-4-one	-	-	-	0,1	-	-
1-oxaspiro[4.5]décan-2-one	-	-	-	-	0,1	-
menthalactone	-	-	-	-	-	0,1

- 5 Dans six machines à laver le linge, on a traité séparément six lots de textiles standard, contenant des textiles en coton, en fibre acrylique et en nylon, avec respectivement les échantillons 1 à 6 préparés ci-dessus. Les six lots de textiles ainsi traités ont ensuite été évalués à l'aveugle par un panel d'experts parfumeurs, aussi bien à l'état humide qu'après leur séchage.
- 10 Les résultats de ces essais comparatifs ont montré que, de l'avis des parfumeurs, le lot de textiles traité avec l'échantillon 1, contenant la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, exhalait une odeur jugée cinq à dix fois plus forte que l'odeur du lot de textiles traité avec l'échantillon 2, contenant de la coumarine, ceci aussi bien sur le linge humide que sur le
- 15 linge sec. L'odeur du linge traité avec l'échantillon 1 était aussi beaucoup plus durable après le séchage.
- Les textiles traités avec l'échantillon 3 exhalaient une odeur jugée moins puissante et moins substantive que celle des textiles traités avec l'échantillon 2, alors que l'odeur du lot traité avec l'échantillon 4 était plus
- 20 puissante et tenace que celle de ces derniers, et que l'odeur exhalée par les textiles traités avec l'échantillon 5 était comparable, en intensité et durabilité, à l'odeur des textiles traités avec l'échantillon 2. De l'avis unanime des parfumeurs, tous ces trois lots de textiles traités avec les échantillons 3, 4 et 5 possédaient des odeurs qui étaient nettement inférieures, en puissance et
- 25 substantivité, à l'odeur du lot traité avec l'échantillon 1, ceci aussi bien à la sortie de la machine à laver qu'après le séchage des textiles.

Par ailleurs, les textiles traités avec l'échantillon 6 développaient une odeur beaucoup plus faible à l'état humide que ceux traités avec l'échantillon 1, odeur qui disparaissait très vite sur les textiles secs. Ce lot de textiles était, en fait, le moins substantif de tous les lots susmentionnés.

REVENDICATIONS

1. Utilisation d'une furanone de formule



5

dans laquelle les symboles R^1 et R^2 , pris séparément, sont identiques et représentent chacun un radical méthyle, ou sont différents et représentent chacun un atome d'hydrogène ou un radical méthyle, ou, pris ensemble, 10 représentent un radical méthylène, à titre d'ingrédient parfumant pour la préparation de compositions parfumantes ou d'articles parfumés.

2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite furanone se présente sous forme de l'un de ses isomères optiquement actifs.

3. Utilisation selon la revendication 2, de la (+)-(3aS,6R,7aR)-perhydro-6-méthyl-3-méthylène-2-benzo[b]furanone ou de la (3aS,7aR)-perhydro-6-méthyl-2-benzo[b]furanone. 15

4. Utilisation selon la revendication 2, de la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, sous forme de l'un des composées suivantes :

- a) (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
- 20 b) (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
- c) (-)-(3S,3aR,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone.

5. Utilisation selon la revendication 1, de la perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, sous forme d'un mélange de deux ou plusieurs de ses isomères optiquement actifs.

25 6. Utilisation selon la revendication 5, caractérisée en ce que le poids combiné des (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone et (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone dans ledit mélange est de 50% ou plus.

30 7. Utilisation selon la revendication 6, caractérisée en ce que ledit mélange contient environ 50% en poids de (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, 30% en poids de (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, 11% en poids de (-)-(3S,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone et 7% en poids de

(-)-(3R,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, par rapport au poids du mélange.

8. Utilisation selon la revendication 5, caractérisée en ce que ledit mélange contient 50% ou plus de l'un des isomères suivants :

- 5 a) (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
 b) (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone.

9. Composition parfumante ou article parfumé résultant de l'utilisation selon l'une des revendications 1 à 8.

10 10. Article parfumé selon la revendication 9, sous forme d'un parfum ou d'une eau de toilette, d'un savon, d'un gel de douche ou bain, d'un shampoing ou autre produit d'hygiène capillaire, d'une préparation cosmétique, d'un désodorisant corporel ou d'air ambiant, d'un détergent ou adoucissant textile, ou d'un produit d'entretien.

15 11. Composition contenant 50% ou plus de l'un des composés suivants :

- a) (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
 b) (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone.

20 12. Composition caractérisée en ce qu'au moins 50% de son poids est constitué par un mélange de (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone et (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone.

25 13. Composition selon la revendication 12, contenant environ 50% en poids de (+)-(3S,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, 30% en poids de (+)-(3R,3aS,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, 11% en poids de (-)-(3S,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone et 7% en poids de (-)-(3R,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone, par rapport au poids de composition.

14. Composé choisi parmi les suivants :

- 30 a. (-)-(3S,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
 b. (-)-(3R,3aS,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
 c. (-)-(3R,3aR,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
 d. (-)-(3S,3aR,6R,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
 e. (+)-(3S,3aR,6R,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
 f. (3S,3aR,6S,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
35 g. (+)-(3R,3aR,6S,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
 h. (+)-(3S,3aR,6S,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
 i. (3S,3aS,6S,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
 j. (3S,3aS,6S,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone

- k. (3R,3aS,6S,7aR)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
- l. (3R,3aR,6S,7aS)-perhydro-3,6-diméthyl-2-benzo[b]furanone
- m. (-)-3aS,6R,7aS)-perhydro-3,3,6-triméthyl-2-benzo[b]furanone.

5 15. Utilisation d'une furanone telle que définie dans l'une des revendications 1 à 4 pour la reconstitution de l'odeur caractéristique de la coumarine dans des compositions parfumantes ou articles parfumés.

16. Utilisation selon la revendication 15, caractérisée en ce que ladite furanone se présente sous forme d'un mélange tel que défini dans l'une des revendications 5 à 8.